

# Verzeichniss

der von Herrn Dr. W. Horn auf Ceylon gesammelten

## Ruteliden.

Von

**Dr. Fr. Ohaus.**

1. *Anomala (Heteroptia) varians* Oliv. 1 ♂ von Anuradhapura.  
6 ♀ von Nalanda, Puttalam und Negombo.
2. *A. (Heteroptia) ypsilon* Wiedem. 18 ♂ von Negombo, Puttalam,  
Nalanda, Laxapana. Hatton, Anuradhapura und Kandy;  
1 ♀ von Matala.
3. *A. (Heteroptia) testacea* Blanch. 1 ♂ von Matala, 1 ♀ von  
Kandy.
4. *A. varicolor* Gyllenh. 4 ♂ und 4 ♀ von Colombo.
5. *A. (Euchlora) perplexa* Hope. 2 ♀ von Anuradhapura resp.  
Nalanda.
6. *Mimela Mac Leayana* Vigors. 2 ♀ von Matala resp. Kandy.
7. *M. xanthorhina* Hope. 1 ♂ von Laxapana.
8. *Popillia complanata* Newm. Von dieser in der Färbung sehr  
veränderlichen Art liegen 11 ♂ und 10 ♀ von Pentotta,  
Hatton und Laxapana vor, darunter die Varietäten *lateralis*  
Kr. (3), *semilimbata* m. (4), *humeralis* m. (3), *discalis*  
Walker (2), *microphthalmica* m. (1), *stolata* m. (1), *dif-*  
*fusa* m. (1), *apicalis* m. (2), *viridissima* m. (4).
9. *Adoretus pallens* Blanch. 1 ♂ von Negombo.
10. *A. lasiopygus* Burm. 1 ♂ von Paradna.
11. *A. singhalensis* nov. spec. Nitidus, depressus, rufo-fuscus  
caput tarsisque obscuriora, femora tibiaeque intus flava;  
caput, thorax et pedes pilis griseo-flavis erectis. elytra et  
abdomen pilis griseis brevioribus accumbentibus sat dense  
obtecta, elytra praeterea pilis griseo-flavis longioribus erectis  
in series quattuor aggregatis ornata. Caput cum clypeo dense  
et profunde, ad oculos solum confluerter punctatum, clypeus

paraboliens margine parum elevatus; thorax brevis et scutellum dense vix confluer punctata; elytra costis quattuor (suturali inclusa) vix elevatis praedita, punctis costas delimitantibus in series ordinatis, punctis interstitialibus irregularibus; pygidium elytris obtectum confluer punctatum et pilis brevibus griseis sicut in abdomine aecumbentibus obtectum; hujus segmenta fusca, margine rufa disperse punctata; pedes pilis erectis longis flavidis obsita, tibiae antieae tridentatae, dente apicali sat longo recurvo; antennae rufae.

Long. 12, lat. hum. 5 mm. ♀. Kandy.

Nach der Burmeister'schen Eintheilung würde diese Art in die Nähe seines *A. caliginosus* gehören, dem sie in Größe, Färbung und in der graugelben Behaarung ziemlich gleicht; sie ist jedoch flacher und durch den Bau der Oberlippe von ihr zu unterscheiden. Bei der *singhalensis* ist die Oberlippe rothbraun, glänzend, weitläufig tief punktirt; aus jedem Punkt entspringt ein graugelbes Haar; neben dem Seitenrand verläuft jederseits vom Basalwinkel beginnend eine tiefe, scharfe Furche; die Parthie zwischen dieser und dem Seitenrand ist glänzend, schwarz, punktfrei, ebenso wie der gerade abgestutzte schnabelförmige Fortsatz, der Seitenrand regelmäßig tief crenulirt; das Kinn ist hell röthlichgelb und an seinem Vorderrand tief ausgebuchtet, sodaß zwischen Oberlippe und Kinn eine halbkreisförmige Vertiefung liegt. Bei *caliginosus* ist diese Vertiefung viel geringer, die Furche neben dem Seitenrand weniger deutlich, die Oberlippe dichter punktirt (bei frischen Stücken auch behaart) und mit einem scharf abgesetzten Längskiel von der Spitze des Schnabels bis zur Mitte der Basis versehen.

Mit Ausnahme der letzten sind alle von Dr. Horn auf Ceylon gesammelten Arten auch auf dem Festland Vorderindiens gefunden worden.