

க.பொ.த உயர்தரம்

இணைந்த கணிதம்

(தூயகணிதப்பகுதி)

தீர்க்கோண கணிதம்

G.C.E. ADVANCED LEVEL

COMBINED MATHEMATICS

(Pure Mathematics Component - Trigonometry)

கா. கணேசலிங்கம், B.Sc. Dip-in-Ed.

க. பொ. த

உயர்தர வகுப்புக்கான

இணைந்த கணிதம்

(தூயகணிதப் பகுதி)

தீர்க்காண கணிதம்

K. Ganeshalingam. B. Sc. Dip in Ed.

SAI EDUCATIONAL PUBLICATION
155/2, CANAL ROAD, COLOMBO - 06.
Phone : 592707

BIBLIOGRAPHICAL DATA

Title	: INNAINTHA KANITHAM (PURE MATHEMATICS - COMPONENT TRIGONOMETRY)
Language	: Tamil
Author	: Karthigesu Ganeshalingam B. Sc.Dip – in – Ed. Puttalai, Puloly.
Publications	: Sai Educational Publication 155/2, Canal Road, Colombo – 06.
Date of Issue	: August 2005
No of pages	: 333 + iv
Copyright	: Sai Educational Publication.
Type Setting	: SDS COMPUTER SERVICES, Col - 06. Tel : 553265
Printed at Students Offset Services, Chennai-600 001, #25382513	
நூலின் விபரம்	
தலைப்பு	: க. பொ. த உயர்தரம் இணைந்த கணிதம் (தூயகணிதப் பகுதி - திரிகோண கணிதம்)
மொழி	: தமிழ்
ஆசிரியர்	: கார்த்திகேச கணேசலிங்கம். புற்றளை, புலோலி.
வெளியீடு	: சாயி கல்வி வெளியீட்டகம். 155/2, கனல் வீதி கொழும்பு - 06
பிரசுரத்திக்கீ	: ஆகஸ்டு 2005
பக்கங்கள்	: 225 + iv
பதிப்புரிமை	: சாயி கல்வி வெளியீட்டகம்.
கணிதப்பதிவு	: எஸ்.டி.எஸ் கம்பியூட்டர் சேர்விசஸ், கொழு - 0-6. 553265
அச்சிட்டோர் : மாணவர் மறுதோன்றி அச்சகம், சென்னை - 1. # 25382513	

எண்ணுரை

புதிய பாடத்திட்ட இணைந்த கணிதம் - தூய கணிதப் பகுதி அட்சரகணித நூலைத் தொடர்ந்து, தூயகணிதப் பகுதியில் திரிகோண கணிதம் என்னும் இந்நால் வெளிவருகிறது. பாடத்திட்டத்தில் அடக்கப்பட்டுள்ள உள்ளடக்கங்கள் யாவையும் இந்நால் கொண்டுள்ளது.

இந்நாலில் ஒவ்வொரு அலகிற்கும் பல்வேறு விதமான உதாரணங்கள், கடந்தகால வினாப்பத்திரக் கணக்குகள், என்பன மாணவர்கள் இலகுவாக விளங்கிக் கொள்ளக் கூடிய முறையில் செய்துகாட்டப்பட்டுள்ளன. அவற்றைத் தொடர்ந்து வரும் பயிற்சிக் கணக்குகளை மாணவர்கள் தாமாகவே செய்து கொள்ள இது வழிவகுத்துக் கொடுக்கும் என்பது எனது எதிர்பார்ப்பாகும். அநேக மாணவர்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க 1982 - 2000 வரையான கடந்தகால வினாப்பத்திரத்தில் சில குறித்த கணக்குகளுக்கான விடைகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் திரிகோணகணித நூலின் பருமன் அதிகரிப்பினால் ஆள்கூற்றுக் கேத்திரகணிதம் தனி ஒரு நூலாக வெளிவரும் என்பதையும் அறியத்தருகிறோம். மாணவர்கள் வெறுமனே விடைகளைப் பெறும் கணித யுத்திகளைப் பயிலும் இயந்திரங்களாக இருக்காது கணிதத் தாற்பரியத்தை விளங்கிக் கொண்டு அதனை மேலும் விருத்தி செய்யும் சிந்தனையாளர்களாக இருப்பது அவசியமாகும்.

நிறைவுகள் ஏற்று குறைவுகள் சுட்டி மேலும் இணைந்த கணிதத்தின் அடுத்த பகுதி நூலை வெளியிட ஆக்கமும் ஊக்கமும் தருவார்களை மாணவர்களையும் ஆசிரியர்களையும் கேட்டு இந்நாலை புத்தக உருவில் கொணர்ந்த சாயி கல்வி வெளியீட்டகத்துக்கும் எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்.

நன்றி
ஜூன் 2001

ஆசிரியர்

பொருளாடக்கம்

1. கோண அளவீடுகள், திரிகோண கணித விகிதங்கள் 01
2. $\sin(A \pm B)$, $\cos(A \pm B)$, $\tan(A \pm B)$
என்பவற்றின் விரிவுகள் 26
3. மடங்குக் கோணங்கள் 47
4. திரிகோணகணித சமன்பாடுகள் 60
5. முக்கோணியின் பக்கங்களும் கோணங்களும். 131
6. மேலதிக உதாரணங்கள் 115
7. பலவினப் பயிற்சி 214
8. விடைகள் 222

1. கோண அளவீடுகள், திரிகோணம் கணித விகிதங்கள்

கோண அளவீடுகள் (Measurement of angles)

O - மூச்சி

Ox - ஆரம்பக் கோடு

அல்லது நிலைத்த கோடு ஆகும்.

Ox இலிருந்து இடஞ்சுழியாக

அளக்கப்படும் கோணங்கள்,


நேர்க் கோணங்கள் (positive angles)

எனவும், வலஞ்சுழியாக அளக்கப்படும் கோணங்கள்

மறைக்கோணங்கள் (negative angles) எனவும்

வரையப்படுகிறது.

கோணங்கள் பாகையில் அல்லது ஆரையனில் அளக்கப்படும்.



ஆரையன் (Radian)

O வை மையமாகவும் r ஜ ஆரையாகவும் உடைய வட்டம் ஒன்றைக் கருதுக. ஆரை r க்கு நீளத்தில் சமமாக உள்ள வில் AB எனின், வில் AB யினால் மையம் O வில் எதிரமைக்கப்படும் கோணம் 1 ஆரையன் எனப்படும்.

$\angle AOB = 1$ ஆரையன் $= 1^c$ எனக் குறிக்கப்படும்.

$360^o = 2\pi$ ஆரையன் ஆகும்.


$$1^o = \frac{2\pi}{360} = \frac{\pi}{180} \text{ ஆரையன்.}$$

மறுதலையாக

$$2\pi \text{ ஆரையன்} = 360^o$$

$$1 \text{ ஆரையன்} = \frac{360^o}{2\pi}$$

$$= \frac{180^o}{\pi} = 57.3^o \text{ (அண்ணளவாக)}$$



$360^\circ = 2\pi$ ஆரையன் என்பதால்

$180^\circ = \pi, 90^\circ = \frac{\pi}{2}, 60^\circ = \frac{\pi}{3}, 30^\circ = \frac{\pi}{6}, 120^\circ = \frac{2\pi}{3}$ ஆரையன்கள் ஆகும்.


வட்ட வில்லொன்றின் நீளம் :

r ஆரையடைய வில்லொன்று (AB என்க)

வட்டமையம் O வில் எதிரமைக்கும்

கோணம் θ ஆரையன் எனின்,

வட்ட வில் AB யின் நீளம் $r\theta$ ஆகும்.



ஆரைச்சிறை (Sector)

வட்டமொன்றின் இரு ஆரைகள்


OA, OB என்பவற்றாலும் வில் AB யினாலும்

அடைக்கப்பட்ட உரு ஆரைச்சிறை எனப்படும்.

ஆரை r ஆகவும், கோணம் AOB யானது

த ஆரையனாகவும் இருக்க

ஆரைச்சிறை AOB யின் பரப்பு $\frac{1}{2}r^2\theta$ ஆகும்.



திரிகோண கணித விகிதங்கள் (Trigonometric ratios)

செங்கோண முக்கோணி ABC யில்


கோணம் ABC ஒரு செங்கோணம்.

AC - செம்பக்கம் ஆகும். கோணம் $ACB = \theta$ என்க.

$$\sin \theta = \frac{\text{எதிர்ப்பக்கம்}}{\text{செம்பக்கம்}} = \frac{AB}{AC}$$

$$\cos \theta = \frac{\text{அயல்பக்கம்}}{\text{செம்பக்கம்}} = \frac{BC}{AC}$$

$$\tan \theta = \frac{\text{எதிர்ப்பக்கம்}}{\text{அயல்பக்கம்}} = \frac{AB}{BC}$$



$$\begin{aligned}\text{மேலும் } \tan \theta &= \frac{AB}{BC} = \frac{AB}{AC} \times \frac{AC}{BC} \\ &= \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \text{ ஆகும்.}\end{aligned}$$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\cosec \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

என வரையறுக்கப்படும்.

$2a$ பக்கமுள்ள சமபக்க முக்கோணி ABC ஐக் கருதுக.

$AB = BC = AC = 2a$ ஆகும்.

AD, BC யிற்கு செங்குத்தாகும்.

எனவே $BD = DC = a$ ஆகும்.

செங்கோண முக்கோணி ABD யில்


$$\begin{aligned}AD^2 &= AB^2 - BD^2 \\ &= (2a)^2 - a^2 = 3a^2\end{aligned}$$

$$AD = a\sqrt{3}$$

$$\sin 60^\circ = \frac{AD}{AB} = \frac{a\sqrt{3}}{2a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 60^\circ = \frac{BD}{AB} = \frac{a}{2a} = \frac{1}{2}$$

$$\tan 60^\circ = \frac{AD}{BD} = \frac{\sqrt{3}a}{a} = \sqrt{3} \text{ ஆகும்.}$$



$$\sin 30^\circ = \frac{BD}{AB} = \frac{a}{2a} = \frac{1}{2}$$

$$\cos 30^\circ = \frac{AD}{AB} = \frac{\sqrt{3}a}{2a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$


$$\tan 30^\circ = \frac{BD}{AD} = \frac{a}{a\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ ஆகும்.}$$

PQR என்பது இருசமபக்க செங்கோண முக்கோணி.

கோணம் $PQR = 90^\circ$; $PQ = QR = x$ என்க.

செங்கோண முக்கோணி PQR இல்

$$\begin{aligned} PR^2 &= PQ^2 + QR^2 \\ &= x^2 + x^2 = 2x^2 \\ PR &= x\sqrt{2} \text{ ஆகும்.} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \sin 45^\circ &= \frac{x}{x\sqrt{2}}; \quad \cos 45^\circ = \frac{x}{x\sqrt{2}}, \quad \tan 45^\circ = \frac{x}{x} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}; \quad = \frac{1}{\sqrt{2}}; \quad = 1 \end{aligned}$$

இங்கு திரிகோண கணித விகிதங்கள் யாவும் முக்கோணியின் பக்கங்களின் நீளங்களில் தங்கியிருக்கவில்லை என்பதை அவதானிக்க.

கூர்ந்கோணங்களுக்கு மட்டுமன்றி

எந்த ஒரு கோணத்திற்கும் திரிகோண கணித விகிதம் பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படும்.


செவ்வக தெக்காட்டின் தளம் ஒன்றைக் கருதுக.

x, y அச்சுக்கள் வெட்டும் புள்ளி

உற்பத்தி O ஆகும்.

O வை மையமாகவும், r ஜ ஆரையாகவும் கொண்ட வட்டமொன்றைக் கருதுக.

வட்டத்தின் பரித்தியில் புள்ளி P யானது



கோணம் $POX = \theta$ ஆகுமாறு உள்ளது என்க.

$P \equiv (x, y); \quad OP = r$ ஆகும்.


$$\sin \theta = \frac{y}{r}; \quad \cos \theta = \frac{x}{r}, \quad \tan \theta = \frac{y}{x}$$

$$\cosec \theta = \frac{r}{y}; \quad \sec \theta = \frac{r}{x}; \quad \cot \theta = \frac{x}{y}$$


என வரையறுக்கப்படும்.

திரிகோணகணித விகிதங்களின் குறிகள் (Signs)

(i) $0 < \theta^\circ < 90^\circ$



(ii) $90^\circ < \theta^\circ < 180^\circ$



$0 < \theta^\circ < 90^\circ$ எனின்

புள்ளி $P \equiv (x, y)$ முதலாம் கால் வட்டத்திலிருக்கும்.

எனவே $x > 0, y > 0$

எப்போதும் நேர் ஆகும்.

$$\sin \theta = \frac{y}{r} > 0$$

$$\cos \theta = \frac{x}{r} < 0$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x} > 0$$


$r > 0$

$$\sin \theta = \frac{y}{r} > 0$$


$$\cos \theta = \frac{x}{r} < 0$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x} < 0$$

$180^\circ < \theta < 270^\circ$



$270^\circ < \theta < 360^\circ$



$180^\circ < \theta < 270^\circ$ எனின்

புள்ளி $P \equiv (x, y)$. முன்றாம் கால் வட்டத்தில் அமையும். இங்கு $x < O$; $y < O$ ஆகும்.

$$\sin \theta = \frac{y}{r} < 0$$

$$\cos \theta = \frac{x}{r} < 0$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x} > 0$$

$270^\circ < \theta < 360^\circ$ எனின்

புள்ளி $P \equiv (x, y)$ நான்காம் கால் வட்டத்தில் அமையும் இங்கு $x > O$; $y < O$ ஆகும்

$$\sin \theta = \frac{y}{r} < 0$$

$$\cos \theta = \frac{x}{r} > 0$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x} < 0$$

0° கிணதும் 90° கிணதும் திரிகோண கணித விகிதங்கள்

வட்டத்தின் ஆரை $OP = r$ ஆகும்.

$\theta = 0^\circ$ எனின், $P \equiv A$ ஆகும்.


$A \equiv (x, y) \equiv (r, 0)$ ஆகும்.

$$\sin 0^\circ = \frac{y}{r} = \frac{0}{r} = 0$$

$$\cos 0^\circ = \frac{x}{r} = \frac{r}{r} = 1$$

$$\tan 0^\circ = \frac{y}{x} = \frac{0}{r} = 0 \text{ ஆகும்.}$$

$\theta = 90^\circ$ எனின், $P \equiv B$ ஆகும், $B \equiv (0, r)$




$$\sin 90^\circ = \frac{y}{r} = \frac{r}{r} = 1 \text{ ஆகும்.}$$

$$\cos 90^\circ = \frac{x}{r} = \frac{0}{r} = 0 \text{ ஆகும்.}$$

$$\tan 90^\circ = \frac{y}{x} = \frac{r}{0} - \text{இது வரையறுக்கப்படவில்லை}$$

இவ்வாறு $180^\circ, 270^\circ$ என்பவற்றின் திரிகோண கணித விகிதங்களையும். கணிக்கலாம்.



θ°	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°
$\sin \theta^\circ$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1
$\cos \theta^\circ$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
$\tan \theta^\circ$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	*	0	*

$0^\circ, 90 - \theta^\circ$ என்பவற்றிற்கிடையோன திரிகோணகளுக்கு விகிதத்தொடர்பு

$$\angle P_1 Ox = \theta \quad \angle P_2 Ox = 90 - \theta$$

$P_1 \equiv (x_1, y_1)$; $P_2 \equiv (x_2, y_2)$ எனக்

$$\sin \theta = \frac{y_1}{r}$$

$$\cos \theta = \frac{x_1}{r}$$

$$\tan \theta = \frac{y_1}{x_1}$$

$\Delta OMP_1, \Delta P_2 NO$ என்பன ஒருங்கிணைச்வானலை.

எனவே, $y_2 = x_1$; $x_2 = y_1$ ஆகும்.

$$\sin(90^\circ - \theta) = \frac{y_2}{r} = \frac{x_1}{r} = \cos \theta$$

$$\cos(90^\circ - \theta) = \frac{x_2}{r} = \frac{y_1}{r} = \sin \theta$$

$$\tan(90^\circ - \theta) = \frac{y_2}{x_2} = \frac{x_1}{y_1} = \cot \theta$$

$0^\circ, 90^\circ + \theta^\circ$ என்பவற்றிற்கிடையோன திரிகோணகளுக்கு விகிதத்தொடர்பு


$$\angle P_1 Ox = \theta; \angle P_2 Ox = (90 + \theta)$$

$P_1 \equiv (x_1, y_1)$; $P_2 \equiv (x_2, y_2)$ எனக்.

$\Delta OMP_1, \Delta P_2 NO$ என்பன

ஒருங்கிணைச்வானலை.

எனவே $y_2 = x_1$; $x_2 = -y_1$ ஆகும்.



$$\sin \theta = \frac{y_1}{r}, \cos \theta = \frac{x_1}{r}, \tan \theta = \frac{y_1}{x_1}$$

$$\sin(90^\circ + \theta) = \frac{y_2}{r} = \frac{x_1}{r} = \cos \theta$$

$$\cos(90^\circ + \theta) = \frac{x_2}{r} = \frac{-y_1}{r} = -\sin \theta$$

$$\tan(90^\circ + \theta) = \frac{y_2}{x_2} = -\frac{x_1}{y_1} = -\cot \theta$$

$0^\circ, 180 - \theta^\circ$ என்பவற்றிற்கிடையோன திரிகோணகளுக்கு விகிதத்தொடர்பு

$$\angle P_1 Ox = \theta; \angle P_2 Ox = 180 - \theta \text{ ஆகும்.}$$

$P_1 \equiv (x_1, y_1)$; $P_2 \equiv (x_2, y_2)$ எனக்.


$\Delta OMP_1 \equiv \Delta ONP_2$

எனவே $y_2 = y_1$; $x_2 = -x_1$ ஆகும்.

$$\sin \theta = \frac{y_1}{r}$$

$$\cos \theta = \frac{x_1}{r}$$


$$\tan \theta = \frac{y_1}{x_1}$$



$$\sin(180^\circ - \theta) = \frac{y_2}{r} = \frac{y_1}{r} = \sin \theta$$

$$\cos(180^\circ - \theta) = \frac{x_2}{r} = \frac{-x_1}{r} = -\cos \theta$$

$$\tan(180^\circ - \theta) = \frac{y_2}{x_2} = -\frac{y_1}{x_1} = -\tan \theta$$



உதாரணமாக $\sin 120^\circ$, $\cos 120^\circ$, $\tan 150^\circ$ என்பவற்றின் பெறுமானங்கள்

$$\sin 120^\circ = \sin (180^\circ - 60^\circ) = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 120^\circ = \cos (180^\circ - 60^\circ) = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$\tan 120^\circ = \tan (180^\circ - 60^\circ) = -\tan 60^\circ = -\sqrt{3} \text{ ஆகும்.}$$

θ° , $180 + \theta^\circ$ என்பவற்றிற்கிடையோன திரிகோணகணித விகிதத் தொடர்பு

$$\angle P_1 Ox = \theta, \quad \angle P_2 Ox = 180 + \theta^\circ$$

$$P_1 \equiv (x_1, y_1); \quad P_2 \equiv (x_2, y_2) \text{ என்க.}$$

$$\Delta OP_1 M \equiv \Delta OP_2 N$$

$$y_2 = -y_1; \quad x_2 = -x_1$$

$$\sin \theta = \frac{y_1}{r}, \quad \cos \theta = \frac{x_1}{r}$$

$$\tan \theta = \frac{y_1}{x_1}$$


$$\sin (180 + \theta) = \frac{y_2}{r} = -\frac{y_1}{r} = -\sin \theta$$

$$\cos (180 + \theta) = \frac{x_2}{r} = \frac{-x_1}{r} = -\cos \theta$$

$$\tan (180 + \theta) = \frac{y_2}{x_2} = \frac{y_1}{x_1} = \tan \theta$$

உதாரணமாக $\sin 210^\circ$, $\cos 210^\circ$, $\tan 210^\circ$ என்பவற்றின் பெறுமானங்கள்

$$\sin 210^\circ = \sin (180^\circ + 30^\circ) = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}$$



$$\cos 210^\circ = \cos (180^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan 210^\circ = \tan (180^\circ + 30^\circ) = \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$\theta^\circ + 360^\circ - \theta$ என்பவற்றிற்கிடையோன திரிகோணகணித விகிதத் தொடர்பு

$$\angle P_1 Ox = \theta, \quad \angle P_2 Ox = 360^\circ - \theta$$

$$P_1 \equiv (x_1, y_1), \quad P_2 \equiv (x_2, y_2)$$

$$x_2 = x_1; \quad y_2 = -y_1$$

$$\sin \theta = \frac{y_1}{r}, \quad \cos \theta = \frac{x_1}{r}, \quad \tan \theta = \frac{y_1}{x_1}$$

$$\sin (360^\circ - \theta) = \frac{y_2}{r} = \frac{-y_1}{r} = -\sin \theta$$

$$\cos (360^\circ - \theta) = \frac{x_2}{r} = \frac{x_1}{r} = \cos \theta$$

$$\tan (360^\circ - \theta) = \frac{y_2}{x_2} = -\frac{y_1}{x_1} = -\tan \theta$$

உதாரணமாக $\sin 315^\circ$, $\cos 315^\circ$, $\tan 315^\circ$ இன் பெறுமானங்கள்

$$\sin 315^\circ = \sin (360^\circ - 45^\circ) = -\sin 45^\circ = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\cos 315^\circ = \cos (360^\circ - 45^\circ) = \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\tan 315^\circ = \tan (360^\circ - 45^\circ) = -\tan 45^\circ = -1 \text{ ஆகும்.}$$

$\theta^\circ, (-\theta)$ என்பவற்றிற்கிடையோன் திரிகோண கணித விகிதத்தொடர்பு

$$\angle P_1 O_x = \theta, \quad \angle P_2 O_x = -\theta$$

$$P_1 \equiv (x_1, y_1); \quad P_2 (x_2, y_2)$$

$$y_2 = -y_1; \quad x_2 = x_1$$

$$\sin \theta = \frac{y_1}{r}, \cos \theta = \frac{x_1}{r}, \tan \theta = \frac{y_1}{x_1}$$

$$\sin(-\theta) = \frac{y_2}{r} = \frac{-y_1}{r} = -\sin \theta$$

$$\cos(-\theta) = \frac{x_2}{r} = \frac{x_1}{r} = \cos \theta$$


$$\tan(-\theta) = \frac{y_2}{x_2} = \frac{-y_1}{x_1} = -\tan \theta$$

உதாரணமாக

$$\sin(-30^\circ) = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}; \quad \sin(-120^\circ) = -\sin 120^\circ = \frac{-\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos(-30^\circ) = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}; \quad \cos(-120^\circ) = \cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$\tan(-30^\circ) = -\tan 30^\circ = -\frac{1}{\sqrt{3}}; \quad \tan(-120^\circ) = -\tan 120^\circ = \sqrt{3}$$



சர்வசமன்பாடுகள் (Identities)

$$P \equiv (x, y)$$


$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$\frac{x^2}{r^2} + \frac{y^2}{r^2} = 1$$

$$\left(\frac{x}{r}\right)^2 + \left(\frac{y}{r}\right)^2 = 1$$

$$(\cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2 = 1$$

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \quad \dots \dots \dots (1)$$




(1) ஜ இருபக்கமும் $\cos^2 \theta$ ஆல் பிரிக்க,

$$\frac{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{1}{\cos^2 \theta}$$

$$\frac{\cos^2 \theta}{\cos^2 \theta} + \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{1}{\cos^2 \theta}$$

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta \quad \dots \dots \dots (2)$$



(1) ஜ இருபக்கமும் $\sin^2 \theta$ ஆல் பிரிக்க


$$\frac{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}{\sin^2 \theta} = \frac{1}{\sin^2 \theta}$$

$$\frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} + \frac{\sin^2 \theta}{\sin^2 \theta} = \frac{1}{\sin^2 \theta}$$

$$\cot^2 \theta + 1 = \cosec^2 \theta \quad \dots \dots \dots (3)$$


$$\begin{aligned} \cos^2 \theta + \sin^2 \theta &= 1 \\ 1 + \tan^2 \theta &= \sec^2 \theta \\ 1 + \cot^2 \theta &= \operatorname{cosec}^2 \theta \end{aligned}$$

$y = \sin x$ இன் வரைபு.




இங்கு x இன் எல்லாப் பெறுமானங்களுக்கும் $-1 \leq y \leq 1$.

$y = \cos x$ இன் வரைபு



x இன் எல்லாப் பெறுமானங்களுக்கும் $-1 \leq y \leq 1$

$y = \tan x$ இன் வரைபு



$y = \tan x$ இல் எல்லா மெய்ப் பெறுமானங்களையும் எடுக்கும்.

$f(-x) = -f(x)$ எனின், $f(x)$ எனும் சார்பு ஒற்றைச் சார்பு (odd function) எனப்படும்.

$f(-x) = f(x)$ எனின், $f(x)$ என்பது இரட்டைச் சார்பு (even function) எனப்படும்.

$f(x) = \sin x$ எனக்.

$f(-x) = \sin(-x) = -\sin x = -f(x)$

எனவே $f(x) = \sin x$ ஒற்றைச் சார்பு ஆகும்.

$g(x) = \cos x$ எனக்.

$g(-x) = \cos(-x) = \cos x = g(x)$

ஆகவே, $g(x) = \cos x$ இரட்டைச் சார்பு ஆகும்.

$h(x) = \tan x$ எனக்.

$h(-x) = \tan(-x) = -\tan x = -h(x)$

எனவே $h(x) = \tan x$ என்பது ஒற்றைச் சார்பு ஆகும்.

ஆவர்த்தனச் சார்பு (Periodic Function)

x இன் எல்லாப் பெறுமானங்களுக்கும், சார்பு $f(x)$ ஆனது,

$f(x+k) = f(x)$, $k > 0$; k ஒரு மாறிலி என இருப்பின் $f(x)$ என்பது ஆவர்த்தனமான-சார்பு எனப்படும். k இன் மிகச் சிறிய பெறுமானம் சார்பின் ஆவர்த்தன காலம் (period of the function) எனப்படும்.
திரிகோண கணிதச் சார்புகள் எல்லாம் ஆவர்த்தனமானவை, $\sin x$, $\cos x$ என்பவற்றின் ஆவர்த்தன காலம் 2π உம் $\tan x$ இன் ஆவர்த்தனகாலம் π உம் ஆகும்.

$y = \cosec x$ என்ற சார்பைக் கருதுக.

இங்கு $y \leq -1$ அல்லது $y \geq 1$, $y = -1$ இற்கும் 1 இற்குமிடையில் எப்பெறுமானத்தையும் எடுக்காது.

இவ்வாறே $y = \sec x$ எனின், $y \leq -1$ அல்லது $y \geq 1$ ஆகும்.


$y = -1$ இற்கும் $+1$ இற்குமிடையே எப்பெறுமானத்தையும் எடுக்காது.

$y = \cosec x$, $y = \sec x$ என்பவற்றின் ஆவர்த்தன காலம்


2π உம், $y = \cot x$ இன் ஆவர்த்தன காலம் π உம் ஆகும்.

வரைபுகள்


(1) Sine and Cosecant



(2) Cosine and Secant



(3) Tangent and Cotangent



உதாரணம் 1

பின்வருவனவற்றின் பெறுமானங்களைக் காண்க.

$$(a) \sin 510^\circ \quad (b) \cos 960^\circ \quad (c) \tan(-870^\circ)$$

$$(a) \sin 510^\circ = \sin(360^\circ + 150^\circ) = \sin 150^\circ$$

$$= \sin(180^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

$$(b) \cos 940^\circ = \cos[2 \times 360^\circ + 240^\circ]$$

$$= \cos 240^\circ = \cos(180^\circ + 60^\circ) = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$(c) \tan(-870^\circ) = -\tan 870^\circ = -\tan(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$$

$$= -\tan 150^\circ$$

$$= -\tan(180^\circ - 30^\circ)$$

$$= \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

உதாரணம் 2

நியுவக.

$$(i) \frac{1}{\cot A + \tan A} = \sin A \cos A$$

$$(ii) \frac{1}{\sec A + \tan A} = \sec A - \tan A$$

$$(i) \text{இ.கை.ப} = \frac{1}{\cot A + \tan A}$$

$$= \frac{1}{\frac{\cos A}{\sin A} + \frac{\sin A}{\cos A}}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\cos^2 A + \sin^2 A} \\ &= \frac{1}{\sin A \cos A} = 1 \times \sin A \cos A \\ &= \frac{1}{\sin A \cos A} = \text{வ.கை.ப} \\ &= \sin A \cos A \end{aligned}$$

$$(ii) \text{இ.கை.ப} = \frac{1}{\sec A + \tan A}$$

$$= \frac{1}{\sec A + \tan A} \times \frac{\sec A - \tan A}{\sec A - \tan A}$$

$$= \frac{\sec A - \tan A}{\sec^2 A - \tan^2 A}$$

$$= \frac{\sec A - \tan A}{1} = \sec A - \tan A$$

உதாரணம் 3

நியுவக.

$$(\sec \theta + \tan \theta - 1)(\sec \theta - \tan \theta + 1) = 2 \tan \theta$$

$$\text{இ.கை.ப} = (\sec \theta + \tan \theta - 1)(\sec \theta - \tan \theta + 1)$$

$$= [\sec \theta + (\tan \theta - 1)][\sec \theta - (\tan \theta - 1)]$$

$$= \sec^2 \theta - (\tan \theta - 1)^2$$

$$= \sec^2 \theta - [\tan^2 \theta - 2 \tan \theta + 1]$$

$$= \sec^2 \theta - \tan^2 \theta + 2 \tan \theta - 1$$

$$= 1 + 2 \tan \theta - 1$$

$$= 2 \tan \theta$$

உதாரணம் 4

நிறுவக.

$$(i) (\sec A + \cos A)(\sec A - \cos A) = \tan^2 A + \sin^2 A$$

இ.கை.ப $(\sec + \cos A)(\sec A - \cos A)$

$$= \sec^2 A - \cos^2 A$$

$$= (1 + \tan^2 A) - (1 - \sin^2 A)$$

$$= \tan^2 A + \sin^2 A$$

உதாரணம் 5

$$\frac{\tan A + \sec A - 1}{\tan A - \sec A + 1} = \frac{1 + \sin A}{\cos A}$$

$$\text{இ.கை.ப} = \frac{\tan A + \sec A - 1}{\tan A - \sec A + 1}$$

$$= \frac{(\tan A + \sec A) - (\sec^2 A - \tan^2 A)}{\tan A - \sec A + 1}$$

$$= \frac{(\sec A + \tan A) - (\sec A + \tan A)(\sec A - \tan A)}{\tan A - \sec A + 1}$$

$$= \frac{(\sec A + \tan A)[1 - (\sec A - \tan A)]}{(\tan A - \sec A + 1)}$$

$$= \frac{(\sec A + \tan A)(\tan A - \sec A + 1)}{(\tan A - \sec A + 1)}$$

$$= (\sec A + \tan A)$$

$$= \frac{1}{\cos A} + \frac{\sin A}{\cos A} = \frac{1 + \sin A}{\cos A} = \text{வ.கை.ப}$$

$$\frac{\tan A + \sec A - 1}{\tan A - \sec A + 1} = \frac{1 + \sin A}{\cos A}$$

உதாரணம் 6

$$\frac{1}{\cosec A - \cot A} - \frac{1}{\sin A} = \frac{1}{\sin A} - \frac{1}{\cosec A + \cot A}$$

$$\text{இ.கை.ப} = \frac{1}{\cosec A - \cot A} - \frac{1}{\sin A}$$

$$= \frac{\cosec A + \cot A}{(\cosec A - \cot A)(\cosec A + \cot A)} - \frac{1}{\sin A}$$

$$= \frac{\cosec A + \cot A}{1} - \cosec A$$

$$= \cosec A + \cot A - \cosec A$$

$$= \cosec A - (\cosec A - \cot A)$$

$$= \frac{1}{\sin A} - \frac{(\cosec A - \cot A)(\cosec A + \cot A)}{(\cosec A + \cot A)}$$

$$= \frac{1}{\sin A} - \frac{1}{\cosec A + \cot A} = \text{வ.கை.ப. கால்வாய்}$$

$$\therefore \frac{1}{\cosec A - \cot A} - \frac{1}{\sin A} = \frac{1}{\sin A} - \frac{1}{\cosec A + \cot A}$$

உதாரணம் 7

$$\frac{1 + \cos \theta + \sin \theta}{1 - \cos \theta + \sin \theta} = \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta}$$

$$\text{இ.கை.ப} = \frac{1 + \cos \theta + \sin \theta}{1 - \cos \theta + \sin \theta}$$

$$= \frac{(1 + \sin \theta) + \cos \theta}{(1 + \sin \theta) - \cos \theta} \times \frac{(1 + \sin \theta) + \cos \theta}{(1 + \sin \theta) + \cos \theta}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(1 + \sin\theta)^2 + 2\cos\theta(1 + \sin\theta) + \cos^2\theta}{(1 + \sin\theta)^2 - \cos^2\theta} \\
 &= \frac{(1 + \sin\theta)^2 + 2\cos\theta(1 + \sin\theta) + (1 - \sin^2\theta)}{1 + 2\sin\theta + \sin^2\theta - \cos^2\theta} \\
 &= \frac{(1 + \sin\theta)^2 + 2\cos\theta(1 + \sin\theta) + (1 - \sin^2\theta)}{2\sin\theta(1 + \sin\theta)} \\
 &= \frac{(1 + \sin\theta) + 2\cos\theta + (1 - \sin\theta)}{2\sin\theta} \\
 &= \frac{1 + \cos\theta}{\sin\theta}
 \end{aligned}$$

பயிற்சி 1

1. பெறுமானங் காண்க,

- | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| (a) $\sin 480^\circ$ | (b) $\cos(-870^\circ)$ | (c) $\sec 570^\circ$ |
| (d) $\cot(-675^\circ)$ | (e) $\sin 2460^\circ$ | (f) $\cot(-315^\circ)$ |

2. (a) $\sin 420^\circ \cos 390^\circ - \cos(-300^\circ) \sin(-330^\circ)$

(b) $\frac{\sin 300^\circ \tan 330^\circ \sec(-420^\circ)}{\cot 135^\circ \cos 210^\circ \cosec 315^\circ}$

(c) $\frac{\cos(\frac{\pi}{2} + A) \sec A \tan(\pi - A)}{\sec(2\pi - A) \sin(\pi + A) \cot(\frac{\pi}{2} - A)}$

எண்பவர்த்தின் பெறுமானங்களைக் காண்க.

3. பின்வருவனவற்றை நிறுவுக
 (a) $\sin 420^\circ \cos 390^\circ + \cos(-300^\circ) \sin(-330^\circ) = 1$

(b) $\cos 570^\circ \sin 510^\circ - \sin 330^\circ \cos 390^\circ = 0$

(c) $\tan 225^\circ \cot 405^\circ + \tan 765^\circ \cot 675^\circ = 0$

4. பின்வருவனவற்றை நிறுவுக

(a) $\cos A + \sin\left(\frac{3\pi}{2} + A\right) - \sin\left(\frac{3\pi}{2} - A\right) + \cos(\pi + A) = 0$

(b) $\sec\left(\frac{3\pi}{2} - A\right) \sec\left(\frac{\pi}{2} - A\right) - \tan\left(\frac{3\pi}{2} - A\right) \cdot \tan\left(\frac{\pi}{2} + A\right) = -1$

(c) $\cot A + \tan(\pi + A) + \tan\left(\frac{\pi}{2} + A\right) + \tan(2\pi - A) = 0$

பின்வருவனவற்றை நிறுவுக

5. $\frac{1}{1 - \sin A} + \frac{1}{1 + \sin A} = 2 \sec^2 A$

6. $\frac{\sin A}{1 + \cos A} + \frac{1 + \cos A}{\sin A} = 2 \cosec A$

7. $\sqrt{\frac{1 + \sin A}{1 - \sin A}} = \sec A + \tan A$ 8. $\cos^4 A \sin^4 A + 1 = 2 \cos^2 A$

9. $(\cos A - \sin A)(1 - \sin A \cdot \cos A) = \sin^3 A + \cos^3 A$

10. $\frac{1}{1 - \cos A} + \frac{1}{1 + \cos A} = 2 \cosec^2 A$

11. $\sqrt{\frac{1 - \cos A}{1 + \cos A}} = \cosec A - \cot A$

12. $\cos^6 A + \sin^6 A = 1 - 3\sin^2 A \cos^2 A$

13. $(\sec \theta + \tan \theta - 1)(\sec \theta - \tan \theta + 1) = 2 \tan \theta$

14. $\csc^4 A - \csc^2 A = \cot^2 A + \cot^4 A$
15. $\frac{\cos A}{1 - \tan A} + \frac{\sin A}{1 - \cot A} = \sin A + \cos A$
16. $(\sin A + \csc A)^2 + (\cos A + \sec A)^2 = 7 + \tan^2 A + \cot^2 A$
17. $\frac{\csc A}{\csc A + 1} + \frac{\csc A}{\csc A - 1} = 2 \sec^2 A$
18. $\frac{\csc A}{\cot A + \tan A} = \cos A$ 19. $\sec^4 A - \sec^2 A = \tan^2 A + \tan^4 A$
20. $\tan A + \cot A = \sec A \cdot \csc A$
21. $\cot^4 A + \cot^2 A = \csc^4 A - \csc^2 A$
22. $\frac{1 - \tan A}{1 + \tan A} = \frac{\cot A - 1}{\cot A + 1}$ 23. $\frac{1 + \tan^2 A}{1 + \cot^2 A} = \tan^2 A$
24. $\sqrt{\csc^2 A - 1} = \cos A \cdot \csc A$
25. $\sec^2 A \cdot \csc^2 A = \tan^2 A + \cot^2 A + 2$
26. $\tan^2 A - \sin^2 A = \sin^4 A \cdot \sec^2 A$
27. $\sqrt{\sec^2 A + \csc^2 A} = \tan A + \cot A$
28. $\frac{\tan A}{1 - \cot A} + \frac{\cot A}{1 - \tan A} = \sec A \cdot \csc A + 1$
29. $(\sin A + \cos A)(\cot A + \tan A) = \sec A + \csc A$
30. $(1 + \cot A - \csc A)(1 + \tan A + \sec A) = 2$
31. $\frac{\cot A \cdot \cos A}{\cot A + \cos A} = \frac{\cot A - \cos A}{\cot A \cdot \cos A}$ 32. $\frac{\cot A + \tan B}{\cot B + \tan A} = \cot A \cdot \tan B$
33. $\sin^8 A - \cos^8 A = (\sin^2 A - \cos^2 A)(1 - 2 \sin^2 A \cos^2 A)$
34. $2 \sec^2 A - \sec^4 A - 2 \csc^2 A + \csc^4 A = \cot^4 A - \tan^4 A$
35. $(\tan A + \csc B)^2 - (\cot B - \sec A)^2$
 $= 2 \tan A \cot B (\csc A + \sec B)$
36. $(\csc A - \sin A)(\sec A - \cos A)(\tan A + \cot A) = 1$
37. $\frac{\tan A + \sec A - 1}{\tan A - \sec A + 1} = \frac{1 + \sin A}{\cos A}$
38. $\frac{1}{\csc A - \cot A} - \frac{1}{\sin A} = \frac{1}{\sin A} - \frac{1}{\csc A + \cot A}$
39. $(1 + \cot A + \tan A)(\sin A - \cos A) = \frac{\sec A}{\csc^2 A} - \frac{\csc A}{\sec^2 A}$
40. $(1 + \tan A + \sec A)(1 + \cot A - \csc A) = 2$
41. $\cos A(\tan A + 3)(3 \tan A + 1) = 3 \sec A + 10 \sin A$
42. $\sin A(\cot A + 5)(5 \cot A + 1) = 5 \csc A + 26 \cos A$
43. $a \cos \theta + b \sin \theta = c$;
 $b \cos \theta - a \sin \theta = C$ எனின் $a^2 + b^2 = 2c^2$ என நிறுவக.
44. $x = a \cos A \cdot \cos B$; $y = a \cos A \sin B$; $z = a \sin A$ எனின்
 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ என நிறுவக.
45. $\sec \theta + \tan \theta = x$ எனின், $\sin \theta = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$ எனக் காட்டுக.
46. $\sec^6 A - \tan^6 A = 1 + 3 \tan^2 A + 3 \tan^4 A$ எனக் காட்டுக.
47. $2 \cos \theta + 3 \sin \theta = a$
 $3 \cos \theta + 2 \sin \theta = b$ எனின் θ ஜிச் சாராது
 a, b இல் தொடர்பொன்றினைப் பெறுக.
48. $2 \tan \theta + \sec \theta = \lambda$
 $\tan \theta + 2 \sec \theta = \mu$ எனின் θ ஜிச் சாராது
 λ, μ என்பவற்றிற்கிடையே தொடர்பு ஒன்றைப் பெறுக.

$$2. \sin(A \pm B), \cos(A \pm B), \tan(A \pm B)$$

என்பவற்றின் விரிவுகள்


$$OM = QN + NM$$

$$= QN + PL$$

$$OQ \sin(A+B) = PQ \cos A + OP \sin A$$

$$= OQ \sin B \cos A + OQ \cos B \cdot \sin A$$

$$\therefore \sin(A+B) = \sin B \cos A + \cos B \cdot \sin A$$



$$\boxed{\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B} \quad (1)$$

(1) இலிருந்து

$$\sin(A-B) = \sin[A+(-B)]$$

$$= \sin A \cdot \cos(-B) + \cos A \sin(-B)$$

$$= \sin A \cdot \cos B - \cos A \sin B$$

$$\boxed{\sin(A-B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B} \quad (2)$$

$$OM = OL - LM$$

$$= OL - NP$$

$$OQ \cos(A+B) = OP \cos A - PQ \sin A$$

$$= OQ \cos B \cos A - OQ \sin B \cdot \sin A$$

$$\boxed{\cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B} \quad (3)$$

(3) இலிருந்து

$$\cos(A-B) = \cos[A+(-B)]$$

$$= \cos A \cdot \cos(-B) - \sin A \cdot \sin(-B)$$

$$= \cos A \cos B + \sin A \sin B$$

$$\cos(A-B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$$

$$\tan(A+B) = \frac{\sin(A+B)}{\cos(A+B)}$$

$$= \frac{\sin A \cos B + \cos A \sin B}{\cos A \cos B - \sin A \sin B}$$

தொகுதி, பகுதி என்பவற்றை $\cos A \cos B$ ஆல்பிரிக்க,

$$= \frac{\frac{\sin A \cos B + \cos A \sin B}{\cos A \cos B}}{\frac{\cos A \cos B - \sin A \sin B}{\cos A \cos B}}$$

$$= \frac{\frac{\sin A \cos B}{\cos A \cos B} + \frac{\cos A \sin B}{\cos A \cos B}}{\frac{\cos A \cos B}{\cos A \cos B} - \frac{\sin A \sin B}{\cos A \cos B}}$$

$$= \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$$

$$\boxed{\tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}} \quad (5)$$

$$\tan(A - B) = \frac{\sin(A - B)}{\cos(A - B)} = \frac{\sin A \cos B - \cos A \sin B}{\sin A \cos B + \cos A \sin B}$$

தொகுதி, பகுதி என்பவற்றை $\cos A \cdot \cos B$ ஆல் பிரிக்க.

$$\tan(A - B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B}$$

அல்லது

$$\tan(A - B) = \tan[A + (-B)]$$

$$= \frac{\tan A + \tan(-B)}{1 - \tan A \cdot \tan(-B)} = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B}$$

$$\tan(A - B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B} \quad \text{----- (6)}$$

எந்த ஒரு கோணத்திற்கும் கிள்வாய்ப்பாட்டினைப் பின்வரும் முறையில் நிறுவலாம்

O_x, O_y ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தான் இரு அச்க்கள், O வை மையமாகவும்

1 அலகு ஆரையாகவும் வட்டம் ஒன்று வரையப்படுகிறது. கோணங்கள் POx, QOx என்பன முறையே B, A ஆகும்.


$$P \equiv (x_1, y_1) \equiv (\cos B, \sin B)$$

$$Q \equiv (x_2, y_2) \equiv (\cos A, \sin A) \text{ ஆகும்.}$$

$$PQ^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$$

$$= (\cos A - \cos B)^2 + (\sin A - \sin B)^2$$

$$= [2 - 2 \cos A \cos B - 2 \sin A \sin B] \text{ ஆகும்} \quad \text{----- (1)}$$



ΔOPQ இல்,

$$PQ^2 = OP^2 + OQ^2 - 2 \cdot OP \cdot OQ \cos(A - B)$$

$$= 1 + 1 - 2 \times 1 \times 1 \cdot \cos(A - B)$$

$$= 2 - 2 \cos(A - B) \quad \text{----- (2)}$$

(1), (2) இலிருந்து,

$$2 - 2 \cos(A - B) = 2 - 2 \cos A \cos B - 2 \sin A \sin B$$

$$\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B \quad \text{----- *} \quad \underline{\underline{\cos(A - B)}}$$

$$\cos(A + B) = \cos[A - (-B)] = \cos A \cos(-B) + \sin A \sin(-B)$$

$$= \cos A \cos B - \sin A \sin B$$

சமன்பாடு * இல் A யிற்குப் பதிலாக $\frac{\pi}{2} - A$ என இட,

$$\cos\left[\left(\frac{\pi}{2} - A\right) - B\right] = \cos\left(\frac{\pi}{2} - A\right) \cdot \cos B + \sin\left(\frac{\pi}{2} - A\right) \cdot \sin B$$

$$\cos\left[\frac{\pi}{2} - (A + B)\right] = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

$$\sin(A + B) = \underline{\underline{\sin A \cos B + \cos A \sin B}}$$

சமன்பாடு * இல் A யிற்குப் பதிலாக $\frac{\pi}{2} + A$ என இட

$$\cos\left[\frac{\pi}{2} + A - B\right] = \cos\left(\frac{\pi}{2} + A\right) \cos B + \sin\left(\frac{\pi}{2} + A\right) \sin B$$

$$-\sin(A - B) = -\sin A \cos B + \cos A \sin B$$

$$\sin(A - B) = \underline{\underline{\sin A \cos B - \cos A \sin B}}$$

$$\begin{aligned}\sin(A+B) &= \sin A \cos B + \cos A \sin B \\ \sin(A-B) &= \sin A \cos B - \cos A \sin B \\ \cos(A+B) &= \cos A \cos B - \sin A \sin B \\ \cos(A-B) &= \cos A \cos B + \sin A \sin B \\ \tan(A+B) &= \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} \\ \tan(A-B) &= \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tan 15^\circ &= \tan(45^\circ - 30^\circ) \\ &= \frac{\tan 45^\circ - \tan 30^\circ}{1 + \tan 45^\circ \tan 30^\circ} \\ &= \frac{1 - \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 + \frac{1}{\sqrt{3}}} \\ &= \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1}\end{aligned}$$

உதாரணம் 1

$\sin 105^\circ$, $\cos 105^\circ$, $\tan 15^\circ$ என்பவற்றின் பெறுமானங்களைக் காண்க.

$$\begin{aligned}\sin 105^\circ &= \cos(60^\circ + 45^\circ) \\ &= \sin 60^\circ \cos 45^\circ + \cos 60^\circ \sin 45^\circ \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{3} + 1}{2\sqrt{2}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos 105^\circ &= \cos(60^\circ + 45^\circ) \\ &= \cos 60^\circ \cos 45^\circ - \sin 60^\circ \sin 45^\circ \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{1 - \sqrt{3}}{2\sqrt{2}}\end{aligned}$$

உதாரணம் 2

$\sin(A+B) \cdot \sin(A-B) = \sin^2 A - \sin^2 B$ எனக் காட்டுக.

$$\begin{aligned}\sin(A+B) \cdot \sin(A-B) &= (\sin A \cos B + \cos A \sin B)(\sin A \cos B - \cos A \sin B) \\ &= (\sin^2 A \cos^2 B - \cos^2 A \sin^2 B) \\ &= \sin^2 A (1 - \sin^2 B) - \sin^2 B (1 - \sin^2 A) \\ &= \sin^2 A - \sin^2 A \cdot \sin^2 B - \sin^2 B + \sin^2 A \sin^2 B \\ &= \sin^2 A - \sin^2 B\end{aligned}$$

உதாரணம் 3

$$\frac{\cos A + \sin A}{\cos A - \sin A} = \tan(A + 45^\circ) \text{ எனக் காட்டுக.$$

$$\begin{aligned}\frac{\cos A + \sin A}{\cos A - \sin A} &= \frac{\cos A + \sin A}{\cos A - \sin A} \\ &= \frac{1 + \tan A}{1 - \tan A} \\ &= \frac{\tan 45^\circ + \tan A}{1 - \tan 45^\circ \tan A} \\ &= \tan(45^\circ + A) = \tan(A + 45^\circ)\end{aligned}$$

உதாரணம் 4

கருக்குக

$$\begin{aligned}\sin A \cdot \sin(B-C) + \sin B \cdot \sin(C-A) + \sin C \cdot \sin(A-B) &= 0 \text{ எனக்காட்டுக.} \\ &= \sin A [\sin B \cdot \cos C - \cos B \cdot \sin C] + \sin B [\sin C \cdot \cos A - \cos C \cdot \sin A] \\ &\quad + \sin C [\sin A \cos B - \cos A \sin B] = 0\end{aligned}$$

உதாரணம் 5

$\tan\{A + (B + C)\}$ ஜக் கருதி $\tan(A + B + C)$ இன் விரிவை எழுதுக.

$$\begin{aligned}\tan(A + B + C) &= \tan\{A + (B + C)\} \\ &= \frac{\tan A + \tan(B + C)}{1 - \tan A \cdot \tan(B + C)} \\ &= \frac{\tan A + \frac{\tan B + \tan C}{1 - \tan B \cdot \tan C}}{1 - \tan A \cdot \frac{\tan B + \tan C}{1 - \tan B \cdot \tan C}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= \frac{\tan(1 - \tan B \tan C) + \tan B + \tan C}{1 - \tan B \cdot \tan C - \tan A(\tan B + \tan C)} \\ &= \frac{\tan A - \tan A \tan B \tan C + \tan B + \tan C}{1 - \tan B \cdot \tan C - \tan C \cdot \tan A - \tan A \tan B} \\ &= \frac{\tan A + \tan B + \tan C - \tan A \tan B - \tan C}{1 - \tan B \cdot \tan C - \tan C \cdot \tan A - \tan A \tan B}\end{aligned}$$

உதாரணம் 6

$$\begin{aligned}\cos(45^\circ - A) \cdot \cos(45^\circ - B) - \sin(45^\circ - A) \sin(45^\circ - B) \\ &= \sin(A + B) \text{ எனக் காட்டுக.} \\ \cos(45^\circ - A) \cdot \cos(45^\circ - B) - \sin(45^\circ - A) \cdot \sin(45^\circ - B) \\ &= \cos[(45^\circ - A) + (45^\circ - B)] \\ &= \cos[90^\circ - (A + B)] \\ &= \sin(A + B)\end{aligned}$$

உதாரணம் 7

$$\tan 3A - \tan 2A - \tan A = \tan 3A \cdot \tan 2A \cdot \tan A \text{ எனக் காட்டுக.}$$

$$3A = 2A + A$$

$$\begin{aligned}\tan 3A &= \tan(2A + A) \\ &= \frac{\tan 2A + \tan A}{1 - \tan 2A \cdot \tan A}\end{aligned}$$

$$\tan 3A (1 - \tan 2A \cdot \tan A) = \tan 2A + \tan A$$

$$\tan 3A - \tan 3A \cdot \tan 2A \cdot \tan A = \tan 2A + \tan A$$

$$\tan 3A - \tan 2A - \tan A = \tan 3A \cdot \tan A \cdot \tan A$$

$\sin C \pm \sin D$, $\cos C \pm \cos D$ என்பவற்றிற்கான
வாய்ப்பாடுகள்

$$A + B = C$$

$$\underline{A - B = D} \quad \text{எனின்,}$$

$$2A = C + D; \quad A = \frac{C + D}{2}$$

$$2B = C - D; \quad B = \frac{C - D}{2} \quad \text{ஆகும்.}$$

$$\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B \quad \dots \dots \dots (1)$$

$$\underline{\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B} \quad \dots \dots \dots (2)$$

$$(1) + (2); \quad \sin(A + B) + \sin(A - B) = 2 \sin A \cos B$$

$$\boxed{\sin C + \sin D = 2 \sin\left(\frac{C + D}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{C - D}{2}\right)}$$

$$(1) - (2); \quad \sin(A + B) - \sin(A - B) = 2 \cos A \sin B$$

$$\boxed{\sin C - \sin D = 2 \cos\left(\frac{C + D}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{C - D}{2}\right)}$$

$$\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B \quad \dots \dots \dots (3)$$

$$\underline{\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B} \quad \dots \dots \dots (4)$$

$$(3) + (4); \quad \cos(A + B) + \cos(A - B) = 2 \cos A \cos B$$

$$\boxed{\cos C + \cos D = 2 \cos\left(\frac{C + D}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{C - D}{2}\right)}$$

$$(3) - (4); \quad \cos(A + B) - \cos(A - B) = -2 \sin A \sin B$$

$$\begin{aligned} \cos C - \cos D &= -2 \sin\left(\frac{C + D}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{C - D}{2}\right) \\ &= 2 \sin\left(\frac{C + D}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{D - C}{2}\right) \end{aligned}$$

$$\boxed{\cos C - \cos D = 2 \sin\left(\frac{C + D}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{D - C}{2}\right)}$$

$$\boxed{\sin C + \sin D = 2 \sin\left(\frac{C + D}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{C - D}{2}\right)}$$

$$\boxed{\sin C - \sin D = 2 \cos\left(\frac{C + D}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{C - D}{2}\right)}$$

$$\boxed{\cos C + \cos D = 2 \cos\left(\frac{C + D}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{C - D}{2}\right)}$$

$$\boxed{\cos C - \cos D = 2 \sin\left(\frac{C + D}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{D - C}{2}\right)}$$

உதாரணம் 8

பின்வருவனவற்றை நிறுவக.

$$(i) \quad \frac{\sin A + \sin 3A}{\cos A + \cos 3A} = \tan 2A$$

$$(ii) \quad \frac{\sin 7A - \sin A}{\cos A - \cos 7A} = \cot 4A$$

$$(i) \quad \frac{\sin A + \sin 3A}{\cos A + \cos 3A}$$

$$= \frac{2 \sin 2A \cos A}{2 \cos 2A \cos A} = \tan 2A$$

(ii)
$$\frac{\sin 7A - \sin A}{\cos A - \cos 7A}$$

$$= \frac{2 \cos 4A \cdot \sin 3A}{2 \sin 4A \cdot \sin 3A} = \cot 4A$$

உதாரணம் 9

$$\begin{aligned}\cos(A+B) + \sin(A-B) &= 2 \sin(45^\circ + A) \cos(45^\circ + B) \text{ என நிறுவக.} \\ \cos(A+B) + \sin(A-B) &= \sin[90 + (A+B)] + \sin(A-B) \\ &= 2 \sin\left[\frac{90 + 2A}{2}\right] \cdot \cos\left[\frac{90^\circ + 2B}{2}\right] \\ &= 2 \sin(45^\circ + A) \cos(45^\circ + B)\end{aligned}$$

உதாரணம் 10

$$\begin{aligned}\frac{\sin A + \sin 3A + \sin 5A + \sin 7A}{\cos A + \cos 3A + \cos 5A + \cos 7A} &= \tan 4A \text{ என நிறுவக.} \\ \frac{\sin A + \sin 3A + \sin 5A + \sin 7A}{\cos A + \cos 3A + \cos 5A + \cos 7A} &= \frac{\sin A + \sin 7A + \sin 3A + \sin 5A}{\cos A + \cos 7A + \cos 3A + \cos 5A} \\ &= \frac{2 \sin 4A \cdot \cos 3A + 2 \sin 4A \cdot \cos A}{2 \cos 4A \cdot \cos 3A + 2 \cos 4A \cdot \cos A} \\ &= \frac{2 \sin 4A (\cos 3A + \cos A)}{2 \cos 4A (\cos 3A + \cos A)} \\ &= \tan 4A\end{aligned}$$

உதாரணம் 11

$$\begin{aligned}\frac{\sin A - \sin 5A + \sin 9A - \sin 13A}{\cos A - \cos 5A - \cos 9A + \cos 13A} &= \cot 4A \text{ என நிறுவக.} \\ \frac{\sin A - \sin 5A + \sin 9A - \sin 13A}{\cos A - \cos 5A - \cos 9A + \cos 13A} &= \frac{(\sin A + \sin 9A) - (\sin 5A + \sin 13A)}{(\cos A - \cos 9A) - (\cos 5A + \cos 13A)} \\ &= \frac{2 \sin 5A \cdot \cos 4A - 2 \sin 9A \cdot \cos 4A}{2 \sin 5A \cdot \sin 4A - 2 \sin 9A \cdot \sin 4A} \\ &= \frac{2 \cos 4A (\sin 5A - \sin 9A)}{2 \sin 4A (\sin 5A - \sin 9A)} \\ &= \frac{\cos 4A}{\sin 4A} = \cot 4A\end{aligned}$$

உதாரணம் 12

$$\begin{aligned}\sin A + \sin\left(A + \frac{2\pi}{3}\right) + \sin\left(A + \frac{4\pi}{3}\right) &= 0 \text{ என நிறுவக.} \\ \sin A + \sin\left(A + \frac{2\pi}{3}\right) + \sin\left(A + \frac{4\pi}{3}\right) &= \sin A + 2 \sin(\pi + A) \cdot \cos \frac{\pi}{3} \\ &= \sin A - 2 \sin A \times \frac{1}{2} \\ &= \sin A - \sin A \\ &= 0\end{aligned}$$

உதாரணம் 13

$$\begin{aligned}
 & \sin 10^\circ + \sin 20^\circ + \sin 40^\circ + \sin 50^\circ = \sin 70^\circ + \sin 80^\circ \\
 & (\sin 10^\circ + \sin 50^\circ) + (\sin 20^\circ + \sin 40^\circ) \\
 & = 2 \sin 30^\circ \cos 20^\circ + 2 \sin 30^\circ \cos 10^\circ \\
 & = 2 \times \frac{1}{2} \cos 20^\circ + 2 \times \frac{1}{2} \times \cos 10^\circ \\
 & = \cos 20^\circ + \cos 10^\circ \\
 & = \cos(90^\circ - 70^\circ) + \cos(90^\circ - 80^\circ) \\
 & = \sin 70^\circ + \sin 80^\circ
 \end{aligned}$$

பெருக்கங்களை கூட்டுத்தொகையாகவோ அல்லது வித்தியாசமாகவோ எழுதுதல்

$$\begin{aligned}
 \sin(A+B) &= \sin A \cos B + \cos A \sin B && \text{(i)} \\
 \sin(A-B) &= \sin A \cos B - \cos A \sin B && \text{(ii)} \\
 \cos(A+B) &= \cos A \cdot \cos B - \sin A \sin B && \text{(iii)} \\
 \cos(A-B) &= \cos A \cos B + \sin A \sin B && \text{(iv)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(i) + (ii), } \quad \sin(A+B) + \sin(A-B) &= 2 \sin A \cos B \\
 \text{(i) - (ii), } \quad \sin(A+B) - \sin(A-B) &= 2 \cos A \sin B \\
 \text{(iii) + (iv), } \quad \cos(A+B) + \cos(A-B) &= 2 \cos A \cos B \\
 \text{(iv) - (iii), } \quad \cos(A-B) - \cos(A+B) &= 2 \sin A \cdot \sin B
 \end{aligned}$$

எனவே,

$2 \sin A \cos B =$	$\sin(A+B) + \sin(A-B)$
$2 \cos A \sin B =$	$\sin(A+B) - \sin(A-B)$
$2 \cos A \cos B =$	$\cos(A+B) + \cos(A-B)$
$2 \sin A \sin B =$	$\cos(A-B) - \cos(A+B)$

உதாரணம் 14

பின்வருவனவற்றை ஒரு கூட்டுத்தொகையாகவோ அல்லது வித்தியாசமாகவோ தருக.

$$\begin{array}{ll}
 \text{(i)} & 2 \sin 50^\circ \cos 20^\circ \\
 \text{(ii)} & 2 \sin 40^\circ \cos 75^\circ \\
 \text{(iii)} & 2 \cos 45^\circ \cos 85^\circ \\
 \text{(iv)} & 2 \sin 20^\circ \sin 130^\circ
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(i)} \quad 2 \sin 50^\circ \cos 20^\circ &= \sin(50^\circ + 20^\circ) + \sin(50^\circ - 20^\circ) \\
 &= \sin 70^\circ + \sin 30^\circ \\
 \text{(ii)} \quad 2 \sin 40^\circ \cos 75^\circ &= \sin(40^\circ + 75^\circ) + \sin(40^\circ - 75^\circ) \\
 &= \sin 115^\circ + \sin(-35^\circ) \\
 &= \sin 115^\circ - \sin 35^\circ
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(iii)} \quad 2 \cos 45^\circ \cos 85^\circ &= \cos(45^\circ + 85^\circ) + \cos(45^\circ - 85^\circ) \\
 &= \cos 130^\circ + \cos(-40^\circ) \\
 &= \cos 130^\circ + \cos 40^\circ
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(iv)} \quad 2 \sin 20^\circ \sin 130^\circ &= \cos [20^\circ - 130^\circ] - \cos [20^\circ + 130^\circ] \\
 &= \cos(-110^\circ) - \cos(150^\circ) \\
 &= \cos 110^\circ - \cos 150^\circ \\
 &= 2 \cos(A+B) \cdot \cos(A-B) \\
 &= \cos 2A + \cos 2B
 \end{aligned}$$

உதாரணம் 15

$\sin 75^\circ \cos 45^\circ$ கூட்டுத்தொகையாக எழுதி, இதிலிருந்து $\sin 75^\circ$ கீட்ட காணக.

$$\begin{aligned}
 \sin 75^\circ \cos 45^\circ &= \frac{1}{2} [2 \sin 75^\circ \cos 45^\circ] \\
 &= \frac{1}{2} [\sin 120^\circ + \sin 30^\circ]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2 \sin 75^\circ \cos 45^\circ &= [\sin 120^\circ + \sin 30^\circ] \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3} + 1}{2}
 \end{aligned}$$

$$2 \times \sin 75^\circ \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3} + 1}{2}$$

$$\sqrt{2} \times \sin 75^\circ = \frac{\sqrt{3} + 1}{2}$$

$$\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{3} + 1}{2\sqrt{2}}$$

உதாரணம் 16

$$2 \cos^2 A \cos^2 B - 2 \sin^2 A \sin^2 B = \cos 2A + \cos 2B \text{ எனக் காட்டுக.}$$

$$2 \cos^2 A \cos^2 B - 2 \sin^2 A \sin^2 B$$

$$\begin{aligned}
 &= 2 [\cos^2 A \cos^2 B - \sin^2 A \sin^2 B] \\
 &= 2 (\cos A \cos B - \sin A \sin B) (\cos A \cos B + \sin A \sin B) \\
 &= 2 \cos(A+B) \cdot \cos(A-B) \\
 &= \cos 2A + \cos 2B
 \end{aligned}$$

உதாரணம் 17

$$\cos 2\theta \cdot \cos \frac{\theta}{2} - \cos 3\theta \cdot \cos \frac{9\theta}{2} = \sin 5\theta \cdot \sin \frac{5\theta}{2} \text{ என நிறுவக.}$$

$$\begin{aligned}
 &\cos 2\theta \cdot \cos \frac{\theta}{2} - \cos 3\theta \cdot \cos \frac{9\theta}{2} \\
 &= \frac{1}{2} [2 \cos 2\theta \cdot \cos \frac{\theta}{2} - 2 \cos 3\theta \cdot \cos \frac{9\theta}{2}] \\
 &= \frac{1}{2} \left[\left(\cos \frac{5\theta}{2} + \cos \frac{3\theta}{2} \right) - \left(\cos \frac{15\theta}{2} + \cos \frac{3\theta}{2} \right) \right] \\
 &= \frac{1}{2} \left[\cos \frac{5\theta}{2} - \cos \frac{15\theta}{2} \right] \\
 &= \frac{1}{2} \times 2 \sin 5\theta \cdot \sin \frac{5\theta}{2} \\
 &= \sin 5\theta \cdot \sin \frac{5\theta}{2}
 \end{aligned}$$

உதாரணம் 18

$$\sin A \cdot \sin(B-C) + \sin B \cdot \sin(C-A) + \sin C \cdot \sin(A-B) = 0 \text{ என நிறுவக.}$$

$$\begin{aligned}
 &\sin A \cdot \sin(B-C) + \sin B \cdot \sin(C-A) + \sin C \cdot \sin(A-B) \\
 &= \frac{1}{2} [2 \sin A \cdot \sin(B-C) + 2 \sin B \cdot \sin(C-A) + 2 \sin C \cdot \sin(A-B)]
 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} [\cos(A - B + C) - \cos(A + B - C) + \cos(B - C + A) - \cos(B + C - A) \\ + \cos(C - A + B) - \cos(C + A - B)]$$

$$= \frac{1}{2} [0] = 0$$

உதாரணம் 19

$$\cos 20^\circ \cdot \cos 40^\circ \cos 60^\circ \cos 80^\circ = \frac{1}{16} \text{ என நிறுவக.}$$

$$\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 60^\circ \cos 80^\circ$$

$$\cos 20^\circ \cos 40^\circ \times \frac{1}{2} \times \cos 80^\circ$$

$$= \frac{1}{4} [2 \cos 20^\circ \cos 40^\circ] \cdot \cos 80^\circ$$

$$= \frac{1}{4} [(\cos 60^\circ + \cos 20^\circ) \cos 80^\circ]$$

$$= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{2} \cos 80^\circ + \cos 20^\circ \cos 80^\circ \right]$$

$$= \frac{1}{8} [\cos 80^\circ + 2 \cos 20^\circ \cos 80^\circ]$$

$$= \frac{1}{8} [\cos 80^\circ + 2 \cos 100^\circ + \cos 60^\circ]$$

$$= \frac{1}{8} \left[\cos 80^\circ - \cos 80^\circ + \frac{1}{2} \right] = \frac{1}{16}$$

பயிற்சி 2(a)

பின்வருவனவற்றை நிறுவக

1. $\sin(A + B) \cdot \sin(A - B) = \cos^2 B - \cos^2 A$
 2. $(\sin A + \cos A)(\sin B + \cos B) = \sin(A + B) + \cos(A - B)$
 3. $\sin(45^\circ + A) \cos(45^\circ + B) + \cos(45^\circ + A) \cdot \sin(45^\circ + B) \\ = \cos(A + B)$
 4. $\frac{\sin(A - B)}{\cos A \cdot \cos B} + \frac{\sin(B - C)}{\cos B \cdot \cos C} + \frac{\sin(C - A)}{\cos C \cdot \cos A} = 0$
 5. $\cos A \cdot \cos(B + A) + \sin A \cdot \sin(B + A) = \cos B$
 6. $\cot(A + B) = \frac{\cot A \cdot \cot B - 1}{\cot A + \cot B}$
 7. (i) $\sin 105^\circ + \cos 105^\circ = \cos 45^\circ$ (ii) $\cos 15^\circ - \sin 15^\circ = \cos 45^\circ$
 8. $\cos(60^\circ - \theta) \cos(30^\circ + \theta) - \sin(60^\circ - \theta) \cdot \sin(30^\circ + \theta) = 0$
 9. $\sin(n-1)A \cdot \sin(n+1)A + \cos(n-1)A \cdot \cos(n+1)A = \cos 2A$
 10. $\sin(n-2)A \cdot \cos nA - \cos(n-2)A \cdot \sin nA = -\sin 2A$
 11. $A + B = 45^\circ$ எனின், $(1 + \tan A)(1 + \tan B) = 2$ எனக் காட்டுக.
 12. $\sin(x+y) = \frac{3}{4}, \sin(x-y) = \frac{1}{2}$ எனின், $\tan x = 5 \tan y$ எனக் காட்டுக.
 13. $\cos(A - B) = 3 \cos(A + B)$ எனின் $\tan A \cdot \tan B = \frac{1}{2}$ எனக் காட்டுக.
 14. $\cot B - \cot A = a, \tan A - \tan B = a$ எனின்,
- $$\cot(A - B) = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \text{ எனக் காட்டுக.}$$

15. $\cos(A+B) \cdot \cos(A-B) = \cos^2 A - \sin^2 B$ என நிறுவக.
16. $\tan A = \frac{1}{2n+1}$, $\tan B = \frac{n}{n+1}$ எனின், $\tan(A+B)$ ஐக் கணிக்க.
17. $\tan A = \frac{5}{6}$, $\tan B = \frac{1}{11}$ எனின், $\tan(A+B) = 1$ எனக் காட்டுக.
18. $\tan\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) \cdot \tan\left(\frac{3\pi}{4} + \theta\right) = -1$ என நிறுவக.
19. $\cot\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) \cdot \cot\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right) = 1$ என நிறுவக.
20. $1 + \tan A \cdot \tan \frac{A}{2} = \tan A \cdot \cot \frac{A}{2} - 1 = \sec A$ என நிறுவக.
21. $\tan A = \frac{1}{2}$, $\tan B = \frac{1}{3}$ எனின், $\tan(A+B)$ ஐக் காண்க.
மேலும் $\tan C = 1$ எனின், $\cot(A+B+C)$ ஐக் காண்க.

2 (b)

பின்வருவனவற்றை நிறுவக.

1. $\frac{\sin A + \sin B}{\sin A - \sin B} = \tan\left(\frac{A+B}{2}\right) \cdot \cot\left(\frac{A-B}{2}\right)$
2. $\frac{\sin A + \sin B}{\cos A + \cos B} = \tan\left(\frac{A+B}{2}\right)$
3. $\frac{\cos A + \cos B}{\cos B - \cos A} = \cot\left(\frac{A+B}{2}\right) \cot\left(\frac{A-B}{2}\right)$
4. $\frac{\sin A - \sin B}{\cos B - \cos A} = \cot\left(\frac{A+B}{2}\right)$
5. $\frac{\sin 2A + \sin 2B}{\sin 2A - \sin 2B} = \tan(A+B) \cdot \cot(A-B)$

6. $\frac{\sin A + \sin 3A}{\cos A + \cos 3A} = \tan 2A$
7. $\cos 70^\circ - \cos 10^\circ + \cos 50^\circ = 0$ 8. $\sin 50^\circ - \sin 70^\circ + \sin 10^\circ = 0$
9. $\sin 20^\circ + \sin 40^\circ - \sin 80^\circ = 0$
10. $\cos A + \cos\left(\frac{2\pi}{3} + A\right) + \cos\left(\frac{2\pi}{3} - A\right) = 0$
11. $\sin 10^\circ + \sin 20^\circ + \sin 40^\circ + \sin 50^\circ = \sin 70^\circ + \sin 80^\circ$
12. $\frac{\sin 3A - \sin A}{\cos A - \cos 3A} = \cot 2$
13. $\sin A + \sin\left(A + \frac{2\pi}{3}\right) + \sin\left(A + \frac{4\pi}{3}\right) = 0$
14. (a) $\cos 10^\circ = \cos 50^\circ + \cos 70^\circ$ (b) $\sin 10^\circ = \sin 70^\circ - \sin 50^\circ$
15. $\cos(A+B) = \frac{1}{5}$, $\cos(A-B) = \frac{3}{5}$ எனின்,
 $\cos A \cdot \cos B$, $\tan A \tan B$, $\tan(A-B)$ என்பவற்றைக் காண்க.
16. $\sin 2A - \sin 4A + \sin 6A = \sin 4A (2\cos 2A - 1)$
17. $\frac{\sin 5A - \sin 3A}{\cos 3A + \cos 5A} = \tan A$
18. $\frac{\sin A + 2\sin 3A + \sin 5A}{\sin 3A + 2\sin 5A + \sin 7A} = \frac{\sin 3A}{\sin 5A}$
19. $\frac{\sin(A+B) - 2\sin A + \sin(A-B)}{\cos(A+B) - 2\cos A + \cos(A-B)} = \tan A$
20. $\frac{\sin(A-C) + 2\sin A + \sin(A+C)}{\sin(B-C) + 2\sin B + \sin(B+C)} = \frac{\sin A}{\sin B}$
21. $\cos 3A + \cos 5A + \cos 7A + \cos 15A = 4\cos 4A \cdot \cos 5A \cdot \cos 6A$

$$22. \quad \cos(A+B+C) + \cos(A+B-C) \\ + \cos(B+C-A) + \cos(C+A-B) = 4 \cos A \cdot \cos B \cdot \cos C$$

$$23. \quad \sin A + \sin 2A + \sin 4A + \sin 5A = 4 \cos \frac{A}{2} \cdot \cos \frac{3A}{2} \cdot \sin 3A$$

$$24. \frac{\cos 3A - \cos A}{\sin 3A - \sin A} + \frac{\cos 2A - \cos 4A}{\sin 4A - \sin 2A} = \frac{\sin A}{\cos 2A \cdot \cos 3A}$$

$$25. \frac{\tan 5\theta + \tan 3\theta}{\tan 5\theta - \tan 3\theta} = 4 \cos 2\theta \cdot \cos 4\theta$$

$$26. \frac{\cos 3\theta + 2\cos 5\theta + \cos 7\theta}{\cos \theta + 2\cos 3\theta + \cos 5\theta} = \cos 2\theta - \sin 2\theta \cdot \tan 3\theta$$

2 (b)

1. பின்வருவனவற்றை ஒரு கூட்டுத்தொகையாகவோ அல்லது வித்தியாசமாகவோ தருக.

$$(i) \quad 2 \sin 3\theta \cdot \cos \theta$$

$$(ii) \quad 2 \sin \theta \cdot \cos 3\theta$$

$$(iii) \quad 2 \cos 6\theta \cdot \cos 8\theta$$

$$(iv) \quad 2 \sin 3\theta \cdot \sin 5\theta$$

பின்வருவனவற்றை நிறுவக

$$2. \quad \sin A \cdot \sin(A + 2B) - \sin B \cdot \sin(B + 2A) = \sin(A - B) \cdot \sin(A + B)$$

$$3. \quad \cos(36^\circ - A) + \cos(36^\circ + A) \times \cos(54^\circ + A) = \cos(54^\circ - A)$$

$$4. \quad \cos A \cdot \sin(B - C) + \cos B \cdot \sin(C - A) + \cos C \cdot \sin(A - B) = 0$$

$$5. \quad \sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 60^\circ \sin 80^\circ = \frac{3}{16}$$

$$6. \quad \cos 10^\circ \cos 30^\circ \cos 50^\circ \cos 70^\circ = \frac{3}{16}$$

$$7. \quad \cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 60^\circ \cos 80^\circ = \frac{1}{16}$$

3. மடங்குக் கோணங்கள்

$\sin 2A, \cos 2A, \tan A$ என்பவர்தினை A இல் காணல்.

$$\begin{aligned} \sin 2A &= \sin(A + A) \\ &= \sin A \cos A + \cos A \sin A \\ &= 2 \sin A \cos A \quad \text{----- (1)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin 2A &= \frac{2 \sin A \cos A}{\cos^2 A + \sin^2 A} \\ &= \frac{2 \sin A \cos A}{\cos^2 A} = \frac{2 \tan A}{1 + \tan^2 A} \end{aligned} \quad \text{----- (2)}$$

$$\begin{aligned} \cos 2A &= \cos(A + A) \\ &= \cos A \cdot \cos A - \sin A \cdot \sin A \\ &= \cos^2 A - \sin^2 A \end{aligned} \quad \text{--- (3)}$$

(3) இல் $\sin^2 A = 1 - \cos^2 A$ எனப் பிரதியிட

$$\cos 2A = \cos^2 A - (1 - \cos^2 A)$$

(3) இல் $\cos^2 A = 1 - \sin^2 A$ எனப் பிரதியிட

$$\cos^3 2A = (1 - \sin^2 A) - \sin^2 A$$

$$(3) \text{ இல்லை, } \cos 2A = \frac{\cos^2 A - \sin^2 A}{1}$$

$$= \frac{\cos^2 A - \sin^2 A}{\cos^2 A + \sin^2 A}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\cos^2 A - \sin^2 A}{\cos^2 A + \sin^2 A} \\
 &= \frac{\cos^2 A}{\cos^2 A} \\
 &= \frac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A} \quad \text{----- (6)}
 \end{aligned}$$

$$\tan 2A = \tan(A + A)$$

$$= \frac{\tan A + \tan A}{1 - \tan A \cdot \tan A} = \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A} \quad \text{----- (7)}$$

$$\sin 2A = 2 \sin A \cos A$$

$$= \frac{2 \tan A}{1 + \tan^2 A}$$

$$\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$$

$$= 2 \cos^2 A - 1$$

$$= 1 - 2 \sin^2 A$$

$$= \frac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A}$$

$$\tan 2A = \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}$$

$$\begin{aligned}
 \sin 3A &= \sin(2A + A) \\
 &= \sin 2A \cos A + \cos 2A \cdot \sin A \\
 &= 2 \sin A \cos A \cdot \cos A + (1 - 2 \sin^2 A) \cdot \sin A \\
 &= 2 \sin A (1 - \sin^2 A) + (1 - 2 \sin^2 A) \sin A
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 2 \sin A - 2 \sin^3 A + \sin A - 2 \sin^3 A \\
 &= 3 \sin A - 4 \sin^3 A
 \end{aligned}$$

$$\boxed{\sin 3A = 3 \sin A - 4 \sin^3 A}$$

$$\cos 3A = \cos(2A + A)$$

$$\begin{aligned}
 &= \cos 2A \cdot \cos A - \sin 2A \cdot \sin A \\
 &= (2 \cos^2 A - 1) \cos A - 2 \sin A \cos A \cdot \sin A \\
 &= (2 \cos^2 A - 1) \cos A - 2 \cos A (1 - \cos^2 A) \\
 &= 2 \cos^3 A - \cos A - 2 \cos A + 2 \cos^3 A \\
 &= 4 \cos^3 A - 3 \cos A
 \end{aligned}$$

$$\boxed{\cos 3A = 4 \cos^3 A - 3 \cos A}$$

$$\tan 3A = \frac{\sin 3A}{\cos 3A}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{3 \sin A - 4 \sin^3 A}{4 \cos^3 A - 3 \cos A} \\
 &= \frac{\sin A (3 - 4 \sin^2 A)}{\cos A (4 \cos^2 A - 3)}
 \end{aligned}$$

$$= \tan A \cdot \frac{[3 \cos^2 A + 3 \sin^2 A - 4 \sin^2 A]}{[4 \cos^2 A - 3 \cos^2 A - 3 \sin^2 A]}$$

$$= \tan A \cdot \frac{[3 \cos^2 A - \sin^2 A]}{[\cos^2 A - 3 \sin^2 A]}$$

$$= \tan A \frac{\frac{3\cos^2 A - \sin^2 A}{\cos^2 A}}{\frac{\cos^2 A - 3\sin^2 A}{\cos^2 A}}$$

$$= \tan A \frac{(3 - \tan^2 A)}{1 - 3\tan^2 A}$$

$$= \frac{3\tan A - \tan^3 A}{1 - 3\tan^2 A}$$

அல்லது

$$\tan 3A = \tan(2A + A)$$

$$= \frac{\tan 2A + \tan A}{1 - \tan 2A \cdot \tan A}$$

$$= \frac{\frac{2\tan A}{1 - \tan^2 A} + \tan A}{1 - \frac{2\tan A}{1 - \tan^2 A} \cdot \tan A}$$

$$= \frac{\frac{2\tan A + \tan A(1 - \tan^2 A)}{1 - \tan^2 A}}{1 - \frac{1 - \tan^2 A - 2\tan^2 A}{1 - \tan^2 A}}$$

$$= \frac{3\tan A - \tan^3 A}{1 - 3\tan^2 A}$$

$$\tan 3A = \frac{3\tan A - \tan^3 A}{1 - 3\tan^2 A}$$

$$\begin{aligned}\sin A &= \sin \left(\frac{A}{2} + \frac{A}{2}\right) \\ &= \sin \frac{A}{2} \cdot \cos \frac{A}{2} + \cos \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{A}{2} \\ &= 2 \sin \frac{A}{2} \cdot \cos \frac{A}{2} \end{aligned} \quad (1)$$

$$\sin A = \frac{2 \sin \frac{A}{2} \cdot \cos \frac{A}{2}}{1}$$

$$\sin A = \frac{2 \sin \frac{A}{2} \cdot \cos \frac{A}{2}}{\cos^2 \frac{A}{2} + \sin^2 \frac{A}{2}}$$

தொகுதி, பகுதி என்பவற்றை $\cos^2 \frac{A}{2}$ ஆல் வகுக்க,

$$\sin A = \frac{2 \tan \frac{A}{2}}{1 + \tan^2 \frac{A}{2}} \quad (2)$$

$$\begin{aligned}\cos A &= \cos \left(\frac{A}{2} + \frac{A}{2}\right) \\ &= \cos \frac{A}{2} \cdot \cos \frac{A}{2} - \sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{A}{2} \\ &= \cos^2 \frac{A}{2} - \sin^2 \frac{A}{2} \end{aligned} \quad (3)$$

$$\sin^2 \frac{A}{2} = 1 - \cos^2 \frac{A}{2} \text{ எனப் பிரதியிட}$$

$$\cos A = 2\cos^2 \frac{A}{2} - 1 \quad (4)$$

$$\cos^2 \frac{A}{2} = 1 - \sin^2 \frac{A}{2} \text{ எனப் பிரதியிட}$$

$$\cos A = 1 - 2\sin^2 \frac{A}{2} \quad (5)$$

$$\cos A = \frac{\cos^2 \frac{A}{2} - \sin^2 \frac{A}{2}}{\cos^2 \frac{A}{2} + \sin^2 \frac{A}{2}}$$

$$\begin{aligned} & \frac{\cos^2 \frac{A}{2} - \sin^2 \frac{A}{2}}{\cos^2 \frac{A}{2} / 2} \\ &= \frac{\cos^2 \frac{A}{2} + \sin^2 \frac{A}{2}}{\cos^2 \frac{A}{2}} \\ &= \frac{1 - \tan^2 \frac{A}{2}}{1 + \tan^2 \frac{A}{2}} \quad \text{-----(6)} \end{aligned}$$

$$\tan A = \tan \left(\frac{A}{2} + \frac{A}{2} \right)$$

$$= \frac{2 \tan \frac{A}{2}}{1 - \tan^2 \frac{A}{2}}$$

உதாரணம் 1

$$\frac{1 - \cos 2A}{1 + \cos 2A} = \tan^2 A \text{ எனக் காட்டுக.}$$

$$\frac{1 - \cos 2A}{1 + \cos 2A} = \frac{1 - (1 - 2 \sin^2 A)}{1 + (2 \cos^2 A - 1)}$$

$$= \frac{2 \sin^2 A}{2 \cos^2 A} = \tan^2 A$$

உதாரணம் 2

$$\frac{\sin A + \sin 2A}{1 + \cos A + \cos 2A} = \tan A \text{ எனக் காட்டுக.}$$

$$\begin{aligned} & \frac{\sin A + \sin 2A}{1 + \cos A + \cos 2A} \\ &= \frac{\sin A + 2 \sin A \cos A}{1 + \cos A + 2 \cos^2 A - 1} \\ &= \frac{\sin A + 2 \sin A \cos A}{\cos A + 2 \cos^2 A} \\ &= \frac{\sin A (1 + 2 \cos A)}{\cos A (1 + 2 \cos A)} = \tan A \end{aligned}$$

உதாரணம் 3

$$t = \tan \frac{1}{2}x \text{ எனில், } \frac{7 - 5 \cos x}{5 - 7 \cos x} \text{ ஜி } t \text{ இல் காணக.}$$

$$\cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2} \text{ ஆகும்.}$$

$$\begin{aligned} \frac{7 - 5 \cos x}{5 - 7 \cos x} &= \frac{7 - 5 \left(\frac{1 - t^2}{1 + t^2} \right)}{5 - 7 \left(\frac{1 - t^2}{1 + t^2} \right)} \\ &= \frac{7(1 + t^2) - 5(1 - t^2)}{5(1 + t^2) - 7(1 - t^2)} \\ &= \frac{2 + 12t^2}{12t^2 - 2} = \frac{6t^2 + 1}{6t^2 - 1} \end{aligned}$$

உதாரணம் 4

$$\sin 80^\circ = \sin(60^\circ + 20^\circ) \text{ என எழுதுவதன் மூலம்}$$

$$\sin 80^\circ = \sin 40^\circ + \sin 20^\circ \text{ எனக் காட்டுக. இதிலிருந்து,}$$

$$4 \cos 20^\circ \cos 40^\circ = 2 \cos 20^\circ + 1 \text{ எனக் காட்டுக}$$

இதிலிருந்து $C = \cos 20^\circ$ எனின்,

$$8C^3 - 6C - 1 = 0 \text{ என உய்த்தறிக.}$$

$$\sin 80^\circ = \sin(60^\circ + 20^\circ)$$

$$= \sin 60^\circ \cos 20^\circ + \cos 60^\circ \sin 20^\circ$$

$$\sin 80^\circ = \sin 60^\circ \cos 20^\circ + \frac{1}{2} \sin 20^\circ$$

$$2 \sin 80^\circ = 2 \sin 60^\circ \cos 20^\circ + \sin 20^\circ$$

$$= \sin 80^\circ + \sin 40^\circ + \sin 20^\circ$$

$$\sin 80^\circ = \sin 40^\circ + \sin 20^\circ \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

$$2 \sin 40^\circ \cos 40^\circ = \sin 40^\circ + \sin 20^\circ$$

$$2 \times 2 \sin 20^\circ \cos 20^\circ \cos 40^\circ = 2 \sin 20^\circ \cos 20^\circ + \sin 20^\circ \quad (\sin 20^\circ \neq 0)$$

$$4 \cos 20^\circ \cos 40^\circ = 2 \cos 20^\circ + 1 \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

$$C = \cos 20^\circ$$

$$4 \cos 20^\circ \cos 40^\circ = 2 \cos 20^\circ + 1$$

$$4 \cos 20^\circ (2 \cos^2 20^\circ - 1) = 2 \cos 20^\circ + 1$$

$$4C(2C^2 - 1) = 2C + 1$$

$$8C^3 - 6C - 1 = 0$$

உதாரணம் 5

$$\text{நிறுவக. } \cosec \theta + \cot \theta = \cot \frac{1}{2}\theta$$

$$\begin{aligned} \cosec \theta + \cot \theta &= \frac{1}{\sin \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \\ &= \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta} \end{aligned}$$

$$= \frac{2 \cos^2 \frac{\theta}{2}}{2 \sin \frac{\theta}{2} \cdot \cos \frac{\theta}{2}}$$

$$= \frac{\cos \frac{\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}} = \cot \frac{\theta}{2}$$

உதாரணம் 6

$$\sin \alpha \cdot \sin(60^\circ - \alpha) \cdot \sin(60^\circ + \alpha) = \frac{1}{4} \sin 3\alpha \text{ எனக் காட்டுக.}$$

$$\sin \alpha \cdot \sin(60^\circ - \alpha) \sin(60^\circ + \alpha)$$

$$= \frac{1}{2} [2 \sin \alpha \cdot \sin(60^\circ - \alpha) \cdot \sin(60^\circ + \alpha)]$$

$$= \frac{1}{2} \sin \alpha \cdot [\cos 2\alpha - \cos 120^\circ]$$

$$= \frac{1}{2} \sin \alpha \cdot \left[\cos 2\alpha + \frac{1}{2} \right]$$

$$= \frac{1}{4} \sin \alpha [2 \cos 2\alpha + 1]$$

$$= \frac{1}{4} [2 \cos 2\alpha \cdot \sin \alpha + \sin \alpha]$$

$$= \frac{1}{4} [\sin 3\alpha - \sin \alpha + \sin \alpha] = \frac{1}{4} \sin 3\alpha$$

உதாரணம் 7

$$\cosec A - 2 \cot 2A \cdot \cos A = 2 \sin A$$

$$\cosec A - 2 \cot 2A \cdot \cos A$$

$$= \frac{1}{\sin A} - 2 \cdot \frac{\cos 2A}{\sin 2A} \cdot \cos A$$

$$= \frac{1}{\sin A} - \frac{2 \cos 2A}{2 \sin A \cos A} \cdot \cos A$$

$$= \frac{1 - \cos 2A}{\sin A}$$

$$= \frac{1 - (1 - 2 \sin^2 A)}{\sin A}$$

$$= \frac{2 \sin^2 A}{\sin A}$$

$$= 2 \sin A$$

பயிற்சி 3

பின்வருவனவற்றை நிறுவுக.

$$1. \quad \frac{\sin 2A}{1 + \cos 2A} = \tan A$$

$$2. \quad \frac{\sin 2A}{1 - \cos 2A} = \cot A$$

$$3. \quad \frac{\sin 5\theta}{\sin \theta} - \frac{\cos 5\theta}{\cos \theta} = 8 \cos^2 \theta - 4$$

$$4. \quad (\cos x + \sin x)^4 = 1 + 2 \sin 2x + \sin^2 2x$$

$$5. \quad \frac{1 - \cos 4x}{1 + \cos 4x} = \tan^2 2x$$

$$7. \quad \frac{\sin 3A}{\sin A} - \frac{\cos 3A}{\cos A} = 2$$

$$6. \quad \frac{1}{1 - \tan x} + \frac{1}{1 + \tan x} = \tan 2x$$

$$8. \quad \frac{\sin 3A}{\sin A} + \frac{\cos 3A}{\cos A} = 4 \cos 2A$$

$$9. \quad \frac{1 - \cos 2A + \sin 2A}{1 + \cos 2A + \sin 2A} = \tan A$$

$$10. \quad \sqrt{\frac{1 + \sin \theta}{1 - \sin \theta}} = \frac{1 + \tan \frac{\theta}{2}}{1 - \tan \frac{\theta}{2}} = \sec \theta + \tan \theta$$

$$11. \quad 1 + 2 \cos 4x + \cos 8x = 4 \cos 4x \cdot \cos^2 2x$$

$$12. \quad 1 + \cos 2A + \sin 2A = 2 \cos A (\cos A + \sin A)$$

$$13. \quad \sin(\alpha - \beta) + 2 \sin \alpha + \sin(\alpha + \beta) = 4 \sin \alpha \cdot \cos^2 \frac{\beta}{2}$$

$$14. \quad \sin 3x + \sin x = 4 \sin x \cos^2 x \quad 15. \quad \sin 4x = 4 \sin x \cos x \cos 2x$$

$$16. \quad \sin 8x = 8 \sin x \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 4x$$

17. பின்வரும் ஒவ்வொரு வகையிலும் $\cos 2\alpha$ இன் பெறுமானத்தை காண்க.

$$(i) \quad \sin \alpha = -\frac{4}{5}, \quad \cos \alpha = -\frac{5}{17}, \quad \tan \alpha = \frac{5}{12}$$

$$18. \quad \tan \theta = \frac{b}{a} \text{ எனின், } a \cos 2\theta + b \sin 2\theta \text{ இன் பெறுமானத்தைக் கணிக்க.}$$

$$19. \quad (i) \quad \sin x = \frac{1}{3} \text{ எனின், } \sin 3x \text{ ஜக் காண்க.}$$

$$(ii) \quad \tan x = \frac{1}{2} \text{ எனின், } \tan 4x \text{ ஜக் காண்க.}$$

$$20. \quad \frac{\sin 3A + \sin^3 A}{\cos^3 A - \cos 3A} = \cot A$$

$$21. \quad \frac{\sin 3A - \cos 3A}{\sin A + \cos A} = 2 \sin 2A - 1$$

$$22. \quad t = \tan \frac{1}{2}x \text{ எனின், } \left(\frac{5 - 13 \sin x}{\tan \frac{1}{2}x - 5} \right) \text{ ஜக் } t \text{ இல் காண்க}$$

$$23. \quad \cos x + \sin x = a$$

$$\cos 2x = b \text{ எனின், } x \text{ ஜக் சாராது}$$

a, b இற்கிடையே தொடர்பொன்றினைப் பெறுக.

24. $\cos \theta = a, \sin 2\theta = 2b$ எனின், θ ஜிச் சாராது a, b இற்கிடையே தொடர்பொன்றினைப் பெறுக.
25. $\cos 3\theta + 3\cos \theta = 4a$
 $3\sin \theta - \sin 3\theta = 4b$ எனின், θ ஜிச் சாராது a, b இற்கிடையே தொடர்பொன்றினைப் பெறுக.
26. $\tan A + \cot A = 2\cosec A$ 27. $\cosec 2A + \cot 2A = \cot A$
28. $\frac{1 + \sin A - \cos A}{1 + \sin A + \cos A} = \tan \frac{A}{2}$ 29. $\cot A = \frac{1}{2} \left(\cot \frac{A}{2} - \tan \frac{A}{2} \right)$
30. $\cos 4A = 1 - 8\cos^2 A + 8\cos^4 A$
31. $\sin 4A = 4\sin A \cos^3 A - 4\cos A \sin^3 A$
32. $\cos 6A = 32\cos^6 A - 48\cos^4 A + 18\cos^2 A - 1$
33. $\cos \alpha \cdot \cos(60^\circ - \alpha) \cdot \cos(60^\circ + \alpha) = \frac{1}{4} \cos 3\alpha$
34. $\cot \alpha + \cot(60^\circ + \alpha) - \cot(60^\circ - \alpha) = 3 \cot 3\alpha$
35. $\frac{\sin^2 A - \sin^2 B}{\sin A \cos A - \sin B \cos B} = \tan(A + B)$
36. $\frac{1 - \cos A + \cos B - \cos(A + B)}{1 + \cos A - \cos B - \cos(A + B)} = \tan \frac{A}{2} \cdot \cot \frac{B}{2}$
37. $\frac{\cos A}{1 - \sin A} = \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{A}{2} \right)$ 38. $\frac{\sec 8A - 1}{\sec 4A - 1} = \tan 8A \cdot \cot 2A$
39. $4(\cos^6 \theta - \sin^6 \theta) = \cos^3 2\theta + 3\cos 2\theta$
40. $\sec^2 A (1 + \sec 2A) = 2\sec 2A$ 41. $\cosec A - 2\cot 2A \cdot \cos A = 2\sin A$
42. $\sin 3A + \sin 2A - \sin A = 4 \cdot \sin A \cdot \cos \frac{A}{2} \cdot \cos \frac{3A}{2}$
43. $2(\cos^4 \theta + \sin^4 \theta) = 1 + \cos^2 2\theta$
44. $\sin(2n+1)A \cdot \sin A = \sin^2(n+1)A - \sin^2(n-1)A$
45. $\frac{\sin(A + 3B) + \sin(3A + B)}{\sin 2A + \sin 2B} = 2\cos(A + B)$
46. $\cos = \frac{11}{61}, \sin \beta = \frac{4}{5}$ ஆகும். கோணங்கள் ஆகியன எனக் கொண்டு என்பவற்றின் பெறுமானங்களைக் காண்க.
 பின்வருவனவற்றை நிறுவுக.
47. $(\cos A + \cos B)^2 + (\sin A - \sin B)^2 = 4 \cos^2 \left(\frac{A + B}{2} \right)$
48. $(\cos A + \cos B)^2 + (\sin A + \sin B)^2 = 4 \cos^2 \left(\frac{A - B}{2} \right)$
49. $(\cos A - \cos B)^2 + (\sin A - \sin B)^2 = 4 \sin^2 \left(\frac{A - B}{2} \right)$
50. $\sec \left(\frac{\pi}{4} + \theta \right) \cdot \sec \left(\frac{\pi}{4} - \theta \right) = 2 \sec 2\theta$
51. $\tan \left(45^\circ + \frac{A}{2} \right) = \sqrt{\frac{1 + \sin A}{1 - \sin A}} = \sec A + \tan A$
52. $\sin^2 \left(\frac{\pi}{8} + \frac{A}{2} \right) - \sin^2 \left(\frac{\pi}{8} - \frac{A}{2} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin A$
53. $\cos^2 \theta + \cos^2 \left(\theta + \frac{2\pi}{3} \right) + \cos^2 \left(\theta - \frac{2\pi}{3} \right) = \frac{3}{2}$
54. $\cos 2A + \cos 2B + \sin^2(A - B) - \sin^2(A + B)$
 $= \cos(2A + 2B)$
55. $(\tan 4A + \tan 2A)(1 - \tan^2 3A \cdot \tan^2 A) = 2 \tan 3A \cdot \sec^2 A$
56. $\left(1 + \tan \frac{A}{2} - \sec \frac{A}{2} \right) \left(1 + \tan \frac{A}{2} + \sec \frac{A}{2} \right)$
 $= \sin A \cdot \sec^2 \frac{A}{2}$

4. தீர்கோண கணிதச் சமன்பாடுகள்

$\sin \theta = O$ இன் தீவு.

$$\theta = O, \pi, 2\pi, 3\pi, 4\pi, 5\pi, \dots$$

$$-\pi, -2\pi, -3\pi, -4\pi, -5\pi, \dots$$

பொதுத்தீவு:

$$\theta = n\pi, (n \in \mathbb{Z}) \text{ ஆகும்.}$$

$$\sin \theta = \frac{1}{2} \text{ என்க.}$$

$$\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, 2\pi + \frac{\pi}{6}, 2\pi + \frac{5\pi}{6}, 4\pi + \frac{\pi}{6}, 4\pi + \frac{5\pi}{6}, \dots$$

$$= \frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6} \text{ என்பதால்,}$$

$$= \frac{\pi}{6}, \pi - \frac{\pi}{6}, 2\pi + \frac{\pi}{6}, 3\pi + \frac{\pi}{6}, 4\pi + \frac{\pi}{6}, 5\pi - \frac{\pi}{6}, \dots$$

$$\theta = n\pi + (-1)^n \cdot \frac{\pi}{6}; n = 0, 1, 2, 3, 4, \dots \text{ என எழுதலாம்.}$$

இவ்வாறே, கோணம் வலஞ்சுழியாக அளக்கப்படின்,

$$\theta = -\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right), -2\pi + \frac{\pi}{6}, -\left(3\pi + \frac{\pi}{6}\right), -4\pi + \frac{\pi}{6}, \dots$$

$$\theta = n\pi + (-1)^n \cdot \frac{\pi}{6} \quad n = -1, -2, -3, \dots \text{ என எழுதலாம்.}$$

$$\text{ஆகவே, } \sin \theta = \frac{1}{2} \text{ இன் பொதுத்தீவு}$$


$$\theta = n\pi + (-1)^n \cdot \frac{\pi}{6} \text{ ஆகும்.}$$

இங்கு n நிறையெண் ஆகும்.

$$\sin \theta = -\frac{1}{2} \text{ என்க.}$$

$$\theta = -\frac{\pi}{6}, \pi + \frac{\pi}{6}, 2\pi - \frac{\pi}{6}, 3\pi + \frac{\pi}{6}, \dots$$

$$\theta = n\pi + (-1)^n \cdot \left(-\frac{\pi}{6}\right); \quad n = 0, -1, -2, -3, \dots \text{ ஆகும்.}$$



வலஞ்சுழியாக அளக்கப்படும் போதும் இது பொருந்துவதைக் காணலாம்.

$$\theta = n\pi + (-1)^n \cdot \left(-\frac{\pi}{6}\right); \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\sin \theta = \sin \alpha \cdot \text{எனின்,}$$

$$\theta = n\pi + (-1)^n \alpha \cdot \text{ஆகும். ; } n \in \mathbb{Z}$$

$\cos \theta = O$ என்க.

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, 2\pi + \frac{\pi}{2}, 2\pi + \frac{3\pi}{2}, 4\pi + \frac{\pi}{2}, 4\pi + \frac{3\pi}{2}, \dots$$

$$\frac{3\pi}{2} = 2\pi - \frac{\pi}{2} \text{ என எழுதுவதால்,}$$

$$\theta = \frac{\pi}{2}, 2\pi - \frac{\pi}{2}, 2\pi + \frac{\pi}{2}, 4\pi - \frac{\pi}{2}, 4\pi + \frac{\pi}{2}, 6\pi - \frac{\pi}{2}, \dots$$

கோணங்களை வலஞ்சுழியாக அளப்பதன் மூலமும்,

$\cos \theta = 0$ எனின்,

$$\theta = 2n\pi \pm \frac{\pi}{2}; \quad n \in \mathbb{Z} \text{ என எழுதலாம்.}$$

$$\cos \theta = \frac{1}{2} \text{ என்க,}$$

$$\theta = \frac{\pi}{3}, 2\pi - \frac{\pi}{3}, 2\pi + \frac{\pi}{3}, 4\pi - \frac{\pi}{3}, \dots$$

அல்லது


$$-\frac{\pi}{3}, -2\pi + \frac{\pi}{3}, -2\pi - \frac{\pi}{3}, -4\pi + \frac{\pi}{3}, -4\pi - \frac{\pi}{3}, \dots$$

என எழுதலாம்

$$\therefore \theta = 2n\pi \pm \frac{\pi}{3}; \quad n \in \mathbb{Z} \text{ ஆகும்.}$$

$$\cos \theta = -\frac{1}{2} \text{ என்க.}$$

$$\theta = \frac{2\pi}{3}, 2\pi - \frac{2\pi}{3}, 2\pi + \frac{2\pi}{3}, 4\pi - \frac{2\pi}{3}, \dots \text{ ஆகும்.}$$



$$\theta = 2n\pi \pm \frac{2\pi}{3}, \text{ ஆகும்.}$$

$$\cos \theta = \cos \alpha \cdot \text{எனின்}$$


$$\theta = 2n\pi \pm \alpha, \text{ ஆகும் } n \in \mathbb{Z}$$

$$\tan \theta = 0 \text{ என்க.}$$

$$\theta = 0, \pi, 2\pi, 3\pi, \dots$$

$$-\pi, -2\pi, -3\pi, \dots$$


$$\text{அகவே } \theta = n\pi, n \in \mathbb{Z} \text{ ஆகும்.}$$



$$\tan \theta = 1 \text{ என்க.}$$

$$\begin{aligned} \theta &= \frac{\pi}{4}, \pi + \frac{\pi}{4}, 2\pi + \frac{\pi}{4}, 3\pi + \frac{\pi}{4}, 4\pi + \frac{\pi}{4} \\ &= -\pi + \frac{\pi}{4}, -2\pi + \frac{\pi}{4}, -3\pi + \frac{\pi}{4}, \dots \end{aligned}$$


$$\text{எனவே } \theta = n\pi - \frac{\pi}{4}; n \in \mathbb{Z} \text{ ஆகும்.}$$



$$\tan \theta = -1 \text{ என்க.}$$

$$\begin{aligned} \theta &= \pi - \frac{\pi}{4}, 2\pi - \frac{\pi}{4}, 3\pi - \frac{\pi}{4}, 4\pi - \frac{\pi}{4}, \dots \\ &= -\pi + \frac{\pi}{4}, -\pi - \frac{\pi}{4}, -2\pi + \frac{\pi}{4}, -3\pi + \frac{\pi}{4}, \dots \end{aligned}$$

$$\text{எனவே, } \theta = n\pi - \frac{\pi}{4}; n \in \mathbb{Z} \text{ ஆகும்.}$$



$$\tan \theta = \tan \alpha \text{ எனின்,}$$

$$\theta = n\pi + \alpha \text{ ஆகும். } n \in \mathbb{Z}$$

உதாரணம் 1

இன்வரும் சமன்பாடுகளின் பொதுத்தீவைக் காண்க.

$$(a) \cos^2 x + 3 \cos x + 2 = 0$$

$$(b) \tan^2 \theta - (1 + \sqrt{3}) \tan \theta + \sqrt{3} = 0 \quad (c) \sin 9\theta = \sin \theta$$

$$(a) \cos^2 x + 3 \cos x + 2 = 0$$

$$(\cos x + 2)(\cos x + 1) = 0$$

$$\cos x + 2 = 0 \quad \text{அல்லது} \quad \cos x + 1 = 0$$

$$\cos x = -2$$

$$-1 \leq \cos x \leq 1 \quad \text{என்பதால்}$$

$$\cos x = 2 \quad \text{பொருந்தாது}$$

$$\cos x = -1$$

$$\cos x = \cos \pi$$

$$x = 2n\pi \pm \pi; n \in \mathbb{Z}$$

$$(b) \tan^2 \theta - (1 + \sqrt{3}) \tan \theta + \sqrt{3} = 0$$

$$(\tan \theta - 1)(\tan \theta - \sqrt{3}) = 0$$

$$\tan \theta - 1 = 0 \quad \text{அல்லது} \quad \tan \theta - \sqrt{3} = 0$$

$$\tan \theta = 1 \quad \tan \theta = \sqrt{3}$$

$$\tan \theta = \tan \frac{\pi}{4} \quad \tan \theta = \tan \frac{\pi}{3}$$

$$\theta = n\pi + \frac{\pi}{4}; n \in \mathbb{Z}; \quad \theta = m\pi + \frac{\pi}{3}, m \in \mathbb{Z}$$

$$(c) \sin 9\theta = \sin \theta$$

$$\sin 9\theta - \sin \theta = 0$$

$$2 \cos 5\theta \cdot \sin 4\theta = 0$$

$$\cos 5\theta = 0 \quad \text{அல்லது} \quad \sin 4\theta = 0$$

$$\cos 5\theta = \cos \frac{\pi}{2} \quad \sin 4\theta = \sin 0$$

$$4\theta = m\pi$$

$$5\theta = 2n\pi \pm \frac{\pi}{2}; \quad n \in \mathbb{Z}; \quad \theta = \frac{m\pi}{4}; \quad m \in \mathbb{Z}$$

$$\theta = \frac{1}{5} [2n\pi \pm \frac{\pi}{2}]; \quad n \in \mathbb{Z}$$

உதாரணம் 2

தீர்க்க

$$(a) \cos x + \cos 2x + \cos 3x = 0$$

$$(b) \cos x \cdot \cos 3x - 1 = 0 \quad (c) \cos 5x - \cos 4x + \cos x = 1$$

$$(a) \cos x + \cos 2x + \cos 3x = 0$$

$$(\cos x + \cos 3x) + \cos 2x = 0$$

$$2\cos 2x \cdot \cos x + \cos 2x = 0$$

$$\cos 2x (2\cos x + 1) = 0$$

$$\cos 2x = 0 \quad \text{அல்லது} \quad \cos x = -\frac{1}{2}$$

$$\cos 2x = \cos \frac{\pi}{2}$$

$$\cos x = \cos \frac{2\pi}{3}$$

$$2x = 2n\pi \pm \frac{\pi}{2}$$

$$x = 2n\pi \pm \frac{2\pi}{3}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$x = n\pi \pm \frac{\pi}{4}, \quad n \in \mathbb{Z};$$

$$(b) \cos x \cdot \cos 3x - 1 = 0$$

$$\cos x (4\cos^3 x - 3\cos x) - 1 = 0$$

$$4\cos^4 x - 3\cos^2 x - 1 = 0$$

$$(4\cos^2 x + 1)(\cos^2 x - 1) = 0$$

$$4\cos^2 x + 1 \neq 0; \quad \cos^2 x - 1 = 0$$

$$\cos x = \pm 1$$

$$\cos x = 1$$

$$\cos x = -1$$

$$\cos x = \cos 0$$

$$\cos x = \cos \pi$$

$$x = 2n\pi; \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$x = 2n\pi \pm \pi; \quad n \in \mathbb{Z}$$

அல்லது

$$x = m\pi, \quad m \in \mathbb{Z}$$

$$(c) \cos 5x - \cos 4x + \cos x = 1$$

$$\cos 5x + \cos x - \cos 4x = 1$$

$$2\cos 3x \cdot \cos 2x - (2\cos^2 2x - 1) = 1$$

$$2\cos 3x \cdot \cos 2x - 2\cos^2 2x = 0$$

$$\cos 2x [\cos 3x - \cos 2x] = 0$$

$$\cos 2x = 0 \quad \text{அல்லது} \quad \cos 3x - \cos 2x = 0$$

$$\cos 2x = \cos \frac{\pi}{2} \quad \cos 3x = \cos 2x$$

$$3x = 2n\pi \pm 2x$$

$$2x = 2n\pi \pm \frac{\pi}{2}$$

$$3x = 2n\pi + 2x \quad \text{எனின்,}$$

$$x = 2n\pi; \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$x = n\pi \pm \frac{\pi}{4}; \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$3x = 2n\pi - 2x \quad \text{எனின்}$$

$$5x = 2n\pi$$

$$x = \frac{2n\pi}{5}; \quad n \in \mathbb{Z}$$

ஆகவே தீர்வுகள் $x = 1, x = \sin 18^\circ, x = -\sin 54^\circ$

$$4x^3 - 2x^2 - 3x + 1 = 0$$

$$(x - 1)(4x^2 + 2x - 1) = 0$$

எனவே $\sin 18^\circ, -\sin 54^\circ$ என்பவற்றை மூலங்களாக கொண்ட

$$\text{சமன்பாடு } 4x^2 + 2x - 1 = 0$$

$$4x^2 + 2x - 1 = 0$$

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 16}}{8}$$

$$= \frac{-2 \pm 2\sqrt{5}}{4}$$

$$= \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$\sin 18^\circ > 0. \text{ எனவே } \sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$$

$$\text{மேலும் } -\sin 54^\circ = \frac{-\sqrt{5} - 1}{2}$$

$$\sin 54^\circ = \frac{\sqrt{5} + 1}{2}$$

$a \cos \theta + b \sin \theta = c$ எனும் வடிவிலான சமன்பாடுகளின் தீர்வுகளைக் காணல்:

$$a \cos \theta + b \sin \theta = C$$

$$\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos \theta + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin \theta = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\cos \alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \sin \alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \text{ எனக்.}$$

$$\cos \alpha \cdot \cos \theta + \sin \alpha \cdot \sin \theta = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\cos(\theta - \alpha) = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$-1 \leq \cos(\theta - \alpha) \leq 1$ என்பதால் சமன்பாடு தீர்வைக் கொண்டிருப்பதற்கு

$$-1 \leq \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \leq 1$$

$c^2 \leq a^2 + b^2$ ஆகும்.

$$\text{இப்பொழுது } -1 \leq \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \leq 1 \text{ எனக்}$$

$$\cos(\theta - \alpha) = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \cos \beta \text{ எனக்.}$$

$$\theta - \alpha = 2n\pi \pm \beta$$

$$\theta = 2n\pi \pm \beta + \alpha, n \in \mathbb{Z}$$

உதாரணம் 4

தீர்க்க

(i) $\cos \theta + \sin \theta = 1$

(ii) $\alpha = \sin^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{10}}\right)$ எனின் $3\sin 2\theta + 2\sin^2 \theta = 2$ என்னும் சமன்பாட்டின்

சில தீர்வுகள் அவைச் சார்ந்தன எனவும், வேறு சில தீர்வுகள் அவைச் சாராதன எனவும் காட்டுக.

(iii) $\operatorname{cosec} \theta + \cot \theta = \sqrt{3}$.

(i) $\cos \theta + \sin \theta = 1$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\cos \frac{\pi}{4} \cos \theta + \sin \frac{\pi}{4} \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\cos \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right) = \cos \frac{\pi}{4}$$

$$\theta - \frac{\pi}{4} = 2n\pi \pm \frac{\pi}{4}$$

$$\theta = 2n\pi \pm \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}$$

$$\theta = 2n\pi; \quad \theta = 2n\pi + \frac{\pi}{2}; \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$(ii) \quad 3\sin 2\theta + 2\sin^2 \theta = 2$$

$$3\sin 2\theta + (1 - \cos 2\theta) = 2$$

$$3\sin 2\theta - \cos 2\theta = 1$$

$$\frac{3}{\sqrt{10}} \sin 2\theta - \frac{1}{\sqrt{10}} \cos 2\theta = \frac{1}{\sqrt{10}}$$

$$\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{10}}, \cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{10}} \text{ எனக்}$$

$$\cos \alpha \cdot \sin 2\theta - \sin \alpha \cdot \cos 2\theta = \frac{1}{\sqrt{10}}$$

$$\sin(2\theta - \alpha) = \frac{1}{\sqrt{10}} = \sin \alpha$$

$$2\theta - \alpha = n\pi + (-1)^n \cdot \alpha$$

$$n \text{ ஒற்றை எனின், } 2\theta - \alpha = n\pi - \alpha$$

$$2\theta = n\pi$$

$$\theta = \frac{n\pi}{2} \quad (n = \pm 1, \pm 3, \pm 5, \dots)$$

$$n \text{ ஒற்றை எனின், } 2\theta - \alpha = n\pi + \alpha$$

$$\theta = \frac{n\pi}{2} + \alpha \quad (n = 0, \pm 2, \pm 4, \dots)$$

$$(iii) \quad \cosec \theta + \cot \theta = \sqrt{3}$$

$$\frac{1}{\sin \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \sqrt{3}$$

$$\cos \theta - \sqrt{3} \sin \theta = -1$$

$$\frac{1}{2} \cos \theta - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta = -\frac{1}{2}$$

$$\cos \frac{\pi}{3} \cos \theta - \sin \frac{\pi}{3} \sin \theta = -\frac{1}{2}$$

$$\cos \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right) = \cos \frac{2\pi}{3}$$

$$\theta + \frac{\pi}{3} = 2n\pi \pm \frac{2\pi}{3}$$

$$\theta + \frac{\pi}{3} = 2n\pi + \frac{2\pi}{3}$$

$$\theta + \frac{\pi}{3} = 2n\pi - \frac{2\pi}{3}$$

$$\theta = 2n\pi + \frac{\pi}{3}; \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\theta = (2n-1)\pi, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$\theta = (2\pi - 1)\pi$ எனின், $\sin \theta = 0$; இது பொருந்தாது.

$$\text{எனவே தீவிர } \theta = 2n\pi + \frac{\pi}{3}; \quad n \in \mathbb{Z}$$

$a \cos \theta + b \sin \theta = C$ எனும் வடிவிலான சமன்பாடுகளை

$$t = \tan \frac{\theta}{2}, \text{ எனப் பிரதியிடுவதனால் தீர்க்கலாம்.}$$

$$\cos \theta = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \sin \theta = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$a \cos \theta + b \sin \theta = c$$

$$a \left(\frac{1-t^2}{1+t^2} \right) + b \cdot \frac{2t}{1+t^2} = c$$

$$a(1-t^2) + 2bt = c(1+t^2)$$

$$(c+a)t^2 - 2bt + (c-a) = 0$$

இச் சமன்பாடு தீர்க்கப்பட (t இல் இருபடிச் சமன்பாடு) $\Delta \geq 0$ ஆதல் வேண்டும்.

$$\Delta \geq 0$$

$$4b^2 - 4(c^2 - a^2) \geq 0 \text{ ஆதல் வேண்டும்.}$$

$$a^2 + b^2 \geq c^2$$

$\cos\theta - \sqrt{3}\sin\theta = -1$ எனும் சமன்பாட்டைக் கருதுக.

$$t = \tan \frac{\theta}{2} \text{ எனக்.}$$

$$\frac{1-t^2}{1+t^2} - \frac{\sqrt{3} \times 2t}{1+t^2} = -1$$

$$1-t^2 - 2\sqrt{3}t = -(1+t^2)$$

$$2\sqrt{3}t = 2$$

$$t = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \tan \frac{\pi}{6}$$

$$\frac{\theta}{2} = n\pi + \frac{\pi}{6}$$

$$\theta = 2n\pi + \frac{\pi}{3}, n \in Z$$

உதாரணம் 5

$2(\cos\theta + \sin\theta) = \sqrt{3} + 1$ எனும் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

$$\cos\theta + \sin\theta = \frac{\sqrt{3} + 1}{2}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\cos\theta + \frac{1}{2}\sin\theta = \frac{\sqrt{3} + 1}{2\sqrt{2}}$$

$$\cos \frac{\pi}{4} \cos\theta + \sin \frac{\pi}{4} \sin\theta = \frac{\sqrt{3} + 1}{2\sqrt{2}}$$

$$\cos \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{3} + 1}{2\sqrt{2}} = \cos \frac{\pi}{12}$$

$$\theta - \frac{\pi}{4} = 2n\pi \pm \frac{\pi}{12}$$

$$\begin{aligned} \theta &= 2n\pi + \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{4} ; \quad \theta = 2n\pi - \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{4} \\ &= 2n\pi + \frac{\pi}{3} ; \quad \theta = 2n\pi + \frac{\pi}{6} ; \quad n \in Z \end{aligned}$$

உதாரணம் 6

$\tan 3\theta = 1$ எனும் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

$$\tan 3\theta = \frac{3\tan\theta - \tan^3\theta}{1 - 3\tan^2\theta} \text{ எனக் காட்டுக.}$$

இதிலிருந்து $t^3 - 3t^2 - 3t + 1 = 0$ எனும் சமன்பாட்டின் மூலங்கள்

$\tan \frac{\pi}{12}, \tan \frac{5\pi}{12}, \tan \frac{3\pi}{4}$ எனக்காட்டி $\tan \frac{\pi}{12}$ இன் பெறுமானத்தைக் காண்க.

$$\tan 3\theta = 1$$

$$\tan 3\theta = 1 = \tan \frac{\pi}{4}$$

$$3\theta = n\pi + \frac{\pi}{4}$$

$$\theta = \frac{1}{3} \left(n\pi + \frac{\pi}{4} \right)$$

$$\theta = (4n+1) \frac{\pi}{12}; n \in \mathbb{Z} \quad \text{-----}(1)$$

$\tan 3\theta = 1$ என்க.

$$\frac{3\tan\theta - \tan^3\theta}{1 - 3\tan^2\theta} = 1$$

$$3\tan\theta - \tan^3\theta = 1 - 3\tan^2\theta$$

$$\tan^3\theta - 3\tan^2\theta - 3\tan\theta + 1 = 0$$

$\tan\theta = t$ என்க.

$$t^3 - 3t^2 - 3t + 1 = 0,$$

இப்பொழுது $\tan 3\theta = 1$ எனின் $0 \leq \theta < 2\pi$ இல் தீவுகள் பின்வருமாறு அமையும். [(1) இல்லிருந்து, $n = 0, 1, 3, 4$]

$$\theta = \left\{ \frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}, \frac{9\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}, \frac{17\pi}{12}, \frac{21\pi}{12} \right\}$$

$$\tan\theta = \left\{ \tan\frac{\pi}{12}, \tan\frac{5\pi}{12}, \tan\frac{9\pi}{12} \right\} \text{ ஆகும்.}$$

$$\left[\tan\frac{13\pi}{12} = \tan\left(\pi + \frac{\pi}{12}\right) = \tan\frac{\pi}{12} \right]$$

$$\tan\frac{17\pi}{12} = \tan\left(\pi + \frac{5\pi}{12}\right) = \tan\frac{5\pi}{12},$$

$$\tan\frac{21\pi}{12} = \tan\frac{7\pi}{4} = \tan\left(\pi + \frac{3\pi}{4}\right) = \tan\frac{3\pi}{4}$$

$$t^3 - 3t^2 - 3t + 1 = 0$$

$$(t+1)(t^2 - 4t + 1) = 0 \cdot \left[\tan 3\pi/4 = -1 \right]$$

$$t^2 - 4t + 1 = 0 \text{ இன் தீவுகள் } \tan\pi/12, \tan 5\pi/12 \text{ ஆகும்.}$$

$$\begin{aligned} t &= \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4}}{2} \\ &= 2 \pm \sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\tan\frac{\pi}{12} < 1. \text{ எனவே } \tan\frac{\pi}{12} = 2 - \sqrt{3} \text{ ஆகும்.}$$

உதாரணம் 7

பொதுத்தீவுகளை எழுதுக.

$$(i) \sin\theta = -\cos 22^\circ$$

$$(ii) \cot\theta = \cot 280^\circ$$

$$(iii) \sin\theta = \frac{1}{2} \text{ ம் } \cos\theta = \frac{-\sqrt{3}}{2} \text{ ம் } (iv) \cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$(i) \sin\theta = -\cos 22^\circ = -\cos(90^\circ - 68^\circ)$$

$$\sin\theta = -\sin 68^\circ = \sin(-68^\circ)$$

$$\theta = (180^\circ \times n) + (-1)^n (-68^\circ)$$

$$= (180^\circ \times n) - (-1)^n 68^\circ ; n \in \mathbb{Z}$$

$$(ii) \cot\theta = \cot 280^\circ$$

$$\tan\theta = \tan 280^\circ = \tan(360^\circ - 80^\circ)$$

$$= -\tan 80^\circ$$

$$\tan\theta = \tan(-80^\circ)$$

$$\theta = 180^\circ \times n + (-80^\circ)$$

$$= 180^\circ \times n - 80^\circ ; n \in \mathbb{Z}$$

அல்லது

$$\tan \theta = \tan 280^\circ$$

$$\theta = 180^\circ \times n + 280^\circ , n \in \mathbb{Z}$$

$$(iii) \quad \sin \theta = \frac{1}{2}, \cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$0 \leq \theta < 2\pi \text{ இல்}$$

$$\theta = \frac{5\pi}{6}$$

$$\text{பொதுத்தீவு } \theta = 2n\pi + \frac{5\pi}{6}, n \in \mathbb{Z}$$

$$(iv) \quad \cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right)$$


$$\cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left[\frac{\pi}{2} - \left(\theta + \frac{\pi}{3}\right)\right]$$

$$\theta - \frac{\pi}{3} = 2n\pi \pm \left[\frac{\pi}{2} - \left(\theta + \frac{\pi}{3}\right)\right]$$

$$\theta - \frac{\pi}{3} = 2n\pi + \frac{\pi}{2} - \theta - \frac{\pi}{3}$$

$$2\theta = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$$

$$\underline{\underline{\theta = n\pi + \frac{\pi}{4}; n \in \mathbb{Z}}}$$



உதாரணம் 8

$$\tan 4\theta = \frac{4\tan\theta(1 - \tan^2\theta)}{1 - 6\tan^2\theta + \tan^4\theta} \text{ எனக் காட்டுக.}$$

இதிலிருந்து $t^4 + 4t^3 - 6t^2 - 4t + 1 = 0$ எனும் சமன்பாட்டைத் தீர்ப்பதன் மூலம்,

$$\tan \frac{\pi}{16} + \tan \frac{5\pi}{16} - \tan \frac{3\pi}{16} - \tan \frac{7\pi}{16} = -4 \text{ எனவும்,}$$

$$\tan \frac{\pi}{16} \cdot \tan \frac{5\pi}{16} \cdot \tan \frac{3\pi}{16} \cdot \tan \frac{7\pi}{16} = 1 \text{ எனவும் காட்டுக.}$$

$$\tan 4\theta = \tan(2\theta + 2\theta)$$

$$= \frac{2 \tan 2\theta}{1 - \tan^2 2\theta}$$

$$= \frac{2 \cdot \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}}{1 - \left(\frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}\right)^2}$$

$$= \frac{4 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta} \times \frac{(1 - \tan^2 \theta)^2}{(1 - 6\tan^2 \theta + \tan^4 \theta)}$$

$$= \frac{4 \tan \theta (1 - \tan^2 \theta)}{(1 - 6\tan^2 \theta + \tan^4 \theta)}$$

$$\tan \theta = t \text{ எனக் ; மேலும் } \tan 4\theta = 1 \text{ எனின்,}$$

$$\tan 4\theta = \frac{4t(1 - t^2)}{1 - 6t^2 + t^4} = 1$$

$$t^4 + 4t^3 - 6t^2 - 4t + 1 = 0 \quad \dots \dots \dots (1)$$

இது t இல் நான்காம் படியிலுள்ள சமன்பாடு.

மூலங்கள் $t_1 + t_2, t_3, t_4$ எனக்.

$$(t - t_1)(t - t_2)(t - t_3)(t - t_4) = O$$

$$t^4 - (t_1 + t_2 + t_3 + t_4)t^3 + \dots + t_1 t_2 t_3 t_4 = O \quad \dots \dots \dots (2)$$

$$\tan 4\theta = 1 = \tan \frac{\pi}{4}$$

$$4\theta = n\pi + \frac{\pi}{4}$$

$$\theta = \frac{\pi}{16}(4n+1); n \in \mathbb{Z}$$

$0 \leq \theta \leq 2\pi$ இல் θ இன் தீவுகள்:

$$\theta = \left\{ \frac{\pi}{16}, \frac{5\pi}{16}, \frac{9\pi}{16}, \frac{13\pi}{16}, \frac{17\pi}{16}, \frac{21\pi}{16}, \frac{25\pi}{16}, \frac{29\pi}{16} \right\}$$

$$\tan \theta = \left\{ \tan \frac{\pi}{16}, \tan \frac{5\pi}{16}, \tan \frac{9\pi}{16}, \tan \frac{13\pi}{16} \right\}$$

சமன்பாடுகள் (1), (2) எனபவற்றை ஒப்பிடுவதால்,

$$\tan \frac{\pi}{16} + \tan \frac{5\pi}{16} + \tan \frac{9\pi}{16} + \tan \frac{13\pi}{16} = -4$$

$$\tan \frac{\pi}{16} + \tan \frac{5\pi}{16} - \tan \frac{7\pi}{16} - \tan \frac{3\pi}{16} = -4$$


$$\tan \frac{\pi}{16} \cdot \tan \frac{5\pi}{16} \cdot \tan \frac{9\pi}{16} \cdot \tan \frac{13\pi}{16} = 1$$

$$\tan \frac{\pi}{16} \cdot \tan \frac{5\pi}{16} \cdot \left(-\tan \frac{7\pi}{16} \right) \cdot \left(-\tan \frac{3\pi}{16} \right) = 1$$

$$\underline{\underline{\tan \frac{\pi}{16} \cdot \tan \frac{5\pi}{16} \cdot \tan \frac{7\pi}{16} \cdot \tan \frac{3\pi}{16} = 1}}$$

வரைபுகள்

$y = \sin x, y = 2 \sin x$ எனபவற்றின் வரைபுகள்



$y = \sin x, y = 2 \sin x$ என்ற இருவளையிகளும் ஒரே ஆவர்த்தனம் 2π ஐக் கொண்டவை.

$y = \sin x$ இல் $-1 \leq y \leq 1$

$y = 2 \sin x$ இல் $-2 \leq y \leq 2$ ஆகும்.

$y = \sin x, y = \sin 2x$ எனபவற்றின் வரைபுகள்

$$\sin 2x = O \Rightarrow 2x = n\pi, n \in \mathbb{Z}$$

$$x = \frac{n\pi}{2}$$

$$x = -\pi, -\frac{\pi}{2}, O, \frac{\pi}{2}, \pi \text{ எனபவற்றில் } \sin 2x = O$$

$\sin 2x$ இன் உயர்வுப் பெறுமானம் 1 ஆகும்.

$\sin 2x = 1$ எனின்,

$$2x = n\pi + (-1)^n \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$x = \frac{1}{2} \left[n\pi + (-1)^n \cdot \frac{\pi}{2} \right]$$

$$x = -\frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{4} \text{ என்பவற்றில் } \sin 2x = 1.$$

$\sin 2x$ இன் இழிவுப்பெறுமானால் -1 ஆகும்.

$$\sin 2x = -1$$

$$2x = n\pi + (-1)^n \left(\frac{-\pi}{2} \right)$$

$$x = \frac{1}{2} \left[n\pi - (-1)^n \frac{\pi}{2} \right]$$

$$x = -\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \text{ என்பவற்றில் } y = -1$$

இருவளையிகளும் வெட்டும் புள்ளிகள்


$$\sin 2x = \sin x$$

$$\sin 2x - \sin x = 0$$

$$2 \sin x \cos x - \sin x = 0$$

$$\sin x = 0 \text{ அல்லது } \cos x = \frac{1}{2}$$

$$x = -\pi, 0, \pi, -\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3} \text{ என்பவற்றில் இரு வளையிகளும் வெட்டும்}$$



$$-1 \leq \sin x \leq 1,$$

$$-1 \leq \sin$$

$y = \sin 2x$ ஆவர்த்தனமானது. ஆவர்த்தனம் π ஆகும்.

$y = \cos x, y = \cos 3x$ என்பவற்றின் வரைபுகள்

$$\cos 3x = 0 \text{ எனின், } 3x = 2n\pi \pm \frac{\pi}{2}; n \in \mathbb{Z}$$

$$x = \frac{1}{3} \left[2n\pi \pm \frac{\pi}{2} \right]$$

$$= \frac{\pi}{6} [4n \pm 1]$$

$$x = -\frac{3\pi}{6}, -\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}, \frac{3\pi}{6} \text{ என்பவற்றில் } \cos 3x = 0.$$

$$\cos 3x = 1 \text{ எனின், } 3x = 2n\pi$$


$$x = \frac{2n\pi}{3}$$

$$x = \frac{2\pi}{3}, -\frac{2\pi}{3} \text{ என்பவற்றில் } \cos 3x = 1 \text{ ஆகும்.}$$

$$\cos 3x = -1 \text{ எனின், } 3x = 2n\pi \pm \pi$$

$$x = \frac{\pi}{3} (2n \pm 1)$$

$$x = -\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3} \text{ என்பவற்றில் } \cos 3x = -1 \text{ ஆகும்.}$$



$y = \cos 3x$ இன் ஆவர்த்தனம் $\frac{2\pi}{3}$ ஆகும்.

$y = \sin(x + \alpha)$ கிண் வரைபு ($\alpha > 0$)

$$y = 0, \sin(x + \alpha) = 0$$

$$\Rightarrow x + \alpha = n\pi$$

$$x = n\pi - \alpha$$

$x = -\pi - \alpha, -\alpha, \pi - \alpha, 2\pi - \alpha$ என்பவற்றில் $y = 0$

$\sin(x + \alpha)$ இன் உயர்வுப் பெறுமானம் 1


$$\sin(x + \alpha) = 1$$

$$x + \alpha = n\pi + (-1)^n \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$x = n\pi + (-1)^n \cdot \frac{\pi}{2} - \alpha$$


$x = -\frac{3\pi}{2} - \alpha, \frac{\pi}{2} - \alpha$ என்பவற்றில் $y = 1$

$x = -\frac{\pi}{2} - \alpha, \frac{3\pi}{2} - \alpha$ என்பவற்றில் $y = -1$




82

$y = \sin(x - \alpha)$ கிண் வரைபு



$y = \cos(x - \alpha)$ கிண் வரைபு



83

$y = \cos x + \sin x$ கிண் வரைபு

$$y = \cos x + \sin x$$

$$= \sqrt{2} \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \cos x + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin x \right]$$


$$= \sqrt{2} \left[\cos \frac{\pi}{4} \cos x + \sin \frac{\pi}{4} \sin x \right]$$

$$= \sqrt{2} \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right)$$

y இன் உயர்வுப் பெறுமானம் $= \sqrt{2}$; $x = -\frac{7\pi}{4}, \frac{\pi}{4}$

y இன் இழிவுப் பெறுமானம் $= -\sqrt{2}$; $x = -\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$

$y = O$; $x = -\frac{5\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$




திரீகோண கணித நேர்மாறு சார்புகள்

$$y = \sin^{-1} x$$

இங்கு $-1 \leq x \leq 1$

மேலும் $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$ ஆகுமாறு

y வரையறுக்கப்படுகிறது.




$$y = \cos^{-1} x$$

$-1 \leq x \leq 1$ ஆகும்.

$0 \leq y \leq \pi$ ஆகுமாறு


y வரையறுக்கப்படுகிறது.



$$y = \tan^{-1} x \quad x \in R$$

$-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$ என

y வரையறுக்கப்படும்.



உதாரணம் 9

$$\theta_1 = \tan^{-1} \left(\frac{1}{3} \right), \theta_2 = \tan^{-1} \left(\frac{1}{4} \right), \theta_3 = \tan^{-1} \left(\frac{2}{9} \right) \text{ எனின்,}$$

$$0 < \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 < \frac{3\pi}{4} \text{ என நிறுவக.}$$

இதிலிருந்து $\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = \frac{\pi}{4}$ எனக் காட்டுக.

$$\theta_1 \tan^{-1} \left(\frac{1}{3} \right), \theta_2 = \tan^{-1} \left(\frac{1}{4} \right), \theta_3 = \tan^{-1} \left(\frac{2}{9} \right)$$

$-\frac{\pi}{2} < \theta_1, \theta_2, \theta_3 < \frac{\pi}{2}$ ஆகும்.

மேலும் $O < \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{9} < 1$ என்பதால்,

$O < \theta_1, \theta_2 < \theta_3 < \frac{\pi}{4}$ ஆகும்.

ஆகவே $O < \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 < \frac{3\pi}{4}$ ஆகும்.

$$\tan(\theta_1 + \theta_2) = \frac{\tan \theta_1 + \tan \theta_2}{1 - \tan \theta_1 \tan \theta_2}$$

$$= \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{4}}{1 - \left(\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} \right)} = \frac{7}{11}$$

$$\tan(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) = \frac{\tan(\theta_1 + \theta_2) + \tan \theta_3}{1 - \tan(\theta_1 + \theta_2) \cdot \tan \theta_3}$$

$$= \frac{\frac{7}{11} + \frac{2}{9}}{1 - \frac{7}{11} \times \frac{2}{9}}$$

$$= \frac{\frac{85}{99}}{1 - \frac{14}{99}} = \frac{\frac{85}{99}}{\frac{85}{99}} = 1$$

$$\tan(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) = 1$$

$$\text{ஆகவே, } \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = \frac{\pi}{4}$$

உதாரணம் 10

$\cos^{-1} x + \cos^{-1} y + \cos^{-1} z = \pi$ எனின்,

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1 \text{ என நிறுவக.}$$

$\cos^{-1} x = A, \cos^{-1} y = B, \cos^{-1} z = C$ எனக்.

$\cos A = x, \cos B = y, \cos C = z, (0 \leq A, B, C \leq \pi)$

$$A + B + C = \pi$$

$$A + B = \pi - C$$

$$\cos(A + B) = \cos(\pi - C)$$

$$\cos A \cos B - \sin A \sin B = -\cos C$$

$$xy - \left(\sqrt{1-x^2} \right) \left(\sqrt{1-y^2} \right) = -z$$

$$(xy + z) = \sqrt{1-x^2} \cdot \sqrt{1-y^2}$$

$$(xy + z)^2 = (1-x^2)(1-y^2)$$

$$x^2y^2 + 2xyz + z^2 = 1 - x^2 - y^2 + x^2y^2$$

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1$$

பயிற்சி 4

4(a)

பின்வரும் சமன்பாடுகளிற்கு பொதுத்தீவை எழுதுக.

- | | | |
|--|--|--|
| 1. $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ | 2. $\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 3. $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| 4. $\cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 5. $\tan^2 \theta = \frac{1}{3}$ | 6. $2 \cot^2 \theta = \operatorname{cosec}^2 \theta$ |

7. $2\sqrt{3} \cos^2 \theta = \sin \theta$
8. $\cos 5\theta = \cos 4\theta$
9. $\cot \theta = \tan 8\theta$
10. $\sin 2\theta = \cos 3\theta$
11. $2 \cos^2 x = 3(1 - \sin x)$
12. $6 \sin^2 x + 4 \cos^2 x = 5 \tan x$
13. $\sin 8\theta - \sin 6\theta + \sin 4\theta = 0$
14. $4 \tan \theta \cdot \tan 2\theta + 3 \sec^2 \theta = 0$
15. $\cos 3\theta + \sin 4\theta + \cos 7\theta = 0$
16. $6 \tan 2\theta - 3 \tan \theta - 5 \cot \theta = 0$
17. $2 \sin \theta \cdot \sin 3\theta - 1 = 0$
18. $\cos 6x \cdot \cos 2x - \cos 3x \cdot \cos x = 0$
19. $\tan x - \sec 2x + 1 = 0$
20. $2 \sin 5x \cos 3x - \sin 4x = 0$
21. $\cos 3x - 4 \cos 2x + 2 \cos 2x - 2 = 0$
22. $3 \tan x \cdot \tan 2x - 4 \cos^2 x + 13 = 0$
23. $\sin 3\theta - \sin 2\theta + \sin \theta = 0$
24. $4 \cos 3\theta - \sin 2\theta \cos \theta = 0$
25. $\cos \theta + \sin \theta = \sqrt{2}$
26. $\cos \theta + \sin \theta = 1$
27. $\sqrt{3} \sin x + \cos x = 2$
28. $\sqrt{3} \cos x + \sin x = 1$
29. $\operatorname{cosec} x = \cot x + \sqrt{3}$
30. $2 \sin 3\theta - 7 \cos 2\theta + \sin \theta + 1 = 0$
31. $\cos \theta - \sin 2\theta + \cos 3\theta - \sin 4\theta = 0$
32. (i) $\sin x = \cos 2x$ இன் தீர்வை, $0 < x < 2\pi$ இல் தருக.
- (ii) $\cos x + \cos 3x = \cos 2x$ இன் தீர்வை, $0 < x < 360^\circ$ இல் தருக.
- (iii) $\sin \theta + \cos \theta + \sec \theta + \operatorname{cosec} \theta = 0$ இன் தீர்வை,
 $-180^\circ < x < 180^\circ$ இல் தருக.
33. $4 \sin^3 \theta - 3 \sin \theta + 1 = 0$
34. $4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta + 1 = 0$
35. $\sin \theta + \cos \theta = \sec \theta + \operatorname{cosec} \theta$
36. (i) $\tan A = \frac{2 \tan \frac{A}{2}}{1 - \tan^2 \frac{A}{2}}$ எனக் காட்டுக.
- இதிலிருந்து $\tan 22\frac{1}{2}^\circ$ இன் பெறுமானத்தைக் காண்க.
- (ii) $\cos 2\theta + \cos 4\theta + \cos 6\theta + 1 = 4 \cos \theta \cdot \cos 2\theta \cdot \cos 3\theta$ என நிறுவுக.
- இதிலிருந்து அல்லது வேறுவிதமாக $4 \cos \theta \cdot \cos 2\theta \cdot \cos 3\theta - 1 = 0$ எனும் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.
- (iii) $\tan^2 \theta + 2 \cos 2\theta - 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

4(b)

1. $\sin A = \cos (B + C)$ எனின், A ஜி, B, C இன் உறுப்புகளில் காண்க.
2. $\sin A = -\cos (B + C)$ எனின், A ஜி B, C இன் உறுப்புக்களில் காண்க.
3. $\cos 3\theta = \cos 3\alpha$ எனின், θ ஜி α இல் தருக. $\cos \theta$ இன் இயல்தகு பெறுமானங்கள் எவை?

4. $\sin 3\theta = \sin 3\alpha$ எனின், உஜ அல்லது தருக. $\sin \theta$ இன் இயல்தகு பெறுமானங்களை காண்க.
5. பொதுத் தீவைக் காண்க.
 $(\cos \theta + \sin \theta)(1 - 2 \sin 2\theta) = 2(\cos 3\theta - \sin 3\theta)$
6. $\tan 5\theta - \tan \theta = 1 + \tan 5\theta \cdot \tan \theta$ இன் பொதுத்தீவை எழுதுக.
7. $\sin 4\theta = \frac{4 \tan \theta (1 - \tan^2 \theta)}{(1 + \tan^2 \theta)^2}$ என் நிறுவுக.
- இதிலிருந்து $t^4 + 8t^3 + 2t^2 - 8t + 1 = 0$ என்னும் சமன்பாட்டின் மூலங்களைக் காண்க.
- $\tan \frac{\pi}{24} \cdot \tan \frac{5\pi}{24} \cdot \tan \frac{7\pi}{24} \cdot \tan \frac{11\pi}{24} = 1$ என உய்த்தறிக.
8. (a) (i) $\frac{\sin \alpha + \sin \beta}{\cos \alpha - \cos \beta} = \cot \left(\frac{\beta - \alpha}{2} \right)$ என நிறுவுக.
- (ii) $\frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin(\alpha - \beta)} = \frac{3}{2}$ எனின், $\tan \alpha = 5 \tan \beta$ என நிறுவுக.
- (b) $\cosec \theta + \cot \theta = \cot \frac{1}{2}\theta$ என நிறுவுக. இதிலிருந்து,
- (i) $\cot \frac{\pi}{8}, \cot \frac{\pi}{12}$ இன் பெறுமானங்களைக் காண்க.
- (ii) $\cosec \theta + \cosec 2\theta + \cosec 4\theta$ இனை இரு கோதாங்களின் வித்தியாசமாகத் தருக.
- (iii) $\cosec \frac{4\pi}{15} + \cosec \frac{8\pi}{15} + \cosec \frac{16\pi}{15} + \cosec \frac{32\pi}{15} = 0$
 என நிறுவுக.
9. (i) $\tan \theta = \sec 2\alpha \cot \phi$ எனின், $\frac{\cos(\theta + \phi)}{\cos(\theta - \phi)} = -\tan^2 \alpha$ என நிறுவுக.
- (ii) $\cos A + 3 \sin B = 2$ ஆகும் வண்ணம் A, B என்பன இரு நேரான கூங்கோணங்களாகும். $r = \sin A + 3 \cos B$ எனின், r இன் மிகப் பெரிய பெறுமானம் $2\sqrt{3}$ எனவும், $A = 2B = \frac{\pi}{3}$ எனவும் நிறுவுக.
10. $\sin 2x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos 2x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ எனவும் நிறுவுக.
- இங்கு $t = \tan x$ ஆகும்.
- $\sin \theta + \sin \phi = a$
 $\cos \theta + \cos \phi = b$ ஆகவும் இருப்பின் $\cos(\theta + \phi), \cos(\theta - \phi)$ என்பவற்றின் பெறுமானங்களை a, b இல் காண்க.
- $\tan \theta + \tan \phi = \frac{8ab}{(a^2 + b^2)^2 - 4a^2}$ எனவும் நிறுவுக.
11. (a) $f(\theta) = \cos k\theta$ எனும் சார்பின் ஆவர்த்தனம் யாது?
 $k = 2, k = \frac{1}{2}$ ஆகும் போது வரைபுகளை வரைக. ஒவ்வொரு வகையிலும் $f(\theta) = 0, f(\theta) = 1, f(\theta) = -1$ ஆகும் போது பொதுத் தீவுகளை எழுதுக.
- (b) $0 \leq x \leq 180^\circ$ இல் தீவுகளை எழுதுக.
- (i) $\cos(x + 30^\circ) = \cos(60^\circ - 3x)$
- (ii) $\sin(x + 20^\circ) = \cos 3x$
12. (i) கூங்கோணம் $A, \sin A = \frac{3}{5}$ ஆகவும், விரிகோணம் $B, \sin B = \frac{5}{13}$ ஆகவும் இருப்பின் $\cos(A+B), \tan(A-B)$ என்பவற்றைக் காண்க.
- (ii) $\sin^2 \frac{\pi}{8} - \cos^4 \frac{3\pi}{8}$ இன் பெறுமானத்தைக் காண்க.
- (iii) தீர்க்க : $0 < \theta < 2\pi$ இல் $\tan \theta + 3 \cot \theta = 5 \sec \theta$

13. தீர்க்க : (i) $2\sin\theta + \cos 2\theta = 1$, $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$
(ii) $\sin 2x + 2\cos 2x = 1$, $0 \leq \theta^\circ \leq 360^\circ$
(iii) $\cos 3x + \cos x = \sin 2x$
14. (i) $\sin 2\theta = \sin \frac{\pi}{6}$ எனின் $0 \leq \theta \leq 2\pi$ இல் தீர்வைக் காண்க.
(ii) x இன் எல்லாப் பெறுமானங்களுக்கும்,
 $(2\cos x + 3\sin x)^2 \leq 13$ எனக் காட்டுக.
(iii) $0 < \theta < 2\pi$ இல், $\sin\theta + \sin 3\theta = \cos\theta + \cos 3\theta$ இன் தீர்வைக் காண்க.
15. (i) $\sin(\theta - \alpha) = k \sin(\theta + \alpha)$ எனின், $\tan\theta$ ஜி k , $\tan\alpha$ இல் காண்க.
 $K = \frac{1}{2}$, $\alpha = 150^\circ$ ஆக, 0° இங்கும் 360° இற்குமிடையில் உ இன் பெறுமானங்களைக் காண்க.
(ii) $(\sin 2\theta - \sin\theta)(1 + 2\cos\theta) = \sin 3\theta$ என நிறுவுக.
(iii) தீர்க்க. $7\tan 2\theta + 4\sin\theta = 0$
16. (i) $\cos 3\theta - \sin 3\theta = \sqrt{2} \cdot \sin(45^\circ - 3\theta)$ என்றிருவி,
 $\cos\theta - \sin\theta = \sqrt{2}$ ஜத் தீர்க்க.
(ii) $\sin^2 10^\circ + \sin^2 50^\circ + \sin^2 70^\circ = \frac{3}{2}$ என நிறுவுக.
17. (i) $\sec x + \tan x = \tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right)$ என நிறுவுக. $\sec x - \tan x$ இங்கு இதையொத்த கோவையைப் பெறுக. இதிலிருந்து,
 $\tan \frac{7\pi}{12}$, $\tan \frac{\pi}{12}$ என்பவற்றின் பெறுமானங்களைக் காண்க.
(ii) $\cos 3\theta - \sin 3\theta = (\cos\theta + \sin\theta)(1 - 4\sin\theta - \cos\theta)$ என நிறுவுக.
18. (iii) $\sec A = \cos B + \sin B$ எனின்,
(a) $\tan^2 A = \sin 2B$ (ii) $\cos 2A = \tan^2\left(\frac{\pi}{4} - B\right)$ எனக் காட்டுக.
18. (i) $\sec 2x$, $\tan 2x$ என்பவற்றை $\tan x$ இல் எழுதுக. இதிலிருந்து $2\tan x + \sec 2x = 2\tan 2x$ எனும் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.
(ii) $\sqrt{3}\sin\theta - \cos\theta$ ஜி $R \sin(\theta - \alpha)$ எனும் வடிவில் எழுதுக. $R > 0$ ஆகும்.
 $4\sin\theta \cdot \cos\theta = \sqrt{3}\sin\theta - \cos\theta$ ஜி $0^\circ < \theta < 180^\circ$ எனும் வீச்சில் தீர்க்க.
19. (a) தீர்க்க. $\sin 2x + \sin 3x + \sin 5x = 0$.
(b) $t = \tan\frac{\theta}{2}$ எனின், $\sin\theta$, $\cos\theta$ என்பவற்றை t இல் எழுதுக.
 $\frac{1 + \sin\theta}{5 + 4\cos\theta} = \frac{(1 + t)^2}{9 + t^2}$ எனக்காட்டுக. உ இன் எல்லாப் பெறுமானங்களுக்கும், $0 \leq \frac{1 + \sin\theta}{5 + 4\cos\theta} \leq \frac{10}{9}$ என உய்தறிக.
20. (i) $\cos^6 x + \sin^6 x = 1 - \frac{3}{4} \sin^2 2x$ எனக்காட்டுக.
(ii) $\sin x + \sin 5x = \sin 3x$ ஜி $0^\circ \leq x \leq 180^\circ$ எனும் வீச்சில் தீர்க்க.
(iii) $t = \tan\theta$ எனின், $\tan 3\theta = \frac{3t - t^3}{1 - 3t^2}$ எனக் காட்டுக. இதிலிருந்து $\tan \frac{1}{12}\pi = 2 - \sqrt{3}$ எனக்காட்டுக. உ என்பது 0 இங்கும் ட
இங்குமிடையில் இருப்பின் உ இன் எப்பெறுமானத்திற்கு $\tan\theta = 2 + \sqrt{3}$ ஆகும்.

21. (i) $\cos x + \cos y = 1$
 $\sec x + \sec y = 4$ எனும் ஒருங்கமை சமன்பாடுகளின் தீவுகளை
 $0^\circ < x < 180^\circ, 0 < y < 180^\circ$ இல் காண்க.

(ii) தீர்க்க (a) $\cos 2x - \sin 2x = 1$
(b) $\cos 2x - \sin 2x = \sqrt{2} \cos 4x$

22. (i) $\cos 5x = \cos$ இன் தீவை $-180^\circ < x < 180^\circ$ இல் காண்க.
(ii) $4 \sin \theta = \sec \theta$ இன் பொதுத் தீவை எழுதுக.
(iii) $\sin \theta + \sin 2\theta + \sin 3\theta + \sin 4\theta = 0$ எனின், ட ஆனது $\frac{\pi}{2}$ இன்
மடங்கு அல்லது $\frac{2\pi}{5}$ இன் மடங்கு என நிறுவுக.

23. தீர்க்க. (i) $2 \sin 2x = \tan x$
(ii) $10 \sin \frac{\pi x}{3} + 24 \cos \frac{\pi x}{3} = 13$
(iii) $2 \cos \theta \cdot \cos 2\theta + \sin 2\theta = 2(3 \cos^3 \theta - \cos \theta)$ இன்
தீவை $0 < \theta < 2\pi$ இல் தருக.

24. தீர்க்க (i) $2 \sin \theta = \sqrt{3} \tan \theta$
(ii) $3 \cos^2 \theta + 5 \sin \theta - 1 = 0 ; 0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$
(iii) $\cos 2x + \sin x = 0 ; 0 \leq \theta \leq 360^\circ$
(iv) $\sin x - \sin 2x + \sin 3x = 0 ; 0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$

25. (a) $x = 2 \sin \left(nt + \frac{\pi}{3} \right)$ உம், $y = 4 \sin \left(nt + \frac{\pi}{6} \right)$ எனவும்
தரப்பாடின் x, y என்பவற்றை $\sin n t, \cos n t$ என்பவற்றின்
உறுப்புக்களில் காண்க. t மாறும் போது (x, y) இன் ஒழுக்கின்
சமன்பாட்டை $(x, y$ இல்) காண்க.

(b) $A = 36^\circ$ எனின், $\sin 3A = \sin 2A$ எனக் காட்டுக.

$$\cos 36^\circ = \frac{\sqrt{5} + 1}{4}$$

(c) $A + B = \frac{\pi}{4}, \tan A = \frac{n}{n+1}$ எனின், $\tan B, \tan(A - B)$
என்பவற்றைக் காண்க.

26. (a) $\sin 4x = \cos x$ இன் தீவை $0^\circ \leq x \leq 180^\circ$ இல் காண்க.

(b) $2 \sin 2x + \cos 2x = k$ எனின்,
 $(1+k) \tan^2 x - 4 \tan x - 1 + k = 0$ எனக் காட்டுக.
 $\tan x_1, \tan x_2$ என்பன இச்சமன்பாட்டின் மூலங்கள் எனின்,
 $\tan(x_1 + x_2) = 2$ எனக்காட்டுக.

(c) $2x + y = \frac{\pi}{4}$ எனின், $\tan y = \frac{1 - 2 \tan x - \tan^2 x}{1 + 2 \tan x - \tan^2 x}$ எனக் காட்டுக.
 $t^2 + 2t - 1 = 0$ இன் ஒரு மூலம் $\tan \frac{\pi}{8}$ எனவும், அதன்
பெறுமானம் $\sqrt{2} - 1$ எனவும் உய்த்தறிக.

27. $\tan^{-1} x + \tan^{-1} y = \tan^{-1} \frac{x+y}{1-xy}$ என நிறுவுக. இம் முடிபினை
உபயோகித்து $\tan^{-1} x + \tan^{-1} y + \tan^{-1} z = \frac{\pi}{2}$ எனின்,
 $xy + yz + zx = 1$ எனக் காட்டுக.

28. $\tan^{-1} \frac{1}{2} - \tan^{-1} \frac{1}{3} = \sin^{-1} x$ எனின், x ஐக் காண்க.

29. தீர்க்க, $\tan^{-1} \left(\frac{1-x}{1+x} \right) = \frac{1}{2} \tan^{-1} x$

பின்வரும் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க

30. $\sin 2\theta - \cos 2\theta - \sin \theta + \cos \theta = 0$
31. $\sin(3\theta + \alpha) + \sin(3\theta - \alpha) + \sin(\alpha - \theta) - \sin(\alpha + \theta) = \cos \alpha$
32. $\cos(3\theta + \alpha) \cdot \cos(3\theta - \alpha) + \cos(5\theta + \alpha) \cos(5\theta - \alpha) = \cos 2\alpha$
33. $\cos n\theta = \cos(n-2)\theta + \sin \theta$
34. $\sin^2 n\theta - \sin^2(n-1)\theta = \sin^2 \theta$
35. $(2 + \sqrt{3}) \cos \theta = 1 - \sin \theta$
36. $4 \cot 2\theta = \cot^2 \theta - \tan^2 \theta$
37. $3 \tan\left(\theta - \frac{\pi}{12}\right) = \tan\left(\theta + \frac{\pi}{12}\right)$
38. $\tan \theta + \tan 2\theta + \tan 3\theta = 0$
39. $\tan \theta + \tan 2\theta + \sqrt{3} \tan \theta \cdot \tan 2\theta = \sqrt{3}$
40. $\sin(A - B) = \frac{1}{2}, \cos(A + B) = \frac{1}{2}$
41. $\cos(2A + 3B) = \frac{1}{2}, \cos(3A + 2B) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
42. $\tan(\pi \cot \theta) = \cot(\pi \tan \theta)$
43. $\sin(\pi \cos \theta) = \cos(\pi \sin \theta)$ எனில்,
$$\cos\left(\theta \pm \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2\sqrt{2}} \text{ என நிறுவக.}$$
44. $\sin(\pi \cot \theta) = \cos(\pi \tan \theta)$ எனில், n என்பது ஒரு நிறையெண்ணாக இருக்க $\cosec 2\theta$ அல்லது $\cot 2\theta$ ஆனது, $n + \frac{1}{4}$ இறகுச் சமம் எனக் காட்டுக.

1. பொதுத் தீர்வைக் காணக.
 (i) $\cos x + \cos 7x = \cos 4x$
 (ii) $\sqrt{3} \sin x - \cos x = \sqrt{2}$
 (iii) $6 \tan 2\theta - 3 \tan \theta - 5 \cot \theta = 0$
2. (i) $\sin^{-1} x + \sin^{-1} y = \frac{\pi}{3}$ எனில்,
 $x^2 + xy + y^2 = \frac{3}{4}$ என நிறுவக.
 (ii) $\tan^{-1}(x+1) + \tan^{-1}(x-1) = \tan^{-1}(2)$ ஜத் தீர்க்க.
 (iii) a என்பது ஒரு ஒருமையாகவும் θ என்பது ஒரு ஒருமையான கூர்ங்கோணமாயிருக்க,
 $f(x) = \cos^2 x - 2 \sin x \cos x - \sin^2 x, 0 \leq x \leq 2\pi$
 எனில், $f(x)$ ஜ $a \cos(2x + \theta)$ எனும் வடிவில் எடுத்துரைக்க.
 இதிலிருந்து, (i) $f(x) = 0$ ஆக
 (ii) $f(x) = 1$ ஆக x இன் தீர்வைகளைக் காணக.
3. (i) $\cos n\theta = 2 \cos \theta \cdot \cos((n-1)\theta) - \cos((n-2)\theta)$ எனக் காட்டுக.
 இதிலிருந்து $\cos 4\theta$ வை, $\cos \theta$ வில் எடுத்துரைக்க.
 (ii) $\cot \alpha \cot \beta = k$ எனில்,
 $(k+1) \cos(\alpha + \beta) = (k-1) \cos(\alpha - \beta)$ எனக் காட்டுக.
 இதிலிருந்து $\cot \theta \cot\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{3}$ எனும் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.
4. (i) α என்பது 2π இன் ஒரு மடங்கள்று எனவும்,
 $\tan \frac{\beta}{2} = \frac{1 - \cos x}{\sin \alpha}$ எனவும் கொண்டு $\tan \beta = \tan \alpha$ எனக் காட்டுக.

இதிலிருந்து $\tan^{-1}(x) = 2 \tan^{-1}(\csc \tan^{-1} x - \tan \cot^{-1} x)$ என நிறுவக.

(ii) $7 \sin \theta + \cos \theta = 5$ என்னும் சமன்பாட்டை

(a) $R \sin(\theta + \alpha)$ என எழுதுவதன் மூலம் R, α ஒருமைகள்

(b) $t = \tan \frac{\theta}{2}$ எனப் பிரதியிடுவதன் மூலம் தீர்க்க.

5. (a) தீர்க்க.

(i) $\sqrt{3} \cos x - \sin x = \sqrt{2}$

(ii) $\cos x + \sqrt{3} \sin x = 2$

(iii) $\cos 7x - \sqrt{3} \cos 3x + \cos x = 0$

(b) $\theta_1 = \tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right), \theta_2 = \tan^{-1}\left(\frac{1}{4}\right), \theta_3 = \tan^{-1}\left(\frac{2}{9}\right)$

எனின், $O < \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 < \frac{3\pi}{4}$ என நிறுவக.

இதிலிருந்து $\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = \frac{\pi}{4}$ எனக் காட்டுக.

6. (i) $2 \tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{7}\right) = \frac{\pi}{4}$ என நிறுவக.

(ii) $\sin \theta + \sin 3\theta = \sin 2\theta$ என்னும் சமன்பாட்டின் பொதுத் தீர்வைக் காண்க.

(iii) $\alpha = \sin^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{10}}\right)$ எனின், $3 \sin 2\theta + 2 \sin^2 \theta = 2$ என்னும்

சமன்பாட்டின் சில தீர்வுகள் α ஜச் சார்ந்தன எனவும், வேறு சில தீர்வுகள் α வைச் சாராதவை எனவும் காட்டுக.

7. (i) $2 \cos x = \sqrt{3} \cot x$ எனும் சமன்பாட்டின் பொதுத் தீர்வைக் காண்க.
 α என்பது ஒரு கூர்க்கோணமாயிருக்க $4 \cos x - 3 \sin x$ என்பதை $a \cos(x + \alpha)$ என்னும் வடிவத்தில் எடுத்துரைக்க. இதிலிருந்தோ அல்லது வேறு முறையாலோ

(a) $4 \cos x - 3 \sin x = 3$ என்னும் சமன்பாட்டைத் தீர்த்து O இற்கும் 2π இங்குமிடையே இருக்கும் எல்லாத் தீர்வுகளையும் தருக.

(b) $\frac{1}{4 \sin x - 3 \cos x + 6}$ என்பதன் மிக உயர்ந்த பெறுமானத்தையும் மிகக் குறைந்த பெறுமானத்தையும் காண்க.

8. $\cos \alpha = \sqrt{\frac{2}{3}}$ ஆகவும், $\sin \alpha = \sqrt{\frac{1}{3}}$ இருக்க

$\sqrt{6} \cos(x - \alpha) - \tan x = \sqrt{2}$ என்னும் சமன்பாட்டைத் திருப்தியாக்கும் x இன் பெறுமானங்களை O இற்கும் 2π இங்குமிடையில் காண்க.

$O, 2\pi$ இந்கிடையிலுள்ள x இன் பெறுமானங்களுக்கு $\sqrt{6} \cos(x - \alpha)$, $\sqrt{2} + \tan x$ என்பவற்றின் வரைபுகளை ஒரே வரிப்படத்தில் பரும்படியாக வரைக.

இதிலிருந்து $\tan x - \sqrt{6} \cos(x - \alpha) + \sqrt{2} > 0$ ஆக இருக்கும் x இன் பெறுமான ஆயிடைகளை O இலிருந்து 2π வரையிலான ஆட்சியினுள் காண்க.

9. (i) $\tan(A - 2B) = \cot(2A + B)$ உம்

$\tan(A + 2B) = \cot(2A + B)$ உம் எனின்,

A, B ஆகிய இரண்டும் $\frac{\pi}{6}$ ஆரையின் மடங்குகள் என்பதையும் A ஆனது ஓர் ஒற்றை மடங்காபின் B ஆனது ஓர் இரட்டை மடங்காகும் என்பதையும் காட்டுக.

(ii) u, v என்பன $12 \cos x + 5 \sin x = 1$ என்னும் சமன்பாட்டின் இரு தீர்வுகளாகும். u, v ஆகியன 2π ஆரையனின் ஒருமடங்கினால்

வேறுபடாவெனின் $\cos u + \cos v = \frac{24}{169}$ எனக் காட்டுக.

10. (i) $\sec \theta + \tan \theta = u$ எனின் $\sin \theta$ ஒரேயொரு பெறுமானத்தையே கொண்டிருக்குமெனக்காட்டி இப் பெறுமானத்தைத் துணிக.
- (ii) $\cos x + \cos y + \cos z = \frac{3}{2}$,
 $\tan x = \tan y = \tan z$ எனின்,
 x, y, z என்பவற்றிற்கு O இங்கும் 2π இங்குமிடையிலான இரண்டு தொடைப் பெறுமானங்கள் இருப்பது சாத்தியமெனக் காட்டி, பொதுத் தீர்வைக் காண்க
11. $c^2 \leq a^2 + b^2$ எனின், $a \cos \theta + b \sin \theta = c$ எனும் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.
 θ_1, θ_2 என்பன O இங்கும் 2π இங்குமிடையிலான இரண்டு தீர்வுகள் எனின்,
 $\tan\left(\frac{\theta_1 + \theta_2}{2}\right), \cos(\theta_1 - \theta_2)$ என்பவற்றைக் காண்க.
12. (i) θ இன் பெறுமானம் எதுவாக இருந்தாலும் $\cos \phi = -\frac{1}{2}$ எனின்
 $\cos \theta + \cos(\theta + \phi) + \cos(\theta + 2\phi)$ இன் பெறுமானம் பூச்சியம் எனக் காட்டுக.
- (ii) $\cot \theta - (7 + 4\sqrt{3}) \cot(\theta + \alpha) = 0$ எனின்,
 $\sqrt{3} \sin(2\theta + \alpha) = 2 \sin \alpha$ ஆகுமெனக் காட்டுக உ இங்கு ஒருதீர்வு பெறக்கூடியவாறு $\sin \alpha$ இன் வீச்சைக் குறிப்பிடுக. இதிலிருந்து
 $\cot \theta - (7 + 4\sqrt{3}) \cot\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) = 0$ ஜத் திருப்தியாக்கும் உ இன் பெறுமானங்களைக் காண்க.


5. முக்கோணியின் பக்கங்களும், கோணங்களும்

யாதும் ஒரு முக்கோணி ABC இல் கோணம் A யிற்கு எதிரான பக்கம் BC ஆனது a யினாலும், கோணம் B யிற்கு எதிரான பக்கம் CA ஆனது b யினாலும், கோணம் C யிற்கு எதிரான பக்கம் AB ஆனது c யினாலும் குறிக்கப்படும்.

1. யாதாயினும் ஒரு முக்கோணி ABC கில்

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \text{ ஆகும்.}$$

(i) ΔABC இல் AD, BC யிற்கு செங்குத்தாக வரையப்பட்டுள்ளது.



$$AD = AB \sin B$$

$$AD = AC \sin C$$

$$AB \sin B = AC \sin C$$

$$c \sin B = b \sin C$$

இருபக்கமும் $\sin B \sin C$ ஆல் பிரிக்க,

$$\frac{c}{\sin C} = \frac{b}{\sin B}$$

இவ்வாறே AC யிற்கு செங்குத்தாக BE ஜ வரைவதன் மூலம்

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C} \text{ என நிறுவலாம்.}$$

(ii) கோணம் B செங்கோணமாக இருக்கும் போது,


$$AB = AC \sin C$$

$$c = b \sin C$$

$$c \sin \frac{\pi}{2} = b \sin C$$

$$c \sin B = b \sin C$$

$$\text{எனவே } \frac{c}{\sin C} = \frac{b}{\sin B}$$




(iii) கோணம் B விரிகோணமாக இருக்கும் போது,

$$AD = b \sin C$$

$$AD = c \sin(\pi - B) = c \sin B$$

$$b \sin C = c \sin B$$

$$\frac{c}{\sin C} = \frac{b}{\sin B}$$



எனவே யாதாயினும் ஒரு முக்கோணி ABC இல்,

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \text{ ஆகும்.}$$

2. யாதாயினும் ஒரு முக்கோணியின் ஒரு கோணத்தின் கோசைனை பக்கங்கள் சார்பாகக் காணல்

$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} \text{ ஆகும்.}$$


$$AC^2 = AD^2 + DC^2$$

$$b^2 = (c \sin B)^2 + (a - c \cos B)^2$$

$$b^2 = c^2 \sin^2 B + a^2 - 2ac \cos B + c^2 \cos^2 B$$

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ac \cos B$$


$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$



கோணம் B செங்கோணமெனின்,

$$b^2 = a^2 + c^2 ; \cos B = \cos \frac{\pi}{2} = 0$$

$$c^2 + a^2 - b^2 = 0$$



$$c^2 + a^2 - b^2 = 0$$

$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

கோணம் B , விரிகோணமெனின்,

$$AC^2 = AD^2 + DC^2$$


$$b^2 = [c \sin(\pi - B)]^2$$

$$+ [a + c \cos(\pi - B)]^2$$

$$= c^2 \sin^2 B + (a - c \cos B)^2$$

$$= c^2 \sin^2 B + a^2 - 2ac \cos B + c^2 \cos^2 B$$

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ac \cos B$$



ஆகவே, யாதாயினும் ஒரு முக்கோணி ABC இல்,

$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} \text{ ஆகும்.}$$

இவ்வாறே,

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2ab}$$

உதாரணம் 1

யாதாயினும் ஒரு முக்கோணி ABC இல் பின்வருவனவற்றை நிறுவக.

$$(i) \quad \sin\left(\frac{B-C}{2}\right) = \frac{b-c}{a} \cos \frac{A}{2}$$

$$(ii) \quad a(\cos B + \cos C) = 2(b+c) \sin^2 \frac{A}{2}$$

$$(i) \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b - c}{\sin B - \sin C}$$

$$\frac{b - c}{a} = \frac{\sin B - \sin C}{\sin A}$$

$$\frac{b - c}{a} = \frac{2 \cos\left(\frac{B+C}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{B-C}{2}\right)}{2 \sin\frac{A}{2} \cdot \cos\frac{A}{2}}$$

$$\frac{b - c}{a} = \frac{\sin\frac{A}{2} \cdot \sin\left(\frac{B-C}{2}\right)}{\sin\frac{A}{2} \cdot \cos\frac{A}{2}}$$

$$\frac{b - c}{a} \cos\frac{A}{2} = \sin\left(\frac{B-C}{2}\right)$$

$$(ii) \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b + c}{\sin B + \sin C}$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b+c}{2 \sin\left(\frac{B+C}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{B-C}{2}\right)}$$

$$\frac{a}{2 \sin\frac{A}{2} \cdot \cos\frac{A}{2}} = \frac{b+c}{2 \cos\frac{A}{2} \cdot \cos\left(\frac{B-C}{2}\right)}$$

$$\frac{a}{\sin\frac{A}{2}} = \frac{b+c}{\cos\left(\frac{B-C}{2}\right)}$$

$$(b+c) \sin\frac{A}{2} = a \cos\left(\frac{B-C}{2}\right)$$

$$2(b+c) \sin^2\frac{A}{2} = a \left[2 \cos\left(\frac{B-C}{2}\right) \cdot \sin\frac{A}{2} \right]$$

$$\begin{aligned} &= a \left[2 \cos\left(\frac{B-C}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{B+C}{2}\right) \right] \\ &= a [\cos B + \cos C] \end{aligned}$$

உதாரணம் 2

யாதாயினும் ஒரு முக்கோணியில் பின்வருவனவற்றை நிறுவுக.

$$(i) (b+c-a)\left(\cot\frac{B}{2} + \cot\frac{C}{2}\right) = 2a \cot\frac{A}{2}$$

$$(ii) a^2 + b^2 + c^2 = 2(bc \cos A + ca \cos B + ab \cos C)$$

$$(iii) c^2 = (a-b)^2 \cos^2\frac{C}{2} + (a+b)^2 \sin^2\frac{C}{2}$$

$$(i) \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b+c-a}{\sin B + \sin C - \sin A}$$

$$\frac{a}{2 \sin\frac{A}{2} \cdot \cos\frac{A}{2}} = \frac{b+c-a}{2 \sin\left(\frac{B+C}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{B-C}{2}\right) - 2 \sin\frac{A}{2} \cdot \cos\frac{A}{2}}$$

$$\frac{a}{2 \sin\frac{A}{2} \cdot \cos\frac{A}{2}} = \frac{b+c-a}{2 \cos\frac{A}{2} \left[\cos\left(\frac{B-C}{2}\right) - \cos\left(\frac{B+C}{2}\right) \right]}$$

$$\frac{2a \cdot \cos \frac{A}{2}}{\sin \frac{A}{2}} = \frac{2(b+c-a) \cdot \cos \frac{A}{2}}{\left[\cos\left(\frac{B-C}{2}\right) - \cos\left(\frac{B+C}{2}\right) \right]}$$

$$2a \cot \frac{A}{2} = 2(b+c-a) \frac{\sin\left(\frac{B+C}{2}\right)}{2 \sin \frac{B}{2} \cdot \sin \frac{C}{2}}$$

$$2a \cot \frac{A}{2} = (b+c+a) \frac{\sin \frac{B}{2} \cdot \cos \frac{C}{2} + \cos \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}}{\sin \frac{B}{2} \cdot \sin \frac{C}{2}}$$

$$= (b+c-a) \left(\cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2} \right)$$

$$(ii) \quad a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A \quad \dots \dots \dots (1)$$

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cdot \cos B \quad \dots \dots \dots (2)$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C \quad \dots \dots \dots (3)$$

$$(1) + (2) + (3) \Rightarrow$$

$$a^2 + b^2 + c^2 = 2(bc \cos A + ca \cos B + ab \cos C)$$

$$(iii) \quad (a-b)^2 \cos^2 \frac{C}{2} + (a+b)^2 \sin^2 \frac{C}{2}$$

$$= (a^2 - 2ab + b^2) \cos^2 \frac{C}{2} + (a^2 + 2ab + b^2) \sin^2 \frac{C}{2}$$

$$= (a^2 + b^2) \left(\cos^2 \frac{C}{2} + \sin^2 \frac{C}{2} \right) - 2ab \left(\cos^2 \frac{C}{2} - \sin^2 \frac{C}{2} \right)$$

$$= a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

$$= c^2$$

உதாரணம் 3

$A + B + C = 180^\circ$ எனின், பின்வருவனவற்றை நிறுவக.

$$(i) \quad \cos 2A + \cos 2B + \cos 2C = -1 - 4 \cos A \cdot \cos B \cdot \cos C$$

$$(ii) \quad \sin A + \sin B - \sin C = 4 \sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{B}{2} \cdot \cos \frac{C}{2}$$

$$(iii) \quad \cos^2 A + \cos^2 B - \cos^2 C = 1 - 2 \sin A \cdot \sin B \cdot \cos C$$

$$(i) \quad \cos 2A + \cos 2B + \cos 2C$$

$$= 2 \cos(A+B) \cos(A-B) + 2 \cos^2 C - 1$$

$$= -1 - 2 \cos C \cdot \cos(A-B) + 2 \cos^2 C$$

$$= -1 - 2 \cos C [\cos(A-B) - \cos C]$$

$$= -1 - 2 \cos C [\cos(A-B) + \cos(A+B)]$$

$$= -1 - 2 \cos C [2 \cos A \cdot \cos B]$$

$$= -1 - 4 \cos A \cos B \cdot \cos C$$

$$(ii) \quad \sin A + \sin B - \sin C$$

$$= 2 \sin \left(\frac{A+B}{2} \right) \cos \left(\frac{A-B}{2} \right) - 2 \sin \frac{C}{2} \cdot \cos \frac{C}{2}$$

$$= 2 \cos \frac{C}{2} \cos \left(\frac{A-B}{2} \right) - 2 \sin \frac{C}{2} \cdot \cos \frac{C}{2}$$

$$= 2 \cos \frac{C}{2} \left[\cos \left(\frac{A-B}{2} \right) - \cos \left(\frac{A+B}{2} \right) \right]$$

$$= 2 \cos \frac{C}{2} \left[2 \sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{B}{2} \right]$$

$$= 4 \sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{B}{2} \cdot \cos \frac{C}{2}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(iii)} \quad & \cos^2 A + \cos^2 B - \cos^2 C \\
 &= \frac{\cos 2A + 1}{2} + \frac{\cos 2B + 1}{2} - \cos^2 C \\
 &= 1 + \frac{1}{2}(\cos 2A + \cos 2B) - \cos^2 C \\
 &= 1 + \cos(A+B)\cos(A-B) - \cos^2 C \\
 &= 1 - \cos C \cos(A-B) - \cos^2 C \\
 &= 1 - \cos C [\cos(A-B) - \cos(A+B)] \\
 &= 1 - \cos C [2\sin A \sin B] \\
 &= 1 - 2 \sin A \sin B \cdot \cos C
 \end{aligned}$$

உதாரணம் 4

$A + B + C = \pi$ எனின் பின்வருவனவற்றை நிறுவக.

$$\begin{aligned}
 \text{(i)} \quad & \sin^2 \frac{A}{2} + \sin^2 \frac{B}{2} + \sin^2 \frac{C}{2} = 1 - 2 \sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{B}{2} \cdot \frac{C}{2} \\
 \text{(ii)} \quad & \sin \frac{A}{2} + \sin \frac{B}{2} + \sin \frac{C}{2} - 1 = 4 \sin \frac{\pi - A}{4} \cdot \sin \frac{\pi - B}{4} \cdot \sin \frac{\pi - C}{4} \\
 \text{(i)} \quad & \sin^2 \frac{A}{2} + \sin^2 \frac{B}{2} + \sin^2 \frac{C}{2} \\
 &= \frac{1}{2}(1 - \cos A) + \frac{1}{2}(1 - \cos B) + \sin^2 \frac{C}{2} \\
 &= 1 - \frac{1}{2}(\cos A + \cos B) + \sin^2 \frac{C}{2} \\
 &= 1 - \frac{1}{2} \times 2 \cos \left(\frac{A+B}{2} \right) \cdot \cos \left(\frac{A-B}{2} \right) + \sin^2 \frac{C}{2} \\
 &= 1 - \sin \frac{C}{2} \left[\cos \left(\frac{A-B}{2} \right) - \cos \left(\frac{A+B}{2} \right) \right]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 1 - \sin \frac{C}{2} \cdot \left[2 \sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{B}{2} \right] \\
 &= 1 - 2 \sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{B}{2} \cdot \sin \frac{C}{2} \\
 \text{(ii)} \quad & \sin \frac{A}{2} + \sin \frac{B}{2} + \sin \frac{C}{2} - 1 \\
 &= 2 \sin \left(\frac{A+B}{4} \right) \cos \left(\frac{A-B}{4} \right) + 1 - 2 \sin^2 \left(\frac{A+B}{4} \right) - 1 \\
 &= 2 \sin \left(\frac{A+B}{4} \right) \left[\cos \left(\frac{A-B}{4} \right) - \sin \left(\frac{A+B}{4} \right) \right] \\
 &= 2 \sin \left(\frac{\pi-C}{4} \right) \left[\cos \left(\frac{A-B}{4} \right) - \cos \left[\frac{\pi}{2} - \left(\frac{A+B}{4} \right) \right] \right] \\
 &= 2 \sin \left(\frac{\pi-C}{4} \right) \left[2 \sin \left(\frac{\pi-A}{4} \right) \cdot \sin \left(\frac{\pi-B}{4} \right) \right] \\
 &= 4 \sin \left(\frac{\pi-A}{4} \right) \cdot \sin \left(\frac{\pi-B}{4} \right) \cdot \sin \left(\frac{\pi-C}{4} \right)
 \end{aligned}$$

உதாரணம் 5

$\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$ எனின,

- (i) $A + B + C = \pi$ இன் நிறையெண் மடங்கு எனவும்,
- (ii) $\tan rA + \tan rB + \tan rC = \tan rA \cdot \tan rB \cdot \tan rC$ எனவும் நிறுவுக. (r - நிறையெண்)

$$\begin{aligned}
 & x + y + z = xyz \text{ எனின்,} \\
 \text{(a)} \quad & \frac{3x-x^3}{1-3x^2} + \frac{3y-y^3}{1-3y^2} + \frac{3z-z^3}{1-3z^2} = \frac{3x-x^3}{1-3x^2} \cdot \frac{3y-y^3}{1-3y^2} \cdot \frac{3z-z^3}{1-3z^2} \\
 \text{(b)} \quad & x(1-y^2)(1-z^2) + y(1-z^2)(1-x^2) + z(1-x^2)(1-y^2) = 8xyz
 \end{aligned}$$

என உய்த்தறிக.

$$(1) \Rightarrow \cos \frac{A}{2} + \cos \frac{B}{2} + \cos \frac{C}{2} = 4 \cos\left(\frac{\pi-A}{4}\right) \cos\left(\frac{\pi-B}{4}\right) \cos\left(\frac{\pi-C}{4}\right)$$

$$A \rightarrow 180^\circ - 2A, B \rightarrow 180^\circ - 2B, C \rightarrow 180^\circ - 2C$$

என (1) இல் பிரதியிட.

$$(1) \Rightarrow \sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = 4 \sin A \cdot \sin B \cdot \sin C \text{ ஆகும்.}$$

குறிப்பு: $A + B + C = 180^\circ$ ஆகுமாறுள்ள A, B, C இங்கு பெறப்படும் முடிவுகளில் A, B, C என்பவற்றிற்கு முறையே

(i) $90^\circ - \frac{A}{2}, 90^\circ - \frac{B}{2}, 90^\circ - \frac{C}{2}$ என்பவற்றையோ

(ii) $180^\circ - 2A, 180^\circ - 2B, 180^\circ - 2C$ என்பவற்றையோ

பிரதியிடலாம். ஏனெனில்,

$$\left(90^\circ - \frac{A}{2}\right) + \left(90^\circ - \frac{B}{2}\right) + \left(90^\circ - \frac{C}{2}\right) = 180^\circ$$

$$(180^\circ - 2A) + (180^\circ - 2B) + (180^\circ - 2C) = 180^\circ \text{ ஆகும்.}$$

$$5. a(\cos C - \cos B) = 2(b-c)\cos^2 \frac{A}{2}$$

$$6. \frac{a+b}{a-b} = \tan\left(\frac{A+B}{2}\right) \cot\left(\frac{A-B}{2}\right)$$

$$7. a \sin\left(\frac{A}{2} + B\right) = (b+c) \sin \frac{A}{2}$$

$$8. (b+c-a)\left(\cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2}\right) = 2a \cot \frac{A}{2}$$

$$9. b^2 \sin 2C + c^2 \sin 2B = 2bc \cdot \sin A$$

$$10. a(b \cos C - c \cos B) = b^2 - c^2$$

$$11. (b+c)\cos A + (c+a)\cos B + (a+b)\cos C = a+b+c$$

$$12. \frac{\sin(B-C)}{\sin(B+C)} = \frac{b^2 - c^2}{a^2}$$

$$13. (a^2 - b^2 + c^2) \tan B = (a^2 + b^2 - c^2) \tan C$$

$$14. a \sin(B-C) + b \sin(C-A) + c \sin(A-B) = 0$$

$$15. a, b, c \text{ என்பன கூட்டல் விருத்தியில் அமைந்திருப்பின்}$$

$$\cot \frac{A}{2}, \cot \frac{B}{2}, \cot \frac{C}{2} \text{ என்பனவும் கூட்டல் விருத்தியில்}$$

அமைந்திருக்கும் எனக்காட்டுக்

$$16. a^2, b^2, c^2 \text{ என்பன கூட்டல் விருத்தியில் அமைந்திருப்பின்}$$

$\cot A, \cot B, \cot C$ என்பனவும் கூட்டல் விருத்தியில் அமைந்திருக்கும் எனக்காட்டுக்

யாதாயினும் ஒரு முக்கோணி ABC இல் பின்வருவனவற்றை நிறுவுக.

$$1. \tan \frac{B-C}{2} = \frac{b-c}{b+c} \cot \frac{A}{2}$$

$$2. a \cos \frac{B-C}{2} = (b+c) \sin \frac{A}{2}$$

$$3. (a+b+c) \left(\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2} \right) = 2c \cdot \cot \frac{C}{2}$$

$$4. a \sin \left(\frac{B-C}{2} \right) = (b-c) \cos \frac{A}{2}$$

யீற்சி

5(a)

5(b)

$A + B + C = 180^\circ$ எனின் பின்வருவனவற்றை நிறுவுக.

1. $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = 4 \sin A \sin B \sin C$
2. $\sin 2A + \sin 2B - \sin 2C = 4 \cos A \cos B \sin C$
3. $\cos 2A + \cos 2B - \cos 2C = 1 - 4 \sin A \sin B \cos C$
4. $\sin A + \sin B + \sin C = 4 \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}$
5. $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$
6. $\cos A + \cos B + \cos C = 1 + 4 \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$
7. $\cos A + \cos B - \cos C = -1 + 4 \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$
8. $\sin^2 A + \sin^2 B - \sin^2 C = 2 \sin A \sin B \cos C$
9. $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C = 2 + 2 \cos A \cos B \cos C$
10. $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = 1 - 2 \cos A \cos B \cos C$
11. $\sin^2 \frac{A}{2} + \sin^2 \frac{B}{2} - \sin^2 \frac{C}{2} = 1 - 2 \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$
12. $\tan \frac{A}{2} \cdot \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{B}{2} \cdot \tan \frac{C}{2} + \tan \frac{C}{2} \cdot \tan \frac{A}{2} = 1$
13. $\cot \frac{A}{2} \cdot \cot \frac{B}{2} \cdot \cot \frac{C}{2} = \cot \frac{A}{2} + \cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2}$
14. $\cot B \cdot \cot C + \cot C \cdot \cot A + \cot A \cdot \cot B = 1$
15. $\sin(B+2C) + \sin(C+2A) + \sin(A+2B)$
 $= 4 \sin \frac{B-C}{2} \cdot \sin \frac{C-A}{2} \cdot \sin \frac{A-B}{2}$
16. $\cos \frac{A}{2} + \cos \frac{B}{2} - \cos \frac{C}{2} = 4 \cos \frac{\pi+A}{4} \cos \frac{\pi+B}{4} \cos \frac{\pi-C}{4}$

114

மேலதீக உதாரணங்கள்

உதாரணம் 1

(i) $\tan 3\theta = 1$ எனின், $\tan \theta$ என்பது $t^3 - 3t^2 - 3t + 1 = 0$ என்னும் சமன்பாட்டைத் திருப்தி செய்யும் எனக்காட்டுக் கூடும் இச்சமன்பாட்டைத் தீர்த்து, இம்முன்று மூலகங்களுக்கும் ஒத்த ட இன் பெறுமானங்களைக் காண்க.

$$(ii) \cos x + \cos y = \frac{1}{3}$$

$$\sin x + \sin y = \frac{1}{4} \text{ எனின், } \tan \frac{1}{2}(x+y) = \frac{3}{4} \text{ எனக்காட்டுக் கூடும்.}$$

இச்சமன்பாடுகளைத் திருப்தி செய்யும் x, y இன் எல்லா இயல்தகு பெறுமானங்களையும் காண்க.

(1982)

$$\begin{aligned} \tan 3\theta &= \frac{\sin 3\theta}{\cos 3\theta} \\ &= \frac{3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta}{4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta} \\ &= \frac{\sin \theta (3 - 4 \sin^2 \theta)}{\cos \theta (4 \cos^2 \theta - 3)} \\ &= \frac{\tan \theta [3 \sec^2 \theta - 4 \tan^2 \theta]}{[4 - 3 \sec^2 \theta]} \end{aligned}$$

$$= \frac{\tan \theta (3 - \tan^2 \theta)}{1 - 3 \tan^2 \theta}$$

$$= \frac{3 \tan \theta - \tan^3 \theta}{1 - 3 \tan^2 \theta}$$

115

$\tan 3\theta = 1$ எனின்,

$$\frac{3\tan\theta - \tan^3\theta}{1 - 3\tan^2\theta} = 1 \quad (\tan\theta = t \text{ என்க.})$$

$$t^3 - 3t^2 - 3t + 1 = 0$$

$$(t+1)(t^2 - 4t + 1) = 0$$

$$t+1=0 \text{ அல்லது } t^2 - 4t + 1 = 0$$

$$t = -1 \quad \text{அல்லது} \quad t = \frac{4 \pm \sqrt{12}}{2}$$

$$t = -1 \quad \text{அல்லது} \quad t = 2 \pm \sqrt{3}$$

$t = -1, 2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3}$ ஆகும்.

$$\tan 3\theta = 1 = \tan \frac{\pi}{4}$$

$$3\theta = n\pi + \frac{\pi}{4}; \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\theta = \frac{1}{3} \left(n\pi + \frac{\pi}{4} \right)$$

0 இற்கும் 2π இற்குமிடையில் தீர்வுகள்

$$\theta = \left\{ \frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}, \frac{9\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}, \frac{17\pi}{12}, \frac{21\pi}{12} \right\}$$

$$= \left\{ \frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}, \frac{3\pi}{4}, \frac{13\pi}{12}, \frac{17\pi}{12}, \frac{7\pi}{4} \right\}$$

$$\tan \frac{13\pi}{12} = \tan \left(\pi + \frac{\pi}{12} \right) = \tan \frac{\pi}{12}$$

$$\tan \frac{17\pi}{12} = \tan \left(\pi + \frac{5\pi}{12} \right) = \tan \frac{5\pi}{12}$$

$$\tan \frac{7\pi}{4} = \tan \left(\pi + \frac{3\pi}{12} \right) = \tan \frac{3\pi}{12}$$

$$0 < \tan \frac{\pi}{12} < 1 \quad \tan \frac{\pi}{12} = 2 - \sqrt{3}$$

$$\tan \frac{5\pi}{12} = \tan \frac{17\pi}{12}; \quad \tan \frac{5\pi}{12} = 2 + \sqrt{3}$$

$$\tan \frac{3\pi}{4} = \tan \frac{7\pi}{4}; \quad \tan \frac{3\pi}{4} = -1$$

$$\text{(ii)} \quad \cos x + \cos y = \frac{1}{3}$$

$$\sin x + \sin y = \frac{1}{4}$$

$$2 \cos \left(\frac{x+y}{2} \right) \cdot \cos \left(\frac{x-y}{2} \right) = \frac{1}{3} \quad \dots \dots \dots (1)$$

$$2 \sin \left(\frac{x+y}{2} \right) \cdot \cos \left(\frac{x-y}{2} \right) = \frac{1}{4} \quad \dots \dots \dots (2)$$

$$(2) \div (1) \quad \tan \left(\frac{x+y}{2} \right) = \frac{3}{4}$$

$$\frac{x+y}{2} = n\pi + \alpha \quad \left(\alpha = \tan^{-1} \frac{3}{4} \right) \quad \dots \dots \dots (3)$$

$$2 \cos \left(\frac{x+y}{2} \right) \cdot \cos \left(\frac{x-y}{2} \right) = \frac{1}{3} \quad \text{என்பதில்,}$$

$$2 \cos(n\pi + \alpha) \cdot \cos \left(\frac{x-y}{2} \right) = \frac{1}{3}$$

$$2(-1)^n \cos \alpha \cdot \cos \left(\frac{x-y}{2} \right) = \frac{1}{3}$$

$$\cos \left(\frac{x-y}{2} \right) = (-1)^n \cdot \frac{5}{24} \quad \left[\tan \alpha = \frac{3}{4}, \cos \alpha = \frac{4}{5} \right]$$

$$\frac{x-y}{2} = 2m\pi \pm \cos^{-1} \left[(-1)^n \cdot \frac{5}{24} \right] \quad \dots \dots \dots (4)$$

$$x + y = 2n\pi + 2\alpha$$

$$x - y = 4m\pi \pm \cos^{-1} \left[(-1)^n \cdot \frac{5}{24} \right]$$

இரு சமன்பாடுகளிலிருந்தும் x, y இன் பெறுமானங்களைக் கணிக்கலாம்.

உதாரணம் 2

(i) $6 \tan 2\theta - 3 \tan \theta - 5 \cot \theta = 0$ என்னும் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

(ii) $\sin 2x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos 2x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ எனக் காட்டுக.

இங்கு $t = \tan x$

$$\sin \theta + \sin \phi = a$$

$$\cos \theta + \cos \phi = b$$

$\sin(\theta + \phi), \cos(\theta + \phi)$ என்பவற்றின் பெறுமானங்களை a, b யில் காண்க.

$$\tan \theta + \tan \phi = \frac{8ab}{(a^2 + b^2)^2 - 4a^2} \text{ எனக் காட்டுக.}$$

(i) $6 \tan 2\theta - 3 \tan \theta - 5 \cot \theta = 0$

(1983)

$$\frac{6 \times 2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta} - 3 \tan \theta - \frac{5}{\tan \theta} = 0$$

$$12 \tan^2 \theta - 3 \tan^2 \theta (1 - \tan^2 \theta) - 5(1 - \tan^2 \theta) = 0$$

$$3 \tan^4 \theta + 14 \tan^2 \theta - 5 = 0$$

$$(3 \tan^2 \theta - 1)(\tan^2 \theta + 5) = 0$$

$$\tan^2 \theta + 5 = 0$$

அல்லது

$$3 \tan^2 \theta - 1 = 0$$

$$\tan^2 \theta + 5 = 0$$

$$\tan \theta = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

பொருத்தமற்றது

$$\theta = n\pi \pm \frac{\pi}{6}; \quad n \in \mathbb{Z}$$

118

(ii) $\sin \theta + \sin \phi = a$

$$\cos \theta + \cos \phi = b$$

$$2 \sin\left(\frac{\theta+\phi}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta-\phi}{2}\right) = a \quad \dots \dots \dots (1)$$

$$2 \cos\left(\frac{\theta+\phi}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta-\phi}{2}\right) = b \quad \dots \dots \dots (2)$$

$$\frac{(1)}{(2)}, t = \tan\left(\frac{\theta+\phi}{2}\right) = \frac{a}{b} \text{ ஆகும்.}$$

$$\sin(\theta + \phi) = \frac{2t}{1+t^2} = \frac{\frac{2a}{b}}{1+\frac{a^2}{b^2}} = \frac{2ab}{a^2+b^2}$$

$$\cos(\theta + \phi) = \frac{1-t^2}{1+t^2} = \frac{1-\frac{a^2}{b^2}}{1+\frac{a^2}{b^2}} = \frac{b^2-a^2}{b^2+a^2}$$

$$\sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cdot \sin \phi + \sin^2 \phi = a^2 \quad \dots \dots \dots (3)$$

$$\cos^2 \theta + 2 \cos \theta \cdot \cos \phi + \cos^2 \phi = b^2 \quad \dots \dots \dots (4)$$

$$(3) + (4); \quad 2 + 2 \cos(\theta - \phi) = a^2 + b^2$$

$$\cos(\theta - \phi) = \frac{a^2 + b^2 - 2}{2}$$

$$\tan \theta + \tan \phi = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\sin \phi}{\cos \phi}$$

$$= \frac{\sin(\theta + \phi)}{\cos \theta \cdot \cos \phi}$$

$$= \frac{\sin(\theta + \phi)}{\frac{1}{2} [\cos(\theta + \phi) + \cos(\theta - \phi)]}$$

119

$$\begin{aligned}
 &= \frac{2ab}{a^2+b^2} \times \frac{2}{\frac{b^2-a^2}{b^2+a^2} + \frac{a^2+b^2-2}{2}} \\
 &= \frac{4ab}{a^2+b^2} \times \frac{2(a^2+b^2)}{2(b^2-a^2) + (a^2+b^2-2)(a^2+b^2)} \\
 &= \frac{8ab}{(a^2+b^2)^2 - 4a^2}
 \end{aligned}$$

உதாரணம் 3

x இன் எல்லா பெறுமானங்களுக்கும்

$a \cos^2 x + 2b \sin x \cos x + c \cdot \sin^2 x$ என்னும் கோவையானது,

$$\frac{a+c}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{(a-c)^2 + 4b^2}$$
 என்பதற்கும்,

$$\frac{a+c}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{(a-c)^2 + 4b^2}.$$
 என்பதற்குமிடையில் அமைகிறது என நிறுவுக.

$f(x) = 9 \cos^2 x + 24 \sin x \cos x + 16 \sin^2 x - k = 0$ என்பதில் k இன் பெறுமான வீச்சைக் காண்க.

$$9 \cos^2 x + 24 \sin x \cos x + 16 \sin^2 x - k = 0$$
 என்பதன்

மிகப்பெரிய பெறுமானத்தையும், மிகச்சிறிய பெறுமானத்தையும் காண்க.

$$9 \cos^2 x + 24 \sin x \cos x + 16 \sin^2 x - \frac{25}{4} = 0$$
 என்னும் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

(1985)

$$g(x) = a \cos^2 x + 2b \sin x \cos x + c \cdot \sin^2 x$$
 என்க.

$$= \frac{a}{2} (1 + \cos 2x) + b \sin 2x + \frac{c}{2} (1 - \cos 2x)$$

$$= \left(\frac{a-c}{2} \right) \cos 2x + b \sin 2x + \left(\frac{a+c}{2} \right)$$

$$= \sqrt{\left(\frac{a-c}{2} \right)^2 + b^2} \left[\frac{\frac{a-c}{2}}{\sqrt{\left(\frac{a-c}{2} \right)^2 + b^2}} \cos 2x + \frac{b}{\sqrt{\left(\frac{a-c}{2} \right)^2 + b^2}} \sin 2x \right] + \left(\frac{a+c}{2} \right)$$

$$g(x) = \frac{1}{2} \sqrt{(a-c)^2 + 4b^2} [\cos(2x-\alpha)] + \left(\frac{a-c}{2} \right)$$

$$-1 \leq \cos(2x+\alpha) \leq 1$$

$$-\frac{1}{2\sqrt{(a-c)^2 + 4b^2}} \leq \frac{1}{2} \sqrt{(a-c)^2 + 4b^2} \cos(2x+\alpha) \leq \frac{1}{2} \sqrt{(a-c)^2 + 4b^2}$$

ஆகவே,

$$\frac{a+c}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{(a-c)^2 + 4b^2} \leq g(x) \leq \frac{a+c}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{(a-c)^2 + 4b^2}$$
 ஆகும்.

$$f(x) = 9 \cos^2 x + 24 \sin x \cos x + 16 \sin^2 x - k = 0$$

$$k = 9 \cos^2 x + 24 \sin x \cos x + 16 \sin^2 x$$

இங்கு $a = 9, b = 12, c = 16$ ஆகும்.

மேலே பெற்ற முடிவிலிருந்து,

$$\frac{a+c}{2} = \frac{9+16}{2} = \frac{25}{2}; \quad \frac{1}{2} \sqrt{(a-c)^2 + 4b^2} = \frac{1}{2} \times 25 = \frac{25}{2}$$

$$\frac{25}{2} - \frac{25}{2} \leq k \leq \frac{25}{2} + \frac{25}{2}$$

$$0 \leq k \leq 25$$

$9 \cos^2 x + 24 \sin x \cos x + 16 \sin^2 x$ இன் இழிவு பெறுமானம் 0. உயர்வுப்பெறுமானம் 25 ஆகும்.

$$9\cos^2 x + 24\sin x \cos x + 16\sin^2 x - \frac{25}{4} = 0$$

$$\frac{25}{2}\cos(2x-\alpha) + \frac{25}{2} - \frac{25}{4} = 0 \quad \left[\cos \alpha = -\frac{7}{25}, \sin \alpha = \frac{24}{25} \right]$$

$$\frac{25}{2}\cos(2x-\alpha) = -\frac{25}{4}$$

$$\cos(2x-\alpha) = -\frac{1}{2}$$

$$2x - \alpha = 2n\pi \pm \frac{2\pi}{3}$$

$$x = n\pi \pm \frac{\pi}{3} + \frac{\alpha}{2}; \quad n \in \mathbb{Z}$$

உதாரணம் 4

(i) $\sin x + \cos y = 1$

$\cos 2x - \cos 2y = 1$ என்னும் ஒருங்கமை சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க.

(ii) $\cot^{-1}\left(\frac{xy+1}{x-y}\right) + \cot^{-1}\left(\frac{yz+1}{y-z}\right) + \cot^{-1}\left(\frac{zx+1}{z-x}\right) = n\pi$ எனக்காட்டுக.

இங்கு n நிறையெண் ஆகும்.

(1986)

(i) $\sin x + \cos y = 1 \quad \dots \quad (1)$

$\cos 2x - \cos 2y = 1 \quad \dots \quad (2)$

(2) இலிருந்து, $(1 - 2\sin^2 x) - (2\cos^2 y - 1) = 1$

$2\sin^2 x + 2\cos^2 y = 1 \quad \dots \quad (3)$

(1), (3) இலிருந்து,

$$2\sin^2 x + 2(1 - \sin x)^2 = 1$$

$$4\sin^2 x - 4\sin x + 1 = 0$$

$$(2\sin x - 1)^2 = 0$$

$$\sin x = \frac{1}{2}$$

(1) இலிருந்து $\cos y = \frac{1}{2}$

$$\sin x = \frac{1}{2}$$

$$\cos y = \frac{1}{2}$$

$$\sin x = \sin \frac{\pi}{6}$$

$$\cos y = \cos \frac{\pi}{3}$$

$$x = n\pi + (-1)^n \cdot \frac{\pi}{6}$$

$$y = 2m\pi \pm \frac{\pi}{3}$$

இங்கு m, n என்பன நிறையெண்களாகும்.

(ii) $\cot^{-1}\left(\frac{xy+1}{x-y}\right) + \cot^{-1}\left(\frac{yz+1}{y-z}\right) + \cot^{-1}\left(\frac{zx+1}{z-x}\right) = n\pi$

$$\cot^{-1}\left(\frac{xy+1}{x-y}\right) = A \quad \text{எனக; } \tan A = \frac{x-y}{xy+1}$$

$$\cot^{-1}\left(\frac{yz+1}{y-z}\right) = B \quad \text{எனக; } \tan B = \frac{y-z}{yz+1}$$

$$\cot^{-1}\left(\frac{zx+1}{z-x}\right) = C \quad \text{எனக; } \tan C = \frac{z-x}{zx+1}$$

$$\text{இப்பொழுது } \tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \cdot \tan B}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{x-y}{xy+1} + \frac{y-z}{yz+1}}{1 - \left(\frac{x-y}{xy+1}\right)\left(\frac{y-z}{yz+1}\right)} \\ &= \frac{(x-y)(yz+1) + (y-z)(xy+1)}{(xy+1)(yz+1) - (x-y)(y-z)} \\ &= \frac{xyz + x - y^2z - y + xy^2 - xyz + y - z}{xy^2z + xy + yz + 1 - xy + xz + y^2 - yz} \\ &= \frac{(x-z) + y^2(x-z)}{(1+xz) + y^2(1+xz)} \\ &= \frac{(x-z)(1+y^2)}{(1+xz)(1+y^2)} \\ &= \frac{x-z}{1+xz} = -\tan C = \tan(-C) \end{aligned}$$

$$\tan(A+B) = \tan(-C)$$

$A + B = n\pi + (-C)$; n - நிறையெண்

$A + B + C = n\pi$; n - நிறையெண்

உதாரணம் 5

(i) $(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)^3$ என்பதை விரிவுபடுத்தியோ அல்லது வேறு

முறையிலோ $\cos^6 \theta + \sin^6 \theta$ என்பதை $\cos 4\theta$ இன் உறுப்புகளில்

எழுதி, அதிலிருந்து $\cos^6 \theta + \sin^6 \theta = \frac{1}{2} \sin 4\theta + \frac{5}{4}$ எனும் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

- (ii) $\tan 2\alpha + \tan 2\beta = 0$ எனின், $\alpha + \beta$ என்பது $\frac{\pi}{2}$ இன் நிறையெண்மடங்கு என நிறுவுக.
 $\tan \theta + \tan \phi + 3 = 0$
 $\tan 2\theta + \tan 2\phi = 0$ என்னும் சமன்பாட்டுத் தொகுதியைத் திருப்தியாக்கும், ஆனால் 0° இற்கும் 180° இற்குமிடையில் திட்டமாய் அமையும் எல்லா கோணச்சோடிகள் θ, ϕ என்பவற்றைக் காண்க.

$$(iii) \tan^{-1} x + \tan^{-1} \frac{x}{2} + \tan^{-1} \frac{x}{3} = \frac{\pi}{2} \text{ ஜத் தீர்க்க.}$$

(1987)

$$\begin{aligned} (i) \quad &(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)^3 = 1^3 = 1 \\ &\cos^6 \theta + 3\cos^4 \theta \sin^2 \theta + 3\cos^2 \theta \sin^4 \theta + \sin^6 \theta = 1 \\ &\cos^6 \theta + \sin^6 \theta = 1 - 3\cos^2 \theta \sin^2 \theta (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \\ &= 1 - 3\cos^2 \theta \sin^2 \theta \\ &= 1 - \frac{3}{4} \sin^2 2\theta \\ &= 1 - \frac{3}{8} (1 - \cos 4\theta) \\ &= \frac{5}{8} + \frac{3}{8} \cos 4\theta \end{aligned}$$

$$\cos^6 \theta + \sin^6 \theta = \frac{1}{2} \sin 4\theta + \frac{5}{4}$$

$$\frac{3}{8} \cos 4\theta + \frac{5}{8} = \frac{1}{2} \sin 4\theta + \frac{5}{4}$$

$$3\cos 4\theta - 4\sin 4\theta = 5$$

$$\frac{3}{5} \cos 4\theta - \frac{4}{5} \sin 4\theta = 1$$

$$\cos(4\theta + \alpha) = 1 \quad \left[\cos \alpha = \frac{3}{5}, \sin \alpha = \frac{4}{5} \right]$$

$$4\theta + \alpha = 2n\pi$$

$$\theta = \frac{1}{4} [2n\pi - \alpha] ; n - \text{நிறையெண்}$$

$$(ii) \tan 2\alpha + \tan 2\beta = 0$$

$$\text{முன் } \tan 2\alpha = -\tan 2\beta = \tan(-2\beta)$$

$$2\alpha = n\pi - 2\beta$$

$$2\alpha + 2\beta = n\pi$$

$$(iii) \alpha + \beta = n\frac{\pi}{2} \quad (n - \text{நிறையெண்})$$

ஆகவே $(\alpha + \beta)$ ஆனது $\frac{\pi}{2}$ இன் நிறையெண் மடங்காகும்.

$$\tan\theta + \tan\phi + 3 = 0 \quad \dots \quad (1)$$

$$\tan 2\theta + \tan 2\phi = 0 \quad \dots \quad (2)$$

மேலே நிறுவியதிலிருந்து (2) \Rightarrow

$$(\theta + \phi) \text{ ஆனது } \frac{\pi}{2} \text{ இன் நிறையெண் மடங்காகும்.}$$

மேலும் $0 < \theta, \phi < 180^\circ$ என்பதால்

$$0 < \theta + \phi < 360^\circ \text{ ஆகும்.}$$

$$(2) \text{ இலிருந்து } \theta + \phi = n\frac{\pi}{2}$$

எனவே n எடுக்கக்கூடிய பெறுமானங்கள் 1, 2, 3 ஆகும்.

$$n = 1 \quad \text{எனின் } \theta + \phi = \frac{\pi}{2}$$

$\tan\theta + \tan\phi + 3 = 0$ என்பவற்றிலிருந்து,

$$\tan\theta + \tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + 3 = 0$$

$$\tan\theta + \frac{1}{\tan\theta} + 3 = 0$$

$$\tan^2\theta + 3\tan\theta + 1 = 0$$

$$\tan\theta = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$\tan\theta = \frac{-3 + \sqrt{5}}{2}, \quad \tan\theta = \frac{-3 - \sqrt{5}}{2}$$

$$\text{இங்கு } \tan\theta < 0 \quad \theta > 90^\circ$$

$$0^\circ < \theta, \phi < 180^\circ \quad \theta + \phi = 90^\circ \text{ என்பதால்,}$$

θ, ϕ இந்கு தர்வு இல்லை.

$$n = 2 \text{ எனின்,}$$

$$\theta + \phi = \pi$$

$$\tan\theta + \tan\phi + 3 = 0$$

$$\tan\theta + \tan(\pi - \theta) + 3 = 0$$

$$3 = 0$$

ஆகவே $n = 2$ பொருந்தாது.

$$n = 3 \text{ எனின்,}$$

$$\theta + \phi = \frac{3\pi}{2}$$

$$\tan\theta + \tan\phi + 3 = 0$$

$$\tan\theta + \frac{1}{\tan\theta} + 3 = 0$$

$$\tan^2\theta + 3\tan\theta + 1 = 0$$

$$\tan\theta = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$\tan\theta = \frac{-3 + \sqrt{5}}{2} \quad \text{எனக்.} \quad \theta = \theta_1 \quad [90^\circ < \theta_1 < 180^\circ]$$

எனவே $\phi_1 = 270^\circ - \theta_1$ ஆகும்.

$$\tan\theta = \frac{-3 - \sqrt{5}}{2} \quad \text{எனக்.} \quad \theta = \theta_2 \quad [90^\circ < \theta_2 < 180^\circ]$$

எனவே $\phi_2 = 270^\circ - \theta_2$ ஆகும்.

$$(iii) \tan^{-1}x + \tan^{-1}\frac{x}{2} + \tan^{-1}\frac{x}{3} = \frac{\pi}{2} \quad \dots \dots \dots (1)$$

$$\tan^{-1}x = A, \quad \tan^{-1}\frac{x}{2} = B, \quad \tan^{-1}\frac{x}{3} = C$$

$$\tan A = x, \quad \tan B = \frac{x}{2}, \quad \tan C = \frac{x}{3}$$

$$(1) \text{ இலிருந்து} \quad A + B + C = \frac{\pi}{2}$$

$$A + B = \frac{\pi}{2} - C$$

$$\tan(A+B) = \tan\left(\frac{\pi}{2} - C\right) = \frac{1}{\tan C}$$

$$\frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} = \frac{1}{\tan C}$$

$$\frac{x + \frac{x}{2}}{1 - x \cdot \frac{x}{2}} = \frac{3}{x}$$

$$\frac{\frac{3x}{2}}{\frac{2-x^2}{2}} = \frac{3}{x}$$

$$\frac{x}{2-x^2} = \frac{1}{x}$$

$$x^2 = 2 - x^2$$

$$2x^2 = 2; \quad x^2 = 1$$

$$x = \pm 1$$

$$A + B + C = \frac{\pi}{2} \quad \text{என்பதால்,} \quad x \neq -1.$$

$$\therefore x = 1$$

உதாரணம் 6

(i) $a^2 + b^2 > c^2$ எனின், $a \cos \theta + b \sin \theta = c$ எனும் சமன்பாட்டைத் திருப்தியாக்குகின்ற 0 இற்கும் 2π இற்குமிடையே α, β என்னும் இரு வேறு பெறுமானங்கள் இருக்குமெனக்காட்டுக்.

$$\cos^2\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) = \frac{c^2}{a^2 + b^2} \quad \text{என நிறுவுக.}$$

(ii) $x = \sin \alpha$ என்பது $4x^3 - 3x + \sin 3\alpha = 0$ இன் ஒருமூலமெனக்காட்டி, அதன் மற்றைய மூலங்களைப் பெற்று அவற்றை கோணங்களின் சைன்களாக எடுத்துரைக்க.

$$\alpha = 10^\circ \quad \text{எனக்கொண்டோ அல்லது வேறுவிதமாகவோ} \\ \cosec 10^\circ + \cos ec 130^\circ + \cosec 250^\circ = 6 \quad \text{எனக்காட்டுக்.}$$

(1988)

$$a \cos \theta + b \sin \theta = c$$

$$\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \cos \theta + \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \sin \theta = \frac{c}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

$$\cos \phi \cdot \cos \theta + \sin \phi \cdot \sin \theta = \frac{c}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

$$\cos(\theta - \phi) = \frac{c}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

$$-1 \leq \cos(\theta - \phi) \leq 1 \quad \text{என்பதால்,}$$

$$\frac{c^2}{a^2+b^2} \leq 1$$

$$a^2 + b^2 \geq c^2$$

$$\text{இங்கு } a^2 + b^2 > c^2 \quad \text{என்பதால்,}$$

$$-1 < \cos(\theta - \phi) < 1 \quad \text{ஆகும்.}$$

(ii)

$$\cos(\theta - \phi) = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \cos \gamma \text{ எனக். } [0 < \gamma < \pi]$$

$\theta - \phi = 2n\pi \pm \gamma$; n - நிறையெண்

$\theta = 2n\pi + \gamma + \phi$; $2n\pi - \gamma + \phi$:

$\alpha = 2n_1\pi + \gamma + \phi$ $\beta = 2n_2\pi - \gamma + \phi$ எனக்.

$$\alpha - \beta = (n_1 - n_2)2\pi + 2\gamma \quad \dots \quad (1)$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos 2\gamma = 2\cos^2 \gamma - 1 \quad \dots \quad (2)$$

$$= 2 \frac{c^2}{a^2 + b^2} - 1$$

$$\alpha = \beta \text{ எனின், } \frac{2c^2}{a^2 + b^2} - 1 = 1$$

$$\text{எனவே, } c^2 = a^2 + b^2$$

$$\text{ஆனால் } c^2 < a^2 + b^2$$

$$\text{எனவே } \alpha \neq \beta$$

$$(1) \text{ இலிருந்து, } 2\cos^2 \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) - 1 = 2\cos^2 \gamma - 1$$

$$\cos^2 \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) = \cos^2 \gamma$$

$$\left[\cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \right]^2 = \cos^2 \gamma = \frac{c^2}{a^2 + b^2}$$

$$(ii) \quad 4x^3 - 3x + \sin 3\alpha = 0$$

$$4x^3 - 3x + 3\sin \alpha - 4\sin^3 \alpha = 0$$

$x = \sin \alpha$ என இடப்பக்கத்தில் பிரதியிட,

$$4\sin^3 \alpha - 3\sin \alpha + 3\sin \alpha - 4\sin^3 \alpha = 0$$

$\therefore x = \sin \alpha$ ஒரு மூலமாகும்.

$$4x^3 - 3x + 3\sin \alpha - 4\sin^3 \alpha = 0$$

$$(x - \sin \alpha)[4x^2 + 4x \sin \alpha - (3 - 4\sin^2 \alpha)] = 0$$

$$x - \sin \alpha = 0 \quad \text{அல்லது} \quad 4x^2 + 4\sin \alpha x + (3 - 4\sin^2 \alpha) = 0$$

$$x = \sin \alpha \quad x = \frac{-4\sin \alpha \pm \sqrt{16\sin^2 \alpha + 16(3 - 4\sin^2 \alpha)}}{8}$$

$$= \frac{-4\sin \alpha \pm \sqrt{48\cos^2 \alpha}}{8}$$

$$= \frac{-\sin \alpha \pm \sqrt{3}\cos \alpha}{2}$$

$$x = \frac{1}{2}(-\sin \alpha + \sqrt{3}\cos \alpha);$$

$$x = \frac{1}{2}(-\sin \alpha - \sqrt{3}\cos \alpha)$$

$$x = -\frac{1}{2}\sin \alpha + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos \alpha$$

$$x = -\frac{1}{2}\sin \alpha - \frac{\sqrt{3}}{2}\cos \alpha$$

$$x = \cos \frac{2\pi}{3} \sin \alpha + \sin \frac{2\pi}{3} \cos \alpha$$

$$= \cos \frac{4\pi}{3} \sin \alpha + \sin \frac{4\pi}{3} \cos \alpha$$

$$= \sin \left(\frac{2\pi}{3} + \alpha \right)$$

$$= \sin \left(\frac{4\pi}{3} + \alpha \right)$$

$$= \sin (120^\circ + \alpha)$$

$$= \sin (240^\circ + \alpha)$$

தரப்பட்ட சமன்பாட்டின் மூலங்கள் $(4x^3 - 3x + \sin 3\alpha = 0)$

$\sin \alpha, \sin \left(\frac{2\pi}{3} + \alpha \right), \sin \left(\frac{4\pi}{3} + \alpha \right)$ ஆகும்.

இப்பொழுது $\frac{1}{\sin \alpha}, \frac{1}{\sin\left(\frac{2\pi}{3}+\alpha\right)}, \frac{1}{\sin\left(\frac{4\pi}{3}+\alpha\right)}$ என்பவற்றை மூலங்களாகக்

கொண்ட சமன்பாடு $4x^3 - 3x + \sin 3\alpha = 0$ என்பதில்,

x இற்கு $\frac{1}{x}$ ஜப் பிரதியிடுவதனால் பெறப்படும்.

$$4\left(\frac{1}{x}\right)^3 - 3\left(\frac{1}{x}\right) + \sin 3\alpha = 0$$

$$\sin 3\alpha \cdot x^3 - 3x^2 + 4 = 0$$

$$\alpha = 10^\circ \text{ எனின் } \sin 3\alpha = \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \text{ ஆகும்.}$$

$$\therefore \text{சமன்பாடு } x^3 - 6x^2 + 8 = 0$$

$$\text{மூலங்கள் } x_1, x_2, x_3 = 0$$

$$(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3) = 0$$

$$x^3 - (x_1 + x_2 + x_3)x^2 + (x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3)x + x_1x_2x_3 = 0$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 6$$

$$\frac{1}{\sin 10^\circ} + \frac{1}{\sin 130^\circ} + \frac{1}{\sin 250^\circ} = 6$$

$$\cosec 10^\circ + \cosec 130^\circ + \cosec 250^\circ = 6 \text{ ஆகும்.}$$

உதாரணம் 7

$$\tan(\theta + \alpha) - (3 + 2\sqrt{2})\tan \theta = 0 \text{ எனின்,}$$

$$\sin(2\theta + \alpha) = \sqrt{2} \sin \alpha \text{ எனக் காட்டுக.}$$

இங்கு θ விற்குரிய மெய்த்தீர்வுகள் சாத்தியமாகும். $\sin \alpha$ இன் விச்சைக் கூறுக.

இதிலிருந்து $\tan\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) - (3 + 2\sqrt{2})\tan \theta = 0$ என்னும் சமன்பாட்டைத் திருப்தியாக்கும் உ வின் பெறுமானங்களைக் காண்க.

- (ii) ஒரு முக்கோணியின் கோணங்கள் A, B, C ஆகும். உ வின் எப்பெறுமானத்திற்கும் $\tan A + \tan(B+\theta) + \tan(c-\theta) = \tan A \cdot \tan(B+\theta) \cdot \tan(C-\theta)$ என நிறுவுக.

- (iii) $\tan(\cos^{-1} x) = \sin\left(\cot^{-1} \frac{1}{2}\right)$ எனும் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

(1989)

$$(i) \tan(\theta + \alpha) = (3 + 2\sqrt{2}) \tan \theta$$

$$\frac{\sin(\theta + \alpha)}{\cos(\theta + \alpha)} = (3 + 2\sqrt{2}) \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\sin(\theta + \alpha) \cos \theta = (3 + 2\sqrt{2}) \sin \theta \cos(\theta + \alpha)$$

$$2 \sin(\theta + \alpha) \cos \theta = (3 + 2\sqrt{2}) \times 2 \sin \theta \cos(\theta + \alpha)$$

$$\sin(2\theta + \alpha) + \sin \alpha = (3 + 2\sqrt{2}) [\sin(2\theta + \alpha) - \sin \alpha]$$

$$(4 + 2\sqrt{2}) \sin \alpha = (2 + 2\sqrt{2}) \sin(2\theta + \alpha)$$

$$\sin(2\theta + \alpha) = \frac{4 + 2\sqrt{2}}{2 + 2\sqrt{2}} \sin \alpha$$

$$\sin(2\theta + \alpha) = \sqrt{2} \sin \alpha \quad \dots \dots \dots (1)$$

$$-1 \leq \sin(2\theta + \alpha) \leq 1 \text{ ஆதலால்,}$$

$$-\frac{1}{\sqrt{2}} \leq \sin \alpha \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ ஆகும்.}$$

$$\tan\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) = (3 + 2\sqrt{2}) \tan \theta$$

இங்கு (1) இல் $\alpha = \frac{\pi}{6}$ எனப் பிரதியிட,

$$\sin\left(2\theta + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$2\theta + \frac{\pi}{6} = n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{4}$$

$$\theta = \frac{1}{2} \left[n\pi + (-1)^n \cdot \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} \right]; \quad n - \text{நிறையெண்}$$

$$(ii) \quad A + B + C = 180^\circ$$

$$B + C = 180^\circ - A$$

$$(B + \theta) + (C - \theta) = 180^\circ - A$$

$$\tan[(B + \theta) + (C - \theta)] = \tan[180^\circ - A]$$

$$\frac{\tan(B + \theta) + \tan(C - \theta)}{1 - \tan(B + \theta)\tan(C - \theta)} = -\tan A$$

$$\tan A + \tan(B + \theta) + \tan(C - \theta) = \tan A \cdot \tan(B + \theta) \cdot \tan(C - \theta)$$

$$(iii) \quad \tan(\cot^{-1} x) = \sin\left(\cot^{-1} \frac{1}{2}\right)$$

$$\cot^{-1} x = A; \quad \cot^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = B$$

$$\tan A = \sin B; \quad \cot A = x, \cot B = \frac{1}{2}$$

$$\tan^2 A = \sin^2 B$$

$$\frac{1}{x^2} - 1 = \frac{4}{5}$$

$$5(1-x^2) = 4x^2$$

$$x^2 = \frac{5}{9} \quad x = \pm \frac{\sqrt{5}}{3}$$

$$\tan A = \sin B; \quad 0 < B < \frac{\pi}{2} \quad \text{ஆதலால் } \sin B > 0$$

$$\tan A > 0, \quad \therefore 0 < A < \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore x > 0$$

$$\text{ஆகவே} \quad x = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

உதாரணம் 8

பின்வரும் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க.

$$(i) \quad \sin \theta - \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$(ii) \quad \cos^{-1} x - \sin^{-1} x = \frac{\pi}{6}$$

$$(iii) \quad \sin x \cos x - 6 \sin x + 6 \cos x + 6 = 0$$

(1990)

$$(i) \quad \sin \theta - \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta - \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta = \frac{1}{2}$$

$$\cos \frac{\pi}{4} \sin \theta - \sin \frac{\pi}{4} \cos \theta = \frac{1}{2}$$

$$\sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = \sin \frac{\pi}{6}$$

$$\theta = n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4}; \quad n - \text{நிறையெண்}$$

(i)

$$(ii) \quad \cos^{-1} x - \sin^{-1} x = \frac{\pi}{6}$$

$$\cos^{-1} x = A \quad \text{எனக.} \quad \cos A = x$$

$$\sin^{-1} x = B \quad \text{எனக.} \quad \sin B = x$$

$$B = \frac{\pi}{2} - A$$

$$A - \left(\frac{\pi}{2} - A\right) = \frac{\pi}{6}$$

$$2A = \frac{2\pi}{3}$$

$$\therefore A = \frac{\pi}{3}$$

$$\cos A = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{1}{2}$$

$$(iii) \quad \sin x \cos x + 6 = (\sin x - \cos x)$$

$$(\sin x \cos x + 6)^2 = 36 (\sin x - \cos x)^2$$

$$\sin^2 x \cos^2 x + 12 \sin x \cos x + 36 = 36 (1 - 2 \sin x \cos x)$$

$$\sin^2 x \cdot \cos^2 x + 84 \sin x \cos x = 0$$

$$\sin x \cos x (\sin x \cos x + 84) = 0$$

$$\sin x \cdot \cos x = 0 \left[\sin x \cdot \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x \neq -84 \right]$$

$$\sin x = 0: \quad x = n\pi$$

$$\cos x = 0 \quad x = 2m\pi \quad n, m - \text{நிறையெண்}$$

உதாரணம் 9

(i) $a \cos^2 \theta + b \sin \theta \cos \theta + c \sin^2 \theta$ என்பதை $A \cos(2\theta + B) + C$ எனும் வடிவத்தில் எடுத்துரைக்க. இங்கு A, B, C ஆகியவை டவுச் சாராதவை. இதிலிருந்து $E = 8 \cos^2 \theta + 9 \sin \theta \cdot \cos \theta - 4 \sin^2 \theta$ என்னும் கோவையின் மிகப் பெரிய பெறுமானத்தையும் மிகச் சிறிய பெறுமானத்தையும் காண்க. அத்துடன் $E = 0$ ஆக இருக்கும் கூர்ங்கோணம் டவுக்க காண்க.

(ii) தீர்க்க.

$$(a) \quad 5 \sin x - 12 \cos x = -13 \sin 3x$$

$$(b) \quad \sin^{-1} x + \tan^{-1} \left(\frac{2x\sqrt{1-x^2}}{1-2x^2} \right) = \frac{\pi}{2}$$

(1991 Aug.Special)

$$(i) \quad a \cos^2 \theta + b \sin \theta \cos \theta + c \sin^2 \theta$$

$$= \frac{1}{2} [a(1 + \cos 2\theta) + b \sin 2\theta + c(1 - \cos 2\theta)]$$

$$= \left(\frac{a-c}{2} \right) \cos 2\theta + \frac{b}{2} \sin 2\theta + \frac{a+c}{2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{a-c}{2} \right)^2 + \left(\frac{b}{2} \right)^2} \left[\frac{\frac{a-c}{2}}{\sqrt{\left(\frac{a-c}{2} \right)^2 + \left(\frac{b}{2} \right)^2}} \cos 2\theta \right.$$

$$\left. - \frac{\left(\frac{-b}{2} \right)}{\sqrt{\left(\frac{a-c}{2} \right)^2 + \left(\frac{b}{2} \right)^2}} \sin 2\theta \right] + \frac{a+c}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{(a-c)^2 + b^2} \cdot \cos(2\theta + B) + \left(\frac{a+c}{2} \right)$$

$$\text{இங்கு } A = \frac{1}{2} \sqrt{(a-c)^2 + b^2}$$

$$C = \frac{a+c}{2}$$

$$\cos B = \frac{a-c}{\sqrt{(a-c)^2 + b^2}}; \quad \sin B = \frac{-b}{\sqrt{(a-c)^2 + b^2}} \quad \text{ஆகும்.}$$

$$E = 8\cos^2 \theta + 9\sin \theta \cos \theta - 4\sin \theta$$

$$a = 8, b = 9, c = -4$$

$$\frac{a+c}{2} = \frac{8-4}{2} = 2$$

$$\frac{1}{2} \sqrt{(a-c)^2 + b^2} = \frac{1}{2} \sqrt{12^2 + 9^2} = \frac{15}{2}$$

$$E = \frac{1}{2} (a+c) + \frac{1}{2} \sqrt{(a-c)^2 + b^2} \cdot \cos(2\theta + B)$$

$$E = 2 + \frac{15}{2} \cos(2\theta + B)$$

$$E \text{ இழுவு ; } \cos(2\theta + B) = -1; \quad E \text{ இயிவு } = 2 - \frac{15}{2} = -\frac{11}{2}$$

$$E \text{ உயர்வு ; } \cos(2\theta + B) = 1 \quad E \text{ உயர்வு } = 2 + \frac{15}{2} = \frac{19}{2}$$

$$E=O \text{ ஆக, } \cos(2\theta + B) = \frac{-4}{15} = \cos \alpha \text{ எனக்.}$$

$$\left(\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi \right)$$

$$2\theta + B = 2n\pi \pm \alpha \begin{bmatrix} \cos B = \frac{12}{15} = \frac{4}{5} \\ \sin B = \frac{-9}{15} = \frac{-3}{5} \end{bmatrix}$$

$$\theta = n\pi \pm \frac{\alpha}{2} - \frac{B}{2}$$

$$\theta = \pi - \frac{\alpha}{2} - \frac{B}{2} \text{ (கூர்ந்கோணம்)}$$

(a) $5\sin x - 12\cos x = -13\sin 3x$

$$\frac{5}{13} \sin x - \frac{12}{13} \cos x = -\sin 3x$$

$$\sin x \cos \alpha - \cos x \sin \alpha = -\sin 3x$$

$$\sin(x - \alpha) = -\sin 3x$$

$$\sin 3x = \sin [-(x - \alpha)]$$

$$3x = n\pi + (-1)^n [-(x - \alpha)]$$

$$n \text{ ஒற்றை எனின், } 3x = n\pi - (-x + \alpha)$$

$$3x = n\pi + x - \alpha$$

$$x = \frac{n\pi}{2} - \frac{\alpha}{2}$$

$$x = (2n-1) \frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2} \quad (n - \text{நிறையெண்.})$$

n இரட்டை எனின்,

$$3x = n\pi + (-x + \alpha)$$

$$4x = n\pi + \alpha$$

$$x = \frac{n\pi}{4} + \frac{\alpha}{4}$$

$$x = \frac{n\pi}{2} + \frac{\alpha}{4}; \quad (n - \text{நிறையெண்.})$$

உதாரணம் 10

(a) $\cos(A+B)$ இங்கான நியம குத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி

$$\cos 2\theta = 2\cos^2 \theta - 1 \text{ எனக் காட்டுக. } \cos 2\theta \cdot \tan \theta + \sin \theta = 0$$

என்னும் சமன்பாட்டின் பொதுத் தீர்வைக் காணக்.

$2\cos^2 \theta - 2\cos^2 2\theta = \cos 2\theta - \cos 4\theta$ என்னும் சர்வசமன்பாட்டை நிறுவக இதிலிருந்து

$$\cos \frac{\pi}{5} - \cos \frac{2\pi}{5} = \frac{1}{2} \text{ எனக் காட்டுக.$$

$\cos \frac{\pi}{5} = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$ என உய்த்தறிந்து $\cos \frac{3\pi}{5}$ இற்கான பெறுமானத்தைக் காணக்.

(b) பின்வரும் சமன்பாடுகளை x இற்காகத் தீர்க்க.

$$\tan x - \tan(x - \alpha) = \tan \alpha (\alpha \neq 0)$$

$$\tan^{-1} x + \tan^{-1} 2x = \frac{\pi}{4}$$

(1992)

$$(a) \cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$$

$$A = B = \theta \text{ எனின்,}$$

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$$

$$= \cos^2 \theta - (1 - \cos^2 \theta)$$

$$= 2\cos^2 \theta - 1$$

$$\cos 2\theta \cdot \tan \theta + \sin \theta = 0$$

$$\cos 2\theta \cdot \tan \theta + \cos \theta \cdot \tan \theta = 0$$

$$\tan \theta = 0 \text{ அல்லது}$$

$$\cos 2\theta + \cos \theta = 0$$

$$\theta = n\pi$$

$$2\cos^2 \theta + \cos \theta - 1 = 0$$

$$(2\cos \theta - 1)(\cos \theta + 1) = 0$$

$$\cos \theta = \frac{1}{2}$$

$$\theta = 2n\pi \pm \frac{\pi}{3}$$

$$\cos \theta = -1$$

$$\theta = 2n\pi \pm \pi$$

$$\text{தீர்வு: } \theta = n\pi; \quad \theta = 2n\pi \pm \frac{\pi}{3}; \quad n-\text{நிறையெண்.}$$

$$\begin{aligned} \cos 2\theta - \cos 4\theta &= (2\cos^2 \theta - 1) - (2\cos^2 2\theta - 1) \\ &= 2\cos^2 \theta - 2\cos^2 2\theta \end{aligned} \quad \dots \quad (1)$$

$$\theta = \frac{\pi}{5} \text{ எனக்.}$$

$$\cos \frac{2\pi}{5} - \cos \frac{4\pi}{5} = 2 \left[\cos^2 \frac{\pi}{5} - \cos^2 \frac{2\pi}{5} \right]$$

$$\cos \frac{2\pi}{5} + \cos \frac{\pi}{5} = 2 \left(\cos \frac{\pi}{5} - \cos \frac{2\pi}{5} \right) \left(\cos \frac{\pi}{5} + \cos \frac{2\pi}{5} \right)$$

$$\text{ஆகவே, } \cos \frac{\pi}{5} - \cos \frac{2\pi}{5} = \frac{1}{2} \text{ ஆகும்.}$$

$$\cos \frac{\pi}{5} - \left(2\cos^2 \frac{\pi}{5} - 1 \right) = \frac{1}{2}$$

$$4\cos^2 \frac{\pi}{5} - 2\cos \frac{\pi}{5} - 1 = 0$$

$$\cos \frac{\pi}{5} = \frac{2 \pm \sqrt{20}}{8}$$

$$= \frac{1 \pm \sqrt{5}}{4}$$

$$\cos \frac{\pi}{5} > 0 \text{ ஆகவே, } \cos \frac{\pi}{5} = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}$$

(1) இல் $\theta = \frac{3\pi}{5}$ எனப் பிரதியிடன்,

$$\cos \frac{6\pi}{5} - \cos \frac{12\pi}{5} = 2 \left[\cos^2 \frac{3\pi}{5} - \cos^2 \frac{6\pi}{5} \right]$$

$$- \cos \frac{\pi}{5} - \cos \frac{2\pi}{5} = 2 \left[\cos^2 \frac{2\pi}{5} - \cos^2 \frac{\pi}{5} \right]$$

$$\cos \frac{\pi}{5} + \cos \frac{2\pi}{5} = 2 \left(\cos^2 \frac{\pi}{5} - \cos^2 \frac{2\pi}{5} \right)$$

$$\cos \frac{\pi}{5} - \cos \frac{2\pi}{5} = \frac{1}{2} \text{ ஆகும்.}$$

$$\text{எனவே மற்றைய தீர்வு } \cos \frac{3\pi}{5} = \frac{1-\sqrt{5}}{4} \text{ ஆகும்.}$$

(b)(i) $\tan x - \tan(x - \alpha) = \tan \alpha$ ----- (1)

$$\tan \alpha = \tan [x - (x - \alpha)] \text{ என எழுதலாம்}$$

$$\tan \alpha = \frac{\tan x - \tan(x - \alpha)}{1 + \tan x \cdot \tan(x - \alpha)} ----- (2)$$

(1), (2) இலிருந்து

$$\tan \alpha [1 + \tan x \cdot \tan(x - \alpha)] = \tan \alpha$$

$$\tan x \cdot \tan(x - \alpha) = 0$$

$$\tan x = 0 \text{ அல்லது, } \tan(x - \alpha) = 0$$

$$x = n\pi \quad \text{அல்லது} \quad x = n\pi + \alpha; \quad n - \text{நிறையெண்}$$

(ii) $\tan^{-1} x + \tan^{-1}(2x) = \frac{\pi}{4}$

$$\tan^{-1} x = A, \tan^{-1}(2x) = B \text{ எனக்.}$$

$$A + B = \frac{\pi}{4}$$

$$\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} = \tan \frac{\pi}{4} = 1$$

$$\frac{x + 2x}{1 - 2x^2} = 1$$

$$2x^2 + 3x - 1 = 0$$

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{17}}{2}$$

$$x = \frac{\sqrt{17} - 3}{2}, \quad x = \frac{-\sqrt{17} - 3}{2}$$

$$0 < A < \frac{\pi}{4} \text{ என்பதால், } x = \frac{\sqrt{17} - 3}{2} (> 0)$$

உதாரணம் 11

(a) பின்வரும் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க.

(i) $\sqrt{3}(\sin x + \cos x)^2 = \cos 2x$

(ii) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{x-1}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{1}{x+1}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

(b) $2 \sin y \cdot \sin(x+y) = \cos x$

$$\cot x + \sin 2y = \sin 2x$$

ஆகிய சமன்பாடுகளை x, y திருப்தி செய்கின்றன. முதலாவது சமன்பாடு $\sin x \cdot \sin 2y = \cos x \cdot \cos 2y$ எனும் வடிவத்தில் எழுதப்படலாம் எனக் காட்டுவதன் மூலம் அல்லது வேறுவிதமாக y இலே ஒரு சமன்பாட்டைப் பெறுக. இதிலிருந்து $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi$ ஆக இருக்க x, y ஆகியவற்றுக்கு மேலே குறிப்பிட்ட ஒருங்கமை சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க.

$$(i) \sqrt{3}(\sin x + \cos x)^2 = \cos 2x$$

$$\sqrt{3}(1 + \sin 2x) = \cos 2x$$

$$\cos 2x - \sqrt{3} \sin 2x = \sqrt{3}$$

$$\frac{1}{2} \cos 2x - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos \frac{\pi}{3} \cos 2x - \sin \frac{\pi}{3} \sin 2x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} = \cos \frac{\pi}{6}$$

$$2x + \frac{\pi}{3} = 2n\pi \pm \frac{\pi}{6}$$

$$x = n\pi \pm \frac{\pi}{12} - \frac{\pi}{6}; \quad n - \text{நிறையெண்.}$$

$$(ii) \tan^{-1}\left(\frac{1}{x-1}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{1}{x+1}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$A = \tan^{-1}\left(\frac{1}{x-1}\right) \Rightarrow \tan A = \frac{1}{x-1}$$

$$B = \tan^{-1}\left(\frac{1}{x+1}\right) \Rightarrow \tan B = \frac{1}{x+1}$$

$$C = \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) \Rightarrow \tan C = \frac{1}{2}$$

$$A - B = C$$

$$\tan(A - B) = C$$

$$\frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B} = \tan C$$

$$\frac{\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}}{1 + \frac{1}{x-1} \cdot \frac{1}{x+1}} = \frac{1}{2} \quad \frac{2}{x^2} = \frac{1}{2}; \quad x^2 = 4; \quad x = \pm 2$$

$$(b) 2 \sin y \cdot \sin(x+y) = \cos x$$

$$2 \sin y [\sin x \cos y + \cos x \sin y] = \cos x$$

$$2 \sin y \cos y \cdot \sin x + \cos x \cdot (2 \sin^2 y) = \cos x$$

$$\sin 2y \cdot \sin x = \cos x (1 - 2 \sin^2 y)$$

$$\sin 2y \cdot \sin x = \cos x (\cos 2y)$$

$$\frac{\sin 2y}{\cos 2y} = \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$\tan 2y = \cot x = \tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

$$2y = n\pi + \left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

$$(i) \sin 2y = \cos x \quad [n \text{ இரட்டை எணின்}]$$

$$(ii) \sin 2y = -\cos x \quad [n \text{ ஒற்கை எணின்}]$$

$$\cot x + \sin 2y = \sin 2x \quad \text{என்பதில்,}$$

$$(i) \cot x + \cos x = \sin 2x$$

$$\frac{\cos x}{\sin x} + \cos x = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos x [1 + \sin x - 2 \sin^2 x] = 0$$

$$\cos x = 0, (1 - \sin x)(1 + 2 \sin x) = 0$$

$$\cos x = 0, (1 - \sin x) = 0, (1 + 2 \sin x) = 0$$

$0 \leq x \leq \pi$ என்பதால்,

$$x = \frac{\pi}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{2} \text{ எனின், } \sin 2y = \cos x = \cos \frac{\pi}{2} = 0$$

$$2y = 0, \pi, 2\pi$$

$$y = 0, \frac{\pi}{2}, \pi \quad \text{----- (1)}$$

(ii) $\sin 2y = -\cos x$ எனின்,

$$\cot x + \sin 2y = \sin 2x \text{ என்பதில்}$$

$$\cot x - \cos x = \sin 2x$$

$$\cos x(1 - \sin x - 2 \sin^2 x) = 0$$

$$\cos x(1 + \sin x)(1 - 2 \sin x) = 0$$

$$\cos x = 0, \sin x = -1, \sin x = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \quad [0 \leq x \leq \pi \text{ என்பதால்}]$$

$$x = \frac{\pi}{2} \text{ எனில், } \sin 2y = 0 \cdot y = 0, \frac{\pi}{2}, \pi$$

$$x = \frac{\pi}{6} \text{ எனில், } \sin 2y = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$2y = \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$$

$$y = \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{6} \quad \text{----- (2)}$$

$$x = \frac{5\pi}{6} \text{ எனில், } \sin 2y = -\cos \frac{5\pi}{6}$$

$$\sin 2y = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$2y = \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}$$

$$y = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3} \quad \text{----- (3)}$$

தீர்வு $x = \frac{\pi}{2} \text{ எனின், } y = 0, \frac{\pi}{2}, \pi$

$$x = \frac{\pi}{6} \text{ எனின், } y = \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}$$

$$x = \frac{5\pi}{6} \text{ எனின், } y = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3} \text{ ஆகும்.}$$

உதாரணம் 12

(a) தீர்க்க :

(i) $6 \tan^2 x - 2 \cos^2 x = \cos 2x$

(ii) $\cos^{-1} \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{2x}{x^2 - 1} \right) = \frac{2\pi}{3} (x > 1)$

(b) $\sin \frac{x+y}{2} = u$ எனவும், $\cos \frac{x-y}{2} = v$ எனவும் இருப்பின்,

$$\sin x + \sin y = \sqrt{2}$$

$$\cos x \cdot \cos y = \frac{1}{2} \text{ ஆகிய ஒருங்கமை சமன்பாடுகள்}$$

$$uv = \frac{1}{\sqrt{2}}, v^2 - u^2 = \frac{1}{2} \text{ என ஒருங்கும் எனக் காட்டுக.$$

இதிலிருந்து தரப்பட்ட ஒருங்கமை சமன்பாடுகளை x, y இல் ஆகியவற்றுக்காகத் தீர்க்க.

$$(i) \quad 6\tan^2 x - 2\cos^2 x = \cos 2x$$

$$6\tan^2 x - (\cos 2x + 1) = \cos 2x$$

$$6\tan^2 x = 2\cos 2x + 1$$

$t = \tan x$ எனக்.

$$6t^2 = 2 \frac{(1-t^2)}{1+t^2} + 1$$

$$(6t^2 - 1)(1+t^2) = 2(1-t^2)$$

$$6t^4 + 5t^2 - 1 = 2 - 2t^2$$

$$6t^4 + 7t^2 - 3 = 0$$

$$(3t^2 - 1)(2t^2 + 3) = 0$$

$$3t^2 - 1 = 0; \quad t = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\tan x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$x = n\pi \pm \frac{\pi}{6}; \quad n - \text{நிறையெண்.}$$

$$(ii) \quad \cos^{-1}\left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{2x}{x^2 - 1}\right) = \frac{2\pi}{3} (x > 1)$$

$x = \tan \alpha$ எனக்.

$$\cos^{-1}(-\cos 2\alpha) + \tan^{-1}(-\tan 2\alpha) = \frac{2\pi}{3}$$

$$\cos^{-1}(-\cos 2\alpha) + \tan^{-1}[\tan(-2\alpha)] = \frac{2\pi}{3} \quad \dots \dots \dots (1)$$

$$(\pi - 2\alpha) + (-2\alpha) = \frac{2\pi}{3}$$

$$\pi - 4\alpha = \frac{2\pi}{3}$$

$$4\alpha = \frac{\pi}{3}$$

$$\alpha = \frac{\pi}{12}$$

$$x = \tan \alpha = \tan \frac{\pi}{12} < 1 - \text{பொருந்தாது.}$$

(1) இலிருந்து

$$\cos^{-1}[\cos(\pi - 2\alpha)] + \tan^{-1}[\tan(\pi - 2\alpha)] = \frac{2\pi}{3}$$

$$(\pi - 2\alpha) + (\pi - 2\alpha) = \frac{2\pi}{3}$$

$$2\pi - 4\alpha = \frac{2\pi}{3}$$

$$4\alpha = \frac{4\pi}{3}$$

$$\alpha = \frac{\pi}{3}$$

$$x = \tan \alpha = \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$

$$u = \sin\left(\frac{x+y}{2}\right), v = \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\sin x + \sin y = \sqrt{2}$$

$$2\sin\left(\frac{x+y}{2}\right)\cos\left(\frac{x-y}{2}\right) = \sqrt{2} \quad \dots \dots \dots (1)$$

$$2uv = \sqrt{2}; \quad uv = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$2 \cos x \cdot \cos y = 1$$

$$\cos(x+y) + \cos(x-y) = 1$$

$$\left[1 - 2 \sin^2\left(\frac{x+y}{2}\right)\right] + \left[2 \cos^2\left(\frac{x-y}{2}\right) - 1\right] = 1$$

$$\cos^2\left(\frac{x-y}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{1}{2} \quad \dots \dots \dots (2)$$

$$v^2 - u^2 = \frac{1}{2}$$

$$uv = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad v^2 - u^2 = \frac{1}{2}$$

$$v^2 - \frac{1}{2v^2} = \frac{1}{2}$$

$$2v^4 - v^2 - 1 = 0$$

$$(2v^2 + 1)(v^2 - 1) = 0$$

$$2v^2 + 1 \neq 0; \quad v^2 - 1 = 0$$

$$v = \pm 1 \quad \begin{cases} v = 1 \\ u = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases} \quad \begin{cases} v = -1 \\ u = -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

$$v = 1, \quad u = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\cos\left(\frac{x-y}{2}\right) = 1; \quad \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{x-y}{2} = 2n\pi \quad \frac{x+y}{2} = m\pi + (-1)^m \frac{\pi}{4}$$

$$x = (m+2n)\pi + (-1)^m \frac{\pi}{4}$$

$$y = (m-2n)\pi - (-1)^m \frac{\pi}{4} \quad \text{இங்கு } m, n - \text{ நிறையெண்கள்}$$

$$v = 1, \quad u = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\cos\left(\frac{x-y}{2}\right) = -1 \quad \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{x-y}{2} = 2n\pi + \pi \quad \frac{x+y}{2} = m\pi - (-1)^m \frac{\pi}{4}$$

$$x = (m+2n+1)\pi - (-1)^m \frac{\pi}{4}$$

$$y = (m-2n-1)\pi + (-1)^m \frac{\pi}{4}; \quad m, n - \text{ நிறையெண்கள்}$$

உதாரணம் 13

x இறகாகத் தீர்க்க.

$$(i) \quad 3 \cos x - 4 \sin x = 5 \sin kx; \quad k - \text{ ஒரு மாறிலி}$$

$$(ii) \quad 4 - 4(\cos x - \sin x) - \sin 2x = 0$$

$$(iii) \quad \cos^{-1} x - \sin^{-1} x = \frac{\pi}{6} \left[0 \leq \cos^{-1} x \leq \pi, -\frac{\pi}{2} \leq \sin^{-1} x \leq \frac{\pi}{2} \right]$$

(1995)

$$(i) \quad 3 \cos x - 4 \sin x = 5 \sin kx$$

$$\frac{3}{5} \cos x - \frac{4}{5} \sin x = \sin kx$$

$$\cos a \cos x - \sin a \cdot \sin x = \sin kx$$

$$\cos(x+\alpha) = \sin kx = \cos\left(\frac{\pi}{2} - kx\right)$$

$$x + \alpha = 2n\pi \pm \left(\frac{\pi}{2} - kx\right)$$

$$x = \frac{1}{(k+1)} \left[2n\pi + \frac{\pi}{2} - \alpha \right] \quad n - \text{நிறையெண்}$$

$$x = \frac{1}{(1-k)} \left[2n\pi - \frac{\pi}{2} - \alpha \right]; \quad n - \text{நிறையெண்}$$

$$(ii) \quad 4 - 4(\cos x - \sin x) + [(\cos x - \sin x)^2 - 1] = 0$$

$t = \cos x - \sin x$ எனக்.

$$4 - 4t + t^2 - 1 = 0$$

$$t^2 - 4t + 3 = 0$$

$$(t-3)(t-1) = 0$$

$t = 3$ அல்லது $t = 1$

$-\sqrt{2} \leq \cos x - \sin x \leq \sqrt{2}$ என்பதால் $t = 3$ பொருந்தாது.

$$\cos x - \sin x = 1$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \cos x - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin x = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$x = 2n\pi \quad \text{அல்லது} \quad 2n\pi + \frac{\pi}{2}; \quad n - \text{நிறையெண்}$$

$$(i) \quad \cos^{-1} x - \sin^{-1} x = \frac{\pi}{6}$$

$$\cos^{-1} x = A \quad \text{எனக்,} \quad \sin^{-1} x = B \quad \text{எனக்.} \quad \left(B = \frac{\pi}{2} - A \right)$$

$$A - B = \frac{\pi}{6}$$

$$A - \left(\frac{\pi}{2} - A \right) = \frac{\pi}{6}$$

$$2A = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} = \frac{4\pi}{6} = \frac{2\pi}{3}$$

$$A = \frac{\pi}{3}; \quad \cos A = x$$

$$\cos \frac{\pi}{3} = x = \frac{1}{2}$$

உதாரணம் 14

(i) $\frac{\cos x + 2 \sin x + 1}{\cos x + \sin x}$ என்பது 1 இற்கும் 2 இற்குமிடையே அனைய முடியாதெனக் காட்டுக.

(ii) $A + B + C = \pi$ எனின்,
 $\cot A \cot B + \cot B \cot C + \cot C \cot A = 1$ எனக் காட்டுக.

(iii) தீர்க்க. $\tan \theta + \tan 2\theta + \tan 3\theta = 0$

(iv) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{1}{4}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ என நிறுவுக.

(1996)

$$E = \frac{\cos x + 2 \sin x + 1}{\cos x + \sin x}$$

$$(E-1) \cos x + (E-2) \sin x = 1$$

$$k = \sqrt{(E-1)^2 + (E-2)^2} \quad \text{எனக்.}$$

$$\frac{E-1}{k} \cos x + \frac{E-2}{k} \sin x = \frac{1}{k}$$

$$\cos(x-\alpha) = \frac{1}{k}$$

$$|\cos(x-\alpha)| \leq 1$$

$$\frac{1}{k^2} \leq 1$$

$$k^2 - 1 \geq 0$$

$$(E-1)^2 + (E-2)^2 - 1 \geq 0$$

$$2E^2 - 6E + 4 \geq 0$$

$$E^2 - 3E + 2 \geq 0$$

$$(E-1)(E-2) \geq 0$$

$$E \leq 1 \quad \text{அல்லது} \quad E \leq 2.$$

ஆகவே E , 1 இற்கும் 2 இற்குமிடையே எப்பெறுமானத்தையும் எடுக்காது.

$$(ii) \quad A + B + C = \pi$$

$$A + B + C = \pi - C$$

$$\tan(A+B) = \tan(\pi-C)$$

$$\frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} = -\tan C$$

$$\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$$

$\tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$ ஆல் பிரிக்க,

$$\cot B \cot C + \cot C \cot A + \cot A \cot B = 1$$

$$(iii) \quad \tan \theta + \tan 2\theta + \tan 3\theta = 0$$

$$\tan \theta + \tan 2\theta + \frac{\tan \theta + \tan 2\theta}{1 - \tan \theta \cdot \tan 2\theta} = 0$$

$$(\tan \theta + \tan 2\theta)(2 - \tan \theta \cdot \tan 2\theta) = 0$$

$$\tan 2\theta + \tan \theta = 0 \quad \text{அல்லது} \quad 2 - \tan \theta \cdot \tan 2\theta = 0$$

$$\tan 2\theta = -\tan \theta = \tan(-\theta)$$

$$2\theta = n\pi + (-\theta)$$

$$\theta = \frac{n\pi}{3}; \quad n - \text{நிறையெண்}$$

$$2 - \tan \theta \cdot \tan 2\theta = 0$$

$$2 - \frac{2 \tan^2 \theta}{1 - \tan^2 \theta} = 0$$

$$\tan \theta = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} = \pm \tan \alpha = \tan(\pm \alpha)$$

$$\theta = n\pi \pm \alpha; \quad n - \text{நிறையெண்}$$

$$(iv) \quad \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$A = \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right), \quad B = \tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$\tan A = \frac{1}{2}, \quad \tan B = \frac{1}{3}; \quad 0 < A < \frac{\pi}{4}; \quad 0 < B < \frac{\pi}{4}$$

$$\tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \cdot \tan B}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}} = 1$$

$$0 < A+B < \frac{\pi}{2}; \quad A+B = \frac{\pi}{4}$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{1}{4}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$$

$$C = \tan^{-1}\left(\frac{1}{4}\right), D = \tan^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$$

$$\tan C = \frac{1}{4}; \tan D = \frac{3}{5} \quad 0 < C, \quad D < \frac{\pi}{2}$$

$$\tan(C+D) = \frac{\tan C + \tan D}{1 - \tan C \cdot \tan D} = \frac{\frac{1}{4} + \frac{3}{5}}{1 - \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{5}}$$

$$C+D = \frac{\pi}{4} \quad (C+D < \pi)$$

$$A+B = C+D$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{1}{4}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$$

உதாரணம் 15

(a) தீர்க்க. (i) $\cos x + \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) = 0$

(ii) $\sin 3x = 4 \sin x \cdot \sin 2x \cdot \sin 4x$

156

(b) A, B, C, D ஆகிய மாறிலிகள் எல்லாம் x ஜி சாராதனவாயிருக்க $A \sin x + B \cos x + C \sin 2x + D \cos 2x = 0$ என்றும் சமன்பாடு x இன் எல்லாப் பெறுமானங்களுக்கும் உண்மையாக இருப்பின் இந்த மாறிலிகள் ஒவ்வொன்றும் பூச்சியமாக இருத்தல் வேண்டும் எனக் காட்டுக.

(1997)

(a) (i) $\cos x + \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right)$

$$\cos x + \cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 0$$

$$2\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \cdot \cos\frac{\pi}{3} + \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 0$$

$$2\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 0$$

$$\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 0$$

$$x + \frac{\pi}{3} = 2n\pi \pm \frac{\pi}{2}$$

$$x = 2n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}; \quad x = 2n\pi - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}$$

$$= 2n\pi + \frac{\pi}{6}; \quad 2n\pi - \frac{5\pi}{6}; \quad n - \text{நிறையெண்}$$

(ii) $\sin 3x = 4 \sin x \cdot \sin 2x \cdot \sin 4x$

$$= 2(\cos x - \cos 3x) \sin 4x$$

$$= 2 \cos x \cdot \sin 4x - 2 \cos 3x \cdot \sin 4x$$

$$= (\sin 5x + \sin 3x) - (\sin 7x + \sin x)$$

$$0 = \sin 5x - \sin 7x - \sin x$$

$$0 = -2 \cos 6x \cdot \sin x - \sin x$$

157

$$\begin{aligned}
 &= \frac{x - \frac{x\sqrt{3}-1}{x+\sqrt{3}}}{1 + \frac{x(\sqrt{3}-1)}{x+\sqrt{3}}} \\
 &= \frac{x^2+1}{\sqrt{3}(x^2+1)} = \frac{1}{\sqrt{3}}
 \end{aligned}$$

$-\pi < A - B < \pi$, அத்துடன் $A - B > 0$,

$$\therefore A - B = \frac{\pi}{6}$$

$$\therefore \tan^{-1} x - \tan^{-1} \frac{x\sqrt{3}-1}{x+\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6} \text{ ஆகும்.}$$

$$(b) \quad \frac{1}{a+c} + \frac{1}{b+c} = \frac{3}{a+b+c}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{a+c} + \frac{1}{b+c} - \frac{3}{a+b+c} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{(b+c)(a+b+c) + (a+c)(a+b+c) - 3(a+c)(b+c)}{(a+c)(b+c)(a+b+c)}$$

$$\Leftrightarrow \frac{a^2 + b^2 - c^2 - ab}{(a+c)(b+c)(a+b+c)} = 0$$

$$\Leftrightarrow a^2 + b^2 - c^2 - ab = 0$$

$$\Leftrightarrow a^2 + b^2 - c^2 = ab$$

$$\Leftrightarrow \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{1}{2}$$

$$\cos C = \frac{1}{2} \quad \therefore C = \frac{\pi}{3}$$

உதாரணம் 17

வழக்கமான குறிப்பிட்டுடன் ஒரு முக்கோணி $A B C$ யில்,

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \text{ என நிறுவுக.}$$

$$(i) \quad a = (b-c) \cos \frac{A}{2} \cosec \frac{B-C}{2}$$

$$(ii) \quad \cot \left(\frac{B-C}{2} \right) = \frac{b+c}{b-c} \tan \frac{A}{2} \text{ என நிறுவுக:}$$

இவற்றிலிருந்து, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ என உய்த்தறிக.

(1983)

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b-c}{\sin B - \sin C}$$

$$\frac{a}{2 \sin \frac{A}{2} \cos \frac{A}{2}} = \frac{b-c}{2 \cos \left(\frac{B+C}{2} \right) \cdot \sin \left(\frac{B-C}{2} \right)}$$

$$\frac{a}{2 \sin \frac{A}{2} \cdot \cos \frac{A}{2}} = \frac{b-c}{2 \sin \frac{A}{2} \cdot \sin \left(\frac{B-C}{2} \right)}$$

$$a = (b-c) \cos \frac{A}{2} \cosec \left(\frac{B-C}{2} \right) \quad \dots \dots \dots (1)$$

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

$$\Rightarrow \frac{b-c}{\sin B - \sin C} = \frac{b+c}{\sin B + \sin C}$$

$$\frac{b-c}{2\cos\left(\frac{B+C}{2}\right)\cdot\sin\left(\frac{B-C}{2}\right)} = \frac{b+c}{2\sin\left(\frac{B+C}{2}\right)\cdot\cos\left(\frac{B-C}{2}\right)}$$

$$\frac{b+c}{b-c} = \cot\frac{A}{2} \cdot \cos\left(\frac{B-C}{2}\right)$$

$$\frac{\sin\frac{A}{2}}{\cos\frac{A}{2}} \cdot \sin\left(\frac{B-C}{2}\right)$$

$$\frac{b+c}{b-c} \cdot \tan\frac{A}{2} = \cot\left(\frac{B-C}{2}\right) \quad \text{----- (2)}$$

(1) இலிருந்து

$$\begin{aligned} a^2 &= (b-c)^2 \cdot \cos^2\frac{A}{2} \cdot \csc^2\left(\frac{B-C}{2}\right) \\ &= (b-c)^2 \cdot \cos^2\frac{A}{2} \left[1 + \left(\frac{b+c}{b-c}\right)^2 \cdot \tan^2\frac{A}{2} \right] \\ &= (b-c)^2 \cdot \cos^2\frac{A}{2} + (b+c)^2 \cdot \sin^2\frac{A}{2} \\ &= b^2 + c^2 - 2bc \cdot \left(\cos^2\frac{A}{2} - \sin^2\frac{A}{2} \right) \\ &= b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A \end{aligned}$$

உதாரணம் 18

வழமையான குறிப்பிடுகளுடன் ஒரு முக்கோணம் ABC யில்

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \text{ எனக் காட்டுக.}$$

$$(i) \quad b \sin\left(\frac{B}{2} + C\right) = (c+a) \sin\frac{B}{2}$$

$$(ii) \quad \frac{\cot\frac{C}{2} + \cot\frac{A}{2}}{\cot\frac{B}{2}} = \frac{2b}{c+a-b}$$

(iii) a, b, c என்பன கூட்டல் விருத்தியில் அமைந்தால்

$$\cot\frac{A}{2}, \cot\frac{B}{2}, \cot\frac{C}{2} \text{ என்பனவும் இவ்வாறு அமையும் எனக் காட்டுக.}$$

(1984)

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{a+c}{\sin A + \sin C}$$

$$\frac{b}{2\sin\frac{B}{2}\cos\frac{B}{2}} = \frac{a+c}{2\sin\left(\frac{A+C}{2}\right)\cos\left(\frac{A-C}{2}\right)}$$

$$\frac{b}{\sin\frac{B}{2}} = \frac{a+c}{\cos\left(\frac{A-C}{2}\right)}$$

$$(a+c) \sin\frac{B}{2} = b \cdot \cos\left(\frac{A-C}{2}\right)$$

$$= b \cos\left[\frac{180^\circ - B - C - C}{2}\right]$$

$$= b \cos\left[90^\circ - \left(\frac{B}{2} + C\right)\right]$$

$$= b \sin\left(\frac{B}{2} + C\right) \quad \text{----- (1)}$$

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{a+c-b}{\sin A + \sin C - \sin B}$$

$$\frac{b}{2 \sin \frac{B}{2} \cdot \cos \frac{B}{2}} = \frac{a+c-b}{2 \sin \left(\frac{A+C}{2}\right) \cos \left(\frac{A-C}{2}\right) - 2 \sin \frac{B}{2} \cos \frac{B}{2}}$$

$$\frac{b}{\sin \frac{B}{2}} = \frac{a+c-b}{\cos \left(\frac{A-C}{2}\right) - \cos \left(\frac{A+C}{2}\right)}$$

$$\frac{b}{\sin \frac{B}{2}} = \frac{a+c-b}{2 \sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{C}{2}}$$

$$\frac{2b}{a+c-b} = \frac{\sin \frac{B}{2}}{\sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{C}{2}} = \frac{1}{\sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{C}{2}} \times \frac{1}{\frac{\sin \frac{B}{2}}{2}}$$

$$= \frac{\cos \frac{B}{2}}{\sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{C}{2}} \times \frac{1}{\frac{\cos \frac{B}{2}}{\sin \frac{B}{2}}}$$

$$= \frac{\sin \left(\frac{A+C}{2}\right)}{\sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{C}{2}} \times \frac{1}{\cot \frac{B}{2}}$$

$$= \frac{\sin \frac{A}{2} \cdot \cos \frac{C}{2} + \cos \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{C}{2}}{\sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{C}{2}} \times \frac{1}{\cot \frac{B}{2}}$$

$$\frac{2b}{a+c-b} = \frac{\cot \frac{A}{2} + \cot \frac{C}{2}}{\cot \frac{B}{2}}$$

164

(iii) a, b, c , என்பன கூட்டல் விருத்தியில் அமையின்,

$$b-a=c-b \Rightarrow a+c=2b$$

$$\frac{2b}{2b-b} = \frac{\cot \frac{A}{2} + \cot \frac{C}{2}}{\cot \frac{B}{2}}$$

$$2 \cot \frac{B}{2} = \cot \frac{A}{2} + \cot \frac{C}{2}$$

ஆகவே $\cot \frac{A}{2}, \cot \frac{B}{2}, \cot \frac{C}{2}$ என்பன கூட்டல் விருத்தியில் அமையும்.

உதாரணம் 19

$$\cos^{-1} x + \cos^{-1} y + \cos^{-1} z = \pi \text{ எனின்,}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1 \text{ எனக் காட்டுக.}$$

பொருத்தமான வகையில் x, y, z ஜக் தெரிவு செய்து

$$A+B+C = \pi \text{ எனின்,}$$

$$\sin^2 \frac{A}{2} + \sin^2 \frac{B}{2} + \sin^2 \frac{C}{2} + 2 \sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{B}{2} \cdot \sin \frac{C}{2} = 1$$

என்பதை உய்த்தறிக.

$A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$ என்பன உச்சிகள் வட்டத்தில் அமைந்துள்ளதும் $A_1 A_2 = A_2 A_3 = 2a; A_3 A_4 = A_4 A_5 = 2b; A_5 A_6 = A_6 A_1 = 2c$ எனும் வகையில் அமைந்துள்ள அறு கோணியாகும். இவ்வட்டத்தின் ஆரை λ என்பது $\lambda^3 - (a^2 + b^2 + c^2)\lambda - 2abc = 0$ என்பதால் தரப்படும் எனக் காட்டுக.

(1985)

165

$$\cos^{-1} x + \cos^{-1} y + \cos^{-1} z = \pi$$

$$\alpha = \cos^{-1} x, \quad \beta = \cos^{-1} y, \quad \delta = \cos^{-1} z \quad \text{எனக்.}$$

$$\cos \alpha = x, \quad \cos \beta = y, \quad \cos \delta = z; \quad 0 \leq \alpha, \beta, \delta \leq \pi$$

$$\alpha + \beta + \delta = \pi$$

$$\alpha + \beta = \pi - \delta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = -\cos \delta$$

$$\cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta = -\cos \delta$$

$$x \cdot y - \sqrt{1-x^2} \cdot \sqrt{1-y^2} = -z$$

$$(x \cdot y + z)^2 = (1-x^2)(1-y^2)$$

$$x^2 y^2 + 2xyz + z^2 = 1 - x^2 - y^2 + x^2 y^2$$

$$x^2 y^2 + z^2 + 2xyz = 1$$

$$\alpha + \beta + \delta = \pi \quad \text{ஆகும். } A + B + C = \pi$$

$$\alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{A}{2}, \quad \beta = \frac{\pi}{2} - \frac{B}{2}, \quad \delta = \frac{\pi}{2} - \frac{C}{2} \quad \text{எனக்.}$$

$$\left(\frac{\pi}{2} - \frac{A}{2}\right) + \left(\frac{\pi}{2} - \frac{B}{2}\right) + \left(\frac{\pi}{2} - \frac{C}{2}\right) = \frac{3\pi}{2} - \left(\frac{A+B+C}{2}\right)$$

$$= \frac{3\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = \pi$$

$$\cos^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \frac{A}{2}, \quad \cos^{-1} y = \frac{\pi}{2} - \frac{B}{2}, \quad \cos^{-1} z = \frac{\pi}{2} - \frac{C}{2}$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{A}{2}\right) = x, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{B}{2}\right) = y, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{C}{2}\right) = z$$

$$\sin \frac{A}{2} = x, \quad \sin \frac{B}{2} = y, \quad \sin \frac{C}{2} = z$$

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1 \quad \text{என்பதில் பிரதியிட.}$$

$$\sin^2 \frac{A}{2} + \sin^2 \frac{B}{2} + \sin^2 \frac{C}{2} + 2 \sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{B}{2} \cdot \sin \frac{C}{2} = 1 \quad \text{ஆகும்.}$$

$$4(\alpha + \beta + \gamma) = 4\pi$$

$$\alpha + \beta + \gamma = \pi \quad \text{ஆகும்.}$$

வட்டத்தின் ஆரை λ என்பது.

$$x = \cos \alpha = \frac{a}{\lambda},$$


$$y = \cos \beta = \frac{b}{\lambda}$$

$$z = \cos \gamma = \frac{c}{\lambda}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1 \quad \text{என்பதில்,}$$

$$\frac{a^2}{\lambda^2} + \frac{b^2}{\lambda^2} + \frac{c^2}{\lambda^2} + \frac{2abc}{\lambda^3} = 1$$

$$\lambda^3 - (a^2 + b^2 + c^2)\lambda - 2abc = 0 \quad \text{ஆகும்.}$$



உதாரணம் 20

வழுமையான குறிப்பிடுகளுடன் யாதுமொரு முக்கோணி ABC இல்

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \quad \text{எனக் காட்டுக.}$$

$$(i) \quad (b^2 - c^2) \cot A + (c^2 - a^2) \cot B + (a^2 - b^2) \cot C = 0$$

$$(ii) \quad a^2 + c^2 = 2b^2 \quad \text{எனின், } \cot A + \cot C = 2 \cot B \quad \text{எனக்காட்டுக.}$$

(1986)

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = k$$

$$k^2 = \frac{b^2 - c^2}{\sin^2 B - \sin^2 C}$$

$$\cot A (b^2 - c^2) = k^2 (\sin^2 B - \sin^2 C) \cot A$$

$$= \frac{k^2}{2} [(1 - \cos 2B) - (1 - \cos 2C)] \cot A$$

$$= \frac{k^2}{2} [\cos 2C - \cos 2B] \cot A$$

$$= \frac{k}{2} \cdot 2 \sin(B+C) \sin(B-C) \cdot \frac{\cos A}{\sin A}$$

$$= k^2 \sin(B-C) \cos A$$

$$(b^2 - c^2) \cot A + (c^2 - a^2) \cot B + (a^2 - b^2) \cot C$$

$$= k^2 \sin(B-C) \cos A + k^2 \sin(C-A) \cos B + k^2 \sin(A-B) \cos C$$

$$= k^2 [(\sin B \cos C - \cos B \sin A) \cos A + (\sin C \cos A - \cos C \sin A) \cos B + (\sin A \cos B - \cos A \sin B) \cos C] = 0$$

(ii) $a^2 + c^2 = 2b^2$ எனின்,

$$a^2 - b^2 = b^2 - c^2 \text{ ஆகும். மேலும் } a^2 - c^2 = 2b^2 - 2c^2 = 2(a^2 - b^2)$$

(1) இல்லிருந்து,

$$(b^2 - c^2) \cot A + (c^2 - a^2) \cot B + (a^2 - b^2) \cot C = 0$$

$$(a^2 - b^2) \cot A + (a^2 - b^2) \cot C = (a^2 - c^2) \cot B$$

$$(a^2 - b^2) (\cot A + \cot C) = 2(a^2 - b^2) \cot B$$

$$\cot A + \cot C = 2 \cot B$$

உதாரணம் 21

முக்கோணி ABC இற்குரிய வழமையான குறிப்பீடுகளைக் கொண்டு,

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \text{ என நிறுவுக.}$$

முக்கோணம் ABC யில் கோணம் A யின் உள் இரு கூறாக்கியானது, BC ஜ்

$$D$$
 இல் சந்திப்பின் $AD = \frac{2bc}{b+c} \cos \frac{A}{2}$ ஆகும் என நிறுவுக.

$c > b$ எனின், கோணம் A யின் வெளியிரு கூறாக்கியானது BC ஜ் E இல் சந்திப்பின் AE இற்குரிய இயல்பொத்த கோவையொன்றைப் பெறுக.

கோணம் DAE இன் உள்ளிரு கூறாக்கியானது, DE ஜ் X இல் சந்திப்பின்

$$AX = \frac{\sqrt{2} bc \sin A}{c \left(\cos \frac{A}{2} + \sin \frac{A}{2} \right) + b \left(\sin \frac{A}{2} - \cos \frac{A}{2} \right)} \text{ ஆகுமெனக் காட்டுக.}$$

$b = c$ எனின், AE, AX பற்றி யாது கூறமுடியும்?

(1987)


$$\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC} \text{ (உள்ளிரு கூறாக்கி)}$$

$$\frac{c}{b} = \frac{BD}{DC}$$

$$\frac{c+b}{b} = \frac{BD+DC}{DC}$$

$$\frac{b+c}{b} = \frac{BC}{DC}$$

$$DC = \frac{ab}{b+c}$$



$$\Delta ADC \text{ இல், } \frac{DC}{\sin \frac{A}{2}} = \frac{AD}{\sin C}$$

1691

$$\Delta ADC \text{ இல், } \frac{DC}{\sin \frac{A}{2}} = \frac{AD}{\sin C}$$

$$\begin{aligned} AD &= \frac{DC \cdot \sin C}{\sin \frac{A}{2}} \\ &= \frac{ab \sin C}{(b+c) \sin \frac{A}{2}} \\ &= \frac{bc \cdot \sin A}{(b+c) \sin \frac{A}{2}} \quad [a \sin C = c \sin A] \\ AD &= \frac{2bc \cdot \cos \frac{A}{2}}{(b+c)} \end{aligned} \quad (1)$$

கோணம் A இன் வெளி இருக்கிற கூறாக்கி AE ஆகும்.

$$\frac{AB}{AC} = \frac{BE}{CE}; \quad \frac{c}{b} = \frac{BE}{CE}$$

$$\frac{c}{b} - 1 = \frac{BE}{CE} - 1$$

$$\frac{c-b}{b} = \frac{BC}{CE} = \frac{a}{CE}$$

$$CE = \frac{ab}{c-b}$$

$$\Delta ACE \text{ இல், } \frac{AE}{\sin C} = \frac{CE}{\sin \left(90 - \frac{A}{2}\right)}$$

$$AE = \frac{CE \sin C}{\cos \frac{A}{2}}$$

170

$$\begin{aligned} &= \frac{ab \sin C}{(c-b) \cos \frac{A}{2}} \\ &= \frac{b c \cdot \sin A}{(c-b) \cos \frac{A}{2}} = \frac{2 b c \cdot \sin \frac{A}{2}}{(c-b)} \end{aligned} \quad (2)$$

ΔADE இல் $\angle DAE$ இன் உள்ளிரு கூறாக்கி AX ஆகும்.

முடிபு (1) இலிருந்து

$$AX = \frac{2 AD \cdot AE}{AD + AE} \cos \frac{\hat{DAE}}{2}$$

$$\begin{aligned} AX &= \frac{\frac{2bc}{c+b} \cos \frac{A}{2} \cdot \frac{2bc}{c-b} \sin \frac{A}{2}}{\frac{2bc}{c+b} \cos \frac{A}{2} + \frac{2bc \cdot \sin \frac{A}{2}}{c-b}} \cdot \cos 45^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{2bc \cdot 2bc \cdot \cos \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{A}{2}}{2bc \left[(c-b) \cos \frac{A}{2} + (c+b) \sin \frac{A}{2} \right]} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{2} bc \cdot \sin A}{c \left(\cos \frac{A}{2} + \sin \frac{A}{2} \right) + b \left(\sin \frac{A}{2} - \cos \frac{A}{2} \right)} \end{aligned}$$

$b = c$ எனின், AE, BC ஓசு சந்திக்காது. $AE \parallel BC$

$$AD \perp BC \text{ ஆகும். } AX = \sqrt{2} b \cdot \cos \frac{A}{2}$$


171

உதாரணம் 22

Δ என்பது ஒரு முக்கோணி ABC யின் பரப்பளவாகும். வழக்கமான குறிப்பிட்டுடன் $\Delta = \frac{1}{2} bc \cdot \sin A$ என நிறுவக. முக்கோணி ABC யின் கோணங்கள் A, B, C என்பவற்றின் உள்ளிரு கூறாக்கிகள் எதிர்ப்பக்கங்களை முறையே D, E, F ஆகியவற்றில் வெட்டுகின்றன. முக்கோணி ABC யின் உள்வட்டமையம் I ஆகும்.

$$AI = \frac{2 \Delta \operatorname{cosec} \frac{A}{2}}{a + b + c} \text{ எனக்காட்டுக.}$$

முக்கோணி D, E, F இன் பரப்பளவு $\frac{2 a b c \Delta}{(b+c)(c+a)(a+b)}$ எனவும் காட்டுக. (1988)



ΔABC இன் பரப்பளவு ΔABC இன் பரப்பளவு ΔABC இன் பரப்பளவு

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} AB \cdot CD & &= \frac{1}{2} AB \cdot AC & &= \frac{1}{2} AB \cdot CD \\ &= \frac{1}{2} c \cdot b \sin A & &= \frac{1}{2} c \cdot b & &= \frac{1}{2} c \cdot b \sin(\pi - A) \\ &= \frac{1}{2} bc \sin A & &= \frac{1}{2} c \cdot b \cdot \sin \frac{\pi}{2} & &= \frac{1}{2} bc \cdot \sin A = \delta \\ & & & & & \end{aligned}$$


$$\Delta ABC = \Delta AIB + \Delta BIC + \Delta CIA$$

$$\Delta = \frac{1}{2} c \cdot r + \frac{1}{2} b \cdot r + \frac{1}{2} a \cdot r$$

$$= \frac{r}{2} (a + b + c)$$

$$r = \frac{2 \Delta}{a + b + c}$$

$$AI = r \operatorname{cosec} \frac{A}{2} = \frac{2 \Delta}{a + b + c} \operatorname{cosec} \frac{A}{2}$$




$$\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$$

$$\frac{c}{b} = \frac{BD}{DC}$$

$$\frac{c+b}{b} = \frac{BD+DC}{DC} = \frac{BC}{DC} = \frac{a}{DC}$$

$$DC = \frac{ab}{c+b}$$



$$\text{இதேபோல் } CE = \frac{ba}{a+c}$$

$$\Delta DEC \text{ இன் பரப்பளவு } = \frac{1}{2} \cdot \frac{ab}{b+c} \cdot \frac{ab}{a+c} \cdot \sin C$$

$$= \frac{ab}{(a+c)(b+c)} \Delta \quad (\Delta ABC \text{ யின் பரப்பளவு})$$

$$\Delta AEF \text{ இன் பரப்பளவு } = \frac{bc}{(b+a)(c+a)} \Delta$$

$$\Delta BFD \text{ இன் பரப்பளவு} = \frac{ca}{(a+b)(b+c)} \Delta$$

$$\begin{aligned}\Delta DEF \text{ இன் பரப்பளவு} &= \Delta - \left\{ \frac{ab}{(a+c)(b+c)} + \frac{bc}{(b+a)(c+a)} + \frac{ca}{(c+b)(a+b)} \right\} \\&= \Delta \left[\frac{(a+b)(b+c)(c+a) - ab(a+b) - bc(b+c) - ca(c+a)}{(a+c)(b+c)(c+a)} \right] \\&= \Delta \left[\frac{2abc}{(a+c)(b+c)(c+a)} \right]\end{aligned}$$

உதாரணம் 23

வழிமையான குறிப்பீட்டுக்களுடன் $\cos A = \frac{b^2 + c^2 + a^2}{2bc}$ என நிறுவக.

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \text{ என உட்யத்தறிக.}$$

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{2}{b} \text{ எனின்,}$$

$$(a) \quad \frac{1}{\sin A} + \frac{1}{\sin C} = \frac{2}{\sin B} \text{ எனவும்,}$$

$$(b) \quad \frac{1}{\sin^2 \frac{A}{2}} + \frac{1}{\sin^2 \frac{C}{2}} = \frac{1}{\sin^2 \frac{B}{2}} \quad \text{எனவும் நிறுவக.}$$

(1989)

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\sin^2 A = 1 - \cos^2 A = 1 - \frac{(b^2 + c^2 - a^2)^2}{(2bc)^2}$$

174

$$\begin{aligned}&= \frac{(2bc)^2 - (b^2 + c^2 - a^2)^2}{(2bc)^2} \\&= \frac{(2bc - b^2 - c^2 + a^2)(2bc + b^2 + c^2 - a^2)}{(2bc)^2} \\&= \frac{\left[a^2 - (b - c)^2\right] \left[(b + c)^2 - a^2\right]}{4b^2 c^2} \\&= \frac{(a - b + c)(a + b - c)(b + c - a)(b + c + a)}{4b^2 c^2}\end{aligned}$$

$$\frac{a^2}{\sin^2 A} = \frac{4a^2 b^2 c^2}{(a+b+c)(a+b-c)(b+c+a)(c+a-b)}$$

இவ்வாறே, $\frac{b^2}{\sin^2 B}, \frac{c^2}{\sin^2 C}$ என்பனவும் பெறப்படும்.

$$\therefore \frac{a^2}{\sin^2 A} = \frac{b^2}{\sin^2 B} = \frac{c^2}{\sin^2 C}$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \quad [a, b, c, \sin A, \sin B, \sin C > 0]$$

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{2}{b} \text{ எனின்,}$$

$$(a) \quad \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = k \text{ எனக.}$$

$$\frac{1}{\sin A} + \frac{1}{\sin B} = \frac{k}{a} + \frac{k}{c}$$

$$= k \cdot \frac{2}{b} = 2 \cdot \frac{1}{\sin B} = \frac{2}{\sin B}$$

175

$$\cos = 1 - 2 \sin^2 \frac{A}{2}$$

$$2 \sin^2 \frac{A}{2} = 1 - \cos A$$

$$= 1 - \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$= \frac{a^2 - (b-c)^2}{2bc}$$

$$= \frac{(a-b+c)(a+b-c)}{2bc}$$

$$\sin^2 \frac{A}{2} = \frac{(a-b+c)(a+b-c)}{4bc}$$

$$\frac{1}{\sin^2 \frac{A}{2}} + \frac{1}{\sin^2 \frac{C}{2}}$$

$$= \frac{4bc}{(a-b+c)(a+b-c)} + \frac{4ab}{(c-a+b)(c+a-b)}$$

$$= \frac{4b}{(b-c+a)(b+c-a)} \left[\frac{c(c-a+b) + a(b+a-c)}{a-b+c} \right]$$

$$= \frac{8ac}{(b-c+a)(b+c-a)} \left[\frac{c\left(c-a+\frac{2ac}{c+a}\right) + a\left(a-c+\frac{2ac}{a+c}\right)}{(a+c)\left\{a+c-\frac{2ac}{a+c}\right\}} \right]$$

$$= \frac{8ac}{(b-c+a)(b+c-a)} \left[\frac{c(c-a)(c+a) + 2ac^2 + a(a-c)(a+c) + 2a^2c}{(a+c)(a^2+c^2)} \right]$$

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{2}{b}$$

$$\frac{a+c}{ac} = \frac{2}{b}$$

$$b = \frac{2ac}{a+c}$$

$$= \frac{8ac}{(b-c+a)(b+c-a)} \left[\frac{(c+a)\{c(c-a) + 2ac + a(a-c)\}}{(a+c)(a^2+c^2)} \right]$$

$$= \frac{8ac}{(b-c+a)(b+c-a)} \left[\frac{(a+c)(a^2+c^2)}{(a+c)(a^2+c^2)} \right]$$

$$= \frac{8ac}{(b-c+a)(b+c-a)} = 2 \times \frac{4ac}{(b-c+a)(b+c-a)}$$

$$= \frac{2}{\sin^2 \frac{B}{2}}$$

உதாரணம் 24

முக்கோணி ABC யின் பக்கங்கள் a, b, c உம் அரைச்சுற்றளவு s உம் குத்துயரங்கள் h_1, h_2, h_3 உம், உள்வட்ட ஆரை r உம் எனின், பின்வருவனவற்றை நிறுவுக.

$$(i) \quad \frac{1}{h_1} + \frac{1}{h_2} + \frac{1}{h_3} = \frac{1}{r}$$

$$(ii) \quad \text{கோணங்கள் } ABC \text{ என்பன } 1:2:4 \text{ என இருப்பின், } \frac{1}{a} = \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$$


$$(iii) \quad 2(PA^2 + PB^2 + PC^2) = a^2 + b^2 + c^2 + \sqrt{48s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

இங்கு P என்பது, அதில் (P யில்) முக்கோணத்தின் பக்கங்கள் 120° அமைக்குமாறு முக்கோணத்தினுள் ஒரு புள்ளியாகும்.

(1990)

- (i) முக்கோணியின் செங்குத்துமையை H
உள்வட்டமையை I எனக்.
உள்வட்ட ஆரை r .

$$\Delta AIB + \Delta BIC + \Delta AIC = \Delta ABC$$




$$\frac{1}{2} c \cdot r + \frac{1}{2} a \cdot r + \frac{1}{2} b \cdot r = \Delta ABC$$

$$\frac{\frac{1}{2} cr}{\frac{1}{2} c \cdot h_3} + \frac{\frac{1}{2} ar}{\frac{1}{2} a \cdot h_1} + \frac{\frac{1}{2} br}{\frac{1}{2} b \cdot h_2} = 1 \left[\Delta ABC = \frac{1}{2} a \cdot h = \frac{1}{2} b \cdot h_2 = \frac{1}{2} c \cdot h_3 \right]$$

$$r \left[\frac{1}{h_1} + \frac{1}{h_2} + \frac{1}{h_3} \right] = 1$$

$$\frac{1}{h_1} + \frac{1}{h_2} + \frac{1}{h_3} = \frac{1}{r}$$



$$(ii) \quad A = \frac{\pi}{7}, \quad B = \frac{2\pi}{7}, \quad C = \frac{4\pi}{7}$$

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c} = k$$

$$\frac{1}{b} + \frac{1}{c} = k \left[\frac{1}{\sin \frac{2\pi}{7}} + \frac{1}{\sin \frac{4\pi}{7}} \right]$$

$$\frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{k \cdot 2 \sin \frac{3\pi}{7} \cdot \cos \frac{\pi}{7}}{\sin \frac{2\pi}{7} \cdot \sin \frac{4\pi}{7}}$$


$$= \frac{k \cdot 2 \cos \frac{\pi}{7}}{2 \sin \frac{\pi}{7} \cdot \cos \frac{\pi}{7}} = k \cdot \frac{1}{\sin \frac{\pi}{7}} = \frac{1}{a}$$

$$\text{ஆகவേ } \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{a}$$

$$(iii) \quad a^2 = PB^2 + PC^2 - 2PB \cdot PC \cdot \cos 120^\circ$$

$$= PB^2 + PC^2 + 2PB \cdot PC \cdot \cos 60^\circ$$

$$= PB^2 + PC^2 + PB \cdot PC$$



இவ்வாறு b^2, c^2 என்பவற்றைக் கருதுவதால்,

எனவே,

$$a^2 + b^2 + c^2 = 2(PA^2 + PB^2 + PC^2) + PB \cdot PC + PC \cdot PA + PA \cdot PB$$

$$= 2(PA + PB + PC)^2 - 3(PB \cdot PC + PC \cdot PA + PA \cdot PB) \quad \dots \dots \dots (1)$$

$$2s = a + b + c$$

$$48s(s-a)(s-b)(s-c)$$

$$= 3 \times 2s \times (2s-2a)(2s-2b)(2s-2c)$$

$$= 3(a+b+c)(b+c-a)(c+a-b)(a+b-c)$$

$$= 3[(b+c)^2 - a^2][a - (b-c)][a + (b-c)]$$

$$= 3[(b+c)^2 - a^2][a^2 - (b-c)^2]$$

$$= 3 \times 2bc(1 + \cos A) \times 2bc(1 - \cos A)$$

$$= 3(2bc)^2 \cdot \sin^2 A$$

$$\sqrt{48s(s-a)(s-b)(s-c)} = \sqrt{3} \times 2bc \cdot \sin A$$

$$= \sqrt{3} \times 4 \times \frac{1}{2} bc \cdot \sin A$$

$$= 4\sqrt{3} \Delta \quad \dots \dots \dots (2)$$

$$\Delta ABC = \Delta APB + \Delta BPC + \Delta CPA$$

$$\Delta = \frac{1}{2} PA \cdot PB \cdot \sin 120^\circ + \frac{1}{2} PB \cdot PC \cdot \sin 120^\circ + \frac{1}{2} PC \cdot PA \cdot \sin 120^\circ$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} [PA \cdot PB + PB \cdot PC + PC \cdot PA]$$

$$4\sqrt{3} \Delta = 3(PA \cdot PB + PB \cdot PC + PC \cdot PA) \quad \text{---(3)}$$

(1) இலிருந்து, (2), (3) என்பவற்றையும் பிரயோகித்து,

$$2(PA + PB + PC)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 3(PA \cdot PB + PB \cdot PC + PC \cdot PA)$$

$$2(PA + PB + PC)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + \sqrt{48s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

உதாரணம் 25

முக்கோணி ABC இல் வழக்கமான குறிப்பிட்டுள்ள

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \text{ என நிறுவுக.}$$

- (i) ஒரு முக்கோணி ABC யின் C யிற்கு அப்பால் உள்ள பக்கம் AB மீது ஒரு சமபக்க முக்கோணி ABC_1 வரையப்பட்டுள்ளது. Δ என்பது முக்கோணியின் பரப்பளவெனின்,

$$CC_1^2 = \frac{1}{2} (a^2 + b^2 + c^2) + 2\sqrt{3} \Delta \text{ எனக் காட்டுக.}$$

- (ii) ABC என்னும் ஒரு முக்கோணியில் $a = 4$, $b = 3$ ஆகும்.
 A, B ஆகியவற்றினுடைன் இடையங்கள் தம்முள் செங்குத்தெனின்

$$\cos C = \frac{5}{6} \text{ எனக்காட்டுக.}$$

(1990 விசேட)


(i) $CC_1^2 = AC^2 + AC_1^2 - 2AC \cdot AC_1 \cdot \cos(A+60^\circ)$

$$= b^2 + c^2 - 2bc \cdot (\cos A \cdot \cos 60^\circ - \sin A \cdot \sin 60^\circ)$$

$$= b^2 + c^2 - bc \cdot \cos A + \sqrt{3} bc \cdot \sin A$$

$$= b^2 + c^2 - \left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2} \right) + 2\sqrt{3} \Delta$$

$$= \frac{1}{2}(b^2 + c^2 + a^2) + 2\sqrt{3} \Delta$$



(ii) ΔABC இல்,

$$\cos C = \frac{b^2 + a^2 - c^2}{2ba}$$

$$= \frac{4^2 + 3^2 - c^2}{24}$$

$$= \frac{25 - c^2}{24} \quad \text{---(1)}$$


$$AD^2 = AC^2 + CD^2 - 2AC \cdot CD \cos C$$

$$AD^2 = 9 + 4 - 2 \times 3 \times 2 \cos C$$

$$= 13 - 12 \cos C$$

$$BE^2 = 4^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 2 \times 4 \times \frac{3}{2} \cos C$$

$$= \frac{73}{4} - 12 \cos C$$



$$\begin{aligned}
 AB^2 &= AG^2 + BG^2 \\
 &= \left(\frac{2}{3}AD\right)^2 + \left(\frac{2}{3}BE\right)^2 \\
 C^2 &= \frac{4}{9} \left[(13 - 12 \cos C) + \left(\frac{73}{4} - 12 \cos C \right) \right] \\
 &= \frac{4}{9} \left[\frac{125}{4} - 24 \cos C \right] \quad \text{----- (2)}
 \end{aligned}$$

(1), (2) இலிருந்து

$$25 - 24 \cos C = \frac{125}{9} - \frac{32}{3} \cos C$$

$$225 - 216 \cos C = 125 - 96 \cos C$$

$$100 = 120 \cos C$$

$$\cos C = \frac{5}{6}$$

உதாரணம் 26

(i) வழக்கமான குறிப்பிட்டுடன் ஒரு முக்கோணி ABC இங்கு

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c} \text{ என நிறுவுக.}$$

$$a - b = k c \text{ எனின்,}$$

$$\sin\left(\frac{A-B}{2}\right) = k \cos \frac{C}{2} \text{ எனவும்,}$$

$$\frac{k \cdot \sin A}{1 - k \cdot \cos B} = \frac{a}{b} \tan\left(\frac{A-B}{2}\right) \text{ எனவும் காட்டுக.}$$

(i) கோணம் $\theta (> 0)$ என்பது $\cos \theta = \frac{2\sqrt{bc}}{b+c} \cos \frac{A}{2}$ என்னும் தொடர்பால் தரப்படுகிறது. இங்கு A, b, c என்பன முக்கோணி ABC இங்கு பிரயோகிக்கப் படுகின்றவாறு அவற்றின் வழக்கமான கருத்துக்களை உடையன.

$$a = (b+c) \sin \theta \text{ என நிறுவுக.}$$

(1991)

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

$$\frac{\sin A - \sin B}{a - b} = \frac{\sin C}{c}$$

$$\frac{c}{a - b} = \frac{\sin C}{\sin A - \sin B} = \frac{1}{k} \text{ ஆகும்.}$$

$$\sin A - \sin B = k \sin C$$

$$2 \cos\left(\frac{A+B}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{A-B}{2}\right) = 2k \cdot \sin \frac{C}{2} \cos \frac{C}{2}$$

$$\sin\left(\frac{A-B}{2}\right) = k \cdot \cos \frac{C}{2}$$

$$\frac{k \sin A}{1 - k \cdot \cos B} = \frac{\frac{a-b}{c} \cdot \sin A}{1 - \frac{a-b}{c} \cdot \cos B}$$

$$= \frac{(a-b) \sin A}{c - (a-b) \cos B}$$

$$= \frac{(a-b) \sin A}{c - a \cos B + b \cos B}$$

$$= \frac{(a-b) \sin A}{b \cos A + b \cos B}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{a-b}{b} \cdot \frac{\sin A}{\cos A + \cos B} \\
 &= \frac{\sin A - \sin B}{\sin B} \times \frac{\sin A}{\cos A + \cos B} \\
 &= \frac{\sin A}{\sin B} \times \frac{2 \cos\left(\frac{A+B}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{A-B}{2}\right)}{2 \cos\left(\frac{A+B}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{A-B}{2}\right)} \\
 &= \frac{b}{a} \cdot \tan\left(\frac{A-B}{2}\right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(ii)} \quad \cos \theta &= \frac{2\sqrt{bc}}{b+c} \cos \frac{A}{2} \\
 \sin^2 \theta &= 1 - \frac{4bc}{(b+c)^2} \cos^2 \frac{A}{2} \\
 &= \frac{b^2 + 2bc + c^2 - 4bc \cos^2 \frac{A}{2}}{(b+c)^2} \\
 &= \frac{b^2 + c^2 - 2bc \left(2 \cos^2 \frac{A}{2} - 1\right)}{(b+c)^2} \\
 &= \frac{b^2 + c^2 - 2bc \cos A}{(b+c)^2}
 \end{aligned}$$

$$(b+c)^2 \sin^2 \theta = a^2$$

$$(b+c) \sin \theta = a$$

உதாரணம் 27


வழக்கமான குறிப்பிட்டுள் $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ என்றும் குத்திரத்தைப் பெறுக.

- (i) ஒரு முக்கோணி ABC யின்து பக்கம் BC யின்து நடுப்புள்ளி D எனில்,
 $4AD^2 = a^2 + 4bc \cos A$ என நிறுவுக.
- (ii) ஒரு முக்கோணி ABC யின்து கோணம் BAC யின்து உள்ளிரு சூறாக்கி
 AX எனின், $AX = \frac{2bc \cos \frac{A}{2}}{b+c}$ ஆகுமென நிறுவுக.
- (iii) A, B, C என்பன முக்கோணி ஒன்றின் கோணங்கள் எனின்,
 $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = 1 - 2 \cos A \cos B \cos C$ ஆகுமென நிறுவுக.

(1991 விசேட)

- (i) (1) $AC^2 = AD^2 + DC^2 - 2 \cdot AC \cdot DC \cdot \cos ADC$
- (2) $AB^2 = AD^2 + DB^2 - 2 \cdot AD \cdot DB \cdot \cos ADB$

$$(1)+(2) \quad AC^2 + AB^2 = 2AD^2 + DC^2 + DB^2$$



$$b^2 + c^2 = 2AD^2 + 2 \cdot \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

$$b^2 + c^2 = 2AD^2 + \frac{a^2}{2}$$

$$4AD^2 = 2(b^2 + c^2) - a^2$$

$$= 2[a^2 + 2bccos A] - a^2$$

$$= a^2 + 4bccos A$$

$$(ii) \frac{AB}{AC} = \frac{BX}{XC}$$

$$\frac{AB + AC}{AC} = \frac{BX + XC}{XC}$$

$$\frac{c+b}{b} = \frac{a}{XC}$$

$$XC = \frac{ab}{b+c}$$

$\triangle AXC$ இல்,

$$\frac{AX}{\sin C} = \frac{XC}{\sin \frac{A}{2}}$$

$$AX = \frac{ab}{b+c} \cdot \frac{\sin C}{\sin \frac{a}{2}}$$

$$= \frac{cb}{b+c} \frac{\sin A}{\sin \frac{A}{2}} \quad [a \cdot \sin C = c \cdot \sin A]$$

$$= \frac{2bc \cdot \cos \frac{A}{2}}{b+c}$$

$$(iii) \cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C$$


$$= \frac{1 + \cos 2A}{2} + \frac{1 + \cos 2B}{2} + \cos^2 C$$

$$= 1 + \frac{1}{2} [\cos 2A + \cos 2B] + \cos^2 C$$

$$1 + \cos(A+B) \cdot \cos(A-B) + \cos^2 C$$

$$1 - \cos C [\cos(A-B) + \cos(A+B)]$$

$$1 - 2 \cos C \cdot \cos A \cdot \cos B$$



உதாரணம் 28

வழக்கமான குறிப்பிட்டுடன் யாதாயினும் ஒரு முக்கோணம் ABC இல்,

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c} \text{ என நிறுவுக.}$$

$BD : DC = m : n$ ஆகுமாறு இம்முக்கோணியின் பக்கம் BC மீதுள்ள ஒரு புள்ளி D ஆகும். $\angle BAD = \alpha$, $\angle CAD = \beta$, $\angle CDA = \theta$ எனின்,

$$(m+n)\cot \theta = mcot \alpha - ncot \beta$$

$$= ncot C - mcot C \text{ என நிறுவுக.}$$

பக்கம் AB யின் நடுப்புள்ளி F ஆகும். உச்சி A யிலிருந்து பக்கம் BC க்கு வரையப்பட்ட செங்குத்தின் அடி L ஆகும். CF உம் AL உம் P யில் இடைவெட்டுகின்றன.

$$\tan \angle APF = \frac{2 - \cot B(\cot A - \cot B)}{\cot A + \cot B} \text{ எனக்காட்டுக.}$$

(1992)

$$\frac{m}{n} = \frac{BD}{DC} ; \quad \angle ABD = \theta - \alpha,$$

$$= \frac{BD}{AD} \cdot \frac{AD}{DC} \quad \angle ACB = \pi - (\theta + \beta)$$

$$\frac{m}{n} = \frac{\sin \alpha}{\sin(\theta - \alpha)} \cdot \frac{\sin(\theta + \beta)}{\sin \beta}$$


$$\frac{m}{n} = \frac{\sin \alpha (\sin \theta \cdot \cos \beta + \cos \theta \cdot \sin \beta)}{\sin \beta (\sin \theta \cdot \cos \alpha - \cos \theta \cdot \sin \alpha)}$$

$$m \sin \beta \cdot [\sin \theta \cos \alpha - \cos \theta \sin \alpha] = n \sin \alpha \cdot [\sin \theta \cos \beta + \cos \theta \sin \beta]$$

$$\sin \theta \cdot [m \sin \beta \cos \alpha - n \sin \alpha \cos \beta] = \cos \theta \cdot \sin \alpha \cdot \sin \beta (m+n)$$

$$\frac{m \sin \beta \cdot \cos \alpha - n \sin \alpha \cdot \cos \beta}{\sin \alpha \cdot \sin \beta} = (m+n) \cot \theta$$

$$mcot \alpha - ncot \beta = (m+n) \cot \theta$$



$$\begin{aligned}
 \frac{m}{n} &= \frac{BD}{DC} = \frac{BD}{AD} \cdot \frac{AD}{DC} \\
 &= \frac{\sin(\theta-B)}{\sin B} \cdot \frac{\sin C}{\sin[\pi-(\theta+C)]} \\
 &= \frac{\sin(\theta-B)}{\sin B} \cdot \frac{\sin C}{\sin(\theta+C)} \\
 &= \frac{[\sin \theta \cdot \cos B - \cos \theta \cdot \sin B] \sin C}{[\sin \theta \cdot \cos C + \cos \theta \cdot \sin C] \sin B}
 \end{aligned}$$

$$m \sin B [\sin \theta \cdot \cos C + \cos \theta \cdot \sin C] = n \sin C [\sin \theta \cdot \cos B - \cos \theta \cdot \sin B]$$

$$\sin \theta [m \sin B \cdot \cos C - n \sin C \cdot \cos B] = -\cos \theta (m+n) \sin B \cdot \sin C$$

$$\underline{n \cot B - m \cot C = (m+n) \cot \theta}$$

$\triangle ABC$ இல், $AF = FB$

$$\angle AFC = \theta$$

$$(1+1) \cot \theta = 1 \cot B - 1 \cot A$$


$$2 \cot \theta = \cot B - \cot A \quad \text{---(1)}$$

$\triangle APF$ இல்

$$\begin{aligned}
 \angle APF &= \pi - \left[\theta + \left(\frac{\pi}{2} - B \right) \right] \\
 &= \frac{\pi}{2} - (\theta - B)
 \end{aligned}$$

$$\tan APF = \tan \left[\frac{\pi}{2} - (\theta - B) \right]$$

$$= \cot(\theta - B) = \frac{1 + \tan \theta \cdot \tan B}{\tan \theta - \tan B}$$



$$\tan APF = \frac{\cot \theta + \tan B}{1 - \cot \theta \cdot \tan B} \quad \text{---(2)}$$

(1) இல்லை.

$$\begin{aligned}
 \tan APF &= \frac{\frac{\cot B - \cot A}{2} + \tan B}{1 - \frac{(\cot B - \cot A)}{2} \cdot \tan B} \\
 &= \frac{\frac{\cot B - \cot A}{2} + \frac{1}{\cot B}}{1 - \frac{(\cot B - \cot A)}{2} \cdot \frac{1}{\cot B}} \\
 &= \frac{2 + \cot B(\cot B - \cot A)}{\cot B + \cot A} \\
 &= \frac{2 - \cot B(\cot A - \cot B)}{\cot B + \cot A}
 \end{aligned}$$

உதாரணம் 29

(a) வழக்கையான குறிப்பிடுவதை, ஒரு முக்கோணி ABC இன் பரப்பளவு Δ ஆனது,

$$\Delta = \frac{1}{2} bc \cdot \sin A \quad \text{என்பதாற் தரப்படுகிறது என நிறுவக. அதோடு}$$

$$\frac{\Delta}{\tan \frac{A}{2}} + \Delta \tan \frac{A}{2} = bc \quad \text{எனவும், } \frac{\Delta}{\tan \frac{A}{2}} + s = b + c \quad \text{எனவும் நிறுவக.}$$

$$\text{இங்கு } 2s = a + b + c$$

(b) ஒரு முக்கோணி ABC யிற்கு,

$$\tan \angle AOH = \frac{\sin 2B - \sin 2C}{1 + \cos 2B + \cos 2C} \quad \text{என நிறுவக.}$$

இங்கு O, H என்பன முறையே முக்கோணியின் சுற்றுமையம், நிமிர்ணமையம் என்பனவாகும்.

(1994)

$$(a) \Delta = \frac{1}{2} bc \cdot \sin A$$

$$= \frac{\Delta}{\tan \frac{A}{2}} + \Delta \cdot \tan \frac{A}{2}$$

$$= \frac{1}{2} bc \cdot \sin A \cdot \frac{1}{\tan \frac{A}{2}} + \frac{1}{2} bc \cdot \sin A \cdot \tan \frac{A}{2}$$

$$= \frac{1}{2} bc \cdot \sin A \left(\frac{\cos \frac{A}{2}}{\sin \frac{A}{2}} + \frac{\sin \frac{A}{2}}{\cos \frac{A}{2}} \right)$$

$$= \frac{1}{2} bc \times 2 \cdot \sin \frac{A}{2} \cdot \cos \frac{A}{2} \times \frac{1}{\sin \frac{A}{2} \cdot \cos \frac{A}{2}} = bc$$

$$\frac{\Delta}{\tan \frac{A}{2}} + s = \frac{\frac{1}{2} bc \cdot \sin A}{\frac{1}{2} (a+b+c)} \cdot \frac{\cos \frac{A}{2}}{\sin \frac{A}{2}} + \left(\frac{a+b+c}{2} \right)$$

$$= \frac{2bc}{(a+b+c)} \cos^2 \frac{A}{2} + \frac{a+b+c}{2}$$

$$= \frac{bc}{a+b+c} [1 + \cos A] + \frac{a+b+c}{2}$$

$$= \frac{bc}{a+b+c} \left[1 + \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \right] + \frac{a+b+c}{2}$$

$$= \frac{bc}{a+b+c} \left[\frac{(b+c)^2 - a^2}{2bc} \right] + \frac{a+b+c}{2}$$

$$= \frac{bc}{a+b+c} \times \frac{(b+c+a)(b+c-a)}{2bc} + \frac{a+b+c}{2}$$

$$= \frac{b+c-a}{2} + \frac{a+b+c}{2} = b+c$$

(b) ΔAHB இல், $\angle HAB = 90^\circ - B$

$\angle ABH = 90^\circ - A$

ஆகவே, $\angle AHB = (A + B)$


$$\frac{AH}{\sin (90^\circ - A)} = \frac{AB}{\sin (A+B)}$$

$$AH = \frac{c \cdot \cos A}{\sin C} \quad \dots \dots \dots (1)$$

O சுற்றுவட்ட மையம். ஆகவே $OA = OB = OC$

$$BX = \frac{1}{2} BC = \frac{1}{2} a$$

$$OB = \frac{a}{2 \sin A} = OA \quad \dots \dots \dots (2)$$



$$\angle HAO = (90^\circ - B) - (90^\circ - C) = (C - B)$$

$\angle AOH = \theta$ என்க.

$$\therefore \angle AHO = 180^\circ - (C - B + \theta)$$

$$\Delta AOH \text{ இல், } \frac{AH}{\sin \theta} = \frac{OA}{\sin(C-B+\theta)} \quad \dots \dots \dots (3)$$

$$(1),(2) \text{ இலிருந்து, } \frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C} \text{ என்பதால்,}$$

$$AH = \frac{c}{\sin C} \cos C = \frac{a}{\sin A} \cos A$$

$$OA = \frac{a}{2 \sin A}$$

$$(3) \Rightarrow \frac{a \cdot \cos A}{\sin A \sin \theta} = \frac{a}{2 \sin A} \cdot \frac{1}{\sin(C - B + \theta)}$$

$$\frac{\cos A}{\sin \theta} = \frac{1}{2 \sin(C - B + \theta)}$$

$$\sin \theta = 2 \cos A [\sin(C - B) \cos \theta + \cos(C - B) \sin \theta]$$

$$\sin \theta [1 - 2 \cos A \cdot \cos(C - B)] = 2 \cos A \cdot \sin(C - B) \cdot \cos \theta$$

$$\tan \theta [1 - 2 \cos A \cdot \cos(C - B)] = 2 \cos A \cdot \sin(C - B)$$

$$\tan \theta [1 + 2 \cos(B + C) \cdot \cos(C - B)] = -2 \cos(B + C) \cdot \sin(C - B)$$

$$\tan \theta [1 + \cos 2B + \cos 2C] = \sin 2B - \sin 2C$$

$$\tan \theta = \frac{\sin 2B - \sin 2C}{1 + \cos 2B + \cos 2C}$$

உதாரணம் 30

(i) வழக்கமான குறிப்பிட்டுடன் யாதாயினும் ஒரு முக்கோணி ABC இல்,

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c} \text{ எனக்காட்டுக.$$

$$ABC \text{ எனுமொரு முக்கோணியில் } C = \frac{\pi}{2} + A \text{ ஆயிருக்க, மிகச்சிறிய கோணம்}$$

A ஆகவும், மிகப்பெரிய கோணம் C ஆகவும் உள்ளன. பொது வித்தியாசம் d ஆகவுள்ள கூட்டல் விருத்தியில் a, b, c உள்ளன.

$$\sin A = \frac{a}{[2a^2 + 4ad + 4d^2]^{\frac{1}{2}}} \text{ எனக் காட்டி,}$$

192

$\cos A$ இங்கும் $\cos 2A$ இந்குமான ஒத்த கோவைகளைப் பெறுக.

$$\frac{a}{d} = \sqrt{7} - 1 \text{ என்பதை உய்த்தறிக்.}$$

(ii) ABC ஒரு முக்கோணி. O, H என்பன முறையே அதன் சுற்றுமையமும், நிமிர் மையமும் ஆகும். கோடு OH ஆனது BC யுடன்

$$\tan^{-1} \left(\frac{3 - \tan B \tan C}{\tan B - \tan C} \right) \text{ எனும் கோணத்தில் சாய்ந்துள்ளதெனக் காட்டுக.}$$

(1995)

(i) ΔABC இல் மிகச்சிறிய கோணம் $A = A$

$$\text{மிகப் பெரிய கோணம் } \frac{\pi}{2} + A = C$$

$$\text{ஆகவே } B = \frac{\pi}{2} - 2A$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \text{ என்பதில்}$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin \left(\frac{\pi}{2} - 2A \right)} = \frac{c}{\sin \left(\frac{\pi}{2} + A \right)}$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\cos 2A} = \frac{c}{\cos A}$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\cos A} \Rightarrow \frac{a^2}{\sin^2 A} = \frac{c^2}{\cos^2 A} = \frac{a^2 + c^2}{1}$$

$$\sin^2 A = \frac{a^2}{a^2 + c^2}, \cos^2 A = \frac{c^2}{a^2 + c^2}$$

$$c = a + 2d \text{ என்பதால்}$$

193

$$\sin^2 A = \frac{a^2}{a^2 + (a+2d)^2}$$

$$= \frac{a^2}{2a^2 + 4ad + 4d^2}$$

$$0 < A < \frac{\pi}{2} \text{ என்பதால்}$$

$$\sin A = \frac{a}{[2a^2 + 4ad + 4d^2]^{1/2}} \text{ ஆகும். } \quad (1)$$

$$\cos^2 A = \frac{(a+2d)^2}{2a^2 + 4ad + 4d^2}$$

$$0 < A < \frac{\pi}{2} \text{ என்பதால், } \cos A = \frac{a+2d}{[2a^2 + 4ad + 4d^2]^{1/2}} \quad (2)$$

$$(1) \text{ இலிடுந்து } \frac{a}{\sin A} = [2a^2 + 4ad + 4d^2]^{1/2}$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\cos 2A} = \frac{c}{\cos A} = [2a^2 + 4ad + 4d^2]^{1/2}$$

$$\cos 2A = \frac{b}{[2a^2 + 4ad + 4d^2]^{1/2}} = \frac{a+d}{[2a^2 + 4ad + 4d^2]^{1/2}} \quad (3)$$

$$\cos 2A = 1 - 2 \sin^2 A$$

$$\frac{a+d}{[2a^2 + 4ad + 4d^2]^{1/2}} = 1 - 2 \times \frac{a^2}{2a^2 + 4ad + 4d^2}$$

$$a+d = \frac{4ad + 4d^2}{[2a^2 + 4ad + 4d^2]^{1/2}} = \frac{4d(a+d)}{[2a^2 + 4ad + 4d^2]^{1/2}}$$

$$2a^2 + 4ad + 4d^2 = 16d^2$$

$$2a^2 + 4ad - 12d^2 = 0$$

$$a^2 + 2ad - 6d^2 = 0$$

$$\left(\frac{a}{d}\right)^2 + 2\left(\frac{a}{d}\right) - 6 = 0$$

$$\frac{a}{d} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 24}}{2}$$

$$\frac{a}{d} = \frac{-1 \pm \sqrt{7}}{2}$$


$$a, d > 0. \text{ எனவே } \frac{a}{d} = \frac{\sqrt{7}-1}{2}$$

(ii) ΔABD இல்,

$$BD = c \cdot \cos B$$

$$HD = \frac{c \cdot \cos B}{\tan C}$$

$$HL = HD - LD$$



$$= HD - OX = \frac{c \cdot \cos B}{\tan C} - \frac{a}{2 \tan A}$$

$$= \frac{c}{\sin C} \cdot \cos B \cdot \cos C - \frac{a \cdot \cos A}{2 \sin A} \quad (1)$$

$$OL = BX - BD = \frac{a}{2} - c \cdot \cos B$$

$$\angle LOH = \theta \text{ எனின்,}$$

$$\tan \theta = \frac{HL}{LO} = \frac{\frac{c \cdot \cos B \cdot \cos C}{\sin C} - \frac{a \cdot \cos A}{2 \sin A}}{\frac{a}{2} - c \cdot \cos B}$$

$$\begin{aligned} \left[\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C} \right] &= \frac{\frac{a}{2 \sin A} [2 \cos B \cdot \cos C - \cos A]}{\frac{a}{2 \sin A} [\sin A - 2 \sin C \cdot \cos B]} \\ &= \frac{2 \cos B \cdot \cos C + \cos(B+C)}{\sin(B+C) - 2 \sin C \cdot \cos B} \\ &= \frac{3 \cos B \cdot \cos C - \sin B \cdot \sin C}{\sin B \cos C - \cos B \sin C} \\ &= \frac{3 - \tan B \cdot \tan C}{\tan B - \tan C} \end{aligned}$$

உதாரணம் 31

(i) முக்கோணி தொடர்பான சென் விதியைக் குறிப்பிடுக.

வழக்கமான குறிப்பிடுடன் யாதாயினும் ஒரு முக்கோணி ABC இல்,

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \text{ என நிறுவுக.}$$

$$\frac{\sin(B-C)}{\sin A} = \frac{b^2 - c^2}{a^2} \text{ எனக்காட்டுக.}$$

(ii) ABC எனும் முக்கோணியின் கோணங்களின் இருக்குறாக்கிகள் இடைவெட்டும் புள்ளி I உம், பக்கங்களின் இருக்குறாக்கிகள் இடைவெட்டும் புள்ளி O உம் ஆகும். A ஒரு கூர்ங்கோணம் எனின், BC இற்கு IO இன் சாய்வு

$$\tan^{-1} \left| \frac{\cos B + \cos C - 1}{\sin B - \sin C} \right| \text{ எனக்காட்டுக.}$$

(1996)

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad \frac{a}{\sin A} &= \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \\ \frac{a^2}{\sin^2 A} &= \frac{b^2}{\sin^2 B} = \frac{c^2}{\sin^2 C} = \frac{b^2 - c^2}{\sin^2 B - \sin^2 C} \\ \frac{a^2}{\sin^2 A} &= \frac{b^2 - c^2}{\sin^2 B - \sin^2 C} \\ \frac{b^2 - c^2}{a^2} &= \frac{\sin^2 B - \sin^2 C}{\sin^2 A} = \frac{(1 - \cos 2B) - (1 - \cos 2C)}{2 \sin^2 A} \\ &= \frac{\cos 2C - \cos 2B}{2 \sin^2 A} \\ &= \frac{2 \sin(B+C) \cdot \sin(B-C)}{2 \sin^2 A} \\ &= \frac{\sin(B-C)}{\sin A} \end{aligned}$$

I – உள்வட்ட மையம்,

O – சுற்றுவட்ட மையம்


$$BM = MC = \frac{1}{2}a$$

$$IL = r$$

$$BL + LC = BC$$

$$r \cot \frac{B}{2} + r \cot \frac{C}{2} = a$$

$$r \left(\cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2} \right) = a$$



$$r = \frac{a}{\cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2}}, \quad OM = \frac{a}{2} \cot A$$

197

கோணம் $ION = \theta$ என்க.

$$\tan \theta = \frac{IN}{ON} = \frac{r - \frac{a}{2} \cot A}{\frac{a}{2} - r \cot \frac{B}{2}}$$

$$= \frac{2r - a \cot A}{a - 2r \cot \frac{B}{2}}$$

$$= \frac{2 - \frac{a}{r} \cot A}{\frac{a}{r} - 2 \cot \frac{B}{2}}$$

$$= \frac{2 - \left(\cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2} \right) \cot A}{\cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2} - 2 \cot \frac{B}{2}}$$

$$= \frac{2 - \left(\cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2} \right) \cot A}{\left(\cot \frac{C}{2} - \cot \frac{B}{2} \right)}$$

$$= \frac{2 \sin \frac{B}{2} \cdot \sin \frac{C}{2} + \sin \left(\frac{B+C}{2} \right) \cdot \frac{\cos(B+C)}{\sin(B+C)}}{\sin \left(\frac{B-C}{2} \right)}$$

$$= \frac{\cos \left(\frac{B-C}{2} \right) - \cos \left(\frac{B+C}{2} \right) + \cos(B+C) \cdot \frac{1}{2 \cos \left(\frac{B+C}{2} \right)}}{\sin \left(\frac{B-C}{2} \right)}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{2 \cos \left(\frac{B+C}{2} \right) \cos \left(\frac{B-C}{2} \right) - 2 \cos^2 \left(\frac{B+C}{2} \right) + \cos(B+C)}{2 \sin \left(\frac{B-C}{2} \right) \cos \left(\frac{B+C}{2} \right)} \\ &= \frac{\cos B + \cos C - 1}{\sin B - \sin C} \\ \theta &= \tan^{-1} \left[\frac{\cos B + \cos C - 1}{\sin B - \sin C} \right] \end{aligned}$$

உதாரணம் 32

வழக்கமான குறிப்பிட்டுள்ள யாதாயினும் ஒரு முக்கோணி ABC இற்கு

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c} \text{ என நிறுவுக.}$$

$$(i) \quad \frac{b^2 - c^2}{a^2} \sin 2A + \frac{c^2 - a^2}{b^2} \sin 2B + \frac{a^2 - b^2}{c^2} \sin 2C = 0 \text{ எனக்காட்டுக.}$$

- (ii) முக்கோணி ABC இன் நியிர்மையம் P ஆகும். AP, BP, CP ஆகியன முக்கோணியின் எதிர்ப்பக்கங்களை முறையே K, L, M ஆகியவற்றில் சந்திக்கின்றன. முக்கோணி KLM இலே $\angle MKL = 180^\circ - 2A$ எனவும், $LM = a \cos A$ எனவும் காட்டுக.

(1997)

$$(i) \quad \frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

$$\frac{\sin^2 A}{a^2} = \frac{\sin^2 B}{b^2} = \frac{\sin^2 C}{c^2}$$

$$\frac{\sin^2 A}{a^2} = \frac{\sin^2 B - \sin^2 C}{b^2 - c^2}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{b^2 - c^2}{a^2} &= \frac{\sin^2 B - \sin^2 C}{\sin^2 A} \\
 &= \frac{(1 - \cos 2B) - (1 - \cos 2C)}{2 \sin^2 A} \\
 &= \frac{\cos 2C - \cos 2B}{2 \sin^2 A} \\
 \frac{b^2 - c^2}{a^2} \cdot \sin 2A &= \frac{2 \sin(B+C) \cdot \sin(B-C)}{2 \cdot \sin^2 A} \cdot \sin 2A \\
 &= \frac{\sin(B-C)}{\sin A} \cdot 2 \sin A \cos A \\
 &= 2 \sin(B-C) \cdot \cos A \\
 \frac{b^2 - c^2}{a^2} \sin 2A + \frac{c^2 - a^2}{b^2} \sin 2B + \frac{a^2 - b^2}{c^2} \sin 2C \\
 &= 2[\sin(B-C)\cos A + \sin(C-A)\cos B + \sin(A-B)\cos C] \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

(ii) நாற்பக்கல் $ACKM$ ஜக்கருதுக.

$$\angle AMC = 90^\circ = \angle AKC$$

எனவே $ACKM$ வட்ட நாற்பக்கல்

$$\text{ஆகவே } \angle BKM = \angle LAM = A$$

இதேபோல் $ALKB$ வட்ட நாற்பக்கல்.

$$\angle LKC = \angle BAL = A$$


$$\therefore \angle MKL = 180^\circ - 2A$$

$$\triangle ABL \text{ இல், } \angle ALB = 90^\circ$$

$$AL = AB \cos A = c \cdot \cos A$$

$\triangle AML$ இல்,

$$\begin{aligned}
 \frac{AL}{\sin \angle AML} &= \frac{ML}{\sin A} \\
 \frac{c \cdot \cos A}{\sin C} &= \frac{ML}{\sin A} \\
 ML &= \frac{(c \sin A) \cos A}{\sin C} \\
 &= \frac{c}{\sin A} \cdot \sin A \cdot \cos A \\
 &= \frac{a}{\sin A} \cdot \sin A \cdot \cos A = a \cos A
 \end{aligned}$$



உதாரணம் 33

(a) $\tan^{-1}\left(\frac{5}{12}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{7}{17}\right) = \frac{\pi}{4}$ எனக் காட்டுக.

(b) $\cos x + \cos 3x = \sin 2x + \sin 4x$ ஐத் தீர்க்க.

(c) $\cos 3\theta \equiv \cos \theta (2 \cos 2\theta - 1)$ எனக் காட்டுக.

இதிலிருந்து $\alpha = \frac{2\pi}{41}$ ஆக இருக்கும்போது

$$(2 \cos 11\alpha - 1)(2 \cos 17\alpha - 1)(2 \cos 31\alpha - 1)(2 \cos 33\alpha - 1) = 1 \text{ எனக்காட்டுக.}$$

(1999)

$$A = \tan^{-1}\left(\frac{5}{12}\right), \quad B = \tan^{-1}\left(\frac{7}{17}\right) \text{ எனக்.}$$

$$\tan A = \frac{5}{12}, \quad \tan B = \frac{7}{17}, \quad 0 < A, B < \frac{\pi}{4} \text{ ஆகும்.}$$

$$\tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \cdot \tan B}$$

$$= \frac{\frac{5}{12} + \frac{7}{17}}{1 - \frac{5}{12} \times \frac{7}{17}}$$

$$= \frac{169}{169} = 1$$

$$0 < A + B < \frac{\pi}{2}$$

என்பதால்,

$$A + B = \frac{\pi}{4}$$

$$(b) \cos x + \cos 3x = \sin 2x + \sin 4x$$

$$2\cos 2x \cdot \cos x = 2\sin 3x \cdot \cos x$$

$$\cos x (\cos 2x - \sin 3x) = 0$$

$$\cos x = 0 \quad \text{அல்லது} \quad \cos 2x - \sin 3x = 0$$

$$\cos x = \cos \frac{\pi}{2}$$

$$\cos 2x = \cos \left(\frac{\pi}{2} - 3x \right)$$

$$x = 2n\pi \pm \frac{\pi}{2}$$

$$2x = 2n\pi \pm \left(\frac{\pi}{2} - 3x \right)$$

n - நிறையெண்

$$2x = 2n\pi + \left(\frac{\pi}{2} - 3x \right)$$

$$2x = 2n\pi - \left(\frac{\pi}{2} - 3x \right)$$

$$x = \frac{1}{5} \left[2n\pi + \frac{\pi}{2} \right]$$

$$x = -2n\pi + \frac{\pi}{2}$$

$$x = 2m\pi + \frac{\pi}{2}$$

m - நிறையெண்

$$(c) \cos 3\theta = \cos(2\theta + \theta)$$

$$= \cos 2\theta \cdot \cos \theta - \sin 2\theta \cdot \sin \theta$$

$$= \cos 2\theta \cdot \cos \theta - 2\cos \theta \cdot \sin^2 \theta$$

$$= \cos \theta [\cos 2\theta - 2\sin^2 \theta]$$

$$= \cos \theta [\cos 2\theta - (1 - \cos 2\theta)]$$

$$= \cos \theta (2\cos 2\theta - 1)$$

$$2\cos 2\theta - 1 = \frac{\cos 3\theta}{\cos \theta}$$

$$(2\cos 11\alpha - 1)(2\cos 17\alpha - 1)(2\cos 31\alpha - 1)(2\cos 33\alpha - 1)$$

$$= \frac{\cos \frac{33\alpha}{2}}{\cos \frac{11\alpha}{2}} \cdot \frac{\cos \frac{51\alpha}{2}}{\cos \frac{17\alpha}{2}} \cdot \frac{\cos \frac{93\alpha}{2}}{\cos \frac{31\alpha}{2}} \cdot \frac{\cos \frac{99\alpha}{2}}{\cos \frac{33\alpha}{2}}$$

$$= \frac{\cos \frac{51\alpha}{2} \cdot \cos \frac{93\alpha}{2} \cdot \cos \frac{99\alpha}{2}}{\cos \frac{11\alpha}{2} \cdot \cos \frac{17\alpha}{2} \cdot \cos \frac{31\alpha}{2}}$$

$$\alpha = \frac{\pi}{41}$$

எனின்,

$$= \frac{\cos \frac{51\pi}{41} \cdot \cos \frac{93\pi}{41} \cdot \cos \frac{99\pi}{41}}{\cos \frac{11\pi}{41} \cdot \cos \frac{17\pi}{41} \cdot \cos \frac{31\pi}{41}}$$

$$= \frac{\left(-\cos \frac{10\pi}{41} \right) \cdot \cos \frac{11\pi}{41} \cdot \cos \frac{17\pi}{41}}{\cos \frac{11\pi}{41} \cdot \cos \frac{17\pi}{41} \cdot \left(-\cos \frac{10\pi}{41} \right)} = 1$$

உதாரணம் 34

(i) $x \sec \theta = 1 - y \tan \theta$

$$x^2 \sec^2 \theta = 5 + y^2 \tan^2 \theta \text{ எனின்,}$$

x, y இற்கிடையே θ ஜ சாராது தொடர்பு ஒன்றினைப் பெறுக.

(ii) $\cos(\alpha + \beta) \sin(\gamma + \delta) = \cos(\alpha - \beta) \cdot \sin(\gamma - \delta)$ எனின்,

$$\cot \alpha \cdot \cot \beta \cdot \cot \gamma = \cot \delta \text{ எனக்காட்டுக்.}$$

(iii) $\frac{ax}{\cos \theta} + \frac{by}{\sin \theta} = a^2 - b^2$

$$\frac{ax \sin \theta}{\cos^2 \theta} - \frac{by \cos \theta}{\sin^2 \theta} = 0 \text{ எனின்,}$$

$$(ax)^{\frac{2}{3}} + (by)^{\frac{2}{3}} = (a^2 - b^2)^{\frac{2}{3}} \text{ எனக்காட்டுக்.}$$

(i) $x \sec \theta = 1 - y \tan \theta; \quad x^2 \sec^2 \theta = 5 + y^2 \tan^2 \theta$

$$x \sec \theta + y \tan \theta = 1 \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

$$x^2 \sec^2 \theta - y^2 \tan^2 \theta = 5 \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

$$(2) \div (1) \Rightarrow x \sec \theta - y \tan \theta = 5 \quad \dots \dots \dots \quad (3)$$

$$(1) + (3), \quad 2x \sec \theta = 6$$

$$x \sec \theta = 3 \quad \dots \dots \dots \quad (4)$$

$$(1) - (3), \quad 2y \tan \theta = -4$$

$$y \tan \theta = -2 \quad \dots \dots \dots \quad (5)$$

(4) இலிருந்து, $\sec \theta = \frac{3}{x}$

(5) இலிருந்து, $\tan \theta = \frac{-2}{y}$

$$\sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1$$

$$\left(\frac{3}{x}\right)^2 - \left(\frac{-2}{y}\right)^2 = 1; \quad \frac{9}{x^2} - \frac{4}{y^2} = 1$$

204

(ii) $\cos(\alpha + \beta) \sin(\gamma + \delta) = \cos(\alpha - \beta) \sin(\gamma - \delta)$

$$\frac{\cos(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha - \beta)} = \frac{\sin(\gamma - \delta)}{\sin(\gamma + \delta)} \Rightarrow$$

$$\frac{\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)}{\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)} = \frac{\sin(\gamma - \delta) + \sin(\gamma + \delta)}{\sin(\gamma - \delta) - \sin(\gamma + \delta)}$$

$$\frac{2 \cos \alpha \cdot \cos \beta}{-2 \sin \alpha \cdot \sin \beta} = \frac{2 \sin \gamma \cdot \cos \delta}{-2 \cos \gamma \cdot \sin \delta}$$

$$\cot \alpha \cdot \cot \beta = \tan \gamma \cdot \cot \delta$$

$$\cot \alpha \cdot \cot \beta \cdot \cot \gamma = \cot \delta$$

(iii) $\frac{ax}{\cos \theta} + \frac{by}{\sin \theta} = a^2 - b^2 \quad \dots \dots \dots \quad (1)$

$$\frac{ax}{\cos^3 \theta} = \frac{by}{\sin^3 \theta} = k \text{ எனக்.} \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

(2) இலிருந்து (1) இல் பிரதியிட,

$$k \cos^2 \theta + k \sin^2 \theta = a^2 - b^2$$

$$k = a^2 - b^2 \quad \dots \dots \dots \quad (3)$$

(2), (3) இலிருந்து,

$$\frac{ax}{\cos^3 \theta} = \frac{by}{\sin^3 \theta} = a^2 - b^2$$

$$\frac{(ax)^{\frac{2}{3}}}{(\cos^3 \theta)^{\frac{2}{3}}} = \frac{(by)^{\frac{2}{3}}}{(\sin^3 \theta)^{\frac{2}{3}}} = (a^2 - b^2)^{\frac{2}{3}}$$

$$\Rightarrow \frac{(ax)^{\frac{2}{3}} + (by)^{\frac{2}{3}}}{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = (a^2 - b^2)^{\frac{2}{3}}$$

$$(ax)^{\frac{2}{3}} + (by)^{\frac{2}{3}} = (a^2 - b^2)^{\frac{2}{3}}$$

205

உதாரணம் 35

- (a) A, B, C என்பன முக்கோணி ஒன்றின் கோணங்களாக இருக்கும்போது
 $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = 1 - 2 \cos A \cos B \cos C$ என நிறுவக.

(b) $2A + B = \frac{\pi}{4}$ எனில்,

$$\tan B = \frac{1 - 2 \tan A - \tan^2 A}{1 + 2 \tan A - \tan^2 A} \quad \text{எனக் காட்டுக...}$$

சமன்பாடு $x^2 + 2x - 1 = 0$ இன் ஒரு மூலம் $\tan \frac{\pi}{8}$ என்பதையும் அதன் பெறுமானம் $\sqrt{2} - 1$ என்பதையும் உய்த்தறிக்.

$\tan \theta$ அதன் மற்ற மூலம் எனில் $(0, \pi)$ என்னும் வீச்சில் θ ஜுக் காண்க.

(1993)

(a) $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} [2 \cos^2 A + 2 \cos^2 B + 2 \cos^2 C] \\ &= \frac{1}{2} [1 + \cos 2A + 1 + \cos 2B + 2 \cos^2 C] \\ &= \frac{1}{2} [2 + 2 \cos(A+B) \cdot \cos(A-B) + 2 \cos^2 C] \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} [2 - 2 \cos C \cdot \cos(A-B) + 2 \cos^2 C]$$

$$= 1 - \cos C [\cos(A-B) + \cos(A+B)]$$

$$= 1 - \cos C \cdot 2 \cos A \cdot \cos B$$

$$= 1 - 2 \cos A \cdot \cos B \cdot \cos C$$

(b) $2A + B = \frac{\pi}{4}$

$$B = \frac{\pi}{4} - 2A$$

$$\tan B = \tan \left(\frac{\pi}{4} - 2A \right)$$

$$\tan B = \frac{\tan \frac{\pi}{4} - \tan 2A}{1 + \tan \frac{\pi}{4} \cdot \tan 2A}$$

$$\tan B = \frac{1 - \tan 2A}{1 + \tan 2A}$$

$$\tan B = \frac{1 - \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}}{1 + \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}}$$

$$\tan B = \frac{1 - 2 \tan A - \tan^2 A}{1 + 2 \tan A - \tan^2 A}$$

$$A = \frac{\pi}{8} \quad \text{எனின்,} \quad B = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = 0 \Rightarrow \tan B = 0$$

$$\therefore \tan A (= \tan \frac{\pi}{8}) = x \quad \text{எனக்.}$$

$$1 - 2x - x^2 = 0$$

$$x^2 + 2x - 1 = 0$$

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{8}}{2}$$

$$x = -1 \pm \sqrt{2}$$

$$0 < \tan \frac{\pi}{8} < 1 \text{ என்பதால்}$$

$$\tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1 \quad \text{ஆகும்.}$$

மூலங்களின் பெருக்குத்தொகை -1 ஆகும்.

$$\tan \theta \cdot \tan \frac{\pi}{8} = -1$$

$$\Rightarrow \tan \theta = -\cot \frac{\pi}{8} = \tan \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{8} \right) = \tan \frac{5\pi}{8}$$

$$\therefore \theta = \frac{5\pi}{8}$$

உதாரணம் 36

(a) $n \in \mathbb{Z}, \theta \neq n\pi$ அல்லது $2n\pi - \frac{\pi}{2}$ இற்கு,

$$\frac{1 + \cos \theta + \sin \theta}{1 - \cos \theta + \sin \theta} = \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta} \text{ எனக் காட்டுக.}$$

(b) எல்லா மெய் x இற்கும் $8(\cos^6 x + \sin^6 x) = 5 + 3 \cos 4x$ எனக் காட்டுக.

இதிலிருந்து அல்லது வேறுவிதமாக $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ இற்கு

$y = \cos^6 x + \sin^6 x$ இன் வரைபைப் பரும்படியாக வரைக.

$$-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{இனுள்ளே சமன்பாடு } \cos^6 x + \sin^6 x = k \text{ யிற்கு}$$

- (i) தீவுகள் இல்லாதிருப்பதற்கு
- (ii) இருதீவுகள் மாத்திரம் இருப்பதற்கு
- (iii) மூன்று தீவுகள் மாத்திரம் இருப்பதற்கு
- (iv) நான்கு தீவுகள் மாத்திரம் இருப்பதற்கு

k இன் பெறுமானத்தை அல்லது பெறுமானங்களின் வீச்சை உய்த்தறிக.

(2000)

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad & \frac{1 + \cos \theta + \sin \theta}{1 - \cos \theta + \sin \theta} = \frac{1 + \sin \theta + \cos \theta}{1 + \sin \theta - \cos \theta} \\
 & = \frac{[(1 + \sin \theta) + \cos \theta]^2}{(1 + \sin \theta)^2 - \cos^2 \theta} \\
 & = \frac{(1 + \sin \theta)^2 + 2 \cos \theta (1 + \sin \theta) + \cos^2 \theta}{2 \sin \theta (1 + \sin \theta)} \\
 & = 2(1 + \sin \theta) + 2 \cos \theta (1 + \sin \theta) \\
 & = \frac{2(1 + \sin \theta)(1 + \cos \theta)}{2 \sin \theta (1 + \sin \theta)} \\
 & = \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(b)} \quad & 8(\cos^6 x + \sin^6 x) \\
 & = 8[(\cos^2 x + \sin^2 x)(\cos^4 x - \cos^2 x \sin^2 x + \sin^4 x)] \\
 & = 8[\cos^4 x - \cos^2 x \sin^2 x + \sin^4 x] \\
 & = 8[(\cos^2 x + \sin^2 x)^2 - 3 \cos^2 x \sin^2 x] \\
 & = 8 - 24 \cos^2 x \cdot \sin^2 x \\
 & = 8 - 6 \sin^2 2x \\
 & = 8 - 3(1 - \cos 4x) = 5 + 3 \cos 4x
 \end{aligned}$$

$$y = \cos^6 x + \sin^6 x = \frac{5}{8} + \frac{3}{8} \cos 4x \quad \left[-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \right]$$


$$y \text{ ன் உயர்வுப் பெறுமானம் } = \frac{5}{8} + \frac{3}{8} = 1$$

$$\cos 4x = 1 \Rightarrow x = -\frac{\pi}{2}, 0, \frac{\pi}{2}$$

$$y \text{ ன் இழிவுப் பெறுமானம் } = \frac{5}{8} - \frac{3}{8} = \frac{1}{4}$$

$$\cos 4x = -1 \Rightarrow x = -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}$$

$$y = \frac{5}{8} \text{ எனின், } \cos 4x = 0 \Rightarrow -\frac{\pi}{8}, -\frac{3\pi}{8}, \frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8}$$



(i) $k < \frac{1}{4}$ அல்லது $k > 1$ எனின், தீர்வு இல்லை.

(ii) $k = \frac{1}{4}$ எனின், இரு தீர்வுகள் உண்டு.

(iii) $k = 1$ எனின், முன்று தீர்வுகள் உண்டு.

(iv) $\frac{1}{4} < k < 1$ எனின், நான்கு தீர்வுகள் உண்டு.

[$y = k$ என்னும் கோடு x அச்சிற்கு சமாந்தரமாகும்.

$y = k$ என்னும் கோடு $y = \cos^6 x + \sin^6 x$ எனும் வளையியை வெட்டும் புள்ளிகளைக் கருதுக.]

உதாரணம் 37

(a) $0 \leq x \leq 2\pi$ யிற்கு $4\sin^2 x + 12\sin x \cos x - \cos^2 x + 5 = 0$ ஜத் தீர்க்க.

(b) முக்கோணிக்கு சைன் நெறியையும், கோசைன் நெறியையும் எடுத்துரைக்க.

$$\frac{b+c}{2k-1} = \frac{c+a}{2k} = \frac{a+b}{2k+1} \text{ எனத் தரப்பட்டுள்ளது; இங்கு}$$

k ஆனது 2 இலும் பெரியதும் ஆனால் 4 இற்குச் சமமாக இல்லாததுமான தரப்பட்ட ஒரு நிறைவெண் ஆகும். a,b,c என்பன வழக்கமான குறிப்பீடில் ஒரு முக்கோணி ABC யின் பக்கங்கள் ஆகும்.

$$\frac{\sin A}{k+1} = \frac{\sin B}{k} = \frac{\sin C}{k-1} \text{ எனக் காட்டுக.}$$

அதோடு $\cos A$ ஜ k யின் சார்பில் பெற்று

$$\frac{\cos A}{(k-4)(k+1)} = \frac{\cos B}{k^2+2} = \frac{\cos C}{(k+4)(k-1)} \text{ எனக் காட்டுக.}$$

இங்கு A,B,C வழக்கமான கருத்துக்களை உடையன.

(2000)

$$4\sin^2 x + 12\sin x \cos x - \cos^2 x + 5 = 0$$

$$2(1 - \cos 2x) + 6\sin 2x - \left(\frac{1 + \cos 2x}{2}\right) + 5 = 0$$

$$12\sin 2x - 5\cos 2x + 13 = 0$$

$$5\cos 2x - 12\sin 2x = 13$$

$$\frac{5}{13}\cos 2x - \frac{12}{13}\sin 2x = \frac{13}{13}$$

$$\cos \alpha \cdot \cos 2x - \sin \alpha \cdot \sin 2x = 1 \quad \left[\cos \alpha = \frac{5}{13}, \sin \alpha = \frac{12}{13} \right]$$

(1), (2), (3) இல்லாது.

$$\cos(2x + \alpha) = 1$$

$$2x + \alpha = 2n\pi \quad n - நிறையெண்$$

$$x = n\pi - \frac{\alpha}{2} \quad n - நிறையெண்$$

$\pi - \frac{\alpha}{2}, 2\pi - \frac{\alpha}{2}$ என்பன 0 இற்கும் 2π இற்குமிடையில் இரு தீர்வுகளாகும்.

(b) சென் விதி : $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$

கோசென் விதி : $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

$$\frac{b+c}{2k-1} = \frac{c+a}{2k} = \frac{a+b}{2k+1}$$

$$\Rightarrow \frac{b+c}{2k-1} = \frac{c+a}{2k} = \frac{a+b}{2k+1} = \frac{2(a+b+c)}{6k} = \frac{a+b+c}{3k}$$

$$(1) \quad \frac{b+c}{2k-1} = \frac{a+b+c}{3k} \Rightarrow \frac{b-c}{2k-1} = \frac{(a+b+c)-(b+c)}{3k-(2k-1)} = \frac{a}{k+1}$$

$$(2) \quad \frac{c+a}{2k} = \frac{a+b+c}{3k} \Rightarrow \frac{c+a}{2k} = \frac{b}{k}$$

$$(3) \quad \frac{a+b}{2k+1} = \frac{a+b+c}{3k} \Rightarrow \frac{a+b}{2k+1} = \frac{c}{k-1}$$

$$\frac{a}{k+1} = \frac{b}{k} = \frac{c}{k-1} \quad \dots \dots \dots \quad (4)$$

$$\text{ஆனால் } \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = \lambda \quad \text{எனக்} \quad \dots \dots \dots \quad (5)$$

(4), (5) இல்லாது $\frac{\sin A}{k+1} = \frac{\sin B}{k} = \frac{\sin C}{k-1}$ ஆகும்.

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{k^2 + (k-1)^2 - (k+1)^2}{2k(k-1)} = \frac{k-4}{2(k-1)} \quad \dots \dots \dots \quad (6)$$

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{(k+1)^2 + (k-1)^2 - k^2}{2(k+1)(k-1)} = \frac{k^2 + 2}{2(k+1)(k-1)} \quad \dots \dots \dots \quad (7)$$

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{(k+1)^2 + k^2 - (k-1)^2}{2k(k+1)} = \frac{k+4}{2(k+1)} \quad \dots \dots \dots \quad (8)$$

(6), (7), (8) இல்லாது.

$$\frac{\cos A}{(k-4)(k+1)} = \frac{\cos B}{k^2+2} = \frac{\cos C}{(k+4)(k-1)} = \left(\frac{1}{2(k^2-1)} \right) \text{ ஆகும்.}$$

பலவினப் பயிற்சி

1. $\cos\theta + \sin\theta = \sqrt{2} \cos\theta$ எனின்,

$$\cos\theta - \sin\theta = \sqrt{2} \sin\theta$$
 எனக்காட்டுக.

2. $x\cos\theta - y\sin\theta = a, x\sin\theta + y\cos\theta = b$ எனின்,

θ ஓச் சாராது x, y, a, b இற்கிடையே தொடர்பு ஒன்றைக் காண்க.

3. $\frac{1}{\tan 3A - \tan A} - \frac{1}{\cot 3A - \cot A} = \cot 2A$ என நிறுவுக.

4. $2\tan B + \cot B = \tan A$ எனின்,

$$\cot B = 2\tan(A - B)$$
 என நிறுவுக.

5. $a\sin\theta = b\cos\theta = c\cdot\tan 2\theta$ எனின்,

$$(a^2 - b^2)^2 = 4c^2(a^2 + b^2)$$
 எனக் காட்டுக.

6. (a) $\sin\alpha(1 + \tan\alpha) + \cos\alpha(1 + \cot\alpha) = \sec\alpha + \operatorname{cosec}\alpha$ என நிறுவுக.

(b) $A + B + C = \frac{\pi}{2}$ எனின்,

$$\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C - 1 = 2\sin A \cdot \sin B \cdot \sin C$$
 என நிறுவுக.

7. (a) $(1 + \operatorname{cosec} A + \cot A)(1 - \sec A + \tan A) = 2$ என நிறுவுக.

(b) $\sin^2 10^\circ + \sin^2 50^\circ + \sin^2 70^\circ = \frac{3}{2}$ என நிறுவுக.

8. $\sin 2\alpha \cdot \sin 2\beta = \sin^2(\alpha + \beta) - \sin^2(\alpha - \beta)$ என நிறுவுக. இதிலிருந்து $\sin^2 105^\circ - \sin^2 15^\circ$ இன் பெறுமானத்தைக் காண்க.

9. $\sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$ என நிறுவுக. இதிலிருந்து $\cos 3\theta$ இன் பெறுமானத்தை உய்த்தறிக.

$$\cos^3\theta \cdot \cos 3\theta + \sin^3\theta \cdot \sin 3\theta = \cos^3 2\theta$$
 என நிறுவுக.

10. (a) $\tan 2\theta + 2\cot\theta = \tan 2\theta \cdot \cot^2\theta$ என நிறுவுக.

(b) $3\tan\theta - \sec\theta = 1$ எனின், $3\tan\theta + \sec\theta$ இன் சாத்தியமான பெறுமானங்களைக் காண்க.

11. (a) $\sec x = \sqrt{2} \sec y$

$\cot y = \sqrt{3} \cot x$ ஆகிய ஒருங்கமை சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க.
(பொதுத் தீர்வைக் காண்க)

(b) $\sin\left(\frac{\pi}{2}\sin\theta\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)$ இன் பொதுத் தீர்வினை எழுதுக.

12. $\tan 3\theta, \tan 4\theta$ என்பவற்றை $\tan\theta$ இல் தருக.

$\tan 3\theta + \tan 4\theta = 0$ என்னும் சமன்பாட்டின் மூலங்களைக் கருதுவதன் மூலம் $\tan^2 \frac{\pi}{7}, \tan^2 \frac{2\pi}{7}, \tan^2 \frac{3\pi}{7}$ என்பவற்றை மூலங்களாகக் கொண்ட சமன்பாட்டைப் பெறுக.

இதிலிருந்து, $\tan \frac{\pi}{7} \cdot \tan \frac{2\pi}{7} \cdot \tan \frac{3\pi}{7}$

$$\tan^4 \frac{\pi}{7} + \tan^4 \frac{2\pi}{7} + \tan^4 \frac{3\pi}{7}$$
 என்பவற்றின் பெறுமானங்களை உய்த்தறிக.

13. (a) யாதேனும் ஒரு முக்கோணி ABC இல்,

(i) $a \cos\left(\frac{B-C}{2}\right) = (b+c) \cos\left(\frac{B+C}{2}\right)$

(ii) $(b+c) \tan\left(\frac{B-C}{2}\right) = (b-c) \tan\left(\frac{B+C}{2}\right)$

(iii) $\tan\left(\frac{A-B}{2}\right) = \frac{a-b}{a+b} \cot \frac{C}{2}$ என நிறுவுக.

(b) முக்கோணி ABC இல் $\angle C > \angle B$ ஆகும். D என்பது BC யின் நடுப்புள்ளியாகும். E என்பது A யிலிருந்து BC க்கு வரையப்பட்ட செங்குத்தின் அடியாகும்.

$$DE = \frac{1}{2} a \cdot \sin(C - B) \csc A \text{ என நிறுவுக.}$$

14. வழக்கமான குறிப்பீடுகளைக் கொண்டு, முக்கோணி ABC யில் $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$ என நிறுவுக.

P ஐயும் Q வையும் மையங்களாகவும் p, q ($p \neq q$) என்பவற்றை முறையே ஆரைகளாகவும் கொண்ட இரு ஒரு தள வட்டங்கள் X இலும் Y இலும் இடைவெட்டுகின்றன. கோணம் $PXQ = \alpha$ ஆகவும், வட்டத்தின் இரு பொதுத் தொடலிகளும் ஒன்றுடனொன்று அமைக்கும் கோணம் θ ஆகவும் இருப்பின் $(p-q)^2 \cot^2 \frac{\theta}{2} = 4pq \sin^2 \frac{\alpha}{2}$ என நிறுவுக.

இரு வட்டங்களும் நிமிர்கோணமாக இடைவெட்டினால் $\cos \theta$ இன் பெறுமானம்

$$\frac{6pq - (p^2 + q^2)}{(p+q)^2} \quad \text{எனக் காட்டுக.}$$

15. (i) $\cos 3\theta = 4\cos^3 \theta - 3\cos \theta$ என நிறுவுக. $\theta = 18^\circ$ எனின், $\cos 3\theta = \sin 2\theta$ என்றும் $\sin 18^\circ$ என்பது $4x^2 + 2x - 1 = 0$ என்றும் சமன்பாட்டின் ஒரு மூலம் என்றும் நிறுவுக.

இதிலிருந்து $\sin 18^\circ, \cos 18^\circ$ என்பவற்றின் பெறுமானங்களைக் கணிக்க.

(ii) $t = \tan \frac{\theta}{2}$ எனின், $\cos \theta = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \sin \theta = \frac{2t}{1+t^2}$ என நிறுவுக.

$c \leq \sqrt{a^2 + b^2}$ எனின், $a\cos \theta + b\sin \theta = c$ என்றும் சமன்பாட்டை மேலெழுத்தாக பிரதிபிட்டைக் கொண்டு எவ்வாறு தீர்க்கலாம் எனக்காட்டுக.

$\theta = \alpha, \theta = \beta$ என்பன இச்சமன்பாட்டின் தீர்வுகள் எனின், $\tan \frac{\alpha}{2} \cdot \tan \frac{\beta}{2} = \frac{c-a}{c+a}$. எனக் காட்டி,

$$\frac{\cos \left(\frac{\alpha-\beta}{2} \right)}{\cos \left(\frac{\alpha+\beta}{2} \right)} = \frac{c}{a} \quad \text{என்பதை உய்த்தறிக.}$$

(1984)

16. பின்வரும் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க.

- (i) $39 \cos x + 52 \sin x = 60$
(ii) $\sin 3x - 2 \sin x = 4 \cos^2 x - 3$
(iii) $\cos x - \cos 2x = \frac{1}{2}$

(1990 விசேட)

17. பின்வரும் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க.

- (i) $5 \cos \theta + 12 \sin \theta = \frac{13}{2}$
(ii) $\tan x + \tan 2x + \tan 3x = 0$

$$(iii) \tan^{-1} \left(\frac{y-1}{y-2} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{y+1}{y+2} \right) = \frac{\pi}{4}$$

(1991)

யாதாயிலும் ஒரு முக்கோணி ABC யில் பின்வருவனவற்றை நிறுவுக

18. $\frac{a \sin(B-C)}{b^2 - c^2} = \frac{b \sin(C-A)}{c^2 - a^2} = \frac{c \sin(A-B)}{a^2 - b^2}$

19. $a \cdot \sin \frac{A}{2} \cdot \sin \left(\frac{B-C}{2} \right) + b \cdot \sin \frac{B}{2} \cdot \sin \left(\frac{C-A}{2} \right) + c \cdot \sin \frac{C}{2} \cdot \sin \left(\frac{A-B}{2} \right) = 0$

20. $a^2(\cos^2 B - \cos^2 C) + b^2(\cos^2 C - \cos^2 A) + c^2(\cos^2 A - \cos^2 B) = 0$

21. $\frac{b^2 - c^2}{a^2} \cdot \sin 2A + \frac{c^2 - a^2}{b^2} \cdot \sin 2B + \frac{a^2 - b^2}{c^2} \cdot \sin 2C = 0$

22. $\frac{(a+b+c)^2}{a^2 + b^2 + c^2} = \frac{\cot \frac{A}{2} + \cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2}}{\cot A + \cot B + \cot C}$

23. ABC யாதுமொரு முக்கோணி. ட யாதுமொரு கோணம் எனின்,
 $b \cos \theta = c \cdot \cos(A-\theta) + a \cos(C+\theta)$ என நிறுவுக.

24. யாதுமொரு முக்கோணி ABC யில், $\tan \frac{A}{2} = \frac{5}{6}$, $\tan \frac{B}{2} = \frac{20}{37}$. எனின்,
 $\tan \frac{C}{2}$ ஜக்கண்டு, $a+c=2b$ என நிறுவுக.

25. $(b^2 - c^2)\cot A + (c^2 - a^2)\cot B + (a^2 - b^2)\cot C = 0$
 என நிறுவுக.

26. A, B என்னும் இரு கோணங்கள் $A+B=\alpha$, $A-B=0$ ஆகுமாறு

அமைந்துள்ளன. $\frac{\tan A}{\tan B} = \lambda$ எனின்,

$\sin \theta = \frac{\lambda-1}{\lambda+1} \sin \alpha$ எனக் காட்டுக.

27. யாதுமொரு முக்கோணி ABC யில்

$\frac{a-b}{c} = \frac{\tan \frac{A}{2} - \tan \frac{B}{2}}{\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2}}$, $\frac{a+b}{c} = \frac{1 + \tan \frac{A}{2} \cdot \tan \frac{B}{2}}{1 - \tan \frac{A}{2} \cdot \tan \frac{B}{2}}$ என நிறுவுக.

28. $\sin \theta = k \sin(A-\theta)$ எனின்,

$\tan \left(\theta - \frac{A}{2} \right) = \frac{k-1}{k+1} \tan \frac{A}{2}$ எனக் காட்டுக.

29. $\tan \theta + \tan \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right) + \tan \left(\theta + \frac{2\pi}{3} \right)$ என்பதை $\tan 3\theta$ இன் வகையிற் கூறுக.

இதிலிருந்து $\tan \theta + \tan \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right) + \tan \left(\theta + \frac{2\pi}{3} \right) = 3$ என்னும் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

30. முக்கோணம் ABC இல் $\tan \frac{A}{2}, \tan \frac{B}{2}, \tan \frac{C}{2}$ என்பவை கூட்டல் விருத்தியில் உள்ளன எனின், $\cos A, \cos B, \cos C$ என்பனவும் கூட்டல் விருத்தியில் உள்ளன என நிறுவுக.

31. யாதுமொரு முக்கோணி ABC இல்,

$(b^2 - c^2)\cot A + (c^2 - a^2)\cot B + (a^2 - b^2)\cot C = 0$ என நிறுவுக.

32. (a) A, B, C என்பன முக்கோணி ஒன்றின் கோணங்களாக இருக்கும்போது $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = 1 - 2 \cos A \cdot \cos B \cdot \cos C$ என நிறுவுக.

(b) $2A+B = \frac{\pi}{4}$ எனின்,

$\tan B = \frac{1-2\tan A - \tan^2 A}{1+2\tan A - \tan^2 A}$ எனக் காட்டுக.

சமன்பாடு $x^2 + 2x - 1 = 0$ இன் ஒரு மூலம் $\tan \frac{\pi}{8}$ என்பதையும்

அதன் பெறுமானம் $\sqrt{2} - 1$ என்பதையும் உய்த்தறிக.

$\tan \theta$ என்பது அதன் மற்ற மூலம் எனின், $(0, \pi)$ என்னும் வீச்சில் ட வைக் காண்க.

33. a, b, h என்பன மெய்யெண்களாக இருக்க,

$$f(x) = a \cos^2 x + 2h \sin x \cos x + b \sin^2 x \quad \text{என் பதை} \quad \cos 2x, \sin 2x$$

ஆகியவற்றின் சார்பில் எடுத்துரைக்க.

$f(x)$ இங்கு $A + B \sin(2x + \alpha)$ என்னும் வடிவத்திலுள்ள கோவை ஒன்றை உய்த்தறிக். இங்கு $A, B, \alpha (0 \leq \alpha < 2\pi)$ என்பன துணியப்படவேண்டிய மாறிலிகள். இதிலிருந்து $f(x)$ இன் உயர்வுப் பெறுமானத்தையும், இழிவுப் பெறுமானத்தையும் $2\pi - \alpha \leq x \leq 2\pi + \alpha$ இல் மேலே பெற்ற பெறுமானங்களுக்கு நேரொத்த x இன் பெறுமானங்களையும் பெறுக.

$$a = 3, b = 1, h = \sqrt{3} \quad \text{ஆக இருக்கும்போது}$$

$$x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] \quad \text{இல் } f(x) \text{ இன் வரைபை வரைக.}$$

(1997)

34. (a) வழக்கமான குறிப்பீடில் ஒரு முக்கோணிக்கு “சென்” நெறியைக் கூறி நிறுவுக. அதே குறிப்பீடில்

$$(i) \frac{a+b}{c} = \frac{\cos\left(\frac{A-B}{2}\right)}{\sin\frac{C}{2}}$$

$$(ii) \frac{a-b}{c} = \frac{\sin\left(\frac{A-B}{2}\right)}{\cos\frac{C}{2}} \quad \text{என நிறுவுக.}$$

ஒரு முக்கோணிக்கு “கோசென் நெறியை” உய்த்தறிக்.

(b) $A + B + C = \pi$ எனின்,

$$\frac{\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C}{\sin A + \sin B + \sin C} = 8 \sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{B}{2} \cdot \sin \frac{C}{2} \quad \text{என நிறுவுக.}$$

(1998)

35. (a) x இற்குத் தீர்க்க.

$$(i) \cos x + \sqrt{2} \cos 3x + \cos 7x = 0$$

$$(ii) \tan^{-1}(2x) - \tan^{-1}(x) = \cot^{-1}(4 - 4x^2)$$

(b) x_1, x_2 என்பன α ஒரு மாறிலியாக உள்ள சமன்பாடு $2 \sin x \cdot \sin(x + \alpha) = 1$ இன் ஒரு வேறு வேறான மூலங்கள் எனின், ஒன்றில் $x_1 + x_2 = \alpha$ அல்லது $x_2 - x_1 = \alpha$ ஆனது π யின் ஒரு மடங்காகும் எனக் காட்டுக.

(1998)

36. முக்கோணி ABC இன் உள்வட்ட மையம் I ஆகவும், முக்கோணிகள் IBC, ICA, IAB என்பவற்றின் சுற்றுவட்டமையங்கள் X, Y, Z ஆகவுமிருப்பின்

(i) A, B, C, X, Y, Z என்பன ஒரு வட்டப் புள்ளிகள் எனவும்,

(ii) கோணம் $YXZ = \frac{\pi - A}{2}$ எனவும்,

(iii) $\frac{\text{முக்கோணி } XYZ \text{ இன் பரப்பு}}{\text{முக்கோணி } ABC \text{ இன் பரப்பு}} = \frac{1}{8 \cos \frac{A}{2} \cdot \operatorname{cosec} \frac{B}{2} \cdot \operatorname{cosec} \frac{C}{2}}$
எனவும் நிறுவுக.

விடைகள்

பயிற்சி 1

1. (a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (b) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ (c) $-\frac{2}{\sqrt{3}}$ (d) -1 (e) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ (f) 1
2. (a) $\frac{1}{2}$ (b) $-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ (c) 1

பயிற்சி 4 (a)

1. $\theta = n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{3}$ 2. $n\pi - (-1)^n \frac{\pi}{3}$ 3. $\theta = 2n\pi \pm \frac{5\pi}{6}$
4. $\theta = 2n\pi \pm \frac{\pi}{6}$ 5. $\theta = n\pi \pm \frac{\pi}{6}$ 6. $\theta = n\pi \pm \frac{\pi}{4}$
7. $\theta = n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{3}$ 8. $\theta = 2n\pi \pm , \theta = \frac{2n\pi}{9}$
9. $\theta = \left(n + \frac{1}{2}\right) \frac{\pi}{9}$ 10. $\theta = (4n+1) \frac{\pi}{10}, \theta = 2n\pi - \frac{\pi}{2}$
11. $x = 2n\pi + \frac{\pi}{2}, n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{6}$ 12. $n\pi + \frac{\pi}{4}$
27. $x = 2n\pi + \frac{\pi}{3};$ 28. $x = 2n\pi + \frac{\pi}{2}, 2n\pi$
29. $x = 2n\pi + \frac{2\pi}{3}$ 30. $n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{6}; n\pi - (-1)^n - \sin^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$
31. $(2n+1) \frac{\pi}{2}; (4n+1) \frac{\pi}{10}$ 32. (i) $\left\{\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{3\pi}{2}\right\}$

(ii) $\{45^\circ, 60^\circ, 135^\circ, 225^\circ, 300^\circ, 315^\circ\}$ (iii) $\{-45^\circ, 135^\circ\}$

33. $(4n+1) \frac{\pi}{6}$ 34. $(2n+1) \frac{\pi}{3}$ 35. $n\pi - \frac{\pi}{4}; \frac{n\pi}{2} + (-1)^n \frac{\pi}{2}$

4 (b)

1. $A = (4n+1) \frac{\pi}{2} \pm (B+C)$ 2. $A = (4n-1) \frac{\pi}{2} \pm (B+C)$
3. $\theta = \frac{2n\pi}{3} \pm \alpha; \cos \alpha, \cos\left(\frac{2\pi}{3} + \alpha\right), \cos\left(\frac{4\pi}{3} + \alpha\right)$
4. $\theta = \frac{n\pi}{3} + (-1)^n \alpha; \sin \alpha, \sin\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right), \sin\left(\frac{4\pi}{3} + \alpha\right)$
5. $n\pi - \frac{\pi}{4}, n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{12}$ 6. $(4n+1) \frac{\pi}{16}$
11. (a) $\frac{2k}{\pi}; k = 2; \frac{\pi}{4}(2n+1), n\pi, (2n+1) \frac{\pi}{2}$
 $k = \frac{1}{2}; (2n+1)\pi, 4n\pi, (4n+2)\pi$

(b) $\{7.5^\circ, 45^\circ, 97.5^\circ\}, \{17.5^\circ, 107.5^\circ, 145^\circ\}$

12. $\frac{-63}{65}, \frac{56}{33}, \frac{1}{8}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$

13. (i) $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ$ (ii) $45^\circ, 161^\circ, 34', 225^\circ, 341^\circ, 34'$
 (iii) $(2n+1) \frac{\pi}{2}, 2n\pi + \frac{\pi}{6}, 2n\pi + \frac{5\pi}{6}$

14. (i) $\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}, \frac{17\pi}{12}$

(ii) $\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{8}, \frac{9\pi}{8}, \frac{3\pi}{2}, \frac{13\pi}{8}$

15. $\tan \theta = \left(\frac{1+k}{1-k} \right) \tan \alpha; 120^\circ, 300^\circ$

17. (ii) $-(2 + \sqrt{3}), 2 - \sqrt{3}$

18. $n\pi, \frac{2}{3}n\pi; 70^\circ, 190^\circ, 330^\circ, 310^\circ$

19. $n\pi + \frac{\pi}{2}, \frac{4}{3}n\pi \pm \frac{\pi}{3}, \frac{2}{5}n\pi$

20. $0^\circ, 30^\circ, 60^\circ, 120^\circ, 150^\circ, 180^\circ$

21. (i) $x = y = 60^\circ$

(ii) $n\pi, (4n-1)\frac{\pi}{4}, (8n+1)\frac{\pi}{8}, (8n-1)\frac{\pi}{24}$

22. $-120^\circ, -90^\circ, -60^\circ, 0, 60^\circ, 90^\circ, 120^\circ$

23. $n\pi, 2n\pi \pm \frac{\pi}{3}, 2n\pi \pm \frac{2\pi}{3}$

$(6n \pm 1) + \frac{3}{\pi} \tan^{-1} \frac{5}{12}$

$\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, 0.67^\circ, 2.47^\circ$

24. (i) $n\pi, 2n\pi \pm \frac{\pi}{6}$

(ii) $199.5^\circ, 340.5^\circ$

(iii) $90^\circ, 210^\circ, 330^\circ$

(iv) $60^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ, 300^\circ$

25. $4x^2 + y^2 - 2\sqrt{3}xy = 4; \frac{1}{2n+1}, \frac{2n^2-1}{2n^2+4n+1}$

26. $18^\circ, 30^\circ, 90^\circ, 150^\circ, 162^\circ$

28. $\frac{\sqrt{2}}{10}$

29. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

30. $2n\pi$ அல்லது $\left(\frac{2n}{3} + \frac{1}{2}\right)\pi$

31. $n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{6}$ அல்லது $n\pi + (d-1)^n \frac{\pi}{10}$ அல்லது $n\pi - (-1)^n \frac{3\pi}{10}$

32. $\left(n + \frac{1}{2}\right) \frac{\pi}{8}$ அல்லது $\left(n + \frac{1}{2}\right) \frac{\pi}{2}$

33. $k\pi$ அல்லது $\frac{1}{n-1} \left[k\pi - (-1)^k \frac{\pi}{6} \right]$

34. $k\pi$ அல்லது $\frac{k\pi}{n-1}$ அல்லது $\left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\pi}{n}$

35. $2n\pi + \frac{\pi}{2}$ அல்லது $2n\pi - \frac{\pi}{3}$ 36. $n\pi + \frac{\pi}{4}$ 37. $n\pi + \frac{\pi}{4}$

38. $\theta = \frac{n\pi}{3}$ அல்லது $\theta = n\pi \pm \tan^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$ 39. $\left(n + \frac{1}{3}\right) \frac{\pi}{3}$

40. $A = \left(m + \frac{n}{2}\right)\pi \pm \frac{\pi}{6} + (-1)^n \frac{\pi}{12}; B = \left(m - \frac{n}{2}\right)\pi \pm \frac{\pi}{6} - (-1)^n \frac{\pi}{12}$

41. $A = \frac{1}{5} \left[(6m-4n)\pi \pm \frac{\pi}{2} \pm \frac{2\pi}{3} \right]; B = \left[(6n-4m)\pi \pm \pi \pm \frac{\pi}{3} \right]$

42. $\tan \theta = \frac{2n+1 \pm \sqrt{4n^2+4n-15}}{4}$ இங்கு $n \leq -3$ அல்லது $n \geq 2$

பிளை திருத்தம்

உச்சம்	வரி	வினா இல	பிளை	திருத்தம்
11.	3	-	$\theta^\circ + 360^\circ - \theta$	$\theta^\circ, 360^\circ - \theta^\circ$
23.	12	8	$\cos^4 A + \sin^4 A$	$\cos^4 A + \sin^4 A$
		13	$(\cos A - \sin A)$	$(\cos A + \sin A)$
25.	-	43	$b \cos \theta - a \sin \theta = C.$	$b \cos \theta - a \sin \theta = c.$
30.	9	ஏ + 1	$\cos(60^\circ + 45^\circ)$	$\sin(60^\circ + 45^\circ)$
33.	3	-	$\tan A + \tan B + \tan C - \tan A \tan B - \tan C.$	$\tan A + \tan B + \tan C - \tan A \tan B \tan C.$
கணக்கி				
	வரி	-	$= \tan 3A \tan A \tan A$	$= \tan 3A \tan 2A \tan A$
40.	12	-	$\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{3+1}}{2\sqrt{2}}$	$\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{3+1}}{2\sqrt{2}}$
42.	11		$= \frac{1}{8} [\cos 80^\circ + 2 \cos 100^\circ + \cos 60^\circ]$	$= \frac{1}{8} [\cos 80^\circ + \cos 100^\circ + \cos 60^\circ]$
43.	-	8	$= \theta$	$= 0.$
		14	$\tan A - \tan B = a$	$\tan A - \tan B = b.$
46.	7	-	2 (b)	2 (c)
49.	10	-	$\cos 3A = 4 \cos^3 A - 3 \cos A$	$\cos 3A = 4 \cos^3 A - 3 \cos A.$
56.	-	6	$\frac{1}{1-\tan x} + \frac{1}{1+\tan x}$	$\frac{1}{1-\tan x} + \frac{1}{1+\tan x}$

நேர்வு	வரி	வினா இல	பிழை	திருத்தம்
58.	-	26 44	$\tan A + \cot A = 2 \operatorname{cosec} A$ $= \sin^2(n+1)A - \sin^2(n-1)A$	$\tan A + \cot A = 2 \operatorname{cosec} 2A$ $\sin^2(n+1)A - \sin^2 nA$
59.	-	46 46 53	$\cos = \frac{11}{61}$ கோணங்கள் ஆகியன எனக்கொண்டு என்பவற்றின் கோணங்கள் α, β $\cos^2\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right)$	$\cos \alpha = \frac{11}{61}$ கோணங்கள் α, β ஆகியன கூர்ந்து கோணங்கள் எனக் கொண்டு $\cos^2\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right)$
70.	17	-	n ஒற்றை எனின்	n . இரட்டை எனின்
88.	-	21	$\cos 3x - 4 \cos 2x + 2 \cos 2x - 2 = 0$	$\cos 3x - 4 \cos 2x + 2 \cos x - 2 = 0$
98.	1	-	$\tan^{-1}(\operatorname{cosec} \cdot \tan^{-1} x)$ $- \tan \cot^{-1} x$	$\operatorname{cosec}(\tan^{-1} x)$ $- \cot(\tan^{-1} x)$
108.	-	<u>$a+ib$</u>		
	4(i)		$= 1 - 2 \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \cdot \frac{C}{2}$	$= 1 - 2 \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$
187.	6	<u>$a+ib$</u> 28	$= n \cot C - m \cot C$	$= n \cot B - m \cot C$
212.	11		(1) $\Rightarrow \frac{b-c}{2k-1}$	$\Rightarrow \frac{b+c}{2k-1}$

சாயி கல்வி வெளியீடுகள்

க.பொ.த உயர்தரம்

புதிய பாடத்திட்டத்திற்குரியவை

(ஆண்டு 2000 உம் அதற்குப் பின்னரும்)

- 1.உயிரியல் பகுதி -1
- 2.உயிரியல் பகுதி - 1(B) உயிரினப் பன்மை (அச்சில்)
- 3.உயிரியல் பகுதி - 2(A) தொழிற்படும் விலங்கு
- 4.உயிரியல் பகுதி - 2(B) தொழிற்படும் விலங்கு
- 5.உயிரியல் பகுதி - 3(A) தொழிற்படும் தாவரம் பகுதி I
- 6.உயிரியல் பகுதி - 3(B) தொழிற்படும் தாவரம் பகுதி II
- 7.உயிரியல் பகுதி - 4(A) உயிரின் தொடர்ச்சி
- 8.உயிரியல் பகுதி - 4(B) மனிதனும் குழலும் + பிரயோக உயிரியல்
- 9.சேதன இரசாயனம் - பரீட்சை வழிகாட்டி
- 10.பிரயோக கணிதம் - நிலையியல் பயிற்சிகள்
- 11.பிரயோக கணிதம் - இயக்கவியல் பகுதி I
- 12.பிரயோக கணிதம் - இயக்கவியல் பயிற்சிகள் பகுதி II
- 13.பிரயோக கணிதம் - நிகழ்தகவும் புள்ளிவிபரவியலும்
- 14.இணைந்த கணிதம் - நுண்கணிதம்
- 15.இணைந்த கணிதம் - அட்சர கணிதம்
- 16.இணைந்த கணிதம் - திரிகோணகணிதம்
- 17.இணைந்த கணிதம் - ஆள்கூற்று கேத்திரகணிதம் (அச்சில்)

SAI EDUCATIONAL PUBLICATION .

36/4B, PAMANKADA ROAD, COLOMBO - 06, SRILANKA.