

PHARMACOPŒIA OF INDIA

BY

EDWARD JOHN WARING M. D.

TRANSLATED

BY


DANIEL W. CHAPMAN

MEDICAL PRACTITIONER,

REVISED BY THE LATE

SAMUEL F. GREEN, M. D.

JAFFNA:



Printed for the American Ceylon Mission.

Strong and Asbury Printers.

1888.

முகவுரை.

இந்நூலின் கையெழுத்துப்பிரதியொன்று, சில வருஷங்களுக்கு முன்னமே அமரிக தேசத்திற் போயிருந்த கிறீன் வைத்தியரிடம் அனுப்பப்பட்டது. அவர் அங்கே சீவனோடிருந்த காலத்தில் அதைத் தாமே வாசித்துத் திருத்தி அப் பிரதியைத் தம்மிடம் வைத்துக்கொண்டு தமது திருத்தங்களை வேறே கடுதாசியில் எழுதி இங்கே வைத்திருந்த ஆதாரப்பிரதியின் பக்கங்கள் வரிகளையுங் குறித்துக் காட்டிக் கொஞ்சங் கொஞ்சமாக அனுப்பி வைத்தார். இவைகள் பன்னிராயிரம் மைல் தாண்டிச் சேமமாக இங்கே வந்து சேர்ந்தவுடன் ஆதாரப் பிரதியிற் சேர்க்கப்பட்டன.

கிறீன் வைத்தியரார் பிரசுரஞ்செய்யப்பட்ட வைத்திய நூல்களுக்கு இது ஈரூந்தமாய்த் தோற்றுகின்றது. கடைசியில் தோற்றனாலும் மிக முக்கியமான வாகடங்களுள் இதுவுமொன்று. இதின் தோற்றத்தை மிஷன்கீழ்த் தமிழிற் கற்ற வைத்தியரும் நாட்டு வைத்தியர் பலரும் ஆவலோடு எதிர்பார்த்திருந்தார்கள்.

காலத்துக்குக் காலம் அனுப்பப்பட்ட திருத்தக் கடதாசிகள் இவ்வளவு நூரமான வழியிலே மோசம்போகாமல் காத்துத்தந்த கர்த்தராகிய இயேசு இப் புத்தகம் தமிழ்நாட்டாருக்கு நன்மையாய் முடியும்படி அதை ஆசீர்வதிப்பாராக.

த. வி. ச.

P R E F A C E .

A copy of the manuscript of this Volume was a few years ago sent to America, where it was revised by the late Dr. Green, who devoted his life mainly to the object of popularizing medical science in Tamildom. His corrections and comments, sent from time to time as the work advanced, have been carefully considered, and the manuscript corrected accordingly. Thus the whole text has his approval.

This Volume completes the series of medical works which Dr. Green undertook to prepare. Although last in publication it is not the least in importance. The contents of this volume form one of the most important branches of medical science. Its appearance has been for some years anxiously looked for by the vernacular medical graduates and native practitioners, but various causes have delayed its publication until now.

May the Lord Jesus, who has prospered the undertaking thus far, make this volume a blessing to the Tamil people,

Jaffna Ceylon 1888.

தாவர பதார்த்தசாரம்.

VEGETABLE MATERIA MEDICA.

1 வகுப்பு துவிகதிலீதங்கள். Dicotyledons.

ரனன்குலாசியங்கள்.

RANUNCULACEAE.

அகனீதம். ACONITUM NAPELLUS.

வாசம். Habitat. இந்தப்பூண்டு நடுயுரோபம் ஆசியத்திலும் வட இந்தியாவிலும் உண்டாகின்றது.

வாகடபகுதிகள். Officinal parts. கவது. காய்ந்தகிழங்கு. இதை மாரிகாலத்தலாவது இலை உதிர்காலத்தில் தளிர் அரும்பமுன்னாவது கிண்டியெடுக்கவேண்டும் (1). இதின் லட்சணங்கள்: நீளம் பெரும்பாலும் இரண்டுமூன்று இஞ்சு, அடிக்கிழங்கின் மொத்தம் நடுவிரலுக்கு மிஞ்சுவதரிது, வால்காலானது, நிறம் கருங்கபிலம், உள் வெண்மை. ஒரு சிறுத்துண்டை மெல்ல, நெடுநேரம் உறைப்பும் வீறைப்பும் உண்டாகும். உவது பச்சிலைகளும் அரும்புகளும். இவை பிறித்தனியிற் செய்கைபண்ணப்படும் பூண்டிலிருந்து பூக்கள் மூன்றிலொரு பங்கு மலர்ந்திருக்கும் பருவத்தில் சேர்க்கப்படும். இலை அழுத்தம், ஐவிரலிபோலப் பிரிந்திருக்கும். சப்ப உறைக்கும். பூக்கள் ஏராளமும் ஒழுங்கீனமும் கரு நீலநிறமுமாய் அடர்ந்த குலைகளாகவீருக்கும். சத்து, அகனீதசம்¹ என்னும் அல்கலைவ²மே.

தன்மை. Properties. வீரூன செரதீவம்³, அனுடைன்⁴, தாபக்கினி⁵. பெருந்தேய⁶த்திற் கொடியநஞ்சாகும்.

உபயோகம். Uses. பலவகையான நுறல்சி⁷, ஏர்ப்பு. தீவிர⁸ காலிக⁹ வாதம், குவாதம்¹⁰, எரிசிப்பிலசு¹¹ என்னு நோய்களுக்கும். துடிப்புக் கதித்த இதய வியாதிகளுக்கும் இது உவப்பான மருந்து. என்றாலும் இதின் செயலை விழிப்பாய்ப் பார்க்கவேண்டும்.

கிழங்கின் ரசிதங்கள். Preparations of the root. அகனீதாஞ்சம். Tincture of Aconite. கொள். அகனீதச்ச்கிழங்கு, பருக்கன் பொடியாக,

1 Aconitia. 2 Alkaloid. 3 Sedative, அவசாதனி. 4 Anodyne, அனுக்கினி.

5 Antiphlogistic. 6 Dose, பரமானம். 7 Neuralgia. 8 Acute.

9 Chronic. 10 Gout. 11 Erysipelas.

(1) அனுபந்தம் பார்.

இரண்டரை அன்சு¹; திட்டசீது² அரைநாழியாகிய இருபது அன்சு. அடைத்த சீசாவில் பதினைந்து அன்சுசீதில் அகனிதக் கிழங்கை இரண்டுநாளைக்கு ஊறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கவும். பிறகு ஓர்சியந்தனியில்³ வார்த்து வடியவிடவும். நீர் வடிந்தபின் மிச்சமாயிருக்கிற ஐந்து அன்சு சீதையும் விட்டு வடிக்கவும். சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து, இரண்டு நீர் களையும் கலந்து அரைநாழியாகப் போதிய திட்டசீது சேர்க்கவும்.

இந்த ரஞ்சம்⁴ தபுளின் வாகடத்திற் சொல்லிய அகனிதரஞ்சத்தில் நாலி லொரு பங்கு பெலனுள்ளது. லண்டன் வாகடத்திற் சொல்லிய அகனித ரஞ்சத்தில் மூன்றிலொருபங்கு பெலனுள்ளது. இதில் ஒரு அன்சு காய்ந்த கிழங்கில் 54½ கிரேனுக்குச் சரி.

தேயம். Dose. ஐந்து முதற் பதினைந்து துளி.

அகனித லின்மென். Liniment of Aconite. கொள். அகனிதக் கிழங்கு, பருக்கன் பொடியாக இருபது அன்சு; கர்ப்பூரம், ஒரு அன்சு; திட்டசீது, போதியது. அகனிதப் பொடியைக் கொஞ்சச் சீதால் நனைத்து அடைத்த பாத்திரத்தில் மூன்றுநாளுறவிட்டு, பிறகு சியந்தனியில் ஏற்றி இன்னுஞ் சீதை விட்டு அரைநாழிக்கு வருந்தனையும் கர்ப்பூரத்தை அடக்கிய ஏனத்து க்குள்ளே மெல்ல மெல்ல வடிக்கவும்.

இந்த ரசிதம் வெளிப்பிரயோகத்திற்கு மாத்திரமேயுதவும். வாதநோய், துறல்சீ⁵நோய்களுக்கு மெத்த உவந்தது. வழுந்துண்ட தோவிலாவது சளி ச்சவ்விலாவது இதை இடப்படாது. இதில் ஒரு அன்சு, காய்ந்த கிழங்கில் ஒரு அன்சுக்குச் சரி.

அகனிதசம். Aconitia. இது அகனிதக் கிழங்கிலிருந்தெடுபட்ட ஓர் அல்கலைவம்⁶. வெண்மையும் பெருப்பாலும் மாவாகிய அமாவ⁷முமான உர ப்பதார்த்தம்; 150 பங்கு தண்ணீரிலும் 50 பங்கு வெண்ணீரிலும் கரையக் கூடியது; அலக்கா⁸லிலும் ஈத⁹ரிலும் அதிகமாய்க் கரையும். சிவத்த ஸ்நம் சுக்கு¹⁰ வீரூன அல்கலைத்தோற்றமாய்க் காட்டும். அமிலங்க¹¹ளைத் தடஸ்திக்¹² கும். அவைகளை விட்டுக் காரஅல்கலைகளாற் பிரிந்து அடையும். ஆயினும் அமோனகாபனசு¹³க்காவது சோடம்¹⁴ பதாசி¹⁵களின் துவிகாபனசு¹⁶களுச் சாவது பிரிந்தடையாது. குட்டுக்கு உருகிப் புகைநிறச் சுவாலெகொண்டு எரியும். தாராளமாய்க் காற்றுப்பட்டெரிந்தால் சேடம்காணாது. தோலில் இதை உரைஞ்சு எரிந்து பின்பு நெடுநேரமாய் விறைக்கும். இது மெத்த வீரூன நஞ்சு. உள்ளுக்குக் கொடுக்கப்படுவதில்லை.

அகனிதசவன்கென். Aconitia Ointment. கொள். அகனிதசம், எட்டுக் கிரேன்¹⁷; ஒலீவதேலம்¹⁸, அரைத்திரும்¹⁹; பூதகிடியம்²⁰ ஒரு அன்சு. அகனித சத்தை தேலத்தோடு அரைத்துக் கிடியத்தையும் கூட்டி நன்றாய்ச்சேர்க்கவும். துறல்சீ நோய்களுக்கு இது உவந்த பூச்சு.

இலைகள் பூக்குலைகளின் ரசிதம். Preparation of the leaves and tops. அகனித வெசிற்த்து. Extract of Aconite. கொள். பச்சையான அகனித இலைகள் பூக்குலைகள், துற்றுப்பண்ணிரண்டு இரூத்தல். இவைகளைக் கல்லுரலில் இட்டுத் துவைத்துச் சாற்றைப் பிழிந்து 130 பாகை குடுவரையில் மெல்ல மெல்லக் காய்ச்சி, காரிக்கம்புடவையில் வடித்துப் பச்சை

1 Ounce. 2 Rectified spirit. 3 Percolator. 4 Tincture. 5 Neuralgia. 6 Alkaloid. 7 Amorphous. 8 Alcohol. 9 Ether. 10 Litmus. 11 Acid. 12 Neutralise. 13 Carbonate of Ammonia. 14 Soda. 15 Potash. 16 Bicarbonate. 17 Grain. 18 Olive Oil. 19 Drachm, 20 Prepared Lard.

யான நிறப்பதார்த்தத்தை வேறுக்கவும். அல்புமினை உறைவிப்பதற்கு வடிநீரை 200 பாகை சூட்டிற் காய்ச்சித் திரும்பவும் வடிக்கவும். இப்படி வடித்த நீரை மெல்லிய பாணியாக நீர்மத்திகத்தில் வறட்டி முன்பிரித்துவைத்திருந்த பச்சைநிறப் பதார்த்தத்தையும் அதோடு சேர்த்து முழுவதையும் ஓயாமற் கலக்கி எசுரூத்து குளிகையாகத் தருந்தபதமாய்வருந்தனையும் 140 பாகைக்கு மிஞ்சாத சூட்டில் வறட்டிக்கொள்ளவும்.

தேயம். Dose. ஒரு கிறேன் முதல் இரண்டு கிறேன் வரைக்கும். இந்த ரசிதத்தின் பெலன் எப்போதுஞ் சந்தேகம். உஷ்டண தேசங்களில் இது சுறுக்குப் பழுதாகும்.

*வீற்கனீதம். நாவி, ACONITUM FEROX.

வாசம். Habitat. இது கேவால்² தொடங்கிச் சிக்கிம்³ வரைக்குமுள்ள மத்திம உஷ்டண கீழ் அல்பின் இமயமலைத் தொடரில் 10,000 அடி முதல் 14,000 அடி உயரத்தில் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. Officinal part. இமயத்திலுண்டாகும் இந்த இனத்தினதும் அகனீதத்தின் மற்றும் இனங்களினதும் காய்ந்த கிழங்கு வட இந்துவின் கடைகளில் நாவி (2) என்று சொல்லி வழங்கப்படும். இது இரண்டு மூன்று இஞ்சுநீளமும் அடியில் அரைஇஞ்சு ஒருஇஞ்சு பருமையுமுள்ளது. சற்றே சங்குவடிவானது, திரைந்த கருந்தோலால் மூடுண்டிருக்கும். முறிமினுக்கமும் ராளமு⁴மாயிருக்கும், சிலவேளை மெழுகுபோன்றிருக்கும். நிறத்தில் வெளுப்பு முதல் கருங் கபிலம் வரைக்கும் வித்தியாசப்படும். சிலவகை, வெண்மையும் சுபஞ்சுபோலவுமிருக்கும். உரப்பானவைகளைப் பார்க்க(3) இவை அதி வீறுள்ளவைகளாம். மணமில்லை; சுவை தொடக்கத்திற் சற்றே கசப்பு, பிறகு நாக்கிலுந் தொண்டையிலும் ஒருவகையான விறைப்பு நிற்கும். இதின் சத்து அகனீதசம்.

தன்மைகளும் உபயோகங்களும். Properties and Uses. யுரோபத்தின் அகனீதத்தைப்போலவே(4).

ரசிதங்கள். Preparations. அகனீதசம் எடுப்பதற்கும் அகனீதலினி மென் செய்வதற்கும் இந்தக் கிழங்கை வழங்குவது நயம். யுரோபத்தின் இனத்தைப்பார்க்க இதில் அகனீதசத்தின் வீதம் மெத்த அதிகம். இது அதி வீறுனதாகையால் உள்ளே கொடுக்கும் அகனீதரஞ்சத்தை இதிலே செய்யப் பட்டது.

*அதிலிடயம், ACONITUM HETEROPHYLLUM.

இது அகனீதத்தின் ஓர்வகை.

வாசம். Habitat. இது இமயமலையில் மத்திம உஷ்டணமான மேற்குப் பகுதியில் 8000 அடி முதல் 13000 அடி உயரத்தில், இந்துநதி தொடக்கம் குமையன்வரைக்கும் இருக்கும்.

வாகடபகுதி. Officinal part. காய்ந்தகிழங்கு. இது ஒன்று ஒன்றரை இஞ்சுநீளமும் காலே அரைக்கால்முதல் அரைஇஞ்சு கனமுமுள்ளது. உண்

1 Albumen. 2 Gurhwal. 3 Sikkim. 4 Resinous.

(2) (3) (4) அனுபந்தம் பார்.

டையுங் கூருமானது. நெடும்பாடான சுருக்குகளையும் வேர்த்தழும்புகளையும் முடைய மெல்லிய நரைநிறமான தோலால் மூடப்பட்டது. குறுக்கே வெட்ட உள்ளே நல்ல வெள்ளையும் நொருக்கலுமான மாப்பதார்த்தம் அடங்கியிருக்கிறதாகத் தெரியும். கிழங்குக்கூடே நெடும்பாட்டுக்குத் தும்புகள் ஒடியிருக்கும், அவற்றிற்கு இறுதியாகிய ஐந்து ஆறு மறுக்கள் நிரையுள் நிரையாக அதின் மையத்தைச் சுற்றியிருக்கும். இது மணமற்றது, உறைப்பில்லாதது, கைப்பான சுவையையுடையது, அகனீதசம் இதில் இல்லை; இதற்குரிய கைப்பினால் அதிவிடயம் என்று கடைகளில்விற்கும் மற்றுங்கிழங்குகளிலிருந்து இதை வகுவிற் பகுத்தறியலாம்.

தன்மைகள். Properties. இது தொணிகம்¹ அந்திபிராடி². இதிலே அகனீதசமாவது வேறு நஞ்சுச்சத்தாவது இல்லை. இதை விக்கினமின்றி உள்ளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

உபயோகம். Uses. பெலவீனப்படுத்தும் நோய்களிலிருந்து சுகப்படுகையிலும் முறைச்சுரங்களிலும் தடவை தடவையாய் வரும் மற்றுஞ்சுரங்களிலுங் கொடுக்க இது ஆமான மருந்து(5).

தேயம். Dose. தொணிகமாக ஐந்துமுதற் பத்துக்கிறேன் வரைக்கு நாள் மூன்றுமுறையுண்ணலாம். அந்திபிராடியாக வேர்ப்பொடியில் இருபதுமுதல் முப்பது கிறேன்வரைக்கு நாள் மூன்றுநாலு தரம் காய்ச்சல் இல்லாத நேரத்திலும் காய்ச்சல் உள்ள நேரத்திலும் கொடுக்கலாம். இதுவே உத்தமமான முறை.

*கப்தீஸ்பூடு. COPTIS TEETA.

வாசம். Habitat. இது அசம்தேசத்துக்குக்கிழக்கேயுள்ள மிஷ்மீ மலைகளிலுண்டாகிறது.

வாகடபகுதி. Officinal part. இதின் காய்ந்த வேர் இரண்டொரு அன்சு கொள்ளத்தக்க சிறுத்த பிரப்பம்பெட்டிகளில் அசம்தேசத்திலிருந்து வங்காளத்துக்கு ஏற்றப்படும். இது தென்னீர்க்களவு பருமையும் இரண்டொரு இஞ்சு நீளமுமுள்ளது. ஒரு தலைப்பிற் சுருங்கின வேர்த்தண்டுகளாகவிருக்கும். வெளிப்பக்கம் பெரும்பாலும் ஒப்பமற்றதும் வளையமான புருவங்களுள்ளதுமாயிருக்கும். அடிகளிற் குறுத்த முள்முனைகளாகிய வேர்க்கூந்தலின் அடிகள் உண்டு. வெளிப்பக்கம் மஞ்சட்கபில³நிறம். உள்ளுக்கு நல்ல பொன்மஞ்சள்நிறம். முறிக்க மையத்திலிருந்து கிரணித்த⁴தன்மை காணப்படும். இதின் சுவை நெடுநேரிற்குங் கசப்பு. சப்பினால் உமிழ்நீரை மஞ்சளநிறமாக்கும். இதிற தனிக்கமில்⁵மாவது கலிக்கமில்⁶மாவது இல்லை. தண்ணீரிலும் அலக்காலிலுங் கரையக்கூடிய ஓர் மஞ்சட் கசப்புச் சத்து இதில் நிரம்ப உண்டு.

தன்மை. Property. சுத்தக் கசப்பான தொணிகம்.

உபயோகங்கள். Uses. பெலவீனத்துக்கும் சுரம் முதலான பெலவீனப்படுத்தும் நோய்களிலிருந்து சுகப்படும்போதுக்கும் அசத்துவ குன்மத்துக்கும் லேசான முறைச்சுரங்களுக்கும் இது மெத்த உவப்பணதாய்க் காணப்பட்டது(6)

1 Tonic, 2 Antiperiodic, 3 Yellowish brown. 4 Radiated.

5 Tannic acid, 6 Gallic acid.

(5) (6) அனுபத்தம்பார்.

தேயம். Dose. வேர்ப்பொடியிற் பத்துமுதற் பதினைந்துகிறேன் நாள் மூன்றுமுறைகொடுக்கவும்.

ரசிதங்கள். Preparations. கப்தீசிரஞ்சம். Tincture of coptis. கொள். கப்தீஸ்வேர், பருக்கன்பொடியாக இரண்டரைஅன்சு; புருவுசீது¹ ஒருநாழி; அடைத்த பாத்திரத்தில் எழுநாள் ஊறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கி, வடித்து அரைநாழியாக்கப் போதிய புருவுசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். Dose. அரை முதல் இரண்டுதிரும்².

கப்தீசின்வசம். Infusion of coptis. கொள். கப்தீஸ் வேர், பருக்கன்பொடியாக ஐந்து திரும்; கொதிவெந்நீர் அரைநாழி. அடைத்த பாத்திரத்தில் இரண்டுமணிநேரமூறவிட்டு வடிக்கவும்.

தேயம். Dose. ஒன்றுமுதல் இரண்டு அன்சு³ நாள் மூன்றுமுறை.

அவாகடச்சீரக்து. Non Officinal.

தலிக்குரம் வொலியுலோசம். Thalictrum foliolosum இது இமய மலயின் கீழ்ப்பகுதியிலுள்ளது. இதின் வேரை அம் மலைநாட்டார் பீளேசாறி⁴ என்பார். குமையன் மலைகளிலிருந்து மொமீரியம்⁵ என்ற பேருடனது ஏற்றியனுப்பப்படுகின்றது. ஈர்க்களவு பருமையான தும்புள்ள துண்டுகளாக வரும். வெளி கருங் கபிலநிறம். உள்ளுக்கு மஞ்சள்நிறம். அல்க்காலி⁶லும்தண்ணீரிலும் கரையக்கூடிய மஞ்சளநிறமான கைப்பெசிரூத்திவு⁷இதிலிருந்து பிரியும். தண்ணீரில் கரைந்தது அயிரபுவுப்புக்கு⁸க் கறுக்காது. தொணிக⁹மும் சற்றே பேதிக்குணமும் இதில் கலந்திருக்கும். தீவிர நோய்களில்நின்று சுகப்படுகையிலும் லகுவான முறைச்சுரங்களிலும் அசத்துவ¹⁰குன்மத்திலும் இது உபயோகமாய் காணப்பட்டது. வேர்த்தாளின் தேயம் ஐந்து முதற் பத்துக் கிறேன். ஜென்சனெசிரூத்தைப்போல் எத்தனம்பண்ணின இதின எசிரூத்தின் தேயம் இரண்டு மூன்று கிறேன் நாள் மூன்றுமுறை.

கருஞ்சீரகம். Nigella Sativa. இந்தப்பூண்டின்கொட்டைகள் இந்து தேசத்தின் மிகுதியான பகுதிகளில் கிடைக்கும். மற்றும் காமினதிகள்¹¹ கிடையாதவிடத்தில் இதை வாயுவைக் கழிக்க வழங்கலாம். கருஞ்சீரகக் கொட்டை நாலரை அன்சுக்கு புருவுசீது ஒருநாழிவீதமாகச் செய்த கருஞ்சீரகரஞ்சம் வங்காள¹²பார்மகுபீய¹³த்துக்குரியது. பேதிக்கும் பாணங்களுக்கும் சேர்க்கும்படி இதில் அரைத்திரும் ஒரு திரும் தேயம் அதிற் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

மக்னோலியாசியங்கள்.

MAGNOLIACEAE.

அண்ணாசுப்பூ. ILLICIUM ANISATUM.

வாசம். சீனம்.

வாகடபகுதி. அண்ணாசுப்பழம். ஏறக்குறைய ஒன்றேகால் இஞ்சு பரு

1 Proof spirit. 2 Drachm. 3 Ounce. 4 Pila-Jari அதாவது பீதவேர். 5 Nomeeree. 6 Alcohol. 7 Bitter Extractive. 8 Persalt of Iron. 9 Tonic, ஓசதி. 10 Atonic 11 Carminative, வாயுக்கிளி. 12 Bengal. 13 Pharmacopoeia.

மையானது. சுற்றிச் சுற்றியிருக்கும் எட்டு அறைகள் வரைக்கு உள்ளது. இவைகள் ஒடுங்கி வெளியிற் திறந்து உள்ளுக்கு ஒப்பமாய் மேல்விளிம்பாற் திறக்கும். அழுத்தமும் முட்டைவடிவமுமான கொட்டைகள் ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு அறையிலுமுண்டு. இவைகள் அனீசைப் போன்ற நல்ல சுகந்த மணமும் இனிப்பும் புளிப்புமான சுகந்த சுவையுமுள்ளவைகள். திஸ்திலி¹தெடுக்கிற அத்திரதே²ல³ அதிகமாய் அடக்கியிருப்பதினாலேயே அண்ணாசுப்பழம் வாகடத்துக்குரியதாகும். வியாபாரத்தில் வரும் அனீசத் தேவில³ மிகுதியான பங்கு அண்ணாசுத்தேலே, அண்ணாசுத்தேல் நிறமற்றது அல்லது வெண்மஞ்சள் நிறமானது. அனீசின் மணமும் காரமான இனிய சுவையுமுடையது. 50 பாகை சூட்டில் உறையும்.

தன்மைகள். ஸ்தோமாசி⁴ காமினதி⁵. வயிற்றுப்பொருமல் வயிற்றுவலிக்கு இது உவப்பாகும்.

தேயம். அத்திரதேவில் இரண்டுமுதல் ஐந்துதுளி.

அவாகடச்சரக்கு Non Officinal.

சம்பகம்⁶. Michella Champaca. செண்பகம். இந்தமரத்தினது கசப்பான சுகந்த பட்டையின் தன்மைகள் வடஅமரிசத்திலுள்ள கிளாகமக் னோலியென்ற மரத்தின் பட்டையின் தன்மைகளைப்போலிருக்கும். இது மோறிசுதீவின் முறைச்சுரப் பரிசரிப்பில் லாலியற் வைத்தியரால் சித்தியாய் வழங்கப்பட்டது. இதில் ஒரு அன்சுக்குத் தண்ணீர் அரைநாழி வீதமாகச் சேர்த்துச் செய்த இன்வூசு⁷மாகவும்; ஒரு அன்சுக்கு அரைநாழியாகக் காய்ச்சின கொதிவெந்நீர் ஒருநாழிவீதமாகச் சேர்த்துச் செய்த துகாக்து⁸மாகவும் சுரத்தின் மும்முரத்துக்கு முன்னும் பின்னும் மும்மூன்று மணிநேரம் இரண்டு அன்சு தேயமாக அதை அவர் கொடுத்தார். இந்தப் பட்டையை இன்னும் அதிகமாய்ச் சோதிக்கவேண்டியது அவசியமாய்க் காண்கிறது. வாசனையுள்ள பூக்களுக்காக இம்மரம் அதிகமாய் வளர்க்கப்படுகிறதாதலால் இதுவின் எப்பகுதியிலும் இது லகுவிற் கிடைக்கும்.

மேனிஸ்பேர்மாசியங்கள்,

MENISPERMACEAE.

கரும்புக் கீழங்கு. CALUMBA.

வாசம். இது கிழக்காபிரிகத்தில், ஈபு சம்பேசி யென்ற இடங்களுக்கிடையிலுள்ள காடுகளிலுண்டாகும்.

வாகடபகுதி. கீழங்கு. தட்டையும் வட்டிப்பும், ஏறக்குறைய இரண்டு இஞ்சுபருமையும், இரண்டுமுதல் நாலு லீன்¹⁰தடிப்பும், மையப்பகுதியில்மெல்ல்தும் மெதுவும், நரையான மஞ்சள்நிறமும், சொற்ப மணமும், மெத்தக் கைப்பான சுவையுமுள்ள குறுக்குச் சீவல்களாக இதுவரும். இதின் திகாசுதம் ஆறினபின் இயோத¹¹நீர் சேர்க்கக் கறுக்கும். இதின் இன்வூசுத்தில்

1 Distill. 2 Volatile oil. 3 Anise oil. 4 Stomachic, செண்பகம். 5 Carminative, வாய்க்கி. 6 சம்பகம். 7 Magnolia glauca. 8 Infusion, 9 Decoction.

10 Line, 11 lodum.

அயசல்வசு¹, அந்திமனிதாத்தரகம்², செலதின்³ என்பவை தோன்றக்கூடிய ஓர் மாறுதலையும் உண்டாக்கமாட்டாதாகையால் தனிக்கமில்ம்⁴ கலிக்கமில்ம்⁵ இதில் இல்லையென்றறிபலாம். கிரிஸ்தவி⁶க்கூடிய கலம்பின்⁷ என்ற கைப்பான ஓர் சத்தும் பெர்பெரினம்⁸ என்ற கைப்பான தடஸ்த்⁹ சத்தும் இதில் உண்டு.

அவுஷததன்மைகள். இது நயந்த தொனிகமும்¹⁰ ஸ்தொமாகி¹¹யுமாகும். உபயோகம். பொதுவானபெலவீனம் அசத்துவகுன்மம்¹² இரைப்பைபயழ்ச்சி கருப்பிணிகளிற் காணும் வாந்திகளிலும் தியறீயம்¹³ திசந்தெரி¹⁴யின் பிற்கூற்றிலும் இது மெத்த நயமாய்க்கண்டது.

தேயம். கிழங்குத்தாளில் ஐந்துமுதல் இருபதுகிறேன் நாள் இரண்டு மூன்று முறை கொடுக்கவும்.

ரசிதங்கள். Preparations. களும்பின்வசம். Infusion of Calumba. கொள். நறுக்கின களும்புக்கிழங்கு, அரை அன்சு; தண்ணீர் பத்து அன்சு; மூடின பாத்திரத்தில் ஒருமணிநேரம் ஊறவிட்டு வடிக்கவும்.

தேயம். ஒன்றுமுதல் இரண்டு அன்சு.

களும்பிரஞ்சம். Tincture of Calumba. கொள். களும்புக் கிழங்கு, பருக்கன் தாளாக நறுக்கி இரண்டரை அன்சு; புருவுசீது¹⁵ அரைநாழி. அடைத்த ஓர் பாத்திரத்தில் பதினைந்து அன்சு சீதில் களும்பையிட்டு நாற்பத்தெட்டுமணிநேரம் ஊறவைத்து இடைக்கிடை குலுக்கிக்கொள்ளவும். பின்பு சியந்தனி¹⁶யில் விட்டு நீரை வடியவைக்கவும். வடிந்தபின் மிச்சமானஐந்து அன்சு சீதையும் விட்டு வடிக்கவும். பிறகு சக்கையை நசுக்கிப் பிழிந்து வடித்து இரண்டு நீர்களையுங் கலந்து அரைநாழிக்குப் போதிய புருவுசீதுசேர்க்கவும்.

தேயம். முப்பது துளிமுதல் இரண்டு திரும்வரைக்கு.

களும்பெசிறுத்து. Extract of Calumba. கொள். களும்புக் கிழங்கு, அளாக வெட்டி ஒரு இரூத்தல்; தண்ணீர் இரண்டுநாழி; களும்பை ஒரு நாழி தண்ணீரில் பன்னிரண்டு மணிநேரத்துக்கு ஊறவைத்து வடித்து நசுக்கவும். அவ்வளவு தண்ணீரில் மறுபடியும் ஊறவைத்து முன்போல வடித்து நசுக்கவும். நீர்களைக் கலந்து குளிகையாகத் தகுந்த பதமான எசிறுத்தாய் வருந்தனையும் நீர்மத்திகத்தின் சூட்டில் வறட்டவும்.

தேயம். மூன்றுமுதற் பத்துக்கிறேன்.

பரைரக்கோடி. PAREIRA BRAVA.

வாசம். இது பூமியின் இரண்டு பாதிகளின் உஷ்டணுர்த்தப்பகுதிகளடங்கலும் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. காய்ந்தவேர். திரண்ட சப்பையான துண்டுகளாக நெடும் பாட்டுக்குக் கிழிந்தாவது முழுதாயாவது அரைமுதல் நாலு இஞ்சு பருமையாயும் நாலு இஞ்சு முதல் நாலு அடி நீளமாயும் இதுவரும். பட்டை நரைக்கபிலநிறம்; நெடும்பாட்டுக்குச் சுருக்குவிழுந்தது; குறுக்கே வளையம் வளையமான புருவங்கள் உள்ளது; மையம் கண்ணறைகள் நிறைந்த பீதநரையாண

1 Sulphate of Iron. 2 Antimony tartarate. 3 Gelatine. 4 Tannic acid. 5 Gallic acid. 6 Crystallize. 7 Calumbin. 8 Berberina. 9 Neutral. 10 Tonic, ஊதி.

11 Stomachic ஊசனி. 12 Atonic Dyspepsia. 13 Diarrhoea, 14 Dysentery.

15 Proof spirit. 16 Percolator.

மரத்தடி. இதின் வெட்டிய சலைப்பில் ஒன்றுளொன்றாய்நிற்கும் வளையங் களும் இவைகளைக் குறுக்கிட்டுச்செல்லும் வரிகளுங் காணும். சுவை, முதலில் இனிய சுகந்தம், பின்பு அதிக கசப்பு.

அவுஷததன்மைகள். மெல்லிய தொணிகம்¹, தியுநீசம்². சன்னசலஉறுப்புகளின் சளிச்சவ்வுகளில் துவராகவும் சார்தனியாகவும் சேஷ்டிக்கும்.

உபயோகம். தீவிரகாலிக சலப்பைபத்தாபிதத்தின் பிற்கூற்றிலும் சளி அதிகமாய்க் கக்கும் சலப்பைக்கதாரிலும்³ இதுவழங்கப்படும்.

ரசிதங்கள். Preparations. பரைரக்காக்தம். Decoction of Pareira. கொள். பரைரவேர் துண்டுதுண்டாக வெட்டி, ஒன்றரை அன்சு; தண்ணீர் அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்தில் பதினேந்துமினி⁴ வரைக்கு அவித்துவடித்து வடி⁵யில்நிற்கும் சக்கையின்மேல் அரைநாழி யளக்கப் போதியதண்ணீர் வார்த்துக்கொள்ளவும்.

தேயம். ஒன்று முதல் மூன்று அன்சு.

பரைரவேசிறத்து Extract of Pareira. கொள். பரைரவேர், பருக்கந்துளாக ஒரு இராத்தல்; கொதிவெந்நீர், ஒருகலன்⁶ அல்லது போதியது; பரைரவேர்த்துளை அரைநாழி தண்ணீரில் ஒருநாளைக்கு மென்குடேற்றி ஊறவிட்டு சியந்தனியில் இட்டு இன்னும் தண்ணீர்விட்டு ஒரு கலனுக்கு வருந்தனையும் அல்லது சாரம் இறங்குந்தனையும் மெல்ல மெல்ல வடியவிடவும். உடிந்த நீர் குளிகையுருட்டத் தகுந்தபதமாய் இறுகுந்தனையும் நீர்மத்திசீத்தில் அதை வறட்டவும்.

தேயம். பத்துமுதல் இருபதுகிறேன்.

பரைரநீரசிறத்து. Liquid Extract of Pareira. கொள். பரைரவேர், பருக்கந்துளாக, ஒரு இராத்தல்; கொதிவெந்நீர் ஒரு கலன் அல்லது போதியது. திட்டசீது⁷ மூன்று அன்சு. பரைரவேர்த்துளை அரைநாழி தண்ணீரில் ஒருநாள் ஊறவிட்டுப் பிறகு சியந்தனியில் வைத்து இன்னும் வெந்நீர்விட்டு ஒரு கலன் நீர் கூடுந்தனையும் அல்லது சாரம் இறங்குந்தனையும் நீரை மெல்ல மெல்ல வடியவிடவும். அந்த நீர் பதின்மூன்று அஞ்சாக வற்றுந்தனையும் நீர் மத்திசீத்தில் வறட்டி ஆறினபின் சீதைச் சேர்த்துக் கடுதாசியில் வடிக்கவும்.

தேயம். அரைமுதல் இரண்டு திராம்.

*காக்காய் கோல்லி. COCCULUS INDICUS.

வாசம். இது இலங்கை, மலையாளம், திருவாளங்கோடு, கொங்கணதேசங்களின் மலைக்காடுகளிலும் ஒரிசாவில் காசி அசம் வரையிலும் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. பழவற்றல். இது மிளகிலும் சற்றே பரிது. கொள்ளுவடிவானது; கருங் கபிலநிறம்; சுருங்கினது. இரணை ஒட்டுக்குள்ளமைந்த நெய்ப்புங்கைப்புமுள்ள கொள்ளுவடிவான பீதநிறக்கொட்டையை உடையது. இந்தக் கொட்டையில் பிக்குநதாக்கீன் என்ற கிரிஸ்தலிக்கக்கூடிய ஓர் சத்துண்டு. அது கொடிய நஞ்சு.

1 Tonic, ஓசை. 2 Diuretic. அடிநீர். 3 Catarrh. 4 Minute. 5 Filter. 6 Gallon. 7 Percolator. 8 Water bath. 9 Rectified spirit. 10 Picrotoxin.

அவுஷததன்மைகள். உள்ளே கொடுக்கக்கூடாது. பூச்சிகளைக் கொல்வதற்கு இது கைகண்டமருந்து. ஆகையால் பேன்கொல்லியாய் வழங்கும் பின்வருந்தைலத்தில் இது வீரன கூருகின்றது.

காக்காய்கொல்லியன்கேன். Ointment of Coccus Indicus. கொள். காக்காய்கொல்லிக் கொட்டைகள், எண்பது கிரேன் ; பூதக்கிடயம்¹ ஒரு அன்சு. கொட்டைகளை உரவில் நன்றாய் இடித்து கிடயத்தோடு தீர்ப்பாய்ச் சேர்க்கவும்.

இந்தத் தைலம் நஞ்சு; தோல் வழந்தின இடத்தில் அதைப் பூசப்படாது.

* சீந்தில். GULANCHA.

வாசம். இது வங்காளம், அசர், பாகார், தெக்கணம், ஓரிசம், கருநாடகம், மலையாளம், மைசூர் தேசங்களிலும் இந்துவின் மற்றும் உஷ்டணதே சப்பகுதிகளிலும் வளரும்.

வாகடபகுதி. வேரும் தண்டும். இவைகளில் கைப்புப் பதார்த்தம் அதிகமாயும் அடர்ந்துமிருக்கிற கோடைகாலத்தில் இவைகள் சேர்க்கப்படும். கடைகளில் வருவது திரண்ட மரத்தண்டின் காய்ந்த குறுக்குத்துண்டுகளே. இத் துண்டுகளின் பருமை கால் இஞ்ச முதல் இரண்டு இஞ்ச வரைக்கும், நீளம் அரை இஞ்ச முதல் இரண்டு இஞ்சவரைக்கும் இருக்கும். இவைகள், விசேஷமாய் இளமையான துண்டுகளின் துண்டுகள், அதிகஞ் சுருங்கியிருக்கும். அழுத்தமும் உருவொளியுமான சுருங்கின பட்டை இவைகளை மூடியிருக்கும்; நாட்செல்ல இது திரைந்து மங்கும். அனேகந் துண்டுகளின் வெளிப்பக்கத்திற் காய்போன்ற திடல்கள் இருக்கும். கண்ணறைகள் நிறைந்த உட்பகுதியில் கிரணித்த வரிகள் தோற்றமாய்க்காணும். மணமில்லை; சுவை மெத்தக் கைப்பு. இதின் இன்வூசம் அயபிரபுவுப்புக்குக் கறுக்காது.

அவுஷத தன்மைகள். தொணிகம்², அந்திபிராடி³, தியுரீசம்⁴.

உபயோகம். இலேசான முறைச்சுரங்களிலும் சுரங்களுக்கும், வதக்கும் மற்றும் நோய்களுக்கும் பின் காணும் பெலவீனத்திலும் பரோபதஞ்ச⁵ நோய்களிலும் காலிகவாதத்திலும் இதால் அதி நயங்கண்டிருக்கிறது.(7)

ரசிதங்கள். Preparations. சீந்திலிரஞ்சம். Tincture of Gulancha. கொள். சிறிதாய் நறுக்கிய சீந்தில் நாலு அன்சு; புருவுசீது⁶ அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்தில் ஏழுநாள் ஊறவைத்து இடைக்கிடை குலுக்கி, வடித்து அரைநாழியாகப் போதிய சீது சேர்க்கவும்.

தேயம். ஒருதிரும் இரண்டு திரும்.

சீந்திலின்வூசம். Infusion of Gulancha. கொள். சிறிதாய் வெட்டிய சீந்தில், ஒரு அன்சு; தண்ணீர், பத்து அன்சு. அடைத்த பாத்திரத்தில் இரண்டு மணிநேரம் ஊறவைத்து, வடிக்கவும்.

தேயம். ஒன்று முதல் மூன்று அன்சு, நாள் மூன்றுமுறை.

சீந்திலேசிறுத்து. Extract of Gulancha. கொள். சிறிதாய் வெட்டி நசுக்கிய சீந்தில் ஒரு இராத்தல்; தண்ணீர் இரண்டுநாழி. சீந்திலை ஒருநாழிதண்ணீரில் பன்னிரண்டு மணிநேரம் ஊறவைத்து, வடித்துப் பிழியவும்.

1 Prepared Lard. 2 Tonic. 3 Antiperiodic. 4 Diuretic, அரிசி. 5 Secondary syphilis. 6 Proof spirit.

(7) அனுபந்தம் பார்.

அவ்வளவு தண்ணீரில் மறுபடியும் ஊறவைத்து, முன்போல வடித்துப் பிழியவும். இரண்டு நீர்களையுங் கலந்து வடித்து, குளிகையாகப் போதிய பதமான எசுரூத்தாயிறுகுந்தனையும் நீர்மத்திகத்தின் சூட்டில் வறட்டவும்.

தேயம். நாள் பத்துமுதல் முப்பது கிறேன் பிரித்துக்கொடுக்கவும். இது சுதேசிகன் செய்யும் வீறுகுறைந்த அசுத்த எசுரூத்தைப் போன்றது. அது ஒன்றுமுதல் மூன்று திரும் தேயமாக, சுரங்களிலிருந்து சுகப்பட்டுவருகையிலும் பிளிகை வியாதி முதலியவைகளிலும் தொணிகமாக அவர்களால் மெத்த உவக்கப்படுகின்றது.

அவாகடச்சரக்கு. Non-Officinal.

மரமஞ்சள். *Coscinium fenestratum*. இது இலங்கை மலையாளங்களின் காடுகளில் உண்டாகும். தென் இந்துவின் கடைகளில் மரமஞ்சள் என்றும் கிடைக்கும். நீளமுங் குறளுமான தேறுகளாகவிருக்கும். பருமை ஒரு இஞ்சுமுதல் நாலு இஞ்சு. மெல்லிய வெண்பட்டையையுடையது. குறுக்கே வெட்டினால் கண்ணறைகள் நிறைந்து கிரணித்த¹ வரிகள் உள்ளதாயும் ஏக மைய வளயங்கள் இல்லாததாயுங்காணப்படும். தேறு நல்ல பச்சைமஞ்சள் நிறமும் சுத்தக் கைப்புச் சுவையுமுள்ளது. சில வருஷங்களுக்கு முன்னே இது இலங்கையிலிருந்து களும்புத்தேறு என்று இங்கிலாந்துக்கு ஏற்றப்பட்டு பெறினசு என்பவரால் சோதித்துக் கூறுபடுத்தப்பட்ட சோதனையிற் பெர்பெரிஸ்² அதில் அடங்கியிருக்கிறதாய்க் காணப்பட்டது. வாரிங்கென்பவர் திரிவேந்திரம் தருமவிசிகத்தில்³ இதை வெருவாய்ப் பரிசோதித்தார். சுத்தக் கைப்பான தொணிகம்⁴ தேவையான வேளைகளில் களும்பு கிடையாதிருந்தால் இதை வடிங்குவது நயமென்று தீர்த்தார். இதின் இன்வூசம்⁵ ரஞ்சங்கள் களும்பின் இன்வூசம் ரஞ்சங்களைப் போன்ற பெலனுடையனவாகக் கொடுக்கப்படும். இதை மலிவும் சித்தியுமான தொணிகமாக இந்துதேச வைத்தியர் வழங்கிவருவது மிகத் தகும்.

Cissampelos hernandifolia. ஒஷான்சியென்பவர் நீமுக என்ற வங்காளப்பெயரால் இந்தக் கொடியை விதந்து பேசுகிறார். ஆயினும் வாலிக் கரால் இப்படியழைக்கப்பட்ட இக்கொடியானது இந்துவடங்கலும் மெத்தப்பொதுவாயிருக்கிற பரைரக்கொடியென்று கூட்கர், தம்சன் வைத்தியர்கள் காட்டியிருக்கிறார்கள்.

காட்டுக்கொடி. *Cocculus villosus*. இதுவும் இதற்கு இனமாய் இந்துவின் பல பருதிகளிலுமுள்ள வேறு பல கொடிகளும் சீந்திலின் கசப்பையும் தொணிகத்தன்மையையுமுடையன.

பேபேரிடியங்கள்.

BERBERIDEAE.

போடுவிலப்பூடு. PODOPHYLLUM.

வாகம். ஐக்கமரிகம் அடங்கலும் இது உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. காய்ந்த வேர்த்தண்டு. இது பல அளவான நீளமும், ஏறக்குறைய இரண்டு லீன் தடிப்புமுள்ள துண்டுகளாக வரும். பட்டை

1 Radiated. 2 Berberine. 3 Hospital. ஆஸ்பீதல். 4 Tonic. 5 Infusion. 6 Tincture.

நெடும்பாடான சுருக்குகள் உள்ளதும், கருஞ் செங்கபில சிறமானதும். உள்ளே வெண்மை; நொறுநொறுக்கலானது; வெண்கபில வேர்க்கூந்தல்கள் தொடுத்திருக்கும். இதின் தூள் பீத நரைநிறம்; மணம் இனிமை. சுவை கசப்பும், சற்றே கார்ப்பும், உவட்டுமானது. இதில் இருந்து ராளம் எடுக்க ப்படுவதால் மாத்திரம் இது வாகடத்துக்குரித்தாகிறது.

ரசிதம். Preparation. பொடுவிலராளம். பொடுவில்லின். Resin of Podophyllin. கொள். பொடுவிலவேர் பருக்கன் தூளாக ஒரு இருத்தல்; திட்டசீது¹ ஒன்றரைநாழி, அல்லது போதியது; தண்ணீர் போதியது; ஐரு குலோறிக்கமில்² போதியது. சியந்தனிப்பதால்³ பொடுவிலவேரின் சாரத்தைச் சீதால் வாங்கி, இந்த ரஞ்சு⁴த்தை ஸ்தில்லில்⁵ இட்டு அதிலுள்ள சீதி ன் மிகுதிப்பங்கையும் வாங்கவும், தண்ணீரோடு, அதில் இருபத்துநாலில் ஒருபங்கு ஐருகுலோறிக்கமில்⁶ஞ் சேர்த்து ரஞ்சத்தைத் திஸ்திலித்தபின் எஞ் சுநீரை அதிலும் மும்மடங்கு அமிலநீருக்குள்ளே மெல்ல மெல்ல வார்த்து, ஓயாமற் கலக்கவும். ராளம் அடைவதற்கு இந்தக் கலவையை ஒருநாள் நிற்கவிடவும். அடைந்த ராளத்தை வடியில்இட்டு திஸ்திலித்தநீராற்⁶ கழுவி அடுப்பில் உலர்த்தவும். இலட்சணங்கள். இது வெண்பச்சைக் கபில மாவாகும். திட்டசீதிலும் அமோனீரீரிலும் கரையும். திட்டசீதிற் கரைந்தது, தண்ணீருக்கும், அமோனீரீற் கரைந்தது அமிலங்⁸களுக்கும் அடையும். சுத்த ஈத⁹ரில் ஏறக்குறைய முழுதுங் கரையும்.

தன்மைகள். விரேசனி, பித்தக்கினி¹⁰. சிறுத்தேயமாக நாட்படக் கொடுத்தால் அல்திறவம்¹¹.

உபயோகம். மலவரச்சியிலும், காலிக¹² ஈரல்நோய்களிலும், விசேஷமாய் ஈரலின் தொழிற்குறைவு கஞ்செஸ்தங்¹³களிலும் குவாதம்¹⁴ வாதம், சிவ்லிசு¹⁵ நோய்களிலும் இதால் நயங்கண்டிருக்கிறது.

தேயம். பித்தக்கினி விரேசனியாக ஒரு கிறேன் இரண்டு கிறேன். இளம்பேதியாக அரைக்கிறேன் ஒருகிறேன்; அல்திறவமாக பன்னிரண்டில் ஒருபங்கு முதல் எட்டில் ஒருபங்கு கிறேன், நாள் இரண்டு மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம்.

பொடுவிலத்தின் இன்னொருவகை இமயமலையில் உள்ளது. அதின் தன்மைகள் ஆராயப்படத்தகும்.

* இந்துபாபேரி. INDIAN BARBERRY.

வாசம். இதில் முன்று இனமுண்டு; இந்த இனங்களெல்லாம் இமயமலையின் மத்திமோஷ்டண வறண்ட பகுதிகள் அடங்கலும் உண்டு. அவைகளில் (B. Aristata) என்ற இனம் இப்பாற் சென்னையின் உயர்ந்த மலைகள் வரையிலுமுள்ளது.

வாகடபகுதி. வேர்ப்பட்டை. இதிற் கைப்புப் பதார்த்தம் பின்கோடையில் அதிகப்படுமாதலால் அப்போதே இது சேர்க்கப்படும். வேர்பச்சையாயிருக்கும்போது பட்டையை உரித்துக் காயப்போடவேண்டும். இது வெண்மையும் மெதுவுமானது; மணம் மெத்தவில்லை; பசைப்பான கைப்

1 Rectified spirit. 2 Hydrochloric acid. 3 Percolation. 4 Tincture. 5 Still.

6 Distilled water. 7 Ammonia. 8 Acid. 9 Ether. 10 Cholagogue.

11 Alterative, பரிணமி. 12 Chronic. 13 Congestion. 14 Gout.

15 Syphilis.

புச் சுவையுடையது. பெர்பேரின்¹ என்ற கிரிஸ்தலி²க்கக்கூடிய கைப்புப் பதார்த்தம் இதில் உண்டு.

தன்மைகள். தொணிகம்³, அந்திபிராடி⁴, சுவேதனி⁵. (8)

உபயோகம். முறைச்சுரங்கள், ரீமீஷ்⁶ சுரங்களிலும், பிரதானமாய்ச் சுரங்களின்பின்காணும் பெலவீனத்திலும் இது உச்சித மருந்தாகும். இதி ன் எசிரூத்து⁷ கண்ணோ முதலான நயனரோகங்களிற் தானிகமாய் இடப் படும்.

ரசிதங்கள். Preparations. இந்துபாபெரிரஞ்சம். Tincture of Indian Barberry. கொள். இந்துபாபெரி வேர்ப்பட்டை நறுக்கிப் பன்னிரண் டு அன்சு; புருவுசீது⁸ ஒருநாழி. அடைத்தபாத்திரத்தில் எழுநாளுறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்க அரித்து⁹ பிழிந்து வடித்து ஒருநாழியாகப் போதிய சீது சேர்க்கவும். களும்பிரஞ்சத்தைப்போலச் சியந்தனித்தும்¹⁰ இதை எடு க்கலாம்.

தேயம். அந்திபிராடியாக மூன்று முதல் ஆறுதிரும் குலைப்பன்(9)தொ டங்கமுன் கொடுக்கலாம். தொணிகமாக முப்பது துளிமுதல் இரண்டு தி ரும்வரைக்கு நாள் இரண்டுமூன்றுமுறை கொடுக்கலாம்.

இந்துபாபெரியின்வூசம். Infusion of Indian Barberry. கொள். இந்துபாபெரி வேர்ப்பட்டை துண்டுகளாக நறுக்கி, அரை அன்சு; கொதி வெந்நீர், பத்து அன்சு; மூடிய பாத்திரத்தில் ஒருமணிநேரமுறவிட்டு வடிக் கவும்.

தேயம். ஒன்றரை முதல் மூன்று அன்சு நாள் இரண்டு மூன்று முறை கொடுக்கலாம்.

இந்துபாபெரியேசிறுத்து. Extract of Indian Barberry. கொள். இந்துபாபெரி வேர்ப்பட்டை துண்டுகளாக நறுக்கி ஒரு இரூத்தல்; புருவுசீ தை இரண்டுநாழி. வேர்ப்பட்டையை ஒருநாழி சீதில் ஒருநாள் ஊறவிட் டிப் பின்பு சியந்தனியில் இட்டு மிச்சமான சீதை மெல்ல மெல்ல வார்த்து சீதைத் திஸ்திலி¹¹த்தெடுத்து எசிரூத்தைக் குளிகைப்பதமாய் வறட்டவும்.

தேயம். நாளுக்கொருமுறை இருபதுமுதல் முப்பதுகிறேன் கொடுக்க லாம்.

இந்துபாபெரியின் அந்தத்த இனங்களின் மரத்திலும் பட்டையிலும் இரு ந்து செய்யப்படுவதாகிய (Rasot) என்ற நீரான ஒர் எசிரூத்து கடைகளில் விலைப்படும். இது சுரச்சினியாகவும் கண் வியாதிகளில் (10) இடுமருந்தா கவும் சுதேசிகளால் மெத்த மதிக்கப்படும். இதில் அதிக வீதமான அசுத்த ங்கள் உண்டு. சுத்தமான வகைகள் கிடையாதிருந்தால் இதை அரைமுதல் ஒருதிரும் தேயமாக வழங்கலாம். ஆகிலும் இதை அலக்காலிற் கரைத்தால் அசுத்தங்கள் அதிற் கரையாமல் சுத்த எசிரூத்து கரையும். இக் கரைவைக் குளிகைப்பதமாய் வறட்டலாம்.

1 Berberine. 2 Crystalize. 3 Tonic. 4 Antiperiodic. 5 Diaphoretic. 6 Re-
mittent. 7 Extract. 8 Proof spirit. 9 Strain. 10 Percolate. 11 Distill.

(8) (9) (10) அனுபந்தம் பார்.

பபாவிருசியங்கள்.

PAPAVERACEAE.

சேங்கசகசா. RED POPPY.

வாசம். யுரோபமும் மத்திம ஆசியமும்.

வாகடபகுதி. அல்லிகள்¹. நல்ல சிவப்புநிறமும் கசகசாவின் மணமுமுடையன.

ரசிதம். Preparation. சேங்கசகசாச்சிறுபம். Syrup of Red Poppy. கொள். பச்சையான செங்கசகசாவிதழ்கள், பதின்மூன்று அன்சு; சுத்தசர்க்கரை, இரண்டேகால் இரூத்தல்; தண்ணீர் அரைநாழி அல்லது போதியது; திட்டசீது இரண்டரை அன்சு. தண்ணீரை நீர்மத்திகத்திற் காய்ச்சும் பொழுது இதழ்களைப் படிப்படியாய் அதற்குள்ளே போட்டு அடிக்கடி கலக்கிப் பின்பு பாத்திரத்தை இறக்கிப் பன்னிரண்டு மணிநேரம் ஊறவிடவும். பிற்பாடு நீரைப் பிழிந்து வடித்துச் சர்க்கரையைச் சேர்த்துச் சூடுகாட்டிக் கரைக்கவும். பாணி ஏறக்குறைய ஆறினபின் மூன்றுஇரூத்தல் பத்துஅன்சு நிறுக்கத்தக்கதாய்ச் சீதையும் வற்றிய தண்ணீர்அளவு தண்ணீரையும் அதனோடு சேர்க்கவும். பாணி 1.330 என்ற விசேஷகிராவிதம்² உடையதாயிருக்கவேண்டும்.

தேயம். ஒருதிரும். இது நிறங்கொடுப்பதற்கு மாத்திரம் வழங்கப்படும். அதிகாங்கையில் சுறுக்கு நொதிக்குமாகையால் செய்தவுடனன்றி உஷ்டணதேசங்களில் இது வழங்கத் தகுந்ததல்ல.

கசகசா. WHITE POPPY.

வாசம். தென்கிழக்கு யுரோபமும் மேற்கு ஆசியமும்.

வாகடபகுதி. காய்ச்சிக் கொட்டையெடுத்த முற்றற்கோதுகள். இவை உண்டையாயும் இரண்டு மூன்று இஞ்சு பருமையாயுமிருக்கும். காம்பற்றதும் சக்கரமயமுமான ஸ்திக்மத்தை³ மேற்பகுதியில் உடையவைகள். உருசி அவினின் உருசி. உயிர்க் கசகசாவின் காயிலிருந்தே அவின் எடுக்கப்படும்.

தன்மை. செரதீவம்⁴, அனுடைன்⁵.

உபயோகம். தாபிதங்கள்⁶, கன்றல்கள், சுளுச்சுகள், வேதனையுள்ள மற்றும் ஊறுகளில் இது வமன்றாஷ்⁷மாக நொந்தபகுதிக்கு அணைக்கப்படும்.

ரசிதங்கள். Preparations. கசகசாத்திகாக்கீதம். Decoction of Poppies. கொள். கசகசாக்காய் நசுக்கி, இரண்டு அன்சு; தண்ணீர் முக்கால்நாழி. மூடிய பாத்திரத்திற் பத்துமினி வரைக்கு அவித்து, வடிக்கவும். வடித்தநீர் அரைநாழியளக்கப் போதிய தண்ணீரை வடியிலுள்ள சக்கையின்மேல் வார்த்து வடிக்கவும்.

இது சாந்தியான வமன்றாஷ்மாக வெளியில் அணைக்கப்படும்.

கசகசாவேசிறுத்து. Extract of Poppies. கொள். காய்ந்து கொட்

1 Petal, பூவீழ். 2 Specific gravity. 3 Stigma. 4 Sedative, சாத்தனி. 5 Anodyne, அனுக்கினி. 6 Inflammation, 7 Fomentation.

டையெடுத்துப் பருக்கன் தூளாக்கிய கசகசாக்காய் ஒரு இரூத்தல்; திட்ட சீது இரண்டு அன்சு; கொதிவெந்நீர் போதியது. கசகசாக்காயை ஒருநாழி வெந்நீருடன் கலந்து ஒருநாளுறவிட்டு இடைக்கிடை கலக்கவும். சியந்தனியில் இட்டு இன்னும் வெந்நீர் வார்த்து, ஒரு கலன்சேருந்தனையும் அல்லது சாரம் முழுவதும் இறங்குந்தனையும் மெல்ல மெல்ல வடியவிடவும். வடிந்த நீரை அரைநாழியாய் வற்றுந்தனையும் நீர்மத்திக¹த்தில் வறட்டவும். ஆறினபின் சைத²ச் சேர்க்கவும். இந்தக் கலவைநீரை ஒருநாள் நிற்கவிட்டுப் பின்பு தெளிந்தநீரை வடித்து வேரூக்கி, எசுரூத்துக் குளிகைப்பதமாய் வறுந்தனையும் நீர்மத்திகத்தில் வறட்டவும்.

தேயம். இரண்டுமுதல் ஐந்து கிரேன்.

கசகசாச்சிறுபம். Syrup of Poppies. கொள். காய்ந்து கொட்டை நீக்கி பருக்கன்பொடியாக்கின கசகசாக்காய் முப்பத்தாறு அன்சு; திட்ட சீது பதினாறு அன்சு; சுத்த சர்க்கரை நாலு இரூத்தல்; கொதிவெந்நீர் போதியது. கசகசாப்பொடியை இரண்டு நாழி வெந்நீரிற் கலந்து ஒருநாள் ஊறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கவும். பிறகு சியந்தனியில் இட்டு, இன்னும் வெந்நீர்வார்த்து, இரண்டு கலன்³ சேருந்தனையும், அல்லது சாரம் இறங்குந்தனையும் நீரை மெல்ல மெல்ல வடியவிடவும். வடிந்த நீரை ஒன்றரை நாழியாய் வற்றுந்தனையும் நீர்மத்திகத்தில் வறட்டவும். நன்றாய் ஆறினபின் சைதச்சேர்த்து அக்கலவையைப் பன்னிரண்டு மணிநேரம் நிற்கவிட்டு வடிக்கவும். சைதத் திஸ்திலித்து⁴, சேஷமான நீரை ஒருநாழியாக வறட்டிப் பிற்பாடு சர்க்கரையைச் சேர்க்கவும். சிறுபம் ஆறரை இரூத்தல் நிறுக்கவும் 1.320 என்ற விசேஷகிரூவிதம்⁵ உடையதாகவும்வேண்டும்.

தேயம். ஒருதிரும். கூடவுங் கொடுக்கலாம். இது சூட்டுக்குச் சுறுக்கு நொதிக்குமாயைகால் காங்கையான தேசங்களிற் புதிது புதிதாய்ச் செய்தாலன்றி உதவாது.

அவின். Opium. இது உயிர்க் கசகசாப் பூண்டின் காயைச் கீறிவிட, வடிந்து இறுகின சாறு. இது நாலு அன்சுமுதல் இரண்டு இரூத்தல் நிறையுள்ள பல வடிவான கட்டிகளாக, கசகசா இலையால் மூடி வரும். பெரும்பான்மையாய் ஓர்வகைச் சுக்கான் கீரைநெற்றிற் பொதிந்துவரும். அவின் புதிதாயிருக்கும்போது பசைப்புள்ளதாய் ஒப்பமற்றதாய்ச் சற்றே ஈரிப்பாய்ப் பிய்ந்து செங்கருமையாயிருக்கிறது. விரலால் ஒப்பமாய் அழுத்த மினுங்கும். ஓர்வகை மணமும் உவட்டிப்பான கைப்புச் சுவையுமுடையது.

இத்தன்மைகள் துருக்கியிலுள்ள சிமிர்ண அவினுக்கே உரியன. பிரதானமாய்ப் பிறித்தனில் வழங்கும் அவின் இதுவே. கிழக்குத்தேச வைத்தியர் வழங்குவதும் யுரோப வியாபாரத்தில் அருமையுமான இந்துஅவினுக்கு இத்தன்மைகள் ஒவ்வா. இந்து அவினிற் பலவகையுண்டு. அவைகளுள் முக்கியமானவைகளாவன :

1. * பற்றா தோட்ட அவின். Patna Garden Opium. 2. * மாளவ அவின். Malwa Opium. இவைகளுள் முதல்வகை மருந்துக்கென்றுமாத்திரம்செய்யப்படுவது. அது அப்பிரகப்படலங்களில் மூடி அரை இஞ்சு தடிப்பான கபிலமெழுகாற் போர்க்கப்பட்டு இரண்டுமுதல் நாலுஇரூத்தல் சுனமானசதுரக்கட்டுகளாகவரும். இது வைரமானது. குளிர்காலத்தில் நொருங்கும். நிறங்

1 Water bath. 2 Spirit. 3 Gallon. 4 Distill. 5 Specific gravity.

கபிலமும் மணம் வீறுமாயிருக்கும். இதிலிருந்து அதி வீதமான மாவியம் எடுக்கப்படும். நூற்றுக்கு ஏழு எட்டுப் பத்துவீதமாய்த்தானும் மாவியம் எடுக்கப்படும். மாளவ அவினிற் பலவகையுண்டு. அவைகளுள் முக்கியமானவை இரண்டு வகை. ஒருவகை வெளிப்போர்வையில்லாமல் ஏறக்குறைய ஒன்றரை இரூத்தல் பாரமுள்ளதாய் வெளியில் மங்கலான கருமைநிறமும் உள்ளே கறுப்பும் மெதுவுமாய் வட்டித்த சில்லுகளாகவிருக்கும். மணம் சிமிர்ண அவினின் மணம்போலிருந்தும் வீறு குறைந்ததாய்ச் சற்றே புகைமணங் கலந்திருக்கும். சுவை கொடுமையாய் நிற்கிற கைப்பு. இதில் நூற்றுக்கு மூன்றுமுதல் ஐந்து வீதமாய் மாத்திரம் மாவியம் வரும். மற்ற வகை மாளவ அவினின் உச்சிதமானது. இது உருண்டைகளாக அல்லது சிறுச் சில்லுகளாக வரும். கசகசா அல்லிகளின் பருக்கன் துண்டுகளால் மூடப்பட்டிருக்கும். பத்து அன்சு பாரமுள்ளது. நிறம் உள்ளே கருங்கபிலம். தன்மை கெத்துக்கொரேமாதிரியானது. மணமும் சுவையும் முந்தினவகையைப் போலவே. இதில் நூற்றுக்கு ஏழு எட்டுப் பங்கு மாவியம் எடுக்கலாம். இந்து அவினின் மற்றும் வகைகள் இமயமலைஅவின் (11), கந்தீச அவின், குச்சு அவின் முதலியவைகள். இவை வித்தியாசமான வீறுள்ளவைகளாதலால் முந்தினவகையினின்று அரிதாய் மருந்துக்கு வழங்கப்படும். அவினிலுள்ள மாவியத்தின் (12) வீதத்தைக் கண்டுபிடிப்பதே அதற்கு நிச்சயமான சோதனை. மருந்துக்கு உவந்த மெதுவான அவினில் மாவியம் நூற்றுக்கு 6 முதல் 8 பங்கென்றுபிறித்தனிவாகடம்காட்டுகின்றது.

கேமிஸ்த் கூட்டுகள். Chemical Composition. அவினில் மெசனிக் கமிலம்¹ என்ற ஓர் சுய அமிலமும் மாவியம்² கோதியின்³ பபாவிரின்⁴ பர மாவியம்⁵ என்ற நாலு அல்கலை⁶ வங்களும், நாகுதின்⁷ நாகின்⁸ மெசனின்⁹ ஒபியனின்¹⁰ பாவிராக்சின்¹¹ என்னும் தடஸ்த கிரிஸ்தலிக்கக்கூடிய பதார்த்தங்களுமுண்டு. மேலும் அதிலே சில ராசங்¹²களும் பிசினும் நிணமும் எசிரூத்திவுப்¹³ பதார்த்தங்களும் கூச்சுக்கும்¹⁴ சொற்பமான அத்திரஎண்ணெய்யும்¹⁵ அநிந்திர உப்பு¹⁶களும் உண்டு. இப்பதார்த்தங்களுள் மாவியமும் கோதியினும் நாகதிகமும்¹⁷ செரதீவமு¹⁸மாகும்; நாகுதின் தொணிக¹⁹மும் அந்திபிராடி²⁰யுமாகும். மற்றுங் கூறுகளின் செயல் தெரியவில்லை. என்றாலும் ராசம் சத்துள்ளதாகத் தோன்றுகின்றது.

தன்மைகள். Properties. அவுஷத தேயங்களில் அவினின் முதன்மையான செயல் ஸ்சிமூல²¹மே. இரண்டாவதான செயல் நாகதிகம்; அனுடைன்²² அந்திஸ்பசி²³. இது பிரதானமாய்க் கோர்த்தகசேருமைய²⁴த்திற்சேஷ்டித்து, அதில்நின்று தோன்றும் நரம்புகள் வழியாய் உடம்பின் உறுப்புகள் ஒவ்வொன்றிலும் கூடக்குறையத் தாக்கும். இது வெயர்வையைமாத்திரம் அதிகப்படுத்தி மற்றெந்த விசர்க்கத்தை²⁵யுங் குறைக்கும். அதிதேயமாகில் வீரூன நஞ்சாகும்.

1 Meconic acid. 2 Morphia. 3 Codea. 4 Papaverine. 5 Paramorphia. 6 Alkaloid. 7 Narcotine. 8 Narceia. 9 Meconine. 10 Opianine. 11 Porphyroxine. 12 Resin. 13 Extractive. 14 Caoutchouc. 15 Volatile oil. 16 Inorganic salt. 17 Narcotic, காகி. 18 Sedative, சாந்தனி. 19 Tonic, ஓசதி 20 Antiperiodic. 21 Stimulant, 22 Anodyne. 23 Antispasmodic, கருச்சகினி. 24 Cerebro-spinal centre. 25 Secretion.

(11) (12) அனுபந்த ர்பார்.

உபயோகம். Uses. அவினின் உபயோகங்கள் அனேகமும் முக்கிய முமாம். தாபிதத்¹ல் விசேஷமாய் வசாசவ்²வின் தாபிதத்தில், இது தனித் தாவது கலமல்³ அந்திமனி⁴யோடும் மற்றும் மருந்துகளோடுங் கலந்தாவது அதிகமாய் வழங்கப்படும். அசத்துவ⁵த்தால் மரணநேரிடும் நோய்களைப்பார்க்க மூடம் அல்லது அசுவாசத்⁶தால் மரணநேரிடுஞ் சார்புள்ள தாபிதநோய்கள் வேறுநோய்களில் இது வழங்கப்படுவதரிது என்பது பொதுவிதி. பரியந்திரதபம்⁷ முதலிய முந்தினவகையான நோய்களில் இது முதற்றமருந்து. சுரங்களில் விசேஷமாய்ப் பிற்கூற்றில் இது தனித்தாவது அந்திமனி, கர்ப்பூரம் முதலியவற்றோடு கலந்தாவது, தசிரங்கள் நரம்புகளின் கிளர்ச்சியைத் தணித்து நித்திரையை வருவிக்க மெத்த உவந்ததாகும். ஆகிலும் கண்ணின் நயனேத்துவாரம்⁸ மெத்தச் சுருங்கியிருக்கையில் இது பொதுவாய் இணங்காது. வருத்தமான ஸ்பசு⁹ நோய்களில் அவினை அதிபிரமாணமாய்த் திரும்பத் திரும்பக் கொடுக்கப் பெரும்பாலும் உடனேசுகங்காணும். வயிற்றுறுப்புகளின் பலவகையான சரோக நிலைமைகளாகிய இரைப்பைப்புண், கன்சர்ப்புண்¹⁰, காலிககஸ்திரீது¹¹, கஸ்திரல்சி¹², சிரா¹³வாந்தி, அனுதாபவாந்தி, தியறீயம்¹⁴, திசந்தெரி¹⁵, வங்கவல்¹⁶, இறுகியவளி¹⁷ குடலடைப்பு முதலிய நோய்களில் இதைக்கொடுப்பதால் மெத்த நயங்காணும். சனன சலஉறுப்புகளின் நோய்களாகிய சலப்பைத்தபம்¹⁸ சலப்பைச்சலை¹⁹ சலபாதையின் ஸ்பசு²⁰ சுருக்குகளிலும், மெனுறீயம்²¹, திஸ்மெனுறீயம்²²த்திலும், கருப்பையழற்சி, கருப்பைத்தபம்²³, முதலிய நோய்களுக்கும் இது உவப்பான மருந்து. ஏர்ப்பு, தீவிரவாதம்²⁴, கம்பதியக்கம்²⁵, என்பவைகளுக்கும், அவின் முதல்மருந்தாகக் கொள்ளப்படும். வாந்திபேதிக்கும் இது கொடுக்கப்படும். ஆயினும் நயங்காண்பது சந்தேகம். கன்சர்புண்கள் காதனப்புண்க²⁶ளில் அவின் சடக்குழப்பத்தைத் தணிப்பதால் தானிகமான குணங்களிலும் நயங்காட்டும். வெளியிற் போடுவதற்குப் பலவகையான வாதம் நுறல்சி²⁷ வருத்தமான மற்றும் நோய்களிலுங் கண்ணோவிலும் கண்ணின் மற்றும் வியாதிகளிலும் இது மிக உவந்தது.

தேயம். Dose. காரியத்துக்குத் தக்கதாய் அவின் காற்கிறேன் முதல் இரண்டுகிறேன் வரைக்குங் கூடவுங்கொடுக்கப்படும். வருத்தமான அனேகம் நோய்களில் அவினுற் காணும் சகாயத்தின் அளவே அதிந்தேயத்தைக் குறிப்பதற்கு அறிகுறி. சிலவேளைகளில் அதிகமான அவினை மோசமின் நித் தாங்குவார்கள்.

ரசிதங்கள். *Preparations of Opium. அவினேசிறுத்து. Extract of Opium, கொள். அவின் மெல்லிய சீவலாக ஒரு இருத்தல் ;

-
- 1 Inflammation. 2 Serous. 3 Calomel. 4 Antimony. 5 Asthenia. 6 Aphonia.
 7 Peritonitis. 8 Pupil. 9 Spasmodic. 10 Cancer. 11 Chronic gastritis.
 12 Gastralgia. 13 Nervous. 14 Diarrhoea. 15 Dysentery. 16 Colica pictonum.
 17 Strangulated hernia. 18 Cystitis. 19 Cystirhoea. 20 Spasmodic.
 21 Menorrhoea. 22 Dysmenorrhoea. 23 Metritis. 24 Acute rheumatism.
 25 Delirium tremens. 26 Gangrene. 27 Neuralgia.
-

*பிறித்தன் பாமகுபீயத்திலிருந்தெடுக்கப்பட்ட இந்த ரசிதங்களுக்கு தருக்கி அவின் சேர்க்கவேணும். இந்துஅவினுக்குணைக்கமாய் இவைகளிற் சில மாற்றப்பட்டவேண்டுமென்பது பரீட்சையால்விளங்கும்.

தண்ணீர் மூன்று நாழி. அவினை ஒருநாழி தண்ணீரில் ஒருநாள் ஊறவைத்து நீரைப் பிழிந்தெடுக்கவும். சேஷமாயிருக்கிற அவினைத் திறமானகளியாக்கி மறுபடியும் ஒருநாழி தண்ணீரில் ஒருநாள் ஊறவைத்துப் பிழிந்தெடுக்கவும். மூன்றாம்முறையும் இப்படியே செய்து நீர்களைக் கலந்து கம்பளியில் வடித்து, குளிகையாகத் தகுந்த பதமான எசிருத்தாய் வருந்தினையும் நீர்மத்திகத்தில் வறட்டவும்.

தேயம். அரைமுதல் இரண்டு கிறேன். தூளாக்கின அவினைப்பார்க்க இது சுறைந்த ஸ்திமுலம், நயந்த செரதீவம்.

அவின் நீரேசிறுத்து. Liquid Extract of Opium. கொள். அவினெசிருத்து, ஒரு அன்சு; தண்ணீர் பதினாறு அன்சு; திட்டசீது நாலு அன்சு. அவினெசிருத்தைத் தண்ணீரில் ஒருமணிநேரம் ஊறவிட்டு அடிக்கடி கலக்கிப் பிறகு சீதையுஞ் சேர்த்து வடிக்கவும். வடித்தநீர் அரைநாழி அளக்க வேணும்.

தேயம். பத்துமுதல் நாற்பது துளி. இதில் ஒரு அன்சில் ஏறக்குறைய இருபத்திரண்டு கிறேன் அவினெசிருத்து இருக்கும். அவினிரஞ்சத்திலும் இது அரைக்காற்பங்கு வீறு கூடினது.

அவினிரஞ்சம். Tincture of Opium. லாடனம். கொள். அவின் பருக்கன் தூளாக, ஒன்றரை அன்சு; புருவுசீது¹ அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்தில் ஏழுநாள் ஊறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கி, தெளித்துப் பிழிந்து வடித்து, அரைநாழியாகப் போதிய புருவுசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். ஐந்து முதல் நாற்பது துளி. இதில் ஒரு அன்சிலே அவினின் கரையும் பதார்த்தம் முப்பத்துமூன்று கிறேன் அடங்கியிருக்கும். அதாவது பதினைந்து துளியில் ஒருகிறேன் அவின்வரைக்கு இருக்கும். இதை யாவது மற்றும் அவின் ரசிதங்களையாவது குழந்தைகளுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் கொடுப்பதில் மெத்த அவதானம் வேண்டும்.

அவினமோனரஞ்சம் Ammoniated Tincture of Opium. கொள். அவின் பருக்கன் தூளாக, நூறு கிறேன்; குங்குமப்பூத்தூள், பெஞ்சோயிக் கமிலம், வகைக்கு, நூற்றெண்பது கிறேன்; அனிஸதேல், ஒருதிரும்; அமோனகரநீர், நாலு அன்சு; திட்டசீது பதினாறு அன்சு. நன்றாயடைத்தபாத்திரத்தில் இவைகளை ஏழுநாள் ஊறவிட்டு, இடைக்கிடை குலுக்கி வடித்து நசுக்கி வடித்து அரைநாழியாகப் போதிய திட்டசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். அரைமுதல் ஒருதிரும். இதில் ஒரு அன்சில் ஐந்து கிறேன் அவின்வரைக்கு இருக்கும்.

அவின்வைன். Wine of Opium. கொள். அவினெசிருத்து, ஒரு அன்சு; இடித்த கறுவாப்பட்டை கரம்புகள், வகைக்கு எழுபத்தைந்து கிறேன்; செரிவைன் அரைநாழி. அடைத்த பாத்திரத்தில் ஏழுநாள் ஊறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கி வடிக்கவும்.

தேயம். பத்துமுதல் நாற்பது துளியுங் கூடவுங் கொடுக்கலாம். இதில் ஒரு அன்சில் அவினெசிருத்து இருபத்திரண்டு கிறேன்வரைக்கு இருக்கும். 1864 ம் ஆண்டின் பிறித்தனி வாகடத்திலும் ஏதிர்பரு தபுளின் வாகடங்களிலும் குறிக்கப்பட்ட அவின்வைனைப்பார்க்க இது காற்பங்கு பெலன்கூடினது. லண்டன்வாகட அவின்வைனில் ஐந்திலொருபங்கு பெலன்குறை

1 Proof spirit.

ந்தது; அவின்¹ரெசினுத்தின் பெலனுக்குச் சரிவந்தது. இது கண்ணேழும் தலிய நயனரோகங்களில் இடுமருந்தாக வழங்கப்படும்.

அவின்கூட்டுச்சூரணம். Compound Powder of Opium, கொள். அவி ன்தான் ஒன்றரை அன்சு; மிளகுதான் இரண்டு அன்சு; சுக்குத்தான், ஐந்து அன்சு; கறவிக் கொட்டை¹ தான், ஆறு அன்சு; திரககந்துத்² தான் அரை அன் சு. இவைகளை நன்றாய்க் கலந்து, மெல்லிய அரிப்பெட்டியில் அரித்து, கடைசியாய்க் குழியம்மியிற்போட்டு மெதுவாய் அரைத்து அடைத்த சீசா வில் வைக்கவும்.

தேயம். இரண்டுமுதல் ஐந்துகிறேன். இதற் பத்துக்கிறேனில் ஏறக் குறைய ஒருகிறேன் அவின் இருக்கும்.

அவின்லேகியம். Confection of Opium. கொள். அவின்கூட்டுச் சூ ரணம், நூற்றுத்தொண்ணூற்றிரண்டு கிறேன்; சீனிகம்³, ஒரு அன்சு. கல.

தேயம். ஐந்து முதல் இருபது கிறேன். இதில் ஏறக்குறைய நாற்பது பங்கில் ஒருபங்கு அவின் இருக்கும்.

அவின்வில்லை. Opium Lozenges. கொள். அவின்னெசினுத்து எழுப த்திரண்டு கிறேன்; தொலுரஞ்சம்⁴ அரை அன்சு; சுத்தசர்க்கரை மாவாக, ப தினாறு அன்சு; அகசிப்பிசின்⁵ மாவாக இரண்டு அன்சு; அதிமதுர வெசினு த்து⁶. ஆறு அன்சு; தண்ணீர் போதியது. அதிமதுர வெசினுத்தை நீர்மத்தி⁷ கத்திற் குடாக்கிக்கொண்டு கொஞ்சத்தண்ணீரால் இளக்கி, அவின் எசினு த்தோடும் தொலுரஞ்சத்தோடும் சேர்க்கவும். இந்தக் கலப்புச் சரியானப தத்துக்கு வந்தபின் அதைக் கலத்தட்டிற் போட்டு முதலே ஒன்றாக அரை த்த சர்க்கரையையும் பிசினையும் இதோடு சேர்த்து நன்றாய்க் கலக்கவும். இந்தத் திரளையை 720 வில்லையாகத்தட்டி மட்டான சூட்டில் உலர்த்தவும்.

தேயம். ஒன்றுமுதல் ஆறு வில்லை. ஒவ்வொரு வில்லையிலும் அவின்னெ சினுத்துப் பத்திலொருபங்கு கிறேன் இருக்கும்.

அவின்னீமம். Enema of Opium. கொள். அவின்னீரஞ்சம்⁸ அரைத் திரும்; அமைலமுசிலாகு⁹ அல்லது தடித்த கஞ்சித்தெளிவு இரண்டு அன்சு. கல.

அவின் லின்மென். Liniment of Opium. கொள். அவின்னீரஞ்சம்⁹ சபுலினிமென்¹⁰ வகைக்கு இரண்டு அன்சு. கல.

வாதத்துக்கும் வருத்தமான மற்றும் நோய்களுக்கும் இது மெத்த உவப் பாண பூச்சு.

அவன்பற்று. Opium Plaster. கொள். அவின், மாவாக ஒரு அன்சு; இராஸப்பற்று¹¹, ஒன்பது அன்சு. இராஸப் பற்றை நீர்மத்திகத்தில் உருக்கி யபின் அவினைக் கொஞ்சங்கொஞ்சமாய்ச் சேர்த்துத் தீர்ப்பாய்க் கலக்கவும்.

அவின்லினிமென் உதவக்கூடிய நோய்களுக்கே இதுவும் உதவும்.

மேலே சொன்ன ரசிதங்களிலன்றி, இபிகாக் ஸ்குவிறி¹² குளிகை, வங்கவ லின்குளிகை, சபுக்¹³ கூட்டுக்குளிகை, கிரீதவவினசுகந்த சூரணம்¹⁴, இபிகா க் கூட்டுச்சூரணம், கீனுக்¹⁵ கூட்டுச்சூரணம், பூரக்கூட்டிரஞ்சம்¹⁶. மாசவவி னன்கென்¹⁷, வங்கக் கூட்டுத்தலஸ்தம்¹⁸, இவைகளிலும் அவின் சேரும்.

1 Caraway. 2 Tragacanth. 3 Syrup. 4 Tincture of tolu. 5 Gum acacia. 6 Extract of liquorice. 7 Water bath. 8 Tincture opium. 9 Mucilage of amyllum. 10 Soap liniment. 11 Resin plaster. 12 Pill of Ipecac with squill. 13 Soap. 14 Aromatic powder of chalk with opium. 15 Kino.

16 Compound tincture of camphor. 17 Ointment of gall and opium.

18 Compound lead suppository.

அவினின் மற்றும் ரசிதங்கள். Other Medicinal Preparations of Opium. மாவியவைருகுலோறசு. Hydrochlorate of Morphia. இதைக் குறிக்குஞ் சின்னம் கா¹⁷ ஐ¹⁹ நீ^{அ³} ஐகு, ³ஐ²அ. இது பட்டுப் போல் மினுக்கமும், வெண்மையுமாய் வசையத்தக்க ஊசிபோன்ற கிரிஸ்தல்¹களாகவிருக்கும். பரமாணு படுவதால் மாறுதல் அடையாது; தண்ணீரிலும் சீதிலுங் கரையும். தண்ணீரில் கரைத்துக் காடிக்காரஞ்சேர்க்கத் தயிர்போன்ற வெண்ணடையல் விழும். இதின் பெலன் 200 பங்கு தண்ணீருக்கு 1 பங்கானால், அயபிரகுலோறிர³ நீர் சேர்க்கக் கடுமையான நீலநிறங்கொள்ளுமானாலும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு மாத்திரம் நிற்கும். இதை வீரூன நீதுரிக்க மில⁴த்தில் நனைக்க மஞ்சட்சிவப்பாகும். அயபிரகுலோறிர³ நீர் சேர்க்கப் பச்சை நீலநிறமாகும். சூட்டுக்குச் சேஷமின்றி ஆவியாய்விடும். இந்த உப்பில் இருபது கிறேனை அரை அன்சு வெந்நீரில் கரைத்து மிகச் சொற்பமான அமோனம் சேர்க்க, ஆறும்போது கிரிஸ்தலான அடையல்விழும். இந்த அடையலச் சொற்ப தண்ணீரில் கழுவிக்காற்றில் உலர்த்த 15.18 கிறேன் நிறுக்கும்.

தன்மைகளும் உபயோகமும். அவினிரஞ்சத்தைப் போலவிருக்கும். அதைப்பார்க்க இதினால் நாடிநாளங்களில் உண்டாகுங் கிளர்ச்சியும், தலையிடி, கிறுதி, சோகம், மலவரட்சிகளும் குறைவு. ஆதலால் இது நயமென்று கொள்ளப்படும். என்றாலும் மாவியமும் அதின் உப்புகளும் நயம் வருவியாத அனேக கருமங்களில் அவினால் நயங்காணும். நரம்பழற்சியைத் தணிக்கிறதற்கும் உடம்பைச் சாந்தப்படுத்துகிறதற்கும் இது விசேஷமாய்த் தகுந்தது. பெருந்தேயங்களில் இது வீரூன கிராக நஞ்சு. உடம்பிலே தோலிற் குற்றிப் புகட்டினால் இதின்முழுச்செயலும் சீக்கிரத்திற் காணும்.

தேயம். அரைக்காற் கிறேன்முதல் ஒருகிறேன்வரைக்குக் கொடுக்கலாம்.

ரசிதங்கள். Preparations. மாவிய வைரு குலோறசு நீர். Solution of Hydrochlorate of Morphia. கொள். மாவியவைருகுலோறசு, நாலு கிறேன்; கிருசவைருகுலோறிக்கமிலம்⁵, எட்டுத் துளி; திட்டசீது⁶இரண்டு திரும்; தண்ணீர் ஆறுதிரும். ஐருகுலோறிக்கமிலத்தையும், சீதையும், தண்ணீரையும், ஒன்றாய்க் கலந்து, மாவியவைருகுலோறசை அந்தக் கலவையிற் கரைக்கவும்.

தேயம். பத்து முதல் அறுபது துளி. இதில் ஒரு திராயில் அரைக்கிறேன் மாவியவைருகுலோறசு அடங்கியிருக்கும். இது லண்டன் வாகடத்திற் சொல்லப்பட்ட மாவியவைருகுலோறசு நீரில் அரைப்பெலனானது.

மாவிய வில்லை. Morphia Lozenges. கொள். மாவியவைருகுலோறசு இருபது கிறேன்; தொலூரஞ்சம்⁷ அரைஅன்சு; சுத்த சர்க்கரைமா, இரு பத்துநாலு அன்சு; அகசிப்பிசின்மா⁸ ஒரு அன்சு; அகசி முசிலாகு⁹, போதியது; திஸ்திலித்த தண்ணீர் அரைஅன்சு. மாவியவைருகுலோறசைத் தண்ணீரில் கரைத்து, தொலூரஞ்சத்தையும் முசிலாகையும் ஒன்றாகவும், பிசினையும் சர்க்கரைமாவையும், பிங்னொன்றாகவும் கலக்கவும். முதற்கலவையிற் ண்டையுங் கலந்து அவைகளோடு பிந்தின கலவையையுஞ் சேர்த்து ஒரேதி

1 Crystal. 2 Spirit. 3 Perchloride of iron. 4 Nitric acid. 5 Dilute hydrochloric acid. 6 Rectified spirit. 7 Tincture of tolu. 8 Gum acacia.

9 Mucilage.

ரணயாக்கி, 720 வில்லைகள்செய்து சூடான காற்றறையில் மட்டான அனலில் உலர்த்தவும்.

ஒவ்வொரு வில்லையிலும் மாவியவைருகுலோறசு முப்பத்தாறில் ஒருபங்கு கிறேன் இருக்கும்.

மாவியஇபிகாக்குவிலை. Morphia and Ipecac Lozenges. கொள். மாவியவைருகுலோறசு, இருபது கிறேன்; இபிகாக்குத் தூள், அறுபதுகிறேன்; தொலூரஞ்சம், அரை அன்சு; சுத்தசர்க்கரை மா, இருபத்து நாலு அன்சு; அகசிப்பிசின்மா, ஒரு அன்சு, அகசிமுசிலாகு, போதியது; திஸ்திலித்த தண்ணீர் அரை அன்சு. தொலூரஞ்சத்தையும் முசிலாகையும் ஒன்றாகக் கலந்தபின் அவற்றோடு மாவியவைருகுலோறசைத் தண்ணீரிற்கரைத்துச் சேர்க்கவும். இக்கலவையை இபிகாக்கு, பிசின், சர்க்கரைமா, மூன்றும் நன்றாய்ச் சேர்ந்த கலவையோடு சேர்த்து எல்லாவற்றையும் ஒர்திரணயாக்கி, 720 வில்லையாகப் பிரித்து சூடான பரமானுவுள்ள அறையில் மட்டான அனலில் உலர்த்தவும். ஒவ்வொரு வில்லையிலும் மாவியவைருகுலோறசு, முப்பத்தாறிலொருபங்கு கிறேனும் இபிகாகு பன்னிரண்டிலொருபங்குகிறேனும் அடங்கியிருக்கும்.

இந்த வில்லையையும் இதற்கு முன் சொல்லப்பட்ட வில்லையையும் வாயிலிட்டுக் கரையவிட, இருமலுடன் தொண்டை மிடற்றின் அழற்சிகள் தணியும். காரியத்துக்குத் தக்கதாய் ஒருநாளேக்குப் பத்துமுதல் இருபது வில்லை வழங்கலாம்.

மாவியதலஸ்தம். Morphia Suppositories. கொள். மாவியவைருகுலோறசு, ஆறுகிறேன்; கிட்யபெஞ்சோவசு¹, அறுபத்துநாலுகிறேன்; வெண்மெழுகு, இருபதுகிறேன்; தியுரோமநெய்², தொண்ணாறு கிறேன். மெழுகையும் தியுரோம நெய்யையும் மென்குட்டில் உருக்கவும். மாவியவைருகுலோறசைக் கிட்யபெஞ்சோவசோடு முதலே உரலில் இட்டு அரைத்துக்கொண்டு, முன்னுருக்கப்பட்டவற்றோடு சேர்த்து மறுபடியெல்லாவற்றையுந் திறமாய்க் கலக்கவும். இக்கலவையை நீராயிருக்கையில் பதினைந்துகிறேன் கொள்ளக்கூடிய தகுந்த குகைகளில் வார்க்கவும். அல்லது அதை ஆறவிட்டுப் பன்னிரண்டு சமபங்குகளாக வெட்டித் தலஸ்தத்துக்கு வசதியான வால்காலான அல்லது வேறுசாங்கமாகக்கொள்ளவும்.

ஒவ்வொரு தலஸ்தத்தில் மாவியவைருகுலோறசு அரைக்கிறேன் இருக்கும். இத் தலஸ்தத்தைக் கடைக்குடல், கருப்பை சலப்பைகளினதும் அயற்பகுதிகளினதும் நோய்களில் கடைக்குடலுக்குள்ளே புகுத்த மெத்தச் சகாயமுண்டாகும். உள்ளே செலுத்துகையில் அபானத்தைச் சுருக்கும் பேசிக்கு அப்பால் அதைக் கவனமாய்ச் செலுத்திவிடப்பார்க்கவேணும்.

மாவியவசீதக. Acetate of Morphia. இதற்குச் சின்னம். கா¹⁷ ஐ¹⁹ நீ^{அ3} கா³ ஐ⁴ அ⁵. இது தண்ணீரிலும் சீதிலும்³ கரையக்கூடிய வெண்தூள். இதின் கரைவில் பதாசியை⁴ விட, அடையும் அடையல் மிஞ்சிய அல்கலை⁵ யாற் கரையும். நீதுரிக்கமில்⁶ மும் அயபிரகுலோறி⁷ மும் மாவியவைருகுலோறசிற் போலவே இதில் சேஷ்டிக்கும். இந்த உப்புக்குச் சல்வுரிக்கமிலஞ்சேர்க்கக் காடியான ஆவி கக்கும்.

தேயம். எட்டில் ஒருபங்கு கிறேன் முதல் அரைக்கிறேன் வரைக்குங் கொடுக்கலாம். கூடவுங் கொடுக்கலாம்.

1 Benzoated Lard. 2 Oil of Theobroma. 3 Spirit. 4 Potash. 5 Alkali, 6 Nitric acid. 7 Perchloride of iron. 8 Hydrochlorate of morphia. 9 Sulphuric acid.

ரசிதம். Preparation. மாவியவசிதசு நீர். Solution of Acetate of Morphia. கொள். மாவியவசிதசு நாலு கிறேன்; கிருசு அசிதிக்கமில்¹ம்¹ எட்டுத்துளி; திட்டசீது² இரண்டு திரும்; தண்ணீர் ஆறுதிரும். அமில்ம்³ சீது தண்ணீர் மூன்றையும் ஒன்றாகக் கலந்து அக்கலவையிலே மாவியவசிதசைக் கரைக்கவும்.

தேயம். பத்துமுதல் அறுபதுமினிம்³. இந்த நீர் இரண்டு திரும்பில் மாவியவசிதசு ஒருகிறேன் அடங்கியிருக்கும். லண்டன் வாகடத்திற் குறித்த மாவியவசிதசுநீரைப் பார்க்க இதில் அரைப்பங்கு மாவியம் இருக்கும்.

*நாகுதீன். Narcotine. இது அவினில் நூற்றுக்கு 1 முதல் 8 வீதமாக அடங்கியிருக்கிற கிரிஸ்தவி⁴க்கக்கூடிய தடஸ்த⁵பொருள். நிறம் மணம் சுவையற்றது. முத்துப்போல் மினுக்கமானது. தட்டை ஊசிகளாக இருக்கும். தண்ணீரிலாவது பதாசி⁶நீரிலாவது கரையாது. திட்டசீதிற் கரையும். ஈதரில்⁷ இன்னும் அதிகமாய்க் கரையும். கிருசு அமில்ங்க⁸ளோடுசேர்த்தால் மெத்தக் கசப்பான நீர்களாகும் இந்த நீர்கள் கிரிஸ்தல் உப்பை ஈவதுமில்லை, அயபிரகுலோறி⁹ஞ் சேர்க்கும்போது நீலமாவதுமில்லை.

தன்மை. தொணிகம்¹⁰, அந்திபிராடி¹¹. இது சுத்தியானால் மயக்குந் தன்மை சற்றுமிராது. பெருந்தேயத்திற் சுவேதனி.

உபயோகம். முறைச்சுரங்களிலும், பொதுவான பெலவீனத்திலும் விசேஷமாய் நெடுநாட் பால்கொடுத்ததாலுண்டான பெலவீனத்திலும், கடுமையான சுரங்கள் தாபித¹²வியாதிகளில்நின்று சுகப்படுகையிலும் கீழைத்தேசங்களில் இது மெத்த நயந்த மருந்தாய்ப் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது(13).

தேயம். தொணிகமாக அரை முதல் ஒருகிறேன், நாள் மூன்றுமுறை. அந்திபிராடியாக இரண்டு முதல் மூன்று கிறேனேத் தண்ணீரிற் சொற்ப ஐருகுலோறிக்கமில்ம் அல்லது சல்வரிக்கமில்ம் விட்டுக்கரைத்து நாள் மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம்.

அவாகடச்சரக்த Non Officinal.

பிரமதண்டு, குருக்கஞ்சேடி. Argemone Mexicana. இது அமரிக உஷ்டண தேசங்களுக்குரிய செடி. இப்போ இந்து அடங்கலும் உண்டு. இதின் கொட்டைகளைப் பிழிய ஓர் திர¹³எண்ணெய்வரும். மேற்கிந்திய வைத்தியர் இளம்பேதியாக இதை வெகுகாலம் வழங்கிவந்தார்கள் (14). ஒஷானசி பண்டிதர் இதற்கு மாறாகச் சொன்னதால் அதை விட்டுவிட்டார்கள். ஆகிலும் சற்காலம் வங்காளத்திலுள்ள பலவைத்தியர் இதின் தன்மைகளைப்பற்றிப் பண்ணிய ஆராய்வுகளால் அரைத்திரும் தேயங்களில் இது இளம்பேதியாகச் சேஷ்டிக்கிறதென்றும், அதின்செரதீவ¹⁴தன்மையால் அது குடல்வலியைத் தணிக்கிறதென்றுங் காணப்பட்டது. இதின் தேயம் சொற்பமாயும் செயல் இளக்கமாயுமிருப்பதால் இதைவழங்குவது நியாயமாகும். பழையதானால் இதின் செயல்குறையும். பழையதைப் பார்க்கப் புதிதாய்ச்செய்தஎண்ணெயின்செயல் அதிகமாயும் ஒழுங்காயும்இருக்கும். ஏர்பிசுக்¹⁵கரப்பனுக்கும் மற்றும் வகையான தோல் வியாதிகளுக்கும் இதையிட்டால் அது அவைகளை மெத்தச் சார்தப்படுத்துமென்று பனவியர் வைத்திய

1 Dilute acetic acid. 2 Rectified spirit. 3 Minim. 4 Crystallize. 5 Neutral. 6 Potash. 7 Ether. 8 Dilute acids. 9 Perchloride of iron. 10 Tonic. 11 Antiperiodic. 12 Inflammation. 13 Fixed oil. 14 Sedative, ~~செரதீவ~~. 15 Herpes.

(13) (14) அனுபந்தம் பார்.

ரும் பிறரும் சொல்லுகிறார்கள். இச்செடியிற் பிழிந்த பசைப்பான மஞ்ச ன்நிறச்சாற்றை மந்தமான கெட்ட புண்களுக்கு இடல் மெத்த நயமென்று சுதேசிகள் பாராட்டுகிறார்கள். இதை இப்படி வழங்கி மெத்த நயங்கண் டோமென்று வம்பாயிலுள்ள தைமக்கு வைத்தியர் சொல்லுகிறார். சுதேசிக ன் கண்ணோவில் இந்தச் சாற்றைக் கண்ணுக்கு இடும் வழக்கம் மோசமான து. கெமிஸ்த தன்மை அவுஷ்ததன்மை இரண்டிலும் இந்தச் செடியை ஆ ராய்வது தரும்.

கூர்மீகனுசிப்பூடு, நிபால்மீகனுசிப்பூடு. *Meconopsis aculeata* and *M. Nipalensis*. இந்த இரண்டு பூண்டுகளும் இமய மலையிலுள்ளவைகள். இவைகள் வீரான மயக்குந் தன்மையும் நச்சுத்தன்மையு முடையவைகள். விசேஷமாய் வேரே இப்பெயர்ப்பட்டதென்றும் சிலர் எண்ணுகிறார்கள். ஆயினும் கூர்வகையின் வேரினது அலங்காலெசுராத்¹தில் ஒருதிராமை ஒஷா னசியர் ஓர் நாய்க்குக் கொடுத்தபோது ஓர்செயலுங்காணப்படவில்லை. எனி னும் இது இன்னும் ஆராயப்படவேண்டியது.

கோவன் கறிடலிஸ் கிழங்கு. *Corydalis Govaniana*. இது இமயமலை யிலுள்ள ஓர் தாவரம். இதின் வேரில் கறிடலின்² என்ற கிரிஸ்தலி³க்கக்கூ டிய ஓர் சத்தை ஒஷானசியர் கண்டுபிடித்தார். இது முத்துப்போன்ற கிரி ஸ்தல்களாகவிருக்கும். அமிலங்க⁴ளிற் கரைந்து உப்புகளாகும். இந்த உ ப்புகள் கிரிஸ்தலியாமல், மெத்தக் கசப்பாயிருக்கும். இருபது கிரேனைக் கரைத்து நாப்களுக்குக் கொடுத்தபோது ஒரு வருத்தமுமுண்டாகவில்லை. இதை இன்னும் ஆராய்ந்தால் தொணிக்⁵மும் அந்திபிராடி⁶யுமாய்க்காணுமெ ன்று ஒஷானசியர் நம்புகிறார்.

குருச்விரங்கள்.

CRUCIFERIAE.

அமுருசிப்பூடு. HORSE RADISH.

வாசம். யுரோபம், வடஅமரிக்கத்தின் எப்பகுதியிலும் செய்கைபண்ண ப்படும்.

வாகடபகுதி. பச்சைக் கிழங்கு. இது நீண்டு திரண்டு அரை இஞ்சமு தல் ஒருஇஞ்சு பருமையாயிருக்கும். அடி குறுத்த பல காம்புகளாகவிரிந் திருக்கும். உட்பகுதி வெண்மை. சுவை காரமானது, மணமுள்ளது. இதைத் திஸ்திலித்தால்⁷ மெத்தக்காரமான மணமும் சுவையுமுள்ள ஓர் அத் திர⁸ எண்ணெய்வரும்.

தன்மைகள். ஸ்திமுலன்⁹,சுவேதனி¹⁰, தியுறீசம்¹¹. வெளியிற் பூச அழற் றிக் கொப்புளங்கொள்ளும். சப்ப உமிழ்நீர் பெருகும்.

1 Alcoholic extract. 2 Corydalin. 3 Crystal. 4 Acid, 5 Tonic, ஓசதி. 6 Anti-periodic, சமயீகரி. 7 Distillation. 8 Volatile oil. 9 Stimulant, தீவனி.

10 Diaphoretic. 11 Diuretic. அமுரீதி.

உபயோகம். அசத்துவ¹மான நீர்க்கோவை வியாதிகள், காலிகவாதம்², ஸ்கேவி³ முதலியவற்றுக்கு இது உண்மருந்தாகும். தானிகமாக பற்கொதிக்கு இதை மெல்லுவார்கள். இளக்கத்தாலுண்டாகுங் குரற்கனப்பில் கார்டிலாக வழங்கப்படும்; சோர்வுமுதலியவற்றில் ஸ்திமுல பூச்சாக அல்லது களியாக வழங்கப்படும்.

ரசிதங்கள். Preparations. அமுரசிக்கூட்டில்பிற்று. Compound Spirit of Horse radish. கொள். துரிவின அமுரசிக்கிழங்கு, துவைத்த கைச்சுற் தோடந்தோல், வகைக்கு இருபது அன்சு; துவைத்த சாதிக்காய், அரை அன்சு; புரூவுசீது⁴, நாலுநாழி; தண்ணீர் ஒருநாழி; கலந்து மட்டான சூட்டில் நாலுநாழி திஸ்திலிக்கவும்.

தேயம். ஒன்று முதல் இரண்டு திரும். அமுரசிக் கிழங்குக்கு முருங்கைவேர்ப்பட்டை நல்ல பதிலாகும்.

கடுகு. MUSTARD.

இதில் கருமை வெண்மையென்று இரண்டு வகை உண்டு.

வாசம். யுரோபம். பூமியின் மற்றும் பல பகுதிகளிலும் இது அதிகமாக யுண்டு.

வாகடபகுதி. இரண்டு இனக் கடுகையுங் கலந்து தாளாக்கின கலவை. இது பசுமையான மஞ்சள்நிறமும் கார்ப்பும், கைப்பும் நெய்ப்புத்தன்மையும் காரமான சுவையுமுள்ளது. காய்ந்திருக்கையில் மணமில்லை. ஈரமாயிருக்கையிலோ காரமும் உறைப்பும் நாசி கண்களுக்கு மெத்த அழற்சியுமான ஓர்வகை மணம் வீசும். அவித்துக் குளிர்த கடுகுநீர் இயோத ரஞ்சுத்தால் நீலநிறமாகாது.

தன்மை. வெளியில் இட்டால் ரூபிவாஷன்⁶ தோலோடணைந்தபடி வெகுநேர மிருக்க விட்டால் கொப்புளிக்கும். உணவோடுசொற்ப அளவாக உட்கொண்டால் சீரணியாகும். ஒரு தேய்க்கரண்டி முதல் மூன்று தேய்க்கரண்டி வீதமாக கால்நாழி தண்ணீர் கரைத்துக் குடித்தால் விக்கினமின்றி விரைவில் வாந்திக்கும்.

உபயோகம். சுரவியாதிகள் தாபித வியாதிகளின் பிற்கூற்றில் மும்முரந்தணிந்திருக்கையிலும் உட்கஞ்செஸ்தம்⁷ கருசு⁸ நுறல்சி⁹, வாத நோய்கள், கோர்த்தகசேருமண்டலத்தின்¹⁰ சரோக¹¹ நிலைமைகள் முதலியவற்றிலும் எதிரழற்சி¹²யும் திறீவதி¹³யும் தேவையாயிருக்கையில் கடுகுப்பற்று மெத்த உவப்பான வெளிமருந்தாகும். வெறியிலும் உடம்பின் பெலனைக் குறைக்காமல் இரைப்பையை வெறுமையாக்கவேண்டியிருக்கிற பிற கருமங்களிலும் இது வமனியாகக் கொடுக்கப்படும்.

ரசிதம். Preparation. கடுகுப்பற்று. Sinapism. கொள். கடுகுத்தூள், லீனமா, வகைக்கு இரண்டரை அன்சு; தண்ணீர் அல்லது இளவெந்நீர் பத்து அன்சு. லீனமாவைத் தண்ணீரோடு படிப்படியாய்க் கலந்து ஓயாமற் கலக்கிக்கொண்டு கடுகுத்தூளையுஞ் சேர்க்கவும்.

லீனமா இல்லாதிருந்தால் நெல்லரிசிமா சேர்க்கலாம். அல்லது அதை முற்றாய் விட்டுவிடலாம். பற்றுப் போட்டபின் எரியும்போதாவது தோல் நல்லாய்ச் சிவந்த உடனாவது அதை எடுக்கவும்.

1 Atonic. 2 Chronic rheumatism. 3 Scurvy. 4 Gargle. 5 Proof spirit. 6 Rubefacient, சோனதி. 7 Congestion, சஞ்சம். 8 Spasmodic. 9 Neuralgia. 10 Cerebro-spinal system. 11 Morbid. 12 Counter-irritant. 13 Derivative.

கடுகுத்தேல். Oil of Mustard. இது கருங்கடுகிலுள்ள திரவெண்ணெயைப் பிழிந்தெடுத்தபின் அதைத் தண்ணீரோடு திஸ்திலித்²தெடுத்த எண்ணெய். இது நிறமற்றது, அல்லது சொற்பமஞ்சள்நிறமுள்ளது; விசேஷ கிராவிதம்³ 1.015; அலக்காலிலும் ஈதரிலும் தாராளமாயும் தண்ணீரில் சொற்பமாயுங் கரையும். காரமான மணமுள்ளது; உறைப்பும் எரிவுமான சுவையுடையது. தோலில் இட சீக்கிரத்திற் கொப்புளிக்கும்.

கடுகுக்கூட்டு லினிமென். Compound Liniment of Mustard. கொள். கடுகுத்தேல், ஒருதிரும்; மெசீரியவீதரெசிராத்து⁴, நாற்பதுகிரேன்; பூரம் தூற்றிருபதுகிரேன்; ஆமணக்குத்தேல், ஐந்துதிரும்; திட்டசீது நாலுஅன்சு. மெசீரிய வெசிராத்தையும், பூரத்தையும் சீதிற் கரைத்து, கடுகுத்தேலையும் ஆமணக்குத்தேலையுங் கூட்டவும்.

வாதங்கள் சோர்வுகளுக்கு இது நல்ல ஸ்திமுல பூச்சு.

*இந்துக் கடுகு. INDIAN MUSTARD.

வாசம். இது இந்துவின் எப்பகுதிகளிலுமுண்டாக்கப்படும்.

வாகடபத்தி. கொட்டை. இது இந்துதேசக் கடைகளில் வழங்குவது. நிறம் கருஞ்சிவப்பு. வெண்கடுகு கருங்கடுகின் தன்மைகள் இதற்குமுண்டு. அவைக்காக இதை வழங்கலாம். பிரதானமாய்க் கடுகுப்பற்றுக்கு உத்தமமாகும். இவைகளிலுள்ள திர எண்ணெய்யைப் பிழிந்துதள்ளினால் இவைகளின் காரமதிகரிக்கும். பழையதானாற் காரம் மெத்தக் குறையும்; ஆகையாற் புதுக்கடுகை வழங்கவேண்டும்.

க ப ப ரி டி ய ங் க ள் .

CAPPARIDAE.

அவாகடச்சரக்கு. Non Officinal.

வேளை. Gynandropsis pentaphylla. இது இந்துவிலுள்ள வாடிக்கையான பூண்டு. பெருங்காயத்தைப் போன்ற மணமுடையதாயும் அதில் இதமாயுமிருப்பதால் இது அந்துஸ்பசி⁷ யாகுமென்று சிறி ஜோன்சு சொல்லுகிறார். இதின் இலைகளைத் துவைத்து அணைக்கத் தோல் சிவந்து கொப்புளிக்குமென்றும் கொப்புளப்பற்றின் வருத்தமில்லாமல் அதினாற் காணும் சகாயம் பெரும்பாலும் இதினாற்காணுமென்றும் வைத்தர் சொல்லுகிறார், காதவாதைக்கு இதின்சாறு பேர்பெற்ற மருந்தென்று இந்துக்களும் இப்பூண்டுவளரும் மேற்கிந்தவின் குடிகளும் இதைக் கொண்டாடுவார்கள். இதின் கொட்டை கடுகுக்கொட்டைக்குப் பதிலாக வழங்கப்படுகிறதென்றும் அதிலிருந்து நல்ல எண்ணெய் பிழியுமென்றும் சாற்று வைத்தியர் சொல்லுகிறார்.

1 Fixed oil. 2 Distill. 3 Specific gravity. 4 Alcohol. 5 Ether. 6 Etherial Extract of Mezereon. 7 Antispasmodic கடுகுகினி.

கனேலாசியங்கள்.

CANELLACEAE.

வேண்கனேலம். CANELLA ALBA.

வாசம். மேற்கிந்து.

வாகடபகுதி. பட்டை. இது சுருள்சுருளாக அல்லது உடைந்த துண்டுகளாக வரும். கடுமையும் வெண்மஞ்சள் நிறமுமானது. உட்பக்கத்தின் நிறம் சற்றே வெண்மைகொண்டது. கரம்புபோல் சுகந்த மணமும் மிளகுபோல் உறைப்பான சுவையுமுடையது. இதின் வீறு ஓர் அத்திர¹ எண்ணெயிலும் கைப்பான ஏசுரத்திலும்² ராளத்திலும்³ அடங்கியிருக்கிறது.

தன்மைகள். சுகந்த ஸ்திமுலம்.

உபயோகம். இது முக்கியமானதல்ல. பெரும்பாலும் மற்றுஞ் சரக்குகளோடு சேர்த்து, பெலவீனம், குன்மம்⁴, ஸ்கேவி⁵ முதலிய நோய்களுக்குக் கொடுக்கப்படும்.

தேயம். தூளாகப் பத்து முதல் முப்பது கிரேன்.

ரசிதம். இது வரியாத்து வைனில்⁶ ஓர் கூட்டாகச்சேருகின்றது.

பிக்சினியங்கள்.

BIXINEAE.

*சால்முக்கிரம் CHAULMUGRA.

வாசம். இது மலாய், கிழக்கிந்துதேசக் காடுகளில் வடக்கு அசம் வரைக்கும் அப்பால் இமயமலையின் அடிநெடுக மேற்கே சிக்கீம் வரைக்கும் உண்டு.

வாகடபகுதி. கொட்டைகள். இவைகளின் நீளம் ஒரு இஞ்சுவரைக்கிருக்கும். முட்டை வடிவம். ஒன்றோடொன்று நெருங்கி வளர்வதினால் நசிந்த சாங்கங் காட்டும். ஒவ்வொரு கொட்டைக்கும் நரைக் கபிலநிறமும் அழுத்தமுமான நொருக்கல் ஒடு உண்டு. ஒட்டுக்குள்ளே எண்ணெய்யுள்ள அல்புமின்⁷ இருக்கும். அதில் மூன்று நரம்புகளையுடைய இதய வடிவான கொதிலீரம்⁸ அடங்கிய முனையுண்டு. கொட்டைகளைப் பிழிய எண்ணெய்வரும். இந்த எண்ணெய் சற்றே துர்க்கந்த மணமும் சுவையுமுடையது. கடையில்வருமெண்ணெய் பெரும்பாலும் அசுத்தமானது.

தன்மைகள். அல்திறவதொனிகம்⁹ பெருந்தேயமாகில் வமனி¹⁰.

உபயோகங்கள். குஷ்டத்துக்கு இது உச்சிதமானது. ஸ்துருமம்¹¹ குட்டைக்கரப்பன்கள், வாதம் இவைகளுக்கும் இது நயமாகக்கண்டது.(15)

1 Volatile. 2 Extractive. 3 Resin. 4 Dyspepsia. 5 Scurvy. 6 Wine of Rhubarb. 7 Alumen. 8 Cotyledon. 9 Alterative tonic. 10 Emetic. 11 Struma.

(15) அனுபந்தம் பார்.

தேயம். கொட்டையைத் தூள்செய்து ஆறு கிரேன் எடுத்து குளிகையாக்கி நாள் மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம். இந்தப் பிரமாணத்தில் மும்மடங்கு நால்மடங்கு வரைக்கும் அல்லது உவட்டிப்புக்காணுமட்டும் படிப்படியாய்க் கூட்டிக்கொடுக்கலாம். உவட்டிப்புக் காணும்போது தேயத்தைக் குறைக்கலாம், அல்லது மருந்தைக் கொஞ்சநாளேக்கு நிறுத்தலாம். இதுவே உத்தமமான முறை. எண்ணெய்யின் தேயம் ஐந்து ஆறு துளி. தூளைப் போல இசையும்து படிப்படியாய்க் கூட்டிக் கொடுக்கலாம். எண்ணெய்தானிகஸ்திமுல¹மாகவும்வழங்கப்படும். தூளை வங்காள வாகடத்துக்குரிய பின்வரும் அன்கெனாக வழங்கலாம்.

சால்முக்கிரவன்கென். Chaulmugra Ointment. சால்முக்கிர கொட்டைகளைப் போதிய அளவாக எடுத்து ஒட்டை அகற்றிப்போட்டுப் பசையாக அரைத்துத் ததந்த பதமாய்வரப் போதிய தனியன்கென்² சேர்க்கவும்.


இது தோல்வியாதிகள் பலவுக்கு விசேஷமாய் ஏர்பிசு⁴ தீனியம்⁵ என்பவைகளுக்கு பிரயோகிக்கப்படும்.

அவாகடச்சரக்குகள். Non-officinal.

நீடிமுத்துமாய். Hydrocarpus inebrians. இது மலையாளம், திருவாளங்கோடு, இலங்கைகளுக்கு உரிய மரம். என்ஸ்லி சொல்லுகிறபடி இன்கொட்டைகள் சால்முக்கிரகொட்டைகளைப்போன்றவைகள். அவைகளிலும் இவைகள் சிறியவைகள். இவை ஒரு தலைப்பிற் சற்றே கூரானவைகள். ஒழுங்கற்ற நெடும் வரைகளை உடைய முரணான பருக்கன் ஒட்டால் மூடப்பட்டிருக்கும். பச்சைக்கொட்டை உவட்டிப்பான மணமும் நெய்ப்பும் சற்றே கார்ப்பான சுவையுமுள்ளது. இதில் பிழிந்தெடுத்த எண்ணெய் குஷ்டத்துக்கு அவுஷதமென்று சுதேசிகள் பாராட்டுகிறார்கள். இதை யொத்த சால்முக்கிரக்கொட்டை அனுகூலம்பெற்றிருக்கிறபடியால், பிரதானமாய் அது கிடையாத இடங்களில் இதைக் கொடுத்துச் சோதிப்பது நல்லது. இதின் தேயம் அரைத்திரும். நாள் இரண்டுமுறையென்று என்ஸ்லி சொல்லியிருக்கிறார். குறைந்த தேயத்திற் தொடங்கிப் படிப்படியாய்க் கூட்டிக்கொடுப்பதே புத்தி.

தாளிசபத்திரி. Flacourtia Cataphracta. இந்தச்செடியின் சிறு இலைகளும் தளிர்களுமே இந்து பதார்த்தசாரத்துக்குரியவைகள். அரைத்திரும் தேயத்தில், இது வயிற்றுக் கழிச்சல், பெலவீனம் முதலியவற்றுக்கு அவுஷதமாக அதிகமாய் வழங்கப்படுகின்றது. இது நயமோ என்பதைப்பற்றிச் சுதேசிகளே சாட்சி.

தனகு. Cochlospermum Gossypium. இதிலிருந்து குத்திரப் பிசின் எடுக்கப்படும். இந்தப் பிசின் வடமேற்கு மாகாணங்களில் திரககந்துப்பிசினுக்குப் பதிலாய் வழங்கப்படும். இது அற்பமான சரக்கு.



1 Local stimulant. 2 Simple ointment, 3 Heipes, 4 Tinea.

பொலிக்கலியங்கள்.

POLYGALEAE.

செனிகம். SENEGA.

வாசம். ஐக்கமரிகம்.

வாகடபகுதி. காய்ந்தவேர். இது கிளைத்த மூலவேரையுடைய முடிச் சுகளுள்ள வேர்த்தண்டு; தென்னீர்க்கிலும் பருமையுள்ளது. திருகிப் புருவம் விழுந்தது. பட்டை மஞ்சட்கபிலநிறம். ஓர்வகையான உவட்டுமணம். சுவை முதல் இனிப்பு, பிறகு கார்ப்பும் உறைப்புமாகி வாயுறப்பண்ணும். உட்பகுதி மரத்தது. சுவை வீறுஅற்றது. பொலிக்கலிக்கமில்¹ என்ற கார்ப்பான சத்திலேயே இதின் வீறு இருக்கும்.

தன்மைகள். ஸ்திமுலம்², எக்ஸ்பெக்துறம்³, தியுரீசம்⁴, எம்மெனாக் கு⁵; பெருந்தேயத்தில் வமனி⁶, விரேசனி⁷.

உபயோகம். சுவாசப்பைகளின் மத்தி⁸ காலிக⁹ நோய்களுக்கும் ஒழுங்கற்ற செயலாற் குறிக்கப்பட்ட இதயத்தின் கரணக் குழப்பங்களுக்கும் சுரங்களின் பின்வரும் நீர்க்கோவைக்கும் அமெனூறீய¹⁰ம் திஸ்மெனூறீய¹¹ங்களுக்கும் இது நல்லது.

தேயம். வேர்த்தாளில் பத்துக் கிரேன் முதல் இருபது கிரேன்.

ரசிதங்கள். செனிகவின்லுசம். Infusion of Senega. கொள். துவைத்த செனிகவேர், அரை அன்சு; கொதிநீர் பத்து அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் ஒரு மணிநேர மூறவிட்டுச் சீலையில் வடிக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு வரைக்கு நாள் இரண்டுமுறை கொடுக்கலாம். நெருக்கமாயுங் கொடுக்கலாம்.

செனிகரஞ்சம் Tincture of Senega. கொள். செனிகவேர் பருக்கன்தூளாக இரண்டரை அன்சு. புருவுசீது¹² அரைநாழி. அடைத்த பாத்திரத்திற் செனிகவேரைப் பதினைந்து அன்சு சீதில் இரண்டுநாள் ஊறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கவும். பிறகு சியந்தனி¹³யில் விட்டு நீர் வடிந்த பின் மிச்சமான ஐந்து அன்சு சீதையும் வார்த்து வடிக்கவும். அப்பால் சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து இரண்டு நீர்களையுங் கலந்து அரைநாழியாகப் போதிய புருவுசீது சோக்கவும்.

தேயம். அரைத் திரும் முதல் இரண்டு திரும் வரைக்கு. இது ஸ்திமுல, எக்ஸ்பெக்துற, தியுரீசக் கலவைகளுடன் உவப்பாகச் சேரும்.

கிரமேரி. KRAMERIA. RHATANY.

வாசம். பெரு, பொலீவியம்.

வாகடபகுதி. காய்ந்த வேர். இது ஏராளமானீண்டு திரண்ட வைரக் கிளைகளை உடையதாயிருக்கும். பருமை ஏறக்குறைய ஒரு இஞ்சு. வெளிப்பக்கஞ் சொறியுங் கபிலச் சிவப்புநிறமும்; உள்ளே மஞ்சட் சிவப்புநிறம். கடிந்துவர். உமிழ்நீரைச் சிவப்பாக்கும். இதின் தன்மைகள் தனின்¹⁴ மிகு

1 Polygalic acid. 2 Stimulant. 3 Expectorant, கிட்டெவனி. 4 Diuretic, அமுரீதி.

5 Emmenagogue, குதுபசே. 6 Emetic. 7 Cathartic. 8 Subacute. 9 Chronic.

10 Amenorrhoea. 11 Dysmenorrhoea. 12 Proof spirit, 13 Percolator.

14 Tannin.

வதாலாகும். அது 100 க்கு 38 முதல் 42 வீதமாய் இதிலடங்கியிருக்கும். தன்மைகள். கடுமையான துவர், தொணிகம்¹.

உபயோகம். காலிக² வயிற்றுக்கழிச்சலுக்கும் விபல³ இரத்தப்பெருக்குகளுக்கும் இது உள்ளே கொடுத்து நயங்கண்டது. லுகறீயம்⁴, பீனசம், கண்ணோ, அபாண ஒடு முதலிய நோய்களுக்குந் தானிகமாயிட நல்லது.

தேயம். வேர்த்தாளில் பத்து முதல் இருபது கிரேன்.

ரசிதங்கள். Preparations. கிரமேரியின்வூசம். Infusion of Krameria. கொள். இடித்த கிரமேரி வேர், அரை அன்சு; கொதிவெந்நீர் பத்து அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் ஒருமணிநேர மூறவிட்டுச் சீலையில் வடிக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு, நாள் இரண்டு மூன்று முறை கொடுக்கலாம்.

கிரமேரியிரஞ்சம். Tincture of Krameria. கொள். இடித்த கிரமேரி வேர் இரண்டரை அன்சு; புருவுசீது அரைநாழி; அடைத்த பாத்திரத்தில் கிரமேரி வேரைப் பதினைந்து அன்சு சீதில் இரண்டுநாள் ஊறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கவும். அப்பாற் சியந்தனியில் இட்டு நீர் வடிந்தபின் சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும் வார்த்து வடியவிடவும். பிறகு சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து இரண்டுநீர்களையும் கலந்து, அரைநாழிக்குப் போதிய புருவுசீது சேர்ச்சவும்.

தேயம். அரைத் திரும் முதல் இரண்டு திரும்.

கிரமேரியேசிறத்து. Extract of Krameria. கொள். கிரமேரிவேர் பருக்கன்தாளாக ஒரு இரத்தல்; திஸ்திலித்த தண்ணீர் போதியது. கிரமேரிவேரை முக்கால்நாழி தண்ணீரில் ஒருநாள் ஊறவைத்துப் பிறகு சியந்தனியில் ஏற்றி, ஆறு நாழி நீர் வடியுந்தனையும் அல்லது கிரமேரி வேரின் சாரமிறங்குந்தனையும் திஸ்திலித்த தண்ணீர் விடவும். வடிந்த நீரை, நீர்மத்தியில் வறட்டவும்.

தேயம். ஐந்து முதல் இருபது கிரேன்.

நாகிறனாடம், பிரசில் தேசங்களிலுண்டாகிற சவனில் கிரமேரி உச்சிதமானதென்று சிலர் எண்ணுகிறார்கள்,

அவாகடச் சரக்குகள். Non-Officinal.

தறேதலரியடுப்பொலிக்கலம். Popygala Crotalarioides. தேலீவியடுப்பொலிக்கலம். P. Telephioides. இவைகளுள் முதலாவது இமயமலையிலுள்ளது. மற்றது சென்னையிலுள்ளது. சலதோஷம் முதலிய கதார⁵நோய்களுக்குச் சுதேசிகள் இவைகளை மருந்தாக வழங்குகிறார்கள். இவைகளைச் சோதித்தால் நல்லது.

1 Tonic, ஓஷி. 2 Chronic. 3 Passive. 4 Leucorrhoea. 5 Catarrh.

தாமரிஸ்னியங்கள்.

TAMARISCINEAE.

அவாகடச்சரக்துகள். Non-Officinal.

சிறுசவுக்குமரம். *Tamarix Gallica*. இது இந்துதேசமடங்கலு முள்ள வோர் சிறுச் செடி. சுதேசிகளாற் கயர்மருந்தாக வழங்கப்படுகிற ஓர்வகை மாசக்காய் இதில் உண்டு. இந்தக் காயின் கயர்த்தன்மையைப் பற்றி ன் தக்க பண்டிதர் மெத்த விதந்து பேசி இதின் பெலனான கஷாயத்தை நாற்றமான அழுகும் புண்களுக்கும் அரையாப்புக்கும் இடுவது திறமென்று தமது பரீட்சையாற் சொல்லியிருக்கிறார். இந்தக் காய்களிலுள்ள தனிச்சுமில் கலிக்க மிலங்களின் செயலைப்பற்றியே இவை சேஷ்டிக்கின்றன. திசந்தெரி¹ திய றீயங்க²ளுக்குச் சுதேசிகள் இவைகளை உள்ளுக்குங் கொடுக்கிறார்கள். இந்தச் செடியில் ஓர்வகை மன்னாவும் உண்டு. ஆயினும் இது இந்துவில் எடுக்கப்படுவதுமில்லை; கடைகளில்வருவதுமில்லை.

சுவப்புச் சிறுசவுக்குமரம். *Tamarix Orientalis*, இசிலும்மாசக்காய் உண்டு. இது முந்தினதைப் போன்றதாயினும் அதிற் சிறியது. இதுவும் துவராக வழங்கப்படும். இதின் பட்டை கைப்பும் துவரும் தொணிகமுமாகும்.

கற்றீவிரங்கள்.

GUTTIFERAE.

சியாம் மக்கிமரம். கம்போச்சு. GAMBOGE TREE OF SIAM (16)

வாசம். சியாம் தேசம்.

வாகடபகுதி. பிசின் ராளம்³. இது திரண்ட தடிகளாக வரும். கபில நிறமும் அழுத்தமும் மினுக்கமுமான முறிகளாக இலகுவில் முறியும். தண்ணீர் பூச இந்த நிறம் மஞ்சளாகும் இது மணமற்றது, கார்ப்பான சுவையுள்ளது. கொதிநீரிற் கரைத்து ஆறின இதின் இமல்சு⁴மானது இயோதீ⁵நீருக்குப் பச்சையாகாது. இதிலே கம்போச்சிக்கமில்⁶ என்ற ஓர் ராளம் அமைந்திருக்கும். இதின் வீறு இந்த ராளத்தைப் பற்றியது. இதின் உத்தம இனங்களில் இந்தச் சத்து 100 க்கு 71 பங்கு முதல் 74 பங்கு வரைக்கு இருக்கும்.

தன்மை. இது ஓர் நயமான நீர்அடிக்கும் விரேசனி⁷. அந்தெல்மிந்தி⁸.

உபயோகங்கள். நீர்க்கோவைகளுக்கு இது பேர்பெற்ற மருந்து. மேலும் கடுமையான மல வறட்சிக்கும் அமெனுறீயத்துக்⁹ும் நல்லது. கிருமி கொல்லியாகவும் வழங்கப்படும்.

1 Dysentery 2 Diarrhoea. 3 Gum-resin. 4 Emulsion. 5 Iodine water. 6 Gambogic acid, 7 Hydragogue Cathartic. 8 Anthelmintic, கிருமி கொல்லி. 9 Amenorrhoea.

(16) அனுபந்தர்பார்.

தேயம். ஒரு கிறேன் முதல் நாலு கிறேன் வரைக்கு மாவாக அரைத்துக் கொடுக்கவும். இதை இப்படித் தனியே கொடுக்கும்போது வாந்தி முன்னுக்குத் தோன்றாமற் தடுப்பதற்குப் பதாசிகாபனசு¹ வன்சபு² அல்லது கலமலோடு³ சேர்த்துக் கொடுக்கவேண்டும்.

ரசிதம். Preparation. கம்போச்சுக் கூட்டுக்குளிகை. Compound Gamboge Pill. கொள். கம்போச்சு ஒரு அன்சு; பபாடுசகை⁴, ஒரு அன்சு; கறுவாககூட்டுச் சூரணம், ஒரு அன்சு; வன்சபுத்துள் இரண்டு அன்சு; சிறுபம்போசுயது. கம்போச்சையும் சகையையும் தனித்தனியாய் அரைத்துத் தூளாக்கிக் கறுவாககூட்டுச் சூரணத்தோடு சேர்த்து அவற்றோடு சிறு பத்தைக் கலந்து எல்லாவற்றையும் ஒன்றாய்ப் பிசைந்து திரளையாக்கிக்கொள்ளவும். பபாடுசகைச் சப்பதிலாக இந்துச்சகை சேர்க்கலாம்.

தேயம். ஐந்து முதற் பத்துக் கிறேன்.

*இந்துமக்கிமரம். மூக்கிமரம். INDIAN GAMBOGE TREE.

வாசம். மைசூர் கருநாடகங்களிலும் சென்னையின் மற்றும் பகுதிகளிலும் உள்ளது.

வாகடபகுதி. பிசின்ராளம்⁶. இது சியாம்மக்கியைப் போன்றது. ஆயினும் அதைப் போலத் திரண்ட துண்டுகளாக வராமல் பல பருமையும் பல சாங்கமுமான கட்டிகளாக வரும். இது தண்ணீரில் சுறுக்குக் கரைந்து இமல்ச⁷மாகும். கிறிஸ்திசன் பண்டிதர் இதைச் சோதனைசெய்து இதிலே கம்போச்சிக்கமில்ம⁸ என்ற ராளம் 100 க்கு 77 பங்கு முதல் 80 பங்கு வீத மாயிருக்கக் கண்டார். இதின் வீறு இந்தச் சத்திலேயே இருக்கிறது போலும்.

தன்மைகளும் உபயோகங்களும், சியாம்மக்கியின் தன்மை உபயோகங்களுக்குச் சரி. நீர்க்கோவை கடுமையான மலவரட்சி முதலியவற்றின் பரிகரிப்பில் அதற்குப் பதிலாக இதை வழங்கலாம். (17)

தேயம். மூன்று நாலு கிறேன்; பதாசிதுவிதாத்தரசோடு⁹ கலந்து கொடுப்பதே உத்தமம்.

*கோகமரம். KOKUM BUTTER TREE.

வாசம். மலையாளம், கொங்கணம் என்ற தேசங்களிலும் சென்னையின் மற்றும் பகுதிகளிலும் காட்டுச் சோலைகளில் உள்ளது.

வாகடபகுதி. கோகநெய்¹⁰. இது அதின் கொட்டைகளிலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது. எடுக்கும்வகையாவது: கொட்டைகளைச் சிலநாள்க்கு வெய்யிலிலிட்டுக் காயவைத்துத் துவைத்துத் தண்ணீரில் அவிக்க எண்ணெய்பிறக்கும். ஆறவிடும்போது கட்டியாக இறும். இதைச்சுத்தமாக்க, நொருக்கலும் வெண்மஞ்சள் நிறமும் தண்மையும் குளிர்ந்த சுவையுமுள்ளதாகும். வாயிலிடும்போது வெண்ணெய்யைப் போல் உருகி, சிறியஐசுக்¹¹ கட்டி வாய்க்குட் கரைந்தாற் போன்ற குளிர்ச்சியை நாக்கிற் பிறப்பிக்கும்.

1 Carbonate of Potash. 2 Hard soap. 3 Calomel. 4 Barbadoes aloes. 5 Syrup. 6 Gum-resin. 7 Emulsion. 8 Gambogic acid. 9 Bitartrate of Potash, 10 Kokum Butter. 11 Ice,

(17) அனுபந்தம் பார்,

இது 98 பாகை சூட்டில் உருகும். கொட்டையிலிருந்து 100 க்கு 10 வீத மாய் எண்ணெய் வரும்.

ரசிதங்களும் உபயோகங்களும். இந்த உறைந்த ரெய்யிலிருந்து அன் கென்கள், தலஸ்தங்கள் செய்வதற்கும் மற்றுஞ் சிகிச்ச பிரயோகங்களுக்கு வழங்குவதற்குமாக அது இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. புண்கள், உதிகள் கைகள் முதலிய பகுதிகளின் வெடிப்புகளுக்கு இது பூசப்படுகிறது. இது திமிரெய்க்கு நல்ல பதிவென்று தைமக் த வைத்தியர் சொல்லியிருக்கிறார்.(18)

அவாகடச் சரக்கு. Non-Offinal.

மங்குஸ்தீன் மரம். Mangosteen. இந்த மரத்தின் மதுரமான பழத்தின் தோல் நல்ல துவரானது. சிமித்தர் இதில் செய்து கண்ட சோதனைப்படி தனினும்¹ ராளமும்² மங்குஸ்தீன்³ என்ற கிரிஸ்தலிக்⁴ கக் கூடிய பசார்த்தமும் இதிலே அடங்கியிருக்கும். திசந்தெரியின் பிற்கூற்றிலும் சுதேசிகருக்குண்டாகும் காலிக தியநீயத்திலும்⁵ வாறிங் வைத்தியர் இதைப் பின்வருமுறையே கொடுத்து நயங்கண்டிருக்கிறார் கொள். காய்ந்த மங்குஸ்தீன் தோல், இரண்டு அன்சு; கொத்தமல்லி, சீரகம் வகைக்கு ஒன்றரைத் திரும்; தண்ணீர் ஒரு நாழி. கலந்து அரைநாழியாகுந்தலையும் மெல்லமெல்லக் காய்ச்சவும்.

தேயம். நாலு அன்சு, நாள் இரண்டுமுறை அவினிரஞ்சத்தோடு⁶ சேர்த்தாவது சேராமலாவது கொடுக்கலாம். கழிச்சலுக்கு இது கைகண்ட மருந்தென்று ரீன் வைத்தியர் சொல்லுகிறார். திசெந்தெரிக்கு இதாற் காணும் நயம் குறைவென்று அடோய்சன் என்ற உதவிச் சத்திரீகன் நினைக்கிறார். இதின் வீரன கஷாயம்⁸ நல்ல துவர்ப்பான பூச்சுமருந்தாகும் என்று வேற் வைத்தியர் சொல்லுகிறார்.

புன்னை. Calophyllum Inophyllum. இந்துவடங்கலுமுள்ள இந்த மரத்தின் கொட்டைப் பருப்பிலிருந்து நல்ல மணமுள்ளவோர் திரவெண்ணெய் பிழியும். இதை வாதத்துக்கு நல்ல பூச்சென்று சுதேசிகள் மெத்த மதிக்கிறார்கள். பட்டையிலிருந்து ராளம்போன்ற வோர் பதார்த்தம் பொசியும். இதைப் பழைய சிகிச்சை வாகடர் சொன்ன, தாகமவகராளம் என்று தவறாய் நினைத்தார்கள். இது சசத்தைப் போன்றதென்றும் மந்தவிரணங்களுக்கு இட நல்ல மருந்தென்றும் வங்காள வாகடத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சரியான கிழக்கிந்துத் தாகமவகம் சென்னையைச் சேர்ந்த மலையாளம் முதலிய பகுதிகளுக்குரிய Calopyllum Calaba என்ற ராளம் ரத்திலிருந்து வருகிறதென்று வின்லி சொல்லியிருக்கிறார்.

நாகசாப்பூ. Nagesa Flowers. இச்சரசுக்கு மெசுவ வெறியம் Mesua Ferrea நெட்டிலைக்கலிசாச்சியன் Calysaccion longifolium என்ற மரங்களின் காய்ந்த, வாசனைப் பூக்களே. இந்தப் பூவுக்குச் சொற்ப தீவன தன்மை உண்டென்று எண்ணுகிறார்கள். ஆயினும் வாசனைக்காகவும் பட்டுகளைச் சாயங்காய்ச்சுவதற்காகவும் இப்பூக்கள் பிரதானமாய் வழங்கப்படும. மருந்துக்குக் கூடிய வீறு சொற்பம். மெசுவ வெறியத்தின் கொட்டை

1 Tannin. 2 Resin. 3 Mangostine. 4 Crystallize. 5 Dysentery. 6 Diarrhoea. 7 Tincture of Opium. 8 Decoction.

(18) அனுபந்தம்பார்.

யிற் பிழிந்த எண்ணெய்யானது வட கருநாடகத்துச் சனங்களால் வாதத் துக்குப் பூச்சு மருந்தாக மெத்த வழுங்கப்படுகிறதென்றும் பட்டையும் வே ரும் உத்தமமான கைப்புத்தொனிகம் என்றும் ராசு வைத்தியர் அறிவித்தி ருக்கிறார். இவை இன்வூசம்¹ திகாகத்தங்²களாக வழுங்கப்படும்.

திப்தேருநார்பியங்கள்.

DIPTEROCARPEAE.

* கர்ச்சமரம். GURJUN TREE.

வாசம். வங்காளம் முதற் தெனாசரிம் வரைக்குமுள்ள கீழிந்துவின் காடுகளில் உள்ளது.

வாகடபகுதி. மரத்திற் கீறிச் சூடுகாட்டும்போது வடிகிற பல்சம்³போன்ற பொசிவான தேல ராளம்⁴. இது தண்ணீரிலும் இலேசான சொற்ப நீர்த்தன்மையுடையது. கருஞ்சிவப்புநிறங் கொண்டது. மேல்வளத்திற் பச்சையான மங்கற்தோற்றமுள்ளது. ஒலீவெண்ணெயின்⁵ தடிப்புள்ளது. கபேவ⁶த்தைப்போன்றிருந்தும் அதிலும் வீறு குறைந்த மணமும் சுவையுமுள்ளது. சீசாவில் இட்டு 270 பாகை சூடுகாட்டக் கலங்கித் தடிக்கும். இதைச் சம்பங்கு பெஞ்சொலோடு⁷ குலுக்க, கலங்கலான நீராகும்.

தன்மை. சளிச்சவ்வையும் பிரதானமாய்ச் சன்னாமுரி⁹ உறுப்புகளின் சளிச்சவ்வையும் அருட்டும் ஸ்திமுலம்¹⁰; தியுநீசம்¹¹.

உபயோகம். கனுநீயத்¹²துக்கும் பெரும்பாலும் கபேவம் கொடுக்கப்படும் மற்றும் நோய்களுக்கும் இது வாய்ப்பாகக் கண்டது. (19)

தேயம். அரைத் திரும் முதல் ஒருதிரும்¹³ வரைக்குத் தனித்தாவது இமல்சத்திலாவது¹⁴ நாள் இரண்டு மூன்று முறை கொடுக்கலாம்.

அவாகடச்சீசரக்துகள். Non-Officinal.

குங்குலியமரம். *Shorea robusta*. இந்த மரத்தின் ராளமே வங்காளக் கடைகளில் டாமர் என்று வருவது. ஒஷானசியர் தெரிந்துபார்த்த வகைகள் நல்ல உருவொளியும் நிறமற்றவைகளுமாயிருந்தன. கடைகளிற் பெரும்பாலும் விற்பதோ, வெண்மை முதல் கருங் கபிலநிறம் வரைக்கு வித்தியாசப்படும். இதற்கு சுவை மணம் இல்லை. அலக்காலிற் சொற்பங்கரையும். ஈதரில் ஏறக்குறைய முழுதுங் கரையும். தர்ப்பந்தீனிலும் திரவெண்ணெய்தளிலும் தாராளமாய்க் கரையும். இது திரவெண்ணெய்களோடு சேர்ந்து பிளாஸ்தர்களாகும். இதின் உத்தம வகைகள் யுரோப வாகடத்திற் சொன்ன ஹபன் குங்குலியங்களுக்குச் சரிவந்தது. கடைகளில் வருகிற கருங்குங்குலியத்தின் ஒருபகுதி இந்த வகுப்புக்குரிய இன்னொரு மரத்திற் பொசிவது.

1 Infusion. 2 Decoction. 3 Balsam. 4 Oleo-resin. 5 Olive oil. 6 Copaiva. 7 Benzole. 8 Mucous membrane, 9 Genito-urinary. 10 Stimulant. 11 Diuretic. 12 Gonorrhoea, 13 Drachm. 14 Emulsion.

(19) அனுபந்தம்பார்.

வேள்ளைக்குன்றிகம். *Vateria Indica*. தென்னிந்துவின் கடைகளில் வருகிற வெள்ளை டாமர் இதிலேயே பொசிவது. இதின் வகைகள் நிறம், வாசனை, இறுக்கங்களில் மெத்த வித்தியாசப்படும். சில சொற்ப பச்சை நிறமும், உரப்பும் ஏகத்துவமுமானது. உடைந்தாற்பளபளக்கும். வேறு சிலவோ, வெண்மஞ்சள்நிறமாய்ச் சிற்றறைகளை அடக்கியிருக்கும். எடுக்கும் முறையைப்பற்றியும், பொசியும் மரத்தின் வயசைப்பற்றியுமே இந்த வித்தியாசங்கள் தோற்றும். இது பிரவையானவெளிச்சங்கொண்டு எரிந்து நல்ல வாசனை வீசும். சொற்பமாய்ப் புனைக்கும். சூட்டினாலுஞ், சொற்பமாய்க் கர்ப்பூரஞ் சேர்ப்பதாலும் அலக்கா¹லிற் கரையும். மென்கூட்டில் மெழுகு எண்ணெய்களோடு சேர்ந்து உத்தமமான ராளவன்கென³கும். வாகட குங்குலியத்துக்கு இது பதிலாகும். பழத்தை நசித்துக் காய்ச்ச, தாவர நெய் என்ற இறுக்கமான எண்ணெய் வரும். காலிகவாதத்துக்கும் வருத்தமான வேறு சில நோய்களுக்கும் இது பேர்பெற்ற பூச்சுமருந்து. அன்கென்கள் தைலங்களுக்கு இதைத் தாரக⁸மாகக் கொள்ளலாம்.

வாசனையோபீயம். *Hopea Odorata*. பிரமதேசத்தில் உண்டாகிற இந்த மரத்தில் வாசனையான ஓர் ராளம் பொசிகிறது. இந்த ராளத்தின் மாவே பிரமதேசத்தாருக்குள்ளே பேர்பெற்ற ஸ்திப்தி⁷. இதின்செயல் மிகா⁶னிக⁹ தன்மையாய் மாத்திரமே இருக்கும்.

மல்வாசியங்கள்.

MALVACEAE.

பருத்திச்சேடி. COTTON PLANT.

வாசம். இது பூமியின் உஷ்டண மத்திமோஷ்டண பகுதிகளில் அதிகமாய்ச் செய்யப்படும்.

வாகடபகுதி. அந்தந்த வகையான பருத்திக்கொட்டையிலுள்ள மயிர். இதுவே பருத்திப்பஞ்சு. இதில் குழலுள்ள வெண்மயிர்கள் இருக்கும். காயும்போது தட்டையாகும். இப்படியிருக்கையில் தண்ணீரில் அமிழ்த்திச் சூக்குமாட்சியாற் பார்த்தால் இவைகள் இடைக்கிடை குறுக்கு வரிக்களற் குறிக்கப்பட்ட பொருத்துகளுள்ள ஒடுக்கமுந் தட்டையுமான, தனித்தனி நாடாக்கள் போலத் தோற்றும்.

தன்மை உபயோகம். வைத்தியத்திற் பருத்திப்பஞ்சின் முதற்பிரயோசனம் வேச்காட்டுக் காயங்களுக்கு இடுவதே. பரமானுபடாதபடி காத்துச் சமமான அனலைப் பேணிக்கொள்வதால் அக்காயங்களுக்கு இதால் நயமுண்டாகும். இந்நயத்தைப் பற்றி உதர்த்தம்¹⁰ தாபிதங்¹¹கொண்ட இடங்களுக்கு இது இடப்படும்.

ரசிதங்கள். Preparations. வெடிப்பஞ்சு. Gun cotton. கொள். பருத்

1 Homogeneity. 2 Alcohol. 3 Resin-ointment. 4 Chronic rheumatism. 5 Unguents. 6 Base. 7 Styptic, தட்பனி. 8 Mechanical, யாந்திரிக. 9 Microscope. 10 Erysipelas, எரிசிபிலிச. 11 Inflammation.

திப்பஞ்சு, ஒரு அன்சு; சல்வுரிச்சுமிலம்¹ நீதுரிக்கமிலம்² வகைக்கு ஐந்து அன்சு. குழியம்மியில் அமிலங்களைக் கலந்து அக்கலவையிற் பருத்திப்பஞ்சை அமிழ்த்தி, அது நன்றாய் நனையுந்தனையும் ஆடித்தடியால் மூன்றுமினி வரைக்குச் கலக்கவும். பிற்பாடு பஞ்சைத் தண்ணீருள்ளவோர் பாத்திரத் திற் போட்டு ஆடித்தடியால் நன்றாய்க் கலக்கவும். உத் தண்ணீரை ஊற்றிவிட்டுப் பஞ்சின்மேல் இன்னுந் தண்ணீர்வார்த்து திரும்பக் கலக்கவும். ஊற்றிய தண்ணீரோடு பாரிதகுலோறிரம்³ சேர்க்க அடையல் வீழுவதொழியுந்தனையும் இப்படியே தண்ணீர்சேர்த்தல் கலக்குதல் தெளித்தல்களைத் திரும்பத் திரும்பச் செய்யவும். அப்பால் பஞ்சுத் தீரளையை வடிதாளில் உணர்த்தி நீர்மத்திகத்தில்⁴ வறட்டவும். சோதனை. ஈதரும்⁵ திட்டசீதூர்⁶ஞ் சேர்ந்த கலவையில் தீவிரமாய்க் கரையும். குட்டுக்குச் சேஷமின்றி வெடிக்கும்.

கலோடியம். Collodium. கொள். வெடிப்பஞ்சு, ஒரு அன்சு; ஈதர் மூப்பத்தாறு அன்சு; திட்டசீது, பன்னிரண்டு அன்சு. ஈதரையுஞ் சீதையுங் கலந்து வெடிப்பஞ்சை அவைகளோடு சேர்க்கவும். சிலநாள்க்கு வைத்திருந்து, அடையல் இருந்தால், தெளிந்த நீரைத் தெளித்தெடுத்து நன்றாய் டைத்த சீசாக்களில் வைக்கவும். இது இலேசுந் தீபற்றி எரியக்கூடிய ஈதர் மணமுள்ள நிறமற்ற நீர். பரமானுவிற் திறந்துவைக்கக் காய்ந்து தண்ணீர் சீதுகளிற் கரையமாட்டாத மெல்லிய உருவொளியுள்ள சவ்வாகிவிடும்.

உபயோகம். வெட்டுக்காயங்கள், புண்கள், தோல்வியாதிகள், உதடுகள் முலைக்காம்புகளிற் காணும் வெடிப்புகள், வேக்காடுகள், உதர்த்தம்⁵ முதலியவற்றுக்குக் கலோடியம் பெரும்பாலும் இடப்படும், இது சுத்தமாயிருக்கையில் வெடிக்கக்கூடியதாயிருப்பதே இதைப் பூசுவதற்குப் பெரிய தடை. இத் தடை பின்னே வரும் மருந்தினால் அதிகப்பற்றுக்கு நீங்கும்.

ரசிதம். சவட்கலோடியம். Flexible Collodium, கொள். கலோடியம், ஆறு அன்சு; கனடபல்சம், நூற்றிருபது கிரேன்; ஆமணக்கெண்ணெய் ஒருதிரும். கலந்து நன்றாயடைத்த சீசாவில் வைக்கவும்.

வண்டுக்காய். OKRA.

வாசம். மேற்கிந்து தீவுகள்; மத்திமோஷ்டணதேசங்களடங்கலும் தீனுக்காக இது அதிகமாய்ச் செய்கைபண்ணப்படும்.

வாகடபகுதி. முற்றாத பச்சைக் காய்கள். இவை நாலு ஆறு இஞ்சு நீளமும், அடியில் ஒரு இஞ்சு பருமையுமாய் நுனியொடுங்கிச் சுருக்குகளுடையதாயிருக்கும். மயிர் விசேஷமாய்ப் புருவங்களிலுள்ளதாயுமிருக்கும். புருவங்களின் தொகை அறைகளின் தொகைக்குச் சரியாய் ஐந்து முதல் எட்டுவரைக்கிருக்கும். ஒவ்வொரு அறையிலும் அழுத்தமான உருண்ட கொட்டைகள் ஒரு நிரை யிருக்கும். அதற்குள்ளே மணம் சுவையற்ற பாணி கனக்க நிற்கும். கொட்டையிலும் பூண்டின் மற்றெப்பகுதியிலும் பிசுபிசுப்பான வழுவுழுப்பு அதிகமாயுண்டு.

தன்மைகள். இதுநல்ல இமாலியம்⁸ திமல்சம்⁹ தியுநீசம்¹⁰.

உபயோகங்கள். கதார்¹¹ நோய்களுக்கும், சலக்கடுப்புக்கும், சலச்சிறு

1 Sulphuric acid. 2 Nitric acid. 3 Chloride of Barium. 4 Water-bath. 5 Ether. 6 Rectified spirit. 7 Erysipelas. 8 Emollient. சாந்தனி. 9 Demulcent, சாமலி. 10 Diuretic, அருசிதி. 11 Catarrh.

ப்புக்கும், வெட்டைக்கும், இமாலியம், திமல்சம் தேவையான மற்றும் நோய்களுக்கும் இதைத் தைரியத்துடன் கொடுக்கலாம்.

ரசீதம். வண்டுக்காய்த்தீக்காக்தம். Decoction of Okra. கொள். முற்றாத பச்சை முகைகள், குறுக்காய்ச் சீவி, மூன்று அன்சு; தண்ணீர் முக்கால்நாழி. அரைநாழியாய் வற்றுந்தினையுங் காய்ச்சிச் சீலையில் வடித்துச் சுவைக்குப் போதிய இனிப்புச் சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

தேயம். மூன்று முதல் ஆறு அன்சு; தாராளமாகவுங் குடிக்கலாம். சூடான இந்தத் திகாக்தத்தின் ஆவியை உறிஞ்சுதல், இருமல், தொண்டையழற்சி, குரற்கம்மல்களையும், தொண்டை மிடற்றின் மற்றும் நோய்களையுந் தணிப்பதற்கு மெத்த உவப்பானது. பச்சைக் காய்கள் கிடையாதிருந்தால் காய்ந்தவைகளை வழங்கலாம்.

கிப்சன் வைத்தியரும் வேறு பேர்களுக்குச் சொல்லுகிறபடி பச்சைக் காய்களைத் துவைத்தால் நல்ல சாந்தியான பாப்பை¹யாகும்.

அவாகடச் சரக்குகள். Non-Officinal.

மலைதாங்கி. Sida acuta. இந்தப் பூண்டின் வேரில் பாணித்தன்மையும் கைப்புத் தன்மையுங் கலந்திருக்கும். கற்குத்தாவில் இதைச் சோதித்துப் பார்த்தஅளவில், இன்வூசு²மாக இதைக் கொடுக்கும்போது இது வெயர்வையை அதிகப்படுத்திப் பசியைக் கிளப்பி வேறுஞ் சில காரியங்களில் விலைபெற்ற கைப்புகளுக்கு நல்ல பதிலாகுமென்று காணப்பட்டது. இதை இன்னுஞ்சோதித்துப்பார்ப்பதுநல்லது. சைட(Sida) என்ற வகுப்பைச்சேர்ந்த மற்ற இனங்களின் வேர்களும் பிரதானமாய் மயிர்மாணிக்கவேரும் வாதநோயின் பரிகரிப்புக்குச் சுதேசிகளுக்குள்ளே பெயர்பெற்றிருக்கின்றன.

பூவரசமரம். Thespesia Populnea. இதின் பழங்களில் பிசுபிசுப்பான மஞ்சள்நிறச் சாறு நிரம்ப உண்டு. தென்னிந்துவின் சனங்களுக்குள்ளே சிரங்குக்கும் மற்றும் சருமநோய்களுக்கும் இந்தச் சாறு நல்ல பூச்சுமருந்தாகின்றது. இதைப் பூசுவதோடு இந்த மரத்தின் பட்டை அவித்த கஷாயத்தால் நோய்த்த பகுதிகளை நாடோறுங் கழுவிவருவார்கள். வாறிங்கு வைத்தியர் இந்த மருந்தைப் பலமுறைகளிற் சோதித்துப் பார்த்தபோது சிலரில் இதால் நயங்கண்டது. அனேகரிலோ நயங்காணவில்லை.

சப்பாத்துப்பூ. Hibiscus Rosa Sinensis. கருஞ்சிவப்பு நிறமான இந்தப் பூவிதழின் பிழிந்த சாறு கடுதாசியிற் பூச நீலச் சிவப்புநிறங்கொடுக்கும். இப்படி எத்தனப்படுத்தின கடுதாசி கெமிஸ்த சோதனை³யில் விற்தாமஸ்தாளு⁴க்கு நல்ல பதிலாகும் என்று வைத்தர் சொல்லுகிறார். கொஞ்சக் காலத்தின்பின் மட்டான வீறுள்ள அமிலந்தானும் இந்தத் தாளில் செயல் காட்டாதாகையால் இந்தத் தன்மை திறமாய்க் காட்டுவதற்கு, தேவையான ஒவ்வொருமுறையும் அதைப் புதிதாய்ச் செய்துகொள்ளவேண்டும். இந்தப் பூவிதழின் இன்வூசும், காய்ச்சல்களுக்கு நல்ல திமல்ச⁶ பானமாகுமென்று முடிவென் செந்வு சொல்லுகிறார்.

முள்ளிலவு. Bombax Malabaricum. இது இந்துவின் சிலபகுதிகளிலுள்ளது. இந்த மரத்துக்கு சுதேச வாகடங்கள் கூறும் இரண்டு சரக்குகள் உரியவைகளென்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். இது தப்பிதம். 1 Mucherus என்ற கயரானவோர் பிசின். இது மங்கலும் கருமையுமான முடிச்சுப்போ

1 Poultice. 2 Infusion. 3 Chemical test. 4 Litmus paper. 5 Acid. 6 Demulcent.

ன்ற துண்டுகளாக வரும். சில, மாசக்காய்போற் தோற்றமுள்ளவைகளாயும் மணமற்றவைகளாயும், கடுங் கயரான சுவையுள்ளவைகளாயுமிருக்கும். இதிலே அதி பிரமாணமான தனிச்சமிலங்¹ கலிக்கமிலங்²கள் உண்டு. கயர்கள் வேண்டிய நோய்களுக்கு இதை உபயோகமாய் வழங்கலாம். இத்தன்மையில் இது வங்காளத்திலேயுள்ள புரசு(Butea) என்ற மரத்தின் கீனுவைக்குக் கீழ்த்தரமானதென்று அ. ச. டதர் சொல்லுகிறார். இது என்னமரத்திற் பிறந்ததென்று தெரியாது. 2 கடைகளில் வருங் காய்ந்த சிறிய கிழங்குகள். இவை சுருங்கியவைகளாய்த் தென்னீர்க்களவு பருமையும் ஒரு இஞ்சு இரண்டு இஞ்சு நீளமும் வெளியில் மங்கல்நிறமுமாய் மணம் ருசியற்று பிசுபிசுப்புள்ளவைகளாயிருக்கும். இவை எககதிலீதன்³என்ற பூண்டுவருப்பைச் சேர்ந்தனவென்று இவைகளின் நெசவினால் விளங்குகின்றது; ஆகையால் இம்மரத்தின் கிழங்கல்ல. நிலப்பனைக்கிழங்கைப் பார்க்கவும். சுதேசிகளுக்குள்ளே இந்தக் கிழங்குகள் மெத்தப் பேர்பெற்றிருக்கும். என்னாலும் விசேஷித்த லீறுள்ளன என்பதைப்பற்றி இன்னுஞ் சந்தேகம்.

பப்பரப்புளி. *Adansonia digitata*. இது ஆபிரிகதேசத்துக்குரியமரம். தற்காலத்தில் இந்துவின் பல பகுதிகளில் வளர்க்கப்படுகின்றது. இது திசந்தெரிக்குப் பேர்பெற்ற மருந்தாகையால் கவனிக்கப்படத் தகுந்தது. விருங்கு வைத்தியர் தமது சொந்த அனுபவத்தைப்பற்றியே இதற்குச் சாட்சியாயிருக்கிறார். இதின் கொட்டையைச் சூழ்ந்திருக்கிற நல்ல புளிப்பான களியே மருந்தாக வழங்கப்படுவது. இக்களியாற் சுறுக்கு நயங்காணாதிருந்தால் பழத்தின் ஒட்டைத் தண்ணீரோடு சேர்த்தரைத்துப் பசையாக்கிக் கொடுக்கலாம். களியைக் கொடுத்துப்பார்த்த அற்சின்சன்வைத்தியர், இதின் செயல், கயர்த்தன்மையைப்பற்றியதல்ல, இதின் குளிர்ச்சி, அமுரிதி⁴த்தன்மையைப் பற்றியதென்கிறார். இந்த மரத்தின்பட்டை முறைச்சுரங்களின் பரிசரிப்பிற் கினியத்துக்குப் பதிலாகத் துசாசேன் என்பவரால் வழங்கப்பட்டது. அவர் இதை வெந்நீர் அரைநாழிக்கு துவைத்த பட்டை ஒரு அங்குல வீதமாக அவித்து மூன்றிலொன்றாக வற்றினபின் கொடுத்தார். அதி தேயமாகக் கொடுத்த கினியத்துக்கு மாறாத சில காய்ச்சல்கள் இதற்கு மாறினதை அவர் கண்டார். இந்த மரத்தின் தன்மைகள் நல்லாய்க் கவனிக்கப்படத் தகுந்தவைகளென்று கிப்சன் வைத்தியர் சொல்லுகிறார்.

ஸ்தேர்குலியாசியங்கள்,

STERCULIACEAE.

தியுபுரோமம். THEOBROMA.

வாகம். உஷ்டண அமரிகதேசம்.

வாகடபகுதி. தியுரோம நெய். இது கொட்டைகளை அரைத்து அவித்துப் பிழிந்தெடுத்தபின், உறைந்த எண்ணெய். இது கொழுப்பின் தடிப்பும் வெண்மஞ்சள்நிறமும், சகுலாத்து⁷ப்போன்ற மணமும், குளிர்ந்த நல்ல

1 Tannic acid. 2 Gallic acid. 3 Monocotyledon. 4 Dysentery. 5 Diuretic. 6 Quinia. 7 Chocolate.

சுவையுமுள்ளது. அதின் முறிவு அந்நிய பதார்த்தம் ஒன்றுத் தோன்றாமல் சுத்தமாயிருக்கும். பரமானுபடுவதால் பாண்டல் பிடியாது. 122 பாகை சூட்டில் உருகும்.

தன்மைகள் உபயோகங்கள். இது இமாலியம்¹ பிரதானமாய் மற்றும் மருந்துகளுக்குத் துணையாகச் சேரும். இது தனிக்கமில் தலஸ்தம்²; இரச தலஸ்தம், மாவிய³தலஸ்தம், வங்ககூட்டுத் தலஸ்தங்களிற் சேருகின்றது.

லீனியங்கள்.

LINEAE.

லீனம். LINUM USITATISSIMUM. FLAX.

வாசம். தென்யுரோபம்; யுரோபத்தின் பலபகுதிகளிலும், ஆசிய வட அமரிக தேசங்களிலும் இது அதிகமாய்ச் செய்யப்படும்.

வாகடபகுதி. லீனக்கொட்டைகள். இவை நீள வட்டமும் தட்டையுமாய் விளிம்பும் ஒரு தலைப்புங் கூராய், வெளிப்பக்கம் அழுத்தமும் மினுக்கமும் கபிலநிறமுமாய் உள்ளே வெண்மஞ்சள் நிறமாய் மணமற்று வழுவு முப்பான எண்ணெய்ச் சுவையுடையனவாயிருக்கும்

தன்மை. இமாலியம், திமல்சம்⁴, போஷணி⁵.

உபயோகங்கள். சுவாச உறுப்புகள், சன்ன சல⁶ உறுப்புகளின் சளிச் சவ்வுக⁷ளினதும் மற்றுஞ் சளிச்சவ்வுகளினதும் அழற்சி தாபிதங்களுக்கு⁸இது வழங்கப்படும்.

ரசிதங்கள். லீனவின்னூசம். Infusion of Linseed. கொள். இடித்த லீனக்கொட்டை நூற்றறுபது கிறேன். நறுக்கிய அதிமதூர வேர், ஒரு திரும்; கொதிவெந்நீர் பத்து அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் நாலு மணிநேரம் ஊறவிட்டுச் சீலையில் வடிக்கவும்.

தேயம். இரண்டு முதல் நாலு அன்சு. அல்லது விரும்பிய அளவுக்குக் குடிக்கலாம். எலுமிச்சம்பழச்சாறும்⁹ சர்க்கரையுஞ் சேர்த்தால் அதிகம் உருகிகொடுக்கும்.

லீனப்பாப்பை. Linseed Poultice. கொள். லீனமா, அல்லது லீனக்கொட்டையை அரைத்து அதிலுள்ள திரவெண்ணெய்¹⁰யை நீக்கியமா, நாலு அன்சு; ஒலீவெண்ணெய், அரை அன்சு; கொதிவெந்நீர் பத்து அன்சு. லீனமாவை வெந்நீரோடு படிப்படியாய்ச் சேர்த்துக் கலக்கிக்கொண்டு எண்ணெய்யையுஞ் சேர்க்கவும்.

இது ஓர் நல்ல சாந்தியான பாப்பை.

லீனதேலம். Linseed oil. இது சூடில்லாமல் லீனக்கொட்டையைப் பிழிந்தெடுத்த எண்ணெய். இது பிசுபிசுப்பும், மஞ்சள்நிறமும், சொற்ப மணமும், நெய்ச்சுவையுமுள்ளது.

லீனக்கொட்டையை 200 பாகை சூட்டில் அவித்தபின் பிழிந்தெடுத்த லீன எண்ணெய்யே பெரும்பாலும் கிடைக்கக்கூடியது. இது கருமைநிற

1 Emollient, சாந்தி. 2 Tannic acid Suppository. 3 Morphia. 4 Demulcent, சாமி. 5 Nutrient. 6 Genito-urinary. 7 Mucous membrane. 8 Inflammation. 9 Lime Juice. 10 Fixed oil.

மும் அதிக மணமும் சுவையுமுடையது. அரை அன்சு ஒரு அன்சு தேயத்தில் இது விரேசனியாகும். ஆயினும் இதை உள்ளுக்குக் கொடுப்பது அரிது. வேஸ்காட்டுக் காயங்களுக்குரியவோர் வினிமெனில்¹சேருவதே வைத்தியத்தில் இதின் விசேஷ உபயோகம்.

சை குவீலியங்கள்.

ZYGOPHYLLAE.

சுவயக மரம். GUAIACUM TREE.

வாசம். மேற்கிந்து தீவுகள்.

வாகடபகுதிகள். 1 இந்த மரத்தின் சிராய். இது பெரிய குற்றிகளாக வரும். மெத்த வைரமானது, குறுக்கே வெட்டிப் பார்த்தால், மையத்தை நோக்கும் வரிகள் துலாம்பரமாய்த் தோற்றாது. மரத்தின் வெளிப்பங்கு வெண்கபிலநிறம். உட்பங்கு கரும்பச்சையான கபிலநிறம். மருந்துக்கு வேண்டிய சுவயகச்சிராய், சீவல்களாக வரும். இவைகள் நீதுரிக்கமில்²துக்கு நீலநிறங்கொடுப்பதால் இவைகளை மற்றும் மரச் சிராய்களினின்று பகுத்தறியலாம். 2 அதின் ராளம். இது அடி மரத்திற் கீறுவதாலும் சூடு காட்டுவதாலும் இயல்பாய்ப் பொசியும். இது கபிலநிறமான பருங் கட்டிகளாக வரும். ஒடிந்தாற் பளபளக்கும். விளிம்புகள் உருவொளியாய் ருக்கும். சுவை முதலிற் சற்றே கைப்பு, மறுபடி உறைப்பு, பிறகு தொண்டையில் எரிந்துகொண்டுநிற்கும். மணம் சற்றே பல்சம்³போன்றமணம். சூடுகாட்டினால் அல்லது மாவாக்கினால் சுகந்த மணம் வீசும். இதைத் திட்டிசீதற் கரைத்துப் பச்சையான புடேது⁴க்கிழங்குச் சீவலின் உட்பக்கத்திற் பூசும்போது தெளிந்த நீலமுண்டாகும்.

தன்மை. ஸ்திமுலம்⁵, சுவேதனி⁶, அல்திறவம்⁷, எம்மெனகாக்கு⁸.

உபயோகம். சிவ்விசு⁹, வாத சுவாத¹⁰நோய்களுக்கு இது வெகுகாலமாகப் பேர்பெற்ற மருந்து. திஸ்மெனுரீயம்¹¹ அமெனுரீயங்க¹²ளுக்கும் கருப்பையின் மற்றுநோய்களுக்கும் இது சத்தியுள்ளது. மேலும் தன்சிற்றபம்¹³ திவ்திரி¹⁴, புறங்கறீயம்¹⁵, சருமரோகங்கள் முதலியவற்றுக்கு இது கொடுத்து நயங்கண்டது.

தேயம். ராளத்தில் பத்துமுதல் முப்பது கிறேனை உண்டையாக அல்லது இமல்சமாக¹⁶ கொடுக்கலாம்.

ராளத்தின் ரசிதங்கள். சுவயமிஸ்தூர். Guaiacum Mixture. கொள். சுவயக ராளம் தூளாக, அரை அன்சு; சுத்த சர்க்கரை அரை அன்சு; அகசிப்பிசின்மா¹⁷ கால் அன்சு; கறுவாநீர் அரைநாழி, சுவயகராளத்தைச் சர்க்கரை பிசினோடு கலந்து அரைத்துக் கறுவாநீரைப் படிப்படியாய்ச் சேர்க்கவும்.

தேயம். அரை முதல் இரண்டு அன்சு; நாள் இரண்டு மூன்றுமுறை

1 Liniment. 2 Nitric acid. 3 Balsam. 4 Potatoe. 5 Stimulant. 6 Diaphoretic. 7 Alterative. 8 Emmenagogue. 9 Syphilis. 10 Gout. 11 Dysmenorrhoea. 12 Amenorrhoea. 13 Tonsillitis. 14 Diphtheria. 15 Bronchorrhoea. 16 Emulsion. 17 Gum Acacia.

கொடுக்கலாம். ஒவ்வொரு அன்சு கலவையிற் பதினொரு கிறேன் ராளம் இருக்கும்.

துவயகவமோனரஞ்சம். Ammoniated Tincture of Guaiac. கொள். குவயகராளம், மாவாக நாலு அன்சு; அமோன சுகந்த சீது¹ அரைநாழி. நன்றாயடைத்த பாத்திரத்தில் ஏழுநாள் ஊறவிட்டு வடித்துப் பிறகு அரைநாழி யாகப் போதிய அளவுக்கு அமோன சுகந்த சீதைக் கூட்டவும்.

தேயம். அரை முதல் ஒரு திராமை முசிலாகு² சேர்த்து இமல்சு³மாக்கி நாள் இரண்டுமுன்றுமுறை கொடுக்கவும். சுவேதனி⁴எமெனகாக்காகச்⁵ கொடுப்பதற்கு இதுவே உத்தமமான முறை. குவயகராளம் கலமற்கூட்டுக் குளிகை⁶யிலும் ஓர் கூறாகச் சேருகின்றது.

துவயகச்சிராயின் ரசிதம். சார்சகூட்டுத் திகாச்சத்⁷தில் மத்திரமே குவயகச்சிராய் ஓர்கூறாகச் சேருகின்றது.

அவாகடச்சரக்த Non-Officinal.

நெருஞ்சி. Tribulus lanuginosus. இந்தப் பூண்டின் எல்லாப் பகுதிகளும் விசேஷமாய் இதின் காய்கள் தியுநீசமாகத்⁸ தென்னிந்துவிற் பேர்கேட்டிருக்கின்றன. வாறிங்கு பண்டிதர் இதைச் சோதனைசெய்தபோது சிலரிற் சிறுநீரை அதிகமாயுறச்செய்ததெனக் கண்டார். சிலரிலோ அதால் ஒருசெயலுந் தோன்றவில்லை. இதைக் கொடுக்கும் முறையாவது; நெருஞ்சிக்காய், துவைத்து, இரண்டு அன்சு; மல்லி⁹ இரண்டு திராம், தண்ணீர் அரைநாழி. கால்நாழியாய் வரக் காய்ச்சிச் சீலையில் வடித்து ஒருநாள் வரையிற் கொஞ்சங்கொஞ்சமாய்க் கொடுக்கலாம். காய்களையும் வேரையும் நெல்லரிசியோடு போட்டுக் கஞ்சியாகக் காய்ச்சிக் கனக்கக் குடிப்பதே சுதேசிகள் வழங்கும் பின்னொருமுறை. இப்படிக் குடிக்கும் நீர்தானே மருந் தொன்றுமில்லாமல் தியுநீசமாகச் சேஷ்டிக்கப் போதியது.

ருதாசியங்கள்.

RUTACEAE.

அறுதம். RUE.

வாசம். தென் யுரோபம்; அமரிகத்திலும் மற்றுமிடங்களிலும் இதுசெய்கைபண்ணப்படும்.

வாகடபகுதி. பூண்டு முழுவதும், மெத்தக் கெட்ட மணமும், கைப்பும் உவட்டுமான சுவையுமுடையது. ஓர் அத்திர வெண்ணெய்¹⁰யும், ஓர் கைப் பெசுருத்திவு¹¹மே இதின் சத்துகளாகும்.

தன்மை. ஸ்திமுல¹²மும், அந்தெல்மிந்தியும்¹³. ஸ்திமுலமாய்ச் சராயுமண்டலம்¹⁴, நரம்புமண்டலங்க¹⁵ளிலேயே இது விசேஷமாய்ச் சேஷ்டிக்கும். தேயம் அதிகப்பட்டால் இது ஓர் மயற்கழற்சி¹⁶ நஞ்சாகும்.

1 Aromatic spirit of Ammonia. 2 Mucilage. 3 Emulsion, 4 Sudorific. 5 Emmenagogue. 6 Compound pill of calomel. 7 Compound decoction of Sarsae. 8 Diuretic, அழித்தி. 9 Coriander. 10 Fixed oil. 11 Bitter extractive. 12 Stimulant, தீவனி. 13 Anthelmintic, கொடுகொல்லி. 14 Uterine system. 15 Nervous system. 16 Narcotico-irritant poison.

உபயோகங்கள். இஸ்தேரி¹ அமெனூறீயங்க²ளுக்கும் மற்றுங்கருப்பை நோய்களுக்கும் இது முற்காலத்தில் பேர்பெற்ற மருந்து. எபிலெப்சி³ கும் குழந்தைகளின் வலிப்புகளுக்கும் வாயுப்பொருமல் வலி முதலிய நோய்களுக்கும் இது கொடுக்கப்பட்டது. தற்காலத்திலோ இதின் பிரயோகம் அரிது.

ரசிதம். அறுதத்தேலம். Oil of Rue. இது பச்சிலைகள்காய்களிலிருந்து திஸ்திலிக்⁴கப்படும். இது வெண்மஞ்சள் நிறமும் கெட்ட மணமும் காரமான கைப்புச் சுவையுமுள்ளது.

தேயம். இரண்டு முதல் ஐந்து துளியைச் சர்க்கரையோடும் தண்ணீரோடுஞ் சேர்த்து அரைத்துக் கொடுக்கலாம்.

இதற்கு நெருங்கிய இனமான அர்வதா⁵ என்ற பூடு இந்துவின் மிகுதியான பகுதியிலே தோட்டங்களிற் செய்யப்படும். அறுதம் உதவும் நோய்களுக்கும் மகமதிய வைத்தியர் இதை மெத்த மதிக்கிறார்கள். அறுதப் பூட்டுக்கு இது பூரண பதிலாகும்.

கஸ்பாரி மரம். CUSPARIA.

வாசம். தென்னமரிசத்தின் உஷ்டண பகுதியின் சோலைகள்.

வாகடபகுதி. பட்டை. இது ஓரங்கள் கோலிய நேரிய துண்டுகளாக வரும். தடிப்பு அரை லீன்⁶ முதல் ஒரு லீன் வரைக்கிருக்கும். விளிம்புகள் சீவப்பட்டிருக்கும். வெளித்தோல் புள்ளிவிழுந்து கபிலம் அல்லது மஞ்சள்நரை நிறமாயிருக்கும். உட்பக்கம் மஞ்சட்கபிலமாயும் படலம்படலமாயுமிருக்கும். மெத்த ஓடியலானது. கைப்புஞ் சற்றே சுகந்தமுமானது. வெட்டுவாயைக் கண்ணாடியாற் பார்த்தால் வழக்கமாய் வெள்ளைப் புள்ளிகளும் நுண்வரிகளும் தோன்றும். உட்பக்கத்தை நீதுரிக்கமில⁷த்தாற் தொட்டால் இரத்தம்போற் சிவப்பாய் வராது.

தன்மை. இது சுகந்தமான தொணிகி⁸. அந்திபிராடி⁹.

உபயோகம். தாழ்ந்த அசத்துவ¹⁰மான நச்சுக் காய்ச்சல்களுக்கு இது அதிகமாய் வழங்கப்படும். ஆயினும் இதின் நயம் சந்தேகம். இந்தக் காய்ச்சல்களுக்குப் பின்னும் ஆளை இளைக்கப்பண்ணும் மற்றும் வியாதிகளுக்கும் பின்னே காணும் பெலவீனத்துக்கு இது மெத்த உவப்பு. அசத்துவ குண்மத்தி¹¹லும் தியறீயத்தின்¹² பிற்பாதங்களிலும், திசந்தெரி¹³யிலும் பொதுவான பெலவீனத்திலும் இதால் நயமுண்டாகும்.

தேயம். பட்டைத்தூளில் பத்துமுதல் நாற்பது கிரேன் கொடுக்கலாம். இதை இன்வூசமாகக் கொடுப்பதே உத்தமம்.

ரசிதம். கஸ்பாரியின்வூசம். Infusion of Cusparia. கொள். கஸ்பாரிப்பட்டை பருக்கன் தூளாக அரை அன்சு; 120 பாகை சூடான வெந்நீர் பத்து அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் இரண்டு மணிநேரமுறவிட்டுச் சீலையில் வடிக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு, இரண்டு அன்சு.

1 Hysteria. 2 Amenorrhoea. 3 Epilepsy. 4 Distill. 5 Indian rue. 6 Line.

7 Nitric acid, 8 Tonic. 9 Antiperiodic. 10 Atonic. 11 Dyspepsia.

12 Diarrhoea. 13 Dysentery.

தியாஸ்மியங்கள்.

DIOSMEAE.

பூக்கு. BUCHU.

வாசம். தென்னாபிரிகம்.

வாகடபகுதி. காய்ந்த இலைகள். இவைகள் அழுத்தமானவைகள். ஓரக் கருக்குகளிலும் துனியிலும் தெளிந்த புள்ளிகளையுடையன. வீரண மணமும் உறைப்பான கர்ப்பூரச் சுவையுமுள்ளவைகள். இவைகளில் மூன்றுவகையுண்டு. 1 முக்கால் இஞ்சு நீளமாய்த் தோல்போன்று முட்டைவடிவாய்ச் சுருண்ட கூழையான துனியும், கூரான முருந்து போன்ற அகலமான பற்களுமுள்ளதாயிருக்கும். 2 ஏறக்குறைய ஒரு இஞ்சு நீளமாயும், நீள வட்டமாயும், துனி நீண்டு அடி கூழையாய் ஓரம் நுண்ணிய கருக்குகளுடையதாய் ஐந்து நரம்புள்ளதாயுமிருக்கும். 3 ஒரு இஞ்சு முதல் ஒன்றரை இஞ்சு நீளமாய் துனி நீண்டொடுங்கியும் கூரான நுண்ணிய கருக்கோரமாயும் மூன்று நரம்புள்ளதாயுமிருக்கும். இவ்வினையின் சத்துகள் அத்திர எண்ணெய்¹யும் தியாஸ்மின்² என்ற கைப்பான எசுரூத்திவு³மே.

தன்மை. சுகந்த⁴ ஸ்திமுலம்⁵, தொணிகம்⁶; சலஉறுப்புகளில் விசேஷ செயல்காட்டும்போல.

உபயோகம். பிருக்க⁷ ரோகங்கள், சலபாதையின் அழற்சி, காலிகசலப்பைத்தபம்⁸, புரஸ்தகோளத்தின்¹⁰ நோய்கள், வாதம், குன்மம், இவைகளுக்குக் கொடுக்கப்படும்.

தேயம். இலத்தூள் இருபது முதல் முப்பது கிரேன். பின்வரும் ரசிதங்களாகக் கொடுப்பதே உத்தமம்.

ரசிதங்கள். பூக்கின்லுசம். Infusion of Buchu. கொள். பூக்கிலை, துவைத்து அரை அன்சு; கொதவெர்நீர் பத்து அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் ஒரு மணிநேரமூறவிட்டுச் சீலையில் வடிக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு, நாள் இரண்டு மூன்று முறை கொடுக்கலாம்.

பூக்கிரஞ்சம். Tincture of Buchu. கொள். பூக்கிலை பருக்கன் தூளாக இரண்டரை அன்சு; புருவுசீது¹¹ அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்தில் பூக்கிலையைப் பதினைந்து அன்சு சீதில் இரண்டுநாள் ஊறவைத்து இடைச்சிடை குலுச்சவும். பிறகு சியந்தனி¹²யில் இட்டு நீர் வடிந்தொழிந்தபின் மிச்சமான ஐந்து அன்சு சீதையும் விட்டு வடிக்கவும். பிற்பாடு சக்கையை நசுக்கி, வடித்து இரண்டு நீர்களையுங்கலந்து அரைநாழியாகப் போதிய புருவுசீது சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

தேயம். ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திரும்.

1 Volatile oil. 2 Diosmin. 3 Bitter extractive. 4 Aromatic, 5 Stimulant.
6 Tonic. 7 Kidney. 8 Urethra. 9 Chronic Cystitis. 10 Prostate gland.
11 Proof spirit. 12 Percolator.

ஒறந்தியசியங்கள்.

AURANTIACEAE.

தோடை. ORANGE TREE.

இதற் தேன்தோடை, கைச்சந்தோடையென்று இரண்டு வகையுண்டு. வாசம். இந்து, சீனம்; பழத்துக்காகவே இது அதிகமாய்ச் செய்கைபண்ணப்படும்.

வாகடபகுதி. பழத்தின் காய்ந்த வெளித்தோல்; இது கரு மஞ்சள் நிறமான மெல்லிய சீவல்களாக வரும். வெண்மையான உத்தோல் இதோடு மெத்தச் சேர்ந்திராது. காரமான கைச்சந்தையையும் நற்கந்தமும் இதற்குண்டு. கைச்சந்தோடந்தோலுக்கே இத்தன்மைகள் தோற்றமாயுண்டு. அதுவே மருந்துக்கு நயமென்று எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.

தன்மை. ஸ்தொமாகி¹, தொணிகம்².

உபயோகம். அசத்துவகுன்மம்³, பசியின்மை, பெலவீனம் முதலியவற்றுக்கு இது கொடுக்கப்படும். ஆயினும் தனியே கொடுப்பதரிது.

ரசிதங்கள். தோடந்தோலின்வூசம். Infusion of Orange Peel. கொள். கைச்சந்தோடந்தோல் சிறுத் துண்டுகளாக வெட்டி, அரை அன்சு; கொதிவெந்நீர் பத்து அன்சு. மூடிய பாத்திரத்திற் பதினேந்து மினிநேரம் ஊறவிட்டுச் சீலையில் வடிக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் நாலு அன்சு.

தோடந்தோற் கூட்டின்வூசம். Compound Infusion Orange Peel. கொள். கைச்சந்தோடந்தோல் சிறுத்துண்டாக வெட்டி, கால்அன்சு; பச்சையான சம்பந்தோல்⁴ துண்டு துண்டாக வெட்டி, அறுபது கிறேன் இடித்த கரம்பு முப்பதுகிறேன்; கொதிவெந்நீர் பத்து அன்சு. மூடிய பாத்திரத்திற் கால்மணினேரமூறவிட்டுச் சீலையில் வடிக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு. இதுவும் முன்வந்த இன்வூசமும் இணக்கமான ஸ்தொமாகிகள். உப்பு விரேசனிகள் முதலிய வேறு மருந்துகள் கொடுப்பதற்கு இவை நல்ல அனுபானமாகும்.

தோடந்தோலரச்சம். Tincture of Orange Peel. கொள். கைச்சந்தோடந்தோல், துண்டுதுண்டாக வெட்டித் துவைத்து, இரண்டு அன்சு; புருவுசீது⁵ அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்தில் எழுநாள் ஊறவிட்டு, இடைக்கிடை குலுக்கி, சீலையில் வடித்து மறுபடி நசுக்கிப் பிழிந்து வடித்து அரைநாழியாகப் போதிய புருவுசீது சேர்க்கவும்.

தேயம் ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திரும்.

தோடந்தோற் சிறுபம். Syrup of Orange Peel. கொள். தோடந்தோலரச்சம், ஒரு அன்சு; சிறுபம் எழுஅன்சு. இரண்டையுங் கலக்கவும்.

தேயம். ஒரு திரும்.

தோடம்பூநீர். Orange Flower Water. தோடம்பூவில்திஸ்திலித்த நீர்⁶, சிரா⁷நோய்கள் இஸ்தேரி⁸ நோய்களில் அந்திஸ்பசியாகவும் சாந்தனியா

¹ Stomachic, ² Tonic. ³ Atonic Dyspepsia. ⁴ Lemon peel.

⁵ Proof spirit. ⁶ Distilled water. ⁷ Nervous. ⁸ Hysteria. ⁹ Anti-spasmodic, கருக்கினி.

கவும் இரண்டொரு அன்சு தேயமாய்க் கொடுக்கப்படும். சுத்தமானால் இது நிறமற்றதாகவும், ஐருசல்வுரிக்கமில்¹ வாயுவினால் மாறுதலடையாமலுமிருக்கும்.

தோடம்பூச்சிறுபம். Syrup of Orange Flower. கொள். தோடம்பூநீர், எட்டு அன்சு; சுத்த சர்க்கரை மூன்று இரூத்தல்; தண்ணீர் பதினாறு அன்சு, அல்லது போதியது. சர்க்கரைபைத் தண்ணீரிலிட்டுச் சூட்டாற் கரைத்துச் சீலையில் வடித்து, ஆறும்போது தோடம்பூநீரைச் சேர்க்கவும். பாணி நாலரை இரூத்தல் வரத்தக்கதாய்த் தண்ணீர் தேவையானாற் போதியளவு கூட்டவும். அதின் விசேஷகிரூவிதம்² 1.330 ஆயிருக்கவேண்டும்.

இது வாசனைக்காகப் பெரும்பாலும் வழங்கப்படும்.

இந்த ரசிதங்களிலன்றி சென்சன் கூட்டின்வூசம்³, சென்சன்மிஸ்தர்⁴, சென்சன் கூட்டிரஞ்சங்க⁵ளிலும், கைச்சந்தோடந்தோல், ஓர்கூறுகச்சேருகின்றது.

சம்பம். LEMON TREE.

வாசம். இந்து, சீனம்; உஷ்டண தேசங்களில் இது அதிகமாய்ச் செய்யப்படும்.

வாகடபகுதிகள். 1 பழத்தின் வெளித்தோல். 2 தோலின் அத்திரவெண்ணெய். 3 பழச்சாறு.

தோலின்தன்மை. ஸ்தொமாகி⁶, காமினதி⁷.

உபயோகம். தோடம்பழத் தோலைப் போலவே. இது விசேஷமாய் வாசனைக்காக வழங்கப்படும்.

ரசிதங்கள். சம்பந்தோலிரஞ்சம். Tincture of Lemon Peel. கொள். பச்சையான சம்பந்தோல் மெல்லிதாய்ச் சீவி, இரண்டரை அன்சு; புருவு சீது அரைநாழி. அடைத்த பாத்திரத்தில் எழுநாள் ஊறவிட்டு இடைக்கி டை குலுக்கிச்சீலையில் வடித்து நசுக்கிக் கடுதாசியில் வடித்து, அரைநாழியாகப் போதிய புருவுசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திரும்.

சம்பந்தேல். Lemon Oil, துருவிய சம்பந்தோலைத் திஸ்திலித்தாவது பிழிந்தாவது இந்த எண்ணெய் எடுக்கப்படும். இது வெண்மையான மஞ்சள்நிறமும், நல்ல மணமும், அனவான கைப்புச் சுவையுமுள்ளது.

இரண்டு துளி நாலு துளி தேயத்தில் இது காமினதி. ஆயினும் இத்தன்மைக்காய் இது வழங்கப்படுவதரிது. அமோன சுகந்தசீதிலும்⁸ பதாசிய வியோதிர சபு லினிமெனிலும்⁹ இது ஓர் கூறுகச் சேருகின்றது. சில வகையான கண்ணேவுக்கு இது பூச்சுமருந்தாக வழங்கப்படும். ஆயினும் நயங்காண்பது சந்தேகம்.

சம்பஞ்சாறு. Lemon Juice. சம்பம்பழத்தைப்பிழிந்து சீலையில் வடித்தசாறு. இது சற்றே மங்கலும், மஞ்சள்நிறமும் கார்ப்பான புளிப்புச்சுவையும், நல்ல மணமுமுள்ளது. இதின்சராசரியான¹⁰ விசேஷகிரூவிதம் 1.039.

சம்பஞ்சாற்றில் ஒரு அன்சுக்கு 32 கிரேன் வீதமாகச் சிதறிக்கமில்¹¹மும், அத்தோடு முசிலாகும்¹² எசுரூத்திவும்¹³ அடங்கியிருக்கும். நெடுகவைத்திரு

1 Hydro-sulphuric acid gas. 2 Specific gravity. 3 Compound Infusion of Gentian. 4 Mixture. 5 Tincture. 6 Stomachic. 7 Carminative. வாடிக்கை. 8 Aromatic spirit of Ammonia. 9 Liniment of Iodide of Potassium and Soap. 10 Average. 11 Citric acid. 12 Mucilage. 13 Extractive.

ந்தால் இது கூறுபடக்கூடியது. அப்படிக்கூறுபடுவதைத் தடுப்பதற்கு வீரூனபிரண்டியை¹ 100 பங்குக்குப்பத்துப்பங்குவீதமாய்க்கூட்டவும், வடித்து முசிலாகைப் பிரிக்கவும்வேண்டும். இதிலும்நல்லவழி பின்னுமொன்றுண்டு. சாற்றைப் பிழிந்தபின் அதிலுள்ள உறையக்கூடிய பதார்த்தம் பிரியுந்தனையும் அதைக்கொஞ்சநேரம் நிற்கவிட்டு, பிறகு வடித்துச் சீசாக்களில்விட்டு மேலே வாதுமை எண்ணெய்கையாவது² இனிமையானவேறேதும் எண்ணெய்கையாவது ஒரு படைமாய் நிற்கவிட்டு அடைக்கவும்.

தன்மைகள். நயந்த ஸ்கேவிக்கினி³ குளிர்மையானது, முதன்மையாய் அபால்கலை⁴, இரண்டாவதாய் அபாமிலி⁵.

உபயோகங்கள். ஸ்கேவி⁶வராமற் காப்பதற்கும், அதை மாற்றுவதற்கும் இது முதல் மருந்து. தண்ணீர் கலந்து இனிப்பாக்கினை சம்பச்சாறு காய்ச்சல் தாபித்⁷ நோய்களுக்கு ஓர் உத்தமமான குளிர்ந்த பானமாகும். தீவிர⁸ வாதத்துக்கும் வாதகுவாதத்துக்கும்⁹ உஷ்டண தேசங்களிலுண்டாகும்சிலவகையான தீவிரதிசந்தெரி¹⁰. தியறீயம்¹¹ முதலியநோய்களுக்கும் இதுசித்தியாய் வழங்கப்பட்டது. மயக்கழற்சி நஞ்சுகள்¹² சிலவற்றுக்கு இது பெரும்பாலும் நல்ல மாற்றமருந்தாகும்.

தேயம். இரண்டுதிரும்¹³ முதல் ஒருஅன்சு¹⁴ வரைக்குங் கூடவுங் கொடுக்கலாம். தீவிரவாதத்தில் இரண்டொரு அன்சு நாலு ஆறு மணிக்கு ஒரு முறை கொடுக்கலாம்.

ரசீத்¹⁵, சம்பஞ்சீறுபம். Syrup of Lemon. கொள். பச்சையான சம்பந்தோல், இரண்டு அன்சு; சீலையில் வடித்த சம்பஞ்சாறு, அரைநாழி; சுத்த சர்க்கரை இரண்டேகால் இறுத்தல். சம்பஞ்சாற்றைக் கொதிக்கத்து வங்குந்தனையும் காய்ச்சி அதைச் சம்பந்தோலோடு மூடிய பாத்திரத்தில் ஆறுந்தனையும் நிற்கவிட்டு வடித்து, வடித்தநீரிற் சர்க்கரையை மென்கூட்டிற் கரைக்கவும். வரும் பாணி மூன்றரை இறுத்தல் நிறுக்கவும். 1.34 என்ற விசேஷகிரூவிதம்¹⁵ உடையதாயிருக்கவும் வேண்டும்.

தேயம். ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திரும். அதி காங்கையில் இது சுறுக்கில் கொதிக்குமாகையால் உஷ்டண தேசங்களில் வழங்க மெத்தத் தருந்ததல்ல. தேவையானவேளைகளில் புதிதாய்ச்செய்துகொள்ளவேணும்.

சித்றிக்கமீலம். Citric acid. இது சம்பஞ்சாறு அல்லது எலுமிச்சஞ் சாற்றிலிருந்து செய்த ஓர் கிரிஸ்தலான¹⁶ அமிலம். இதைக் குறிக்குஞ் சின்னம். ஐ3 கா6 ஐ5 அ7 ஐ2 அ. இது நிறமற்றதும் ரம்பம்¹⁷ என்ற முதல் வடிவத்தை உடையதுமான கிரிஸ்தல்களாக விளையும். தண்ணீரில் மெத்தக் கரையக்கூடியது. திட்டசிதிற¹⁸ கொஞ்சமாய்க் கரையக்கூடியது. சுத்த ஈதரிற்¹⁹ கரையமாட்டாது. கிரிஸ்தல்கள் முக்கால்வாசி தண்ணீரிலும் அரைவாசி கொதிவெந்நீரிலுங் கரையும். தண்ணீரிற் கரைந்தகரைவு உவப்பான புளிப்புச் சுவையுடையது. முப்பத்துநாலுகிறேன் சித்றிக்கமீலத்தை ஒரு அன்சு தண்ணீரிற் கரைத்தால் வீறிலும் புளிப்புத்தன்மையிலும் எலுமிச்சம் பழச்சாறுபோலாகும். வைத்திருந்தால் அச் சாற்றைப் போலக் கூறுபட்

1 Brandy. 2 Almond oil. 3 Antiscorbutic. 4 Antalkali. 5 Antacid.

6 Scurvy. 7 Inflammation. 8 Acute. 9 Rheumatic gout. 10 Dysentery.

11 Diarrhoea. 12 Narcotico-irritant poison. 13 Drachm. 14 Ounce.

15 Specific gravity. 16 Crystalline. 17 Rhomb. 18 Rectified spirit. 19 Ether.

டுப் பாண்டல்கட்டும். தண்ணீர்க்கரைவு ஐருசல்வரிக்கமில்¹ வாயுவாற் கரு மையடையாது. பதாசியசிடசு² நீருக்காவது, பாரிதகுலோறி³ நீருக்காவது இதை அதிகமாய்ச் சேர்க்க அடையல்விழாது. குளிர்ந்த சுண்ணாம்புத்தண் ணீருடன்⁴ இதைச் சொற்பமாய்ச் சேர்த்தால் இது அதை மங்கலாக்காது. கிரிஸ்தல்களைப் பரமானுவில் எரித்தாற் சாம்பல்விழாது. திஸ்திலித்த⁵ நீரி ற் கரைக்கப்பட்ட எழுபதுகிறேன் சிதிறிக்கமில்மானது சோடபருமவில யனத்தில்⁶ 100 கிறேன் அளவாற் தடஸ்திக்கப்படும்⁷.

தேயம். பத்துமுதல் முப்பது கிறேன்.

நுரைபானங்கள் குளிர்ச்சிப்பானங்கள் செய்வதற்கே சிதிறிக்கமில்ம் பரி காரத்தில் பிரதானமாய் வழங்கப்படும். ஒரு அஞ்சு சிதிறிக்கமில்த்தைப் பதினாறு அஞ்சு தண்ணீர் கரைத்து, சிலதுளி சம்பந்தேல் விட்டு வாச னைப்படுத்தினால் அது செயற்கையான⁸ சம்பஞ்சாறு ஆகும். நுரைபானங் கள் செய்வதிற் தடஸ்தகலவை⁹ உண்டாவதற்கு அமிலமும்¹⁰ தாரகமும்¹¹ சேரவேண்டிய வீதங்களாவன.

	௨	சிதிறிக்கமில்ம் அல்லது சம்பஞ்சாறு.	௧௨
பதாசியசிடசு ¹²	௧	14 கிறேன்.	3½ திரும்.
அமோன ¹³ காபனசு	௨	24 கிறேன்.	6 திரும்.
சோட ¹⁴ துவிகாபனசு	௩	17 கிறேன்.	4 திரும்.

* எலுமிச்சை. LIME TREE.

வாசம். இந்துவிலும் மற்றும் உஷ்டண தேசங்களிலும் இது வழக்கமா ய்ச் செய்கைபண்ணப்படும்.

வாகடபதூதி. பழம். இது சம்பம்பழத்தைப் போன்றது. ஆயினும் சி றியதும் தோல் மெல்லிதும் அழுத்தமுமாயிருக்கும். வாசனையிற் குறைவு. இதின் சாறு சம்பஞ்சாற்றைப் போன்ற கார்ப்பான புளிச்சுவையுள்ளது. அதின் கூறுகளே இதிலும் உண்டு. ஆயினும் அக்கூறுகளின் வீதம் இதிலே சற்று வித்தியாசம். இதிற் சிதிறிக்கமில்ம் அதிக வீதமாயும் முசிலாகு கு றைந்தவீதமாயும் இருக்கும். சம்பஞ்சாறு என்று இங்கிலந்துக்கு ஏற்றுமதி பண்ணப்படுஞ் சாறு மிகுதியாய் எலுமிச்சம்பழத்திலிருந்தே எடுக்கப்படும்.

தன்மைகளும் உபயோகங்களும். சம்பம்பழத்தைப் போன்றவைகளே. இதின் சாறு அதைப்போலக் குளிர்மை. ஸ்கேவிக்கு¹⁷ மாற்றமருந்து. உஷ் டணதேச வைத்தியர் பலர் இதையே நல்லதென்று எடுத்துக்கொள்ளுகிறார் கள். எலுமிச்சம்பழச்சாறு உஷ்டண தேசங்களில் கிட்டத்தட்ட எல்லா ப்பகுதிகளிலும் கிடைக்கும். பேணிவைத்த சாற்றைப்பார்க்க இதேஅதிக திறமானது. சம்பச்சாற்றைப்பார்க்க எலுமிச்சம்பழச்சாற்றில் சிதிறிக்கமி லத்தின் வீதம் அதிகமாதலால் சிதிறிக்கமில்ம் எடுப்பதற்கு இச்சாற்றை வழங்கலாம்.

1 Hydro-sulphuric acid gas. 2 Acetate of Potash. 3 Chloride of Barium. 4 Lime water. 5 Distilled, 6 Volumetric solution of soda, 7 Neutralize. 8 Artificial. 9 Neutral compound. 10 Acid. 11 Base, 12 Bicarbonate of Potash. 13 Ammonia. 14 Soda. 15 Saturate. 16 Mucilage. 17 Scurvy.

வில்வம். AEGLE MARMELOS. BAEL.

வாசம். இது இந்துவடங்கலுமுள்ள மேட்டுச் சோலைகளில் உண்டு. இந்தக்களுடைய பரிசுத்த மரங்களிலொன்றாகையால் கோயில்களுக்குக் கிட்டப் பெரும்பாலும் வளர்க்கப்படும்.

வாடபதூதி. காய்ப்பழம். இது உண்டையாயுந் தோடம்பழம் அளவு பருமையும் அழுத்தமுமாயும் வைரமான ஒடுள்ளதாயுமிருக்கும். உள்ளுக்குப் பத்துப்பதினைந்து அறைகள் இருக்கும். இந்த அறைகளுக்குள்ளே கொட்டைகளன்றி மெத்தப் பிசினியான உருவொளியுள்ள சளியுமிருக்கும். பழம் சற்றே தர்ப்பந்தின்¹ போன்ற பழுதற்ற மணமும் சுவையுமுடையது. அதிலே தனிக்கமிலமும்² ஓர் அத்திரஎண்ணெய்யும்³ கைப்பான ஓர் சத்தும் பெருபல்சத்தின்⁴ மணத்தையொத்த பல்சம்போன்ற ஓர் சத்தும் அடங்கியிருக்கும்⁽²⁰⁾. ஓடும் அத்துடன் ஒட்டிய காய்ந்த சதையும் கொட்டைகளும் சேர்ந்த காய்ந்த வற்றற் துண்டுகளாக இது இங்கிலாந்துக்கு ஏற்றப்படும். ஓடு ஒன்றரை லீன்⁵ வரைக்குத் தடிப்புள்ளது. இது நரைநிறமான வெளித்தோலால் முடிண்டிருக்கும். உட்பக்கமும் காய்ந்த சதையும் சிவப்புநிறம். சதையை நனைக்கப் பாணிபோலாகும்.

நன்மை. இது கழிச்சலைக் கட்டுகிறதாகவும் மலச்சிக்கை இளக்குகிறதாகவும் பரீட்சையால் விளங்கியிருக்கிறபடியால் குடவின் சளிச்சவ்விலே இது சற்றே தீவனச் செயல்உடையதாயிருக்கவேணும். குடவின் இந்த இரண்டு சீர்களிலும் இது குடலைப் பெலப்படுத்துகிறதுபோலத் தோன்றுகின்றது.⁽²¹⁾

உபயோகம். அசத்துவமான⁶ தியறீயம்⁷ திசந்தெரீ⁸களுக்கும் இந்தநோய்களின் பிற்கூற்றிற்கும் குடற்பிசுக்குகளுக்கும் வாடிக்கையான மலவரட்சிக்கும் இது மெத்த நயப்பான மருந்து.

ரசிதங்கள். *வில்வக்கலவை. Bael Mixture. கொள். வில்வப்பழத்தின் மெதுவும் பிசினியுமான உள்ளுடனீர், இரண்டு அன்சு; தண்ணீர் நாலு அன்சு. இவற்றைத் திறமாய்க் கலந்து சர்க்கரை இரண்டு அன்சாவது ருசிக்குப் போதிய அளவாவது சேர்க்கவும்.

இதை ஐசு⁹ சேர்ப்பதாலாவது வேறு வகையாயாவது செயற்கையாய்க் குளிராக்கினால், பழத்தின் வாசனையுடைய சுவையான பானமாகும். நாள் இரண்டுமூன்றுமுறை கொடுக்கலாம். கனிந்த பழத்திற் செய்தால் கழிச்சலைக் கட்டுகிறதல்லாமல் மலவரட்சியை இளக்கவுங்கூடிய தன்மையுள்ளது. நோயாளியின் பெலன் மெத்தக் குன்றி இரைப்பைபழற்சியாகும்போது இந்தக் கலவை சிலவேளை இணங்காது. அப்போது இதைக் கொஞ்சங்கொஞ்சமாய் இடைக்கிடை கொடுக்கவேணும். வாந்தித்தால் வில்வ எசுரூத்தைக்¹⁰கொடுத்துப் பார்க்கலாம்.

* வில்வவேசிற்ந்து. Extract of Bael. மெல்லிய ஒப்பமான ஒடுள்ள நன்றாய்க் கனிந்த வில்வம்பழங்களைத் தெரிந்து, சதையை எடுத்துப் பாத் திரத்தில் வைத்து அதை மூடப் போதிய அளவு தண்ணீர் விட்டு இரண்டு மணிநேரத்துக்குக் கலக்கி உரப்பான காரிக்கம்புடைவையில் வடிக்கவும்

1 Turpentine. 2 Tannic acid. 3 Essential oil. 4 Peru Balsam. 5 Line.
6 Atonic. 7 Diarrhoea. 8 Dysentery. 9 Ice. 10 Extract.

(20) (21) அனுபந்தம் பார்.

வடியுநீர் சுவையற்றசா துந்தனையும் திரும்பத் திரும்ப இப்படியே வடித்துப் பாணிப்பதமாய் வருந்தனையும் நீர்மத்திகத்தின்மேல் வறட்டவும்.

நயந்தென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்தப் பாணி பழத்துக்குரிய சுகந்தம் எல்லாவற்றையும் அமைத்திருக்கும். மேலே சொல்லியபடி கனிந்த பழத்திற் செய்த எசுரூத்தைப்பார்க்கக் காய்ப்பழத்திற்செய்தது நெடுகவிருக்குமாம்.

தேயம். அரைத் திரும் முதல் ஒருதிரும், நாள் இரண்டு மூன்று முறை கொடுக்கலாம். நெருக்கமாயுங் கொடுக்கலாம்.

வில்வநீரசிந்தி. Liquid Extract of Bael. கொள், வில்வம்பழம் ஒரு இரூத்தல்; தண்ணீர் ஆறுநாழி; திட்டசீது¹இரண்டு அன்சு. வில்வம்பழத்தை இரண்டுநாழி தண்ணீரிற் பன்னிரண்டு மணிநேர மூறவிட்டு நீரைத் தெளித்தெடுத்துக்கொண்டு மிச்சமான தண்ணீரில் இன்னும் இரண்டுமுறை ஒவ்வொரு மணிநேரமூறவிட்டு தெளித்துச் சக்கையைப் பிழியவும். கலந்த நீர்களைக் கம்பளத்தில் வடிக்கவும். பதினானு அன்சாக வறட்டி ஆறினபின் திட்டசீதைச் சேர்க்கவும்.

தேயம். ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திரும். இங்கிலந்துக்கு ஏற்றப்படும் வில்வப் பழ வற்றலில் செய்யப்படும் நீரெசுரூத்தானது இந்துவிலே புதியபழத்திற் செய்யப்படுவதைப் பார்க்கச் சத்துக் குறைந்ததுபோல.

* மிளகரணை. TODDALIA.

வாசம். இது மலையாளம், சோழமண்டலம், மைசூர், கொங்கண் தேசங்களிலும், சென்னையின் மற்றும்பகுதிகளிலும் வேவ்யோரங்கள் காடுகளில் உண்டாகின்றது.

வாகடபகுதி. வேர்ப்பட்டை. வேர் கனத்துக் கிளைத்துச் சில இஞ்சு பருமையாகிக் கைப்பும் காரமும், சுகந்தமுமான பட்டையையும் மஞ்சள் நிறமும் தடிப்பும் மெதுவுமான வெளித்தோலையும் உடையதாகும். உட்பகுதி வெண்மையான மர வைரம். இது காய்ந்திருக்கும்போது மணம் சுவையற்றதாகும்.

தன்மை. சுகந்தமான² தொணிகம்³, ஸ்திமுலம்⁴, அந்திபிரூடி⁵.

உபயோகம். தேகப் பெலவீனத்துக்கும் காய்ச்சலிலும் பெலவீனப்படுத்தும் மற்றும் நோய்களிலும் நின்று சுகப்படுபவர்களுக்கும் இது நயந்தமருந்த. Lopez root என்ற நாமத்துடன் யுரோபதேசத்திற் கழிச்சலுக்கு நல்ல மருந்தென்று இது ஒருகாலத்திற் கீர்த்திபெற்றிருந்தும் வழங்காமற்போயிற்று. ஆயினும் இந்துதேசத்திற் பச்சையாய்க் கிடைக்கக்கூடியதாயிருப்பதால் இதை இன்னுஞ் சோதித்துப்பார்ப்பது நலம்.(22)

ரசிதங்கள். மிளகரணைரஞ்சம். Tincture of Toddalia. கொள், மிளகரணை வேர்ப்பட்டை துவைத்து இரண்டரை அன்சு; புருவுசீது அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்தில் ஏழுநாள் ஊறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கித்தெளித்து பிழிந்து வடித்து அரைநாழிக்குப் போதிய புருவுசீது சேர்க்கவும். கரும்பிரஞ்சம் செய்யும் முறையாகவும் இதைச் செய்யலாம்.

1 Rectified spirit. 2 Aromatic. 3 Tonic. 4 Stimulant. 5 Antiperiodic *செய்* *பசரி*, 6 Proof spirit.

(22) அனுபந்தப்பார்.

தேயம். ஒன்றரைத் திரும் முதல் மூன்று திரும் வரைக்கு நாள் இரண்டுமூன்றுமுறை கொடுக்கலாம்.

மிளகரணையின்லுசும். Infusion of Toddalia. கொள். மிளகரணை வேர்ப்பட்டை பருக்கன் தாளாக ஒரு அன்சு; கொதிநீர் பத்து அன்சு. இவற்றை மூடிய பாத்திரத்தில் ஒருமணி¹நேரமூறவீட்டுத் தெளிக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு அல்லது இரண்டு அன்சு நாள் இரண்டு மூன்று முறை கொடுக்கலாம்.

அவாகடச்சாக்கு. Non-Officinal.

விளாத்தி. Wood apple Tree. இம்மரம் இந்துதேசமடங்கலு முள்ளது. இதிலிருந்து ஓர் பிசின் தாராளமாய் வடியும். இங்கிலந்துக்கு ஏற்றுப்படும் சிழக்கிந்து அகசிப்பிசினில் இது கலந்திருக்கிறதென்று பரைரர் எண்ணுகிறார். இது உருவொளியுஞ் செங்கபிலநிறமுமான பல சாங்கமுள்ள உண்டையான கட்டிகளாக வரும். தண்ணீரில் போட்டாற் கபிலநிறமான சுவையற்ற பாணியாகும். அகசிப்பிசின் பாணியைப்போல் இது ஒட்டும். அகசிப்பிசினுக்குப் பதிலாக இந்தப் பிசினை வழங்கலாம். விளாங்காய்க்கஷாயம் நல்ல துவரென்றும் விளாம்பழம் ஸ்கேவிக்கினி¹ என்றும் வுட்டென்பவர் சொல்லியிருக்கிறார். இது தன் செயலில் வில்வத்தைப் போன்றது. தர்ப்பந்தின்² மணத்தை அதிகமாயுடையதாதலால் அதிலுஞ் சுவைகெட்டது. இதின்ருத்திலைகள் அனிஸ்கொட்டையைப்³ போன்ற நல்லமணமுள்ளவைகள், இவை அதிகமாய் ஸ்தொமாகி⁴ காமினதி⁵ யாக சுதேசிகளால் வழங்கப்படும்.

சந்தச்சைலவலாதமரம். Zanthoxylum alatum. சந்தச்சைலகஸ்தீலிமரம். Z. Hastile சந்தச்சைலபுங்கமரம் and Z. Budrunga. இம்மூவகைமரங்களும் இமயமலை காசியமலைகளில் வளரும். இவைகளின் பழத்தன்மைகளைக்குறித்துச் சுதேச பதார்த்தசார வாகடங்கள் பேசுகின்றன. இவைகளின் சுந்தமான காரமணத்தைக்கொண்டு இவை ஸ்தொமாகி காமினதியாகுமென்று நிதானிக்கலாம்.

இதில் முதல் மரத்தின் பழத்தை ஸ்தெனோசுவைத்தியர் கூறுபடுத்தி அதிலே சுந்தமான⁶ ஓர் அத்திராவெண்ணெய்யைக் கண்டு⁷ டித்தார். இது சுத்தமாயிருக்கையில் தர்ப்பந்தின் எண்ணெய்யோடு கூடிய ஓர் இசமி⁸ ஐருகாபன்⁹ பதார்த்தம். மேலும் ஓர் ஸ்தயரப்தினைக்¹⁰ கண்டுபிடித்தார். இது பழங்களைத் திஸ்திலித்த¹¹ நீரில் மிதந்துகொண்டிருக்கும். சுத்தமற்ற அத்திராவெண்ணெய்யிலிருந்தும் இதைப் பிரிக்கலாம்.

சீமையழுவனை. Peganum Harmala. சிந்து பஞ்சாப்பு தேசங்களிலுள்ள இந்தப் பூண்டு வீரான கெட்ட மணமும் கைப்புச் சுவையுமுடையது. இது தன்செயலிற் கஞ்சாவுக்குக்கிட்டியதென்று லன்றறர் வைத்தியர் நினைக்கிறார். இதின்விதைகள் ஸ்திமுலம்¹² எமெனகாக்கு¹³ அந்தெல்மிந்தி¹⁴ யாகக் கீழ்த்தேச வாகடங்களில் வெகுகாலமாகப் பேசப்பட்டிருக்கின்றன. இவைக்குச் சொற்ப மயக்குத்தன்மையும் உண்டென்கிறார்கள். இவைகளைக்கொடுக்கச் சிலருக்குப் புன்சிரிப்புடன் கூடிய அலட்டுக்காணு

1 Antiscorbutic. 2 Turpentine. 3 Aniseseed, 4 Stomachic. 5 Carminative. 6 Aromatic 7 Essential. 8 Isomeric. 9 Hydro-carbon. 10 Stearopten. 11 Distils. 12 Stimulant. 13 Emmenagogue. 14 Anthelmintic.

மென்று கெம்வர் சொல்லுகிறார். இந்த விதைகளின் செயலைப்பற்றி மேலாராய்வுகள் வேண்டும்.

கருவேம்பு. *Murraya Konigii* இந்தச் சிறியமரம் இந்துவின் பல பகுதிகளிலுமுள்ளது. சுதேசிகள் இதின் பட்டை, வேர், இலைகளை, தொணிகம்¹ ஸ்தொமாகிக²ளாக அதிகமாய் வழங்குவார்கள். ரோசு சாற்று என்ற வைத்தியர்கள் இத்தன்மைகளில் இவை திறமென்று சாட்சியிட்டிருக்கிறார்கள். இலகுவியர் சீரணிப்பதற்கு இதின் இலைகளைக் கறிகளுக்குச் சேர்ப்பார்கள்.

சிமருபியங்கள்.

SIMARUBEAE.

சுவசிமரம். QUASSIA TREE.

வாசம். மேற்கிந்துத்தீவுகள்.

வாகடபகுதி. மரச்சிராய்; தொடையளவுக்கு மேற்படாத வெவ்வேறு பருமையான குற்றிகளாக, ஏற்றுமதிபண்ணப்படும். வெளிப்பகுதி அழுத்தமான நொருக்கற் பட்டையால் மூடப்பட்டிருக்கும். சிராய் வைரமும், உரப்பும் வெண்மஞ்சள்நிறமும் கடுமையான சுத்தக் கைப்பும் உள்ளது. கடைகளில் சீவல்களாகவும் இருக்கும். கடுமையான கைப்புச் சுவையால் இதை மற்றும் மரச்சிராய்களிலிருந்து பகுத்தறியலாம். இதின் கஷாயம் அயபிரவுப்புக்கள்³ சேர்ப்பதாற் கறுக்காது. இதிலே குவசின்⁴ என்ற கைப்பான் தடஸ்த்⁵ சத்து அமைந்திருக்கும்.

தன்மைகள். இது சுத்தக் கைப்பான தொணிகமும் ஸ்தொமாகியுமாகும்.

உபயோகங்கள். பெலவீனத்துக்கும் சுரவியாதிகளிலிருந்து சுகப்படுபவர்களுக்கும் அசத்துவகுன்மத்துக்கும் இது உத்தமமானமருந்து. முறைச்சுரங்களுக்கும் இது நல்லது. ஆயினும் கைப்பான மற்றும் தொணிகங்களைப் பார்க்கத் திறமல்ல. இதின் கஷாயத்தைக் கடைக்குடலுட் புகட்டத் தானப்பழுக்கள் கழலும்.

ரசிதங்கள். குவசியின்வாசம். Infusion of Quassia. கொள். குவசிச் சிராய் அறுபது கிறேன்; தண்ணீர் பத்து அன்சு. மூடியபாத்திரத்தில் அரை மணிநேரமுற விட்டுத் தெளிக்கவும்.

தேயம். அன்சு இரண்டொன்று. நாள் இரண்டு மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம். அயவுப்புகளுக்கு இது நல்ல அனுபானமாகும்.

குவசிரஞ்சம். Tincture of Quassia. கொள். குவசிச் சிராய் சீவல்களாக முக்கால் அன்சு; புருவசீது⁶ அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்தில் ஏழு நாள் ஊறவிட்டு இடைச்சுடை குலுக்கி தெளித்துப் பிழிந்துவடித்து அரை நாழியாகப் போதிய புருவசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். முப்பது துளிமுதல் இரண்டு திரும்.

1 Tonic. 2 Stomachic, ரோசனி. 3 Persalt of iron. 4 Quassine. 5 Neutral.
6 Proof spirit.

குவசியேசிறுத்து. Extract of Quassia. கொள். துருவின குவசிச் சிராய் ஒரு இரூத்தல்; திஸ்திலித்த¹ நீர் போதியது. குவசியை எட்டு அன் சு தண்ணீரிற் பன்னிரண்டு மணிகேர மூறவிட்டு, பிறகு சியந்தனியில்² ஏற்றி, இன்னுந் தண்ணீர்விட்டு, குவசியின் சாரம் இறங்குந்தனையும் நீரை மெல்ல மெல்ல ஒழுகவிடவும். நீரை வறட்டி அது மெத்தத் தடிப்பாகமுன் வடித்து, பிற்பாடு பாணி குளிகைக்குத் தகுந்தபதமாய் வருந்தனையும் நீர்மத் திகத்தில்³ வறட்டவும்.

நேயம். மூன்று முதல் ஐந்து கிரேனைத் தனித்தாவது லோகதொணிக⁴ ங்களோடு கலந்தாவது கொடுக்கலாம்.

அவாகடச்சாக்குகள். Non-Officinal.

குவசியேம்பு. Nima Quassioides. இந்த மரம் இமயமலையிலுள்ளது. இதின் வேர் மேற்கிந்துக் குவசியைப் போலக் கைப்பு என்று ரைல் பண்டிதர் சொல்லுகிறார். இது அதற்குப் பதிலாகுமென்பதற்குச் சந்தேகமில்லை. இதின் பட்டை இமயமலையினின்று வங்காளத்துக்கு ஏற்றப்பட்ட அங்கே வறங்கி (Pharangi) என்று விலைப்படும். வேரின் கைப்பு இதற்கு உண்டு. இதின்னும் ஆராயப்படத் தகுந்தது.

பெருமரம். Ailanthus Malabarica. இது இலங்கை, மலையாளம், கொங்கணங்களிலுள்ள பெரிய மரம். இதின் பட்டையைக் கீற மட்டிப்பால் என்ற சுகந்தமான ஓர் பிசின் ராளம்⁵ வரும். இது தூபவருக்கமாகவும் மருந்தாகவும் வழங்கப்படும். விசேஷமாய் வயிற்றுக்கடுப்புக்கு மருந்தாகும். சுவாசக்குழலின் நோய்களுக்கு இது நல்ல ஸ்திமுல⁶மென்று கிப்சன் வைத்தியர் நினைக்கிறார். இப் பட்டை மெத்தத் தடிப்பும் முாணுமானது. அதின் சுவை சற்றே கைப்பான நற்சுவை. தோற்றத்தில் ராளம்போன்ற பளிங்கையொத்த சிவத்த மணிகள் இதில் திணிந்திருக்கிறதாக வைத்தர்கண்டார். ஆயினும் இவைகள் ராளம்போல் எரியவுமில்லை, சீதிலாவது தண்ணீரிலாவது கரையவுமில்லையாதலால் இவைகள் இனிமேல் நிதானிக் கப்படவேண்டிய நூதன கெமிஸ்த கலப்புள்ளவைகளென்று அவர் அனுமானிக்கிறார். இந்தப் பட்டையையும் பிசின்போன்ற இதின் பொசிவையும் இன்னும் ஆராய்வது நல்லது.

சவுக்குமரம். Ailanthus excelsa. இது கருநாடகம் தொடங்கி இமயமலையின் அடிவரைக்குமுள்ள மேட்டுச்சோலைகளிலுண்டாகும் பெரிய மரம். இதின் நற்சுவையுள்ள சுகந்தமான பட்டை குன்மநோய்களுக்குச் ச தேசிகளால் வழங்கப்படுகிறதென்று என்ஸ்லி சொல்லுகிறார். சர்க்கார்களில் இந்தப் பட்டை வீரூன சுரக்கினி⁷யாகவும் பெலவீனத்துக்கு தொணிக⁸ கமாகவுங் கொள்ளப்படுகிறதென்று வைத்தர் சொல்லுகிறார்.

நேட்டிலையுறுகோமமரம். Eurycoma Longifolia. இது மலாக்கா யிலுள்ள ஓர் சிறுமரம். அக்சலி என்பவர் மூன்றுநாலு வருஷங்களாக இந்த மரத்தின் வேர்த் திகாகத்ததை⁹ முறைச்சுரத்துக்கு மருந்தாகக் கொடுத்துவந்தோமென்றும் கினியத்தை விட இதிலும் நிச்சயமான மருந்தைத் தாம் அறியவில்லையென்றும் எழுதியிருக்கிறார்.

1 Distilled. 2 Percolator. 3 Water-bath. 4 Metallic Tonic. 5 Gum-resin. 6 Stimulant. 7 Febrifuge. 8 Tonic, ஓசதி. 9 Decoction.

பேர்சியூசியங்கள்,

BURSERACEAE.

சசமரம். MYRRH TREE.

வாசம். அரபிதேசம்.

வாகடபகுதி. மரத்தில் வடியும் பிசின் ராளப் பொசிவு. இதையே சசம்¹ என்பது. இது பல பருமையுள்ள உண்டைக் கட்டிகளாக வரும். சற்றே உருவொளியும் செம்மஞ்சள் அல்லது செங்கபில² நிறமுமானது. ஒடிந்தபக்கம் ஒழுங்கினமும் சற்றே நெய்ப்புமாயிருக்கும். மணம் நல்ல சுகந்த மணம். சுவை காரமும் கைப்புமானது. தண்ணீர், அலக்கால்³, ஈதர்க⁴ளிற் சொற்பம்மாத்திரங் கரையும். தண்ணீர் விசேஷமாய்ப் பிசினைக் கரைக்கும். அலக்காலும் ஈதரும் ராளத்தையும் எண்ணெய்யையுங் கரைக்கும்.

தன்மைகள். ஸ்திமுலம்⁵, எக்ஸ்பெக்துறம்⁶, எம்மெனகக்கு⁷.

உபயோகங்கள். அமெனுறீயம்⁸, குலொரோசி⁹க்கும் அசத்துவமான மற்றுங் கருப்பைரோகங்களுக்கும், சுவாசப்பையின் நோய்களுக்கும் விசேஷமாய் வயோதிகரின் ஈளைக்கும், சீரண உறுப்புகளின் சீர்க்கேடுகள் சில வற்றுக்கும் இது நல்ல மருந்து. தானிக¹⁰ மருந்து அல்லது வெளிமருந்தாக வாய்த்தொண்டையின் நோய், நாட்பட்ட விரணங்கள்¹¹ முதலியவற்றுக்கு இது மிகுதியாய் வழங்கப்படும்.

தேயம். பத்துமுதல் இருபது கிறேனைத் தூளாக அல்லது குளிகையாகக் கொடுக்கலாம்.

ரசிதங்கள், சசரஞ்சம். Tincture of Myrrh. கொள். சசம் பருக்கன்தூளாக இரண்டரை அன்சு; திட்டசீது¹² அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்திற் பதினைந்து அன்சு சீதிற் சசத்தை இரண்டுநாள் ஊறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கிப் பிற்பாடு சியந்தனி¹³யில் இட்டு அடைசி நீர் வடிந்தொழிந்தபின், சேஷமான ஐந்து அன்சுசீதையும் வார்த்து வடிக்கவும். அப்பாற் சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து இரண்டு நீர்களையுங் கலந்து அரைநாழிக்குப் போதிய திட்டசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். அரைத்திரும்முதல் ஒருதிரும். கார்கில்¹⁴ முதலியவற்றிற் தண்ணீர் கலந்து வழங்கப்படும்.

சகைக்கூட்டுத்திகாக்சம்¹⁵ சகை சசக்குளிகை¹⁶ இங்குக்கூட்டுக்குளிகை¹⁷ வரியாத்துக்கூட்டுக்குளிகை¹⁸ அயகூட்டுக்கலவை¹⁹ இவைகளிலும் சசம் சேருகின்றது.

எலெமிமரம். ELEMI TREE.

வாசம். இந்துதேசம், இலங்கை, கிழக்குத் தீவுகள்.

1. Myrrh. 2 Brown. 3 Alcohol. 4 Ether. 5 Stimulant. 6 Expectorant.
7 Emmenagogue. 8 Amenorrhoea. 9, Chlorosis, 10 Local, 11 Ulcer.
12 Rectified spirit, 13 Percolator. 14 Gargle. 15 Compound decoction of Aloes. 16. Aloes and Myrrh pill. 17 Compound pill of Assafoetida. 18 Compound Rhubarb pill. 19 Compound iron mixture.

வாகடபகுதி. எலெமியென்ற இறுகின ராளம்¹. இது பிரதானமாய் மனிலதேசத்திலிருந்து இங்கிலந்துக்கு ஏற்றுமதிபண்ணப்படும். இது மெதுவான நெய்ப்புள்ள ஒட்டக்கூடிய கட்டியாக வரும். காலஞ்செல்ல இறுகி ராளம்போலாகும். வெண்மஞ்சள் நிறமும் சுகந்தமான சீரகம்போன்ற மணமுமுடையது. திட்டசீதில் ஏறக்குறைய முழுதுங் கரையும்.

இந்த விபரம் மனில எலெமிக்கே ஒக்கும். இது சிலதன்மைகளில் பிறே சில் எலெமிக்கும் மெக்சிகு எலெமிக்கும் வித்தியாசமானது.

தன்மை. சொற்பமாய்த் தர்ப்பந்தீனை²ப் போன்ற ஸ்திமுலம்³; உள்ளே கொடுக்கப்படுவதில்லை.

உபயோகங்கள். நாட்பட்ட கெட்ட புண்களுக்குப் பின்வரும் அன் கென்⁴ நல்ல பூச்சு.

ரசீதம். எலெமியன்கென். Ointment of Elemi. கொள். எலெமி கால் அன்சு; தனியன்கென், ஒரு அன்சு. உருக்கி கம்பளத்தில் வடித்து, இறுகுந்தனையும் ஓயாமற் கலக்கவும்.

எலெமிப் பருப்பிலிருந்து சாந்தியான ஓர் எண்ணெய் வரும். இதை வாதுமை எண்ணெய்க்குப் பதிலாக வழங்கலாம். வாதுமைக் கலவைக்குப் பதிலாக எலெமிப் பருப்பை இமல்சு⁵மாக்கி வழங்குவது நல்லதென்று வேற்சுவைத்தியர் சொல்லியிருக்கிறார். இது சொற்ப விரேசனத்தன்மையுடையதாயிருப்பதினால் மாத்திரமல்ல, யுரோபத்திலிருந்து வரும் வாதுமைக்கொட்டை நெடுகவிருந்தாற் பெரும்பாலும் பழுதாகிப்போகிறதாதலாலும் இந்துவில் வழங்க இதைவே அவர் நயமென்று எடுத்துக்கொள்ளுகிறார்.

* குந்துருக்க மரம். OLIBANUM TREE.

வாசம். இது காடவு முனைக்கு மேற்காகச் சொமாலிக் கரையிலுள்ளது.

வாகடபகுதி. குந்துருக்கம் என்ற பிசின்ராளம்⁶. இது உருண்ட நீளக் கட்டிகளாக வரும். இது சற்றே மங்கலும் நொருக்கலும், வெண்மஞ்சள் நிறமும் கார்ப்பும் சொற்ப சுகந்த சுவையும் பல்சம்போன்ற ராளமணமுமுள்ளது. குடுகாட்ட மணம் திறமாய் வீசும். அலக்காலுட் தாழ்க்க மங்கலாகும்.

தன்மை. தர்ப்பந்தின் போன்ற ஸ்திமுலம். உட்கொண்டால் இதின்செயல் சளிச்சவ்விலே⁷ விசேஷமாய்ச் சுவாசப்பைகளின் சளிச்சவ்விலே காட்டும்.

உபயோகங்கள். மத்திமபுறங்கீதிலும்⁸ காலிகமான⁹ சுவாசப்பைநோய்களிலும் புறங்குறீய¹⁰த்திலும் காலிக லறிஞ்சீதிலும்¹¹ இதை உள்மருந்தாய்க் கொள்ளலாம். புகையுங் காட்டலாம். இரண்டிலும் நயமுண்டானது. தானிகமாய்ப்¹² பிளவை¹³, புண்கள், சிலந்திகள் முதலியவற்றிற்கு இது ஸ்திமுலமாகும் (23)

தேயம். பதினைந்து கிறேன் முதல் இரண்டு திரும் வரைக்குக் கொடுக்கலாம்.

1 Resin. 2 Turpentine. 3 Stimulant. 4 Ointment, கைலம். 5 Emulsion.

6 Gum-resin. 7 Mucous membrane. 8 Subacute Bronchitis. 9 Chronic. 10 Bronchorrhoea. 11 Laryngitis. 12 Locally. 13 Carbuncle.

(23) அனுபந்தம்பார்.

ரசிதம். துந்துருக்கவன்கேன். *Olibanum Ointment*. கொள். குந்துருக்கம், நல்லெண்ணெய் அல்லது கசகசாவெண்ணெய், வெண்மெழுகு, வகைக்கு ஒரு அன்சு. மென்கூட்டில் உருக்கி வடித்துக்கொள்ளவும்.

அவாகடச் சரக்கு. *Non-Officinal*.

குக்குலு. *Bdellium*. இது ஓர் பிசின்ராளம். இது சிந்துவுக்குரிய முகுல்குக்குலு *Balsamodendron Mukul* என்றும் சுணைக்குக்குலு *B. Pubescens* என்றுஞ் சொல்லப்படுகிற இரண்டுமரங்களிலிருந்து பிறக்கும். இது கருஞ்சிவப்புநிறமான திரண்ட கட்டிகளாக வரும். சசத்தை¹ப்பார்க்கநரிப்பானது; அதைப்போல் நொருக்கல் அல்ல; கைச்சூட்டுக்குத்தானும் இளகும்; சுவை கைப்பும் சற்றே கார்ப்புமானது; மணம் நல்ல மணமல்ல. குக்குலுவின் அவுஷதத்தன்மைகள் சசத்தின்தன்மைகளுக்குக் கிட்ட முட்டச்சரி. இதுமலிந்த சரக்காகையால் சசத்துக்குப் பதிலாக இதை வழங்கலாம். இதின் தைலம் நாட்பட்ட கெட்ட புண்களை அருட்டிச் சுத்தப்படுத்துவதற்கு மெத்த நயமென்று நூத்தன் வைத்தியர் விதந்துபேசுகிறார். தெல்லியிலுண்டாகும் புண்களுக்கு இதைக் செந்தகம், காசுக்கட்டி², வெண்காரம்³ என்பவற்றோடு கலந்து இடுதல் வழக்கம். இது புண்களை அருட்டிச் சுகசீருக்கு உரப்பண்ணுகிறதென்று சொல்லுகிறார்கள்.

கறுப்பு டாமர். *Black Dammer*, இது *Canarium Strictum* என்ற மரத்திலிருந்து பிறக்கும். இது தென் இந்துவில் வழங்குஞ் சரக்கு. இது பிரவையும் மினுக்கமுமான கட்டிகளாக வரும். வெளிச்சத்திற் பிடித்து ஊடே பார்த்தால் சற்றே உருவொளியும் கபலமான⁴நல்ல சிவப்புநிறமுமாய்த் தோற்றும். எகத்துவமானது⁵. கண்ணாடிபோல் உடையும். கொதிஅலக்காலில்⁶அரைக்கரைவாசி கரையும். தர்ப்பந்தின்⁷எண்ணெயில் முற்றாய்க் கரையும். பெர்கன்றிராளத்துக்கு⁸ இது பதிலாகுமென்று பிடி வைத்தியர் சொல்லி இது சேருஞ் சில விதிகளையுங் கற்பித்திருக்கிறார்.

மேலியாசியங்கள்.

MELIACEAE.

*வேம்பு. NIM OR MARGOSA TREE.

வாசம். இது இந்துஅடங்கலுமுள்ளது. வளவுகளிற் பெரும்பாலும்வளரும்.

வாகடபகுதிகள். 1 பட்டை. 2 பச்சை இலைகள். மரத்தின் வயசுக்கும் பருமைக்குந் தக்கதாய்ப் பட்டை தோற்றத்தில் வித்தியாசப்படும். மூன்று நாலு வயதுக்கு மேற்பட்ட அடிமரத்தின் பட்டை கால்இஞ்சு⁹, அரை இஞ்சு கனமுள்ளதாய்த் தடிப்பான பொருக்கால் மூடுண்டிருக்கும். சிறுக் கொப்புகளின் பட்டையோ அழுத்தமாயும் மங்கலான கருஞ்சிவப்பாயும் நெடும்பாட்டுக்குச் சாம்பல்நிற வரிகளுள்ளதாயும் இருக்கும். இவ்வரிகள்

1 Myrrh. 2 Catechu, 3 Borax, 4 Brown. 5 Homogeneous. 6 Alcohol.

7 Turpentine oil. 8 Burgundy resin. 9 Inch.

ஒன்றுக்கொன்று இஞ்சில் எட்டிலொரு பங்கு முதல் பன்னிரண்டிலொரு பங்களவாப்த் தள்ளியிருக்கும். பட்டையின் உட்படலம் பச்சையாயிருக்கையில் வெண்மை. வெளிப்பக்கத்தைப்பார்க்க உட்பக்கங் கடுங்கைப்பு. வெளிப்பகுதி அதிகங் கயர்ப்புள்ளது. இதிலே மாகுசின்¹ என்ற கிரிஸ்தவிக்கத்²கூடிய சத்தும் கதிசின்³ என்ற கயர்ச்சத்தும் அமைந்திருக்கும். (24)

தன்மைகள். பட்டை கயரும் தொணிகமும்⁴ அந்திபிராடியுமாகும்⁵. இலைகள் ஸ்திமுலமாகும்⁶.

உபயோகங்கள். முறைச் சுரங்களுக்கும் தடவை தடவையாய் வரும் மற்றுஞ் சுரங்களுக்கும் பொதுவான பெலவீனத்துக்கும், காய்ச்சலாதிநோய்களில்நின்று சுகப்படுபவர்களுக்கும் பட்டை கொடுத்ததால் நயங்கண்டது. (25) புண்களுக்கும் மாறாமல் நிற்கும் சருமநோய்களுக்கும் சொற்ப ஸ்திமுலம் தேவையாயிருக்கும்போது வேப்பிலை நல்ல தானிக⁷மருந்தாகும்.

தேயம். பட்டை மாவில் ஒருதிரும்⁸ நாள் முன்றுநாலுமுறை கொடுக்கலாம்.

ரசிதங்கள். வேப்பம்பட்டைத்தீக்காக்தம். Decoction of Nim Bark. கொள். வேப்பம்பட்டையின் உட்பகுதி. துவைத்து, இரண்டு அன்சு; தண்ணீர் முக்கால் நாழி. பதினைந்து மணிநேரத்துக்கு அவித்துச் சூடாயிருக்கையில் வடித்துக்கொள்ளவும்.

தேயம். அந்திபிராடியாக ஒன்றரை அன்சு முதல்மூன்று அன்சைக் காய்ச்சல் முறை வருவதற்கு முன் ஒன்றைவிட்டொவ்வொருமணிநேரங்கொடுக்கவும். தொணிகமாக ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சை நாள் இரண்டு மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம். இந்தக் கஷாயம் உஷ்டணகாலத்திற்குறுக்குப் பழுதாய்ப் போகுமாயை யால் தேவையான வேளைகளிற் புதுக்கப் புதுக்கச் செய்துகொள்ளவேண்டியது.

வேப்பம்பட்டை ரஞ்சம். Tincture of Nim Bark. கொள். வேப்பம்பட்டையின் உட்பங்கு துவைத்து, இரண்டரை அன்சு; புருவுசீது⁹அரை நாழி. அடைத்த பாத்திரத்தில் ஏழுநாள் ஊறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கித் தெளித்துப் பிழிந்து வடித்து அரைநாழியாகப் போதிய சீதுசேர்க்கவும். களும்பிரஞ்சத்தைப் போலச் சியந்தனித்தும்¹⁰ இதைச் செய்யலாம். (களும் பிரஞ்சம் பார்.)

தேயம். தொணிகமாக அரை முதல் இரண்டு திரும்.

வேப்பிலைப் பாப்பை. Poultice of Nim Leaves. கொள். பச்சை வேப்பிலை போதியது. துவைத்து இளஞ்சூடான வெந்நீர் சேர்த்து மெது வாக்கிக்கொள்ளவும்.

சீர்கெட்ட புண்களுக்கு இது நல்ல தீவன பாப்பை. (26) இதால் நோவும் அழற்சியும்உண்டானால் சரிபங்கு அரிசிமாவாவது லீனமாவாவது¹¹ இலையோடு கூட்டிக்கொள்ளலாம்.

வேப்பங்கொட்டையின் கைப்பான எண்ணெய் வாதத்துக்குப் பூச்சாகவும் கிருமிகொல்வி¹²யாகவும் சுதேசிகளால் மெத்த மதிக்கப்படுகிறதாலால்

1 Margosine. 2 Crystillizable. 3 Catechin. 4 Tonic. 5 Antiperiodic.

6 Stimulant. 7 Local. 8 Drachm. 9 Proof-spirit. 10 Percolate.

11. Linseed meal. 12 Anthelmintic.

(24) (25) (26) அனுபந்தம்பார்.

இத்தன்மைகளைப்பற்றி அதை ஆராய்ந்தறிவது நல்லது. அது பூச்சிகளைக் கொல்லுமென்றும் அன்றர் வைத்தியரார் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

*சேம்மரம். ROHUN TREE.

வாசம். மலையாளம், தொங்கணம், மத்தியஇந்துவின் மலைச்சோலைகள் வாகடபகுதி. பட்டை. இது நாருளதாய் இறுக்கமான தடித்த துண்டுகளாக வரும். கறை நிறமும் கைப்பான கயர்ச்சுவையுமுள்ளது. இதுவே அதிகவீதமான தனிக்கமில்ம்¹ கலிக்கமில்ங்க²ளும் கைப்பான ஓர் அமாவ³சத்தும் அடங்கியிருக்கும். (27)

சோதனை. பட்டையின் உட்பக்கத்துக்கு நீதுரிக்கமில்ம்⁴ இட்டால் அது நல்ல சிவப்பாகாது. சேம்பட்டைக்குப் பதிலாகக் காஞ்சிரம்பட்டை வங்காளக் கடைகளில் வருமாதலால் நஞ்சான அந்தப் பட்டையிலிருந்து இதைப் பகுத்தறிவதற்காக இந்தச் சோதனை இங்கே சொல்லப்படுகிறது.

தன்மைகள். துவர், தொணிகம்⁵, அந்திபிராடி⁶.

உபயோகங்கள். முறைச் சுரங்களுக்கும் பொதுவான பெலவீனத்துக்கும் திசந்தெரி⁷ தியறீயங்க⁸ளின் பிற்கூற்றுக்கும் துவர்கள் வேண்டிய மற்றும் நோய்களுக்கும் இது கொடுத்து வாய்த்தது. (28)

தேயம். பட்டைத் தாளில் ஒருதிரும் நாள் இரண்டுமுறை கொடுக்கலாம். இதுவே உத்தமமான முறை.

ரசிதங்கள். சேம்பட்டைத் திகாக்தம். Decoction of Rohun. கொள். துவைத்த சேம்பட்டை, ஒன்றரை அன்சு; வெந்நீர் அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்திற் பதினைந்து மினிநேரம் அவித்து, இறுத்து, இறுத்த நீர் அரைநாழியளக்கப் போதிய வெந்நீரைப் பட்டையில் வார்த்து எடுத்துக்கொள்ளவும். ஓக்⁹ பட்டைத் திகாக்தத்துக்கு இது பதிலாகும். காரீகில்கள்¹⁰, புகட்டல்கள்¹¹, என்மங்களுக்கு¹² உவந்தது.

அவாகடச் சரக்குகள். Non-Officinal.

மலைவேம்பு. Melia Azedarach. இது அமரிக தேசத்துக்குரியது. ஆயினும் இந்துவின் பல பகுதிகளிற் செய்கைபண்ணப்படுகிறது. இந்தச் சிறிய மரத்தின் வேர்ப்பட்டை அமரிகத்திற் அந்தெல்மீந்தியாகப்¹³ பேர்பெற்று ஐக்கமரிக சிகிச்சை வாகடத்தின் உப இடாப்பிற் சேர்ந்திருக்கின்றது. இது கைப்பும் உவட்டுச் சுவையுமுடையது. கொதிவெந்நீர் இதின் சத்தை வாங்கும். ஒருநாழி தண்ணீரில் நாலு அன்சு வேர்ப்பட்டையைப் போட்டு அரைநாழியாய் வர அவித்து இது கொடுக்கப்படும். பிள்ளைகளுக்கு இந்தத் திகாக்தத்தை அரை அன்சு தேயமாக மூன்று மணிநேரத்துக் கொருமுறை இரைப்பைக்குடலிற் பிரட்டுக்காணுந்தனையுங் கொடுக்கலாம். சிலநாளாகக் காலேமாலையில் ஒவ்வொரு தேயங்கொடுத்துப் பிற்பாடு சுள்ளாப்பான விரேசனங்கொடுப்பது இன்னொருமுறை. அதி தேயத்தில் இது மயக்கத்தை உண்டாக்குகிறதென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

¹ Tannic acid. ² Gallic acid. ³ Amorphous. ⁴ Nitric acid. ⁵ Tonic. ⁶ Antiperiodic.
⁷ Dysentery. ⁸ Diarrhoea. ⁹ Oak bark. ¹⁰ Gargle. ¹¹ Injection.
¹² Enema. ¹³ Anthelmintic, கருமகைகலி.

(27) (28) அனுபந்தம் பார்.

மயக்கம் உண்டானாலும் மோசடில்லாமல் மாறிப்போகும். பட்டை காய்ந்தால் அதின் வீறு மெத்தக் குறையும். இதின் பச்சைக் காய்கள் இலைகளுக்கு நஞ்சுத்தன்மை உண்டென்றுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

தூணுமரம். *Cedrela Toona*. இந்த மரத்தின் பட்டை கடுங் கயரானது. மற்றங் கயர் மருந்துகள் கிடையாத வேளையில் இதை வழங்கலாம். குழந்தைகளின் காலிகதிகந்தெரிக்கு¹ வேற்சு வைத்தியர் இந்தப் பட்டையி ன் எசிரூத்தை²க் கொடுத்து நயங்கண்டார். இதற்கு அந்திபிராடித்³தன்மை உண்டென்று புரூட், கெனடி வைத்தியர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். இது நல்ல அந்திபிராடியென்று ரோசு வைத்தியரும் சின்கனத்துக்குப்⁴ பதிலாகுமென்று துத்தன் வைத்தியருஞ் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

தேயம். காய்ந்த பட்டைக் கஷாயத்தில் நாள்தோறும் ஒரு அன்சு; பட்டைத் தூள் பலவகையான புண்களுக்குக் கயராய் இடுவதற்கு மெத்தத் திறமென்று கெனடி வைத்தியர் கண்டார்.

கடற்றேன்னை. *Xylocarpus Granatum*. இம்மரம் இந்துவிலும் அயற் தேசங்களிலும் தாழ்வும் நொதியுமான பகுதிகளில் உண்டாகும். பட்டையும் மரத்தின் மற்றும் பகுதிகளும் மெத்தக் கைப்புந் துவருமுடையன. இது நல்ல துவரான தொணிகமாகுமென்று துணியலாம். மலாயர் இதை வான் சிபேதி, வயிற்றுவலி, கழிச்சல்களுக்கும் மற்றும் குடல் நோய்களுக்கும் அதிகமாய் வழங்குவார்கள்.

சேலஸ்திரினியங்கள்.

CELASTRINEAE.

அவாகடச்சரக்குகள். Non-officinal.

வாலுளுவை. *Celastrus Paniculata*, இந்தச் செடியின் கொட்டை கடைகளில் வரும். இது கறைக் கபில நிறம், முட்டை வடிவம், ஐந்திலொருபங்கு இஞ்ச நீளம், கடுதாசியில்நசுக்கிவிட அதில் ஏண்ணெய்ப்பிடிக்கும்; மிளகளவு பருமையும் மூன்று இதழ்களுள்ளதுமான பழத்தின் சேஷம் கொட்டையுடன் பெரும்பாலுங் கலந்திருக்கும். சுதேசிகள் இந்தக் கொட்டையிலிருந்து கருமையான ஓர் புகையெண்ணெயைத் திஸ்திலித்தெடுப்பார்கள். இதுவே வாலுளுவைத் தேல். இது பெரிபெரிக்கு⁵ உத்தமமான மருந்தென்று கொர்குலச்சு வைத்தியர் சொல்லியிருக்கிறார். இதைப் பத்துமுதல் பதினைந்துதுளி தேயத்தில் நாளிரண்டு முறை கொடுத்தால் வீரூன ஸ்திமுலமாகும். இது ஸ்திமுலமாகச் சேஷ்டித்தபின் சில மணிகேரமாகக் களையில்லாமற் தாராளமாய் வெயர்க்கும். கொர்குலச்சுவைத்தியர் புகழ்ந்தஅளவு நயங்காணுதிருந்தாலும் இதைக் கொடுத்த சிலருக்கு நயஞ் சந்தேகமின்றிக்கண்டது. சிலரிலோ வாய்க்கலில்லை. இந்த நோயின் தொடக்கத்துக்கும் விறைப்பும் சோர்வுமான குணம் மேலாடிநிற்கும் பேர்களுக்குமே இது விசேஷமாய்த் தகுந்ததென்று தோற்றுகிறது.

1 Chronic dysentery. 2 Extract. 3 Antiperiodic. 4 Cinchona. 5 Beri-beri.
6 Stimulant, தீவன.

ரம்னியங்கள். RHAMNEA.

ரம்னஸ்சேடி.

COMMON BUCKTHORN. RHAMNUS CATHARTICUS.

வாசம். இது பிறித்தனிலும் யுரோபத்தின் மற்றும் பகுதிகளிலுமுள்ளது.

வாகடபகுதி. பழத்தில் உடன்பிழிந்த சாறு.

தன்மை. இது நீரடிக்கும் பேதி.

உபயோகம். இது நீர்க்கோவைகளுக்குங் கடுமையான மலக்கட்டுக்குஞ் சுள்ளாப்பான விரேசனம் வேண்டிய மற்றும் நோய்களுக்குங் கொடுக்கப்படும்.

ரசிதம். ரம்னஸ் சிறுபம். Syrup of Rhamnus. கொள். ரம்னஸ் சாறு, இரண்டு நாழி; சீவினஇஞ்சி, துவைத்தபிமெந்தம்¹, வகைக்கு முக்கால் அன்சு; சுத்த சர்க்கரை ஐந்து இரூத்தல் அல்லது போதியது; திட்டசீது² ஆறு அன்சு. சாற்றை ஒன்றேகால் நாழியாகுந்தனையும் காய்ச்சி இஞ்சி, யையும் பிமெந்தத்தையுஞ் சேர்த்து, மென்கூட்டில் நாலுமணிநேரம் ஊறவிட்டு இறுக்கவும். ஆறினபின் சீதைச் சேர்த்து, அக்கலவையை இரண்டு நாள் நிற்கவிட்டு பிற்பாடு நீரைத் தெளித்து அதின் விசேஷகிருவிதம் 1.32 ஆப் வரத்தக்கதாய்ச் சர்க்கரையை மென்கூட்டிற் கரைக்கவும்.

தேயம். ஒரு திரும். இது பிறித்தனி வாகடத்திற் குறித்த தேயம். பரைரர், கிரிஸ்திசன் முதலியவர்களுடைய வாகடங்களில் இதின் தேபம் அரை அன்சு முதல் ஒரு அன்சு என்று குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. வெக்கையான பரமானுவில் இது சுறுக்கு நொதித்துப் பழுதாருமாகையால் உஷ்டண தேசங்களில் வழங்க இது உவந்த தல்ல.

அம்பேலிடியங்கள்.

AMPELIDEAE.

திராட்சக்கோடி. GRAPE VINE.

வாசம். இது மத்திமோஷ்டண ஆசியத்திலுள்ளது. பூமியின் மத்திம பகுதிகள் அடங்கலிலும் இது செய்கைபண்ணப்படும்.

வாகடபகுதி வெயிலிலாவது நெருப்பிலாவது காயவைத்த திராட்சப் பழவற்றல். இந்த வற்றல்கள் திரைந்து சுருங்கி, நசித்து அழுத்தமாய்ச் சர்க்கரையாவது உப்பாவது பூத்திராமல் நல்ல வாசனையாயிருக்கும். சதை மெதுவும் அதிகம் இனிப்புமாயிருக்கும்.

1 Pimento. 2 Rectified Spirit.

தன்மை உபயோகம். இது திமல்சம்¹; பெரும்பாலும் சுவைக்காக வழங்கப்படும்.

ரசிதங்கள். ஏலக்கூட்டிரஞ்சம்² நிலவாகைக்கூட்டிரஞ்சம்³ முதலியவற்றில் திராட்சப்பழ வற்றல் ஓர் கூறுகச் சேருகின்றது.

தாத்தரிக்கமில்ம். Tartaric Acid. இது திராட்சப்பழச் சாறு நொதிக்கையில் அடைந்த உப்பாகிய பதாசியமிலதாத்தரசி⁴லிருந்தெடுத்த கிரிஸ்த⁵லான அமிலம். இதைக் குறிக்குஞ் சின்னமாவது : ஐ² கா⁴ ஐ⁴ அ⁶. இது நிறமற்ற சாய்வான ரம்ப பிரிசங்களாக விளையும். வீரூன அமிலச்சுவையுள்ளது. தண்ணீரிலுந் திட்டசீதி⁷யிலுஞ் சுறுக்குக் கரையும். இந்த இரண்டு கரைவில் எதற்காவது, சொற்ப பதாசியசிடசு⁸ சேர்க்க, வெண்மையான கிரிஸ்தலடையல்⁹ உண்டாகும். தண்ணீரிற்கரைந்த எழுபத்தைந்து கிறேன்¹⁰ தாத்தரிக்கமில்ம் தடஸ்த¹¹மாவதற்குச் சோடபருமவிலயனத்தில்¹²1000 கிறேன் அளவு வேண்டும். இந்த அமிலத்தின் தண்ணீர்ச்சுரைவு ஐருசல்வுரிக்கமில்த்தால்¹³ மாறுதல் அடையாது. சுண்ணசல்வசு¹⁴அல்லது அமோனவக்சலசின்¹⁵ விலயனத்தோடு சுலக்கும்போது அடையல்விழாது. இதைப் பரமானுவில் எரிக்கச் சேஷம் காணாது; அல்லது மெத்தச் சொற்பமாய்க் காட்டும்.

தன்மை உபயோகம். இது குளிர்மையானது. காய்ச்சல் முதலியவற்றுக்குக் குளிர்ந்த பானங்கள் செய்வதற், சிதறிக்கமில்த்துக்குப்¹⁶பதிலாக இது வழங்கப்படும். நுரைபானங்கள் செய்வதற்கு இது பெரும்பாலும் உபயோகமாகும்.

தாத்தரிக்கமில் கிரிஸ்தலில் இருபது கிறேன்

கிரிஸ்தலான பதாசினுவிகாபனசு¹⁷

27 கிறேன்.

வியாபாரப்பதாசிகாபனசு¹⁸

22 கிறேன்.

அமோனவைரசுச்சார்த்தகாபனசு¹⁹.

15½ கிறேன்.

கிரிஸ்தலான சோட²⁰காபனசு

38½ கிறேன்.

வியாபாரச் சோடனுவிகாபனசு

28 கிறேன்.

பூர்த்திக்கும்²¹.

இப்பிரமாணங்களின்படிசெய்யும் பானங்கள் குளிர்மையாய்த் தாகத்தைத் தணிப்பதுமாத்திரமல்ல, நுரைக்கையிற் குடிக்கும்போது காபனிக்கமில்²²த்தைக் கக்கிவிடுவதால் உவட்டிப்பையும் இரைப்பையழற்சியையுந் தணிக்கும்.

தேயம். பத்து முதல் முப்பது கிறேன்.

திராட்சம் முதலியவற்றின் சாற்றிலிருந்து வரும் ரசிதங்களாகிய அலக் கால், வைன், காடி, என்பவைகள், நொதிப்பால் எடுக்கும் பதார்த்தங்களுடன் பின்னே சொல்லப்படும்.

1 Demulcent, சமகி. 2 Compound tincture of Cardamoms. 3 Senna. 4 Acid Tartrate of Potash 5 Crista. 6 Rhombic prism. 7 Rectified Spirit. 8 Acetate of potash. 9 Crystalline deposit. 10 Grain. 11 Neutral. 12 Volumetric solution of Soda. 13 Hydro-Sulphuric acid. 14 Sulphate of Lime. 15 Oxalate of Ammonia. 16 Citric acid. 17 Bicarbonate of Potash. 18 Carbonate of Potash. 19 Hydrated Sesquicarbonate of Ammonia. 20 Soda 21 Saturate. 22 Carbonic acid.

அனகாடியாசியங்கள்.

ANACARDIACEAE.

மஸ்திசுமரம். MASTICH TREE.

வாசம். தென்யுரோபம், வடஆபிரிகம், லெவந்துக் கடற்கரை.

வாகடபகுதி. மரத்தைக் கீறப் பொசியும் மஸ்திசு என்ற ராளம்¹. இது நொருங்கக்கூடிய மஞ்சள்நிறமான சிறுத்த நீண்ட உண்டைகளாக வரும். ஒடிந்த இடத்தில் மினுங்கும். சப்ப மெதுவும் கம்பியாய் இழுபடக்கூடிய துமாகும். சுகந்தம் சொற்பமாய் வீசும். சூடுகாட்ட உரைஞ்ச இந்த மணம் அதிகப்படும். இதிலே சொற்ப வீதமான அத்திர² வெண்ணெய்யும், அலக்காலிற்³ கரையக்கூடிய மஸ்திகிக்கமிலம்⁴ என்ற ஓர் ராளம் தூற்றுக்கு ஏறக்குறைய 90 வீதமும், குளிர்ந்த அலக்காலிற் கரையமாட்டாததும் சுடு அலக்காலிற் கரையக்கூடியதுமான மஸ்திசின்⁵ என்ற பின்னொரு ராளம் தூற்றுக்குப் பத்து வீதமுமாய் அமைந்திருக்கும்.

தன்மைகள். தர்ப்பந்தின் போன்ற ஸ்திமுலம்⁶ அமுரிதி⁷.

உபயோகம். இதுஉள்மருந்தாகக் கொடுக்கப்படுவதரிது. இது அவிபட்ட தண்ணீர் குழந்தைகளின் கழிச்சலுக்கு நல்லதென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இதை ஈதரிற்⁸ கரைத்துப் பருத்திப் பஞ்சிற்றோய்த்துக் கோறைப் பல்லுக்குள்ளே வைக்கப் பற்கொதி பெரும்பாலும் மாறும்.

தேயம். பத்துமுதல் முப்பது கிரேன்.

அவாகடச்சாக்குகள். Non-Officinal.

கிஞ்சுப்பிஸ்தகிமரம். கபூல்பிஸ்தகிமரம். Pistacea Khinjuk and P. Cabulica. பெலுகிஸ்தான் அவ்கனிஸ்தானிலுள்ள இந்தச் சிறிய மரங்கள் இரண்டும் தெறிபிந்த மரத்துக்கு இனமானவைகள். இவைகளிலிருந்து ஓர் ராளம் பொசியும். இது அத்தேசங்களில் மாத்திரமல்ல சிந்து, பார்சிய தேசங்களிலும் மஸ்திசுக்குப் பதிலாய் வழங்கப்படுகின்றது. கைப்பு மஸ்திசு என்று சொல்லப்படுகிற குந்துருக்கத்திலிருந்தும் மஸ்திசுவிலிருந்தும் இதைப் பகுத்தறிவதற்கு இதை இனிய மஸ்திசு என்று பார்சியர் குறித்தெழுதியிருக்கிறார்கள். இந்த மரங்களில் முதலாவதில் ஓர் மாதிரியான மாசக்காய் உண்டாகும். இது நாட்டு வாகடங்களிற் சேர்ந்திருக்கின்றது. இது அத்திப் பழம்போல் முட்டை வடிவும், அரைஇஞ்சுவரைக்கு நீளமும் செங்கபிலநிறமுமான காய். இது உள்ளே குழாயாயிருக்க ஓடு மெல்லிதும் நொருக்கலும் உருவொளியுமாயிருக்கும். சுவை புளிப்பும் துவரும் சற்றே தர்ப்பந்தின் போலுமாம்.

கற்கடகசிங்கி. Rhus succedanea. இது இமயமலையின் மத்திமோஷ்டண பகுதிகளிலுள்ள மரம். இதின் கொப்புகளில் பூச்சிகள் குற்றிவளருங் கொம்புபோன்ற காய்களைப்பற்றி இது கற்கடகசிங்கியெனப்பட்டது.

1 Resin. 2 Volatile. 3 Alcohol. 4 Mastichic acid. 5 Masticine. 6 Stimulant, தீவனி. 7 Diuretic தியூரிசம் 8 Ether.

இந்தக் காய்கள் பரிதும் உட்குழாயானவைகளும் மெல்லியசுவருடையவைகளும் பெரும்பாலும் நீண்டு திரண்டவைகளுமாய் இருதலைப்பிலும் ஒடுங்கிக் கூராயிருக்கும். இவை சிலவேளை சுட்டுவிரலின் நீளமும் பருமையுமாய்த் திருகி ஒழுங்கினமாயிருக்கும். இவைக்குத் துவர்த்தன்மை தொணிகத்¹தன்மைகள் உண்டென்று சுதேசிகள் சொல்லுகிறார்கள்.

மாமரம். Mango tree. இது இந்துதேசமடங்கலுமுண்டாகும். இதின் கொட்டையின் பருப்பை மாத்திரமே இவ்விடத்திற் கவனிக்கவேண்டியது. இது இந்துவில் மாத்திரமல்லப் பிறேசிலிலும் அந்தெல்மிந்தி²யாக வழங்கப்படுகின்றது. கெர்க் பதிரிக்கு வைத்தியர் தனது பரிகாரத்தில் மாங்கொட்டைப்பருப்பு மாவை அந்தெல்மிந்தியாக இருபது முப்பது கிறேன் தேயத்தில் கீரைப்பாம்புக்குக் கொடுத்துச் சித்திபெற்றோமென்கிறார். இன்னும் அவர் இதிலே அதிவீதமாய்க் கலிக்கமில்³ இருக்கிறதென்றும் இரத்தம் பாயும் மூலமுளைக்கும் மெனுறியத்துக்குங்⁵ கொடுத்துக் கைகண்டோமென்றுஞ் சொல்லுகிறார். இந்தமருந்து மேலும் பரிசோதிக்கப்படவேண்டியது.

காட்டுமேந்திரி. Cashew tree. இது இந்து முதலிய உஷ்டண தேசங்களின் கடற்கரைகளில் மிகுதியாயுண்டு. இதிலிருந்து அதிக அளவான பிசின் வடியும். ஆயினும் இந்தப் பிசின் மருந்துக்காவது வேறொன்றுக்காவது மெத்த உபயோகமானதல்ல. கொட்டையின் ஒட்டுப் படலங்களுக்கிடையில் காரமான கறுப்புநீர் சொற்பமுண்டு. அதிலே காடல்⁶ என்ற காரமான தேலச்சத்தும் அனகாடிக்கமில்⁷ என்ற ஓர் அமிலமும் அடங்கியிருக்கும். இந்த நீருக்கு ருபிவாஷ⁸ கொப்புள⁹த்தன்மைகள் உண்டு. ஆயினும் சேங்கொட்டையின்¹⁰ நீருக்குள்ள தடைகள் இதற்குமுண்டு. இதின் பருப்பைப் பிழிய மெல்லிய எண்ணெய்வரும். இதைச் சிகிச்சை¹¹யில் வழங்கலாம். பழத்தைப் பிழிந்த சாற்றிலிருந்து மலையாளச்சுரைகளில் நல்ல சீது¹² திஸ்திலி¹³கிறார்கள். இது வம்பாயிலும் மற்றுமிடங்களிலும் கிடைக்கக் கூடியது. இது தனக்கேயுரிய ஓர்வகை மணமுள்ள நல்ல சீது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. மற்றும் ஸ்திமுலங்கள்¹⁴ கிடையாதவிடத்தில் இதை ஸ்திமுலமாக வழங்கலாம்.

சேங்கோட்டை. Marking nut. இக்கொட்டையின் ஒட்டுப்படலங்களுக்குள்ளே இருக்கிற பிசுபிசுப்பான கறுத்தச்சாறு அடையாளம் போடுவதற்கு மையாக வழங்கப்படும். இது கடுங்காரமானது. சுதேசிகள் கொப்புளங்கொள்ளும் மருந்தாக இதை வழங்குவார்கள். இதை இப்படி வழங்குவது குற்றம். சொற்ப இடத்திற்குநூனும் இந்தச் சாறு பட்டதால் மெத்த மோசமுண்டானது. கொப்புளங்கொள்ள இதைப் போட்டதினால் புண்ணுண்டாய் ஒரு ஆளுக்கு மரணம் நேரிட்டதாக எழுத்திலிருக்கின்றது. மையாக இதை வழங்குவதிலும் மெத்த அவதானந் தேவை. காரமான இந்தச் சாற்றின் ஆவி வீசினதால் சிலருக்கு முகம் முதலிய பகுதிகளில் எரிசிப்பிலசு¹⁵ உண்டானது. சிலருடைய உடம்பில் இது லகுவிற் பிடிக்கும். இதைப் போட்டதாலுண்டான வீக்கமுங் காய்ச்சற் குணங்களும் உப்பு மருந்துகளை உண்டுக்குக் கொடுப்பதாலும் அந்த இடத்துக்கு வங்கநீர்¹⁶ இடுவதினாலும்

1 Tonic. 2 Anthelmintic, கிருமிகொல்லி. 3 Gallic acid. 4 Piles, 5 Menorrhoea. 6 Cardol. 7 Anacardic acid. 8 Rubifacient, சேணதி. 9 Vesicant. 10 Marking nut. 11 Pharmacy. 12 Spirit, ஸுபிதம். 13 Distil. 14 Stimulant, தீவனி. 15 Erysipelas, உதத்தம். 16 Liquor plumbi.

செவ்வையாய் மாறுமென்று கிறைல்சுவைத்தியர் சொல்லுகிறார். சேங்கொட்டையை அரைத்துக் கருப்பைவாய்க்கு¹ இடுதல், கருவை அழிப்பதற்கு நாட்டுப்பெண்கள்செய்யும் சூட்சமென்று நூற்றன்வைத்தியர் சொல்லுகிறார்.

Melanorrhoea Usitatissima.—இது கங்கைநதிக்கப்பாலுள்ள இர்துதேசப்பகுதியில் உண்டாகிற பெரிய மரம். இதின் எப்பகுதியிலுமிருந்து தடித்த பிசுபிசுப்பான நரைநிறமுள்ள தர்ப்பந்தின்² போன்ற நீர் வடியும். பாமாணுவில் வைக்க இந்த நீர் கறுப்பாகும். பிரமதேசக் கறுப்புவாணிசு³ என்பது இதுவே. பிரமர் இதை வேலைகளில் மாத்திரமல்லக் கீரைப்பாம்புக்கு மருந்தாகவும் வழங்குவார்கள். இது மெத்தச் சத்துள்ளது; அந்தெல்மிந்தியாக இதைச் சமபங்கு தேனுடன்சேர்த்து லேகிய⁴மாக்கிக் கொஞ்சமணித்தியாலம் சூட்டில் வைத்தபின் கொடுப்பார்கள். இந்த லேகியத்தின் தேயம் ஆளின் வயதுக்குத் தக்கதாய் ஒன்று இரண்டு மூன்று பெருங்கரண்டி. இதைக் கொடுத்தபின் சில மணி நேரத்தால் ஆமணக்கெண்ணெய்யில் ஒரு தேயங் கொடுக்கக் கீரைப்பாம்பு செத்து விழும். இந்த மருந்து கிருமிக்கு நஞ்சென்று இதிலால் விளங்கும். இந்த மருந்து மெத்த உவட்டிப்பானதாயும் அதிதேயமாய்க் கொடுக்கவேண்டியதாயுமிருத்தல் இதை வழங்குவதற்குப் பெரிய தடைகளாகும். ஆயினும் இதின் சத்து ஓர் உத்திரவெண்ணெய்யில் இருப்பதாகத் சோற்றுகிறபடியால் அது சுத்தமாய்க் கிடைத்தால் சோதித்துப் பார்க்கத் தகுந்தது. புதிய சாற்றைக் கையாளுவதாற் சிலருக்கு எரிசிப்பிலசு⁶வீக்கம் உண்டாகும். தேக்கங்கஷாயம்⁷ பூச அவ்வீக்கம் மாறும்.

ஒதியமரம். *Odina wodier*. இது இர்துதேசமடங்கலுமுள்ள பெரிய மரம். இதின் பட்டை மெத்தக் கயரானது. இதின் கஷாயத்தைக் கரப்பன்களுக்கும் நாட்பட்ட புண்களுக்கும் பூச்சுமருந்தாக கொர்க் பதிரிக்கு வைத்தியர் வழங்கினார். இந்தக் கஷாயம் வாய்தொண்டை கொப்பளிக்கிறதற்கு உத்தமமானதென்று போசு வைத்தியர் சொல்லுகிறார். இந்த மரத்திலிருந்து அதிக அளவான பிசின் வடியும். இந்துவின் சிலவிடங்களில் இது ஏற்றுமதிபண்ணுவதற்காகச் சேர்க்கப்படும். இதற்குங் கயர்த்தன்மையுண்டுபோற் தோற்றுகின்றது. இந்தப் பிசினைப்பற்றி ஸ்துவடு வைத்தியர் நல்ல விவரம் சொல்லியிருக்கிறார்.

மோரிங்கியங்கள்.

MORINGEAE.

அவாகடச் சரக்குகள். Non-Officinal.

முருங்கை. *Moringa pterygosperma*. இதின் வேர் அமுருசி¹வேரைப் போன்ற கார்ப்பான சுவை மணமுடையது. பச்சை வேரைத் தோலில் இடச் சிவந்து கொப்புளிக்கும். ஆயினும் இதாலுண்டாகும் எரிவு, இதை வழங்குவதற்குத் தடையாகும். கடுகுப்பற்றின் வீறு அதிகப்படுவதற்

1 Os uterus. 2 Turpentine. 3 Varnish. 4 Anthelmintic. கருமெல்லி.

5 Electuary. 6 Erysipelas, உதர்த்தம். 7 Infusion of teak.

8 Armoracia.

கு முருங்கைவேர்ப்பட்டைச் சாற்றைச் சேர்ப்பது நல்லதென்று வைத்தர் பண்டிதர் சொல்லுகிறார். வேற்சுவைத்தியரும் இப்படியே சொல்லுகிறார். உன்மருந்தாகக் கொடுத்தால் இதற்கு ஸ்திமுல¹ அமுரிதித்² தன்மைகள் உண்டென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இது அமுராசிவேருக்குப் பூரணமான பதிலென்று பிடி வைத்தியர் எண்ணுவது சரி. தொண்டை கம்மலுக்குக் கொப்புளிக்க இதின் வேர்க்கஷாயம் நல்லதென்று சாற்று வைத்தியர் சொல்லுகிறார். இதை வழங்குவதற்குச் சிகிச்சா வாகடத்தில் இரண்டு முறைகளுண்டு. 1 முருங்கைக்கூட்டுச் சீது. கொள். நறுக்கிய முருங்கை வேர், தோடந்தோல், வகைக்கு இருபது அன்சு; துவைத்த சாதிக்காய், ஐந்துதிரும்; புருவுசீது ஒரு கலன்; தண்ணீர் ஒருநாழி. கலந்து ஒரு கலன் திஸ்திலிக்கவும். இரண்டு முதல் நாலு திரும். தேயத்தில் இது ஸ்திமுலம். 2 முருங்கைக்கூட்டுக்கஷாயம். கொள். நறுக்கிய முருங்கைவேர், இடித்த கடுகு, வகைக்கு ஒரு அன்சு; கொதிவெந்நீர் அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்தில் இரண்டு மணிநேரத்துக்கு ஊறவைத்து இறுத்து முருங்கைக்கூட்டுச் சீதில் ஒரு அன்சு சேர்க்கவும். இரண்டொரு அன்சு தேயத்தில் இது நல்ல ஸ்திமுலமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இதின் கொட்டையிலிருந்து ஓர் திரமான³மென்னெண்ணெய் வரும். இது (*Moringa aptera*) என்ற இனமான முருங்கையிலிருந்து வரும் எண்ணெய் போன்றது. இந்த மரத்தின் இலை, பட்டை, பூ, பிசின் முதலியவற்றையும் சுதேசிகள் மருந்துக்கு வழங்குவார்கள். இவைகளைப்பற்றி நம்பிக்கையான காரியம் ஒன்று தெரியவில்லை.

லேகுமினேசியங்கள்.

LEGUMINOSAE.

அகசிப்பிசின்மரம். ACACIA VERA.

வாசம். அரபிதேசத்திலும் ஆபிரிக்கத்திற் செனிகல் தொடங்கி எகிப்து வரைக்கும் இருக்கும்.

வாகடபகுதி. அடி மரத்திலிருந்து வடியும் பிசின். இது அகசிப்பிசின் என்றும் அரபிப்பிசின் என்றும் சொல்லப்படும். இது விசேஷமாய் ஆபிரிக்கத்திலுள்ள கோடவன் என்ற பருதியிற் சேர்க்கப்பட்டு அலெக்சந்திரி துறைமுகம் வழியாய் இங்கிலாந்துக்கு ஏற்றுமதிபண்ணப்படும். இது அரைஇஞ்சு ஒரு இஞ்சு நீளமுள்ள, நிறமற்ற, முட்டைவடிவான துண்டுகளாக வரும்தம். அனேக நுண்ணிய வெடிப்புகளிருப்பதால் இவை மங்கலாகவாவது மினுக்கமான சின்னங்களாகவாவது இருக்கும். நொருக்கலும் மெதுவும் வழுவழுப்புமுள்ளது. அலக்கால்நீர் கரையாது; தண்ணீரிற் கரையும். இதின் கரைவோடு ஈயவதவசுதசு⁴சேர்க்க மங்கலும் வெண்மையுமான களியாய்வரும். அகசிப்பிசின் மாவுக்கு இயோதநீர்⁵இன்னும் சேர்க்க அதுநீலமாகாது.

பாபெரி, செனிகல், கிழக்கிந்து முதலிய இடங்களிலுண்டாகி அந்தந்த இடப்பெயரால் அழைக்கப்படுகிற சிலவகையான அகசிப்பிசின் வியாபார

1 Stimulant. 2 ஊன. 3 Fixed. 4 Alcohol, 5 Subacetate of lead. 6 Iodine water.

த்தில் வரும். இவைகளுள் மிகுதியானவைகள் கீழ்த்தரமானவைகள். இவைகள் இன்னின்ன மரத்தில் வடியும் பிசின் என்பது இன்னும் நிச்சயிக்கப்படவில்லை.

தன்மைகள். இது திமல்சம்¹, இமாலியம்². இது பெரும்பாலும் மற்றும் மருந்துகளுக்குத் துணையாகக் கொள்ளப்படும். விசேஷமாய் நீரில் கனத்த பொடி பற்பங்களை மிதக்கப்பண்ணுவதற்காகவே.

உபயோகங்கள். கதார்³ நோய்கள், சுவாச உறுப்புகள் சனை சல உறுப்புகளின் அழற்சி, கழிச்சல் முதலிய வியாதிகளில் இது மற்று மருந்துகளுக்கு நல்ல துணைமருந்தாகும்.

கிரீதக் கலவை⁴, குவயகக்⁵ கலவை, வாதுமைக்கூட்டுச்சூரணம்⁶, திரககந்து⁷ கூட்டுச்சூரணம், இவைகளிலும் வாகட வில்லை⁸கள் எல்லாவற்றிலும் அகசிப்பிசின் ஓர் கூறுகச் சேருகின்றது.

ரசிதங்கள். அகசிழ்சிலாது. Mucilage of Gum Acacia. கொள். அகசிப்பிசின், பருக்கன் தூளாக, நாலு அன்சு; தண்ணீர் ஆறு அன்சு; பிசினையும் தண்ணீரையும் மட்சாடிக்குள்ளிட்டு மூடிப் பிசின் கரையுந்தனையும் இடைக்கிடை கலக்கவும். கரைந்தபின் தேவையாகில் மெல்லிய புடைவையில் வடித்துக்கொள்ளவும்.

தேயம். நாள்வீதம் மூன்று தொடங்கி ஆறு அன்சு; அல்லது விரும்பியமட்டுங் குடிக்கலாம்.

இந்து தேசத்தில் கருவேல்⁹ மரத்திலிருந்து அதிகமான பிசின் எடுப்பார்கள். இது மிகுதிபற்றி மெத்தச் கீழ்த்தரமானதாய் அசுத்தங்களோடு கலந்திருக்கும். இதைப்பார்க்க விளாம்பிசின் அகசிப்பிசினுக்கு உவப்பான பதிலாகும்.

* வோதலைமரம். CATECHU ACACIA.

வாசம். இது இந்து அடங்கலும் சோலைகளிலுண்டாகும்.

வாகடபகுதி. மர வைரத்திலிருந் தெடுக்கும் ஓர் எசுரூத்து¹⁰. இது கருங் காசுக்கட்டி யெனப்படும். இது படலம் படலமாய்ச் சேர்ந்த கட்டிகளாக வரும். சிலவேளை முரணான இலைகளிற் சுற்றப்பட்டு இருக்கும். இது கருங்கபிலநீறமும், மினுக்கமும், பாரமும், கைப்பும், மெத்தத் துவர்ப்புமானது. இதின் சத்துக்கள் ஓர் வகையான தனிணும்¹¹ கதிசினு¹²மே. இந்துதேசக் கடைகளில் வேறு மாதிரியான காசுக்கட்டிகளும் வரும்.

தன்மை. கடுங் சுயர்.

உபயோகங்கள். குடவின்சளிச்சவ்¹³வின் இளக்கத்தைப்பற்றி யுண்டாகுங் கழிச்சலுக்கு இது மெத்த உவப்பானது. மேலும் இது முறைச்சுரங்கள், ஸ்கேவி¹⁴ முதலிய நோய்களுக்கு நயமென்று கொடுக்கப்பட்டது (29). உமிழ்நீர்ப் பெருக்கு, முரசு கரைதல், புண்படல், உண்ணாக்குநீட்சி, தன்சில்¹⁵ வீக்கம் முதலியவற்றுக்குத் தானிகமாய் வழங்கப்படும். லுகறீயத்துக்கும்¹⁶ அசத்துவ மெனுறீயத்துக்கும்¹⁷ புகட்டப்படும்.

1 Demulcent. சாமகி. 2 Emollient. ஶாந்தனி. 3 Catarrh. 4 Mistura Creta. 5 Guaiac.

6 Compound powder of Almond. 7 Tragacanth. 8 Lozenge. 9 Babool tree.

10 Extract. 11 Tannin. 12 Catechin. 13 Mucous membrane. 14 Scurvy.

15 Tonsil, லசுனம். 16 Leucorrhoea. 17 Atonic Menorrhoea.

(29) அனுபந்திபார்.

தேயம். தூளிற் பத்துத் தொடங்கி இருபது கிறேன். இந்த மாதிரியாய்க் கொடுப்பதரிது.

ரசிதங்கள். காசக்கட்டியின்வூசம். Infusion of Catechu. கொள். காசக்கட்டி பருக்கன்தூளாக தூற்றறுபதுகிறேன்; இடித்த கறுவாப்பட்டை முப்பது கிறேன்; கொதிவெந்நீர் பத்து அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் அரை மணிநேர மூறவிட்டு இறுக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு.

காசக்கட்டியிரஞ்சம். Tincture of Catechu. கொள். காசக்கட்டி பருக்கன் தூளாக, இரண்டரை அன்சு; இடித்த கறுவாப்பட்டை, ஒரு அன்சு; புருவுசீது¹ அரைநாழி. அடைத்த பாத்திரத்தில் ஏழுநாள் ஊறவிட்டு இடைக்கிடை நலுக்கிப் பிழிந்து இறுத்து வடித்து, அரைநாழிக்குப் போதிய புருவுசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். அரைத்திரும் முதல் இரண்டு திரும். கிரிதக்கலவைக்²கும் மற்றும் துவர்ச் கலவைகளுக்கும் இது நல்ல கூட்டு.

காசக்கட்டிக் கூட்டுச்சீதூரணம். Compound Powder of Catechu. கொள். காசக்கட்டி தூளாக, நாலு அன்சு; கீனுத்தூள்³, கிரமேரி⁴ வேர்த்தூள், வகைக்கு இரண்டு அன்சு; கறுவாப்பட்டைத்⁵ தூள், சாதிக்காய்த்⁶ தூள், வகைக்கு ஒரு அன்சு. எல்லாவற்றையும் நன்றாய்க் கலந்து மெல்லிய அரிப் பெட்டியில் அரித்துக் கடைசியில் குழி அம்மியிற் போட்டு மெதுவாய் அரைத்து அடைப்புள்ள சீசாவில் இட்டு வைக்கவும்.

தேயம். பதினைந்து முதல் முப்பது கிறேன் கொடுக்கலாம். இது சுகந்தமான நல்ல துவர்;

கபேவ மரம். COPAIFERA MULTIJUGA.

வாசம். அமரிக தேசத்தின் உஷ்டணப் பகுதியில் விசேஷமாய்ப் பிற சிலில் உண்டாகும். இதில் ஒரு இனம் மேற்கிந்துத் தீவுகளில் உள்ளது.

வாகடபகுதி. அடி மரத்திற் கீற வடியும் ஓர் தேல ராளம்⁷. இது உருவொளியும் தண்ணீரைப்பார்க்க லேசும் ஒலீவெண்ணெய்⁸ அளவு தடிப்பும், வெண்மஞ்சள் நிறமும், தனக்கேயுரிய வாசனையும், காரமான சுகந்த உஷ்டிச்சுவையுமுடையது. சமபங்கு பெஞ்சோலில்⁹ முற்றாய்க் கரையும். 270 பாகை குடளவுக்குக் காய்ச்சினபின்னும் களியாகாது. விலுறசம்¹⁰ என்னும் ஒளியெறிதல் இல்லாததுபோலும்.

தன்மைகள். இது தர்ப்பந்தின்¹¹ போன்ற ஸ்திமூலம். விசேஷமாய்ச் சனைசல உறுப்புகளின் சளிச்சவ்விற்¹² சேஷ்டிக்கும்.

உபயோகங்கள். கனுறீய¹³ நோய்க்கு இது உத்தமமான அலுஷதம். மேலும் வெட்டைவாதம், லுகறீயம்¹⁴, மூலமுளை¹⁵, காலிகசலப்பைத்தபம்¹⁶, புறங் குறீயம்¹⁷, காலிகபுறங்கீது¹⁸ இவற்றுக்கும் அதிகங் கபங்கக்கலோடு கூடிய மற்றும் சுவாச நோய்களுக்கும் இது நயந்த மருந்து.

1 Proof spirit. 2 Chalk mixture. 3 Kino. 4 Krameria. 5 Cinnamon bark. 6 Nutmeg.

7 Oleo-resin. 8 Olive oil. 9 Benzole. 10 Fluorescence. 11 Turpentine.

12 Mucous membrane. 13 Gonorrhoea, வெட்டை. 14 Leucorrhoea.

15 Piles. 17 Chronic Cystitis, 18 Bronchorrhoea. 19 Bronchitis.

தேயம். இருபது துளி முதல் ஒரு திருமை நாள் இரண்டு மூன்றுமுறை இமல்சத்தி¹லாவது தண்ணீரில் மிதக்கவிட்டாவது கொடுக்கவும்.

ரசீதம். கபேவ வெண்ணெய். Oil of Copaiva. இது கபேவதேலராள த்திலிருந்து திஸ்திலித்தெடுக்கப்படும். இது நிறமற்றதாய் அல்லது வெண் மஞ்சள் நிறமாய், கபேவத்தின் மணம் சுவையையுடையதாயிருக்கும்.

தேயம். ஐந்து முதல் இருபது துளி, நாள் இரண்டு மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம். கபேவம் கொடுக்கப்படும் நோய்களுக்கு எல்லாம் இதைக் கொடுக்கலாம்.

புளியமரம். TAMARIND TREE.

வாசம். இப் பெரிய மரம் ஆபிரிக தேசத்துக்குரியது. இக்காலம் உஷ்டண தேசங்கள் எங்கும் வளருகின்றது.

வாகடபகுதி. பழப்புளி. பழங் கனியமுன் கருஞ் சிவப்புநிறமாயும் மெத்தப் புளிப்புமினிப்புமாயுமிருக்கும். மருந்துக்கென்று சர்க்கரையிற் பேணிவைத்த பழம், கருமையாயும் இனித்த புளிப்பாயுமிருக்கும். பழத்துக்குள்ளே பெலனான தும்புகளும் தனித்தனிச் சவ்வுட் சுற்றப்பட்ட மினுக்கமுள்ள கறுத்தக் கொட்டைகளுமிருக்கும். சிதிறிக்², மலிக்³, தாத்தரிக்⁴, கென்ற அமிலங்கள் இருப்பதைப்பற்றியே இதிற் புளிப்பிருப்பது. தாத்தரிக்கமில் பதாசி⁵யோடு சேர்ந்து பதாசிதுவிதாத்தர⁶சாகவுமிருக்கும். செப்புப் பாத்திரங்களிற் சமைத்தால் புளியுடன் செம்பிலும் ஒருபங்கு சேர்ந்திருக்கும். அப்படிச் செம்பு சேர்ந்த புளியுடன் மினுக்கமான இரும்புத்துண்டொன்றை ஒரு மணித்தியாலத்துக்கு அணைத்துவைத்தால் செம்பு அந்த இரும்பில் அடையும்.

தன்மை. இளம்பேதி, குளிர்மையானது. காய்ச்சல் நோய்கள், தாபித⁷ நோய்களுக்குக் குளிர்ச்சியான பானங்கள் இதிற் செய்துகொடுத்தால் பெரும்பாலும் இணக்கமும் நயமுமாயிருக்கும்.(30)

ரசீதம். நிலவாகை லேகியத்திற் பழப்புளி சேருகின்றது.

கோன்றை மரம். PURGING CASSIA.

வாசம். இது உஷ்டண இந்துவின் சோலைகளில் ஆதியாயுள்ள மரம். இப்போ உஷ்டண தேசங்கள் எல்லாவற்றிலும் உண்டாக்கப்படுகிறது.

வாகடபகுதி. காயின் களி. இது கருநிறமும் பிசுபிசுப்பும் இனிப்பும் சற்றே அரோசியமான மணமுமுடையது. காய்கள் திரண்டு, சற்றே வளைந்து இரண்டொரு அடி நீளமும் மினுக்கமான கருமை நிறமுமாய் இரண்டு பாதிக் கோதுகளுஞ் சந்திக்குமிடத்தில் நெடும்பாடான இரண்டு புருவம் உள்ளதாயிருக்கும். கோது மெல்லிதும் வன்மையும் நொருக்கலுமானது. உள்ளறை ஏராளமான மெல்லிய குறுக்குப் பிரிவுகளால் சிற்றறைகளாகப் பிரிந்திருக்கும். இந்தச் சிற்றறைகள் ஒவ்வொன்றுக்குள்ளே வன்மையும் தட்டையும் நீள வட்டமுமான கொட்டை ஒவ்வொன்று, களியாற் சூழப்பட்டிக் கிடக்கும்.

1 Emulsion, 2 Citric acid. 3 Malic, 4 Tartaric. 5 Potash 6 Bitartrate of Potash. 7 Inflammation.

(30) அனுபந்தம்பார்.

ரசிதம். பூதக்கோன்றைக்களி. Prepared Cassia. கொள். கொண் றைக்காய் உரலிற் துவைத்து, ஒரு இரூத்தல்; தண்ணீர் அதை மூடப் போ தியது. ஆறு மணிநேரமூறவிடும் இடைக்கிடை கலக்கி, மெதுவான களி யை மயிர் அரிப்பெட்டியில் வடித்து லேகியத்தின் பதமாய் வறட்டிக்கொ ள்ளவும்.

தன்மை. இது சிறு தேயத்தில் இளம்பேதி, பெருந்தேயத்திற் கடும்பேதி யாகும். இதைத் தனியே கொடுத்தால் வாயுப்பொருமலங் கடுப்புமுண்டா ருமாயையாற் காமினதி¹களோடு சேர்த்துக் கொடுக்கவேண்டும். இதைத் தின்றிருக்கையிற் சிறுநீர் சிலவேளை சுருங் கபிலநிறங்கொள்ளும்.

உபயோகம். மல வரட்சிக்கும் விரேசனந் தேவையான பேர்களுக்கும் இதைக் கொடுத்தால் வாய்க்கும்.

தேயம். இளம்பேதியாக ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திரும்பும், விரேச னியாக, ஒரு அன்ச முதல் இரண்டு அன்சங் கொடுக்கலாம். கொன்றை க்களி நிலவாகை லேகியத்திலும் ஓர் கூறாகும்.

கொன்றை மரத்தின் வேர் கடும்பேதியாகச் சேஷ்டிக்கிறதைத் தாம் சுண் டோமென்று ஏர்வைன் வைத்தியர் சொல்லியிருக்கிறார்.

நிலவாகை. SENNA PLANT.

வாசம். இதில் வட்டிலை, கூரிலை, நெட்டிலை, என மூன்று இனமுண்டு. இவைகளில் முதலாம் இனமும் மூன்றாம் இனமும் ஆபிரிக தேசத்தின் உ வ்டணமான கிழக்குப் பகுதிக்கும் அரபி தேசத்துக்கும் இந்துவில் சிந்து ப ஞ்சாப்பு முதல் கருநாடகம் வரைக்கும் உரிய பூண்டுகள். மூன்றாம் இன ம் கெப்திலும் துபியத்திலும் மாத்திரமுண்டு. மூன்று இனங்களும் செய் கைபண்ணப்படும்.

வாகடபகுதி. காய்ந்த இலைகள். முதலாம் இரண்டாம் இனங்களையட க்கிய சூரத்துநிலவாகையின் லட்சணங்களாவன: இலைகள் கூர் அல்லது வ ட்டித்த வடிவம். ஏறக்குறைய ஒரு இன்ச நீளமானவைகள். அடி ஒருப க்கத்தில் ஒடுங்கியிருக்கும். நொருக்கலும் நரைப்பச்சை நிறமுமானது. தனக்கேயுரிய சொற்பமணமும், சொற்பமாய்ப் பாணிபோன்ற இனிய சு வையுமுடையது. இதோடு பெரும்பாலும் (*Solenostemma Argel*) என்ற செடியின் இலை, பூ, காய்களைக் கள்ளமாய்க் கலந்துவிடுகிறார்கள். சமீபின மாய்ச் சரிந்த இதின் அடியினாலும் கைப்பின்மையினாலும் இதை இதிலுந் த டித்த விதைத்த (*S. Argel*) என்றதின் இலையல்லவென்றறியலாம். திண் ணவேலி நிலவாகையின் லட்சணங்களாவன: இலைகள் இரண்டு இஞ்ச நீ ளமும் அயில் வடிவுங் கூருமானவைகள்; அடியிற் சமவீனமாய்ச் சாய்ந்தி ருக்கும். வசையச் கூடியது. முழுமையும் பச்சையாய்க் கலப்பற்றிருக் கும். மணஞ் சுவை சூரத்து நிலவாகையைப் போலவே.

தன்மை. இது விக்கினமற்ற அனுகூலமான பேதி. பிள்ளைகள், முதி யோர், மெல்லிய பெண்களுக்கு இணக்கமானது.

உபயோகம். மலவரட்சிக்கும் விரேசனந் தேவையான நோயாளருக்கு ம் இது உவந்ததென்று வெகுகாலமாகப் பேர்பெற்றிருக்கின்றது.

¹ Carminative, வாயுக்கிணி.

ரசிதங்கள். நிலவாகையின்வூசம். Infusion of Senna. கொள். நிலவாகையிலே, ஒரு அன்சு; காய்ந்த சுசுசு¹சீவல், முப்பது கிறேன்; கொதிநீர் பத்து அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் ஒருமணிரேர மூறவிட்டு இறுக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு. இந்தக் கஷாயத்தோடு பாலுஞ் சர்க்கரையுஞ் சேர்த்துச் சூடாய்ச் குடித்தால் வாடிக்கையான தேய்த்தண்ணீர்போல் உருசிக்கும். பிள்ளைகளுக்கு இப்படி⁴கொடுப்பதே லகு.

நிலவாகைக்கூட்டுக் கலவை. Compound Mixture of Senna. கொள். மக்னீசிசல்வசு² என்ற பேதியுப்பு, நாலு அன்சு; அதிமதுரவெசிராத்து³, அரை அன்சு; நிலவாகைரஞ்சம்⁴, இரண்டரை அன்சு; ஏலக்⁵கூட்டிரஞ்சம், பத்து த்கிரும்; நிலவாகையின்வூசம் போதியது. மக்னீசி சல்வசையும், அதிமதுரவெசிராத்தையும் நிலவாகையின்வூசத்திற் பதினாறு அன்சில் மென்கூட்டாற் கரைத்துப் பிற்பாடு ரஞ்சங்களையும் அரைநாழியாகப் போதியநிலவாகையின்வூசத்தையும் சேர்க்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் ஒன்றரை அன்சு.

நிலவாகை ரஞ்சம். Tincture of Senna. கொள். காய்ந்த பருக்களுசு நொருக்கின நிலவாகையிலே, இரண்டரை அன்சு; கொட்டை நீக்கிய திராட்சப்பழவற்றல், இரண்டு அன்சு; துவைத்த கறுவிக் கொட்டை⁶ அரை அன்சு; இடித்தகொத்தமல்லி⁷ அரை அன்சு; புருவுசீது⁸ அரைநாழி. நிலவாகையையும் மற்றுஞ் சரக்குகளையும் மூடிய பாத்திரத்தில் பதினேந்து அன்சு சீதில் இரண்டு நாளைக்கு ஊறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கவும். பிற்பாடு சியந்தனியில் ஏற்றி நீர் வடிந்தொழிந்தபின், சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும் வார்த்து வடியவிடவும். வடிந்தபின் சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து இரண்டுநீர்களையுங்கலந்து அரைநாழியாகப் போதிய புருவுசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். ஒரு திரும் முதல் மூன்று திரும். லவண விரேசனங்களுக்கு ம் மற்றும் விரேசனக் கலவைகளுக்கும் இது நல்ல கூட்டு.

நிலவாகை லேகியம். Confection of Senna. கொள். காய்ந்த நிலவாகையிலே மாவாக்கி, ஏழு அன்சு; கொத்தமல்லி⁷மா, மூன்று அன்சு; அத்திப்பழம்⁹பன்னிரண்டு அன்சு; பழப்புளி, ஒன்பது அன்சு; கொன்றைக்களி¹⁰, ஒன்பது அன்சு; புருணம்¹¹, ஆறு அன்சு; அதிமதுரவெசிராத்து, முக்கால் அன்சு; சுத்தசர்க்கரை முப்பது அன்சு; தண்ணீர் போதியது. மூடிய பாத்திரத்தில் அத்திப்பழத்தையும் புருணப் பழத்தையும் இருபத்துநாலு அன்சு தண்ணீரில் நாலு மணிரேரம் மென்கூட்டில் அவிக்கவும். பிறகு முந்தின அளவுக்கு வரத்தக்கதாய் இன்னுந் தண்ணீர் கூட்டினபின் பழப்புளியையுங் கொன்றைக்களியையுஞ் சேர்த்து இரண்டு மணிரேரம் இளஞ்சூட்டில் ஊறவிட்டு நனைந்த பழங்களின் களியை மயிர் அரிப்பெட்டியிற் போட்டுப் பிசைந்து ஊடே செல்லவிட்டுக் கொட்டைகள் சவ்வுகள் முதலியவற்றை வேறுக்கவும். வடிந்த களியோடு சர்க்கரையையும் அதிமதுரவெசிராத்தையும் சேர்த்து அவைகளை மென்கூட்டாற் கரைக்கவும். இந்தக் கலவை சூடாயிருக்கையில், ஒன்றாகக் கலந்த நிலவாகை மாவையும் கொத்தமல்லிமாவையும் அதோடு படிப்படியாய்ச் சேர்த்து முழுவதையுந் திறமாய்க் கலந்து பிறந்த லேகியத்தை வறட்டியாவது அதற்குத் தண்ணீர் சேர்த்தாவது எழுபத்தைந்து அன்சு நிறுக்கப்பண்ணிக்கொள்ளவும்.

1 Ginger. 2 Sulphate of Magnesia. 3 Extract of Liquorice. 4 Tincture of Senna. 5 Cardamom. 6 Caraway fruit. 7 Coriander. 8 Proof Spirit. 9 Figs. 10 Cassia. 11 Prunes.

தேயம். ஒன்று முதல் இரண்டு திரும். இது வெகுகாலம் பேர்பெற்ற நல்ல சுக விரேசனி. கெந்தகம், பதாசிதுவிதாத்தரசு, முதலிய மருந்துகளுக்கு இது பலமுறையும் அனுபானமாகக் கொள்ளப்படும்.

எமதக்சிலமரம்.

HAEMATOTOXYLON CAMPECHIANUM. LOGWOOD TREE.

வாசம். இது மத்திய அமரிசத்திலும் மேற்கிந்திய தீவுகளிலும் இயல்பாயுண்டாகிற பெரிய மரம். இந்துவ்லுமுண்டாக்கப்படுகிறது.

வாகடபகுதி. மரத்தின் உரம். இது வெளியிற் கருமையும் உள்ளே கருஞ் சிவப்பு நிறமுமான குற்றிகளாயாவது துண்டுகளாயாவது வரும். சொற்பமான நற்கந்தமும் இனிய சுவையுமுள்ளது. ஒரு துண்டு சிராயைச் சப்ப உமிழ்நீர் கருஞ் சிவப்புநிறமடையும். இதிலே தனிக்கமில்²மும் ஓர் ராஸ்³மும் எமதக்சிலின்⁴ என்ற நீதுருசு⁵முள்ள கிரிஸ்த்⁶லான ஓர்வகை நிறப் பதார்த்தமும் அமைந்திருக்கும்.

தன்மை. துவர், தொணிகம்.

உபயோகம். காலிக⁷மான அல்லது அசத்துவ⁸மான கழிச்சலுக்கு விசேஷமாய்ப் பிள்ளைகளுக்கு நயங்கொண்ட மருந்து. தானிக⁹மாக இது லுக நீப¹⁰னாய்க்குப் புகட்டப்படும். கன்சர்ப்¹¹ புண்ணுக்கு இதின் எசுரூத்தை¹²த் தைலமாகப் பூச நன்றமும் நீர்ப்பெருக்கமுங் குறையும்.

ரசிதங்கள். எமதக்சிலதிகாந்தம். Decoction of Logwood. கொள். நறுக்கின எமதக்சிலச் சிராய் ஒரு அன்சு; கறுவாப்பட்டை பருக்கன் தூளாக, அறுபது கிறேன்; தண்ணீர் அரைநாழி. எமதக்சிலச் சிராயைத் தண்ணீரில் பத்துமினி¹³நேரமாக அவித்துப் பிற்பகுதியிற் கறுவாப்பட்டையைச் சேர்க்கவும். இந்தக் கஷாயத்தை இறுத்து இறுத்தநீர் அரைநாழியளக்கப் போதியதாய் வரத்தக்க தண்ணீரைச் சக்கையின்மேல் வார்க்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சுமுதல் இரண்டு அன்சு.

எமதக்சிலவேசிறுத்து. Extract of Logwood. கொள். நறுக்கின எமதக்சிலச் சிராய் ஒரு இரூத்தல்; கொதிவெந்நீர் ஒருகலன். சிராயை வெந்நீரில் ஒருநாளைக்கு ஊறவிட்டு பாதியளவாய் நெற்றுந்தனையும் அவித்து, வடித்து நீர்மத்திகத்தில் வைத்து தடியால் இடைச்சுடை கிளறிக்கிளறி வறட்டிக்கொள்ளவும். இதற்கு இரும்புப்பாத்திரம் வழங்கப்படாது.

தேயம். பத்துமுதல் முப்பதுகிறேன்.

* களற்சி. BONDUC.

வாசம். இது உஷ்டணதேசம் எவற்றிலும் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. கொட்டை. இது சற்றே ஒழுங்கீனமான முட்டைவடிவாய் அரையே அரைக்கால் இஞ்சு முதல் அரை இஞ்சு பருமையுள்ளது. அழுத்தமும் வெண்மையும் ஈயநிறமுமாய்க் கைப்புச்சுவையுள்ள அமைல¹⁵

1 Potash Bitartrate. 2 Tannic acid. 3 Resin. 4 Hematoxylin. 5 Nitrogen. 6 Crystal.

7 Chronic. 8 Atonic. 9 Locally. 10 Leucorrhoea. 11 Cancer. 12 Extract.

13 Minute. 14 Gallon. 15 Amylum.

மான வெண்விலசத்தை¹ அடக்கியிருக்கும், இதிலே ஓர்திரவெண்ணெய்²யும் ராளமும்³ கைப்பான ஓர் சத்தும் அமைந்திருக்கும் (31)

தன்மை. தொணிகம்⁴, அந்திபிராடி⁵.

உபயோகம். விசேஷமாய்ச் சுதேசிகளுக்குண்டாம் முறைச்சுரங்களுக்கூ இது கொடுத்து மெத்த அனுகூலப்பட்டது. பெலவீனத்துக்குந் தொணிகங்கள் வேண்டிய நோயாளருக்கும் இது கொடுத்து நயங்கண்டது (32)

தேயம். பத்து முதற் பதினைந்து கிரேன் நாள் இரண்டு முறை கொடுக்கலாம்.

ரசிதங்கள். களர்ச்சிக்கூட்டுச் சூரணம். Compound Powder of Bonduc. கொள். களர்ச்சிக்கொட்டை ஒடு கழற்றித் தூள்செய்து ஒரு அன்சு; மிளகுதூள் ஒரு அன்சு. இரண்டையுந் திறமாய்க்கலந்து நன்றாயடைத்த சீசாவில் வைக்கவும்.

தேயம். பதினைந்து தொடங்கி முப்பது கிரேன், நாள் மூன்று முறை கொடுக்கவும்.

பெரு பல்ச மரம். PERU BALSAM TREE.

வாசம். இது மத்திய அமரிகத்தின் மேற்குக் கரையிலுள்ள பல்சங்கரையென்றழைக்கப்படும் அகசந்ல துறைமுகந் தொடங்கி விபதாட்டு வரைக்கு முண்டாகும்.

வாகடபகுதி. அடிமரத்தில் பட்டையைக் கருக்கி உரித்தபின் வடியும் தேல ராளம்⁶. இதுவே பெருபல்சம் எனப்படுவது. இது செங்கபில⁷நிறம் அல்லது கருமை நிறமுள்ள பாணிப்பதமான நீராகவிருக்கும். பல்ச மணமும் கார்ப்பான சொற்ப கைப்புச் சுவையுமுள்ளது. மெல்லிய படலத்தில் உருவொளியுள்ளது. ஐந்து பங்கு திட்டசீதற்⁸ கரையும். தண்ணீரோடு கலக்கும்போது பருமையிற் குறையாது.

தன்மை. சொற்ப ஸ்திமுலம்⁹, எக்ஸ்பெக்துறம்¹⁰.

உபயோகம். தொலுபல்சம்¹¹ வழங்கப்படும்நோய்களுக்கு இதைக் கொடுக்கலாம். ஆயினும் இதின் வழக்கம் குறைவு. சூட்டினாற் கக்கும் இதின் ஆவியைச் சுவாசித்தல் காலிக புறங்கீதுக்கும்¹² மற்றஞ்சுவாச வியாதிகளுக்கும் நயமாகக்கண்டது, புதிய வெட்டுக்காயங்கள் மந்த¹³,காதனப்¹⁴ புண்கள் முலைக்காம்புப் புண் முதலியவற்றுக்கும் காதுச்சலை¹⁵க்கும் தலைமொட்டைக்கும்¹⁶ இது தானிகமாக¹⁷இடப்படும்.

தேயம். பத்துத் துளி முதல் பதினைந்து துளியை இடல்சத்திற்¹⁸ கொடுக்கவும்.

தொலு பல்ச மரம். TOLU BALSAM TREE.

வாசம். நுகிறடைம்.

வாகடபகுதி. அடி மரத்திற் கீறப் பொசியும் தடித்தநீர். இதுவே தொலு

1 Nucleus. 2 Fixed oil. 3 Resin. 4 Tonic. 5 Antiperiodic. 6 Oleo-resin. 7 Reddish-brown. 8 Rectified Spirit. 9 Stimulant. 10 Expecto-
rant. 11 Tolu-balsam. 12 Chronic Bronchitis. 13 Indolent. 14 Phagedenic. 15 Otorrhoea. 16 Baldness 17 Locally. 18 Emulsion.

(31) (32) உணுபந்தம் பார்.

பல்சம் என்னப்படுவது. இது பொன் நிறமும் பெருபல்சத்தைப்பார்க்க
க வீறு குறைந்த சுத்தமான பல்ச மணமும் நல்ல இனிய சுவையுமுள்ள
மெதுவும் பிசுபிசுப்புமான கட்டி. காலஞ்செல்ல இது வைரமும் நொருக்
கலும் பருபருக்கையான கிரிஸ்தர்¹ தோற்றமும் அடையும். இது திட்டசீ
தில்² முற்றாய்க் கரையும்.

தன்மை. சொற்ப ஸ்திமுலம்³, எக்ஸ்பெக்துறம்⁴.

உபயோகங்கள். தாபிதீ⁵மில்லாமற் சுவாசக்குழல்களிலுண்டாகும் கா
லிக நோய்களுக்கு இது உள்ளே கொடுத்து நயங்கண்டது. இந்த வகையா
ன நோய்களில் இதின் ஆவியைச் சுவாசிப்பதும் நல்லது.

தேயம் பத்துத் தொடங்கி இருபது கிறேன்.

ரசிதங்கள். தோலூரஞ்சம். Tincture of Tolu. கொள். தோலூரப்
சம் இரண்டரை அன்சு; தட்டசீது போதியது. மூடிய பாத்திரத்திற் தொ
லூர பல்சத்தைப் பதினைந்து அன்சு சீதில் அது கரையுந்தனையுமாவது ஆறு ம
ணி நேரத்துக்காவது ஊறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கிக்கொள்ளவும். பிற்
பாடு வடித்து அரைநாழியாகப் போதிய திட்டசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். இருபது துளி தொடங்கி நாற்பது துளி கொடுக்கவும். கபங்
கக்குகிற மற்று மருந்துகளுக்கு இது நல்ல கூட்டு. இதில் ஒவ்வொரு அ
ன்சில் 54½ கிறேன் பல்சம் அடங்கியிருக்கும்.

தோலூர்ச்சிறாபம். Syrup of Tolu. கொள். தோலூரபல்சம், ஒன்றே
கால் அன்சு; சுத்த சர்க்கரை இரண்டு இராத்தல்; தண்ணீர் அரைநாழியல்ல
து போதியது. நுகைவாய் மூடிய பாத்திரத்தில் தோலூரபல்சத்தைத் தண்ணீ
ரில் அரைமணிநேரம் கொதிப்பித்து இடைக்கிடை கலக்கவும். பிற்பாடு
அடுப்பால் இறக்கி, அந்த நீர் பதினாறு அன்சு அளக்கிறதற்குத் தண்ணீர் சே
ர்க்கவேணுமாகிற் சேர்க்கவும். நீர் ஆறினபின் அதை வடித்துச் சர்க்கரை
யைக் கூட்டி ஸ்தீம் மத்திகம்⁷ அல்லது நீர் மத்திகத்தின்⁸ உதவியாற் கரைக்க
வும். வரும் பாணி முன்று இராத்தல் நிறுக்கவும், 1.330 என்ற விசேஷ
கிராவிதம்⁹ உடையதாகவும் வேண்டும்.

தேயம். ஒரு திராய்¹⁰ முதல் இரண்டுதிராய். உஷ்டணத்தில் இலகுவா
ய் நொதிக்காத சிறாபங்கள் சிலவற்றில் இது ஒன்று.

சாம்பிராணிக்கூட்டிரஞ்சம்¹¹, அவின்வில்லை, மாவியஇபிகாக்வில்லை¹², மா
வியவில்லை, தனிக்கமில்¹³வில்லை இவைகளிலும் தோலூரபல்சம்சேருகின்றது.

வேங்கை மரம். INDIAN KINO TREE.

வாசம். இது இலங்கையின் சோலைகளிலும், சென்னையின் எப்பகுதி
களிலும், வடக்கே பாகாரிலுள்ள ராசமால் மலை வரைக்குமுண்டாகும்.

வாகடபகுதி. அடி மரத்திற் கீறப் பொசிந்திறுகின சாறு. இது கீனு எ
ன்னப்படும். இது பளபளப்பும், கருஞ் சிவப்பு நிறமுமான சதுரித்த சிறுத்
துண்டுகளாக வரும். விளிம்புகள் தெளிந்த நற்சிவப்புநிறம். இது மணம
ற்றது, கடுந்துவரானது. இதைச் சப்ப உமிழ்நீர் இரத்தம்போலச் சிவக்கும்.
இதலே ஓர்வகையான தனின் கதிசின்¹⁴ என்ற இரண்டு சத்துக்கள் உண்டு.

1 Crystal. 2 Rectified Spirit. 3 Stimulant. 4 Expectorant. 5 Inflammation.
6 Chronic. 7 Steam bath. 8 Water bath. 9 Specific Gravity. 10 Drachm.
11 Compound Tincture of Benzoin. 12 Morphia and Ipecac Lozenge.
13 Tannic acid. 14 Catechin..

தன்மைகள். இது ஓர் உத்தமமான துவர் மருந்து.

உபயோகங்கள். காசக்கட்டியின் உபயோகங்களைப் போலவே. ஆயினும் இதின் செயல் அதிலுஞ் சாந்தமானதால் பிள்ளைகளுக்கும் நொய்யபெண்களுக்கும் அதிகம் உவந்தது.

தேயம். கீனுத் தூளில் பத்து முதல் முப்பது கிரேன் கொடுக்கலாம். கூடவுங் கொடுக்கலாம்.

ரசிதங்கள். கீனூரஞ்சம். Tincture of Kino. கொள். கீனு பருக்கன் தூளாக இரண்டு அன்சு; திட்டசீது¹ அரைநாழி. அடைத்த பாத்திரத்தில் ஏழுநாள் ஊறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கி வடித்து, அரைநாழிக்குப்போதிய திட்டசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். முப்பது மினிம் முதல் இரண்டு திரும் வரைக்குங் கொடுக்கலாம். துவர்க்கலவைகளுக்கு இது நல்ல கூட்டாகும்.

கீனுகூட்டுச் சூரணம். Compound Powder of Kino. கொள். கீனுத்தூள், மூன்றேழுக்கால் அன்சு; அவின்தூள், சால் அன்சு; சுறுவாப்பட்டைத் தூள் ஒரு அன்சு. மூன்றையும் திறமாய்க் கலந்து, மெல்லிய அரிப்பெட்டியில் அரித்துக் கடைசியில் குழியம்மியிற் போட்டு மெதுவாய் அரைத்து அடைத்த சீசாவிற் போட்டு வைக்கவும்.

தேயம். ஐந்து முதல் இருபது கிரேன். இருபது கிரேனில் ஒரு கிரேன் அவின் இருக்கும். பைரோசிக்கும்² அதிக நீருறுதலோடு கூடிய குன்மத்துக்கும்³ இது நல்ல மருந்து.

காசக்கட்டிக் கூட்டுச் சூரணத்திலும்⁴ கீனு ஓர் கூறுகச் சேருகின்றது.

சேம்பிசின். Red Gum. மேற்கு ஒளஸ்திராலியிற் செங்கீனு அத்தேசமடங்கலும் பரம்பியிருக்கின்ற யுகலிப்தஸ்⁵ என்ற மரத்தின் சில இனங்களில் உண்டாகிறது. சட்⁶ தன்மைகளிலும் அவுஷத தன்மைகளிலும் இது கீனுவைப் போன்றது. மாடின் என்பவர் இந்துக்களின் கழிச்சலுக்கும், விசேஷமாய் யுரோபருக்குண்டாகும் காலிகதிசெந்தெரிக்கும்⁷ இதைக்கொடுத்து மெத்த நயந்ததென்று கண்டு, பிறித்தனி வைத்தியத்தில் இதைச் சேர்த்திருக்கிறார். காசக்கட்டியையும் கீனுவையும் பார்க்க இது குறைந்த துவர் என்றும் கூடமன திமல்சு⁹மென்றும் அவர் எண்ணுகிறார். இந்த மரம் மிகுதியாய் மேற்கு ஒளஸ்திராலியிலுண்டு. அங்கே உத்தியோகந்தராயிருந்த வைத்தியர் சிலர் இதை விதந்துபேசுகிறார்கள். இதின் தேயம் தூள் அல்லது சிறுபமாக¹⁰ ஐந்து முதற்பத்துக் கிரேன். இந்துவில் நீலகிரிமலைகளிலும் மற்றும் உயர்ந்த பகுதிகளிலும் யுகலிப்தசின் சில இனங்கள் வளர்க்கப்பட்டிருப்பதால் இந்தச் சரக்கு இந்துவைத்தியர்க்கு அதிபிரயோசனமாகும்.

செஞ்சந்தன மரம். RED SANDAL WOOD TREE.

வாசம். இது சோழமண்டலக் கரையையடுத்த மலைகளிலுண்டாகும்.

வாகடபகுதி. சிராய். இது உரத்த சனத்த துண்டுகளாகவாவது சிராயாகவாவது வரும். வெளிப்பக்கங் கருங் தபிலம், உள்ளே கருமையுஞ்

1 Rectified Spirit. 2 Pyrosis. 3 Dyspepsia. 4 Compound powder of Catechu.
5 Eucalyptus. 6 Physical. 7 Chronic Dysentery. 8 Kino. 9 Demulcent.
10 Syrup.

சிவப்புங்கலந்து பலவண்ணமுமாயிருக்கும். இதின் தூள் இரத்தம் போன்ற சிவப்பு. சொற்ப மணமும் சற்றே கைப்புச்சுவையும் உடையது. இதிலே சந்தலின்¹ என்ற நிறப்பதார்த்தம் அடங்கியிருக்கும்.

தன்மைகளும் உபயோகங்களும். லவந்தர் கூட்டிரஞ்சத்தில்² நிறப்பதார்த்தமாக மாத்திரம், இது வாக - த்தில் வழங்கப்படும். ஏலக்³ கூட்டிரஞ்சம் சின்னக்⁴ கூட்டிரஞ்சங்கள் முதலியன செய்வதிலும் இதைக் கக்கசுக்குப்⁵ பதிலாக நிறப்பதார்த்தமாய் இந்துவல் வழங்கலாம்.

சுதேசிகளுக்குள்ளே இது துவராக அதிகமாய் வழங்கப்படும். இதின் சொற்ப தனிச்சுவை⁶ கலிச்சுவை⁷ அடங்கியிருப்பதைப்பற்றி இத்தன்மையை உடையதாய் இது இருந்தாலும் உள்மருந்தாகக் கொடுப்பதற்குத் தகுந்ததாகத் தோன்றவில்லை.

வைசுதிக்கமகோடி. PHYSOSTIGMA VENENOSUM.

CALABAR BEAN PLANT.

வாதம். கலபாவிலும் மேற்கு ஆபிரிக்கத்தின் மற்றும் பகுதிகளிலுமுள்ளது.

வாகடபகுதி. கொட்டை. இது ஒரு இஞ்சு நீளமும் முக்கால் இஞ்சு அகலமுமுள்ளதாய்க் கருஞ்சிவப்பு அல்லது சாம்பல்நிறமுள்ள உரத்தவெரித்த நொருக்கலான மினுக்கமுள்ள ஒடுள்ளதாயிருக்கும். கொள்ளு வடிவான இக்கொட்டை தட்டையான இரண்டு பக்கங்களையும் குவிவான ஓரம் நெடுக ஓடி ஒரு அந்தத்திலுள்ள துவாரத்தில் முடிகிற ஓர் வரையை யுமுடையது. ஒட்டுக்குள்ளே இரண்டு குத்திரங்க⁸ளாலான பருப்பு இருக்கும். இது ஏறக்குறைய 46 கிறேன் நிறையுள்ளது. வன்மையும் வெண்மையுமானது, மாவாக்கப்படக்கூடியது, பயறு முதலியவற்றின் சுவையுள்ளது; கைப்பாவது, கார்ப்பாவது, சுகந்த மணமாவது அற்றது. அலக்கால்⁹ இதின் சத்தை முற்றாய் வாங்கும். தண்ணீர் சொற்பமாய் வாங்கும்.

தன்மைகள். கசேரு நரம்புகளிற்¹⁰ பிடிக்கிற வீரன செரதீவம்¹¹. அதி தேயத்திற் கால்களைச் சோரப்பண்ணி நாடியைக் குறைத்து மரணத்தை வருவிக்கும். தேயம் இன்னும் அதிகப்பட்டால் இதயத்தைச் சோரப்பண்ணும். இது பெரிய நஞ்சு. கண்ணுக்கு இட்டால் நயனேத்துவாரத்தை¹²ச் சீக்கரத்திற் சுருங்கப்பண்ணும்.

உபயோகங்கள். ஈர்ப்புக்கும், கொரியத்துக்கும்¹³, கசேரு நரம்புகளின் உணர்ச்சி அதிகப்பட்ட மற்றஞ் சிராநோய்களுக்கும் இது உள்மருந்தாகக் கொடுக்கப்படும். கண்ணின் வியாதிகள் ஊறுகளுக்கு இடப்படுவதே இதின் முக்கியமான உபயோகம்; இவைக்கு இது மெத்த உவந்தது.

தேயம். கொட்டை மாவில் ஒரு கிறேனிற் தொடங்கிச் செயலுக்குத் தக்கதாய்ப் படிப்படியாய்க் கூட்டி நாலுகிறேன் வரைக்குக் கொடுக்கலாம்.

ரசிதம் வைசுதிக்கமவேசிறத்து. Extract of Calabar Bean. கொள். வைசுதிக்கம கொட்டை பருக்கன்தாளாக ஒரு இருத்தல்; திட்டசீது இரண்டு

1 Santalin. 2 Compound Tincture of Lavander. 3 Cardamom. 4 Cinchona. 5 Coccus. கருஞ்சிவப்பு. 6 Tannic acid. 7 Gallic acid. 8 Cotyledon. 9 Alcohol. 10 Spinal Nerve. 11 Sedative. 12 Pupil. 13 Chorea.

நாழி. மூடிய பாத்திரத்திற் கொட்டைத் தூளை அரைநாழி சீதில் இரண்டுநாளைக்கூறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கவும். பின்பு சியந்தனி¹யில் இட்டு நீர் வடிந்தொழிந்தபின் சக்கையின்மேற் சேஷமான சீதை மெல்ல மெல்ல வடியும்படி வார்த்துவிடவும். சக்கையைப் பிழிந்து, பிழிந்த நீரைச் சியந்தனித்த நீரோடு சேர்த்து வடித்து, சீதின் மிகுதியான பங்கைத் திஸ்திலித்த கற்றி மீந்திருப்பதைப் பாணிப்பதமாய் வரத்தக்கதாய் நீர் மத்திகத்தில் வறட்டிக்கொள்ளவும்.

தேயம். பதினொரிலொருபங்கு கிறேன் முதற் காற்கிறேன் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். கண்ணின் நயனை⁴த் துவாரத்தைச் சுருங்கப்பண்ணுவதற்கு வைசுதிகம் எசுரூத்திற் சொற்பத்தை கிலேசரினிற்⁵ கரைத்து மெதுவான மயிர்க்கூசியால்⁶ கண்ணுக்கு இடலாம். வைசுதிகம்விரஞ்சத்திலூறிய செலதின்⁸ தாளும் ஊறுதாளும் சாய்ப்புகளில் விலைப்படும். இந்த மருந்தைவேண்டிய நயன ரோகங்களுக்கு இடுவதற்கு இவைகள் வசதியானவைகள்.

* பூனைக்காலி. COWHAGE.

வாசம். இது மேற்கிந்துவிலும் இந்துவிலும் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. காயிலுள்ள மயிர்கள். காய் கருமை நிறமாயும் நீண்டு தட்டையாயும், சொற்பமான இரண்டு வளைவுகளையுடையதாயும் இரண்டு மூன்று இஞ்ச நீளமாயும் பெலனான கபிலநிறச் சுணைகளாகிய மயிர்களால் அடர்த்தியாய் மூடப்பட்டுமிருக்கும். குக்குமாட்சியில்⁹ வைத்துப் பார்க்கும் போது இந்த மயிர்கள் முட்பன்றியின் முட்கள் போற் தோன்றும். நுனிப்பகுதியில் கருக்கு விழுந்திருக்கும்.

தன்மைகள். இவைகள் கிருமிகளிற் குற்றி அவைகளைக் கொல்லும்.

உபயோகங்கள். கீரைப்பாம்பை விழுத்துவதற்கு இது விசேஷமாய் வழங்கப்படும். தானப்புழுவுக்கும் இதை வழங்கலாம். ஆனாலும் அவ்வளவு நயமல்ல.

தேயம். இதை தெநீயத்¹⁰, சர்க்கரைப்பாணி¹¹, அல்லது தேனிற் சேர்த்து லேகியமாய்க்கொடுப்பது உத்தமம். பூனைக்காலிக்காயை இந்த அனுபானங்களொன்றில் தோய்த்துவைத்து அது லேகியப்பதமாய் வருந்தினையும் அந்த மயிர்களை வழித்தெடுக்கவும். இதில் வளர்ந்தவர்களுக்கு ஒரு பெரிய கரண்டியும், குழந்தைகளுக்கு ஒரு சிறுக்கரண்டியும் இரண்டு மூன்று நாட்காலமே கொடுக்கலாம். பிறகு சுள்ளாப்பான ஓர் விரேசனங் கொடுக்கக் கிருமிகள் பெரும்பாலும் விழும்.

* முருக்கு. BUTEA FRONDOSA.

வாசம். இது இந்துதேசமடங்கலுமுண்டு.

வாகடபகுதி. மரத்திற் கீறப் பொசியும் பிசின். இது மிளகிற் குறைந்த பருமையான ஒழுங்கற்ற மினுக்கமுள்ள துண்டுகளாக வரும். நரைநிறமான பட்டையின் துண்டுகள் இவைகளோடு ஒட்டியிருக்கும். இது

1 Percolator. 2 Distil. 3 Water bath. 4 Pupil. 5 Glycerine. 6 Soft-brush.
7 Tincture of Physostigmatis. 8 Gelatine. 9 Microscope.
10 Treacle. 11 Syrup.

நல்ல பவன நிறமுங் கயர்ச்சுவையுமுள்ளது. தண்ணீரிலும் அலக்காலிலும்¹ கரையும். பூரணமாயல்ல. தனிக்கமில்ம்² கவிக்கமில்ங்கள் இருப்பதைப் பற்றியே இதற்குக் கயர்த்தன்மை உண்டு.

தன்மைகளும் உபயோகங்களும். கீனுவைப்⁴போலவே. அதற்குப் பதிலாக இதை வழங்கலாம். (33)

ரசிதங்கள். கீனுவின் ரசிதங்களைப் போலவே.

இதைப்போல ஒரு பிசின் Butea Superba விவிருந்தும் Butea parviflora விவிருந்தும்ஊறும். இரண்டையும் சுதேசிகள் மருந்தாக வழங்கு வார்கள். கயர் மருந்துச் செயல் இவைக்குண்டென்பதற்குச் சந்தேகமில்லை.

*குன்றிமணி. INDIAN LIQUORICE PLANT. ABRUS.

வாசம். இது உஷ்டண தேசங்கள் எல்லாவற்றிலும் உண்டாகின்றது.

வாகடபகுதி. வேர். இது அரை இஞ்ச முதல் ஒரு இஞ்ச பருமையும் பல அளவான நீளமுமுள்ளதாய் வரும். வெளியில் வெண்கபிலம்; உள்ளே மஞ்சள்நிறம்; மணமற்றது; அதிமதுர வேர் போன்ற இனிப்பான வாணிச்சுவையுள்ளது.(34)

தன்மைகளும் உபயோகங்களும். அதிமதுரத்தைப் போலவே. அதற்கு இது வாய்ப்பான பதில்.

ரசிதங்கள். குன்றிமணி எசிற்த்து. Extract of Abrus. அதிமதுரவெசிறுத்தைப் போலவே இது செய்யப்படும்.

* வேர்க்கடலை. GROUND NUT PLANT.

வாசம். இது உஷ்டண தேசங்களெவற்றிலும் செய்கைபண்ணப்படும்.

வாகடபகுதி. பருப்பிற் பிழிந்தெடுத்த எண்ணெய். இது வேர்க்கடலைத்தேலம். இது தெளிந்ததும் வெண்மஞ்சள் நிறமுமானது. ஏறக்குறைய மணமற்றதாய், சாந்தமான சுவை பொருந்தியிருக்கும். .916 என்ற விசேஷகிராவிதம்⁵உடையது.

தன்மைகளும் உபயோகங்களும். இந்த எண்ணெய் சிசிச்சைமுதலிய முகாந்தரங்களுக்கும், மற்றுங் காரியங்களுக்கும் ஒலீவெண்ணெய்க்கு⁷ உவப்பும் மலிவுமான பதிலாகும்.(35)

அதிமதுரப்பூடு. LIQUORICE PLANT.

வாசம். இது யுரோப தேசத்தின் தென்பகுதியிலுள்ளது. இங்கிலாந்திலும் செய்கைபண்ணப்படும்.

வாகடபகுதி. வேர் எனப்படும் நிலத்தண்டு. இது ஒரு இஞ்சக்குக் குறைந்த மொத்தமான நீண்ட திரண்ட கவரான துண்டுகளாக வரும். வைரமானது, வசையத்தக்கது; வெளியில் நரையான சிவப்புநிறம், உள்ளே மஞ்சள்நிறம். சுற்றே ஒவ்வாத மணமும், இனிப்பும், வழுவழுப்பும் சற்றுக் கார்ப்புமுடையது. இதைத் தண்ணீரில் ஊறப்போட்டு அதோடு தண்ணீர்

1 Alcohol. 2 Tannic acid. 3 Gallic acid. 4 Kino. 5 Specific Gravity.

6 Pharmacy. 7 Olive oil.

(33) (34) (35) அனுபந்தம்பார்.

கலந்த சல்வுரிக்கமில்¹ சேர்க்க அடையல் காணும். கிலேசியன்² என்ற இ தற்குரிய ஓர் சத்திலும் அதிமதுரச் சர்க்கரை³யிலுமே இதின் இனிப்புத் தங் கியிருக்கும்.

தன்மை. இது திமல்சம்⁴, இமாலியம்⁵.

உபயோகம். இருமலுக்கும் தொண்டையிலும் சுவாசப்பையின் சளி ச்சவ்விலுமுண்டாகும் கதார்⁶ நோய்களுக்கும், சலக்கடுப்பு சலவரிவு முத லியவற்றுக்கும் இது உவந்தது.

ரசிதங்கள். அதிமதுரவெசிறுத்து. Extract of Liquorice. கொள் அதிமதுரவேர்பருக்கன் தூளாக, ஒரு இரூத்தல்; தண்ணீர் இரண்டுநாழி. அதிமதுரவேரை ஒருநாழி தண்ணீரில் பன்னிரண்டு மணிநேரமுறவைத்துத் தெளித்துப் பிழிந்து, சக்கையைச் சேஷமான தண்ணீரில் ஆறுமணிநேர முறவைத்துத் தெளித்துப் பிழியவும். தெளித்த நீர்களைக்கலந்து 212 பாகை சூட்டுக்கு வருந்தனையும் காய்ச்சி, கம்பளத்தில் வடித்து, ருளிகைக்குத் தகு ந்தபதமாக நீர்மத்திகத்⁷தில் வறட்டவும்.

தேயம். விரும்பியமட்டுங் கொடுக்கலாம். நிலவாகை, சகை⁸, அமோன வைருகுலோறசு⁹, முதலியவற்றின் கைப்பை மறைக்கிறதற்கு இது அதிக மாய் வழங்கப்படும்.

லீனவின்ஞ்சம்¹⁰சார்சகூட்டுத் திகாக்தம்¹¹ என்பவைகளில் அதிமதுரவேர் சேரும். சகைக்கூட்டுத் திகாக்தம், நிலவாகைலேகியம், தர்ப்பந்தீன்¹²லேகி யம், சகைரஞ்சம்¹³ அவின் வில்ல, நிலவாகைக் கூட்டுக்கலவை, இவைக ளில் அதிமதுரவெசிறுத்துச் சேருகின்றது.

திரககந்துச்சேடி. TRAGACANTH SHRUB.

வாசம். இது அனதோலியம், ஆமீனியம், வடபார்சியம் என்னுமிடங்க ளிலுண்டாகும்.

வாகடபகுதி. திரககந்துப் பிசின். இது அடியிலும் கொப்புகளிலும் பொசியும். வெண்மஞ்சள் நிறமும் பெலனுங்கொண்டது. வசையத் தக் கது. 120 பாகை சூட்டில் லேசாய் மாவாக்கப்படும். தண்ணீரில் மெத் தச் சொற்பமாய்க் கரையும். ஆயினும் களியாக வீங்கும். இயோதரஞ் சம்¹⁴ பட இது செந்நீலநிறமாகும். இது சுவறின தண்ணீருக்கு திட்டசீது¹⁵ சேர்ப்பதால் அடையல் விழாது.

தன்மைகள். இமாலியம், திமல்சம்.

உபயோகங்கள். சளிச்சவ்வின்¹⁶ அழற்சிக்கு விசேஷமாய்ச் சுவாசஉறு ப்புக்கள் சனைசல உறுப்புகளுக்குரிய சளிச்சவ்வின் அழற்சிக்கு இது ந ல்லது. அதி சேஷ்டையுள்ள மருந்துகளுக்கு அனுபானமாவதே இதின் விசேஷம்.

ரசிதங்கள். திரககந்து முசிலாது. Mucilage of Tragacanth. கொள், திரககந்துப்பிசின், அறுபது கிறேன்; தண்ணீர் பத்து அன்சு. அரைநாழிகொ ள்ளத்தக்கவோர் சீசாவுக்குட் தண்ணீரையும் பிசினையும் இட்டுச் சிலமினி

1 Sulphuric acid. 2 Glycion. 3 Liquorice sugar. 4 Demulcent. சமகி. 5 Emollient. சாந்தனி. 6 Catarrh. 7 Water bath. 8 Aloes. 9 Hydrochlorate of Ammonia.

10 Infusion Lini. 11 Compound Decoction of Sarsae. 12 Turpentine.

13 Tincture of Aloes. 14 Tincture of Iodine, 15 Rectified spirit.

16 Mucous membrane.

நேரமாகத் திறமாய்க் குலுக்கி பிறகு சற்று வேளையாற் பிசின் கரையுந்த னையும் குலுக்கிப் பாணியாக்கிக்கொள்ளவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் மூன்று அன்சு, கனத்த தூள்களைக் கல வைகளில் மிதக்கப்பண்ணுவதற்கு இது சிலவேளை வழங்கப்படும்.

திராககந்துக்கூட்டுச்சூரணம். Compound Powder of Tragacanth. கொள். திராககந்துப் பிசின்மா, அகசிப்பிசின்மா¹, அமைலமா², வகைக்கு ஒரு அன்சு; சுத்த சர்க்கரை மா, மூன்று அன்சு. ஒன்றாய்ச் சேர்த்து நன் ருயரைக்கவும்.

தேயம். கனத்த தூள்கள் முதலிய மற்றும் மருத்துகளுக்கு அனுபான மாகப் பாணியை உடனே செய்துகொள்வதற்கு இது மெத்த வசதியான சூரணம். ஒரு அன்சு தண்ணீரில் இதற் பதினைந்து இருபது கிறேன் க ரைக்கப் பாணி போதிய தடிப்புக்கொள்ளும். அவின் லேகிய³த்திலும் அ வின் கூட்டுச் சூரணத்திலும் திராககந்துப்பிசின் ஓர் கூறாகும்.

ஸ்கோபாரி. SCOPARIUS. COMMON BROOM.

வாசம். இது பிறித்தனிலும் யுரோபத்தின் மற்றும் பகுதிகளிலும் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. பச்சையுங் காய்ந்ததுமான தளிர்கள். இவைகள் கரும் பச்சை நிறமும் அழுத்தமுமான நேரிய கூருள்ள உரத்த தளிர்கள். சுவை கைப்பும் உவட்டுமானது. நசிக்க ஒருவகையாய் மணக்கும். இவைகளில் தங்கள் வீறுக்கு இடமாக ஸ்கோபாரின்⁵ என்ற ஓர் தடஸ்த சத்தும் ஸ்பாட் டியம்⁶ என்ற நீரான அத்திர⁷ அல்கலைவமும்⁸ அடங்கியிருக்கும்.

தன்மைகள். அமுரிதி⁹, இளம்பேதி. பெருந்தேயத்தில் கடும்பேதி, வமனி¹⁰.

உபயோகங்கள். நீர்க்கோவை நோய்களுக்கு இது மெத்த நயம். அமு ரிதி வேண்டிய மற்றும் நோய்களுக்கும் இது உதவும்.

தேயம். காய்ந்த தளிர்களில் இருபது கிறேன் முதல் முப்பது கிறே னைத் திகாத்தமாகக் கொடுக்கலாம்.

ரசிதங்கள். ஸ்கோபாரிச் சாறு. Juice of Broom. கொள். ஸ்கோ பாரிப் பச்சைத் தளிர், ஏழு இருத்தல்; திட்டசீது¹¹ போதியது. தளிர்களை உ ரலிற் துவைத்துச் சாற்றைப் பிழிந்து மூன்றுபங்கு சாற்றுக்கு ஒருபங்கு வீத மாய்த் திட்டசீது சேர்த்துக்கொள்ளவும். ஏழுநாள் வைத்திருந்து வடித்துக் குளிர்ந்த இடத்தில் வைக்கவும்.

தேயம். ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திரும்.

ஸ்கோபாரித் திகாத்தம். Decoction of Broom. கொள். காய்ந்த ஸ் கோபாரித் தளிர் ஒரு அன்சு; தண்ணீர் அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்திற் பத்துமினி¹² வரைக்கு அவித்துச் சீலையில் வடித்து, வடிந்தநீர் அரைநாழிய ளக்கப் போதியதாய் இன்னும் வெந்நீரை வடியிலுள்ள சக்கையின்மேல் வா ர்க்கவும்.

தேயம். இரண்டு முதல் நாலு அன்சு.

1 Gum Acacia. 2 Amylum. 3 Confection of Opium. 4 Compound powder of Opium. 5 Scoparin. 6 Spartia. 7 Volatile. 8 Alkaloid. 9 Diuretic, தியூரீசம்.

10 Emetic. 11 Rectified spirit 12 Minute.

அவாகடச்சரக்குகள். Non-Officinal.

கருவேல்மரம். *Acacia Arabica*. இது இந்துவில் மிகுதியாயுண்டு. இதின் பட்டை பருத்த தடித்த துண்டுகளாக வரும். பருக்கன் நாருள்ளதாயும் கருஞ் சிவப்பான நிறமுள்ளதாயுமிருக்கும். இது கடுங் கயரானது. ஒக்¹பட்டைக்குப் பதிலாக வழங்கலாம். இத்தன்மையில் இது நல்லதென்று மெகிரீகர் வைத்தியர் நினைத்து இதின் திகாத்தம் அபானப் பிதுக்கத்துக்கு²நயந்த பூச்சென்று கண்டார். கருவேலம்பட்டைத் திகாத்தம் தானிக³து வராக விசேஷமாய் லுகறீயத்துக்கு⁴ நல்லதென்று தெல்பிறுது வைத்தியர் சொல்லுகிறார். இதின் குருத்திலைகளைத் துவைத்துப் பாப்பையாக்கி நீர்வடியும் புண்களுக்கு இட்டால் அது உத்தமமான கயர்மருந்தும் ஸ்திமூலமுமாகுமென்று ருமசேண்போசு என்ற உதவிச் சத்திரீகன் சொல்லுகிறார். சுதேசிகள் சொல்லுகிறபடி இந்த மரத்தின் தன்மைகள் உபயோகங்களைப்பற்றியும் இதின் பேறுகளைப்பற்றியும் தாகஸ்தர் எழுதிப் பிரசுரஞ்செய்திருக்கிறார். இந்த மரத்தில் வடியும் பிசினைப்பற்றி முன்னமே அகசியின்சீழ்ச்சொல்லப்பட்டது. அகசியின் வேறனைக இனங்களின் பட்டைக்கு விசேஷமாய் பிய்வேல்⁵, சீமைவெள்வேல்⁶, வெள்வேல்⁷, கைப்பகசி⁸, லெபெக்ககசி⁹ என்பவற்றின் பட்டைக்கு கருவேலம்பட்டையின் கயர்த்தன்மைகள் கூடக்குறையவுண்டு. பிய்வேலிலும் லெபக்ககசியிலும் வடியும்பிசின் திறமானதென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

சீமையகத்தி. *Cassia Alata*. இந்தச் செடி வண்டுகொல்லியென்றும் சொல்லப்படும். இது சிறப்பான நிமிர்ந்த பெரிய மஞ்சள் நிறமான பூக்கொப்புகளையுடையது. இது மேற்கிந்திய தீவுகளிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்டு இப்போ இந்துவடங்களும் பரம்பியிருக்கின்றது. சுதேசிகள் இதின் இலை, தோல் வியாதிகளுக்குப் பூச உத்தமமென்று இதைப் பலஇடங்களில் உண்டாக்குகிறார்கள். இலைகள் இத்தன்மையான சத்தையுடையவென்ற நம்பிக்கை மேற்கிந்து, பிறசீல், மொரீசு, யாவாகம் முதலிய உஷ்டண தேசங்களிலும் இருப்பவர்களுக்குள்ளுண்டு. விசேஷமாய்ப் படர்தேமலுக்கு¹⁰ இவை நயமென்றதை மகென்னர் ஆதர் வைத்தியர்கள் முதலானோர் உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். இந்த வகுப்பான நோய்களில் இவை காட்டுஞ்செயலைப்பற்றி, பிடி, வன்சொமறின், ஸ்துவாடு, நீன் வைத்தியர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள். நாட்பட்ட இந்த நோய்களில்ல, அவை புதிதாயுண்டாகும்போதுதான் இந்த இலைகளால் பொதுவாய் நயமுண்டாகிறதாகத் தோற்றுகின்றது. படர்தேமலுக்குக் கைகண்டமருந்தாய் வழங்கும் பின்வரும் அன்கென் செய்முறை வங்காள சிகிச்சவாகடத்திலுள்ளது. சீமையகத்தி, பச்சை இலை, போதிய அளவாயெடுத்துப், பசையாக அரைத்துச் சமநிறையான லாடன்கெனோடு¹¹கெட்டியாய்ச் சேர்த்துக்கொள்ளவும். இதிலுந் திறமான முறை இலையை அரைத்துக் கொஞ்ச எலுமிச்சம் சாறு விட்டுப் பசையாகச் சேர்த்து, நோய்த்த இடத்திற் திறமாய்ப் பூசித் தேய்த்துவிடுதலாம். இது பெரும்பாலும் மெத்த வாய்க்கும். இலைகளை உட்கொள்ள மெல்லிய

1 Oak. 2 Prolapsus ani. 3 Local. 4 Leucorrhoea. 5 *Acacia Farnesiana*.
6 *A. Feruginea*. 7 *A. Leucophaea*. 8 *A. Amana*. 9 *A. Lebbek*.
10 Ringworm. 11 Lard ointment.

பேதியாகும். காய்ந்த இலைகளிற் செய்த ரஞ்சம்¹ நிலவாகை²யைப் போலச் சேஷ்டிக்கிறதென்று வுட் என்பவர் சொல்லுகிறார். பச்சை இலையிற் செய்த ஓர்எசுரூத்து³ கலுசுந்தெசுரூத்து⁴க்கு நற்பதிலாகுமென்று பளனியாண்டி வைத்தியர் சொல்லுகிறார். இவைகளே இன்னுஞ் சோதிப்பது நல்லது. பொன்னாவரை⁵ நார்த்தந்தகரை⁶ ஊசித்தகரை⁷ இவைகளின் இலைகளுக்கும் இப்படியான தன்மைகள் உண்டென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஊசித்தகரை இலையை எலுமிச்சஞ் சாற்றோடு அரைத்துப் பூசுதல் இந்து வைத்தியருக்குள்ளே படர்தாமரைக்கு உத்தமமருந்தென்று என்ஸ்லி பண்டிதர் சொல்லியிருக்கிறார். பொன்னாவரையிலேக் கஷாயத்தைப் பஸ்தீதர் வைத்தியர் கொடுத்து நயந்த பேதியென்று கண்டார். அகத்தியிலேக்⁸கஷாயமும் இவ்விதமாய்ச் சேஷ்டிக்கிறதென்று அவர் கண்டார். பருவி வைத்தியரும் இதை உறுதிப்படுத்தி இதன்பட்டை கைப்பான தொணிகம்⁹ என்று சொல்லுகிறார்.

கருங்காணம். *Cassia Absus*. இந்தப் பூண்டு வட ஆபிரிக்கத்திலும் இதுவிலுமுண்டாகும். இதின் விதையைப் பற்றி இந்து எகிப்துப் பதார்த்த சாரங்கள் பேசுகின்றன. சீழ்க் கண்ணோவுக்கு நன்மருந்தென்று பேர்பெற்றிருக்கின்றது. இந்த விதையை மெல்லிய மாவாக்கி அதில் ஒரு கிறேன் வரைக்குக் கண் மடலுள் இடுவார்கள். பிரசுல்சத் தேசத்தில் 1822 ம் ஆண்டு பரம்பின சீழ்க்கண்ணோவிற்¹⁰ கார்பவுர் வைத்தியர் இந்தப் பிரயோகத்தைச் செவ்வையாய்ச் சோதித்துப் பார்த்ததாற் கண்ட பேறுகள் இதின் நயத்தை உறுதிப்படுத்தின. சென்னப்பட்டின நயனமடாதிபதியாகிய சிமிது வைத்தியர், கதார்க்கண்ணோ¹¹வுக்கும் கிறனுல¹² மடலுக்கும் இது மோசமான மருந்தென்றும் இதை இடுவதால் மெத்த உபாதியுண்டாகிறதென்றும் எழுதியிருக்கிறார். கடைகளில் வரும் இந்தக் கொட்டைகள் மினுக்கமான கறுப்பும் சற்றே தட்டையும் நீண்ட வட்டிப்பும் ஆறிலொருபங்கு இஞ்சு நீளமுமாய் ஒரு தலைப்பிற் கூர்கொண்டு கைப்புச் சுவையுள்ளதாயிருக்கும்.

ஆவிரை. *Cassia auriculata*. இந்துவுக்குரிய இந்தப் பூண்டின் கொட்டைகள் கருங்காணத்தைப் போலக் கண்ணோவுக்கு இட நல்ல மருந்தாகும். கடுமையல்லாத கண்ணோவுக்கு இவைகள் உவந்தவை களென்பது கொர்க் பதிரிக்கு வைத்தியரது எண்ணம். இவைகள் அழுத்தமும் தட்டையுமான கொட்டைகள். மூன்று முனைகொண்ட வட்டிப்பும் மழுங்கிய துனியுமுள்ளன. நிறம் சில கருஞ்சிவப்பு; சில கரும்பச்சை. இவை மணம் சுவையற்றவைகள். பட்டை கடுங் கயருள்ளது. கார்கில்கள்¹³எனீமங்கள்¹⁴ முதலிய பிரயோகங்களில் ஒக்பட்டைக்குப்¹⁵ பதிலாக இதை வழங்கிறோமென்றும் பிறதேசத்தால் ஏற்றிவரும் ஒக்பட்டைக்கு இது பதிலாகுமென்றும் கொர்க் பதிரிக்கு வைத்தியர் சொல்லுகிறார். கொட்டை பட்டை இரண்டையும் இன்னுஞ் சோதிக்கவேண்டும். இதுவின் சில பகுதிகளில் துவைத்த ஆவிரைப்பட்டையோடுதண்ணீர் கலந்த சர்க்கரைப்பாணிசேர்த்து, நொதிக்கவைத்து, ஒருவகையான சீது நீர்¹⁶ செய்வார்கள்.

1 Tincture. 2 Senna. 3 Extract. 4 Extract of Colocynth. 5 Cassia sophora.

6 Cassia occidentalis. 7 Cassia tora. 8 Agate grandiflora. 9 Tonic, ஒசுதி.

10 Purulent ophthalmia. 11 Catarrhal ophthalmia. 12 Granular lid.

13 Gargle. 14 Enema. 15 Oak-bark. 16 Spirituous liquor.

வத்தேக்கு. Sappan Wood. இது சென்னை மலையாளத்தின் சோலைகளில் நிற்கும் மரம். இதின் சிராய் சாயத்துக்கு வழங்கப்பட்டாலும், தனிக்கமில்¹, கலிக்கமில்ங்க²ளை அதிகமாய் அடக்கி யிருப்பதால் நயந்த கயரென்றும் எமதக்கில³சிராய்க்குப் பதிலாகுமென்றும் வங்காள வாகடங் கூறுகின்றது. எமதக்கில வெசிருத்து⁴ச் செய் முறையை ப்போல இதிலும் எசிருத்துச் செய்யலாம். இதின் தேயம், பத்துமுதற் பதினைந்து கிறேன், நாள் இரண்டு மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம்.

சூமக்கு. American Sumach. இது எதிர் பூமியிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்டும் இப்போ இந்துவிற்கு உரித்தாய்விட்டது. கோதுகளில் அதிக அளவான தனின்⁵ அடங்கியிருக்கும். கோதில் 100 க்கு 60 முதல் 65 பங்கு அசுத்த தனிக்கமில்மாயும் மிச்சப் பங்கு தும்புகளும், அமைலமும்⁶, பிசினுமாகவும் இருக்கும். காய்ந்த கொட்டை நீங்கிய நெற்றின் தூள், வெண்மஞ்சள்நிறம். சுத்த கயர்ச்சுவையுடையது. விபாபாரத்தில் வரும் தனினுக்கு மெத்தச் சரியானது. காணிஷ் வைத்தியர் இந்தத் தூளை அந்திபிராடி⁷யாக முறைச்சுரக்காரர் தொண்ணூற்றுநாலு பேருக்கு நாற்பது கிறேன் துவங்கி அறுபது கிறேன் வரைக்குக் கொடுத்தார். அவர்களில் அனேகருக்குக் காய்ச்சல் கடுமையாயிருந்தும் இந்த மருந்தால் மெத்த நயங்கண்டது. இந்தக் கொட்டை நீங்கிய நெற்றின் கஷாயம்⁸ இரத்தஞ் சிந்தும் மூலமுளைகளுக்குப் புகட்ட நல்லதென்று அஸ்வல்டி வைத்தியர் சொல்லுகிறார். கயராகவும் அந்திபிராடியாகவும் இந்தச் சரக்கை இன்னுஞ் சோதிப்பது நல்லது.

புங்கமரம். Pongamia Glabra. இம் மரம் இந்துவின் அனேகவிடங்களிலுள்ளது. இதின் கொட்டையிலிருந்து ஓர் எண்ணெய் பிழிந்தெடுக்கப்பட்டும். இதைச் சிரங்கு ஏர்பிசு¹⁰முதலான குட்டைக்கரப்பனுக்கும் மற்றுஞ் சரும நோய்களுக்கும் பூச்சு மருந்தாய்ச் சுதேச பதார்த்தசாரம் விதந்து பேசுகின்றது. இந்த நோய்களுக்கு இதைவிட நயந்த மருந்து தாவரவகைகளில் இல்லையென்று கிப்சன் வைத்தியர் சொல்லுகிறார். வாதத்துக்குப் பூச்சாகவும் இந்த எண்ணெய் அதிகமாய் வழங்கப்பட்டும். இதின் இலட்சணங்களைப் பற்றிச் சில குறிப்புகளை குடோசு வைத்தியர் எழுதியிருக்கிறார்.

முருக்கு. Butea frondosa. இந்த மரத்தின் கொட்டைகளை அந்தெல்மிந்தி¹¹ யென்றுவிசேஷமாய் மகமதிய வைத்தியர் மெத்தப் பாராட்டுகிறார்கள். கடையில் வரும் இக் கொட்டை கருஞ்சிவப்புநிறமும் ஒன்றேகால்முதல் ஒன்றேமுக்கால் இஞ்சு நீளமுமாய் மெல்லிதம் தட்டையும் வட்டிப்புமாயிருக்கும். சுவை மணம் ஏறக்குறைய இல்லை. கொஞ்சக் காலத்துக்கு முன் இறந்த பறலர் வைத்தியர் இத்தன்மையில் இதின் நயத்தைப்பற்றி மெத்தச் சார்பாய்ப் பெசியிருக்கிறார். இதைச் சோதித்துப் பார்த்த வைத்திய உத்தியோகஸ்தர் எழுதின எழுத்துக்களும் இதை உறுதிப்படுத்தின. இதிலே மெத்தப் பரீட்சையுள்ள அஸ்வல்டி வைத்தியர் இக் கொட்டைகளைத் தண்ணீரில் ஊறவைத்து ஒடுகளைக் கவனமாய் உடைத்துப்போட்டுப் பருப்பைக் காயவைத்து மாவாக்கிக்கொடுக்கும்படி சொல்லுகிறார். இந்த மாவை இருபது கிறேன் தேயமாக மூன்றுநாளைக்கு நாள் மூன்றுமுறையாகக் கொடுத்து நாலாம் நாளில் ஆமணக்கெண்ணெய் ஒருதேயம் கொடுக்கவேணும். இப்

1 Tannic acid. 2 Gallic acid. 3 Hematoxylum. 4 Extract. 5 Tannin. 6 Amylum or starch. 7 Antiperiodic. 8 Decoction. 9 Piles. 10 Herpes. 11 Anthelmintic.

படிக்கொடுத்த ஒரு ஆளில் 125 கீரைப்பாம்பு விழுந்ததென்றும் இன்னொரு ஆளில் எழுபது ஏண்பது விழுந்ததென்றும் அஸ்வல்டி வைத்தியர் சொல்லுகிறார். கிருமியைக் கொல்லுஞ் செயலைக் காட்டாத வேளைகளில் இது பேதமருந்துபோலாகும். இதன்றிப் பெருந்தேயத்தில் இது வாந்திக்கக்கூடியதென்று கீஸ் வைத்தியரும் பிருக்கங்¹களை அழற்றக்கூடியதென்று சிமிது வைத்தியரும் சொல்லுகிறார்கள். இந்த அவக்குணங்களினிமித்தம் இதைத் தாறுமாராய்க் கொடாதபடி பள்ளியாண்டி வைத்தியர் எச்சரித்திருப்பதுசரி. இந்தத் தூள் கிருமிகளைக் கொல்லுமென்பதற்குச் சந்தேகமில்லை. இதைப் பதனமாய் வழங்குமுறையைப் பற்றி இன்னுமறியவேணும். கொட்டையை இடித்துப் பசையாக்கிப் பூசுதல் படர்தேம²லுக்குச் சிலவேளை நயமாகுமென்று அஸ்வல்டி வைத்தியர் சொல்லுகிறார்.

காக்கணங்கோடி. *Clitorea ternatea*. சிறப்பான இந்த ஏறு கொடியின் கொட்டைகளுக்கு பேதிக்குந் தன்மையுண்டு என்கிறார்கள். உறுத்த கொட்டையைத் தூளாக்கித் திரும் தேயமாகக் கொடுத்துச் செவ்வையாய்ப் பேதித்ததாகச் சாற்று வைத்தியர் சொல்லியிருக்கிறார். திமக்கு வைத்தியரும் இவ்வித சாட்சிசொல்லுகிறார். இதை இரண்டுமடங்கனவான பதாசியமிலதாத்தர³சோடு கலந்துகொடுத்தல் நலமென்று இந்த இரண்டுபேருஞ் சொல்லுகிறார்கள். இதின் செயல் இலகுவும் விக்கினமற்றது மாய்த் தோற்றுகின்றது. இந்துவின் எப்பகுதியிலும் இதைச் சொற்பசெலவோடு சம்பாதிக்கலாமாகையால் இன்னும் ஆராய்வது நல்லது. இதின்வோர்ப்பட்டையைக் கஷாயமாக்கி இரண்டொரு திரும் தேயத்தில் குடித்தால் சலப்பை⁴ சலபாதை⁵யின் அழற்சிக்குச் சாந்தியாகுமென்று முடின்செறீவென்பவர் தமது சொந்த அனுபவத்திலிருந்து மெத்த விதந்துபேசுகிறார். அத்தோடு அமுரிதியோகவும் சிலவேளைகளில் இளம்பேதியாகவும் இதுசேஷ்டிக்கும். இதின் பூக்களின் சிறுபம்⁷ வாய்ப்பான நிறப்பதார்த்தமாகுமென்று ஹேன்ஸ் வைத்தியர் சொல்லுகிறார்.

கிசாரிப்பூண்டு. *Lathyrus Sativus*. இது வடக்கிந்துவிலிருக்கும் ஓர் பூடு. இதின் விதையை வழக்கமாய்ச் சாப்பிட்டிவரச் சிலவேளை கால்கள் சோரும். வங்காளத்தைச் சேர்ந்த ஓர் சில்லாவில் குடிசனங்களுள் ஏறக்குறைய நூற்றுக்கு நாலுபேர் வீதமாய் இச்சோர்பினால் வருந்தினார்கள். இக்குணத்தைப்பற்றி வியப்பான காரியங்களை ஏர்விங், கின்லக் கேர்க்கு வைத்தியர்கள் அறிந்தெழுதியிருக்கிறார்கள்.

கடலை. *Cicer arietinum*. இந்துவடங்களும் இந்தப் பூடு அதிகமாய்ச் செய்கைபண்ணப்படும். இதின் கொட்டைகள் மாடு முதலிய மிருகங்களுக்குத் தீனாகும். அடிக்கொப்புகள் இ⁹லகள் முதலிய பகுதிகளிலுள்ள மயிர்களிலிருந்து புளிப்பான ஓர் நீர் வடியும். இந்த நீரிலே அக்சலிக்கமில⁹மும், அசிதிக்¹⁰கமிலமும் ஒருவேளை மலிக்¹¹கமிலமும் அடங்கியிருக்கும். இந்தப் பூண்டுக்கே உரிய இன்னொரு அமிலமும் இதில் இருக்கிறதென்று திஸ்பன் சொல்லுகிறார். இந்த அமிலத்தையும் இதின் உபயோகங்களையும் இதைச் சேர்க்கும் வகையையும் பற்றிய குறிப்புகள், கிரிஸ்தி, ஹேன், ஏன்ஸ்லி, திரே என்ற வைத்தியர்களாற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இது காய்ச்

1 Kidney. 2 Ringworm. 3 Acid tartrate of potash. 4 Bladder. 5 Urethra.

6 Diuretic. திடிந்சம். 7 Syrup. 8 Kisari. 9 Oxalic acid. 10 Acetic,

11 Malic.

சல் முதலியவற்றுக்குக் குளிர்மையான மருந்தென்று ஈதேசிகளால் வழங்கப்படும். இந்நோக்கத்துக்கு இது நயமாயிருக்கக்கூடும். இது தெக்கணத்துப் போட்டுக்கீசரால் திஸ்மெனுரீய¹த்துக்கு வேது மருந்தாக வழங்கப்படும். பச்சைப் பூண்டு போடப்பட்ட கொதி வெந்நீர் மேல் நோயாளியை நன்றாய்ப் போர்த்து இருத்துவார்கள். காடி²யிட்டு வேது விடுவதில் இது இன்னொரு முறையென்று வால்கர் வைத்தியர் சொல்லுகிறார்.

அல்காகி மரோரம். Alhagi Maurorum. இது ஆபிரிகம், மேற்காசியத்தின் காடுகளுக்குரிய ஓர் செடி. இது வடக்கிந்துவிலும் தெக்கணத்திலும் உண்டு. இதின் தண்டுகளிலிருந்து இனிப்பான பாணியாகிய ஓர்வகை மன்னா பொசியும். இது அவ் மன்னா³வின் அவுஷத தன்மைகளை உடைய தென்கிரார்கள். இலை காம்பு முதலிய அசுத்தங்களோடு கலந்த கருஞ் சிவப்பான சிறுச்சிறு வாலுண்டை⁴களாக இது வரும். இது உண்டாகும் வகை சேர்க்கும்வகையைப்பற்றி நயந்த சில குறிப்புகளை ரூபறன் என்பவர் பிரசுரப்படுத்தியிருக்கிறார். ஆயினும் மருந்தாக இதின் செயலைப்பற்றி அவைகளில் விளங்கிக்கொள்ளக்கூடியது சொற்பம். நாமறிந்த வரையில் இது விசேஷமான சரக்கல்ல.

ரோசாசியங்கள்.

ROSACEAE.

செவ்வுரோசை. RED ROSE.

வாசம். தென்யுரோபம். இது தோட்டங்களில் எங்குமுண்டாக்கப்படும்.

வாகடபகுதி. மலராத பூவின் காய்ந்த இதழ்கள். நிறம் நேர்த்தியான நீலச் சிவப்பு. காய்ந்தபிறகும் இந்த நிறம் நிற்கும். சுவை கைப்பும் சற்றே புளிப்பும் துவருமானது. வாசனை மிகுந்திருக்கும். பூக் காய, வாசனை வீசும்.

தன்மை உபயோகங்கள். சொற்ப தொணிக்⁵முந் துவருமானது. விசேஷமாய்ப் பின் வரும் முறை இரண்டில் மருந்துகளுக்கு அனுபானமாய் வழங்கப்படும்.

ரசிதங்கள். ரோசையமீலவின்லுசம். Acid Infusion of Roses. கொள். செவ்வுரோசையிதழ்கள், தாளாக்கி, கால்அன்சு; கிருச சல்வுரிக்கமிலம்⁶ ஒரு திரும்; கொதிவெந்நீர் பத்து அன்சு. அமிலத்தைத் தண்ணீரோடு கலந்து, ரோசை இதழ்களையிட்டு அவற்றை மூடிய பாத்திரத்தில் அரைமணிநேர மூறவிட்டு சீலையிற் தெளிக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு. லவண விரேசனங்கள், கினியம் முதலிய மருந்துகளுக்கு இது நல்ல அனுபானம்.

ரோசைலேசியம். Confection of Roses. கொள். செவ்வுரோசை இதழ்கள், ஒரு இரூத்தல்; சுத்த சர்க்கரை முன்று இரூத்தல். உடன் கொய்த

1 Dysmenorrhoea 2 Vinegar. 3 Ash-manna. 4 Tears, 5 Tonic, 6 Diluted Sulphuric acid.

செவ்வரோசை இதழ்களைக் கல்லுரலில் துவைத்துக் களியாக்கிச் சர்க்கரையையுஞ் சேர்த்து நன்றாயரைத்துக்கொள்ளவும்.

தேயம். ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திரும் வரைக்குச் சொற்ப துவராகும். குளிகைகள், லேகியங்கள் செய்வதில் யான¹மாய் இதைச் சேர்ப்பதன்றித் தனிய கொடுப்பதரிது. இரசகுளிகை²யிலும் மற்றும் வாகடக்குளிகைகளிலும் இது சேருகின்றது.

நாயுரோசை. DOG ROSE.

வாசம். இது யுரோபத்திலும் மற்றும் மத்திமோஷ்டண பூமிப்பகுதிகளிலும் வேலியருகில் நிற்கும்.

வாகடபகுதி. கனிந்தபழம். இது ஒரு இஞ்சு அல்லது அதற்குக் கூடின நீளமும், அண்ட வடிவம் நல்ல சிவப்புநிறமும் அழுத்தமும் மினுக்கமுமானது. சற்றே புளிப்புள்ள இனிய நஞ்சுவையுடையது.

தன்மைகள், உபயோகங்கள். பின் வரும் லேகியத்தில் இது ஓர் கூறாவதினால் மாத்திரம் இது வாகடத்துக்குரியதாகின்றது. இவ்வினிலேகியம் பல முறையும் எவ்வகையான லேகியத்துக்கும் குளிகைக்கு எத்தனமான திரள்களுக்கும் தாரக³மாக வழங்கப்படும்.

ரசிதம். நாயுரோசைலேகியம். Confection of Dog rose, கொள். நாயுரோசைக்கனி, கொட்டைகள் நீக்கி, ஒரு இராத்தல்; சுத்த சர்க்கரை இரண்டு இராத்தல். கனிகளைக் குழியம்மியில் நசித்தரைத்து, அரிப்பெட்டியில் அரித்துச் சர்க்கரையையுங் கூட்டி நன்றாய்ச் சேர்க்கவும்.

நூறல்லிரோசை. CENTIFOL ROSE.

வாசம். இது பூமியடங்கலும் தோட்டங்களிற் செய்கைபண்ணப்படும்.

வாகடபகுதி. நன்றாய் மலர்ந்த பச்சை இதழ்கள்; இவைகள் இனிப்பும் கைப்பும் சற்றே துவருமான சுவையும் மெத்த வாசனையுமுடையவைகள். சுவையும் வாசனையும் லேசில் பிரிந்து தண்ணீரிற் சேரும்.

தன்மைகள், உபயோகங்கள். மெல்லிய பேதி. இவைகளிற் திஸ்திலிக்கும் நீரின் நிமித்தமாக மாத்திரம் இவை வாகடத்துக்குரித்தாகின்றன.

ரசிதங்கள். ரோசைநீர். Rose water. கொள். நூறல்லி ரோசையின் பச்சையான இதழ்கள், பத்து இராத்தல். அல்லது உப்புப்போட்டுப் பேணிவைத்த இதழ்களில் இதற்குச் சரிவந்த நிறை; தண்ணீர் இரண்டுகலன்⁵. இதைத் திஸ்திலித்து ஒரு கலன் எடுக்கவும். இது வாசனையுள்ளதாகையால் அதிகமாய் லோஷன்கள், கலூறியங்களுக்கு யானமாக வழங்கப்படும்.

ரோசைத்தேல். Attar of Rose. இது தமஸ்கு ரோசையிலிருந்து விசேஷமாய்த் துருக்கையிற் செய்யப்படும். காசிப்பூரிலுஞ் சொற்பஞ் செய்யப்படும். இது செய்யப்படும் விதத்தைப்பற்றியும் பிந்தின இடத்தில் ரோசை நீர் செய்யப்படும் விதத்தைப்பற்றியும் பூரணவிவரம் ஜாக்சன் வைத்தியராற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது, இத் தேவின் வாசனை வெருவாய்க் கமழுமாதலால் சிற்சில அன்கென்கள் பூச்சு மருந்துகளின் நாற்றத்தை மறைப்பதற்குத் தருந்தது.

1 Excipient 2 Mercurial pill. 3 Basis. 4 Distil. 5 Gallon. 6 Lotions.

7 Collyriums.

குசோ. KOUSSO.

வாசம். இது அபிசினிபா நாட்டிலுள்ளது.

வாகடபகுதி. காய்ந்த பூக்களும் துளிர்களும். பூக்கள் சிறுத்துக் கருஞ் சிவப்பு நிறமாய் மயிருள்ள தாஸ்கூளில் பொறுத்திருக்கும். கலிசின்¹ புறப்பங்கு ஐந்தாகப் பிரியும். ஒவ்வொரு பிரிவும் நீண்ட வட்டிப்பாயும் வலைப் பின்னல்போல் கூந்தல் ஓடியுமிருக்கும். நிலவாகையைப் போல் உவட்டிப்பும் சற்றே கார்ப்புமானது. இதில் ஓர் அத்திர எண்ணெய்²யும் கைப்புங் காரமுமான ராளமும்³, தனிணும்⁴ குசேன்⁵ என்ற ஓர் கிரிஸ்தற் சத்தும் அடங்கியிருக்கும்.

தன்மை. இது அந்தெல்மிந்தி⁶.

உபயோகம். தீனியப்புழு⁷வைக் கொல்வதற்குக் கைகண்ட மருந்து. புழுவைக் கழிப்பதற்கு, பிறகு ஓர் விரேசனங் கொடுக்கவேண்டும்.

தேயம். வளர்ந்தவர்களுக்கு அரை அன்சு கொடுக்கவும். ஏழு தொடுத்தப் பன்னிரண்டு வயதான பிள்ளைகளுக்கு இரண்டரைத் திராமும், மூன்று முதல் ஏழு வயதான பிள்ளைகளுக்கு இரண்டு திராமும், மூன்று வயதுக்கு டபட்ட பிள்ளைகளுக்கு ஒரு திராம் முதல் ஒன்றரைத் திராமுங் கொடுக்கவும். இதை இன்வூசு⁸ மாக்கியும் தேனோடு சேர்த்து லேகியமாக்கியுங் கொடுக்கலாம்.

ரசிதம். குசோவின்வூசம். Infusion of Koussou. கொள். குசோ பருக்கன்தாளாக அரை அன்சு; கொதிவெந்நீர் நாலு அன்சு. மூடிய பாத்திரத்திற் பதினைந்து மினி நேரத்துக்கு ஊறவைக்கவும்.

இவ்வளவும் வளர்ந்த ஒரு ஆளுக்கு ஒரு தேயமாகும். தானோடு தண்ணீர் முழுவதையும் ஒருமிக்க வெறுவயிற்றிற் குடிக்கவும், சிலமணி நேரத்தால் விரேசனம் சாப்பிடவும் வேணும்.

தேன் வாதுமை. SWEET ALMOND TREE.

கைப்பு வாதுமை. BITTER ALMOND TREE.

வாசம். இவை பாபெரி, சீரியம் என்னும் தேசங்களில் உண்டு. யுரோபத்திலும் மத்திம ஆசியத்திலும் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. 1 தேன் வாதுமைப் பருப்பு. இது ஏறக்குறைய ஒரு இஞ்சு நீளமானது; அயில் போற் கூருள்ளது. தெளிந்த, கறுவாப்போலக் கருஞ்சிவப்பு நிறமான, தோலுள்ளது. கார்ப்பற்ற இனிய வாசனையும் சுவையுமுடையது. தண்ணீர் விட்டுத் துவைக்கும் போது கைப்பு வாதுமையின் மணம் வீசாது. 2 கைப்பு வாதுமைப் பருப்பு. இது தோற்றத்திற் தேன் வாதுமைப் பருப்புப் போன்றது. ஆயினும் அதிலும் அகலமும் குறளுமானது. கைப்புச் சுவையுள்ளது. கொஞ்சத் தண்ணீர் சேர்த்தரைக்கும் போது தன் சொந்த மணத்தை வீசும்.

தன்மை உபயோகம். தேன் வாதுமை இமாலிய⁹மும் போஷணியுமா

1 Calyx. 2 Volatile oil. 3 Resin. 4 Tannin. 5 Kuoseine. 6 Anthelmintic, குமிகெரல்வி. 7 Taenia. 8 Infusion, 9 Emollient, எந்தனி.

கும். கைப்பு வாதுமை அதிலிருந்து பிழிந்தெடுக்கும் எண்ணெய்க்காக வா கடத்திற் சேர்க்கப்பட்டது.

ரசிதங்கள். வாதுமைக்கூட்டுச் சூரணம். Compound Powder of Almonds. கொள். தேன்வாதுமைப்பருப்பு, எட்டு அன்சு; சுத்தசர்க்கரை மா, காலு அன்சு; அகசிப்பிசின்மா¹ ஒரு அன்சு. வாதுமைப்பருப்பின் தோ லை இலகுவில் உரிக்கத்தக்கதாய் வருந்தனையும் அதை வெந்நீரிற் போடவும். தோல் நீக்கப்பட்டு வெண்மையாக்கினபின் மெல்லிய சீலையால் ஒற்றியுலர்த் தி குழியம்மியில் இட்டு மென் களியாகுந்தனையும் மெல்ல அரைக்கவும். பி சின் சர்க்கரை இரண்டையும் ஒன்றாகக் கலந்து வாதுமையோடு படிப்படி யாய்ச் சேர்த்து முழுவதையும் பருக்கன் சூரணமாய் அரைத்து நுகைவாய் அடைத்த சாடியில் இட்டுவைக்கவும்.

வாதுமைக்கலவை. Almond Mixture. கொள். வாதுமைக்கூட்டுச் சூரணம், இரண்டரை அன்சு; திஸ்திலித்த² நீர், அரைநாழி. சூரணத்துக் குச் சொற்ப தண்ணீர் விட்டு மெல்லிய பசையாக அரைத்துப் பிற்பாடு சே டுமான தண்ணீரையுஞ் சேர்த்து மெல்லிய புடைவையில் வடிக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு. எக்ஸ்பெக்துறங்கள்³ குளி ர்மையான லவண மருந்துகள் முதலியவற்றுக்கு இது நல்ல அனுபானம்.

வாதுமைத் தேலம். Almond oil. இது தேன் வாதுமைப் பருப்பை யாகுது கைப்பு வாதுமைப் பருப்பையாவது பிழிந்தெடுக்கும் எண்ணெய். இது வெண்மஞ்சள் நிறமுள்ளது. ஏறக்குறைய மண்மற்றது. அல்லது மண் மிருக்கில் வாதுமைக்குரியதாய்ச் சொற்பமானது. காரசாரமற்ற எண்ணெ ய்ச்சுவையுள்ளது.

இது இமாலிய⁴மும், இளம்பேதியுமாகும். வாகடத்துக்குரிய அன்கென் கன்⁵ சிலவற்றில் இது சேருகின்றது.

லாறுசெருசிமரம். CHERRY LAUREL.

வாசம். இது சின்ன ஆசியத்துக்குரியது. மத்திம யுரோபமடங்கலும் தோட்டங்களில் உண்டு.

வாகடபகுதி. இலை; அண்ட வடிவ அயிற்சாங்கமானது. ஐதான கரு க்குள்ளது. அடியிற் சிறுக் கணுக்களை உடையது. அழுத்தமும் மினுக்க மும் நல்ல பச்சை நிறமுமானது. பெலத்த காம்புள்ளது. கசக்கினாலொ ழிய மணம் வீசாது. கசக்கும்போது இனிய மணம் வீசும். இந்த மணம் விசேஷமாய் இலையின் அரும்புகளில் இருக்கும், சுவை கைப்புஞ் சுகந்த முஞ் சற்றே துவருமானது. இலையின் வீறு அதிலே ஐருசையனிக்கமிலத் தை⁶ ஓர் கூறுக அடக்கிய அத்திர எண்ணெய்⁷ யைச் சார்ந்தது. இந்த எண்ணெய், இலையிலே இயல்பாயிராமல் அவைகளைக் கசக்கி ஈரிப்பில் வைக்கும்போது பல சத்துக்கள் ஒன்றிலொன்று சேஷ்டிப்பதாலாக்கும் பிற க்கின்றது.

தன்மை. இது வீறுள்ளதாயினும் நிச்சயமற்ற செரதிவம்⁸. பெருந்தேய த்திற் கொடிய நஞ்சு. இலைகளைப்பார்க்க இலையரும்புகள் அதிகம் சத்துள் னவைகள்.

1 Gum Acacia. 2 Distilled. 3 Expectorant. 4 Emollient. 5 Unguent.
6 Hydrocyanic acid. 7 Volatile oil. 8 Sedative.

உபயோகம். சிராநோய்கள் ஸ்பசு²நோய்களுக்கு இது பிரயோகிக்கப்பட்டது. இதால் உண்டாகக் கூடிய நலமெல்லாம் கிருசுவருசையனிக்கமிலத்தால் விக்ஸினமின்றி நிச்சயமாய் உண்டாகக்கூடும் இந்த இலைகளைத் துவைத்து வேதனை தணிப்பதற்குச் சிலவேளை வெளியில் அணைப்பார்கள். ஆயினும் தோல் வழந்தப்பட்ட அல்லது புண்பட்ட பகுதிக்கு இட்டால் மோசமுண்டாகவுங் கூடும்.

தேயம். இலைமாவில் நாலு கிறேன் முதல் எட்டுக்கிறேன் கொடுக்கலாம். இதைக் கொடுப்பதரிது.

ரசிதங்கள். லாறுசெருசி நீர். Laurel water. கொள். பச்சையான லாறுசெருசியிலே, ஒரு இரூத்தல்; தண்ணீர் ஒன்றேகால் நாழி. இலைகளைத் துண்டித்து உரவில் இட்டு நசித்து அந்தத் தண்ணீரில் ஒருநாளைக்கு ஊறப்போடவும். பிற்பாடு அரைநாழி நீரைத் திஸ்திலி⁴த்து, வருவதைக் குலுக்கிக் கடுதாசியில் வடித்து அடைத்த சீசாவிற்பேணிவைக்கவும்.

தேயம். ஐந்து முதல் முப்பது துளி. இதிலே ஐருசையனிக்கமிலம் வித்தியாசமான அளவாய் அடங்கியிருக்குமாயைால் இதை அவதானமின்றி வழங்குவது மோசத்துக்கு இடமாகும்.

கிருசுவருசையனிக்கமிலம். Diluted Hydrocyanic acid. இது ஐகா நீ என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்படுவதாகிய ஐருசையனிக்கமிலமானது நிறைப்படி தூற்றுக்கு இரண்டு பங்கு வீதமாய்த் தண்ணீர்த் கரைந்திருக்கும் நீர்.

இதை லாறுசெருசியிலைகளைத் திஸ்திலித்தெடுக்கும் நீரிவிருந்தும் அவைகளின் அத்திரவெண்ணெய்யிலிருந்தும், கைப்புவாதுமையெண்ணெய்யிலிருந்தும் மற்றும் வாதுமைப்பருப்புகளிலிருந்தும் போமியங்க⁶ளின் கொட்டைகளிலிருந்தும் எடுக்கலாம். ஆயினும் மருந்துக்கு சல்வரிக்கமிலத்தோடு பதாசியபீதபுருசியசு⁷ தண்ணீரும் சேர்த்துத் திஸ்திலித்து இதை எடுப்பார்கள்.

லட்சணங்களும் சோதனைகளும். இது தனக்கே உரிய ஓர்வகை மணமுள்ள நிறமற்ற நீர். இதின் விசேஷகிரூவிதம்³ 0.997. விறம்ஸ் தாளிற் சிவப்புநிறம் சொற்பநேரம் நிற்கத்தக்கதாய், அதைச் சற்றே சிவப்பாக்கும். பிலாடினப்⁹ பாத்திரத்திலே இதிலொரு திரும்பை வறட்டினால் சேஷம் நில்லாது. அயசல்வசு¹⁰ நீர், அயபிரசல்வசு¹¹ நீர் இரண்டையுங் கலந்து அதிற் சொற்பத்தைக் கிருசுஐருசையனிக்கமிலத்தோடு சேர்த்துப் பிற்பாடு பதாசிரீருங்¹² கலந்து, கடைசியில் ஐருகுலோறிக்கமிலத்தாற்¹³ புளிப்பாக்கினால் புருசியநீல¹⁴மாகும். இந்த அமிலத்தைப் பாரிய குலோறிர¹⁵த்தோடு கலந்தால் அடையல் உண்டாகாது. வெள்ளி நீது¹⁶சோடு சேர்த்தாலோ கொதிக்குஞ் சாரதித்த¹⁷ நீதுரிக்கமிலத்தில்¹⁸ முற்றாய்க்கரையக்கூடிய வெண்ணடையல் வீழும். 270 கிறேனோடு, சோட நீர்¹⁹ சேர்த்து அல்கல²⁰யானபின் நிலைபரமான அடையல் உண்டாகத் துவங்குவதற்கு வெள்ளிநீதுரசின்பருமவிலய²¹

1 Nervous. 2 Spasmodic, கரு. 3 Dilute Hydrocyanic acid. 4 Distil.
5 Volatile oil. 6 Pomeae. 7 Yellow Prussiate of Potassium. 8 Specific gravity.
9 Platinum. 10 Sulphate of Iron. 11 Persulphate of Iron. 12 Liquor
potash. 13 Hydrochloric acid. 14 Prussian blue. 15 Chloride
of Barium. 16 Nitrate silver. 17 Concentrated. 18 Nitric acid.
19 Soda Water. 20 Alkali. 21 Volumetric solution.

னத்தில் 1000 கிறேன் அளவு சேர்க்கவேண்டும். இது சுய அமிலத்தில் நூற்றுக்கு இரண்டு பங்குக்குச் சரி.

ஏதென்பரு சிகிச்சா வாகடத்திற் சொல்லப்பட்ட ஐருசையனிக்கமிலத்தில் உள்ள வீதத்தில் அரைவாசிக்கு அதனமாய் இதில அமிலம் அடங்கியிருக்கின்றது. இது பெலனில், லண்டன், தபுளின் சிகிச்சா வாகடங்களிற் சொல்லப்பட்ட கிருசவைருசையனிக்கமிலத்துக்குச் சரியானது.

தன்மைகள். இது வீரூன செரதீவம்¹. அனுடைன்²; பருந்தேயத்திற் சீக் கரமான கொடிய நஞ்சு.

உபயோகங்கள். சுவாசக் குழற் சளிச்சவ்³வின் அழற்சியான கதார்⁴நிலைமைகளுக்கும் குக்கல்⁵ ஈன⁶ அஞ்சினபெக்துசு⁷ சுவாசப்பையின் ஸ்பசு⁸ நோய்கள் சிலவற்றுக்கும் பலமுறையுங் கொடுத்து நயங்கண்டது. சத்தியோடு கூடிய குண்மத்து⁹க்கும் குக்கித்தாபிதத்¹⁰துக்கும், குத்துக்கும் பைரோசிக்கும்¹¹ இது நல்லமருந்து. இதய நிபோஷத்துக்கு¹² விசேஷமாய் அது கடுமையான நெஞ்சியோடு கூடிநிற்கும்போது இது உவந்ததாய்க் கண்டது. மேலும், குவாதம்¹³, வாதம்¹⁴, சபல இரத்தப்பெருக்கு¹⁵, கொரியம்¹⁶, ஏர்ப்பு¹⁷ முதலியவற்றுக்கும் நயமாய்க்கண்டது. தோல் வியாதிகளின் அழற்சி வருத்தத்தைத் தணிப்பதற்குத் தண்ணீரிற் கலந்து லோஷ¹⁸னாகப் பூசப்படும். ஆயினும் தோல் வழந்திய பகுதிக்காவது இடம்படவாவது இதைப் பூசுவது மோசம்.

தேயம். இதில் இரண்டு முதல் எட்டுத் துளியைத் தண்ணீரிற் கலந்து கொடுக்கலாம். பூசுவதற்கு எட்டு அன்சு தண்ணீருக்கு கிருசவைருசையனிக்கமிலத்தில்¹⁹ ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திரும் கலந்துகொள்ளலாம்.

ரசிதம். ஐருசையனிக்கமில சுவசனம். Inhalation of Hydrocyanic acid. கொள். கிருசவைருசையனிக்கமிலம், பத்துமுதற் பதினைந்துதுளி; தண்ணீர் ஒரு திரும். ஏற்ற பாத்திரத்திற் கலந்து அதிற் கிளம்பும் ஆவியைச் சுவாசிக்கட்டும்.

புருணமரம். PRUNUS DOMESTICA. PLUM TREE.

வாசம். மத்திம தேசங்களடங்கலும் தோட்டங்களில் இது வளர்க்கப்படுகிறது.

வாகடபகுதி. புருணம்²⁰ என்ற பழவற்றல். இது ஏறக்குறைய ஒரு இஞ்சு நீளமும், முட்டை வடிவமும் திரைந்ததும் கறுப்பான நிறமும் இனிய சுவையுங் கொண்டது.

தன்மை உபயோகங்கள். இது திமல்சம்²¹, ஈகவிரேசனி. மருந்துக்குத் தனியே வழங்கப்படுவதரிது. இது லேகியங்க²²ளுக்கு இணக்கமான கல்ல அனுமருந்து. நிலவாகை லேகியத்தில் ஓர் கூறுகின்றது.

அவாகடச் சரக்கு. Non-Officinal.

தவிஞ்சு. Quince. இந்தச் சிறுமரம் தென் யுரோபந் தொடங்கி, பார்

1 Sedative. 2 Anodyne, 3 Mucous membrane. 4 Catarrh. 5 Whooping cough. 6 Asthma. 7 Angina Pectoris. 8 Spasmodic. 9 Dyspepsia.

10 Gastritis. 11 Pyrosis. 12 Hypertrophy. 13 Gout. 14 Rheumatism. 15 Active Haemorrhage. 16 Chorea 17 Tetanus.

18 Lotion, 19 Diluted Hydrocyanic acid. 20 Prunum,

21 Demulcent. 22 Confection.

சியத்திலும் இமயமலைப்பகுதி நேபாளம் வடக்கிந்துவின் மற்றும் பகுதிகளிலும் உண்டாகிறது. இதின் கொட்டை சடைகளில் வழக்கமாய் வரும். கால்இஞ்சு நீளமும், தட்டையும் நீண்ட வட்டிப்பும் செங்குப்பிலுள்ள முமாய் ஒரு தலைப்பிற் கூர்கொண்டிருக்கும். ஒரே பழத்துள் ஒவ்வொரு அறையிற் பத்துப் பதினைந்து கொட்டைகள் பெரும்பாலும் ஒருமிக்க ஒட்டிக் கொண்டிருக்கக் காணலாம். கொட்டைகளை வெந்நீரிற் போட அவைகளின் தோலில் ஓர்வகைப் பாணி பிடிக்கும். இதைச் சைதனின்² என்பார்கள். இந்தக் கொட்டைகள் திமல்சம்³ தொணிக்⁴மென்றும் உயிர்தருமருந்⁵ தென்றும் சிழக்குத்தேசமடங்கலும் மசமதியரால் மெத்த மதிக்கப்படுகின்றன. தாபிதத்⁶தோடு கூடிய திசெந்தெரி⁷க்கு இக்கொட்டைகளின் திகாத்தங்கொடுக்க மெத்த நயப்படுமென்று நூற்றன் பண்டிதர் சொல்லுகிறார். மலம் அழற்றாதபடிக்கு இதின் வருவழுப்பு சளிச்சவ்வை⁸ மூடிக் காத்துக்கொள்ளுகிறது போலும். கனுநீயநோய்க்கும்⁹ இது நல்ல திமல்சமாகக் காணப்பட்டது.

லேதிரூரியங்கள்.

LYTHRARICAE.

அவாகடச்சாக்குகள். Non-Officinal.

மருதோன்றி. *Lawsonia alba*. இது மத்திம இந்துவின் வறண்ட காடுகளிலுள்ள செடி. இதின் இலைகளுக்காக இது கீழ்த்தேசமடங்கலும் செய்கை பண்ணப்படும். நகங்களை நிறப்பித்தல் முதலியவற்றுக்காகச் சுதேசிகளுள் எக்குலத்தவர்களும் இதின் இலைகளை வழங்குவார்கள். அவுஷத தன்மைகளுக்காகவும் இவைகள் மதிக்கப்படும். பெர்தொலெற்று என்பவர் இவைகளிற்கலிக்கமில்¹⁰ இருக்கிறதாகக் கண்டிருக்கிறார். ஆகையால் துவர்மருந்தாக இவைகள் சற்றே பீரயோசன முள்ளவைகளா யிருக்கவேணும். இந்துக்களுக்குள்ளே பெரும்பாலும் உண்டாகும் “சால்எரிவு,, என்ற நோய்க்கு இது உத்தமமான பூச்சென்று அவர்கள் பாராட்டுவார்கள். வெகுநாளைக்கு மாறாமல்வின்ற ஒரு ஆளுக்கு இதாற் சுகமுண்டானதென்று கிறீர்சன் வைத்தியர் சொல்லுகிறார். வேறனேக மருந்துகளால் யாதொரு நயமுங் காணாதிருந்த சிலருக்கு இந்த மருந்தைப் பூச உண்டான எரிவினால் அவ்வேளைக்கு மெத்தச் சகாயமுண்டானதை வாறிங்கு பண்டிதர் பிரமதேசத்திலிருந்த போது கண்டார். பச்சைஇலைகளை காடி¹¹சேர்த்துப் பசையாக அரைத்து உள்ளங்காலுக்குப் பாப்பையாக அப்புவதே இதை வழங்கும் முறையாம். துவைத்த இலைகளை எரியுமிடத்துக்குப் பூசிப் பெலனாய்த் தேய்த்ததாற் சில நோயாளருக்கு அதிக சுகமுண்டானது. மற்றும் மருந்துகளைப் போல இதாலும் பெரும்பாலும் அவ்வேளைக்கன்றி மற்றும்படி சுகமுண்டாகாதிருக்கக்கூடும். நசிவுகள், சுளுக்குகள் மற்றும் ஊறுகளுக்குப் பெரும்

1 Reddish brown. 2 Cydonin. 3 Demulcent. சமகி. 4 Tonic. 5 Restorative, 6 Inflammation. 7 Dysentery. 8 Mucous membrane 9 Gonorrhoea. 10 Gallic acid. 11 Vinegar,

பாலும் இந்த இலைகளைத் துவைத்துப் பாப்பையாகக் கட்டுவார்கள். அல்லது இவ்விலைகளை அவித்து அக்கஷாயத்தில் தோய்த்துப் பிழிந்த சீலையை அணைப்பார்கள். இலைகள் பூக்களிற் செய்த ஓர் எசுரூத்து³ குஷ்டத்துக்குக் கொடுக்கப்படும்.

கல்லுருவி. *Ammannia Vesicatoria*. இப்பூண்டு இந்துவிலுள்ளது. இதின் இலைகள் மெத்தக் காரமானவைகள். கொப்புளங் கட்டும் மருந்தாகவே சுதேசிகள் இவைகளை அதிகமாய் வழங்குவார்கள். ஒஷானசி பண்டிதர் சோதித்துக் கண்டபடி இவைகளாற் கொப்புளங் கொள்வதற்குச் செல்லுநேரம் அதிகமாயும் வருத்தங் கடுமையாயுமிருப்பதால் இவைகளை வழங்குதல் சரியல்ல. கந்தாரிசை⁴ப்பார்க்க இவைகளாலுண்டாகும் வருத்தம் அதிகம். சேஷ்டிக்குங் கெதியிலும் நிச்சயத்திலும் இவைகள் கொடிமூலிக்குக் கீழ்மையானவைகள். இந்த இலைச்சாற்றை உள்ளுக்குக் கொடுத்துக் கடுமையான பிளிகை வியாதியைப் பரிகரிக்கும் ஒரு முறையை பலனாத போஸ் வைத்தியர் சொல்லியிருக்கிறார். ஆய்னும் இதாலுண்டாகும் வருத்தங் கொடியதென்றும் அந்நோய் மாறுவது சந்தேகம் என்றுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இது தகுந்த மருந்தாகத் தோன்றவில்லை.

கம்மேலிடியங்கள்.

II AMAMELIDEAE.

ஸ்தைராக்ஸ் பல்சமரம். STYRAX BALSAM TREE.

வாசம். சின்ன ஆசியம்.

வாகடபகுதி. பட்டையில் வடியும் ஓர் பல்சம்⁶. திட்டசீது⁷ கலந்து சீலையால் வடிக்க இது சுத்தமாகும். இது பூதஸ்தைரக்கசு⁸ என்னப்படும். இது சற்றே உருவொளியாய்க் கருமஞ்சன் நிறமும் இறுகின தேனின் தடிப்புங்கொண்டு வீருன நல்ல வாசனையும் சுகந்த⁹ சுவையுமுடைய பாணியான ராசமாகும். சோதனைக்குழு¹⁰லில் இட்டு ஆவிமத்திகத்¹¹திற் காய்ச்ச இது மெல்லதாகும். ஈரிப்பைக் கக்காது. பதாசிதுவிசுரோமசு¹² நீரும் சல்புரிக்மில¹³முங்கலந்து காய்ச்ச, இது பெஞ்சோலைரிதத்தின்¹⁴ மணம் வீசும். இதிலே ஸ்தைரல்¹⁵ என்ற ஓர் அத்திரஎண்ணெய்யும், ஸ்தைரசின்¹⁶ என்ற கிரிஸ்தலிக்கக்¹⁷கடிய சத்தம் சினுமிக்கமில¹⁸மும் அடங்கியிருக்கும்.

தன்மைகள். இது ஸ்திமுலம்¹⁹, எக்ஸ்பெக்துறம்²⁰.

உபயோகங்கள். இது காலிக புறங்கீது²¹ வயோதிகருக்கு உண்டாகும் காலிக இருமல், ஈனை இவைக்கு உவந்தது. கனுறீயம்²² லுகறீயத்துக்கும்²³ இவைபோன்ற நோய்களுக்கும் கபேவத்துக்குப் பதிலாக இது வழங்க

1 Poultice. 2 Fomentation. 3 Extract. 4 Cantharides. 5 Plumbago rosea, செப்புசெதிருமலம். 6 Balsam. 7 Rectified spirit. 8 Prepared styrax.

9 Aromatic. 10 Test tube. 11 Vapor bath. 12 Bichromate of potash.

13 Sulphuric acid. 14 Hydride of Benzoyl. 15 Styrol. 16 Sty-racine. 17 Crystallizable. 18 Cinnamic acid. 19 Stimulant.

20 Expectorant. 21 Chronic Bronchitis. 22 Gonorrhoea.

23 Leucorrhoea.

ப்பட்டிருக்கிறது. நாட்பட்ட கெட்ட புண்களுக்கு இது நல்ல ஸ்தி முலமாகும்.

தேயம். ஐந்து முதல் இருபது கிரேனைக் குளிகையாயாவது இமல் சமாயாவது கொடுக்கலாம்.

ரசிதங்கள். பூதஸ்தைரக்ஷ, சாம்பிராணிக் கூட்டிரஞ்ச²த்தில் ஒர்கூருகச் சேருகின்றது.

அவாகடச்சரக்கு. Non-Officinal.

நன்தாயுக்கு மரம். Liquidambar Altingia. இது யாவகத்திலுள்ள ஓர் பெரிய காட்டு மரம். தெனாசரிம் நாடுகளில் விசேஷமாய் மெர் குவிக்கு முப்பது மைல் தூரத்திலுள்ள பன்லோவிலும் இது உண்டு. பிரமதேசத்திலுள்ள ஸ்தைரக்ஸ் மரமும் இதுதான். இதிலிருந்து வாசனையுள்ள பல்சம்³போன்ற நீர் வடியும். இதில் இரண்டு வகையானவைகள் பிரமதேசத்திலுண்டு. ஒன்று தெளிந்தது, வாசனையுள்ளது, வெண்மஞ்சள் நிறமானது; பட்டையிற் கீற இது வடியும். மற்றது தடிப்புங் கருமையும் மங்கலும் தர்ப்பந்தின்⁴ மணமுமுள்ளது. அடி மரத்திற் துளைக்க, அடிமரத்தைச் சுற்றி நெருப்பாற் காய்ச்ச, இது வடியும். வாறிங்கு பண்டிதர் இந்த இரண்டு இனத்தின் மாதிரியெடுத்து சென்னை பட்டின மருந்துச் சரக்கு ஆராய்வோருக்கு, 1851 ம் ஆண்டு அனுப்பினார். மார்காற்றர் இதைக் கூறுபடுத்தி ஸ்தைரல்⁵ ப்போன்ற ஓர் அத்திரவண்ணெய்யும் ஸ்தைரசின்⁷ போன்ற ஓர் பதார்த்தமும் அதில் அடங்கியிருக்கக் கண்டார். ஆயினும் இவைகளின் கூட்டோ வித்தியாசமாயிருந்ததெனக் கண்டார். வாறிங்கு பண்டிதர் இதை எக்ஸ்பெக்து⁸மாகச் சோதித்துப்பார்த்தும் அதிற் திருத்தியான பேறு ஒன்றையுங் காணவில்லை. இது பிரயோசனமுள்ள மருந்துச் சரக்கல்லப்போற் தோற்றுகிறது.

கோம்பிரிதாசியங்கள்.

COMBRETACEAE.

அவாகடச்சரக்குகள். Non-Officinal.

தான்றிமரம். Belleric Myrobalans Tree. கடுமரம். Chebulic. Myrobalans Tree. இந்த இரண்டுமரங்களும் இந்துவின் காடுகளில் உண்டாகும். இவைகளின்கனிகளே தான்றிக்காயும் கடுக்காயுமாம். யுரோபவைத்தியத்தில் இவைகள் அறியப்படாதிருந்தாலும் இந்து பதார்த்தசாரத்தில் விதந்து பேசப்படுகின்றன. இந்த தூலைப் பிரசித்தஞ்செய்த வாறிங்கு பண்டிதர் கடுக்காயைச் சோதனைசெய்து பார்த்தார். ஆறு கடுக்காய் இடித்துச்செய்த திகாக்தம் குடிக்கக் கடுப்பு உவட்டு முதலிய அவக்குணங்களின்றி நாலு ஐந்து முறை திறமாயும் விக்கினமின்றியும் பேதித்ததென்று கண்டார். கொஞ்சக் கறுவாசேர்க்க இம்மருந்து சுவைகொள்ளும். இந்துவடங்களும் இந்தக் காய்கள் சொற்ப கிரயத்துக்குக் கிடைக்கும். மற்றும் பேதிமருந்துகள் கிடையா

1 Emulsion. 2 Compound Tincture of Benzoin. 3 Balsam. 4 Turpentine.
5 Styrol. 6 Volatile oil. 7 Styracine. 8 Expectorant.

தவேளைகளில் இம் மருந்தைக் கொடுக்கலாம். பேதித்தன்மையிருந்தாலும் துவர்ச்சத்து அதிகமாய் இவைகளிலுண்டு. இதினால் இவைகள் வேலைவித் தைகளில் உபயோகமாவதுமன்றி. லோஷன்¹, புகட்டல்² முதலிய மருந்துகளில் மாசக்காய்க்குப் பதிலாகும். இரத்தம்பாயும் மூலமுளைகளுக்கும் சில வகையான யோனிக் கழிச்சல்களுக்கும் கடுக்காயை அவித்துப்புகட்டுவது நல்லதென்று அஸ்வல்டு வைத்தியர் சொல்லுகிறார். கடுக்காய் முட்டைவடிவும் ஒருஇஞ்சு ஒன்றரை இஞ்சு நீளமுமானது. சில கீழ்த்தலைப்பில் ஒடுங்கியிருக்கும். நெடும்பாட்டுக்குத் தோற்றமற்ற வரைகளும் ஐந்து ஆறு பக்கங்களுமுள்ளவைகளாய் அழுத்தமான மஞ்சட் கபிலத் தோலையுடையது. தோலுக்குள்ளே துவரான சதையும் அதற்குள்ளே பருத்த முரணான ஒரே அறையுள்ள கொட்டையுமிருக்கும். இளம் கடுக்காய்களைக் கருங்கடுக்காயென்று முன்னோர் எழுதியிருக்கிறார்கள். இவைகள் சுருங்கிக் கறுத்திருக்கும். நீளம் மூன்றிலொரு பங்கு இஞ்சு முதல் முக்கால் இஞ்சுவரைக்கிருக்கும். ஒடிவு மினுங்கும். மெத்தத் துவரான சுவையுள்ளது. காலிகீசன் ராசா இவைகளுக்கு விசேசனத்தன்மையோடு காமினாட்³, தொணிக⁴த் தன்மைகளுமுண்டென்று எண்ணி இவற்றை மெத்தப் பாராட்டுகிறார். இத்தன்மையினிமித்தந் துவைனிங்கென்பவரும் இதை மெத்த நயந்து பேசி இவ்வளவு பிரயோசனமான மருந்து யுரோப தேசத்திற் பலவகையான பாண்டினோய்க்கு மெத்த அரிதாய் வழங்கப்படுவதையிட்டு ஆச்சரியப்படுகிறேன் என்கிறார். பிளிகை⁵ பருத்திருந்த ஒரு ஆளுக்கு இதால் நயங்கண்டதாகவும் அவர் சொல்லியிருக்கிறார். கடுவிலையில் ஏதோ ஒரு பூச்சி குற்றி இடம் முட்டைக்கு உறையான காயைக் கடுக்காய்ப் பூ என்பார்கள். இவைகளைத் துவரென்று சுதேசிகள் மெத்த மதிப்பார்கள். சில வருஷங்களுக்கு முன்னே திண்ணைவேலியிலிருந்த காணசு குரு, வாறிங்கு வைத்தியருக்கு இவைகளைப்பற்றி அறிவித்தார். அவர்தாமே இவைகளைச் சோதித்து சுதேசிகளுக்குண்டாகும் வயிற்றுக் கழிச்சல் கடுப்புகளிலும் விசேஷமாய்க் குழந்தைகளுக்குண்டாகும் கடுப்பிலும் இவைகளின் நயத்தைப்பற்றிப் பாராட்டுகிறார். இதின் தேயம் ஒரு வயசுக்குட்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு மும்மூன்று மணிக்கொருமுறை ஒரு கிறேன். அனேக பிள்ளைகளுக்கு இதாற் சுகமுண்டானதை அவர் கண்டோமென்று சொல்லுகிறார். தான்றிக்காயைப்பற்றி அதிகந் தெரியாது. சுதேசிகள் வாடிக்கையாய் அதின்பருப்பைத் தின்பார்கள். இப் பருப்பு வெறித்தன்மையுள்ளதென்று வங்காள சிகிச்சை நூலிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதிக அளவாய் உட்கொண்டால் மயக்கு நஞ்சுகளின் குணங்கள் இவைகளாலுண்டாகுமென்று ராடங்கு வைத்தியர் கண்ட நாலு உதாரணங்களால் விளங்குகின்றது. அந்த நாலுபேரில் ஒருவருக்கும் மரணம் வராவிட்டாலும் ஒவ்வொருவரிலுந்தோற்றின குணங்கள் பயங்கரமானவைகள். இதின் நெற்று வேலை வித்தைகளிற் கயராக அதிகமாய் வழங்கப்படும்.

இந்து வாதுமைக்கோட்டை. Terminalia Catappa. Indian Almond. இந்துதேசம் அடங்கலுஞ் செய்கைபண்ணப்படுகிற சிறப்பான வாதுமை மரத்தின் கொட்டைப் பருப்பிலிருந்து கார்ப்பற்ற எண்ணெய் நூற்றில் ஐம்பதுக்கு அதிகமான வீதமாய் வரும். இது சீமை வாதுமைஎண்ணெ

1 Lotion, தாவணி. 2 Injection. 3 Carminative, வாய்க்கனி. 4 Tonic, ஓசதி. 5 Spleen.

யைப்போலிருப்பதால் அதற்குப் பதிலாக வழங்கப்படலாம். இதைப் பற்றிச் சிமிதர் 1843 ம் ஆண்டு கவனித்தார். இதை வைத்திருக்க ஸ்திய ரின்¹ அதிகவீதமாய் இதில் அடைந்ததைக் கவனித்து வியப்பாய் எழுதியிருக்கிறார். சுதேசிகள் செய்யுமுறையாயெடுத்த எண்ணெய்யை நெடுக வைத்திருக்க அது கலங்கலாகும். இந்து வாதுமையின் பருப்பைச் சீமை வாதுமைப் பருப்புக்குப் பதிலாக வழங்கலாம். இதின் பட்டையிலும் துவருண்டு. கறுப்பு மருதமரத்²தின் பட்டையிலும் இத்தவர் அதிகமாயுண்டு. அதைத் திகாக்த³ மாக்கி அசத்துவக் கழிச்சலுக்கு⁴ உள்ளே கொடுப்பதும் அபலமான மந்தப் புண்களுக்கிடவதும் நல்லதென்று ரோசுவைத்தியர் எழுதியிருக்கிறார். துவைத்த பட்டை இரண்டு அன்சுக்குத் தண்ணீர் அரை நாழி வீதமாய் விட்டு அவித்த இத் திகாக்தத்தின் தேயம் நாள் முன்று தரம் இவ்விரண்டு அன்சு.

இரங்கூன் மல்லி. *Quisqualis Indica*. இது பிரமதேசம் மலாயநாடுகள் முதலிய இடங்களிலுள்ள படர்கொடி. இது இரங்கூன் மல்லியென்ற நாமத்துடன் இந்துதேசமடங்களும் தோட்டங்களிற் செய்கைபண்ணப்படும். இதின் பழம் ஏறக்குறைய ஒரு இஞ்சு நீளம்; நீள வட்டமானது; இரண்டு தலைப்பிலுங் கூரானது; தோற்றமான ஐந்து பக்கங்கள் உள்ளது. இதின் ஒடு மெல்லிதும் நொருங்கக்கூடியதும் சிறந்த கருஞ்சிவப்பு நிறமுமானது. அதற்குள்ளே எண்ணெயுள்ள பருப்பிருக்கும். மலாக்காய்ப் பகுதிகளில் இக்கொட்டைகள் அந்தெல்மிந்தி⁵யென்று வெருகாலம் பேர் பெற்றிருந்தன. இவைகள் இத்தன்மையுடையவைகளென்று சிங்கப்பூரி லிருந்த அக்சலி, காடன் என்பவர்கள் 1833 ம் ஆண்டு வெளியரங்கப்படுத்தினார்கள். இவைகளைப்பற்றி இவர்கள் சொன்ன சாட்சிகள் மெத்தப் பெலப்பானவைகள். இக்கொட்டைகளில் ஐந்து ஆறை அரைத்துத் தேனோடாவது இனிய பழக்களி⁶யோடாவதுசேர்த்து லேகியமாக்கிப் பிள்ளைகளுக்குக் கொடுக்கக் கீரைப்பாம்புகள் விழும். நாலு ஐந்து கொட்டைக்கு அதிகமாய்க் கொடுத்தால் வலி முதலிய அவக்குணங்கள் கிளம்பக்கூடுமென்று பூற்றன் என்பவர் சொல்லுகிறார். இவைகளின் பேரில் இன்னுஞ் சோதனைசெய்வது நல்லது.

மேர்தாசியங்கள்.

MYRTACEAE.



கயபுட்மரம், CAJUPUT TREE.

வரசம். இது மலாயநாட்டிலும் அதின் அயலான தீவுகளிலும் வட அவுஸ்திராலியத்திலும் உண்டாகும்.

1 Stearine. 2 Terminalia tomentosa. 3 Decoction, கஷாயம். 4 Atonic Diarrhoea. 5 Anthelmintic, குருமிகொல்லி 6 Jam.

வாகடபகுதி. இலைகளிற் திஸ்திவி¹க்கப்படும் எண்ணெய். இது கயபுட்டேல் எனப்படும். இது மெத்தச் சலனமுள்ள உருவொளியான நீர். வெளிநற் பச்சை நீலநிறமுடையது. வீரூன நற்கந்தமும், சுகந்த பூச்சுவையுங் கொண்டது. இதை ருசிக்க வாயிலே குளிரான உணர்ச்சி நிற்கும்.

தன்மைகள். இது செறியும்ஸ்திமுலம்², அந்திஸ்பசி³, சுவேதனி⁴; வெளியிற் பூச ருபிவாஷன்⁵.

உபயோகங்கள். சுரங்களின் பிற்காலுக்கும் அசத்துவ⁶வகைகளுக்கும் சோர்வுகள் வாதங்களுக்கும் சீவகரணங்கள் குன்றிய மற்று நோய்களுக்கு இது கொடுத்து நயங்கண்டது. இது வாந்திபேதிக்கு வியக்கப்பட்டும் சாட்சி போதாது. வாயுப் பொருமலோடுகூடிய வயிற்றுவலி, இரைப்பையிலுண்டாகும் வருத்தமான வலி, இஸ்தேரி⁷ முதலியவற்றுக்கும் இது உவந்தது. வாதம், துறல்சி⁸ வருத்தமான மற்றும் வெளிநோய்களுக்கும் சோர்வு முதலியவற்றுக்கும் இது நல்ல பூச்சு மருந்தாகும்.

தேயம். ஒரு துளி முதல் ஐந்து துளி.

நேர்வாள லினிமெனில்⁹ இது ஓர் கூறாகச் சேருகின்றது.

ரசிதம். கயபுட்சீது. Spirit of Cajuput. கொள். கயபுட்டெண்ணெய், ஒரு அன்சு; திட்ட சீது¹⁰ நாற்பத்தொன்பது அன்சு. கல.

தேயம். முப்பது துளி முதல் அறுபது துளி கொடுக்கலாம். 1864 ம் ஆண்டுப் பிறித்தனிச் சிகிச்சா வாகடத்திற் சொல்லப்பட்ட இந்தப் பெயருடைய மருந்துக்கு இது ஐந்திலொருபங்கு வீறுள்ளது.

இலவங்கமரம். கரம்புமரம். CLOVE TREE.

வாசம். இது மலாக்காயிலுண்டாகும். கிழக்கிந்து மேற்கிந்துவிலும் மோறிஷஸ், பூர்பன், சான்சிபாரிலும் செய்கைபண்ணப்படுகின்றது.

வாகடபகுதி. மலராத காய்ந்த பூமுக்கைகள். இவையே கரம்பு. இவை ஏறக்குறைய அரை இஞ்ச நீளமும், கருமை நிறமும், தசைப்பும் கனப்பு மாய்த்திரண்டு நீண்டு, நாலு அரும்புகளையும் ஒரு உண்டையையுந் தாங்கியிருக்கும். வீரூன சுகந்த மணமும் கைப்புங் காரசாரமுமான சுவையுமுள்ளது. நகத்தாற் கிள்ள எண்ணெய் கசியும், ஓர் அத்திரவெண்ணெய்¹¹ யும் கறியுவிவின¹² என்ற ராளம்¹³போன்ற கிரிஸ்தற்¹⁴பதார்த்தமுமே இதின் சத்துக்கள்.

தன்மைகள். இது சுகந்தமான ஸ்திமுலம்¹⁵, காமினதி¹⁶.

உபயோகம். மற்றும் மருந்துகளுக்குச் சுகந்தக் கூட்டாவதே இதின் பிரதான பிரயோகமாயினும் இதின் இன்வூசம் அல்லது அத்திரவெண்ணெய் அசத்துவகுன்ம¹⁷த்துக்கும் இரைப்பையழற்சி¹⁸க்கும் விசேஷமாய்க் கருப்பிணிகளின் வாந்திக்கும் உவப்பாகும்.

ரசிதங்கள். கரம்பின்வூசம். Infusion of Cloves. கொள். இடித்த

1 Distil. 2 Diffusible Stimulant. 3 Antispasmodic. 4 Diaphoretic. 5 Rubefacient. 6 Adynamic. 7 Hysteria. 8 Neuralgia. 9 Liniment of Croton.

10 Rectified spirit. 11 Volatile Oil. 12 Caryophyllin. 13 Resin.

14 Crystal. 15 Aromatic stimulant. 16 Carminative. 17 Atonic Dyspepsia. 18 Gastric Irritation.

கராம்பு, கால் அன்சு; கொதிவெந்நீர் பத்து அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் அரைமணிநேரமுறவிட்டுச் சீலையில் வடிக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் நாலு அன்சு கொடுக்கலாம்.

கராம்புத்தேலம். Oil of Cloves. கராம்பைத் திஸ்திலித்¹தெடுக்குமெண்ணெய். இது புதிதாயிருக்கையில் நிறமற்றது, பிறகோ, படிப்படியாய்க் கருஞ்சிவப்புநிறமடையும். கராம்புக்குரிய மணம், காரம் சுவை யாவுமிதற்குண்டு. தண்ணீரிற் தாழும்.

தேயம். இரண்டு துளிமுதல் ஆறு துளியைச் சர்க்கரையில் விட்டாவது இமல்ச²மாக்கியாவது கொடுக்கலாம். ஒருதுண்டு பருத்திப் பஞ்சை இதில் நனைத்து அடைசப் பற்கொதி பலமுறையும் சுகப்படும்.

கிரீத சுகந்த பற்பம்³ தோடங்குட்டின்வூசம்⁴ அயசுகந்த கலவை⁵ அவின்வைன்⁶ இவைகளிற் கராம்பு ஓர் கூறாகும். கலுசிந்துக் கூட்டுக்குளிகை⁷ கலுசிந்தயசீயமசுக்ரளிகை⁸ ஸ்கமுனிலேகியம்⁹ இவைகளிற் கராம்புத்தேல் ஓர் கூறாகச் சேருகின்றது.

பிமெந்தம். PIMENTO.

வாசம். இது மேற்கிந்துவிலும் தென்னமரிகத்தின் உஷ்டணபகுதியிலும் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. காய்ந்த சிறுக் காய்கள்; இவை சிறு மிளகளவு பருமையாய்க் கறுத்து அழுத்தமற்று, பற்களைத் தாங்கி, உள்ளே மஞ்சள் நிறமாய்க் கருமையான இரண்டு கொட்டைகளை அடச்சியிருக்கும். தன் மணமுஞ்சுவையுமுடையது, சுகந்தமுங் கார்ப்புங்கொண்டது. இவைகளின் சத்து ஓர் அத்திரஎண்ணெய்¹⁰யில் இருக்கும்.

தன்மைகள். சுகந்த ஸ்திமுலம்¹¹, காமினதி¹².

உபயோகம். மற்று மருந்துகளுக்குச் சுகந்த கூட்டாவதே இதின் பிரதான பிரயோகமாயினும் இதின் கஷாயம் அல்லது அத்திரஎண்ணெய் அசத்துவகுன்ம¹³த்துக்கும் இரைப்பையழற்சி¹⁴க்கும் விசேஷமாய்க் கருப்பிணிகளின் வார்திக்கும் உவப்பாகும்.

ரசிதங்கள். பிமெந்ததேல். Oil of Pimento. இது காய்களிலிருந்து திஸ்திலித்தெடுக்கப்படுவது. புதிதாயிருக்கையில் நிறமற்றது; அல்லது சொற்பஞ் சிவப்பு. காலஞ்செல்லக் கபிலநிற¹⁵மாகும். பிமெந்தத்தின் மணம் சுவையுடையது. தண்ணீரிற் தாழும்.

தேயம். ஒரு துளி முதல் ஐந்து துளி கொடுக்கலாம்.

பிமெந்த நீர். Pimento Water. கொள். இடித்த பிமெந்தம், பதினாலு அன்சு. தண்ணீர் இரண்டு கலன். திஸ்திலித்து ஒரு கலன் எடுக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு. மற்று மருந்துகளுக்கு இது நல்ல அனுபானம்.

ரம்னஸ் சிறுபத்¹⁶திற் பிமெந்தம் ஓர்கூறுகின்றது.

1 Distil. 2 Emulsion. 3 Aromatic powder of Chalk. 4 Compound Infusion of Orange, 5 Aromatic mixture of Iron. 6 Wine of opium. 7 Compound pill of Colocynth. 8 Colocynth and Hyoscyamus pill. 9 Confection of Scammony. 10 Volatile oil. 11 Stimulant. 12 Carminative. 13 Atonic Dyspepsia. 14 Gastric Irritation. 15 Brown. 16 Syrup of Rhamnus.

அவாகடச் சரக்குகள். Non-Officinal.

வேள்ளைக் கோய்யா மரம். White Guava Tree. இதின் பழம் சித்திப்பானது. இதின் பட்டை, விசேஷமாய் வேர்ப்பட்டை துவரானது. வேற்சுவைத்தியர் குழந்தைகளின் காலிக¹ கழிச்சலுக்கு இதைக் கொடுத்து மெத்த அனுசூலமடைந்தார். அவர் வேர்ப்பட்டையில் அரை அன்சுக்கு ஆறு அன்சு தண்ணீர் வீதமாக விட்டு மூன்று அன்சாய் வருந்தனையும் அவித்து, அதில் அரை அன்சு ஒரு அன்சு தேயமாக நாள் மூன்று நாலு முறை கொடுத்தார். பிள்ளைகளின் அபானப்பிதுக்கத்துக்கு இடுவதற்கும் இக்கஷாயம் நயந்ததென்று அவர் கண்டார். இந்தப் பட்டையின் கயர்த்தன்மையைப் பற்றிப் பராம், லூனன், ரைத்தர், ஒபிளேற் றாசுவீல்டு முதலிய பண்டிதர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள்.

சிவப்புக் கோய்யா மரம். Red Guava Tree. இதின் பட்டைக்கும் துவர்த்தன்மை இருந்தாலும் இது அவ்வளவாய் வழங்கப்படவில்லை. மோரீச தீவின் மாரக³ வார்திபேதியில், சிவப்புக்கோய்யா இலைத் திகாத்தம், சத்தி கழிச்சலைத் தடுப்பதற்குப் பெரும்பாலும் வழங்கப்பட்டதென்று போதன் என்பவர் சொல்லியிருக்கிறார்.

நாகம். Syzgium Jambolanum. இது இந்துவின் பல பகுதிகளில் உண்டாகும். இதின் பட்டைக்குத் துவர்த்தன்மை உண்டு. வங்காளத்திலே காலிககழிச்சலுக்கு இதின் திகாத்தம் அதிகமாய் வழங்கப்படும். இதன்பேரில் ராமசேண்போசுவைத்தியர் சொன்னதற்குச் சார்பாக பொகானத்போசுவைத்தியரும் சாட்சியிட்டிருக்கிறார். இதின் கனிந்த பழச்சாற்றிற் செய்த சிறுபம்⁴ நல்ல ஸ்தோமாகி⁵யென்றும் காலிக கழிச்சலுக்குத் திறமான துவராகச் சேஷ்டிக்கிறதென்றும், இவர் சாட்சியிட்டிருக்கிறார்.

கிறுதையங்கள்.

GRANATEAE.

மாதளைச்சேடி. POMEGRANATE TREE.

வாசம். இது வட ஆபிரிக்கத்திலும் மேற்காசியத்தில் மேற்கு இமயமலை வரையிலும் இருக்கும்.

வாகடபகுதி. 1 வேர்ப்பட்டை. இது வெளியில் நரை மஞ்சள் நிறமும் உள்ளே மஞ்சள் நிறமுமான துண்டுகள் அல்லது சுருள்களாக வரும், லேசாக ஒடியும். சொற்ப மணமும் துவரான சொற்ப கைப்புச்சுவையுமுடையது. 2 பழத்தின் காய்ந்த கோது. இது வன்மையும் அழுத்தமும்

1 Chronic. 2 Prolapsus anus. 3 Epidemic. 4 Syrup. 5 Stomachic.

ஒரு லீன்¹வரை தடிப்புமாய்ப் பல வடிவான குடைந்த துண்டுகளாக வரும. வெளியிற் செங்கபில நிறமும் உள்ளே மஞ்சள்நிறமுமுடையது; மணமற்றது; கைப்பான துவர்ச்சுவையுள்ளது. இக் கோதிலும் வேர்ப்பட்டையிலும் தனின் அதிகமாய் அடங்கியிருக்கும்.

தன்மை. வேர்ப்பட்டை அந்தெல்மிந்தி². பழத்தோல் துவர்.

உபயோகம். தீனியப் புழு³வைக் கொல்லுவதற்கு வேர்ப்பட்டைமெத்த நயந்தது. ஆயினும் இதற்கு விரேசனத் தன்மையில்லாதபடியால் செத்த புழுவைக் கழிப்பதற்கு ஓர் விரேசனத் தேவை. தியநீயத்⁴துக்கும் விசேஷமாய் இந்துக்களுக்கண்டாகுந் தியநீயத்துக்கும் திசந்தெரி⁵யின் பிறக்கூற்றுக்கும் துவர் மருந்து தேவையான மற்றும்நோய்களுக்கும் பழத்தோல் கொடுத்து நயங்கண்டது.

ரசிதங்கள். மாதளைவேர்த் திகாத்தம். Decoction of Pomegranate Root. கொள். பச்சையான மாதளைவேர்ப்பட்டை, நறுக்கி, இரண்டு அன்சு; தண்ணீர் ஒருநாழி. அரைநாழியாகுந்தனையுங் காய்ச்சிச் சீலையில் வடித்து தேவையானால் வடியின்மேலுள்ள சக்கையிலுந் தண்ணீர் வார்த்து வடித்தநீரை அரைநாழியாக்கிக்கொள்ளவும்.

தேயம். அந்தெல்மிந்தியாக இரண்டு அன்சு; வெறு வயிற்றிற் குடிக்கவேணும். இந்த அளவாக அரைமணிக்கொருமுறையாய் ஆறுமுறை குடித்தபின் ஓர் விரேசனங் குடிக்கவேணும்.

*மாதளங்கோதுத் திகாத்தம். Decoction of Pomegranate Rind. கொள். காய்ந்த மாதளங்கோது இடித்து, இரண்டு அன்சு; தண்ணீர் அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்தில் பதினைந்து மினி நேரம் அவித்து, வடித்து, வடித்தநீர் அரைநாழியாகப் போதிய அளவு தண்ணீரை வடியிலுள்ள சக்கையின்மேல் வார்த்துக்கொள்ளவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் ஒன்றரை அன்சு கொடுக்கலாம். கார்சில்⁶கள், புகட்டல்சள்⁷ முதலியவற்றுக்கு இது நல்ல துவர்மருந்து. கரம்புமுதலிய சுகந்தங்களைச் சேர்த்தால் நன்றாய்க் குடிச்சலாம். இந்துக்களுக்குண்டாகுங் கழிச்சலுக்கு அவினோடு கலந்துகொடுத்தால் மெத்த உவப்பாகும்.(36)

குகேபிதாசியங்கள்.

CUCURBITACEAE.

கலுசிந்து. COLOCYNTH PLANT.

வாசம். இது தென் யுரோபத்திலும், வட ஆபிரிகம், அரபி, இந்துவின் காடுகளிலும் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. தோலுரித்துக் கொட்டையெடுத்துக் காய்ந்த பழச்சதை. இது லேசு, சுபஞ்சு போன்றது, வெண்மஞ்சள் நிறமுங் கடுங் கைப்புமா

1 Line, 2 Anthelmintic, 3 Taenia, 4 Diarrhoea, கழிச்சல். 5 Dysentery.
6 Gargle, 7 Injection, 8 Aromatic.

(36) அனுபந்தம்பார்.

கலுசிந்தின்¹ என்ற கைப்பான ராளம்² போன்ற பதார்த்தமே இதின் சத்து.

தன்மை. இது ஓர் நீரடிக்கும் பேதி.

உபயோகம். மல வரட்சிக்கும், ஈரல், குடல்களின் கஞ்செஸ்தத்துக் கும், நீர்க்கோவை நோய்களுக்கும் விரேசனம் வேண்டியதான மற்று நோய்களுக்கும் இது பக்குவமான மருந்து. ஆயினும் இதைத் தனியே கொடுப்பதரிது. பின்வருங் கூட்டுகளில் ஒன்றே உத்தமம்.

தேயம். இரண்டு முதல் எட்டுக்கிறேன்.

ரசிதங்கள். கலுசிந்துக்கூட்டெச்சுறுத்து. Compound Extract of Colocynth. கொள். கலுசிந்துச் சதை, ஆறு அன்சு; சொகோத்திரசகை யெசுறுத்து⁴ பன்னிரண்டு அன்சு; ஸ்கமுனி ராளம்⁵ நாலு அன்சு; வன்சபு⁶ மாவாக, மூன்று அன்சு; ஏலம் மாவாக ஒரு அன்சு; புருவுசீது⁷ ஒரு கலன். கலுசிந்தைப் புருவுசீதில் நாலுநாள் ஊறவைத்துப் பிழிந்து, சீதைத் திஸ்தி வித்தகற்றினபின் சகையெசுறுத்து, சபு, ஸ்கமுனி மூன்றையுஞ்சேர்த்துக் குளிகைப்பதமாய் வரத்தக்கதாய் நீமத்தி⁸கத்தில் வறட்டிக் கடைசியாய் ஏலத்தைச் சேர்க்கவும்.(37)

தேயம். மூன்றுமுதற் பத்துக்கிறேன்.

கலுசிந்துக் கூட்டுக்குளிகை. Compound Pill of Colocynth, கொள். கலுசிந்துச்சதை, தூளாக ஒரு அன்சு; பபாடுசகை⁹, தூளாக இரண்டு அன்சு; ஸ்கமுனி¹⁰ தூளாக இரண்டு அன்சு; பதாசிசல்வசு¹¹ தூளாக கால் அன்சு; கரம்புத் தேல், இரண்டு திரும்; தண்ணீர் போதியது. தூள்கள் எல்லாவற்றையுங் கலந்து, கரம்புத்தேலையுஞ் சேர்த்து, தண்ணீர் விட்டரைத்துத் திரளையாக்கிக்கொள்ளவும்.

தேயம். ஐந்து கிறேன் முதற் பத்துக் கிறேன். இது விக்கினமில்லாத சுன்னாப்பான பேதி.

கலுசிந்தயசீயமசுக்குளிகை. Pill of Colocynth and Hyosecyamus. கொள். கலுசிந்துக் கூட்டுக்குளிகை, இரண்டு அன்சு; அயசீயமஸ் எசுறுத்து¹² ஒரு அன்சு. சரியாய்க் கலந்து திரளையாக்கிக்கொள்ளவும்.

தேயம். கலுசிந்துக் கூட்டுக்குளிகையின் பிரமாணமாய்க் கொடுக்கலாம் இதோடு சேர்ந்த அயசீயமசு இதின் அழற்சியைத் தணித்துச் சாந்தியாகும்.

எலதீரீக்கோடி. SQUIRTING CUCUMBER.

வாசம். மத்தித்தராத் தேசங்களில் உண்டாகிறது.

வாகடபகுதி. பிழிந்த பழச்சாற்றின் அடையல். இதுவே எலதீரியம்¹³ அல்லது எலதீரிய வெசுறுத்து எனப்படும். இது ஏறக்குறைய ஒரு லீன்¹⁴ தடிப்பும் பச்சை நரைநிறமும். கார்ப்பும் கைப்புமுடையதாய் நொருங்கக் கூடிய சற்றே வளைந்த லேசான வில்லகளாகவரும். நொருங்கினால் நுண்ணிய மாவாகும். அமிலங்கள்¹⁵பட நுரைக்காது. கொதிக்குந் திட்ட

1 Colocynthin. 2 Resin. 3 Congestion. 4 Extract of Socotrine Aloes.

5 Resin of Scammony. 6 Hard Soap. 7 Proof Spirit. 8 Water bath.

9 Barbadoes Aloes. 10 Scammony. 11 Sulphate of Potash. 12 Extract of Hyosecyamus. 13 Elaterium. 14 Line. 15 Acid.

(37) அனுபந்தம் பார்.

சீதில்¹ பாதியளவுக்குக் கரையும். இந்தக் கரைவைச் சாரதித்து² சூடான பதாசி³நீரோடு சேர்த்தால் ஆறும்போது நூற்றுக்கு இருபது பங்கு குறையாத அளவான எலதீரின்⁴ என்னுஞ் சத்து, நிறமற்ற கிரிஸ்தல்களாக விளையும். எலதீரின் நுண்ணிய வரியுள்ள பளபளப்பான பிரிசு⁵கிரிஸ்தல்களாக எடுக்கப்படும். இவை ரம்ப⁷ அடியுள்ளவைகள். பரமானுவில் நிறக்கும், மணமில்லை, கைப்பான காரச் சுவையுண்டு. மேலும் இதில் ஓர் ராஸ⁸மும் கைப்பான ஓர் சத்தும் அடங்கியிருக்கும்.

தன்மை. இது வீரூன நீரடிக்கும் பேதி.

உபயோகம். நீர்க்கோவை⁹ நோய்களுக்கு விசேஷமாய் இதய வியாதியோடு தொடுத்ததாயுண்டாகும் நீர்க்கோவைக்கு இது நயந்த மருந்து. அங்கவிகிர்தியிலும்¹⁰ மூளையின் மற்றுநோய்களிலும் இது குடலைச் சுத்திசெய்வதினால் மாத்திரமல்ல இரத்தோட்டத்தை அதிகரிக்கப் பண்ணுவதினாலும் உபயோகமாகும்.

தேயம். மாகாணிக் கிறேன் முதல் அரைக்கிறேன் வரைக்கும், பேதி காணுந்தனையும் நாலு மணிக்கொருமுறை கொடுக்கலாம். இதாலுண்டாகக் கூடிய முறுக்கு உவட்டைத் தடுப்பதற்குக் கொஞ்ச மிளகாய்த் தூளாவது அயசீயமசெசிறுத்¹¹தாவது சேர்த்துக் கொடுக்கலாம். எலதீரின் தேயம் மாகாணிக்கிறேன்; திட்டசீதிற் கரைத்துக் கொடுக்கப்படும்.

அவாகடச்சரக்குகள். Non-officinal.

காட்டுத்துமட்டி. *Cucumis trigonus*. மலைத்துமட்டி. *C. Hardwickii*. இவைகளுட் காட்டுத்துமட்டி மேற் கங்கையின் சமபூமியிலுண்டாகும். மற்றது மேற்கு இமயத்தின் அடிவாரத்திலுண்டாகும். வாகடக் கலுசிந்து¹²க்குரிய விரேசனத்தன்மை இவைக்குள்ளதாம். ஆயினும் இவ்வெண்ணம் சந்தேகமென்று கிப்சன் வைத்தியர் சொல்லுகிறார். இதை நிதானிப்பதற்குச் சோதனைகள் வேண்டும். இந்தப் பூண்டுகளின் வேர்த் திகாத்தம்¹³ விரேசனியாக வழங்கப்படுகிறதென்று நூற்றன் என்பவர் கூறுகிறார். பழத்தின் களியைப்பார்க்க இவ் வேரின்கெயல் லகுவென்றும் அழற்சி குறைவென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

கோம்புப்புடல். *Trichosanthes nervifolia*. *T. dioica*. இது தீனுக்காக இந்து அடங்கலுஞ் செய்கைபண்ணப்படும் ஓர் பூண்டு. இதின் காயிற் செய்த அலக்காலெசிறுத்து¹⁴ நல்ல பேதியென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதை மூன்று கிறேன் முதல் ஐந்து கிறேன் பிரமாணமாக மூன்று மணிக்கொருமுறை பேதியாகுந்தனையும் கொடுக்கவேண்டும். இதின் வேர்க்கிழங்கு எலதீரி¹⁵யத்தைப் போல நீரடிக்கும் பேதியாய்ச் சேஷ்டிக்குமென்றும் அதற்குத் பதிலாக இதை வழங்கலாமென்றும் கனிலல்லி என்பவர் சொல்லுகிறார். நீடித்த நோயால் வருந்தின உடம்புக்கு இந்தப் பூண்டு, பெலன்கொடுக்கக் கூடிய சுத்தக் கைப்பு என்றும், அவர் கூறுகிறார். பவுசெர் வைத்தியர் இதைத் தாமே சோதித்துப்பார்த்து இது ஓர் சுரக்கினி¹⁶யென்றும், தொணிகம்¹⁷ என்றும் கூறுகிறார். முற்காலத்து இந்துவைத்தியர் குஷ்டரோக¹⁸ பரிகரிப்புக்கு இதில் மெத்த நம்பிக்கைவைத்தார்கள்.

1 Rectified Spirit. 2 Concentrate. 3 Potash. 4 Elaterin. 5 Crystal. 6 Prism.

7 Rhombic. 8 Resin. 9 Dropsy. 10 Apoplexy. 11 Extract Hyoscyamus.

12 Colocynth. 13 Decoction. 14 Alcoholic Extract. 15 Elaterium.

16 Febrifuge. 17 Tonic, ஓசதி. 18 Leprosy.

கடாததீர்த்தசாந்திஸ்கோடி. *Trichosanthes Cordata*. கோரட்டை. *T. Palmata*. இவைகளுள் முந்தினதின் கிழங்கை கீழ்வங்காளத்தார் நல்ல தொணிகம் என்று பாராட்டுவார்கள். களும்புக்குப் பதிலாக இதையே வழங்குவார்கள். கோரட்டைப் பழத்தோலிற் கைச்சற்சுவையிருப்பதால் அதிலே தொணிக அல்லது விரேசனத்தன்மைகள் உண்டாவென்று நிதானிப்பதற்கு ஓஷானசியர் அதிலே சில சோதனைகள் செய்தார். ஆயினும் நாள் மூன்றுமுறையாய் மூன்று கிறேன் கொடுத்தபோதும் யாதொரு செயலுந் தோன்றவில்லை. இதின் பழம் நஞ்சென்றும் சாகங்களைக் கொல்லுவதற்கு வழங்கப்படுகின்றதென்றும் ரக்சபேகர் சொல்லுகிறார்.

ஆகாசகருடன். *Bryonia Epigaea*. இப்பூண்டு இந்துவின் பல பகுதிகளிலுமுள்ளது. இதின் பெரிய கிழங்குகள் பச்சையாயிருக்கையிற் தேணிப்புக் கிழங்கைப்போலிருக்கும். ஆயினும் இவைகள் அதிகம் கூரானவைகள். மிதந்த வளையமான வெண்மைப் புருவங்கள் இவைக்குண்டு. சுவை கைப்பும் வழுபுழும்பும் சொற்ப புளிப்புமுள்ளது. சுதேசிகள் இதை உச்சிதமான அல்திறவதொணிகமாக மதித்துச் சிவ்லிசு⁵ நோய்க்கும் திசந்தெரியின் பிற்கூற்றுக்குங் கொடுப்பார்கள். தெக்கண தேசத்தார் இதைப் பாம்புகடிக்கு நல்ல உள்மருந்தென்றும் வெளிமருந்தென்றும் மதிக்கிறார்கள். மைசூர் தேசத்தாரும் அவ்வாறு வழங்குகின்றார்களென்று பிதிபண்டிதர் 1861-ல் வாரிங்கு பண்டிதருக்குச் சாட்டினார். ஆயினும் இப்படி நயங்கண்டதற்குச் சாட்சியில்லை. புதுச்சேரியிலிருந்த விபீனர் இதிலே கைப்பும் மஞ்சள் நிறமுமான கிரிஸ்தற் பதார்த்தமிருந்ததாகக் கண்டார். இதின் கிழங்கிலே ஆராயப்படத் தகுந்ததன்மைகள் இருக்கின்றனவென்று என்ஸ்லியர் புத்தியாய்ச் சொல்லியிருக்கிறார்.

பூசணி. *Cucurbita Pepo*. இதின் கொட்டைகள் தீனியப் புழுவைக் கொல்ல நல்லதென்று அமரிக வைத்தியர் பலர் சாட்சியிட்டிருக்கிறார்கள். தோலுரித்த கொட்டையிற் இரண்டு அன்னை இமல்சு⁶மாக்கிக் காலமே வெறுவயிற்றிற் கொடுத்து இரண்டொரு மணி நேரத்தால் ஒரு தேயம் ஆமண்ச் கெண்ணெய் கொடுப்பதே முறை. கொட்டையிற் பிழிந்த எண்ணெய்யை அரை அன்சு தேயத்தில் இரண்டு மணிநேரத்துக்கொருமுறையாக இரண்டொருமுறை கொடுத்துப் பிற்பாடு ஓர் விரேசனங் கொடுப்பதும் சரியே. குளிர்மையான தேசங்களில் உண்டாக்கப்படும் பூசணிக் கொட்டைகளைப் பார்க்க உஷ்டண தேசங்களிலுள்ள பூசணியின் கொட்டைகள் திறமாகையால் இந்துதேசத்தில் இந்த மருந்தைச் சோதித்துப் பார்ப்பது நல்லது. பிரம் இந்து தேசங்களில் உண்டாக்கப்படும் பேர்ப்பூசணி⁸க் கொட்டையின் அந்தெல்மிந்தி⁹த் தன்மைக்குச் சார்பாக, ரீன் வைத்தியர் எழுதியிருக்கிறார். தேயம் அரை முதல் ஒரு அன்சு; சர்க்கரையோடாவது தேலேடாவது சேர்த்துக் கொடுக்கலாமென்று அவர் சொல்லுகிறார். தீனியப் புழுவுக்கே இது விசேஷமாய் நல்லதாகக் காணப்பட்டது. இதைக் கொடுத்துப் பத்துப் பன்னிரண்டு மணியின்பின் இப்புழு பெரும்பாலுங் கழலும்.

பேய்ப்பீர்க்கம். *Luffa amara*. இக்கொடியின் எப்பகுதியும் மிகக் கைப்பு. இது நல்ல கைப்பான தொணிகம்¹¹ என்றும், இதின் பச்சைத் தாளை அரைநாழி கொதிநீருக்கு இரண்டு திரும்வீதமாயிட்டு ஊறிய இன்

1 Calumba. 2 Turnip. 3 Alterative Tonic. 4 Syphilis. 5 Dysentery. 6 Crystal. 7 Emulsion, 8 Cucurbita Maxima. 9 Anthelmintic. 10 Taenia. 11 Tonic.

வூசத்தை¹ இரண்டொரு அன்சு தேயமாக நாள் மூன்று நாலுமுறை கொ
டுக்க நல்ல அமுரிதி²யாகுமென்று சிறீன் வைத்தயர் குறித்திருக்கிறார். நீது
ரைரு குலோறிக்கமில³த்தோடு இதை அவர் கலந்துகொடுத்து நச்சவாயுகா
ரணமாகப் பிளிகை⁴ ஈரல்⁵ பருத்துண்டாகும் நீர்க்கோவைக்கு இது உப
யோகமானதென்று கண்டார். இதின் பழத்துக்குக் கடுமையான விசேசன
வமனித்தன்மைகள் உண்டென்று ரக்ஸ்பேகர் சொல்லியும் இவர் அதைப்
பற்றி ஒன்றும் சொல்லவில்லை. பிளிகை நோய்களுக்கும் விசேஷமாய் நச்
சுக்காற்றினால் அந்த உறுப்புப் பருத்தலுக்கும் இது நல்ல மருந்தென்று திக
ன்சன் புகழுகிறார். இதாற் சுகப்பட்ட பேர்களையுங் குறித்திருக்கிறார். குழ
ங்தைகளுக்கு மேற்சொல்லிய இன்வூசத்தை ஒரு திரும் தேயமாக நாள்மூ
ன்றுநாலுமுறை கொடுக்கும்படி கற்பிக்கிறார்.

பபயாசியங்கள்.

PAPAYACEAE.

அவாகடச்சரக்குகள். Non-Officinal.

பப்பளிச்சேடி. Carica Papaya. Papaw tree. இது பூமியின் மேற்
குப் பாதிக்குரிய செடியாயினும் இப்போ பெயர்ச்சகப்பட்டு இந்து
விலும் மற்றும் உஷ்டண தேசங்களிலும் உண்டாகிறது. இதின் கா
யிலுள்ள பாலுக்கு அந்தெல்மிந்தித்⁶ தன்மையுண்டென்று பத்னேழாம்
நூற்றாண்டில் எண்ணிசு என்பவர் முதன்முதற் கவனித்தார். இந்து
வில் 1810 ம் ஆண்டு விளெமிங்குபண்டிதர் இதைக் கவனித்து இத்தன்மை
களுக்குச் சார்பாகக் கொசீனி என்பவர் கருத்தாய் எழுதியிருப்பவைகளிலி
ருந்து எடுத்துக் காட்டுகிறார். மேலும் இதற்கு உறுதியான அத்தாட்சி இச்
செலவு போதன் என்பவரார் காட்டப்பட்டது. இவைகளால் இதின் அந்
தெல்மிந்தித்தன்மை உண்மையென்று சரியாய் முடிவுகட்டலாம். இந்த
மருந்தை வழங்குபவர்கள் மொறீசிற் காலஞ்சென்ற வெமாச்சன் வைத்திய
ர் பிரயோகித்த முறையைக் கைக்கொள்வது நல்லது. அம்முறையாவது;
கொள்; பப்பளப்பால், தேன், வகைக்கு, அரை அன்சு; திறமாய்க் கலந்து பி
றகு கொதிவெநீர் ஒன்றரை இரண்டு அன்சு வரைக்குப் படிப்படியாய்ச்
சேர்த்து சூடு குறைந்தபின் ஒருமிக்கக் குடித்து, இரண்டு மணிநேரத்தின்பி
ன் ஒரு தேயம் ஆமணக்கெண்ணெயோடு போதிய எலுமிச்சஞ்சாறுவது,
வின்றாரியாவது சேர்த்துக் குடிக்கவும். தேவையாகில் இப்படி இரண்டு
நாள் அடுத்துக் குடிக்கலாம். இது வளர்ந்தோர்க்குப் பிரமாணம். ஏழுவ
யசுக்கும் பத்துவயசுக்குமிடையான பிள்ளைகளுக்கு இதில் அரைவாசியும்,
மூன்று வயசுக்குட்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு இதில் மூன்றத்தொரு பங்குங்
கொடுக்கலாம். இதால் வயிற்று முறுக்குண்டானால் சர்க்கரை சேர்த்துக்கு
டலுட் புகட்டத் தணியும். மேலே சொன்ன தேயம் சரியென்றெடுத்தா
ல் பாலை அந்தெல்மிந்தியாக இருபது துளிமுதல் அறுபது துளி தேயத்தில்
ஒஷானசியர் கொடுத்து யாதொரு பலனுங் காணாததற்கு நியாயம் அவர்

1 Infusion. 2 Diuretic. 3 Nitro-hydrochloric acid. 4 Spleen. 5 Liver.
6 Anthelmintic, கரும்கொல்லி.

தைப் போதியளவாய்க் கொடாததே. கீரைப் பாம்பை விழுத்துவதற்கு இது பிரதானமாய் வாய்க்கும். தீனியப்¹புழுவிலோ இது பிடிப்பதரிதாம். பாலுக்கன்றிக் கொட்டைகளுக்கும் அந்தெல்மிந்தித்தன்மை உண்டென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. கடுகு எலங்களைப் போல இதுவும் கார்ப்பான சுவையுள்ளது. ஆயினும் இதின் சித்தி நிச்சயமல்ல. இக்கொட்டைக்கு வீரூன எம்மெனசக்குத்² தன்மையுண்டென்ற நம்பிக்கை தென்னிந்தவிலுள்ள எக்குலத்துப் பெண்களுகளுள்ளும் அதிகமாயுண்டு. கொர்ப்பஸ்திரிஇதிற் கொஞ்சந் தின்றாலுங் கருவழிதல் நடக்குமென்று அவர்கள் சொல்வார்கள். இர்துதேச அறிவிப்புகள்³ அனேகத்தில் இந்த நம்பிக்கை குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இச்செடியின் பாலைக் கருப்பைவாயிற் பூசியே கருவை அழிப்பார்கள் என்றும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. பப்பளிச்செடியின் எம்மெனசக்குத் தன்மையைப்பற்றி அத்தாட்சிகள் இன்னுந் தேவை. வீறைப்பான இறைச்சியை மெதுவாக்குந் தன்மையும் பப்பளிச்சாற்றுக்கு உண்டென்று சொல்லுவார்கள். அதைக் கவனிப்பது இந்த நூலுக்கு உரியதல்ல. உகர், வைத்தர், தாவி, என்பவர்களும் இதன்பேரில் விரிவாய்ப் பேசியிருக்கிறார்கள். பின்னும் இதை ஆராய்வுசெய்வதே சரி.

உம்பெலீவிரங்கள்.

UMBELLIFERAE.

கறுவீப்பூடு. CARUM CARUI. CARAWAY PLANT.

வாசம். இது யுரோபம் மத்திம ஆசியம் அடங்கலும் பள்ளங்கள் புற்றா வைகளில் உண்டாகும். இமயத்தின் உயர்ந்த பகுதிகளிலும் மிகுதியாய் உண்டு.

வாகடபகுதி. கொட்டை. இது பெரும்பாலும் இரண்டு பாதிகளாகப் பிளக்கும். இவைகள் இரண்டு லீன்⁴ நீளமும் வளைவும் கபில⁵நிறமுமாய் இரு து⁶லப்பிலும் ஒடுங்கி, நீளப்பாட்டுக்கு ஒடிய வெண்மையான ஐந்து வரி களுள்வவைகளாயிருக்கும். நல்ல சுகந்த மணமும் கார்ப்பான சுவையுமுடையன. ஓர் அத்திர⁶ எண்ணெய்யே இதின் சத்து.

தன்மைகள். ஸ்தொமாகி⁷, காமினதி⁸.

உபயோகங்கள். வயிற்றில் வாயுப் பொருமலுக்கும், வாயுப்பொருமல் வலிக்கும், அசத்தவ⁹ குன்மத்துக்கும்¹⁰ வயிற்றில் முறுக்கு குத்துகளுக்கும் இது நல்லது.

அவின் லேகியம்¹¹, மிசுருலேகியம், அவின் கூட்டுச் சூரணம், எலக்கூட்டிரஞ்சம்¹², நிலவாலை¹³ஞ்சம், இவைகளில் இக்கொட்டை ஓர்கூருகச் சேருகின்றது.

ரசிதங்கள். Preparations. கறுவீத்தேல். Oil of Caraway. இது கறுவீக்கொட்டையிலிருந்து திஸ்திவிக்கப்படும்¹⁴ எண்ணெய். இது நிறமற்

1 Taenia. 2 Emmenagogue. 3 Report. 4 Line. 5 Brown. 6 Volatile. 7 Stomachic. 8 Carninative. 9 Atonic 10 Dyspepsia. 11 Confection of opium. 12 Compound Tincture of Cardamom. 13 Senna. 14 Distil.

றதாய் அல்லது வெண்மஞ்சள் நிறமாய்ச் சுகந்த மணமும் காரமான சுவையுமுடையதாயிருக்கும்.

தேயம். இரண்டு முதல் ஆறு துளியைச் சர்க்கரையில் விட்டாவது இமல்ச¹மாக்கியாவது கொடுக்கலாம். இது ஸகமுனிலேகியத்திலும்² பபாசுகைக்³ குளிகையிலுஞ் சேருகின்றது.

கறுவிநீர். Caraway Water. கொள். இடித்த கறுவிக் கொட்டை ஒரு இரூத்தல்; தண்ணீர் இரண்டு கலன். திஸ்திலித்து ஒருகலன் நீர் எடுக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு. இது நயந்த காமினதி⁴. விசேஷமாய்ப் பிள்ளைகளுக்கு உவந்தது. லவண்⁵ விரேசனங்கள் முதலிய வற்றுக்கு இதுநல்ல அனுபானம்.

சீமைச் சீரகம். Carum Nigrum. இதின் கொட்டை குளுவூரிவிருந்து இந்துவுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டிக் காமினதியாக வழங்கப்படுகின்றது. இது கறுவிக் கொட்டைக்கு வித்தியாசமானதாகத் தோற்றவில்லை.

*ஒமம். CARUM AJOWAN. OMUM PLANT.

வாசம். இது உஷ்டண ஆபிரிகத்தில் ஆதியாயுண்டானதுபோல. இந்துவில் அதிகமாய்ச் செய்கைபண்ணப்படும்.

வாகடபகுதி. கொட்டை. இது கால் இஞ்சு நீளமுள்ளதும் ஒடுங்கியதும் இரண்டுதலைப்பிலும் கூருமான நுண்ணிய உம்பலீர்க்⁶ கொட்டையாக வரும். லென்சாற்⁷ பார்த்தால் நுண்ணிய புடைப்புகள் பரவியிருக்கிறதாகக்காணும். மெத்தச் சுகந்தமானது. கசக்கும்போது வீரூன மணம் வீசும். சொற்ப கைப்புங் கடுங் கார்ப்புமான சுவையையுடையது. இதின் சத்து இதின் அத்திரி⁸தேலமே.

தன்மைகள். நல்ல ஸ்திமுலம்⁹, காமினதி, அந்திஸ்பசி¹⁰. (38)

உபயோகங்கள். வாயுப்பொருமல், வாயுக்குத்து, அசத்துவகுன்மம்¹¹, கழிச்சல்களுக்கு இது நல்ல மருந்து. இந்த நோய்களுக்கு மாத்திரமல்ல, வாந்திபேதிக்கும் நல்லதென்று பேர்பெற்றது. ஆயினும் வாந்திபேதிக்கு இது தாலுண்டாகக்கூடிய நயம் மெத்தச் சொற்பம்.

ரிசிதங்கள். Preparations. ஒமத்தேல். Oil of Omum. இது ஒமக் கொட்டையிலிருந்து திஸ்திலிக்கப்படும் எண்ணெய். புதிதாயிருக்கையில் நிறமில்ல; சுறுக்குச் சற்றே மஞ்சள்நிறமடையும். கொட்டையின் மணமும் உறைப்பும் கார்ப்புமான சுவையும் இதற்கும் உண்டு. இதின் விசேஷகிராவிதம்¹² ஏறக்குறைய 0.880.

தேயம். ஒரு துளி முதல் மூன்று துளியைச் சர்க்கரையில் விட்டாவது இமல்சமாக்கியாவது கொடுக்கலாம்.

ஒமநீர். Omum Water. கொள். இடித்த ஒமக் கொட்டை இருபது அன்சு; தண்ணீர் இரண்டுகலன். திஸ்திலித்து¹³ ஒரு கலன் சேர்க்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு. இது நல்ல காமினதி. ஆமணக்கெண்ணெய் முதலிய அரோசியமான மருந்துகளின் சுவையை மறைப்பதற்கும் அவைகளால் உண்டாகும் உவட்டு முறுக்கைத் தணிப்பதற்கும் இது நல்லது.

1 Emulsion. 2 Confection of Scammony. 3 Barbadoes Aloes. 4 Carminative. வாயுக்கிளி.

5 Saline. 6 Umbelliferous, குடைபோன்ற. 7 Lens. 8 Volatile. 9 Stimulant.

10 Antispasmodic. 11 Atonic Dyspepsia. 12 Specific Gravity, 13 Distil.

தெக்கணம் சிந்து முதலிய பகுதிகளில் ஓமக்காவுல்¹ என்ற ஓர் கிரிஸ்தந்² பதார்த்தம் விலைப்படும். இச்செலவிலிறந்த ஸ்தக்கு வைத்தியர் இதை முதற் கவனித்து, மத்திய இந்துவில் உசீனிலும் மற்றும் இடங்களிலும் ஓமக் கொட்டையிலிருந்து இது செய்யப்படுகிறதென்றும் திஸ்திலித்த ஓமநீரில் இது வலிய உண்டாகிறதென்றஞ் சொல்லுகிறார். ஸ்தெனோசு வைத்தியர் இதைச் சோதித்து இது கா⁴ ஐ³ அ¹⁰ என்ற சின்னத்தை உடைய ஸ்தியர ப்தின்³ என்றும், தைம்⁴ மசுரம்⁵ என்ற பூண்டுகளின் தேலத்தின் மணத்தை ஒத்த ஓர்வகைக் கார்ப்பான மணத்தை யுடையதாய்தண்ணீரிலும் கனத்ததாய் 127 பாகை குட்டில் உருகும் என்றுங் கண்டார்.

அனீசு. ANISE.

இப்பூண்டு தென் யுரோபம் லிவாந்துக்கரை முதலிய இடங்களுக்கு ஆதியாயுரியது. இதின் கொட்டையிலிருந்து திஸ்திலித்தெடுக்கும் அத்திரஎண்ணெய்யின் நிமித்தமாகவே இது வாகடத்துக்குரியதாகின்றது. இந்த எண்ணெய், தன்மைகள், வட்சணங்கள் உபயோகங்களில் அண்ணாசுப்பூவிலிருந்து திஸ்திலித்தெடுக்கும் எண்ணெய்யைப் போன்றது.

ரசிதம். Preparation. அனீசேசேன். Essence of Anise. கொள். அனீசுத்தேல், ஒரு அன்சு; திட்டசீது⁶ நாலு அன்சு. கல.

தேயம். பத்து முதல் இருபதுதுளி. இது நல்ல காமினதி⁷. தபுளின் சிங்சு சாகடத்திற்⁸ சொல்லிய அனீசேசேசினிலும் இது இருமடங்குவீறுள்ளது.

பெருஞ்சீரகம். FOENICULUM VULGARE. FENNEL.

வாசம். இது தென் யுரோபத்திலுள்ளது. பெரும்பாலுஞ் செய்கைபண்ணப்படும்.

வாகடபகுதி. கொட்டை. இது ஏறக்குறைய மூன்று லீன் நீளமும், ஒரு லீன் அகலமும், பிறை வடிவுமாய்ச் சற்றே வளைந்து சொண்டுள்ளதாக இருக்கும். வெண் கபிலநிறமாய் நீளப்பாட்டில் எட்டுப் புருவங்களுள்ளது. பக்கப் புருவங்கள் இரண்டும் இரணையானவைகள். சுகந்த மணமும் சுவையுமுள்ளது. இதின் சத்து இதின் அத்திர⁹ எண்ணெய்யில் இருக்கும்.

தன்மைகள். ஸ்தொமாகி¹⁰, காமினதி.

உபயோகங்கள். வயிற்றில் வாயுப்பொருமலுக்கும் வாயுப்பொருமல் வலிக்கும் அசத்துவகுன்மத்துக்கும்¹¹ வயிற்றில் முறுக்கு குத்துகளுக்கும் இது நல்லது.

ரசிதம். Preparation. பெருஞ்சீரக நீர். Fennel Water. கொள். பெருஞ் சீரகம் இடித்து, ஒரு இரூத்தல்; தண்ணீர் இரண்டு கலன். திஸ்திலித்து ஒரு கலன் எடுக்கவும்.

1 Ajavain-ka-Phul. 2 Crystal. 3 Stearopten. 4 Thyme. 5 Marjorum. 6 Rectified Spirit. 7 Carminative. 8 Dublin Pharmacopœa. 9 Volatile. 10 Stomachic.

11 Atonic Dyspepsia.

தேயம். ஒன்று முதல் மூன்று அன்சு. இது நல்ல காமினதி, ஸ்தோமகி. பிரதானமாய் மற்றும் மருந்துகளுக்கு இது அனுபானமாக வழங்கப்படும்.

யுரோபப் பெருஞ்சீரகத்தின் தன்மை வட்சணங்கள் எல்லாம் இந்துவி லுள்ள பெருஞ்சீரகத்துக்கும் உண்டு.

அணீதம். சதகுப்பீ.

ANETHUM GRAVEOLENS. COMMON DILL.

வாசம். இது தென் யுரோபத்திலுள்ளது. இங்கிலந்துவிலும் இந்துவி லுஞ் செய்கைபண்ணப்படும்;

வாகடபகுதி. அணீதக்கொட்டை. இது முட்டை வடிவும் தட்டை யும் ஏறக்குறைய ஒன்றரை லீன்¹ நீளமுமானது. விளிம்பு வெளிறின சவ் வுபோலிருக்கும். சுகந்த மணமும் கார்ப்புமான சற்றே கைச்சற்சுவையு முள்ளது. இதின் சத்து இதின் அத்திர²வெண்ணெய்யே.

தன்மை. ஸ்தோமகி. காமினதி.

உபயோகம். வயிற்றில் வாயுப்பொருமனுக்கும் வாயுப்பொருமல் வலி ட்கும் அசத்துவகுன்மத்துக்கும் வயிற்றில் முறுக்கு குத்துகளுக்கும் இது நல் லது. ஆயினும் இது கறுவியிலும் இதமான சுவையும் சித்தியான செயலு முடையது.

ரசிதங்கள். அணீதத்தேல். Oleum Anethi. இது அணீதக்கொட்டையி லிருந்து திஸ்திலித்³தெடுக்கும் எண்ணெய், இது வெளிறின மஞ்சள்நிறமு ம் காரமான இனிய சுவையுமுடையது.

தேயம். இரண்டு முதல் ஐந்து துளியைச் சர்க்கரையில் விட்டாவது இமல்ச⁴மாக்கியாவதுகொடுக்கலாம்.

அணீதநீர். Aqua Anethi. கொள். அணீதக்கொட்டை. இடித்துஒரு இரத்தல்; தண்ணீர் இரண்டு கலன்⁵. திஸ்திலித்து ஒரு கலன் எடுக்கவும்.

தேயம். இரண்டு திரும் முதல் ஒரு அன்சு. கூடவுங் கொடுக்கலாம். குழந்தைகளுக்கு வாய்ப்பொருமல் முதலியவற்றைத் தணிப்பதற்கு இது உ த்தமமான வாயுக்கினி.

சோயிக்கீரை. Anethum Sowa. சுகந்தமான இதின் பழத்துக்காக இது இந்துவின் பல பகுதிகளிற் செய்கைபண்ணப்படும். கடைகளில் இ தைச் சோயி என்று சொல்லி விற்பார்கள். அணீதக் கொட்டையில்நின்ற பகுத்தறிதற்குரிய வட்சணங்கள் ஒன்றும் இதற்கில்லை. யுரோப அணீதத் துக்குரிய அவுஷத தன்மைகள் இந்துவிலுண்டான இப்பூண்டுக்கு முண்டு. இதை அதற்குப் பதிலாக வழங்கலாம்.

கோத்தமல்லி. மல்லி. CORIANDER.

வாசம். யுரோபம்; இந்துவிலுஞ் செய்கைபண்ணப்படும்.

வாகடபகுதி. காய்ந்த கொட்டை. இது உண்டை வடிவும் தெண் மி னகளவு பருமையுங் கொண்டது, மூக்குள்ளது, நுண்ணிய புருவங்கள் உ

1 Line. 2 Volatile. 3 Distil. 4 Emulsion. 5 Gallon.

டையது, மஞ்சட் கபிலநிறமுள்ளது, நல்ல சுகந்த வாசனையுஞ் சுவையுமு டையது. இதின் சத்து அதின் அத்திர¹வெண்ணெய்யில் இருக்கும்.

தன்மை உபயோகம். சுறுவ²யைப் போலவே. இது நிலவாகைலேகி யம்³, ஷென்சன்மிஸ்துர்⁴, வரியாத்துச்சிறுபம்⁵, வரியாத்திரஞ்சம்⁶, நிலவா கை ரஞ்சம், இவைகளில் ஓர் கூறுகச் சேருகின்றது.

ரசிதம். மல்லத்தேல். Oil of Coriander. இது கொட்டையைத் திஸ்திலித்தெடுக்கும் எண்ணெய். இது மஞ்சள் நிறமும் மல்லிக்குரிய வீ ருன மணமுமுடையது.

தேய். இரண்டு துளி முதல் ஐந்து துளியைச் சர்க்கரையில் விட்டா வது இமல்ச⁷மாகியாவது கொடுக்கலாம்.

இது நிலவாகைச் சிறுப⁸த்தல் ஓர் கூறுகச் சேருகின்றது.

இங்குப்பூடு. பெருங்காயப்பூடு.

ASAFOETIDA PLANT.

வாசம். இது கிழக்குப் பார்சியம், துருச்சிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான்களி லும் இமயத்தின் ஆக மேற்குப்பகுதியிலும் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. பச்சைப் பூண்டின் வேரைச் சீற வடிவதாகிய பிசினிரா னம்⁹. இதுவே பெருங்காயம். இது கொஞ்சப் பகுதிக்கு வாலுண்டைக ள் திரண்டதாய் ஒழுங்கற்ற கட்டிகளாக வரும். கசிவாயாவது காய்வாயா வது இருக்கும். புதிதாய் வெட்டிய அல்லது முறித்த கட்டியின் நிறம் மங் கல் வெண்மையாயிருந்து படிப்படியாய்த் தூமிரச்சிவப்பாகி¹⁰, கடைசியில் மங்கல் மஞ்சளாயாவது செங்கபில¹¹மாயாவது மாறும். சுவை கைப் புங் கார்ப்புமானது, மணங் கெட்ட நாற்றம், உள்ளியைப் போல் நெடுக நாறும், திட்டசீதல்¹² ஏறக்குறைய முற்றாய்க் கரையும். இதற்குரிய மணம் இதின் அத்திரவெண்ணெய்யிலுள்ளது.

தன்மை. வீருன அந்திஸ்பசி¹³, ஸ்திமுலம்¹⁴, அந்தெல்மிந்தி¹⁵.

உபயோகம். ஈளை, குச்சல், அஞ்சீனபெக்து¹⁶, வாயுப்பொருமல் வலி முதலிய ஸ்பச¹⁷நோய்களுக்கு இதுநயந்ததாயிருப்பதுபோல இஸ்தெரி¹⁸க்கு ம அதைச் சார்ந்த நோய்களுக்கும் இது உவப்பான மருந்து. பிள்ளைகளு க்குண்டாகும் துமோனி¹⁹ புறங்கீதின²⁰ பிற்கூற்றில் இதால் மெத்த நயங்கா ணும். கீரைப்பாப்பு குடலில் இருப்பதால் அனுதாபமான சிரா²¹குணங்கள் தோன்றமாகில் இதை அந்தெல்மிந்தியாகக் கொடுக்கலாம்.

தேயம். ஐந்து முதல் இருபது கிரேனைக் குளிகையாகவாவது இமலச மாகவாவது கொடுக்கலாம்.

ரசிதங்கள். இங்கிரஞ்சம். Tincture of Asafoetida. கொள். பெரு ங்காயம், சிறுத்துண்டுகளாக, இரண்டரை அன்சு. திட்டசீது²², போதியது. அடைத்த பாத்திரத்தில் பெருங்காயத்தைப் பதினைந்து அன்சு சீதில் ஏழு

1 Volatile. 2 Carawy. 3 Confection of Senna, 4 Gentian mixture. 5 Syrup of Rhubarb. 6 Tincture of Rhubarb. 7 Emulsion. 8 Syrup of Senna.

9 Gum resin. 10 Purple. 11 Brown. 12 Rectified spirit. 13 Antispasmodic.

14 Stimulant. 15 Anthelmintic. 16 Angina pectoris. 17 Spasmodic,

18 Hysteria, 19 Pneumonia. 20 Bronchitis. 21 Nervous,

22 Rectified spirit.

நாளுறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கிக்கொள்ளவும். பிறகு வடித்து அரை நாழி தேறப் போதியளவு சீதைச் சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

தேயம். அரைத் திரும் முதல் ஒரு திரும் கொடுக்கலாம்.

இங்குக்கூட்டுக் குளிகை. Compound Pill of Asafoetida. கொள். இங்கு, கல்பணம்¹, சசம்² வகைக்கு இரண்டு அன்சு; இக்குப்பாணி³ நிறையின்படி ஒரு அன்சு. எல்லாவற்றையும் நீர்மத்திக⁴த்தல் ஒருமிக்கக் காய்ச்சி எடுத்துக்கொரேபதமாய் வருந்தினையுங் கலக்கிக்கொள்ளவும்.

தேயம். ஐந்து முதற் பத்துக் கிறேன். இது ஓர் நயந்த மருந்து. விசேஷமாய் இஸ்தேரிப் பெண்களுக்குண்டாகுங் குன்மத்துக்கு நல்லது.

இங்கேனீமம். Enema of Asafoetida. கொள். இங்கு முப்பது கிறேன்; தண்ணீர் நாலு அன்சு. இங்கைக் குழியம்மியில் இட்டுத் தண்ணீரைப் படிப்படியாய் விட்டு இமல்சு⁵மாகத்தக்கதாய் அரைத்துக்கொள்ளவும்.

இஸ்தேரி⁶, வாயுப்பொருமல் வலி, குழந்தைகளின் வலிப்பு முதலிய நோய்களுக்கு இது நல்ல ஸ்திமுலமும்⁷ அந்திஸ்பசியு⁸மாகும். பெருங்காயத்தை உண்ணக்கூடாதிருக்கும் வேளைகளில் இப்படிச் செலுத்தலாம். இளம்பிள்ளைகளுக்கு அவரவர் வயசுக்குத்தக்கதாய் இதிற் கால்வாசி அரைவாசி செலுத்தலாம்.

சகை⁹ யிங்குக் குளிகையிலும் இங்கமோரைஞ்சத்திலும்¹⁰ பெருங்காயம் ஓர் கூறாகச் சேருகின்றது.

இங்குப் பூண்டின் பிசினிராளம் மாத்திரமல்ல அதின் கனியும் பார்சியம் ஆபுகனிஸ்தான் தேசங்¹¹ளினின்று இந்துவுக்கு ஏற்றப்பட்டு சுதேச வைத்தியர்களால் அதிகமாய் வழங்கப்படுகின்றது. இங்குப் பூண்டின் இலைகளும் விதைகளும் சுவேதனி¹², காமினதி¹³களாக வழங்கப்படுகின்றனவென்று ஏர்வின் பண்டிதர் சொல்லுகிறார்.

அமுனீயகப்பூடு. கமநாயகம்.

DOREMA AMMONIACUM. AMMONIACUM PLANT.

வாசம். இது பார்சியத்தில் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. பூண்டின் தாளில் வடியும் பிசினிராளம். இது வாலுண்டைகளாகவும் திரள்களாகவும் வரும். வாலுண்டைகள் இரண்டு லீன்¹⁴ முதல் நாலு லீன் பருமையானவைகள். வெள்ளினை கறுவாப்போற் கபில¹⁵நிற முள்ளவைகள். உடைந்தவிடத்து அழுத்தமும் மினுக்கமும் மங்கல்வெள்ளையுமாகும். வாலுண்டைகள் கூடியே கடடியாகும். இக்கட்டிகள் குளிராயிருக்கையில் வன்மையும் நொருக்கலுமாகும். குடுபடவோ சுறுக்கு இளகும். சொற்ப மணமுண்டு; கைப்புங் கார்ப்பும் உவட்டுமான சுவையையுடையது; தண்ணீரோடு சேர்த்து அரைக்கப் பால்போல் இமல்சமாகும். இதின் சத்து இதின் அத்திர¹⁶எண்ணெய்யிலும் ராளத்தி¹⁷லுமே இருக்கும்.

தன்மை. ஸ்திமுலம், எக்ஸ்பெக்துறம்¹⁸.

உபயோகம். வயோதிகத்தில் உண்டாகும் கதார்க¹⁸ளுக்கும், ஸ்பசு

¹ Galbanum. Myrrh ³ Trencle, தெய்வம். ⁴ Water-bath. ⁵ Emulsion. ⁶ Hysteria. ⁷ Stimulant. ⁸ Antispasmodic ⁹ Aloes. ¹⁰ Tincture of Asafoetida and Ammonia. ¹¹ Sudorific. ¹² Carminative, ¹³ Line. ¹⁴ Brown. ¹⁵ Volatile. ¹⁶ Resin. ¹⁷ Expecto-
rant ¹⁸ Catarrh.

நனைக்கும். விசேஷமாய் இஸ்தெரி²ப்பெண்களுக்குண்டாகும் ஈனைக்கும், அசத்துவீகையான மற்றுஞ் சுவாசநோய்களுக்கும் இது கைகண்ட மருந்து.

தேயம். பத்துமுதல் இருபது கிரேனைக் குளிகையாக்கியாவது இமல்ச⁴ மாக்கியாவது கொடுக்கலாம்.

ரசிதங்கள். அமுனீயக மீஸ்தூர். Ammoniacum Mixture. கொள். அமுனீயகம், பருக்கன் தூளாக, கால் அன்சு; தண்ணீர் எட்டு அன்சு. தண்ணீரைப் படிப்படியாய் அமுனீயகத்துக்கு விட்டு அக்கலவை பால்போல் வருந்தனையும் அதை அரைத்து மெல்லிய புடைவையில் வடிக்கவும்.

தேயம். நாலு திரும் முதல் ஒரு அன்சுவரைக்குக் கொடுக்கலாம். இது கயந்த எக்ஸ்பெக்தறம்⁵. விசேஷமாய் ஸ்குவீ⁶லோடும் அதின் வருப்பைச் சேர்த்த மற்றும் மருந்துகளோடுங் கலந்து கொடுத்தால் நயமாகும்.

இரசவழனீயகபிலாஸ்தர். Plaster of ammoniacum with mercury. கொள். அமுனீயகம், பன்னிரண்டு அன்சு; இரசம் மூன்று அன்சு; ஒலீ வெண்ணெய்⁷ ஒருதிரும்; உச்சிக்கந்தி⁸ எட்டுக் கிரேன். எண்ணெய்யைச் சூடாக்கி அத்தோடு கந்தியைப் படிப்படியாய்ச் சேர்த்து அவைகள் சேருந்தனையும் கலக்கவும். இந்தக் கலவையோடு இரசத்தையுஞ் சேர்த்து, இரசந்தோன்றாமல் மறையுந்தனையும் அரைக்கவும். கடைசியில் அமுனீயகத்தையும் உருக்கிச் சேர்த்து முழுவதையும் நன்றாய்க் கலக்கிக்கொள்ளவும்.

பொருத்துநீர்க்கோவை. காலிகயரையாப்பு⁹, கழலைகள். சிவ்வி¹⁰வாதம் இவற்றிற்கு இது நல்ல பற்று.

கல்பனப்பிலாஸ்தர்¹¹, ஸ்குவிற்கூட்டுக்குளிகை¹², இபிகாக்ஸ்குவிற்குளிகை¹³ இவைகளிலும் அமுனீயகஞ் சேருகின்றது.

கல்பனப்பூடு. FERULA GALBANIFLUA. GALBANUM PLANT.

வாசம். பார்சியம்.

வாகடபகுதி. பிசினிரானம். இந்துவிலும் விவாந்திலுமிருந்து இது இங்கிலாந்துக்கு ஏற்றப்படும். இது பயறளவு பருமையான ஒழுங்கினமான வாலுண்டைகளாக வரும். பெரும்பாலுந் திரண்டு பச்சை மஞ்சள்நிறமும் உருவொளியுமுள்ள கட்டிகளாகவிருக்கும். வீரான கெட்ட நாற்றமும்காரமான கைப்புச் சுவையுமுள்ளது. இந்த நாற்றமுஞ் சுவையும் ஓர் அத்திர வெண்ணெய்யைப்பற்றியெனலாம்.

தன்மை. ஸ்திமுலம்¹⁴, அந்திஸ்பசி¹⁵, எக்ஸ்பெக்தறம்.

உபயோகம். பெருங்காயத்தைப் போலவே. ஆயினும் அதைப்பார்க்க இதின் செயல் சாந்தமானது. இது பற்றாக மந்தக் கழலை¹⁶களுஞ் குங்காலிக்¹⁷மான சுவாச நோய்களில் நெஞ்சுக்கும் ஸ்திமுலமாக இடப்படும்.

தேயம். பத்து முதல் இருபது கிரேனைக் குளிகை அல்லது இமல்சமாக்கிக் கொடுக்கலாம்.

ரசிதங்கள். கல்பனப்பிலாஸ்தர். Galbanum Plaster. கொள். கல்பனம் ஒரு அன்சு; அமுனீயகம்¹⁸ ஒரு அன்சு; மஞ்சள் மெழுகு ஒரு அன்சு; வங்கபற்று¹⁹ எட்டு அன்சு. கல்பனத்தையும் அமுனீயகத்தையும் ஒன்றாய்ரு

1 Spasmodic Asthma 2 Hysteria. 3 Asthenic. 4 Emulsion. 5 Expectorant. 6 Squill. 7 Olive oil. 8 Sublimed Sulphur. 9 Chronic bubo. 10 Syphilis.

11 Galbanum plaster. 12 Compound pill of squill. 13 Pill of Ipecac and

Squill. 14 Stimulant தனி. 15 Antispasmodic. 16 Indolent Tumor.

17 Chronic. 18 Ammoniacum. 19 Lead plaster.

க்சிச் சீலையில் வடிக்கவும், அப்பால் இவைகளை முதலே ஒன்றையருக்தின வங்கபற்றோடும் மெழுகோடுஞ்சேர்த்து முழுவதையுந் திறமாய்க் கலக்கவும். இங்குக் கூட்டுக் குளிகையிலுங் கல்பனஞ் சேருகின்றது.

கோனியப் பூடு. CONIUM. SPOTTED HEMLOCK.

வாசம். இது யுரோபத்திலும் மத்திம ஆசியத்திலும் உண்டாகும். இங் கிலந்திலும் பொதுவாயுண்டு.

வாகடபகுதி. 1 கோனிய இலைகளும் இளங் கிளைகளும். காட்டிலுள் ள இப் பூண்டுகள் காய்க்கத் துவங்கும்போது இவைகள் சேர்க்கப்பட்டுப் பத்திரமாய் உலர்த்தப்படும். பச்சை இலைகள் கவர்மேற் கவராகி கருந் து மிரப் புள்ளிகளையுடைய அழுத்தமான காம்பிற்றோன்றியிருக்கும். காய்ந் த இலைகள் நல்ல பச்சைநிறமும் சுய மணமுமுடையவைகளாயிருக்கும். இலையைக் காரப்பதாசி¹யோடு அரைக்கக் கோனியத்தின் மணம் பெலலாய் வீசும். 2 காய்ந்த கனி. இது அக்கம்பக்கத்திற் பதிகையுடைய, நீண்ட, ஒரு தலைப்பில் சற்றே கூரிய உண்டை. ஒவ்வொரு பாதியிலும் கருக்கை யுள்ள ஐந்து புருவங்கள் ஒடியிருக்கும். இந்தக் கனியை மாவாக்கிப் பதா சிநீர்விட்டு அரைக்க, கோனிய மணம் வீராய் வீசும். கனி இலை இரண்டி னதும் சத்து இவைக்குரிய கோனியின்² என்ற அத்திர³தேல⁴ அல்கலைவ⁵த்தி ல் அடக்கியிருக்கும்.

தன்மை. நாகதிகம்⁶, அனுடைன்⁷, அந்திஸ்பசி⁸. அதிகேயத்தில் நஞ்சு.

உபயோகம். இருமல்கள், சுவாசக்குழற்கிளைச் சளிச்சவ்வின் அழற்சி, வாதம், நுறல்சி¹⁰நோய்கள், இரைப்பைப் புண் முதலியவற்றுக்கு இது உவ ந்தது. கன்சர்¹¹நோய்க்கு தானிக¹²மாகவும் உள்மருந்தாகவும், இதின் நயஞ் சந்தேகமானாலும் இது அதிகமாய் வழங்கப்படும். ஸ்துரூமத்துக்கு¹³ இது உ த்தமமென்று முற்காலத்தில் பேர்பெற்றிருந்தது. ஸ்துரூமம், சிவ்விசு¹⁴ காதன ப்புண்களின் வருத்தத்தைத் தணிப்பதற்கு கோனியவிலைப்பாப்பை நல்லது.

தேயம். பொடியாக்கிய இலையை இரண்டு கிறேன் முதல் எட்டுக்கி ரேன்வரைக்குக் கொடுக்கலாம்.

இலையின் ரசிதங்கள். கோனியவேசிறந்து. Extract of Conium. கொள். கோனியப்பூண்டின் பச்சை இலைகளும் இளந்தளிர்களும் நூற்றுப் பன்னிரண்டு இரூத்தல். குழியம்மியில் நசுக்கிச் சாற்றைப் பிழிந்து படிப் படியாய் 130 பாகை வரைக்கும் சூடாக்கிப் பச்சைநிறப் பதார்த்தத்தை வே ருக்கும்படி காரிக்கம் சீலையில் வடிக்கவும். வடித்த சாற்றிலுள்ள அல்புமி ன்¹⁵ உறையத்தக்கதாக அதை 200 பாகை சூட்டுக்கு வரக் காய்ச்சி மறுபடி யும் வடிக்கவும். வடித்த நீர் மெல்லிய பாணியாய் வரத்தக்கதாக அதை நீ ர்மத்திகத்தில் வறட்டிப் பிறகு முன் வேரையெடுத்த பச்சைநிறப் பதார்த்தத் தைச் சேர்த்து முழுவதையும் ஓயாமற் கலக்கி அது குளிகைப்பதமாய் வரு த்தனையும் 140 பாகைக்கு மேற்படாத சூட்டில் வறட்டவும்.

தேயம். இரண்டு முதல் ஆறு கிறேன். கூடவுங் கொடுக்கலாம். வெ ருகாலத்துக்கு வைத்திருப்பதால் விசேஷமாய் உஷ்டண தேசங்களில் இது தன் சத்தை இழந்துவிடும்,

1 Caustic Potash, 2 Conein. 3 Volatile. 4 Oleaginous. 5 Alkaloid, 6 Narcotic, 7 Anodyne. 8 Antispasmodic. 9 Mucous membrane. 10 Neuralgia, 11 Cancer. 12 Local. 13 Struma, 14 Syphilis, 15 Albumen.

கோனியக்கூட்டுக் துளிகை. Compound Pill of Conium. கொள். கோனியவெசிறுத்து, இரண்டரை அன்சு; இபிகாக்குத்¹தூள், அரை அன்சு; இக்குப் பாணி² போதியது. கோனியவெசிறுத்தையும் இபிகாக்கையுங் கலந்து குளிகைத் திரளையாகப் போதியளவாய் இக்குப்பாணி சேர்க்கவும்.

தேயம். ஐந்து முதற் பத்துக் கிறேன்.

கோனியசுவசனம். Inhalation of Conium. கொள். கோனியவெசிறுத்து, அறுபது கிறேன்; பதாசிரீர்³ ஒரு திரும்; தண்ணீர் பத்துத் திரும். கல. இந்தக் கலவையில் இருபது துளியை ஓர் சுபஞ்சிற் தோய்த்து ஓபாத்திரத்திலிட்டு அதின் மேற் செல்லும் வெந்நீரின் ஆவியைச் சுவாசிக்கவும். சுவாசபாதையின் அடிற்சி இருமல்முதலியவற்றுக்கு இது நல்லசெரதீவம்⁵.

கோனியச்சாறு. Juice of Conium. கொள். பச்சையான கோனிய இலை, ஏழு இறுத்தல்; திட்டசீத⁶ போதியது. கோனிய இலையைக் குழியம்மியில் நசுக்கிச் சாற்றைப் பிழிந்து மூன்று அன்சு சாற்றுக்கு ஒரு அன்சு வீதமாய்ச் சீது சேர்த்து ஏழுநாள் நிற்கவிட்டு வடித்துக் குளிர்மையான இடத்தில் வைத்திருக்கவும்.

தேயம். அரைத் திரும் முதல் ஒரு திரும். உள்ளே கொடுப்பதற்கு இது உசிதமான ரசிதம்.

கோனியப்பாப்பை. Conium Poultice. கொள். கோனிய இலை மாவாக ஒரு அன்சு; லீனமா⁷, மூன்று அன்சு; கொத்.வெந்நீர் பத்து அன்சு. கோனிய மாவையும் லீனமாவையுங் கலந்து தண்ணீரைக் கொஞ்சங் கொஞ்சமாய்ச் சேர்த்து ஓயாமற் கலக்கவும்.

நோவுள்ள வீக்கங்கள் புண்களுக்கு இட இது நல்லது.

கோனியக்கனியின் ரசிதம். கோனியவிரஞ்சம். Tincture of Conium. கொள். கோனியக் கனி, இடித்து இரண்டரை அன்சு; புருவசீத⁸ அரை நாழி. அடைத்த பாத்திரத்தில் கோனியக் கனியைப் பதினைந்து அன்சு சீதில் இரண்டுநாளுறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கிக்கொள்ளுவம். பிறகு சியந்தனியில் ஏற்றி நீர்வடிதல் ஒழிந்தபின் சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும் வார்த்து வடித்து அப்பாற் சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து இரண்டு நீர்களையுங் கலந்து அரைநாழிக்குப் போதிய புருவசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். இருபது மினிம்¹⁰ முதல் அறுபது மினிம்.

சம்பற்பூண்டு. SUMBUL PLANT.

வாகடபகுதி. காய்ந்த கிழங்கு. இது ருசியத்திலும் இந்துவிலுமிருந்து வரும். இரண்டரை இஞ்சு முதல் ஐந்து இஞ்சு அகலமும் முட்கால் இஞ்சு முதல் ஒன்றரை இஞ்சு தடிப்புமுள்ள வட்டித்த சீவல்களாக வரும். பட்டை முரணான கருங் கபில நிறமாய், குறுத்த தடித்த மயிர்கள் பரவியிருக்கும். உட்பகுதி கண்ணறை உள்ளதாய் லகுவிற் பிரிபடக்கூடிய ஒழுங்கற்ற சிராய் சேர்ந்திருக்கும். இது கஸ்தூரியையொத்த வீரூன மணமுடையது. சுவை தொடக்கத்தில் இனிமையாகிச் சற்று வேளையால் கைப்பும் பல்சம்¹¹போன்றதுமாகும். ருசிய சம்பற் கிழங்கைப்பார்க்க இந்துவிலுள்ளது அடர்த்தியான நெசவும் உரப்பும் இறுக்கமும் சிவப்புநிறமுமுடையது.

1 Ipecac. 2 Treacle. 3 Solution of Potash. 4 Air passage. 5 Sedative. 6 Rectified Spirit. 7 Linseed meal. 8 Proof spirit. 9 Percolator. 10 Minim. 11 Balsam.

தன்மை. நேவின்ஸ்திமுலம்¹, அந்திஸ்பசி².

உபயோகம். இஸ்தெரி³, எபிலெப்சி⁴, சோர்வுகளுக்கும் பெலவீனத்தோடு கூடிய மற்றும் நேவின் நோய்களுக்கும் இது நல்லது. மேலும் வெலன் கெட்ட சன்னிச்சுரங்கள் அசத்துவமான திசந்தெரி⁵ தியறீயம்⁶ காலிக்⁷ சுவா சநோய்கள் குலொரோசி⁸ திஸ்மெனுறீயம்⁹ விசாதகம்¹⁰ இவற்றுக்கும் இது நல்லமருந்து.

தேயம். பத்துமுதல் இருபது கிறேன் தூள் கொடுக்கலாம்.

ரசிதம். சம்புலிரஞ்சம். Tincture of Sumbul. கொள். சம்புல்வேர், பருக்கன்தூளாக இரண்டரை அன்சு; புருவுசீது¹¹ அரைநாழி. அடைத் தபாத்திரத்தில் சம்புல்வேரைப் பதித்து அன்சு சீதில் இரண்டுநாளுறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கவும். பிற்பாடு சியந்தனியில்¹² இட்டு நீர் வடிந்தொழிந்தபின் சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும் வார்த்துச் சியந்தனிக்கவும். பிற்பாடு சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து இரண்டு நீர்களையுங் கலந்து அரைநாழி தேறப் புருவுசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். பத்துமுதல் முப்பது மினிம்¹³.

இந்தக் கிழங்கு ஜடாமாசியல்ல. இந்துச் சம்புல் என்பது ஜடாமாசிக் குள்ள பார்சிய இந்தியப் பேர்களுளொன்று.

வல்லாரை. HYDROCOTYLE ASIATICA.

INDIAN PENNY-WORT

வாசம். இது இந்துவடங்கலுமுண்டாகும்.

வாகடபகுதி. இலைகள். இவை ஒரு அருகில் குடை வடிவையுடைய நீண்ட வட்டிப்பாயும் கருக்குள்ளவைகளாயும் அரை இஞ்சம் அதற்கு மேற்பட்ட நீளமாயிருக்கும். பச்சையாயிருக்கையில் மணமில்லாமல் கசக்கும்போது ஓர்வகையான சுகந்த மணம் வீசும். சுவை காரமும் கைப்பும் அரோசியமுமானது. வல்லாரின்¹⁴ என்ற வெளிறல் நிறமுள்ள கைப்புங் கார்ப்புமுடைய அத்நிர எண்ணெய்யே¹⁵ இதின் சத்து. காய்ந்த இலையைப் பகுத்தறியச்சூடிய மணமாவது சுவையாவது அதற்கு இல்லை.

தன்மை. அல்திறவதொணிகம்¹⁶, தானிக¹⁷ மாயிட்டால் ஸ்திமுலம்.

உபயோகம். திமிர் குஷ்டத்தில் இதை வழங்கினதால் நயங்கண்டது. ஆயினும் இதற்கு இது விசேஷ மருந்தென்று சிலர் சொல்லியிருப்பது தகாது. (39). உபசிவ்விசு¹⁸க்கும் விசேஷமாய்த் தோலும் அதனடுத்த ஆனாயத்திசு¹⁹வும் பிரதானமாய் நோய்த்திருக்கையில் இது அதிக உபயோகமாகுமென்று காணப்பட்டது. மற்றும் புண்களுக்கும் சரும நோய்களுக்கும் இது தகுந்த உண்மருந்தும் பூச்சுமருந்துமாகும்.

ரசிதங்கள். வல்லாரைத்தூள். Powder of Hydrocotyle. கொள். பச்சையான வல்லாரை இலை போதியது. காம்புகளைக் களைந்தபின் இலைகளை மட்டான நிழலிலுலர்த்திவைத்துத் தீர்ப்பாய்க் காயப்பண்ணிக் காய்ந்

1 Nervine stimulant. 2 Antispasmodic. 3 Hysteria. 4 Epilepsy. 5 Dysentery.

6 Diarrhoea. 7 Chronic. 8 Chlorosis. 9 Dysmenorrhoea. 10 Hyphochondriasis. 11 Proofspirit. 12 Percolator. 13 Minim. 14 Vellarine.

15 Volatile oil 16 Alterative Tonic. 17 Local. 18 Secondary syphilis. 19 Cellular tissue.

(39) அனுபந்தி பார்.

தபின் மாவாக அரைத்து நன்றாயடைத்த சீசாவிற்கு போடவும். மூப்பது இறுத்தல் பச்சை இலையை இப்படி ஆயத்தப்படுத்தினால் மூன்று நாலு இறுத்தல் தூள் வரும். இத்தூள் வெண்மையான பச்சைநிறமும் சொற்பமான இனிமையாக நுகர்வதாயுள்ளது. இந்த இலையின் சத்தாகிய அத்திர¹ எண்ணெய்க்கை வெய்யிலும் நெருப்பும் அகற்றிப்போடுமாயினால் அவைகளில் உலர்த்தப்படாது.

தேயம். ஐந்து முதல் எட்டுக் கிரேனை நாள் மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம். மந்தமான புண்களின்மேல் இதைத் தூவ, அவை சுகசீரடையும்.

வல்லாரைப்பாப்பை. Hydrocotyle poultice. கொள். பச்சையான வல்லாரை இலை போதியது. துவைத்துத் தண்ணீர்விட்டு இளக்கிக்கொள்ளவும்.

சிவ்விசுப் புண்களுக்கும் மற்றும் புண்களுக்கும் இது நல்ல தீவன பாப்பையாகும்.

அவாகடச் சரக்குகள். Non-Officinal.

பொன்றோரிமச்சேடி. Dorema aureum. இது வட பெலுகிஸ்தானிலுள்ள ஓர் செடி இதிலே கைப்பும் வெண்மையுமான ஓர் பிசின் ஊறும். இப்பிசின் அமுனீயக²த்தைப் போன்றது. செடி பெருமபாலும் நாலு முழும் உயரம். கிளைத்து மலர்ந்த அதின் தலைப்புக்குரிய பொன் நிறத்தாற் தோற்றமாய்த் தெரியும். இதிலுறும் பிசினைப்பற்றி இன்னும் விபரம்வேண்டும்.

அசுமதாகம். Carum Roxburghianum. இப்பூண்டின் குடைபோன்ற சதைத்த சிறுக் கொட்டைகளை ஸ்தொமாகி⁴, காமினதி⁵யென்று சுதேசிகள் மதிக்கிறார்கள். ஒமத்தின் தன்மைகள் சந்தேகமற்ற இவைக்குண்டு. ஆயினும் அதைப்போல் இது யுரோபவைத்தியரால் சோதிக்கப்படவில்லை. சுகந்தத்தில் இது ஒமத்துக்குக் குறைந்தது.

சீரகம். Cumin. Cuminum Cyminum. இக் கொட்டை வந்தன்பாற்மருபியத்தில் வாகடச் சரக்காகின்றது. இது இந்துவடங்கலும் கடைகளிற் கிடைக்கும். கறிச்சரக்காக அதிகமாய் வழங்கப்படும். இதற்குரிய கைப்புச்சுவையும் சுகந்த மணமும் இதின் அத்திர எண்ணெய்யிற் தங்கும். இக்கொட்டை எண்ணெய்இரண்டுக்கும் கொத்தமல்லி⁷ சதகுப்பி⁸களுக்குரிய காமினதித் தன்மைகள் உண்டு. சுதேசிகளால் அதிகம் மதிக்கப்பட்டாலும் இவை யுரோபரால் மருந்தாக வழங்கப்படுவதரிது. இந்த வகுப்பைச் சேர்ந்த வேறு மருந்துகள் இல்லாதவிடத்தில் இவைகளை வழங்கலாம்.

அரலியாசியங்கள்.

ARALIACEÆ.

அவாகடச் சரக்கு. Non-Officinal.

நெபாளஜின்செங்கிழங்கு. Panax Pseudo-ginseng. இந்தப் பூண்டு நெபாள தேசத்துக்குரியது. வாலிக்கு பண்டிதர் இதை முதன்முதல் விவரி

1 Volatile. 2 Syphilis. 3 Ammoniacum. 4 Stomachic Grass. 5 Carminative. 6 Pharmacopoea. 7 Coriander. 8 Dill.

த்துச் சித்திரித்தார். மெய்யூர்ஜின்செங்பூண்டும் இதைப் போன்றது. சீனருக்குட் பெயர்பெற்ற ஜின்செங்பூண்டின் கிழங்கைப் போன்றது. இப்பூண்டின் அவுஷதத் தன்மைகள் உபயோகங்களைப்பற்றிப்பொன்றும் நிச்சயமாய்த் தெரியாது. ஆயினுஞ் சீனத்திலுள்ள பூண்டைப்போலிருப்பதால் அல்திரவதொணிகமான இதின் கிழங்கைச் சோதித்து இதின் நயத்தையறிவது நல்லது.

லோறந்தாசியங்கள்.

LORANTHACEAE.

அவாகடச் சரக்குகள். Non-Officinal.

புல்லுருவி. *Viscum monoicum*. இதில் பல இனமுண்டு. ஒரு இனம் சுற்றாக்கு தேசத்துக்கு அயலில் காஞ்சிர மரத்தில் உண்டாகின்றது. அம்மரத்தைப் போல நச்சுத்தன்மைகள் இதின் இலைகளுக்குண்டு. இதைப் பற்றி ஓஷானசி பண்டிதர் 1837 ம் ஆண்டு ஆராய்ந்து இலைத்தாளில் ஸ்திரிக்னின்² புருசின்³ என்ற சத்தக்கள் இருக்கக் கண்டார். ஓஷானசி பண்டிதர் வாறிங்கு பண்டிதருக்கு எழுதிய ஒரு கடிதத்தில் வீரனா ஓர் யுரோப மாலுமி வால்மிளகுத் தூளென்று இந்த இலைத்தாளில் அரைத்திருமை வகை மோசமாய்த் தின்றதினால் ஒரு மணிவேளைக்குள்ளே செத்தானென்று எழுதியிருக்கிறார். இதை ஸ்திரிக்னினுக்குப் பதிலாக வழங்கலாமென்று ஸ்துவாட்டு வைத்தியர் சொல்லுகிறார். ஆயினும் கூட்டைப் பற்றிப் பூரணமாய் விளங்காததும் சேர்க்குங்காலம் விதம் முதலியவற்றைப் பற்றிச் சத்தக்கள் விகற்பப்படுவதுமாகிய இந்த நச்சுப் பூண்டைக் கொடுப்பதைப்பார்க்க ஸ்திரிக்னின்¹ முதலிய நன்றாயறிந்த ஒரே வீறுள்ள மருந்தை வழங்குவது சூதானம். நீலகிரி மலைகளிற் காஞ்சிர மரத்திற் படரும் புல்லுருவியென்ற நச்சினத்தைப் பற்றிச் சுபிரான் என்பவர் விபரித்துப் பிரசுரஞ்செய்திருக்கிறார்.

கப்ரிவோலியாசியங்கள்.

CAPRIFOLIACEAE.

சம்பூகச்சேடி. *SAMBUCUS NIGRA*. COMMON ELDER.

வாசம். இது யுரோபம் மேற்கு ஆசியங்களில் உண்டாகும்.

வாகடபததி. பூக்கள். இவை சிறியவை. வெண்ணிறமும் வாசனை யுமுடையவைகள். அடர்த்தியான நுலைக்கொத்துகளாகவிருக்கும்.

தன்மை உபயோகம். திஸ்தில நீர் செய்வதில் மாத்திரம் இது வழங்கப்படும்.

ரசிதம். சம்பூகநீர். *Sambucus Water*. கொள். பச்சையான சம்பூகப்பூ, பத்து இருத்தல்; தண்ணீர் இரண்டு கலன். திஸ்திலித்து ஒரு கலன் எடுக்கவும்.

1 Alterative tonic. 2 Strychnine. 3 Brucine.

இது மற்றும் மருந்துகளுக்கு விசேஷமாய் லோஷன்களுக்கு அனுமருந் தாக வழங்கப்படும். இது மெல்லிய ஸ்திமுலம்.

ரூபியாசியங்கள்.

RUBIACEÆ.

கலிசாயசின்கனம். CINCHONA CALISAYA.

வாசம். பொலீவியம் தென் பெருவின் மலைச் சோலைகளில் தெக்கனா ட்சம் 13 ம் பாகைக்கும் 16 ம் பாகை 30 கலைக்குமிடையிலும் குடதே சாந்தரம் 68 ம் 72 ம் பாகைகளுக்கு இடையிலும் இம்மரம் உண்டாகும். இந்துவிலும் இது செய்யப்படுகின்றது. (40)

வாகடபகுதி. பட்டை. இது பீதச் சின்கனபட்டையென்றும் சொ ல்லப்படும். இது பொருக்கற்ற தட்டையான துண்டுகளாகவும் அரிதாய்ப் பொருக்கால் மூடுண்ட சுருள்களாகவும் வரும். ஆறு முதற் பதினெட்டு இ ஞ்சு நீளமாயும் ஒன்றுமுதல் மூன்று இஞ்சு¹ அகலமாயும் இரண்டு முதல் நா லு லீண்டடிப்பாயும் உரப்புங் கனப்புமாயுமிருக்கும். வெளிப்பக்கங் கபி லநிறமாய் விசாலம ன ஆழமற்ற நெடும் பள்ளங்கள் உடையது. உட்பக் கம் மங்கலான மஞ்சள்நிறமும் நாருமுள்ளது. குறுக்கே முறித்தால் குறு த்த துண்ணிய தும்பு தோற்றும். இதின் தூள் கறுவாப்போலக் கபிலமஞ் சன்நிறமும் சற்றே சுகந்தமும் நெடுக்க கைப்புமுள்ளது. சோ²னை 100 கி ரேன் பட்டையை துண்ணியமாவாக்கி பத்துத்துளி ஐருகுலோறிக்கமில்³ விட்டுப் புளிப்பாக்கின திஸ்திலீத்த⁴ தண்ணீர் ஒரு அன்சுற் கால்மணினேர ம் அவ்ந்து இருபத்துநாலுமணினேரப்ஊறவிடவும். முழுவதையும் சிறியவோ ர் சியந்தனியில்⁵ இட்டு நீர் வடிந்தொழிந்தபின் மேற்படி புளிப்பாக்கின தண்ணீரில் ஏறக்குறைய ஒன்றரை அன்சையாவது நீர்நிறமில்லாமல் இறங் குந்தனையுமாவது விடவும். சியந்தனித்த நீரின் புளிப்பைக்கெடாமல் பா ர்த்து அதின்நிறம் முழுவதும் நீங்குந்தனையும் அதற்கு ஈயவதவசிதசுநீர்⁶ சே ர்க்கவும். அதை வடித்துச் செர்ப் திஸ்திலீரார்⁷ கழுவவும். வடிந்தநீரு க்குக் காரப்பதாசி⁸யில் முப்பத்தைந்து கிரேன் வரைக்கு அல்லது முதலேயு ண்டான அடையலை மறுபடி கரையப்பண்ணக் கூடியவரை⁹ குச் சேர்க்க வும். பிற்பாடு சுத்த ஈதரில்¹⁰ ஆறுதிரும் சேர்க்கவும். திறமாய்க் குலுக்கி ஈதரை வேறுக்கியபின் முறைக்கு மும்மூன்று திரும் ஈதர் விட்டு இரண்டு முறையாவது, விட்ட ஈதரில் ஒரு துளியை வறட்ட அதிலே யாதொரு அ டையலுந் தோன்றாமற்போகுந்தனையுமாவது இப்படியே குலுக்கியெடுக்க வும். கடைசியில் ஈதர்க்கரைவுகள் எல்லாவற்றையுங் கலந்து கப்சுல்⁹ என் ற பாத்திரத்தில் வறட்டவும். ஏறக்குறையச் சுத்தமாயும் சேஷமாயும் வரு ங்கினியம்¹⁰ காய்ந்தபின் இரண்டு கிரேனுக்குக் குறையாமல் நிறுக்கவும், கி ருசசல்வுரிக்கமில்¹¹த்திற் சுறுக்குக்கரையவும் தக்கதாயிருக்கவேண்டும்.

1 Inch. 2 Line. 3 Hydrochloric acid. 4 Distilled. 5 Perculator. 6 Subace-
tate of Lead. 7 Caustic Potash. 8 Ether. 9 Capsule.

10 Quinia. 11 Diluted sulphuric acid.

(40)) அனுபந்தம் பார்.

தன்மைகள். வீரூன அந்திபிராடி¹. தொணிகம்², துவர். முதவிரண்டு தன்மைகளும் கினியமிருப்பதைப்பற்றியே. மூன்றாம் தன்மை சின்கனத னிக்கமிலத்தையும்³ செஞ்சின்கனிக்கமிலத்தையும்⁴ பற்றியேயாகும்.

உபயோகம். இதின் உபயோகத்தைப் பற்றிப் பின்வருங் கினியசல்வ சின்னீழும் இதின் மற்றுமிரசிதங்களின்னீழும் சொல்லப்படும்.

தேயம். பொடியாக்கிய பட்டையில் பத்துமுதல் அறுபதுகிறேனும் கூட வங் கொடுக்கலாம். ஆயினும் இவ்விதமாக வழங்குவது அரிது.

இந்த மரத்தின் இலைகளுக்கும் சின்கனத்தின் மற்றுமினங்களின் இலை களுக்கும் தொணிகதன்மையும் சற்றே அந்திப்பிராடித்தன்மையுமுண்டு.(41)

ரசிதங்கள். கினியசல்வசு. Sulphate of Quinia. இது பீதச் சின்க னபட்டையிலும் வெண்சின்கன பட்டையிலுமிருந்து செய்த ஓர் அல்கலை வசு⁵ சல்வசு⁶. இதைக்குறிக்குஞ் சின்னம் (கா²⁰ ஐ²⁴ நீ² அ².)²ஐ² கேஅ⁴ 7ஐ² அ. இதின் லட்சணங்களாவன: இது ஊசிச்சாங்கமான பட்டுப் போன்ற வெண் கிரிஸ்தல்⁷களாகவும் கடுமையான கைப்புச் சுவையுள்ளதாகவுமிருக்கும். தண்ணீரில் சொற்பமாய்க் கரையும். என்றாலும் அத்தண்ணீரைச் சாடையான நீலநிறமாக்கும். இந்தக்கரைவோடு பாரிதகுலோ றிரம்⁸ சேர்க்க நீதுரிக்கமிலத்⁹திற் கரையாதவோர் வெண்ணடையல் விழும். முதற் குலோற நீர்¹⁰ சேர்த்து மறுபடி அமோனம்¹¹சேர்க்க அது சிறப்பான மரகதப் பச்சை நிறங் கொள்ளும். சோதனைகள். இது சுத்தமான சல்வ ரிக்கமிலத்திற்¹² கரைந்து சொற்ப மஞ்சள்நிறங் காட்டும். சொற்ப ரூடுகாட் ட நிறத்தில் வேறொரு மாறுதலுமுண்டாகாது. இதில் பத்துக் கிறேனும் கிருசசல்வரிக்கமிலத்திற் பத்துத் துளியும் தண்ணீர் அரை அன்சும் சேர்ந் தால் நல்ல கரைவாகும். அதில்நின்று அமோனம் ஒரு வெண்ணடையலை விழுத்தும். முழுவதற்கும் அரை அன்சு ஈதர்¹³ சேர்த்துக் கலக்க இந்த வெ ண்ணடையல் மறுபடி கரையும். கலங்கின நீர் ஓய்ந்து இரண்டு படையா கப் பிரியும்போது யாதொரு கிரிஸ்தற்பதார்த்தமும் உண்டாகாது. இந்த உப்பில் 25 கிறேனை 212 பாகை குட்டில் உலர்த்த, உள்ள தண்ணீர் வற் றுவதால் 3.6 கிறேன் குறையவேண்டும்.

தன்மைகள். மேலேகண்ட பீதச் சின்கனபட்டையின் தன்மைகளே இத ற்குமுண்டு. தொணிகமாகவும் அந்திபிராடியாகவும் இதின் செயல் அதைப் பார்க்கப் பெலனுங் கெதியுமானது. துவர்த்தன்மை அதிலும் இதிற்குறைவு.

உபயோகம். தடவை தடவையாய் வரும் எவ்வகைக் காய்ச்சல்களுக் கும் இது முதல்மருந்து. முறைக் காய்ச்சல்களுக்கு இது மெத்த வாய்க் கும். பித்தசுரம் பீதசுரங்களுக்குத் தொடக்கத்தில் அதிதேயமாய்க் கொடுத் தால் சிலவேளை நயந்தோன்றினாலும் முறைக்காய்ச்சலுக்குப் போல் நயம ல்ல. விடாச்சுரங்களுக்கு இது அவ்வளவு நயமல்ல. ஆயினுஞ் சன்னிச் சுரங்களுக்குச் சிறுபிரமாணமாக மினிறலமிலங்க¹⁴ளோடு கலந்து கொடுத்து வாய்த்ததுண்டு. எச்சந்திமங்களின்¹⁵ பிற்காலில் ஆளின் பெலனைத் தாங்கு வதற்கு இது உவப்பு. பிளிகை¹⁶ பருத்திருப்பதாகிய காய்ச்சற்கட்டிக்கு வி

1 Antiperiodic, சாமய்காரி. 2 Tonic, ஐதி. 3 Cincho-tannic acid. 4 Cinchonic acid.
5 Alkaloid. 6 Sulphate. 7 Crystal 8 Chloride of Barium. 9 Nitric
acid. 10 Chlorine water. 11 Ammonia. 12 Sulphuric acid. 13 Ether.
14 Mineral acid. 15 Exanthemata. 16 Spleen.

(41) அனுபந்தம்பார்.

சேஷமாய் அது நச்சு வாயுகாரணமாக அப்படியானால், சுள்ளப்பான விரே சனத்தோடு கிணியத்தைப் போல நிச்சயமான மருந்து இல்லை. வாத நோய்கள், நுறல்¹ நோய்களுக்கு விசேஷமாய் அவை தடவைத்தன்மைகொள்ளும்போது, இது பெரும்பாலும் உவப்பாகும். மற்றும் வியாதிகளுள் குறுப்பு², கூவுஞ்சுவாசம்³, நுக்கல்⁴ நுமோனியினதும்⁵ பிளுநீதி⁶னதும் பிற்கால்கள், அசத்துவ⁷ நுமோனி, சுவாசப்பையமுகல், கண்ணோ⁸, இரிசீது,⁹ ஸ்துருமத்¹⁰ தோடு கூடிய மற்றும் நயனரோகங்கள், எரிசிப்பிலசு¹¹, எட்டிகாறிய¹², திசந்தெரி¹³, தியநீயம்¹⁴, விசேஷமாய் நச்சுக்காற்றுக் காரணமான திசந்தெரி தியநீயம், அமுகல், முககாதனி¹⁵, ஏர்ப்பு, கசம் என்பவற்றுக்கு இதால் நயங்கண்டது. அவினைத் தவிரக் கிணியத்தைப்போல எத்தனையோ தறுவாய்களுக்குக் கூடும் மருந்து இல்லையெனத் துணியலாம்.

தேயம். தொணிகமாக¹⁶ ஒரு கிறேன் முதல் மூன்று கிறேன் வரைக்கு நாள் இரண்டு மூன்று முறை கொடுக்கலாம். அந்திபிராடி¹⁷ யாகக் காய்ச்சல் விட்ட நேரங்களில் மூன்று முதல் பத்துக் கிறேன் திரும்பத் திரும்பக் கொடுக்கலாம். அல்லது காய்ச்சல் முறையின் தொடக்கத்திலாவது வெயர்வைக்காவின் முடிவிலாவது இருபது கிறேனையாவது கூடவாவது ஒரே முறையிற் கொடுக்கலாம். இதைக் கிருசசல்வரிக்கமில்¹⁸ சேர்ந்த நீரிற் கரைத்துக் கொடுப்பது உத்தமம். இதின் கைப்பை மறைக்கவேண்டில் அல்லது இரைப்பை அழற்சிப்பட்டிருக்கிற் குளிகையாக்கிக் கொடுக்கலாம். இதைக் குடலுட் புகட்டும் போதும் தோலுக்குள்ளாவது தோலிலாவது செலுத்தும்போதும் நயங்காணும். ஆயினும் வாயினாற் செல்வதைப் போலச் செயல் தெரியாவது ஒரே சீராயாவது இராது. வெறு வயிற்றிற் தின்றால் செயல் தீவிரமாயும் நிச்சயமாயுங் காட்டும்.

கிணியத்தின் ரசிதங்கள். கிணியரஞ்சம். Tincture of Quinia. கொள். கிணிய சல்வசு, நூற்றறுபது கிறேன்; தோடந்தோல் ரஞ்சம்¹⁹ அரைநாழி. கிணியசல்வசை ரஞ்சத்திலே மென்குட்டிற் கரைத்து அடைத்த பாத்திரத்திற் மூன்றுநாளுறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கி பிற்பாடு வடிக்கவும்.

தேயம். அரைத்திரும் முதல் இரண்டு திரும். ஒவ்வொரு திரும்பிலும் ஒருகிறேன் கிணியசல்வசு இருக்கும்.

கிணியவைன். Wine of Quinia. கொள். கிணியசல்வசு, இருபது கிறேன்; சிதிறிக்கமில்²⁰ முப்பதுகிறேன்; தோடம்வைன்²¹, அரைநாழி. முதற்சிதிறிக்கமில்த்தையும் பிறகு கிணியசல்வசையும் தோடம் வைனிற் கரைத்து அடைத்த பாத்திரத்தில் மூன்றுநாளுறவிட்டிருந்து இடைக்கிடை குலுக்கிப் பிற்பாடு வடிக்கவும்.

தேயம். அரை அன்சு முதல் ஒரு அன்சு கொடுக்கலாம். ஒவ்வொரு அன்சிலும் ஒரு கிறேன் கிணியம் அடங்கியிருக்கும்.

கிணியக்குளிகை. Pill of Quinia. கொள். கிணியசல்வசு, அறுபதுகிறேன்; நாயுரோசைலேசியம்²² இருபதுகிறேன். ஒன்றாய்ச்சேர்த்துத் திரளையாக்கவும்.

தேயம். இரண்டு முதற் பத்துக்கிறேன் கொடுக்கலாம். இதில் நாலு கிறேனில் மூன்று கிறேன் கிணியமிருக்கும்.

1 Neuralgia, 2 Croup. 3 Crowing Inspiration. 4 Hooping cough. 5 Pneumonia. 6 Pleurisy. 7 Asthenic, 8 Ophthalmia, 9 Iritis. 10 Struma. 11 Erysipelas. 12 Urticaria. 13 Dysentery. 14 Diarrhoea. 15 Cancrum oris, 16 Tonic. 17 Antiperiodic சம்பாதி. 18 Sulphuric acid. 19 Tincture of orange peel. 20 Citric acid. 21. Wine of orange. 22 Confection of Dog rose

அயகினியசிதிறசி¹லுங் கினியம் ஒருகூறுகச் சேருகின்றது.

பீதச்சின்கனபட்டையின் ரசிதங்கள். பீதச்சின்கனபட்டைநீர்காக்தம். Decoction of Yellow Cinchona. கொள். பீதச் சின்கனபட்டை, பருக்கன்தாளாக, ஒன்றேகால் அன்சு; தண்ணீர் அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்திற் பத்து மினி²வேளைக்கு அவித்து, ஆறினபின் நீரை வடித்தெடுத்துக்கொண்டு, வடித்த நீர் அரைநாழியாய் வரத்தக்க அளவு வெந்நீரை வடியிலுள்ள சக்கையில் வார்க்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு இரண்டு அன்சு கொடுக்கலாம்.

பீதச்சின்கனவின்லுகம். Infusion of Yellow Cinchona. கொள். பீதச்சின்கனபட்டை பருக்கன்தாளாக அரை அன்சு; கொதிவெந்நீர், பத்து அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் இரண்டு மணிநேரமூறவிட்டு வடிக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு கொடுக்கலாம். இதுவும் இதற்கடுக்க முன் வந்த ரசிதமும் நல்ல தொணிகங்குளாகும். கிருச சல்வு ரிக்கமில³த்திற் சிலதுளி சேர்ப்பதால் இவைகளின் செயல் அதிகப்படும். தொண்டைப்புண், ஸ்கேவி⁴ முதலிய காரணம்பற்றிய பல்லீற்றுக் கரைதல் முதலியவற்றுக்குக் கொப்பளிக்க இவை உதவும்.

பீதச் சின்கனாஞ்சம். Tincture of Yellow Cinchona. கொள். பீதச் சின்கன பட்டை, பருக்கன்தாளாக நாலு அன்சு; புருவுசீது⁵ அரைநாழி. அடைத்த பாத்திரத்திற் சின்கன பட்டையைப் பதினைந்து அன்சு சீதில் இரண்டுநாள் ஊறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கிக்கொள்ளவும். அப்பாற் சியந்தனியில் இட்டு நீர் வடிந்தொழிந்தபின், சேஷமாயிருக்கிற ஐந்து அன்சு சீதையும் விட்டு வடிக்கவும். அப்பாற் சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து, வடித்த நீர்களைக் கலந்து அரைநாழி தேறச் சீது சேர்க்கவும்.

தேயம். அரைத் திரும் முதல் இரண்டு திரும் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். மற்றந் தொணிக மருந்துகளுக்கு இது நல்ல கூட்டு.

பீதச்சின்கனநீரசிறுத்து. Liquid Extract of Yellow Cinchona. கொள். பீதச் சின்கன பட்டை, பருக்கன்தாளாக, ஒரு இரூத்தல்; திஸ்திலித்த⁶ நீர் போதியது; திட்டசீது⁷ ஒருஅன்சு. சின்கனபட்டையை ஒருநாழி தண்ணீரில் ஒருநாள் ஊறவிட்டு இடைக்கிடை கலக்கி, அப்பாற் சியந்தனியில் இட்டு ஆறுநாழி சேருந்தனையுமாவது சாரமற்றுப் போருந்தனையுமாவது தண்ணீர் வார்த்து வடிக்கவும். வடித்தெடுத்த நீர் அரைநாழியாய் வருந்தனையும் அதை 160 பாகைக்குக் கதிக்காத சூட்டில் வறட்டிக் கடுதாசியில் வடித்து அந்த நீர் மூன்று அன்சாய் வருந்தனையுமாவது அல்லது அதின் விசேஷகிருவிதம்¹⁰ 1.200 ஆய் வருந்தனையுமாவது வறட்டவும். ஆறினபின் ஓயாமற் கலக்கிக் கலக்கிச் சீதைச் சேர்க்கவும். அதின் விசேஷகிருவிதம் 1.100 வரையில் இருக்கவேணும்.

தேயம். பத்து முதல் முப்பது துளியை நாள் இரண்டு மூன்று முறை கொடுக்கலாம்.

வேண்சின்கனம். PALE CINCHONA.

வாசம். இது கலம்பியத்தின்¹¹ தென்மேற்கு மூலையிலுள்ள லக்ச¹²மலைச்

1 Ferriet Quinia citras. 2 Minute. 3 Tonic. 4 Dilute sulphuric acid. 5 Scurvy. 6 Proof spirit. 7 Percolator. 8 Distilled. 9 Rectified spirit. 10 Specific gravity. 11 Columbia. 12 Loxa.

சோலைகளில் கடல்மட்டத்துக்கு மேலே 5,700 அடி முதல் 7,700 அடி உயரத்தில் 64 பாகை முதல் 68 பாகை தாப்பதத்தில்¹ உண்டாகும். இந்து விலும் இலங்கையிலுஞ் செய்கைபண்ணப்படுகின்றது.

வாகடபகுதி. பட்டை. இதின் லட்சணங்களாவன: அரை லீன்² முதல் ஒரு லீன் தடிப்புள்ள ஒற்றைச் சுருள்களாயாவது இரணைச் சுருள்களாயாவது வரும். இவை ஆறு இஞ்சு³ தொடக்கம் பதினைந்து இஞ்சு நீளமாயும் இரண்டு லீன் முதல் எட்டு லீன் பருமையாயும் நொருக்கலாயுமிருக்கும். லகுவில் நெடும்பாட்டுக்குக் கிழியும். குறுக்கே குறுக முறியும். வெளிப்பக்கம் கபிலமுஞ் சுருக்குமாயாவது நரையும் ஒட்டிய பாசிப்புள்ளிகளுமுன்னதாயாவது இருக்கும். சிலவேளை ஏராளமான குறுக்குக் கமர்களுமுண்டு. உட்பக்கஞ் செங்கபீலமாயாவது செம்மஞ்சளாயாவது இருக்கும். இதின் தூள் வெண்கபில நிறமும் சற்றே கைப்புங் கடுந் துவருமானது. சோதனை. பட்டைத் தூளில் 200 கிரேனைப் பீதச் சின்கனப் பட்டைச் சோதனையிற் சொன்ன முறையாய் ஆயத்தப்படுத்தி அகிலே சேர்த்த ஈத⁴ருக்குப் பதிலாகக் குலோறுவாம்⁵ சேர்த்தால் ஒரு கிரேனுக்குக் குறையாத அளவு அல்கலைவங்கள்⁶ பிறக்கவேண்டும்.

தன்மை, உபயோகம், நேயங்கள். பீதச் சின்கனபட்டை போலவேயாகும்.

ரசிதங்கள். சின்கனக்கூட்டிரஞ்சம். Compound Tincture of Cinchona. கொள். வெண் சின்கனபட்டை, பருக்கன்தூளாக இரண்டு அன்சு; கைச்சற் தோடந்தோல், நறுக்கித் துவைத்து, ஒரு அன்சு; சேபந்தாரி⁷ வேர், துவைத்து அரைஅன்சு; குங்குமப்பூ⁸, அறுபதுகிரேன்; கிரிமிஞ்சிப்புழு⁹, தூளாக முப்பது கிரேன்; புருவுசீது¹⁰ அரைநாழி. சின்கன பட்டையையும், உரமான மற்றுஞ் சரக்குகளையும் அடைத்த பாத்திரத்திற் பதினைந்து அன்சு சீதோடு இட்டு இடைக்கிடை குலுக்கிக் குலுக்கி இரண்டுநாளாறவிடவும். அப்பாற்சியந்தனி¹¹யில் வார்த்து நீர் வடிந்தொழிந்தபின், சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும் விட்டு வடிக்கவும். அப்பாற் சக்கையைப் பிழிந்து, பிழிந்த நீரை வடித்து நீர்களை ஒன்றாக்கி, அரைநாழிதேறப் புருவுசீது கூட்டவும்.

நேயம். தொணிக¹²மாகவும் ஸ்தொமாகி¹³யாகவும் அரைத்திரும் முதல் இரண்டு திரங் கொடுக்கலாம்.

அயகூட்டுக்கலவையிலும் வெண்சின்கனபட்டை ஓர்கூறுகச்சேருகிறது.

சேஞ்சின்கனம். RED CINCHONA.

வாசம். இது எக்குடா தேசத்திலுள்ள கிம்புராசு மலையின் மேற்குச்சாரலில் உண்டாகும். குவாயகிலிலிருந்து இங்கிலாந்துக்குப் பெரும்பாலும் ஏற்றப்படும். இந்துவிலும் இலங்கையிலுஞ் செய்யப்படும்.

வாகடபகுதி. பட்டை. இது தட்டையான அல்லது கவிந்த துண்டுகளாகவுஞ் சிலவேளை சுருள்களாகவும் வரும். வெளித்தோலால் மூடப்பட்டிருக்கும். நீளம் சில இஞ்சு முதல் இரண்டு அடிவரைக்கும் அகலம் ஒரு இஞ்சுமுதல் மூன்று இஞ்சுவரைக்கும், கனம் இரண்டு லீன் முதல் ஆறு லீன் வரைக்கும் வித்தியாசப்படும். இறுக்கமுங் கனமுமானது. வெளிப்ப

¹ Temperature. ² Line. ³ Inch. ⁴ Ether. ⁵ Chloroform. ⁶ Alkaloids. ⁷ Serpentry. ⁸ Saffron. ⁹ Cochineal. ¹⁰ Proof spirit. ¹¹ Percolator. ¹² Tonic.

¹³ Stomachic. ரோஷி.

க்கங் கபிலம் அல்லது செங்கபிலமானது. பாசி ஃடித்திருப்பதால் அரிதாய் வெண்மையாகும். நெடும்பாட்டுக்குச் சுருக்குவிழுந்திருக்கும். பலமுறையிலுஞ் சிறுச்சிறுக் கணுவுள்ளது. குறுக்குச் சுமர்கள் நிறைந்திருக்கும். உட்பக்கஞ் சிவப்பு. ஒடிந்த ஓரஞ் செங்கல்லுப்போலிருக்கும். குறுக்கு முறிவில் மெல்லிய சிராய் தெரியும். தூள் செங்கபிலநிறமானது; சுவை கைப்புந் துவருமாகும். சோதனை. 100 கிறேன் பட்டையை பீதச் சின்கனபட்டைச் சோதனையிற் சொன்ன முறையாய் ஆயத்தப்படுத்தி அதற் சொன்ன ஈத¹ருக்குப் பதிலாக குலோறுவாம்² சேர்த்தால் 1.5 கிறேனுக்குக் குறையாமல் அல்கலைவங்க³ள் பிறக்கவேணும்.

தன்மை, உபயோகம், தேயங்கள். பீதச் சின்கன பட்டை போலவேயாகும்.

மேற்சொன்ன சின்கன வகைகளிலிருந்தும் இன்னுஞ் சில வகைகளிலிருந்தும் கினிய⁴த்தோடு சின்குனி⁵, சின்குனிதி⁶, கினிதி⁷ என்ற இன்னும் மூன்று அல்கலைவங்கள் வெவ்வேறுவீதமாய்ப் பிறக்கும். வெண் சின்கனத்திலேயே சின்குனின் அதிகம்போற் தோற்றுகிறது. இந்த அல்கலைவங்களின் அந்திபிராடி⁸த் தன்மைகளை ஆராய்வதற்கு இந்துய்ல் நியமிக்கப்பட்ட கமிஷனர்⁹ அவற்றைப் பரிசோதித்து அவை உச்சிதமானவையென்று முடித்தார்கள். அந்திபிராடியாக இவைகளொவ்வொன்றிலும் ஏகசகடான தேயமாய் எட்டுக் கிறேன் முதற் பத்துக் கிறேன் கொடுக்கலாம். தொணிகமாக¹⁰ இரண்டு கிறேன் முதல் ஐந்து கிறேன் கொடுக்கலாம். (41a)

இபிகாக்குப்பூடு. IPECAC. IPECACUANHA.

வாசம். இது பிறசீல் தேசத்தில் தக்கனாட்சம்¹¹ 8 பாகைக்கும் 20 பாகைக்கும் இடையில் நிழலான பகுதிகளில் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. வேர். இது மூன்று நாலு இஞ்சு நீளமும் தென்னீர்க்களவு பருமையுமான துண்டுகளாக வரும். முறுகி இடைக்கிடை முடிச்சு விழுந்திருக்கும். நிறம் பலவர்ணமான கபிலநிறம். இதில் இரண்டு பகுதிகளுண்டு. சதையான சத்துள்ள வெளிப்பகுதி நொருக்கலானது. மெல்லிய தடிபோன்ற மையப்பகுதி வெண்மையானது. இதின் தூள் வெண்கபிலநிறமும் சொற்ப உவட்டு மணமும், சற்றே கார்ப்பான கைப்புச் சுவையுமுள்ளது. இதிலுள்ள சத்து எமிசிதம்¹² எனப்படும். அது சுத்தமாயிருக்கையில் வெண்மையும் புழுதியும் மணமற்றதும், சற்றே கைப்புச்சுவையும், அல்கலைத்தன்மையுமுடையது,

தன்மைகள். இது வமனி¹³, சுவேதனி¹⁴, எக்ஸ்பெக்துறம்¹⁵; சிறுபிரமாணத்திலு் அல்திறவம்¹⁶. இபிகாக்குத் தூளைத் தைலத்திற் சேர்த்து தோலுட் தேய்த்துவிட்டால் எதிரழற்சி¹⁷யாகச் சேஷ்டித்து, அந்திமனிதாத்தரக¹⁸ தைலத்தைப் பூசிநாற் போலப் பருக்கள் தோன்றச்செய்யும்.

உபயோகம். திசுர்தெரி¹⁹க்கு இது வாய்த்த மருந்து. இந்த நோய்க்கு முப்பது நாற்பது கிறேன் இபிகாக்குக் கொடுப்பதாகிய பரிசுரிப்பு இக்கா

1 Ether. 2 Chloroform. 3 Alkaloid. 4 Quinia. 5 Cinchonine. 6 Cinchonidine. 7 Quinidine. 8 Antiperiodic. 9 Commissioner. 10 Tonic.

11 South Latitude. 12 Emetia. 13 Emetic. 14 Diaphoretic, தியபுரே.

15 Expectorant, ஷசேடவனி. 16 Alterative, பரிசுமி. 17 Counter irritant.

18 Tartarate of Antimony. 19 Dysentery.

(41a) அனுபந்தம்பார்.

லத்தில் மெத்தச் சித்திபெற்று வருகின்றது(42). தியறியத்து¹க்கும் சிலங் கையான கன்மத்துக்கும் விசேஷமாய் ஈரவின் தொழிற்பிசகு அல்லது ம ந்திப்போடு தொடுத்திருக்கையில் இது நல்லது. எக்ஸ்பெக்துறனாக, இது சதார்கன்², காலிகபுறங்கீது³, ஈனே, கசம், குக்கலின் தொடக்கம் முதலியவ ற்றுக்குக் கொடுக்கப்படும். இரத்தப்பெருக்குகளுக்கும் விசேஷமாய்க் க ருப்பை இரத்தப்பெருக்குக்கும் பெரும்பாட்டுக்கும் இது நயந்தது. சமியா ப் பதார்த்தங்களை வாந்திக்கச் செய்வதற்கு இது விச்சயமாயும் பதனமாயுந் தேஷ்டிக்கும். அந்திமனிதாத்தரகம்⁴ கொடுத்தபின் காண்கிற சோகம் அள வு இதாலுண்டாகாது. பிள்ளைகளுக்கும் பெலவீனருக்கும் இது விசேஷ மாய் உவந்தது. சலசீடம்⁵, நாட்பட்ட நெஞ்சுநோய்கள் முதலியவற்றி ற்கு இது வதிரழற்சியாக உடப்படும். இரண்டுதிரும் இபிகாக்குத்தாளும், இரண்டு திரும் ஒலீவெண்ணெய்⁶யும், நாலு திரும் லாடு⁷ஞ் சேர்த்து, நாள் இரண்டொருமுறை தோலுட் தேய்க்க அழற்சியுண்டாகும். இத்தானே ந ணைத்துப் பகசயாக்கி ஏதும் விஷப் பூச்சிகள் குற்றின இடத்துக்கு அணை க்க. அழற்சி உபாதி பெரும்பாலும் தணியும்.

வேர்த்தானின் தேயம். வமனி⁸யாகப் பதினைந்து கிறேன் முதல் முப் பது கிறேன் கொடுக்கலாம். வெந்நீர் குடிக்க இதின் செயல் அதி திருத் தியும் லேசுமாய் நடக்கும். உவட்டிக்கவும் சளிக்கவும் ஒரு கிறேன் முதல் மூன்றுகிறேனும் அல்திறவீமாக கால்முதல் அரைக்கிறேனுங்கொடுக்கலாம்.

ரசிதங்கள். இபிகாக்குவைன். Wine of Ipecac. கொள். இடித்த இபிகாக்குவேர். ஒரு அன்சு; செரிவைன்¹⁰ அரைநாழி. அடைத்த பாத்திரத் தில் ஏழுநாளுறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கிச் சீலையில்வடித்துப் பிழிந்து வடித்து அரைநாழி தேறப் போதிய செரிவைன் கூட்டிக்கொள்ளவும்.

தேயம். வமனியாக மூன்று முதல் ஆறு திரும். எக்ஸ்பெக்துறம்¹¹ சு வேதனி¹²யாக ஐந்து முதல் நாற்பது துள். சிறுபிள்ளைகளுக்குச் சத்திக்கு ந்தனையும் ஒரு திரும் தேயத்தில் அரைமணிநேரத்துக் கொருமுறை திரும்ப த் திரும்பக் கொடுத்தால் நல்ல வமனியாகும். ஒவ்வொரு அன்சிலும் இபி காக்கு வேரின் கரையும் பங்கு 22 கிறேன் அடங்கியிருக்கும்.

இபிகாக்குக்கூட்டுச்சூரணம். Compound Powder of Ipecac. கொள். இபிகாக்குத் தூள், அரை அன்சு; அவின் தூள் அரை அன்சு; பதாசிசல்வசு காவாக நாலு அன்சு. மூன்றையுந் திறமாய்ச் கலந்து மெல்லிய அரிப்பெ ட்டியில் அரித்துக் கடைசியில் உரலிற்போட்டு மெதுவாய்க் குழியம்பியி ல் அரைத்து அடைத்த சீசாவிற்போட்டு வைத்தக்கொள்ளவும்.

தேயம். ஐந்துகிறேன்முதற் பதினைந்து கிறேன். வாசம், நுறல்சி¹³நோ ய்கள், திசந்தெரி¹⁴. தியறியம், கல்லடைசல் முதலியவற்றிற்கு நல்லசெரதீ வமும்¹⁵சுவேதனியுமாகும். பத்துக்கிறேனில் ஒருகிறேன் அவின் இருக்கும்.

இபிகாக்ஸ்துவிற்துளிகை. Pill of Ipecac with Squill. கொள், இபிகா க்குக்கூட்டுச்சூரணம், மூன்று அன்சு; ஸ்குவிற்தூள், அமுனீயசத்தூள்¹⁶, வ கைக்கு ஒரு அன்சு; இச்சுப்பாணி¹⁷ போதியது. தூள்களைக் கலந்து இக்குப் பாணியையுஞ் சேர்த்துத் திரளையாக்கிக்கொள்ளவும்.

1 Diarrhoea. 2 Catarrh. 3 Chronic Bronchitis. 4 Tartarates of Antimony. 5 Hydrocephalus. 6 Olive oil. 7 Lard, டிடியம். 8 Emetic, எமெட். 9 Alterative. 10 Sherry wine. 11 Expectorant, எக்செடென்ட். 12 Diaphoretic, டைபேதென்ட். 13 Neuralgia. 14 Dysentery. 15 Sedative, சேடென்ட். 16 Ammoniacum. 17 Treacle தேறம்.

தேயம். ஐந்து கிறேன் முதற் பத்துக் கிறேன். காவிக்இருமல் முதலியவற்றுக்கு இது நல்ல எக்ஸ்பெக்துறம்.

இபிகாக்குவிலை. Ipecac Lozenges. கொள். இபிகாக்குத்தாள். தூற்றென்பது கிறேன்; சுத்த சர்க்கரை மாவாக, இருபத்தைந்து அன்சு; அகசிப்பிசின் மா¹ ஒரு அன்சு; அகசி முசிலாகு² இரண்டு அன்சு; திஸ்திலித்தநீர்³ ஒரு அன்சு, அல்லது போதியது. தூள்கள் எல்லாவற்றையுங் கலந்து சரிபதமான திரளையாய்வரத்தக்கதாய்ப் பிசின் பாணியையுந் தண்ணீரையுஞ்சேர்க்கவும். 720 வில்லைகளாகத் தட்டி மட்டான சூடுள்ள அறையில் உலர்த்தவும்.

தேயம். ஒன்று தொடக்கம் மூன்று வில்லை. ஒவ்வொரு வில்லையிலும் இபிகாக்குக் காற்கிறேன் இருக்கும்.

கோனிய⁴ கூட்டுக்குளிகையிலும் மாவிய இபிகாக்குவிலையிலும் இபிகாக்குச்சேரும்.

கம்பீர்ச்சேடி. GAMBIR PLANT.

வாசம். இது மலாயுலிலும் அடுத்ததீவுகளிலும் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. இதின் இலைகள் தளிர்களிலிருந்து வடியும் வெண் காசுக் கட்டியென்ற ஓர் பிசின். இது சதுரக் கம்பிகளாகவும், அக் கம்பிகள் ஒன்றித்த சிப்பங்களாகவும் வரும். கட்டிகள் ஒரு இஞ்சு பருமையும் வெளியிற் கபிலநிறமும் உள்ளே வெண்மையான செங்கல்நிறமுமாயிருக்கும். மண்கட்டிபோல் இலகுவில் உடையும். சுவை கைப்புங் கடுத்துவர்ப்பும்வழுவழப்புமாய்ப் பிறகு சொற்ப இனிப்புக் கொடுக்கும். சோதனைகள். சொத்தீரில் முற்றாய்க் கரையும். ஆறினபின் இயோதம்⁵ சேர்க்க நீலநிறமடையாது.

தன்மை, உபயோகம், ரசிதங்கள். வொதலை மரத்திலிருந்து எடுக்குங்கருங் காசுக்கட்டியைப் போலவே. ஆயினும் அதைப்பார்க்க இது அதிகஞ் சுறுக்குக் கரையும்.

ரசிதம். காசுக்கட்டி வில்லை. Catechu Lozenges. கொள். வெண் காசுக்கட்டி, தூளாக எழுதூற்றிருபது கிறேன். சுத்த சர்க்கரை மா, இருபத்தைந்து அன்சு; அகசிப் பிசின்மா, ஒரு அன்சு; அகசிமுசிலாகு, இரண்டு அன்சு; திஸ்திலித்த நீர் போதியது. காசுக்கட்டி, சர்க்கரைமா, பிசின்மா மூன்றையுங் கலந்து தகுந்த திரளையாகத் தக்கதாய் முசிலாகுந் தண்ணீருஞ் சேர்க்கவும். 720 வில்லைகளாகத் தட்டி வெப்பமான அறையில் மட்டான அனலில் உலர்த்தவும்.

தேயம். ஒரு வில்லையாவது கூடவாவது நாளிற் பலமுறை வழங்கலாம். ஒவ்வொரு வில்லையிலும் ஒரு கிறேன் காசுக்கட்டி இருக்கும். வாயிலீட்டு மெல்லக் கரையவிட்டால், குரற்கம்மலுக்கும் தொண்டை உண்ணுக்கு லசுணம்⁷ இளசுதலுக்கும் பல்லீற்று இளகல் புண்களுக்கும் வாயவியலுக்கும் நல்லது. தியறீயம்⁸ பைரோசி⁹க்கும், துவர் மருந்து வேண்டிய மற்ற நோய்களுக்கும் இவைகளை வழங்கலாம்.

அவாகடச்சீரக்துகள். Non-Officinal.

உயர்சின்கனம். விலாரி. Hymenodictyon Excelsum. Cinchona excelsa. இது இர்துவில் வடசர்க்கார்ச் சோலைகளிலும் சென்னையின் மற்றும் பகுதிகளிலும் வளரும் பெரியமரம். பட்டையின் உட்பகுதி சின்கன¹⁰

1 Gum Acacia. 2 Mucilage, பசின்பாணி. 3 Distilled. 4 Conium. 5 Iodum.

6 Acacia Catechu. 7 Tonic. 8 Diarrhoea. 9 Pyrosis. 10 Cinchona.

த்துக்குரிய கைப்புத் துவர்ப்பு உடையது. சப்பினவுடன் இதின் கைப்புச் சுறுக்குத் தோன்றாது ஆயினும் மேற்கொண்டையில் கெடுக நிற்கும். பட்டையின் மெதுவான வெளிப்பகுதிக்குச் சுவை மெத்த இல்லை. இந்த மரத்தின் வகுப்பையும் இதின் பட்டையின் தன்மைகளையும் பார்ச்சுமிடத்து இது நயந்த மருந்தாகக் கூடுமென்று விளங்கலாம். இந்துவுக்குரிய அந்திராடி¹ மருந்துகளை இனிமேல் ஆராயுமிடத்து இந்தப் பட்டையை முதற் கவனிப்பது தகுந்தது.

வட்டவிலைச்சால்மரம். *Nauclea Ovalifolia*. இது கிழக்கு வங்காளத்திலுள்ள காட்டுமரம். இதின் பட்டைக்குச் சின்கனத்துக்குச் சரியான கைப்பு உண்டாம். அப்பகுதியார் தங்களுட் காணும் காய்ச்சல் கழிச்சல்களுக்கு இதை வழங்குவார்கள். இதை இன்னும் ஆராய்வது நலம்.

மருக்காளஞ்சேடி. *Randia dumetorum*. இது இந்துவின் மிகுதியான பகுதிகளில் உண்டாகும். இதின் காய் வமனத்தன்மை யுடையதாதலாற் சுதேசிகளால் மெத்த மதிக்கப்படுகிறது. இதின் உபயோகத்தைப் பற்றிப் பிதிவைத்தியர் பின்வரும் முறையை இந்நூல் கம்மிற்றிமாருக்கு எழுதியிருக்கிறார். மருக்காளங்காய் கொட்டைப்பாக்களவு பருமையும் உருண்டையுமானது. இரண்டு அறைகளும் பல கொட்டைகளும் உள்ளது. கவிசின்²விளிம்பு, மூடியாய் நிற்கும். இதற்கு ஓர்வகையான இனிய உவட்டுமணமுண்டு. சிலநாளேக்கு வைத்திருந்த பழத்தில் மணம் அதிகப்படும். மைசூர்வீருக்கும் வறிய சனங்கள் இந்தப் பழத்தை வமனியாய் வழங்குவது வாடிக்கை. இது நிச்சயமாயுங் கெதியாயுஞ் சேஷ்டிக்குமாம். நானும் இதைப் பலமுறைகளிற் கொடுத்துப் பதினைந்து மினிவரையில் வாந்தியெடுக்கக் கண்டேன். இதின் தேயம் நன்றாய் நசித்த ஒரேபழம். தேவையானால் திருப்பவங் கொடுக்கலாம். இது அழற்றும் வமனி போலத் தோன்றுகின்றது. இந்தப் பழத்தை முன் கற்குத்தாவிலே சோதித்தவரையில் வமனியாக இதை மெத்த நம்பப்படாதென்று ஒஷானசி பண்டிதர் நினைத்தார். வயிற்றுக் கழிச்சலில் உவட்டிப்பை உண்டாக்குவதற்கு இதின் வேர்ப்பட்டைக் சவாயம் சுதேசிகளால் வழங்கப்படுகிறதென்று ஏன்ஸ்லி சொல்லுகிறார். இதன் காய்களைத் துவைத்துத் தண்ணீரிற் போட அதிலுள்ள மீன்கள் வெறித்துச் சாகவுங்கூடுமென்றும் இதினால் அந்த மீன்களை ஆகாதென்று விடுகிறதில்லைபென்றும் ரச்சபேகர் சொல்லியிருக்கிறார்.

கும்பை. *Gardenia lucida and gummifera*. இந்துவின் பலபகுதிகளிலுள்ள இந்த மரத்தினின்று ஓர் ராளம்³வடியும். அது சற்றே பச்சை நிறமான கட்டிகளாகவிருக்கும். அதிலே ராளத்தோடு, பட்டை, தடி முதலிய அசுத்தங்களுங் கலந்திருக்கும். இந்த ராளத்தால் மூடப்பட்ட மரத்தடிகளுங் கடைகளில் விலைப்படும். மணம் ஓர்வகையான கெட்ட மணம். புண்களில் ஈகள் விழாமற் காப்பதற்கு இது வைத்தியசாலைகளில் உபயோகமாய்க் காணப்பட்டது. அந்திஸ்பசி⁴யாகவும் சுதேசிகளால் இது அதிகமாய் வழங்கப்படும். ஆயினும் உண்மருந்தாக இதின் உபயோகத்தைப் பற்றி ஒன்றும் நம்பிக்கையாய்த் தெரியாது. சிதகங்கிலுள்ள சனங்களுக்கும்பைக் காயை விரேசனி, கிருமிகொல்லிகளாக வழங்குகிறார்களென்று ரச்சபேகர் சொல்லியிருக்கிறார்.

1 Antiperiodic, 2 Calyx. 3 Resin. 4 Antispasmodic.

மஞ்சீடீடி. *Rubia Cordifolia*. இதின் வேர், சாயங்காய்ச்சுவதற்கு அதிகமாய் வழங்கப்படும். இதில் மூன்று திரும்¹ வரைக்கு ஒருநாளிற் பல முறை உட்கொண்டால் அது நரம்புமண்டல²த்தில் அதிகமாய்த் தாக்கி அந் நேரத்துக்கு அலட்டு முதலிய குணங்களை உண்டாக்குமென்றும் சராயும ண்டலத்³தைக் குழப்புமென்றும் பிளேவார்வைத்தியர் சொல்லியிருக்கிறார். ம கமதியப்பெண்கள் பிரசவித்திருக்கையில் துவாலை குறைவாயிருந்தால் இந்த வேர்க்கஷாயத்தைச் குடிப்பார்களென்று ஏன்ஸ்லிபண்டிதர் சொல்லுகிறார்.

கீரிபுரண்டான். *Ophiorhiza Munghos*. இது இந்துவின் பல பகுதிக ளிலுள்ள சிறிய பல வாட்டைப் பூண்டு. இதின் வேர் கடுங் கைப்பான தென்றும் தொணிக⁴மாய்ச் சோதிக்கப்படத் தகுந்ததென்றும் ரைற்று வைத் திபரும் மறுபேருஞ் சொல்லியிருக்கிறார்கள். பாம்புகடி விசர்நாய்கடி முத லியவற்றுக்கு நல்ல மருந்தென்று சுதேசிகருக்குள்ளே இது மெத்தப் பேர் பெற்றிருந்தாலும் அதைப்பற்றி நம்பிக்கையானதொன்றுத் தெரியாது.

வலீரியானியங்கள்.

VALERIANEAE.

வலீரியன் பூடு. VALERIAN.

வாசம். யுரோபம் அடங்கலும் ஈரிப்பானிடங்களில் இது உண்டாகும். வாகடபகுதி. வேர். இது இரண்டுமூன்று இஞ்சு நீளமுள்ள ஏராளமா ன கூந்தல்களையுடைய குறுத்த, வெண்மஞ்சள் நிறமான, வேர்த்தண்டுகளா க வரும். கைப்புச் சுவையும் உறைத்த மணமுமுடையது. புது வேரின் மணம் நல்லதாயிருந்து, நெடுநாள் வைத்திருக்க நாற்றமாகும். வலீரியந் தேல்⁵ என்ற ஓர் அத்திரேனெண்ணெய்யே இதின் சத்து. மேலும் இதிலே வ லீரல்⁷ என்ற ஓர் தேலச்சத்தும் அடங்கியிருக்கும். இச்சத்துப் பரமாணு விலே அச்சிரிப்⁸பதால் வலீரியனிக்கமில்⁹மாக மாறும்.

தன்மைகள். ஸ்திமுலம்¹⁰, அந்திபிரூடி¹¹.

உபயோகம். இஸ்தேரி¹² நோய்க்கும் அதைச்சார்ந்த நோய்களுக்கும் இது உவந்த மருந்து. விசேஷமாய் இதின் வகுப்பைச் சேர்ந்த மற்றும் ம ருந்துகளோடு கலந்து கொடுத்தால் உவப்பு. எபிலெப்சி¹³ கொரீயம்¹⁴ என் ற நோய்களுக்கும் அந்த இனமான நோய்களுக்கும் இது அந்திஸ்பசி¹⁵யாக வழங்கப்படும். ஆயினும் நயங்காண்பது சந்தேகம். ஸ்திமுலமாக இது சு ரங்களின் பிற்கால்கள், அசத்துவமான தாபிதங்கள்¹⁶ முதலியவற்றுக்கு நய மென்று கண்டது.

தேயம். வேர்த்துளில் இருபது முதல் நாற்பது கிரேன் கொடுக்கலாம். ஆயினும் இந்தவிதமாய் இதைக் கொடுப்பதரிது. கொடுப்பதற்கு உத்தமமா ன இதின் அத்திர தேவில் மூன்று துளி முதல் ஐந்து துளிவரைக்குக் கொ டுக்கலாம்.

1 Drachm. 2 Nervous system. 3 Uterine system. 4 Tonic. 5 Valerian oil.

6 Volatile. 7 Valerole. 8 Oxidation. 9 Valerianic acid. 10 Stimulant.

11 Antiperiodic. 12 Hysteria. 13 Epilepsy. 14 Chorea. 15 Antispasmodic.

16 Inflammation.

ரசிதங்கள். வலீரியன் இன்ஹூசம். Infusion of Valerian. கொள். இடித்த வலீரியன் வேர், தூற்றிருபதுகிறேன்; கொதிவெந்நீர், பத்து அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் ஒரு மணிநேர மூறவிட்டுத் தெளிக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு; அந்திஸ்பசக்¹ கலவைகளுக்கு இது ஓர் நல்ல கூட்டு.

வலீரியன் ரஞ்சம். Tincture of Valerian. கொள். வலீரியன்வேர், பருக்கன் தூளாக. இரண்டரை அன்சு; புருவுசீது² அரைநாழி. அடைத்த பாத்திரத்தில் வலீரியன் வேரைப் பதினைந்து அன்சு சீதோடு இரண்டுநாளுறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கவும். பிறகு சியந்தனியில்³ இட்டு நீர் வடிந்தொழிந்தபின், மிச்சமான ஐந்து அன்சு சீதையும் விட்டு வடிக்கவும். அப்பாற் சக்கையைப் பிழிந்து அந்த நீரையும்வடித்து முன் வடித்த நீரோடு சலந்து அரைநாழிக்குப் போதிய சீதைக் கூட்டிக்கொள்ளவும்.

தேயம். ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திரும் கொடுக்கலாம்

வலீரியன் மோனரஞ்சம். Ammoniated Tincture of Valerian. கொள். வலீரியன் வேர் பருக்கன்தூளாக இரண்டரை அன்சு; அமோனசுகந்தசீது⁴, அரைநாழி. நன்றாய் அடைத்த சீசாவில் ஏழுநாளுறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கி, அப்பால் வடித்து, பிழிந்து வடித்து அரைநாழிக்குப்போதிய அமோனசுகந்தசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். முப்பது மினிம்⁵ முதல் ஒரு திரும் கொடுக்கலாம். பலவகையான இன்டேரிக்கு⁶ இது நல்ல அந்திஸ்பசியாகும்.

அவாகடச்சரக்குகள். Non-official.

இமயவலீரியன். Valeriana Hardwickii. இது இமயமலையின் உஷ்டணப் பகுதிகளிலுள்ள பூடு. வீரான மணமுள்ள இதின் வேர் நேபாளத்திலும் வடக்கிந்துவிலும் மருந்துக்கு வழங்கப்படும். முற்காலத்தார் சொன்ன Syrian Nard என்பது இதின் வேராயிருக்கவேண்டுமென்று அடம்ஸ் வைத்தியர் சொல்லுகிறார். அந்திஸ்பசியாக இதை ஆராய்வது நல்லது.

ஜடாமாசி. Nardostachys Jatamansi. இது இமயமலையிற் குமையூன் தொடங்கிச் சிக்கிம் வரைக்கும் உண்டாகிற பூடு. இதின் வேர் பெரும பயற்றங்காயளவு பருமையான குறுந் துண்டுகளாக வரும். இதின் ஒரு தலைப்பிலாவது முழு நீட்டிலுமாவது பருக்கனான கறுத்த மயிர்போன்ற கூந்தல்கள் நிறைந்திருக்கும். இது பச்சுவீ⁷த் தளிரையொத்த சுகந்த⁸மணமும் சுகந்த கைப்புச் சுவையுமுடையது. முன்னுள்ளோர் ஜடாமாசியென்றது இதைத்தானென்று ஜோன்ஸ் பண்டிதரும் ரோயல் பண்டிதரும் இதின் வேரையிட்டு மட்டிட்டார்கள். வலீரியனுக்குரிய அந்திஸ்பசத் தன்மைகள் இதற்குண்டென்று இதின் மணம் சுவை முதலியவற்றைக்கொண்டு எண்ணுவதற்கும். ஒஷானசி பண்டிதர் தாம் பண்ணிய சோதனைகளைக்கொண்டு இது பூரணமாய் வலீரியனுக்குப் பதிலாகுமென்கிறார். எபிலெப்சி¹⁰ இஸ்தேரி வலிகளுக்கு இந்தியர் இதை வழங்குவார்களென்று வீரி⁹ சொன்னதாக என்ஸலி குறித்திருக்கிறார். இந்த வகுப்பான நோய்களுக்கு இது செயலுள்ள மருந்தென்று எண்ண நியாயமுண்டு. சசருதம் என்ற ஆகப் பழய இந்திய வாகடத்தில் எபிலெப்சிக்குச் சொன்ன ஓர் மருந்திலே இது

1 Antispasmodic. 2 Proof spirit. 3 Percolator. 4 Aromatic spirit of Ammonia. 5 Minim. 6 Hysteria. 7 Patchouli. 8 Aromatic. 9 Valerian. 10 Epilepsy.

கூடுகின்றது. ஜடாமாசி வேர் ஐந்து அன்சும் புருவுசீது¹ ஒருநாழியும் வீதமாகக் செய்த ரஞ்சம்² வங்காள வாகடத்துக்குரியது. அதின் தேயம் ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திரும். அந்த நல்ல சரக்கை யின்னும் சோதிப்பது உத்தமம். இந்துதேசமடங்கலும் எக் கடைகளிலும் இதைச் சொற்ப கிரயத்துக்கு வாங்கலாம். கடைகளில் விற்கு மிச்சரக்கு மிகுதியாய்ப் பூச்சி துன்று பழுதாய்ப் போகிறபடியால் சோதனைக்கு நல்ல சரக்காய் வாங்க வேணும்.

கம்பசிதங்கள்.

COMPOSITAE.

சீமைச்சாமந்திப் பூடு. CHAMOMILE.

வாசம். இது யுரோபம் அடங்கலும் வெளியான மக்கிகொண்ட மைதா னங்கள் பொதுவான இடங்களில் உண்டாகும். இந்துவின் சில பகுதிகளிலுஞ் செய்யப்படும்.

வாகடபகுதி. பூக்கள். இவை ஒற்றையாயாவது இரட்டையாயாவது இருக்கும். ஒற்றையினத்தில் மஞ்சள் நிறக் குழலும் வெண் நிறக் கச்சும் போன்ற சிறிய பூக்கள் இருக்கும். இரட்டை இனத்தில் வெண்நிறக் கச்சுப்போன்ற சிறிய பூக்கள் மாத்திரம் இருக்கும். இவைகள் எல்லாம் கிண்ணம்போன்ற தகடான ஓர் முளையினின்று கிளம்பும். இரண்டு இனங்களும்கு விசேஷமாய் ஒற்றை இனம் கைப்பும் மெத்தச் சுகந்தமுமானவைகள். இதின் சத்துக்கள் பின்னாலும் வரும் அத்திரஎண்ணெய்யும் கைப்பான ஓர் எசு ருத்திவுமே.

தன்மை. ஸ்திமுல³ தொணிகம்⁴, காமினதி⁵.

உபயோகம். பெலவீனம், இஸ்தேரி, குன்மம், இவைகளுக்கும், சீரண உறுப்புகளினது அல்லது பொதுவாய் உடம்பினது தத்துவம் குறைந்திருப்பவர்களுக்கும் இது உதவும். முன்னே இது முறைச்சுரங்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்டாலும் சின்கன⁶மும்மற்றும் வீரன அந்திபிராடி⁷களும் இதற்குப் பதிலாகக் கொள்ளப்படுகின்றன.

ரசிதங்கள். சாமந்தியின்வூசம். Infusion of Chamomile. கொள். சாமந்திப்பூ, அரை அன்சு; கொதிநீர் பத்து அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில், பதினைந்து மினி⁸ ரேரம் ஊறவிட்டுச் சீலையில் வடிக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் ஒன்றரை அன்சு வரைக்கு நாள் இரண்டுமூன்று முறை தொணிகமாய்க் கொடுக்கலாம். வமனி மருந்துகளின் செயலுக்கு உதவியாக இந்தக் கஷாயம் பெரும்பாலும் இளஞ்சூட்டிற் கொடுக்கப்படும். சுளுக்கு முதலியவற்றுக்கு வமனருஷ⁹ மாகவும் வழங்கப்படும்.

சாமந்தித்தேல். Oil of Chamomile. இது சாமந்திப் பூவிற திஸ்திலிக்கும் எண்ணெய். புதுக்கச் செய்த எண்ணெய் வெண்ணிலநிறமாயாவது பச்சை நீலநிறமாயாவது இருக்கும். படிப்படியாய் மஞ்சள் நிறமடையும். பூக்களுக்குரிய மணமும் சுகந்த சுவையும் இதற்கு உண்டு.

தேயம். ஒருதுளி முதல் ஐந்து துளியைச் சர்க்கரையிலாவது இமல்ச¹⁰

1 Proof spirit. 2 Tincture. 3 Stimulant. 4 Tonic. 5 Carminative. வாயுக்களை.

6 Cinchona, 7 Antiperiodic, 8 Minute, 9 Fomentation, 10 Emulsion.

த்திலாவது விட்டுக் கொடுக்கலாம். குன்மத்தோடு கூடிய வாயுப்பொரும லுக்கும் வாயுப் பொருமலைப்பற்றிய குத்துக்கும் இதைவிட நயந்த மருந்து அரிது.

சாமந்தியேசுரத்து. Extract of Chamomile. கொள். சாமந்திப்பூ, ஒரு இரூத்தல்; சாமந்தித்தேல், பதினைந்து மினிம்; தண்ணீர் ஒரு கலன். தண்ணீர் அரைவாசியாய் வருந்தனையும் சாமந்திப் பூவை அவித்து, சீலையில் வடித்து வடித்த நீர் குளிகைக்குத் தருந்த பதமாய் வருந்தனையும் நீர்மத்திக த்தில்¹ அதை வறட்டிக் கடைசியில் சாமந்தித் தேலைச் சேர்க்கவும்.

தேயம். ஐந்து முதற் பத்துக் கிறேன். குன்மம் முதலிய நோய்களுக்குக் கொடுக்க மற்றும் தொணிகங்களுக்கு இது நல்ல துணைமருந்து.

[சாமந்திப்பூ இந்திய கடைகள் மிகுதியானவற்றில் வரும். யுரோப சாமந்திப் பூவுக்கு இது நல்லபதிலாகும்.]

சந்துனின்பூடு. SANTONICA.

வாசம். ருசியம் என்பதே எண்ணம்.

வாகடபகுதி. சிறுக் கொட்டையைப் போன்ற மலராத பூமுகைகள். இவைகள் ஒரு லீனுக்குக் கதித்த நீளமும் அரை லீன் அகலமும், நுண்ணிய நெல்மணிச் சாங்கமுமாய் இரு தலைப்பும் மழுங்கி வெண் பச்சையான கபிலநிறங்கொண்டு அழுத்தமாயிருக்கும். இவைகள் பச்சையான நடுப்பு ருவமுள்ள நுண்ணிய கவிந்த சுருண்ட மடல்களையும் அவைகளுக்குள்ளே குழலான நாலு ஐந்து பூக்களையும் அமைத்திருக்கும். மணம் வீரூனது; சுவை கைப்பும் கர்ப்பூரம் போன்றதுமாகும். சோதனை. பூமுகைகள் உருண்டையல்ல. மயிருள்ளவைகளும்ல்ல. இதினால் இதை வல்காரி ஆர்திமீசி² அப்சிந்திய ஆர்திமீசி³ என்ற பூண்டுகளின் பூமுகையல்லவென்று அறியலாம். இதின் சத்துப் பின்வருஞ் சந்துனின் என்ற கிரிஸ்த⁴லான தடஸ்த⁵ பொருளே.

தன்மை. அந்தெல்மிந்தி⁶.

தேயம். ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திருமை ஒரு இரவும் மற்றநாட்கா லமேயுங் கொடுத்து நாலேந்து மணித்தியாலமானபின் விரேசனங் கொடுக்கவேணும்.

ரசிதம். சந்துனின். Santonin. இதைக் குறிக்குஞ்சின்னம் கா¹⁵ ஐ¹⁸ அ³. இது சந்துனின்பூண்டிலிருந்தெடுக்குங் கிரிஸ்தலான தடஸ்தசத்து. இது நிறம்ற்ற தட்டையான ரம்பம்⁷ என்ற வடிவையுடைய பிரிசங்⁸களாகவிருக்கும். சற்றே கைப்புள்ளது, மட்டானசூட்டுக்கு உருகி குடிபோகக்கூடியது, சொற்பகுட்டிற் பஸ்மமாகும். தண்ணீரிற் கரைவதரிது. கொதிநீரிற் சொற்பமாய்க் கரையும். குலோறுவா⁹மிலுங் கொதிக்கிற திட்டசீதி¹⁰லும் தாராளமாய்க் கரையும். வெய்யிற்படமஞ்சள்நிறமடையும். சிருசமினிறலமில்ங்க¹¹ளிற் கரையாது. பரமானுவோடு செஞ்சூடுபட இது முற்றாய் அழிந்துபோகும்.

தன்மை. அந்தெல்மிந்தி.

உபயோகம். கீரைப் பாம்புகளைக் கொல்லுவதற்கு இது சீக்கரத்தில்

1 Water-bath. 2 Artemisia Vulgaris. 3 A. Absinthium. 4 Crystal, 5 Neutral, 6. Anthelmintic, உருமெல்ல. 7 Rhomb. 8 Prism. 9 Chloroform, 10 Rectified spirit, 11 Diluted Mineral acid.

நன்றாய்ச் சித்திக்கும். இக் கிருமிகள் குடலில் இருப்பதைப்பற்றியுண்டாகிற கொரியம்¹ இஸ்தேரி² யென்ற நோய்களுக்கும் குழப்பமான மற்றும் வலிகளுக்கும் இது உவந்தது. இதைத் தின்றபின் பார்வை மஞ்சள்நிறமாவதைப் பிடித்து அமரோசி³க்கும் மற்ற நயனரோகங்களுக்கும் இது வழங்கப்பட்டாலும் நயமுண்டாகவில்லை. முறைச் சுரங்களுக்குக் கினியத்⁴துக்குப் பதிலாக இது கொடுக்கப்பட்டாலும் நயங்கண்டது சந்தேகம்.

தேயம். நாலுவயதுக்குட்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு இரண்டு கிறேன் முதல் நாலு கிறேன் கொடுக்கலாம். பன்னிரண்டு வயசுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு ஆறு முதல் எட்டுக்கிறேன் கொடுக்கலாம். சமபங்கு சர்க்கரையோடாவது, சர்க்கரைப் பாணியோடாவது கலந்து கொடுக்கவும். ஒரு இரவும் மற்றநாட் காலமேயும் ஒவ்வொரு தேயங் கொடுத்துச் சில மணிவேளையால் ஒரு தேயம் ஆமணக்கெண்ணெய் கொடுப்பதே உத்தமமான முறை.

ஆணிகப்பூடு. ARNICA MONTANA.

வாசம். யுரோபத்தின் மையப்பகுதி தென்பகுதி மலைகளில் இப்பூடு உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. வேர். இது ஒரு இஞ்சு முதல் மூன்று இஞ்சு - நீளமும், இரண்டு மூன்று லீன் பருமையுமாய்த் திரண்டு முறுகின வேர்த் தண்டுகளாக வரும். காய்ந்து விழுந்த இலைகளின் தழும்புகளால் முரணாகும். ஏராளமான நீண்ட மெல்லிய கூந்தல் இதில் இருக்கும். ஓர்வகை மணமும் காரமான சுவையுமுடையது. ஆணிகின்⁵ என்ற ஓர் அல்கலைவ⁶மும் சைதின⁷னைப் போன்ற கைச்சற்காரமான ஓர் எசுரூத்திவு⁸மே இதின் சத்துக்கள்.

தன்மைகள். ஸ்திமுலம்⁹. அதிதேயத்தில் மயக்கழற்சி¹⁰ நஞ்சு. வெளியிற் பூசிஞற் செரதீவ¹¹மும் ரிசோல்வெனு¹²மாகும்.

உபயோகங்கள். சோர்வுகள், சன்னிச்சுரங்கள், அசத்துவ திசந்தெரி¹³, அமரோசி, முதலிய நோய்களுக்கு இது நயந்ததென்று கொடுக்கப்படும். ஆயினும் பிறித்தனி வைத்திய முறைப்படி சுளுக்குகள், நசிவுகள், நோக்களுக்குப் பூச்சுமருந்தாக மாத்திரம் இதின் ரஞ்சத்தை வழங்குகிறார்கள்.

தேயம். வேர்த் தூளில் ஐந்து கிறேன் முதற் பத்துக் கிறேன் கொடுக்கலாம்.

ரசிதங்கள். ஆணிகரஞ்சம். Tincture of Arnica. கொள். ஆணிக வேர், பருக்கன் தூளாக, ஒரு அன்சு; திட்டசீது¹⁴, அரைநாழி. மூடியபாத் திரத்தில் ஆணிக வேர்த்தூளைப் பதினைந்து அன்சு சீதில் இரண்டுநா னுறப் போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கவும். பிற்பாடு சியந்தனி¹⁵யில் வார்த்து நீர் வடிந்தொழிந்தபின் மிச்சமாயிருக்கிற ஐந்து அன்சு சீதையும் வார்த்து வடியவிடவும். அப்பாற் சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து இரண்டு நீர்களையுங்கலந்து அரைநாழிக்குப் போதிய சீதைக் கூட்டவும்.

தேயம். ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திரங் கொடுக்கலாம். வெளிப்பூச்சே இதின் முக்கியமான வழக்கம்.

1 Chorea. 2 Hysteria. 3 Amaurosis. 4 Quinia. 5 Arnicine. 6 Alkaloid. 7 Cytisin. 8 Extractive. 9 Stimulant. 10 Narcotico-irritant. 11 Sedative, சந்தனி. 12 Resolvent. 13 Dysentery. 14 Rectified spirit. 15 Percolator.

தரக்கப் பூடு. TARAXACUM.

வாசம். இந்தப் பூடு யுரோபமடங்கலும் மத்திம ஆசியத்திலும் உண்டாகும். இமய மலையடங்கலும் மிகுதியாயுண்டு. இந்நூலிற் செய்கைபண்ணப்படும்.

வாகடபகுதி. வேர். இது மாசி முதற் புரட்டாசி வரைக்குங் கிண்டப்படும். இது மூல வேர்ச் சாங்கமானது, அழுத்தமானது, வெளியிற் கருங் கபிலநிறம். உள்ளுக்கு வெண்மை, இலகுவில் முறியும். முறிக்க, மணமற்ற கைச்சலான பால் இதில் வரும். காற்றுப் பட இந்தப் பால் வெண்கபிலநிறமாகும். அதின் இலைகள் பிடித்திருக்கில் அவை வாள்போன்று மெத்த அழுத்தமாயிருக்கும்.

தன்மை. அல்தறவ தொனிகம்¹, பித்தக்கினி².

உபயோகம். அசீரணத்துக்கும், காலிகமான ஈரல்நோய்களுக்கும் விசேஷமாய் ஈரலின் தொழிற்சுணக்கம், கஞ்செஸ்தம்³, செங்கண்மாரிகளுக்கும், இது கொடுத்து நயங்கண்டது. குடற்பிசகு ஈரற்பிசகுகளோடு கூடிய காலிகமான சருமநோய்களுக்கும் இது நல்லது.

ாசிதங்கள். தரக்கக்காகீதம். Decoction of Taraxacum. கொள். காய்ந்த தரக்க வேர் நறுக்கி இடித்து ஒரு அன்சு; தண்ணீர் அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்திற் பத்துமினி நேரம் அவித்து வடித்து வடித்த நீர் அரை நாழியாய் வரப் போதிய திஸ்திவித்த⁴ நீரை வடியிலுள்ள சக்கையின் மேல் வார்க்கவும்.

நேயம். இரண்டு முதல் நாலு அன்சு கொடுக்கலாம்.

தரக்ககவேசிறத்து. Extract of Taraxacum. கொள். பச்சைத் தரக்க வேர், நாலு இருத்தல். வேரைத் துவைத்துப் பிழிந்து சாற்றை அடையவிட்டுத் தெளிந்த நீரை 212 பாகை சூட்டிற் காய்ச்சிப் பத்துமினி வரைக்கு அச்சூட்டிலிருக்க விட்டிருந்து சீலையில் வடித்துக் குளிகைக்குத் தகுந்த பதமாய் வருந்தனையும் 160 பாகைக்குக் கதிக்காத சூட்டில் நீர்மத்திகத்⁵ தில் வறட்டவும்.(13)

நேயம். பத்து முதல் முப்பது கிறேன். நாள் மூன்று நாலுமுறைகொடுக்கலாம். அதிகமாகவுங் கொடுக்கலாம்.

தரக்ககச்சாறு. Juice of Taraxacum. கொள். பச்சைத் தரக்கவேர், ஏழு இருத்தல்; திட்டசீது⁶ போதியது. தரக்க வேரைக் கல்லுரலிற் துவைத்துச் சாற்றைப் பிழிந்து மூன்று பங்கு சாற்றுக்கு ஒருபங்கு வீதமாய்ச் சீதுசேர்த்து ஏழுநாள் வைத்திருந்தபின் வடித்து குளிர்மையான இடத்திற் பேணவும்.

நேயம். ஒரு திரும் முதல் மூன்று திரங் கொடுக்கலாம்.

லக்தாகம் LACTUCA VIROSA. LETTUCE.

வாசம். இப்பூண்டு யுரோபத்திலுண்டாகும்.

வாகடபகுதி. பூக்கும்பூடு. பின்னால் வரும் எசிறுத்து இதிலிருந்தெடுப்பதால் இது வாகடபகுதியாகின்றது.

1 Alterative tonic. 2 Cholagogue. 3 Congestion சஞ்சயம். 4 Distilled.
5 Water-bath. 6 Rectified spirit.

ரசிதம். லக்தூகவெசிஹத்து. Extract of Lettuce. கொள். பூக்கிற லக்தூகப் பூடு, தூற்றுப் பண்ணிரண்டு இருத்தல். கல்லுரலிற் துவைத்துச் சாற்றைப் பிழிந்து, 130 பாகை வரைக்கும் படிப்படியாய்க் காய்ச்சி, பச்சையான நிறப் பதார்த்தத்தைக் காரிக்கம்புடைவையில் வடித்து வேருக்கவும். வடித்த நீரை அல்புமினை¹ உறைவிப்பதற்கு 200 பாகை சூட்டிற் காய்ச்சி மறுபடியும் சீலையில் வடிக்கவும். அப்பால் அது மெல்லிய பாணிப் பதமாய் வருந்தனையும் நீர்மத்திகத்² தில்வறட்டி, அதின்பின் முன் வேருயெடுத்துவைத்த பச்சையான நிறப்பதார்த்தத்தையுங் கூட்டி முழுவதையுந் திறமாய்க் கலக்கி குளிகைக்குத் தருந்த பதமாய் வருந்தனையும் 140 பாகைக்குக் கதிக்காத சூட்டில் வறட்டவும்.

தன்மை. தண்மையான செரதிவம்³, அனுடைன்⁴, அந்தின்பசி⁵.

உபயோகம். கசம். புறங்கீது⁶, ஈளை, குக்கல்களில் இருமலைத் தணிப்பதற்கு இது வழங்கப்பட்டும் நயங்கண்டது சந்தேகம். மேலும் வாதம் பைத்தியம் விந்துக்கழிச்சல், நீர்க்கோவை முதலியவற்றுக்கும் இது கொடுக்கப்படும்.

தேயம். ஐந்து முதல் இருபது கிறேன்.

[கற்குத்தாவிற் செய்த ஓர் லக்தூகவெசிஹத்தைத் தாம் சோதித்துப் பார்த்ததாகவும் ஆறு கிறேன் தேயத்தில் அது நல்ல அனுடைனாகிறதாகவும் ஒஷானசி பண்டிதர் சொல்லியிருக்கிறார். இந்துவில் இச்சரக்கின் பிரயோகத்தைப்பற்றி கிறகம் பண்டிதர் நயப்பான சில குறிப்புகள் சொல்லியிருக்கிறார்.]

அக்கிராக்காரம். PELLITORY OF SPAIN.

வாசம். இது வட ஆபிரிக்கத்திலுண்டாகும். அங்கிருந்து தென் யுரோபத்துக்குங் கொண்டுபோகப்பட்டது.

வாகடபகுதி. வேர். இது மினுக்கமான கறுத்தப் புள்ளிகள் வீழ்ந்த தடித்த கபிலநிறப் பட்டையால் மூடப்பட்டதாய்ச் சின்ன விரலளவு நீளம் பருமையுள்ள துண்டுகளாக வரும். ராளம்⁷ போல முறியும். உள்ளே மையம் நோக்கிய வரைகள் காணும். சப்பினால் நா, உதிகளிற் சுணைத்துக்காரும். இதின் சத்து பைரீதிரீன்⁸ என்ற காரமான ராளத்திலிருக்கும்.

தன்மை. ஸ்திமுலம்⁹; தோலில் அணைத்தால் அழற்றிச் சிவக்கப்பண்ணும்.

உபயோகம். பற்கொதி, உண்ணாக்கு, தன்சில்கள் இளகுதல் சிலவகையான குரவின்மை, நாச்சோர்வு இவைகளுக்கு இதைத் தானிக¹⁰ மாயிட்டால் நயங்காணும்.

ரசிதம். அக்கிராக்காரஞ்சம். Tincture of Pellitory. கொள். அக்கிராக்காரவேர், பருக்கன் தூளாக, நாலு அன்சு; திட்டசீது¹¹ அரைநாழி. அடைத்த பாத்திரத்தில் அக்கிராக்கார வேரைப் பதினைந்து அன்சு சீதிலே போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கி இரண்டுநாளுறவிடவும். அப்பாற் சியந்தனி¹²யில் இட்டு நீர் ஒழுக்கித் தீர்ந்தபின் சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும் விட்டு வடிக்கவும். அப்பாற் சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து நீர்களைக் கலந்து அரைநாழிக்குப் போதிய திட்டசீது சேர்க்கவும்.

¹ Albumen. ² Water-bath. ³ Sedative. ⁴ Anodyne. ⁵ Antispasmodic. ⁶ Bronchitis. ⁷ Resin. ⁸ Pyrethrin. ⁹ Stimulant. ¹⁰ Local ¹¹ Rectified spirit.

¹² The percolator.

இது விசேஷமாய் பற்கொதிமுதலியவற்றுக்கு இடப்படும்.

[அக்கிராக்கார வேர் இந்துவின் பெரிய கடைகளில் மிகுதியானவற்றில் வரும். இது அரபியிலிருந்து வம்பாய்வழியாய் வந்திருக்கவேண்டும்.]

அவாகடச்சரக்குகள். Non-Officinal.

காட்டுச்சீரகம். *Vernonia anthelmintica*. இது இந்துவடங்கலும் கிராமங்களையடுத்த காட்டிடங்களில் உண்டாகும். எக்கடைகளிலும் வாடிக்கையாய்க் கிடைக்கும். இதின் கொட்டை அரைக்கால் இஞ்சு நீளமுடிகருங் கபிலநிறமுமாய் ஐதான வெண்மயிரால் மூடப்பட்டுத் திரண்டு, அடி கூராயிருக்கும். வெளிநிலான புருவங்கள் பத்துவரையில் நெடும்பாட்டுக்குண்டு. குறுகின கபிலநிறமான தகடாகிய வேர் வளையம் நுனியிலிருக்கும். சுவை உவட்டிப்பான கைப்பு. இக்கொட்டை கீரைப்பாம்பைக் கொல்லுமென்று சுதேசிகருக்குள்ளே பெரும்பெயருண்டு. இதைக் கொடுக்கக் கீரைப்பாம்புகள் செத்துக் கழியுமென்று சொல்லப்பட்டிருப்பதால் இவைகளில் அது விசேஷமாய்ச் சேஷ்டிக்கிறதென்று விளங்குகின்றது. இடித்த கொட்டையில் ஒன்றரைத் திரும் உரைக்குத் தேனிற் குழப்பி, இரண்டு தேயமாக்கிச் சிலநாளிகைக்கு முன்னும் பின்னுமாய்க் கொடுத்து பிற்பாடு ஓர் விசேஷனங் கொடுப்பதே முறை. இடித்த கொட்டையில் பத்துமுதல் முப்பது கிறேனைக் கஷாயங்காய்ச்சிக் கொடுத்தால் கீரைப் பாம்பைக் கொல்லுவதற்கு நிச்சயமான நல்ல மருந்தாகுமென்று ரோசுவைத்தியர் சொல்லுகிறார். இத்தன்மையை இன்னுஞ் சோதிப்பது நல்லது. திருவாளங்கோட்டில் இக் கொட்டையை எலுமிச்சஞ் சாறுவிட்டுப் பசையாய்நரத்துப் பேன்கொல்லியாய் வழங்குவார்கள். கிப்சன் வைத்தியர் இதைத் தாமே சோதித்துக் கண்டவரையில் இருபது இருபத்தைந்து கிறேன் தேயத்தில் நல்ல தொணிக¹மும் ஸ்தொமாகி²யுமாகுமென்று எண்ணுகிறார். இதற்கு அமுரிதித்தன்மை³யுமுண்டென்று குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

மாசிபத்திரி. *Artemisia Indica*. இது இந்துவின் மலைகளிற் சாதாரணமாயுண்டாகும் பூடு. வல்காரி ஆர்சமீசி⁴ப் பூண்டின் மணஞ் சுவைக்கு வித்தியாசமல்லாத இதின் வீரன சுகந்த மணமும் கைப்புச் சுவையும், இதற்கு ஸ்தொமாகித்தன்மை தொணிகத்தன்மைகள் உண்டென்று காட்டும். இப்பெயர்ப்பட்ட தன்மை இதற்குண்டென்று தென்னிந்துவின் சனங்கள் எண்ணுகிறார்களென என்ஸ்லிபண்டிதர் சொல்லியிருக்கிறார். பெலவீனத்தோடுகூடிய சிராநோய்கள்⁵ ஸ்பசு⁶ நோய்களுக்கு இதின் இலைகளும் தளிர்களும் கொடுக்கப்படுகின்றனவென்றும் காதனப்⁷ புண்களுக்கு இவற்றின் கஷாயம் வமன்றாஷ⁸மாய் வழங்கப்படுகிறதென்றும் வைற் பண்டிதர் சொல்லுகிறார். இலைகள் முகைகளின் கஷாயம் நல்ல லேசான ஸ்தொமாகி தொணிகமென்று ஸ்துவாட்டு பண்டிதர் சொல்லுகிறார்.

கூர்லைப்பேர்த்லோசம். *Berthelotia lanceolata*. இது சிந்து பஞ்சாப்புக்கும் மத்திய இந்துவின் மழை குறைந்த பகுதிகளுக்குமுரிய பூடு. இதின் இலை சுகவிசேனி. இது நிலவாகைக்கு உத்தம பதிலாகுமென்று

1 Tonic. 2 Stomachic. 3 Diuretic. 4 Artemisia Vulgaris. 5 Nervous.
6. Spasmodic. 7 Phagedenic ulcer. 8 Fomentation.

காலஞ்சென்றுபோன வல்கனர் சொல்லியிருக்கிறார். இது பெருகளர்வா¹வின் இலையைப் போலத் தோற்றும்.

பேரும்பூநோதோனி. *Notonia grandiflora*. இது சென்னையிற் கல்மேட்டிலுண்டாகும். இதிலே செண்டுநோதோனி *N. Corymbosa* என்றது பல பூவுள்ள ஒருவகை. இது ஐரோப்பியென்ற பயங்கர நோய்வராமற் றடுக்கும் மருந்தென்று 1860 ஆண்டு கிப்சன் வைத்தியரால் வெளிவிடப்பட்டது. இதைக் கொடுக்கும் வகையாவது: பச்சையான காய்களில் நாலு அன்சு வரைக்கு எடுத்து அரைநாழி தண்ணீரில் ஒரு இரவைக்கு உலரவிட்டுப் பிழிந்தால் பிசுபிசுப்பான சாறு கொஞ்சம் வரும். அதை அந்தத் தண்ணீரோடு கலந்து கொடுக்கவும். இன்னுங் கொஞ்சச் சாற்றை மாவோடு சேர்த்துத் திரளையாக்கி அன்று சாயங்காலங் கொடுக்கவும். இந்த மருந்துகளை இப்படி மூன்றுநாள்க்கு அடுத்துக் கொடுக்கவும். விசர்நாய் கடித்த பலருக்கு இந்த மருந்து கொடுத்துச் சோதிக்கப்பட்டதென்று, கிப்சன் வைத்தியர் அதிகார ஏவலின்படி எழுதினவற்றால் விளங்குகின்றது. ஆயினும் விசர்நாய் கடித்த அனேகருடைய காயத்துக்குக் காரமும் போட்டபடியால் அந்நோய் வராமற் காப்பதில் இம்மருந்தின் சித்தி எவ்வளவென்று பகுத்தறிவது பிரயாசம். இன்னுஞ் சோதித்தால் அறியலாம்.

ககாலிக்லைனிப்பூடு. *Cacalia Kleinia*. இந்தப் பூண்டிலிருந்துண்டாகிற சரக்கே குசபான் என்னும் பேருடன் கடைகளில் விலைப்படுவதென்று என்ஸ்லி பண்டிதரும் அவருக்குப் பின் இந்தியபதார்த்தசாரத்தை எழுதியிருப்பவர்களும் எண்ணுகிறார்கள். இதில் இரண்டு பிழையிருக்கவேண்டும். 1 லீனியஸ் சொல்லுகிற *C. Kleinia* என்பது இந்துவில் அல்லக் கறரித் தீவிலுள்ள ஓர் பூண்டு. 2 குசபான் என்ற இலையும் பூவுமான சரசு முடிசெனீவு என்பவரார் கம்மிற்றிமாருக்கு அனுப்பப்பட்டபோது அது எகியம் என்ற மரத்திலுண்டாகிறதென்று வைற்று தம்சன் பண்டிதர்கள் அதைப்பற்றி நிதானித்தார்கள்.

அயப்பனை. *Eupatorium Ayapana*. இது தென்னமரிகத்துக்குரிய பூண்டு. இந்து, யாவம், இலங்கைகளின் பல பகுதிகளில் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சொற்ப வேற்றுமையுடன் அயப்பனையென்ற பிரேசிற்பெயரார் பொதுவாய் வழங்கும். பூண்டு முழுவதும் சொற்ப கைப்புத்து வர்ப்புச் சுவையுடன் கூடிய சுகந்த முடையது. இதின் சயத்தைப்பற்றி முன்கொண்டிருந்த பெருமெண்ணங்கள் ஒழிந்தன. ஆயினும் இது நல்ல ஸ்திமுலம்³ தொணிகம்⁴ சுவேதனி⁵ யென்று நம்ப நியாயமுண்டு. மோரீசு தீவிலுள்ள மருந்துப் பூண்டுகளுள் இதுவும் முதன்மையானதாய், குன்மம் மற்றுங்குடல்கள் சுவாசப்பைகளின் நோய்களுக்குக் கஷாயமாக அங்கே நாள் தோறும் வழங்கப்பட்டதாக புதானர் எழுதியிருக்கிறார். அத்தீவில் 1854ம், 1856ம் ஆண்டுகளில் உண்டாகிப் பரம்பிய வாந்திபேதியில் தேக அனல் மந்த இரத்தாட்டம் முதலியவற்றை அருட்டுவதற்கு இது அதிகமாய் வழங்கப்பட்டது. பாம்பு கடிக்கு மாற்றாக இது உள்ளுக்கும் வெளிக்கும் வழங்கிச் சித்திபெற்றதாம். இதின் துவைத்த இலை, நாற்றமான கெட்ட புண்களுக்குத் தாமறிந்தவரையில் உத்தமமருந்தென்று என்ஸ்லி சொல்லியிருக்கிறார். புதானரும் நயமென்கிறார். இலையின் திகாக்தம்⁶ வமன்றாஷ⁷த்

1 *Salvadora Indica*, 2 *Hydrophobia* 3 Stimulant, தீவனி. 4 Tonic 5 Diaphoretic.
6 Decoction. 7 Fomentation.

துக்கு நல்லது. இந்தப் பூண்டு நயந்ததானாலும் அசட்டைபண்ணப்பட்டிருக்கிறதுபோற் தோற்றுகின்றது.

கோஷ்டம். *Aplotaxis auriculata*. இது இமயமலையின் வடமேற்குப் பகுதிகளிலுண்டாகும் பூடு. முன்னுள்ளோர் கஸ்தஸ் அரபிகசு என்று சொன்னது இதைத்தானென்று வல்கனர் முதன்முதற் காட்டினார். ரையில வைத்தியரும் இந்துக் கடைகளில் இதை முன்னமே மட்டிட்டிருந்தார். ராசவறம் என்ற இடத்தில் அவின் உண்டாக்கப்படமுன் இந்த வேர் ஸ்திமுல¹மாக அதிகமாய்ப் புகைக்கப்பட்டதென்றும் இப்படிப் புகைக்கையில் மஸ்தாகிறதென்றும், புகைக்கிறதற்காக முன்னே சினத்துக்குக் கனமாய் ஏற்றப்பட்டதென்றும், ஏர்வின் பண்டிதர் சொல்லியிருக்கிறார். இதின் வாசனை, சிலைக் கட்டுகளைப் பூச்சியரியாமற் காக்கும்.

சாமந்தி. *Chrysanthemum Roxburghii*. இது இந்துதேசமடங்கலுந் தோட்டங்களில் உள்ள பூடு. இதின் காய்ந்த பூவைச் சப்ப நாவில் ஒருவகையாய் உறைக்கும். இப் பூக்கள் மருந்துகளிற் சீமைச் சாமந்திப் பூவுக்குப் பதிலாகுமென்று தல்செல், கிப்சன் பண்டிதர்கள் சொல்லுகிறார்கள். இதின் வேர் அக்கிராக்கார² வேரைப் போல உறைக்கும்; அதற்காக இதை வழங்கலாம். தெக்கண தேசத்தார் கனுறீய நோய்க்கு இப்பூண்டை மிளகோடு கூட்டிக் கொடுக்கிறார்கள்.

பெரும்பிளூமியப்பூடு. *Blumea grandis*, இது பிரமதேசத்திலுள்ள பாழ்நிலங்களில் வராளமாயுண்டாகும். சில வருஷங்களுக்கு முன்னே ஒர்லியென்பவர் இதிலிருந்து நூறு இரூத்தலுக்கதிகமான கர்ப்பூரம் எடுத்தார். அது சீனதேசத்திலிருந்து வருங் கர்ப்பூரத்துக்குச் சரியானதென்று கற்குத் தாலிலுள்ள அதிகாரிகள் தீர்த்தார்கள். ரீன் வைத்தியர் பிரமதேசத்தில் இப்பூண்டைச் சோதித்துப்பார்த்தவரையில் அவ்வளவு கர்ப்பூரம் இதிலிருந்து வரக்கூடியது சந்தேகமென்கிறார்.

பிளூமியபல்சப்பூடு. *Blumea balsamifera*. மலாக்கா இலங்கைத்தீவுகளிலும் இந்தவின் பல பகுதிகளிலுமுள்ள இந்தப் பூண்டு வீரான கர்ப்பூரமணமும் கார்ப்பான சுவையுமுடையது. குடான இதின் கஷாயம் அதிகமாய் வேர்க்கப்பண்ணுமென்றும், யாவகர் சினருக்குள்ளே இது எக்ஸ்பெக்து³மாய்ப் பெரும்பாலும் வழங்குகின்றதென்றும், அஷ்வீல்டி வைத்தியர் சொல்லியிருக்கிறார். சமறங்கில் வைத்தியர் செய்கிற யுரோப வைத்தியர் சிலர் தாங்கள் கதார்⁴ நோய்களுக்கு இதை வழக்கமாய்க் கொடுத்திருக்கிறோமென்று அஷ்வீல்டருக்குச் சொல்லியிருந்தார்கள். கொச்சின்சினத்தில் இது ஸ்தொமாகி⁵ அந்திஸ்பசி⁶ எம்மெனகக்காக⁷ வழங்குகிறதென்று லுறைருசொன்னார்.

கரிசலாங்கண்ணி. *Eclipta prostrata*. இது இந்துவடங்கலும் ஈரமான இடங்களிலுள்ள பூண்டு. இதின் லேருக்கு விசேசன வமனத்⁸தன்மைகள் உண்டாம். ஈரல் பிளிகைகளின் நோய்களுக்கும் நீர்க்கோவைக்கும் இது கொடுக்கப்படுகிறதென்று சிமிது வைத்தியரும் வட்டரும் முடினசெரீவு, ஐயாசவாமியென்ற சுதேச வைத்தியருங் குறித்திருக்கிறார்கள். வட்டர் தாம் இதின் தன்மையைப்பற்றி அறிந்தவரையில் ஈரல் நோய்களுக்குத்

1 Stimulant, தலை. 2 Pyrethrum. 3 Expectorant கசேடவனி. 4 Catarrh. 5 Stomachic, சேசனி. 6 Antispasmodic, 7 Emmenagogue, 8 Emetic. 9 Spleen,

தரக்க¹த்தைப்பார்க்க இது அதிகம் உபயோகமானதாய்க் காணப்படுமென்கிறார். சாற்றைப் பிழிந்துகொடுப்பதே உத்தமமான முறையாகும்.

லோபீலியாசியங்கள்.

LOBELIACEAE.

லோபீலிப்பூடு. LOBELIA.

வாசம். வட அமரிசத்திற் கனடம் துவங்கி கருலீனம் வரைக்கு இது உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. பூக்கும்பூடு. இது பெரும்பாலும் நீண்ட சதுரமான கட்டுகளாக இங்கிலந்துக்கு ஏற்றப்படும். இதின் லட்சணங்களாவன: தாள் கோணம் விழுந்தது; இலைகள் முட்டை வடிவும், கருக்கானதும், கீழ்வளத்தில் மயிருள்ளதுமாய்க் காம்பிலே மாறி மாறி ஒன்றைவிட்டொன்று ஒழுங்காய் நிரைந்திருக்கும். பொத்தி முட்டைவடிவாய் ஊதிப் பத்துப் புருவங்கள் உள்ளதாயிருக்கும். மணங் கேட்ட உவட்டு மணம். சுவை கார்ப்பும் எரிவுமானது. இதின் சத்துக்கள் ஓர் அத்திர²எண்ணெய்யும் லோபீலீன்³ என்ற கார்ப்பான அல்கலைப்⁴ பதார்த்தமுமே. இவைகளைத் தவிர இலே கார்ப்பான ஓரிராள்⁵மும் லோபீலிக்கமிலம்⁶ என்ற ஓர் அமிலமும் அடங்கியிருக்கும்.

தன்மை. இது வமனி⁷ செரதீவம்⁸, சுவேதனி⁹, எக்ஸ்பெக்துறம்¹⁰, அந்திஸ்பசி¹¹, பெருந்தேயத்தில் வீரான மயக்கழற்சி¹²நஞ்சு.

உபயோகம். ஸ்பசுநை¹³, அஞ்சினபெக்துசு¹⁴, குக்கலின்காலிகபாதம்¹⁵, காலிகபுறங்கீது¹⁶, நுமோனி¹⁷இவற்றில் இது இருமல் முட்டைத் தணித்துச் சளியை இளக்கி மெத்த உபயோகமானதாகும்.

தேயம். இலைத் தூளில் ஒரு கிறேன் முதல் ஐந்து கிறேன் கொடுக்க செரதீவம், சுவேதனி, எக்ஸ்பெக்துறமாகும். பதினைந்து முதல் இருபது கிறேன் கொடுக்க வமனியாகும். வமனியாகச் சேஷ்டிக்கு நிச்சயத்திலும் பதனத்திலும் இது இபிகாக்குக்குக்¹⁸குறைந்தது.

ரசிதங்கள். லோபீலிரஞ்சம். Tincture of Lobelia. கொள். லோபீலிப்பூடு பருக்கன் தூளாக இரண்டரை அன்சு; புருவுசீது¹⁹ அரைநாழி. அடைத்த பாத்திரத்தில் லோபீலியைப் பதினைந்து அன்சு சீதிற்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கி, இரண்டுநாள்களுக்கு ஊறவைத்துப் பிற்பாடு சியந்தனி²⁰யில் இட்டு நீர் வடிந்தபின் மிச்சமான ஐந்து அன்சு சீதையும் விட்டுவடிக் கவும். பிற்பாடு சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து, நீர்களைக் கலந்து அரைநாழிக்குப் போதிய புருவுசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். எக்ஸ்பெக்துறம் செரதீவமாகப் பத்துமுதல் முப்பது மினிம்²¹; அந்திஸ்பசி வமனியாக ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திருமைக் காரியத்துக் குத்தக்கதாய் இரண்டு மூன்று மணிநேரத்துக்கொருமுறை கொடுக்கலாம்.

லோபீலியீதிரஞ்சம். Etherial Tincture of Lobelia. கொள். லோபீலிப் பூடு பருக்கன் தூளாக, இரண்டரை அன்சு; ஈதர்சீது²², அரைநாழி.

¹ Taraxacum. ² Volatile. ³ Lobelin. ⁴ Alkaline ⁵ Resin. ⁶ Lobelic acid. ⁷ Emetic. ⁸ Sedative. ⁹ Diaphoretic. ¹⁰ Expectorant, நிசேட்வனி ¹¹ Antispasmodic. ¹² Narcotico-irritant. ¹³ Spasmodic Asthma. ¹⁴ Angina pectoris. ¹⁵ Chronic Stage. ¹⁶ Bronchitis. ¹⁷ Pneumonia. ¹⁸ Ipecac. ¹⁹ Proof spirit. ²⁰ Percolator. ²¹ Minim. ²² Spirit of Ether.

அடைத்த பாத்திரத்தில் ஏழுநாள் ஊறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கிச் சீலையில் வடித்து, பிழிந்து வடித்து அரைநாழிக்குப் போதிய ஈதர்சீது சேர்க்கவும்.

தேயம். பத்துமுதல் முப்பதுமினிம்; ஸ்பச ஈளை¹க்கு இது மெத்த உவந்தது.

அவாகடச்சாத்துகள். Non-Officinal.

லோபீலிந்திதப்பூடு. *Lobelia nicotianaefolia*. இது இலங்கை தென்னிந்துவின் மலைகளிலுள்ள நச்சுப் பூடு. மராட்டியர் இதைப் போக்குநூல்² என்கிறார்கள். இதின் கொட்டை மெத்தக் கார்ப்பானது. இதின் இலைக்கஷாயத்தைச் சுதேசிகள் அந்திஸ்பசி³யாய் வழங்குகிறார்களென்று உதவிச்சத்திரீகன் அ. ச. நாகி குறித்திருக்கிறார். இப்பூண்டையும் இதின் தன்மைகளையும் பற்றி இன்னும் அறியவேண்டும்.

எரிகாசியங்கள்.

ERICACEÆ.

யூவலூர்சி. UVA URSI.

வாசம். இது யுரோபம் ஆசியம் வடஅமரிதம் என்னுந் தேசங்களில் மலையுச்சிகளில் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. காய்ந்த இலைகள். இவை முட்டைவடிவும் தடிப்பும் மினுக்கமும் முக்கால் இஞ்சு நீளமுமானவைகள். கீழ்ப்பக்கம் பின்னல்போன்றிருக்கும். புள்ளிவிழுந்திராது. விளிம்பு கருக்குள்ளதல்ல. சுவை கடுந்துவர்ப்பு. இடித்தாற் காய்ந்த புல்மணஞ் சொற்பம் வீசும். இதின் கஷாயத்தோடு அயபிரகுலோறிரங்⁴ கூட்ட நீலக் கறுப்பான அடையல்விழும். இலையிற் தனிக்கமில்ங்⁵ கவிக்கமில்ங்⁶ளும் ஓர் அத்திர எண்ணெய்⁷யும் இருப்பதோடு ஆபுதின⁸ என்ற கிரிஸ்தற்⁹பதார்த்தமும் அடங்கியிருக்கும்.

தன்மை. இது துவரும் அமுரிதி¹⁰யுமாகும்.

உபயோகம். சனை சல உறுப்புகளின் அழற்சிக்கும் காலிக¹¹சலப்பைபத்தாபிதம், சிஸ்திரீயம்¹², கடுமையானகனுரீயம்¹³, கிலீற்று¹⁴களுக்கும், லுகரீயம்¹⁵, மெனுரீயங்க¹⁶ளுக்கும் இது நயமாகக் கண்டது.

தேயர். இலைத்தாளில் பத்துமுதல் முப்பது கிறேன் கொடுக்கலாம்.

ரசிதம். யூவலூர்சியின்லுசம். Infusion of Uva Ursi. கொள், யூவலூர்சியிலே இடித்து, அரைஅன்சு; கொதிநீர் பத்து அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் இரண்டு மணிநேரமூறவிட்டு இறுத்தெடுக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு நாள் இரண்டு மூன்று முறைகொடுக்கலாம்.

1 Spasmodic Asthma. 2 Boko-Nul. 3 Antispasmodic. 4 Perchloride of Iron.
5 Tannic acid. 6 Gallic acid. 7 Volatile Oil. 8 Arbutine. 9 Crystal. 10 Diuretic.
துயேசை. 11 Chronic. 12 Cystirrhoea. 13 Gonorrhoea. 14 Gleet,
15 Leucorrhoea. 16 Menorrhoea.

சபுதாசியங்கள்.

SAPOTACEAE.

அவாகடச் சரக்கு: Non-Officinal.

இலுப்பை. காட்டிலுப்பை. *Bassia longifolia* and *B. latifolia*. இந்த இரண்டு மரங்களும் இந்துவின் மிகுதியான பகுதிகளில் நிற்கும். இவைகளிலிருந்து உறையக்கூடிய தடித்தவோர் எண்ணெய்யும் ஓர் சீதும்¹ வரும். கொட்டையைப் பிழிய எண்ணெய் வரும். பூக்களிலிருந்து சீது திஸ்திலிக்கப்படும்². எண்ணெய் பெரும்பாலும் தடித்ததும் கனத்ததுமாகும். திறந்தபடி வைத்தாற் சுறுக்குப் பழுதாகுமாகையால் சவுக்காரஞ் செய்வதற்கு இது தகுந்ததேயன்றி மருந்துகளுக்கு உதவாது. 95 பாகை காங்கையிலும் இது உறைந்து கட்டியாகும். காட்டிலுப்பைப் பூவிலிருந்து திஸ்திலிக்கப்படும் சீது வீரான புகைமணமுடையது. சற்றே விஸ்கியைப் போன்றது. சொற்ப காரமும் நாற்றமுமானது. நாட்சென்றால் இந்த மணமற்றுப்போகும். புதிதாய்த் திஸ்திலிக்கப்பட்ட சீது நஞ்சாகி இரைப்பையை அழற்றி வேறு கெட்ட குணங்களையுமுண்டாக்கும். தண்ணீர் கலந்த சீதை அதிகமாய் வழங்கினோமென்று அ. ச. டதர் குறித்திருக்கிறார். ரம்³ என்ற நீர் சீரணத்தைக் குழப்புகிற அளவாக இது குழப்பமாட்டாதென்பதும் தன்மையிலும் உடம்பைப் போஷிப்பதிலும் இது பீரை⁴ப்போன்றது என்பதுமே அவர் எண்ணம். ரைற்று வைத்தியர் எண்ணமும் அப்படியே. இது வீரான செறியும் ஸ்திமுல⁵மென்பது பிரத்தியட்சம். காலத்தாற் பக்குவமானால் பிரண்டி⁶யும் மற்றும் ஸ்திமுலங்களுங் கிடையாத அவசியத்துக்கு இதை வழங்கலாம். இதின் பிண்ணுக்கு வமனியாக வழங்கப்படும். ஊமத்தை நஞ்சுட்டப்பட்ட சிலருக்கு இது கொடுக்கப்பட்டதென்று சாற்று வைத்தியர் சொன்னார். அதற்கு இது தகுந்த மாற்றுப்போல் விளங்குகின்றது.

புல்வமரம். *Fulwa tree*. இது இமயமலையின் மத்திம உஷ்டண பகுதிகளில் உள்ள மரம். இதற்குப் புல்வம் என்றது இந்துஸ்தானிப்பெயர். இதின் கொட்டையைப் பிழிய புல்வநெய் என்ற இறுகின எண்ணெய்வரும். இது லாட்டின் தடிப்புள்ளது. ஏறக்குறைய மணமற்றது; வெண்மையானது; 95 பாகைக்குக் குறைந்த சூட்டில் உறைந்திருக்கும். 120 பாகையில் முற்றாய் உருகும். நெடுக வைத்திருக்க இலுப்பெண்ணெய், காட்டிலுப்பெண்ணெய்கையப் போலப் பாண்டல் பிடியாது. வாதநோவுக்கும் மற்றும் நோக்களுக்கும் பூச இது உத்தமமென்று மதிக்கப்படுகின்றது. இன்னும் இதைச் சோதிப்பது நல்லது.

மோகடம். *Mimusops Elengi*. இது வாசமுள்ள புஷ்பங்களுக்காகச் செய்கைபண்ணப்படுகிறது. இந்த மரத்தின் பட்டைக்குத் துவரான தொணிக⁷த்தன்மையுண்டென்று அஷ்வீல்டர் சொல்லியிருக்கிறார். யாவக

1 Spirit, ஸ்பிரித். 2 Distill. 3 Rum. 4 Beer. 5 Diffusible Stimulant. 6 Brandy. 7 Tonic.

ரால் இது அதிகமாய் மதிக்கப்படும். ஈரங்களிலும் பொதுவான பெலவீனத்திலும் இது உபயோகமானதென்று அஷவீல்ட் ரே சொல்லியிருக்கிறார். வாயவியலுக்கு இதின் திகாகத்தால் ஆசமனிப்பது¹ நல்லதென்று பலனாத போசு வைத்தியர் சொல்லுகிறார். இதின் புஷ்பங்களிற் திஸ்திலிக்கு² நீர் ஸ்திமுல³ மருந்தாகவும் கந்தவருக்க⁴மாகவும் தென்னிந்துவின் சனங்களுக்குள்ளே வழங்கப்படுகின்றது.

எபெனாசியங்கள்.

EBENACEAE.

* தும்பிலிக்காய். DIOSPYROS EMBRYOPTERIS.

வாசம். இந்துவின் காடுகள் அடங்கலும் இது உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. காய். இது சிறு அத்திப் பழமளவு பருமையும் மங்கலான மஞ்சள் நிறமுமானது. தேமலாயிருக்கும். மாவால் மூடப்பட்ட எட்டுக் கொட்டைகளையுடையது. இதில் பிசுபிசுப்பும் மெத்தத் துவருமான சாறு நிறைந்திருக்கும்.

தன்மை. கடுந்துவரானது.

உபயோகம். பிறகே தும்பிலி எசுரூத்தின் கீழ்ச் சொல்லப்படும்.

ரசிதம். தும்பிலியேசுரூத்து. Extract of Diospyros. கொள். தும்பிலிக்காய் போதியது; துவைத்துப் பிழிந்து நீர்மத்திகத்⁵தில்வறட்டி, அடைத்த சீசாக்களிற் பேணி வைக்கவும்.

இந்த எசுரூத்து செங்கபிலநிறமான வசையத்தக்க தகடுகளாக விருக்கும். தண்ணீரிற் சுறுக்குக் கரையும்; இது உத்தமமான துவர்; தியறீயம்⁶, காலிக திசுர்தெரி⁷களுக்கு மெத்த உபயோகமானது. இதில் இரண்டு திரூமை அரைநாழி தண்ணீரிற் கரைத்து லுகறீயத்துக்கு⁸ப் புகட்டுவது நயம். (44)

தேயம். ஒன்றுமுதல் ஐந்துகிறேனை நாள் மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம்.

அவாகடச்சரக்குகள். Non-Officinal.

கருங்காலி. Indian Ebony. இது மலையாளக்கரை சோளமண்டலக்கரைகளிலுள்ளது. இதில் பட்டைக்குத் தொணிகத்⁹தன்மை, துவர்த்தன்மைகள் உண்டென்றும் அசத்துவ¹⁰கழிச்சல் குன்மம் பெலவீனத்தைப் பற்றிய நோய்களுக்கு மெத்த உவப்பானதென்றும், ரோசு வைத்தியர் குறித்திருக்கிறார்.

1 Gargle. 2 Distill. 3 Stimulant. 4 Perfume. 5 Water-bath. 6 Diarrhoea.

7 Chronic Dysentery, 8 Leucorrhoea. 9 Tonic. 10 Atonic.

(44) அனுபந்தம்பார்.

ஸ்தைரகாசியங்கள்.

STYRACACEAE.

சாம்பிராணி மரம், BENZOIN TREE.

வாசம். போணியு, யாவம். சுமத்திறம், சியாம் தேசங்களில் இது உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. சாம்பிராணி. இது வாசனையுள்ள குங்குலியம் போன்ற ராளம். மரத்தின் பட்டையிற் கீறி வடியும் நீரை இறுகவிட்டு எடுப்பார்கள். சியாம் சுமத்திறம் என்ற இடங்களிலிருந்து இது பிறித்தனுக்கு ஏற்றப்படுமீ. இது குமைந்த வாலுண்டைகள் அல்லது கபிலப்புள்ளிகளுள்ள திரைகள் அடங்கிய கட்டிகளாக வரும். கட்டிகளில் வெண்மையான வாலுண்டைகள் அமைந்திருப்பதுமுண்டு. இவைக்குச் சுவை சொற்பம். நற்கந்தமுண்டு. சூடுகாட்டப் பெஞ்சோயிக்கமில்¹ புகை வீசும். திட்டசீதி² லும்³ பதாசிரீரிலும்⁴ கரையும். இதிலே ராளம் 100 க்கு 76 முதல் 80 பங்கு வீதமாயிருக்கும். அதை விட ஓர் அத்திரஎண்ணெயும்⁵ பெஞ்சோயிக்கமில்மும் அடங்கியிருக்கும்.

தன்மை. இது ஸ்திமுலஸ், எக்ஸ்பெக்தறம்⁶. தானிகமாயிட்டால் ஸ்திமுலமாகும்.

உபயோகம். நாட்பட்ட இருமலுக்கும் சுவாசப்பையின் மற்றும் நாட்பட்ட நோய்களுக்கும் இதையுண்ணலாம். புசையாகவும் வழங்கப்படும். மேலும் பைரோசி⁷ சலப்பையழற்சி முதலியவற்றுக்கும் இது வழங்கப்பட்டது. இந்த வகுப்பைச் சேர்ந்த மற்ற மருந்துகளே பெரும்பாலும் இதற்குப் பதிலாகத் தெரிந்துகொள்ளப்படும்.

தேயம். பத்து முதல் இருபது கிரேன் கொடுக்கலாம். இதைத் தனியே கொடுப்பதரிது.

ரசிதங்கள். பெஞ்சோயின்கூட்டிரஞ்சம். Compound Tincture of Benzoin. கொள். பெஞ்சோயின் பருக்கன்தூளாக இரண்டு அன்சு; பூதஸ்தைரக்சு⁸, ஒன்றரை அன்சு; தொலுபல்சம்⁹ அரைஅன்சு; சொகோத்திரசகை¹⁰, நூற்றறுபது கிரேன்; திட்டசீது அரைநாழி. எல்லாவற்றையும் மூடிய பாத்திரத்தில் ஏழுநாள் ஊறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கி வடித்து, அரைநாழிக்குக் குறைந்தால், அதற்குத் தக்கதாய்த் திட்டசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். அரைத்திரும் முதல் ஒருதிரும் கொடுக்கலாம். காயங்கள் விரணங்கள் முதலியவற்றுக்கு ஸ்திமுல பூச்சாக வெகுகாலம் பேர்கேட்டிருந்தது. இதற்கு பிறையர் பல்சம்¹¹ என்று பேர்.

பெஞ்சோயஸ் லாடு. Benzoated Lard. கொள். பூதலாடு¹², ஒருஇரூத்தல்; பெஞ்சோயின் பருக்கன் தூளாக நூற்றறுபது கிரேன். லாட்டை நீர்மத்திகத்¹³தின் சூட்டில் உருக்கி பெஞ்சோயினையுஞ் சேர்த்து அடிக்கடி

¹ Benzoic acid. ² Rectified Spirit. ³ Solution of Potash. ⁴ Volatile oil. ⁵ Stimulant, ⁶ Expectorant, ⁷ Pyrosis. ⁸ Prepared Styra. ⁹ Balsam of Tolu. ¹⁰ Socotrine aloes, ¹¹ Friars Balsam. ¹² Prepared Lard. ¹³ Water-bath.

கலச்சி இரண்டு மணிநேரவரையில் சூட்டிலிருக்க விட்டுக் கடைசியில் வடித்துச் சேஷமான பெஞ்சோயினை வேரூக்கவும்.

பெஞ்சோயஸ் லாடு, இப்படிப் பச்சுவமாக்கப்படாத லாட்டைப்போற் சுறுக்குப்பழுதாகாது. அதைப்போலவே இதுவும் வழங்கப்படும்.

பெஞ்சோயிக்கமில்ம். Benzoic acid. இதைக் குறிக்குஞ் சின்னம் ஐகா⁷ ஐ⁸ அ². இது சாம்பிராணியிலிருந்து புடஞ்செய்தெடுக்கப்படும். இது மெல்லிய இறகுபோன்ற கிரிஸ்தற்²தகடுகளாகவும் ஊசிகளாகவும் வரும். வளையக்கூடியது; நிறமற்றது; சாம்பிராணியைப் போன்ற நல்ல சுகந்த வாசனையுடையது. தண்ணீரில் சொற்பமாய்க் கரையும்; திட்டீதிற் சுறுக்குக் கரையும். மேலும் காரமான அல்கலீ³களிலும் சுண்ணாீர்களிலும் கரைந்திருந்து ஐருகுலோறிக்கமில்ஞ்சேர்க்கப் பிரிந்தடையும். மெத்தவீறு நுறைந்திருந்தால் அடையாது. 248 பாகை சூட்டில் உருகி 462 பாகை யிற் பொங்கும். பொங்குஞ் சூட்டில் ஆவிமாய்ப் பறக்கச் சொற்ப சேஷ மாத்நிரமிருக்கும்.

தன்மை. இது ஸ்திமுலன்⁵ விசேஷமாய்ச் சளிச்சவ்வை அருட்டும். இப்பிரிக்கமில்மாகச் சிறுநீர்வழியாய்க் சுழியும்.

உபயோகம். இது விதிக்கமில்செறிவு என்ற நோய்க்கு மருந்தாகுமென்று உத்தேசித்தும் அனுகூலப்படவில்லை சிறுநீரிலுண்டாகும் பாஸ்வசுக்⁸கற்களுக்கு நல்லதாகக் காணப்பட்டது. செங்கண்மாரிக்கும் குழந்தைகளிலுண்டாகும் சலவொழுக்குக்கும் இது நல்லது.

தேயம். பத்துமுதற் பதினைந்து கிரேன் கொடுக்கலாம்.

பூரக்கூட்டிரஞ்சம்⁹, அமோனவவினிரஞ்சம்¹⁰, அமோனபெஞ்சோவசு¹¹ இவைகளில் பெஞ்சோயிக்கமில்ம் ஒர்கூறுகச் சேருகின்றது.

ஒலியாசியங்கள்.

OLEACEAE.

ஒலீவமரம். OLIVE TREE.

வாசம்- இது சின்ன ஆசியம், தென்யுரோபம், மத்தித்திராணித்தீவுகள், வடஆபிரிகம் என்ற பகுதிகளில் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. எண்ணெய். இது செம்பழத்திற் பிழிந்தெடுக்கப்படும். இது வெண்மஞ்சள்நிறமானது; ஏறக்குறைய மணமற்றது. காரமற்றது, 36 பாகை காங்கையிற் கொஞ்சம் உறையும். 20 பாகையில் ஒலீயின்¹² என்ற நீராகவும் மாகரின்¹³ என்ற முத்துப்போன்ற கட்டியாகவும் பிரியும். இவைகளின் வீதம் 72 ங்கு 28 போலிருக்கும்.

தன்மை. இது மெல்லிய விரேசனி. சூடல்நோய்களுக்குப் பிரயோகிக்கப்படும் எனீமங்க¹⁴ளில் சாந்தன¹⁵ கூறுக இது வழங்கப்படும். மேலும் நஞ்சுதின்றவர்களில் இரைப்பையில் அந்நஞ்சு பிடியாமற் போர்த்துக் காப்பதற்குக் கொடுக்கப்படும். வினிமென்சன்¹⁶ மற்றும்பூச்சுமருந்துகளுக்கு

³ Sublime. ² Crystal. ³ Alkali. ⁴ Hydrochloric acid. ⁵ Stimulant. ⁶ Hippuric acid. ⁷ Lithic acid. ⁸ Phosphate. ⁹ Compomol Tincture of Camphor.

¹⁰ Ammoniated Tincture of opium. ¹¹ Benzoate of Ammonia.

¹² Oleine. ¹³ Margarine. ¹⁴ Enema. ¹⁵ Emollient. ¹⁶ Liniment.

அனுமருந்தாக மெத்தவழங்கப்படும். சராமரோகங்களில் எரிவைத் தணிப் பதற்கும் வேக்காட்டுக் காயங்கள் தோல் வழந்தல்களிற் பரமாணு தாவாம ற் காப்பதற்சமாக இது இடப்படும். இதை மேனியிற் பூசிக்கொண்டால் பிளெக்கு¹நோய் வராமற் காக்குமென்று நினைத்திருக்கிறார்கள்.

தேயம். விரேசனியாக ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு கொடுக்கப் படும். ஆயினும் இது விரேசனியாக வழங்கப்படுவதரிது.

கொப்புளத்தாள்², லீனப்பாப்பை³, இரசவழுனீயக⁴ லாஸ்தர்⁴, சபுசிறுது ப்⁵பிலாஸ்தர் இரசபிலாஸ்தர், பிற்சப⁶பிலாஸ்தர், ஈயபிலாஸ்தர்⁷, மக்னீசி சல்வசெலீம்⁸ அமோனலினிமென்⁹, சுண்ணை¹⁰லினிமென், பூர¹¹லினிமென், கந்தாரிசன்கென்¹², இரசகூட்டன்கென்¹³, இரசநீதுரசன்கென்¹⁴, விருத்தி¹⁵ய ன்கென், அசனீத¹⁶வன்கென் என்றகூட்டு மருந்துகளில் ஒலீவெண்ணெ¹⁷ய் ஓர்கூருகச் சேருகின்றது.

ரசிதங்கள். வன்சபு. Hard Soap. இது கஸ்தீல்சபு¹⁸ என்றுஞ் சொல் லப்படும். ஒலீவெண்ணெய்யோடு சோடஞ்¹⁹சேர்த்து இது செய்யப்படும். இது நரை வெண்மை நிறமும் காய்வுமானது; மணமற்றது; சீதளமில்லாத விடத்திற் சேமித்திருந்தால் கடினமும் லேசில் பொடியாகக்கூடியதுமாகும். சூடுபட லகுவிற் பசையக்கூடியதாகும். திட்டசீது²⁰ற்கரையும். கடுதாசி யிற் பட்டாலும் நெய்ப்பிடிப்புக் காட்டாது. இதைப் பஸ்மமாக்கினால் வரும் சாம்பல் ஈரம்பிடியாது.

வன்சபுவின் ரசிதங்கள். சபுலின்மென். Soap Liniment. கொள். வன்சபு சிறிதாய் வெட்டி இரண்டரை அன்சு; பூரம் ஒன்றேகால் அன்சு; ரோஸ்மரித்தேல் மூன்று திரும்; திட்டசீது பதினெட்டு அன்சு; தண்ணீர் இரண்டு அன்சு. தண்ணீரைச் சீதுடன் கலந்து, ரோஸ்மரித்தேல்²¹, சபு, பூ ரம் மூன்றையுங் கூட்டவும். 70 பாசைக்கு மேற்படாத சூட்டில் ஏழுநா ள் ஊறவைத்து இடைக்கிடை குலுச்சி வடிக்கவும்.

வாதத்துக்கும் மற்று ரோச்சுருக்கும் பூசும்மருந்துகளுக்கு இது நல்ல கூ ட்டு. அவின்லினிமெ²²னில் இது ஓர் கூருகச்சேருகின்றது.

சபுபிலாஸ்தர். Soap Plaster. கொள். வன்சபு, ஆறு அன்சு; ஈயப் பிலாஸ்தர் இரண்டேகால் இரூத்தல்; குங்குலியம், ஒரு அன்சு. ஈயப்பிலா ஸ்தரை மென்கூட்டில் உருக்கி சபுவையுங் குங்குலியத்தையும் முதலே நீ ராக்கிச் சேர்த்து, ஓயாமற் கலக்கித் தகுந்த பதமாய் வறட்டிக்கொள்ளவும்.

இது பிரதானமாய்ப் பொருத்துகலின் ரோக்கள் சுருக்குகளுக்கு ஆதரவா யிடப்படும்.

சபுசிறுதுப்பிலாஸ்தர். Soap Cerate Plaster. கொள். வன்சபு, தூ ளாக, பத்து அன்சு; மெழுகு, பன்னிரண்டரை அன்சு; ஒலீவெண்ணெய் அரைநாழி; ஈயவக்கிரம்²³ பதினைந்து அன்சு; காடி²⁴ ஒருகலன்²⁵. காடியை யும் ஈயவக்கிரத்தையும் ஸ்தீம்மத்திகத்²⁶தில் ஒருமிக்கக் காய்ச்சி ஈயவக்கிரம் காடியிற் கரையுந்தனையும் ஓயாமற் கலக்கி, பிற்பாடு சபுவைச்சேர்த்து ஈரிப் பு வற்றுந்தனையுங் காய்ச்சிக் கடைசியில் மெழுகையும் எண்ணெய்யையும்

1 Plague. 2 Blistering paper. 3 Linseed Poultice. 4 Plaster of Ammoniacum with Mercury. 5 Soap Cerate. 6 Pitch. 7 Lead plaster. 8 Enema of sulphate of magnesia. 9 Liniment of ammonia. 10 Lime. 11 Camphor. 12 Ointment of cantharidis. 13 Compound ointment of Mercury. 14 Nitrate of Mercury ointment. 15 Veratria. 16 Aconite. 17 Olive oil. 18 Castile soap. 19 Soda. 20 Rectified Spirit. 21 Rosemary oil. 22 Liniment of opium. 23 Oxide of Lead. 24 Vinegar. 25 Gallen. 26 Steam bath.

ஒன்றுயருகினபின் சேர்த்து முழுவதையும் ஓயாமல் ஒன்றாய்க்கலக்கி ஈரம்வற்றிப் பிலாஸ்தர்ப்பதமாய் வருந்தனையும் சூடுநிற்கப்பண்ணவும்.

இரானப்பிலாஸ்தர்¹, சபுபிலாஸ்தர்², கலுசிந்துக்கூட்டெசுருத்து³, பதாசியவியோதிரசபுலினிமென்⁴, சபுலினிமென், பபாடுசகைக்குளிகை⁵, சகை⁶யிங்குக்⁷குளிகை, மக்கிக்⁸கூட்டுக்குளிகை, வரியாத்து⁹க்கூட்டுக்குளிகை, சபுக்கூட்டுக் குளிகை, ஸ்குவிற்கூட்டுக்குளிகை என்ற கூட்டு மருந்துகளில் வன்சபு ஓர் கூறுகச் சேருகின்றது.

மேன்சபு. Soft Soap. இது ஒலீவெண்ணெய்யும் பதாசியுஞ் சேர்த்துச் செய்யப்பட்டது. மஞ்சட் பச்சை நிறமுள்ளது; மணமற்றது; இறுகின களிப்பதமானது; திட்டசீதிற் கரையும்; கடுதாசியிற் பட்டாலும் நெய்ப்பிடிப்புக் காட்டாது. இதைப் பன்மமாக்கினால் பரமானுவிற் கரையத்தக்க சாம்பலாகும்.

தன்மை உபயோகம். இது இமாலியம்¹⁰, சுத்திசெய்வது. பொடுகுக்கும் மற்றுஞ் சருமனோய்களுக்கும் வெளியில் பூசப்படும். விசேஷமாய் சிவ்லிக¹¹க் கரப்பன்களுக்குத் தோயமாய் வழங்கப்படும். தர்ப்பந்தின் வினிமெ¹²னில் இது ஓர் கூறுகச் சேருகின்றது.

கிலேசரின். Glycerine. இது திர¹³வெண்ணெய்கள் நிணங்களிலிருந்து எடுக்கப்படும் இனிப்பான நிறமற்ற தெளிந்த பாணி. இதைக் குறிக்குஞ் சின்னம் கா³ ஐ⁸ அ³. இதின் விசேஷகிராவிதம் 1.25. தொட எண்ணெய்போலிருக்கும், மணமில்லை. தண்ணீரிலும் அலக்காலி¹⁴லும் தாராளமாய்க் கரையும். குட்டினாற் கூறுகளாகப் பிரியும்போது கடுங் காரமான ஆவிகளோக் கக்கும்.

தன்மை உபயோகம். இது நல்ல இமாலியம். மாலியம்¹⁵, இயோதம்¹⁶, முதலியவற்றைச் சுறுக்குக் கரைக்குமாகையால் பூச்சுமருந்துகளுக்கு நல்ல அனுமருந்தாகும். சாதுக்குள்ளே ஒழுங்கிவிட்டால் சிலவகையான செவிட்டைக் கொஞ்சக்காலத்துக்கு மாற்றும். கசரோகத்தில் மறுவித்தே¹⁷லுக்குப் பதிலாக இதைக்கொடுக்கலாமென்று சிலர் நியாயமின்றிச் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

தோயம். ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திராங் கொடுக்கலாம்.

காபலிச்சகமில¹⁸கிலேசரின், கலிக்கமில¹⁹கிலேசரின், தனிக்கமில²⁰கிலேசரின், அமைல²¹கிலேசரின், வெண்கார²²கிலேசரின், பதாசியவியோதிர சபுலினிமென் என்னுங் கூட்டுமருந்துகளில் கிலேசரின் ஓர் கூறுகச் சேருகின்றது.

பூவஷ்மரம்.

FLOWERING ASH.

வட்டலிலையஷ்மரம். ROUND LEAVED ASH.

வாசம். இது தென் யுரோபத்தின் மலைகளிலும் விசேஷமாய்க் கல்பிறியம் சிசிலி என்ற இடங்களிலும் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. மரத்திற் கீற வடியும் இறுகின இனிப்பானபொசிவு. இது

1 Resin plaster. 2 Soap plaster. 3 Compound extract of colocynth. 4 Liniment of Iodide of Potassium and soap. 5 Pills of Barbadoes Aloes. 6 Aloes. 7 Asafoetida. 8 Gamboge. 9 Rhubarb. 10 Emollient, சர்தனி. 11 Syphilis 12 Liniment of Turpentine. 13 Fixed, 14 Alcohol. 15 Morphia. 16 Iodum 17 Oleum Morrui. 18 Carbolic acid. 19 Gallic, 20 Tannic. 21 Amylum, 22 Borax.

மன்னு¹ எனப்படும். இது ஒரு இஞ்சு முதல் ஆறு இஞ்சு நீளமும் இரண்டொரு இஞ்சு அகலமுமாய் ஒப்பமற்றுக் கண்ணிறையுள்ளதாய் ஒருபக்கம் வளைந்த நொருக்கலான துண்டுகளாக வரும். வெண்மஞ்சள் நிறமும், சற்றே உவட்டிப்பான மணமும் இனிய சுவையுமுள்ளது. இதிலே கா³ஐ⁷ அ³ என்ற சின்னத்தையுடைய மன்னீதம்², சர்க்கரையும் எசிறுத்திவு³ம் அடங்கியிருக்கும். மன்னாவிலே மன்னீது 100 க்கு 60 முதல் 80 பங்கு வீதமாயிருக்கும். கொதித்திற திட்டசீதில்⁴ மன்னாவைக் கரைத்து ஆறவிட மன்னீது நிறமற்ற மினுக்கமான கிரிஸ்தல்களாகப் பிரியும். இது கரைவதற்கு ஐந்து பங்கு தண்ணீர் வேணும். இந்தக் கரையிலே யீஸ்து⁶ப் படும்போது நொதிக்காது.

தன்மை உபயோகம். இதோர் மெல்லிய விரேசனி. இது இனிப்பாயும் செயலிற் சாந்தியானதாயுமிருப்பதாற் பிள்ளைகளுக்கு உவந்தது. நிலவாகை, உப்பு விரேசனிகளின் உவட்டிப்பான சுவையை மறைத்து அவைளுக்கு உதவியாவதற்கு இது நல்ல துணைமருந்து. நிலவாகை கொடுபடும் நோய்களுக்கு இதைக் கொடுக்கலாம்.

தேயம். பிள்ளைகளுக்கு ஒரு திரும் முதல் மூன்றுதிரும், வளர்ந்தோருக்கு ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சங் கொடுக்கலாம்.

ஜஸ்மினியங்கள்.

JASMINAE.

அவாகடச்சரக்கு. Non-Officinal.

மல்லிகைப்பூ. *Jasminum Sambac*. மல்லிகைக்கொடி, வாசனையான பூவுக்காக இந்துதேசமடங்கலும் வளர்க்கப்படும். இதின் பூக்கள் விக்கிரகங்களுக்குச் சாத்தப்படும். பிரசவஸ்திரிகளில், ஸ்தனங்கள் வீங்கி உபாதிக்கொண்டிருக்கையிற் பாலூறுவதைத் தடுத்து வற்றப்பண்ணுவதற்கு மல்லிகைப்பூக்கள் சித்திக்குமென்று வுட்டர் சொல்லியிருக்கிறார். இரண்டு மூன்று சிறங்கை பூக்களைத் தண்ணீர் விடாமல் அரைத்து ஒவ்வொரு முலைக்கும் அணைத்து நாள் இரண்டொருமுறை புதுப்பிக்கவேண்டும். பாலூறுதல் சிலவேளை ஒருநாளைக்குள் ஒழிந்துபோகும். பெரும்பாலும் இரண்டுமூன்றுநாட் செல்லும். சென்னையில் இதுகாரியத்தை நன்றாயறிந்திருக்கிறார்களென்று வுட்டர் சொல்லுகிறார்.

அபாசனியங்கள்.

APOCYNEAE.

*ஏழிலைப்பாலை. *ALSTONIA SCHOLARIS*.

வாசம். இந்துதேசமடங்கலுஞ் சோலைகளில் இது உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. பட்டை. இது லேசில் முறியத்தக்கதான தடித்த திருகின துண்டுகளாக வரும். முரணான நரைத் தோலும் வெளிநிலான கறு

1 Manna, 2 Mannite. 3 Extractive. 4 Rectified spirit. 5 Crystal. 6 Yeast.

வாநிறப்பட்டையுஞ் சேர்ந்தது. உட்பக்கம் இன்னும் வெண்மையாயும், மெதுவாயும், மணமின்றிக் கடுங்கைப்புச்சுவையுள்ளதாயுமிருக்கும்.

தன்மை. துவரானதொணிகம்¹, அநதெல்மிந்தி², அந்திபுரூடி³.

உபயோகம். காலிக⁴ தியநீயம்⁵, திசந்தெரி⁶யின் பிற்கூறுகளுக்கு இது உபபானதாய்க் காணப்பட்டது. (45) காய்ச்சல்கள், உடம்பிற் கேட்கும் மற்றும் வியாதிகளின் பின் காணும் பெலவீனத்தில், உடம்பையும் இரைப் பையையும் பெலப்படுத்துவதற்கு இது அனுகூலமானது.

தேயம். பட்டைத் தூளில் மூன்றுமுதல் ஐந்து கிறேனைக் குடல்நோய்களுக்குத் தனித்தாவது, சிறுதேயமான இபிகாக்கு⁷ சென்சனெசிரூத்⁸தோடு கலந்தாவது கொடுக்கலாம்.

ரசிதங்கள். ஏழிலைப்பாலேரஞ்சம். Tincture of Alstonia. கொள். ஏழிலைப் பாலைப்பட்டை இடித்து, இரண்டரை அன்சு; புருவுசீது⁹ அரை நாழி. அடைத்த பாத்திரத்தில் ஏழுநாளாறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கி, வடித்து, அரைநாழிக்குப் போதிய புருவுசீது சேர்க்கவும். அல்லது களும் பிரஞ்சத்தைப்போலச் சியந்தனித்தும்¹⁰ எடுக்கலாம்.

தேயம். ஒரு சிரும் முதல் இரண்டு திராங் கொடுக்கலாம்.

ஏழிலைப்பாலையின்ஞ்சம். Infusion of Alstonia. கொள். ஏழிலைப் பாலைப்பட்டை இடித்து அரைஅன்சு; கோதிநீர் பத்து அன்சு. மூடின பாத்திரத்தில் ஒருமணிநேரமுறவைத்து இறுத்தெடுக்கவும்.

தேயம். இதில் ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சை நாள் இரண்டு மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம். இது ஓர் நல்ல தொணிகம்.

அவாகடச் சரக்குகள். Non-Officinal.

கசப்புவேட்பாலை. *Holarrhena antidysenterica*. இது இந்துதேச மடங்கலுமுள்ள சிறிய மரம். இதின் பட்டை வெகுகாலமாகப் பேர்பெற்றது. முன்னே தெல்விச்சேரிப் பட்டையென்று யுரோபத்துக்கு ஏற்றப் பட்டது. இது கண்ணறை நிறைந்த, கறைநிறமுள்ள, கசப்புச்சுவையை யுடைய பட்டை. இது தொணிகமாகவும், சுரக்கினி¹¹யாகவும் பேர்பெற்றிருந்தாலும் திசந்தெரிவகையான கழிச்சல் வியாதிகளுக்கு நல்ல மருந்தென்று கீர்த்திபெற்றது. இத்தன்மையில் இது அனுகூலமானதென்பதற்கு மன்றோ, ஐவீசுவைத்தியர்கள் சாட்சியிட்டிருக்கிறார்கள். இதை அனேகருக்குக் கொடுத்துச் சித்திபெற்றதென்பதற்கு அ. ச. டதர் என்ற உதவிச் சத்திரீகன் பெலப்பான சாட்சியிட்டிருக்கிறார். பவுசர், பலனாதசர் முதலியவர்களுடைய எழுத்துகளிலும் இது நயப்பென்று குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. திசந்தெரியால் வருந்தின பதினைந்துமாசக் குழந்தையொன்றுக்கு இபிகாக்கினாலும் வாடிக்கையான மற்றும் பரிகாரங்களாலும் நயங்காணாதபின் இந்த மருந்தாற் சுகமானதென்று உதவிச் சத்திரீகன் கஸ்தகிரீயர் பிரசுரப்படுத்தியிருக்கிறார். அவர் இந்தப் பட்டையில் இரண்டு அன்சை ஒரு நாழி தண்ணீர்ந் போட்டு அரைநாழியாய் வற்றுந்தனையும் அவித்து அந்தத் திகாத்தத்தை நாலு திரும் தேயமாக நாள் நாலு முறை ஒவ்வொருதுளி லாடன¹²முங் கூட்டிக் கொடுத்தார். இதைச் சுரக்கினியாக வெகுவாய்க்

1 Tonic. 2 Anthelmintic. 3 Antiperiodic. 4 Chronic. 5 Diarrhoea. 6 Dysentery. 7 Ipecac. 8 Extract of Gentian. 9 Proof spirit. 10 Percolate. 11 Febrifuge. 12 Laudanum.

(45) அனுபந்தம்பார்.

கொடுத்தேனென்று கிப்சன் பண்டிதருஞ் சொல்லுகிறார். இந்துவிலுள்ள உத்தமமருந்துகளுள் ஒன்றாகிய இத்துடன், வெட்பாலையரிசி¹யென்ற இதின் பெயரை உடையதும், இதின் தோற்றத்தையுடையதமாகிய செயலற்ற இன்னொரு மரத்தின் பட்டை பெரும்பாலும் மாற்றப்படுவதால் இதின் பெயர் கெட்டுப்போயிற்றென்று எவியற்று பண்டிதர் சொல்லியிருக்கிறார். (46) இந்தப் பட்டையையும் இதின் தன்மைகளையும் இனிமேல் பரிசோதனைகாரர் ஆராய்வது நல்லது. இதில் எட்டு அன்சை ஒருநாழி தண்ணீரில்போட்டு அரைநாழியாய் வற்றுந்தனையும் அவித்த அந்தக் கஷாயத்தை ஒன்றரை அன்சு இரண்டு அன்சு தேயமாக நாள் இரண்டு மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம். ஆயினும் வேர்ப்பட்டையைத் தண்ணீரில் ஊறவைத்துச் செய்த எசுரத்து² நல்லதென்று அ. ச. டதர் சொல்லுகிறார். அதில் மூன்று கிறேன்வரைக்கு அரைக்கிறேன் அவினோடு சேர்த்துக் கொடுப்பதே முறை. திரண்டு நீண்டொடுங்கிக் கூரான இதின் விரையும் திசந்தெரிக்கு³ நல்ல மருந்தென்று சுதேசிகளால் மெத்த மதிக்கப்படுகின்றது. இது ஏறக்குறைய அரை இஞ்சு நீளமானது; கறுவாப் போலக் கயிலிறமுடையது. ஒருபக்கங் குவந்து, மறுபக்கம் கவிந்து, வெளிறலான நெடும் உரி யுள்ளதுமாயிருக்கும். லசுவில் நொருங்கும். கைப்புச் சுவையும் மெத்த நாற்றமுங்கொண்டது. இதின் தோற்றத்தை உடைய வெட்பால விரையோடு இது பெரும்பாலும் மாறிக்கொள்ளும். வறுத்த இக்கொட்டையின் கஷாயம் குடல்நோய்களுக்கு நல்ல லேசான கயராகுமென்றும் வாந்திபேதியில் வாந்தியைத் தணிப்பதற்குக் கொடுக்கப்படுகின்றதென்றும் ஏன்ஸ்லி சொல்லியிருக்கிறார். மூலமுளையாற் பாயும் இரத்தத்தைத் தடுப்பதற்கு இந்தக் கஷாயம் நல்லதென்று தலீவுசெநீவு என்ற நூல் சொல்லுகின்றது. இக்கொட்டைக்குக் கிருமியைக்கொல்லுந் தன்மையுமுண்டாம். வங்காளத்தில் ஓர் பகுதியில் மாட்டு மாரகநோய்க்கடுத்த மருந்தென்று இது அதிகமாய் வழங்கப்பட்டது. நயநட்டஞ் சொல்லப்படவில்லை.

சுணைக்குளப்பாலை. *Holarrhena pubescens*. இது மேலே கண்ட கசப்பு வெட்பாலையிலோர் இனம். இந்துவின் அனேக பகுதிகளிலுள்ள இந்தச் செடியின் கொட்டை, திசந்தெரிக்கும் மற்றங் குடல்நோய்களுக்கும் நல்ல மருந்தென்று சுதேசிகள் வழங்குவார்கள். இதின் பட்டைக்குத் துவர்த்தன்மை தொணிகத்⁴ தன்மைகள் உண்டு. இது சுரங்களுக்குக்கொடுக்கப்படும். சுதேசிகளே இதைப்பற்றிச் சாட்சியிட்டிருக்கிறவர்கள்.

பால்வள்ளி. *Ichnocarpus frutescens*. இது வடக்கிந்துவில் வங்காளம், அசம், குமையுன் முதலிய பகுதிகளிலுள்ள செடி. இதின் வேருக்கு அல்திறவ⁵ தொணிகத்தன்மையிருப்பதால் சீமை நன்னாரி⁶க்குப் பதிலாக வழங்கப்படுகின்றது.

வேள்வலரி. *Exile Oleander*. இதோர் மேற்கிந்துச்செடி. இந்துவிலும் வளர்க்கப்படுகின்றது. இதற்கு அந்திபிராடித்⁷ தன்மையுண்டென்று தெஸ்கூடிசர் கவனித்தார். பிதி, சாற்று பண்டிதர்கள் இக்கருத்தை உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். பலவகையான முறைச்சுரங்களில் அவர்கள் இதைக் கொடுத்துப் பார்த்த சோதனைகளால் இது சத்துள்ள மருந்தென்பது சந்தேகமறவிளங்குகின்றது. காய்ந்த புதிய பட்டையில் ஒரு அன்சை ஐந்து

1 *Wrightia tinctoria*. 2 Extract. 3 Dysentery. 4 Tonic. 5 Alterative.

6 *Sarsaparilla*. 7 Antiperiodic.

(46) அனுபந்தம் பார்,

அஞ்சு திட்டசீதி¹ல் எட்டுநாள் ஊறப்போட்டு வடித்த ரஞ்சம்² பத்துமுதல் பத்னைந்து துளி தேயமாக நாள மூன்றுமுறை கொடுக்கப்படும். மூப்பதுமுதல் அறுபது துளி கொடுத்தால் கார்ப்பான விரேசனியும் வமனியுமாகும். பின்னூர் அதிகமாய்க் கொடுத்தால் கொடிய நஞ்சாய்முடியும். இதின்பருப்புக் கடுங் கசப்பு. சப்ப நாங்கிலே எரிவும், சற்றே லிறைப்புந்தோன்றும். பிழியத்தெளிந்த வெளுறிய அம்பர்³நிறமான, பிசுபிசுத்த, காரமான எண்ணெய் பிறக்கும், இதைச் சுதேசிகள் நீரடிக்கும் பேதியாகச் சிலவேளை கொடுப்பார்கள். இது கடுமையாய்ச் சத்திக்கவும் பேதாக்கவுஞ் செய்யும். ஒரு ஆளுக்கு ஒரே பருப்பு நஞ்சாய் முடிந்ததென்று பல்வூர் பண்டிதர் எழுதியிருக்கிறார். அந்த ஆள் நஞ்சினின்று மீட்கப்பட்டது. சொல்லப்பட்ட குணங்களால் இது மயக்கமுற்சி⁴நஞ்சுகள் என்ற வகுப்புக்குச் சேர்த்ததாகத் தோற்றுகின்றது. இந்தமருந்தைச் சோதிக்கும்போதெல்லாம் மெத்தச் சாவதானம் வேண்டும்.

சேவ்வலரி. Sweet-scented Oleander. பூசைகளுக்காக இந்தச்செடி இந்துதேசத்தில் அதிகமாய் உண்டாக்கப்படும். வேர் முதலாய் இதின் எல்லாப்பகுதிகளும் நஞ்சு. ஆதலாற் கொலை தற்கொலைகளைச் செய்வதற்கு இதைச் சுதேசிகள் பிரயோகிப்பார்கள். ஆயினும் இந்திய வாகடங்கள் சிலவற்றில் இது குஷ்டத்துக்கும் வேறு நோய்களுக்கும் மருந்தாகக் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதிகமாய்க் கொடுத்தாற் சீவமோசந்தானும் நேரிடுமாயினால் இதை மெத்தக் கவனமாய்ச் சோதித்துப் பார்க்கவேணும். இதால் இருவர் நஞ்சுட்டப்பட்டார்களென்று பிறவதனர் ஓராளையும் கிறீகர் பண்டிதர் பின்னொராளையும் பற்றியெழுதியிருக்கிறார்கள். கிறீகர் சொன்ன ஆளில், அந்த நஞ்சு நரம்புமண்டலத்திற் தாக்கினதால் மரணம் நேரிட்டதென்கிறார். இதின் வேர்ப்பட்டையைத் தின்றதினால் ஏர்ப்பின் குணங்கள் உண்டான ஒரு ஆளைப்பற்றிக் காமிகாயநாத ஆசீர்சர் எழுதியிருக்கிறார்.

காட்டலரி. Cerbera Odollam or C. Manghas. இந்த மரம் இந்துவின் கடற்கரைகளில் நொத்யான இடங்களில் உண்டாகும். இதின் பாலும் இலைச்சாறும் பேதிக்கும், வாந்தியுஞ் செய்யும் இந்தமரம் நச்சுத்தன்மையுள்ளதாகையாலும், விக்கினமில்லாமற் பேதி சத்தி செய்யும்மருந்துகள் வேறனேகமிருப்பதாலும், இவைகளைக் கொடுக்கப்படாது.

பாம்புச்சைலம். Ophioxylon Serpentinum. இது இந்துஅடங்கலுமுள்ள படர்செடி. இதைப் பாம்புகடிக்கு நல்ல மருந்தென்று சுதேசிகள் மெத்த வழங்குவார்கள். ஆயினும் இதைப்பற்றி நம்பிக்கையான அத்தாட்சிவேண்டும். மேலும் தொணிக்⁵மாகவும் சுரக்கினி⁶யாகவும் இது மதிக்கப்படும். இதின் வேரில் வீருன கசப்புக்கஷாயம் எடுக்கலாமென்றும் இது மெத்தச் சத்துள்ளதென்றும், அஷ்வீல்டர் சொல்லுகிறார். மேலும் யாவகர் இதை அந்தெல்மிந்தி⁷யாக வழங்குகிறார்களென்றும் இவரே சொல்லுகிறார். பிரசவ நோக்காட்டை அதிகப்படுத்துவதற்கு இதின் வேர்க்கஷாயங் கொடுக்கப்படுகிறதென்று பழனியாண்டி வைத்தியர் சொல்லுகிறார்.

ராகையம். Rhazya Stricta. இது சிந்து, பஞ்சாப்பு, ஆபுகானிஸ்தான் என்ற இடங்களிலுள்ள பூடு. இதின் காய்ந்த இலைகளும் தண்டிகளும்

1 Rectified spirit, 2 Tincture. 3 Amber. 4 Narcotico-irritant poison. 5 Nervous system. 6 Tonic. 7 Febrifuge. 8 Anthelmintic. 9 Womb.

சிந்துக் கடைகளில் விலைப்படும். இது நல்ல கசப்பான தொணிகமென்று
ம், இனிமேல் இதைச் சோதிப்பது நல்லதென்றும் ஸ்தாக்கு வைத்தயர்
சொல்லுகிறார்.

அஸ்கிலீபிரியங்கள்.

ASCLEPIADEAE.

நன்னூரி. INDIAN SARSAPARILLA. HEMIDESMUS.

வாசம். இது இர்துதேசமடங்கலும் உண்டு.

வாகடபகுதி. வேர். இது பல நீளமான, மஞ்சட் கபிலநிறமுள்ள, தீர
ண்ட, திருகலான துண்டுகளாய் வரும் நெடும்பாட்டுக்கு வரிகள் உள்ளது.
வளயமான வெடிப்புகள் பட்டையைப் பிரிக்கும். சுகந்த¹மான சுய மண
மும் சொற்பமான நல்ல கைப்புச் சுவையுமுடையது. இதின் சத்து ஓர்
அத்திர²எண்ணெயிலும் எமிதெஸ்மின்³ என்ற கிரிஸ்தற்பதார்த்தத்திலு யிரு
க்கும். (47)

தன்மை. இது திறத்த அல்திறவ⁴ தொணிக⁵ம், சுவேதனி⁶, அமுரிதி.

உபயோகம். பெலவீனம், பிள்ளைகளின் காமாலை, உடம்பிற் செறிந்த
சிவ்லிசு⁷, காலிகவாதம், சருமநோய்கள் இவற்றுக்கு இது கொடுத்து அதிநய
ங்கண்டிருக்கின்றது.

ரசிதங்கள். *நன்னூரியின்வூசம். Infusion of Hemidesmus. கொள்.
நன்னூரிவேர், இடித்து ஒரு அன்சு, கொதிநீர் பத்து அன்சு; மூடிய பாத்திர
த்தில் ஒருமணிநேரமூறவிட்டுச் சீலையில் வடிக்கவும்.

தேயம். இதில் இரண்டு அன்சு முதல் மூன்று அன்சை நாள் மூன்று
முறை கொடுக்கலாம்.

[குடிக்க இதுவே உத்தமமான முறை. கஷாயஞ் சூடாயிருக்கையிற் கு
டித்தால் அதிக சித்தியாகும். இதற்குப் பாலுஞ் சர்க்கரையுஞ் சேர்த்தால்
பிள்ளைகள் பிரியமாய்க் குடிப்பார்கள். பதாசியவியோதி⁸த்துக்கும் மற்று
ம் மருந்துகளுக்கும் இது நல்ல அனுபாணம். வேர்புதிதாகில் சத்து அதிகம்.]

நன்னூரிச்சிறுபம். Syrup of Hemidesmus. கொள். நன்னூரி வேர்
நாலு அன்சு; சுத்த சர்க்கரை இருபத்தெட்டு அன்சு; கொதிநீர் அரைநாழி.
மூடிய பாத்திரத்தில் நன்னூரிவேரைக் கொதிநீரில் நாலுபூணிநேர மூறவிட்
டுச் சீலையில் வடிக்கவும். இந்த நீரை மண்டியடையுந்தனையும் வைத்து,
தெளிந்தநீரை இறுத்தெடுத்து, சர்க்கரையைச் கூட்டி, மென்சூட்டிற் கரை
த்துக்கொள்ளவும். வரும்பாணி இரண்டு இரத்தல் பத்து அன்சு, நிறுத்து,
1.335 என்ற விசேஷகிராவிதம்⁹ உடையதாயிருக்கவேண்டும்.

தேயம். ஒருதிராமுங் கூடவுங் கொடுக்கலாம். இது சுறுக்கு மோதிக்
குமாகையால் உஷ்டணகாலமிடங்களில் வழங்கத்தக்கதல்ல.

எருக்கு. Mudar. (48) { பேரேருக்கு Calotropis Gigantea.
*சிற்றேருக்கு Calotropis Proceras.

1 Aromatic. 2 Volatile. 3 Hemidsmine. 4 Alterative. 5 Tonic. 6 Diaphoretic.
7 Syphilis. 8 Iodide of Potassium. 9 Specific gravity.

(47) (48) அனுபந்தம்பார்.

வாசம். இந்துதேசமடங்கலும் இந்த இரண்டு இனங்களின் ஏதும் ஒன்று காணப்படும். C. Procera. என்ற சிறிய இனம் தெக்கணம், வங்காளத்தின் மேற்பகுதிகள், பஞ்சாப்பு, சிந்து என்னும் சீதளங்குறைந்த பகுதிகளில் உண்டாகும். C. Gigantea என்ற பெரிய இனம், வங்காளத்தின் கீழ்ப்பகுதி, சென்னை, மலாயநாடு இலங்கைகளில் உண்டாகின்றது.

வாகடபகுதி. காய்ந்த வேர்ப்பட்டை. இது தட்டையான அல்லது வளைந்த சிறுத்துண்டுகளாக வரும்; உள்ளே கபிலநிறம்; வெளியில் மஞ்சளான நரைநிறம்; தனக்குரிய சுயமணமும், வாணித்தன்மையுள்ள உவட்டான காரச்சுவையுமுடையது. முடாரின்¹ என்ற ஓர் பதார்த்தத்திலேயே இதின் சத்து இருக்கின்றதுபோலும். (49)

தன்மை. இது அல்திரவம்², தொணிகம்³, சுவேதனி⁴, பெருந்தேயத்தில் வமனி⁵.

உபயோகம். குஷ்டம்⁶, தேசத்திற் செறிந்த சிவ்லிசு⁷, இரசசோகை⁸, சிவ்லிசுப் புண்கள், மற்றும் புண்கள், திசந்தெரி⁹, தியறியம்¹⁰, காலிகவாதம்¹¹, இவற்றிற்கு இது கொடுத்து நயங்கண்டது. (50)

பரிதங்கன. எருக்குந்தூள். Powder of Mudar. சித்திரை வைகாசி மாசங்களில் மணல்நிலங்களிற் கிண்டின எருக்கம்வேரைப் போதிய அளவாயெடுத்து, மண் அசுத்தமெல்லாம் போகத்தக்கதாய்ச் செவ்வையாய்க்கழுவி, கீறும்போது பால் வடியாமல் இறுகுந்தனையுங் காற்றிற் காயவைத்து பட்டையை எடுத்து வறட்டி மாவாக்கி, நன்றாயடைத்த சீசாக்களிற்பேணவும்.

தேயம். அல்திரவதொணிகமாக மூன்று கிறேன் துவங்கிப் பத்துக்கிறேன் வரைக்கு நாள் மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம். வமனியாக அரைத்திரும் முதல் ஒருதிரும் கொடுக்கலாம்.

[எருக்கு வமனத்தன்மையுடையதென்பதைத் தன்கன்னைத்தியரே முதல் முதற் தெரிவித்தார். ஓஷானசி, பனவ்யர், அற்சின்சன், துரூந்து முதலிய வர்களுடைய ஆராய்வுகள் அதை உறுதிப்படுத்தின. மேலும் ஸ்துவாட்டு, நூற்றன், ரோசு, அ. ச. டதர் முதலியவர்களுடைய எழுத்தும் இதற்குச் சார்பான சாட்சிகளாயிருக்கின்றன. பருவகாலத்திற் கிண்டியெடுத்து மேலே சொன்ன முறையாய்ச் சமைத்துக் காற்றுப்படாமற் பேணிவைக்கப்படும் வேருக்கு நல்ல வமனத்தன்மை யிருப்பது நிச்சயம் ஆயினும் மேலே சொன்ன முறை தப்பினால் வமனத்தன்மை அல்திரவ தொணிகத்தன்மையிரண்டிலுஞ் சத்துக்கெட்டுப்போகும். இதின் வேர்ப்பட்டையைப்பார்க்க வறட்டப்பட்ட இதின் பால் அதிக சத்துள்ளதென்று என்ஸ்லி எண்ணுகிறார். இந்த எண்ணத்தை உறுதிப்படுத்த அத்தாட்சியில்லை. நாள்வீதம் பன்னிரண்டு கிறேனைப் பிரித்துக் கொடுப்பதே தேயமென்கிறார்.

*குறிஞ்சா. INDIAN IPECAC. TYLOPHORA ASTHMATICA.

வாசம். இது வங்காளம் சென்னை முதலிய இந்துவின் பகுதிகளிலும், இலங்கையிலும், மணல்நிலங்களில் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. காய்ந்த இலை. இது இரண்டு இஞ்சு நீளமானது. முட்டை

1 Mudarin 2 Alterative, பசுமை. 3 Tonic, 4 Diaphoretic. 5 Emetic.

6 Leprosy. 7 Syphilis. 8 Mercurial Cachexia, 9 Dysentery.

10 Diarrhoea. 11 Chronic Rheumatism

(49) (50) அனுபத்தம்பார்.

வடிவானது. துனியொடுங்கி நீண்டது. மேற்பக்கம் அழுத்தமும் கீழ்ப்பக்கம் சுணையுமானது. துவைத்தாற் கெட்ட மணம் வீசும், சுவை உவட்டானது.

தன்மை. வமனி¹, சுவேதனி², எக்ஸ்பெக்துரம்³.

உபயோகம். இரையேறலிலும் வமனி வேண்டிய வேளைகளிலும் இது திறமாய்ச்சத்திக்கும். திசந்தெரி⁴ கதார்⁵களுக்கும் வாடிக்கையாய் இபிகாக்கு வழங்கப்படும் மற்றும் நோய்களுக்கும் இது உபயோகமாகும்.

தேயம். காய்ந்த இலைத்தாளில் ஐந்து கிறேன் துவங்கி இருபது முப்பது கிறேனை அரைக்கிறேன் ஒருகிறேன் அந்திமனிதாத்தரக⁶த்தோடு கலந்து வமனியாகக் கொடுக்கலாம். சுவேதனி, எக்ஸ்பெக்துரமாய் மூன்றுமுதல் ஐந்துகிறேனை அவினோடாவது இந்த வருப்பைச் சேர்ந்த மற்றும் மருந்துகளோடாவது கலந்து நாள் மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம். நெருக்கமாயுங் கொடுக்கலாம்.

[குறிஞ்சாவேர் கடைகளில் வரும். இது வெளிறின நிறமுள்ள தடித்த திருகலான துண்டுகளாக விருக்கும். கைப்பும் சற்றே உவட்டுமான சுவையுள்ளது. இதற்குச் சுவேதன வமனித்தன்மைகள் உண்டென்று வெகு காலமாக அறியப்பட்டிருக்கின்றது. திசந்தெரி நோய்க்கு இது நல்லதென்று அன்றர்சன் வைத்தியர் சொல்லியிருக்கிறார். ஒஷானசி பண்டிதரும் இதை உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார். ஆயினும் காய்ந்த இலையின் செயல் சமமாயும் நிச்சயமாயுமிருப்பதால் அதையே எடுத்துக்கொள்வது உத்தமம். இபிகாக்குக்குப் பதிற் சரக்கைத் தேடுகில் இதையேகொள்வதுத்தமம்.] (51)

அவாகடச்சரக்குகள். Non-official.

சேகமோனிச்சேடி. *Secamone emetica*. இது இந்துவிற் பள்ளச் சோலைகளிலுள்ள ஓர் ஏறுகொடி. இது வாந்திக்குமென்பது சுதேசிகளுடைய எண்ணம். ஆயினும் பிதி வைத்தியர் பலமுறைகளில் இதைச் சோதித்துப்பார்த்து அச்செயலற்றதாகக் கண்டார். ஆகையால் இதின் செயல் சந்தேகமானது.

அஸ்கிலிபிக்குறசாவிகப்பூடு. *Asclepias curassavica*. இது இந்துவில் இடையிட்டு வந்து உண்டாகும் பூடு. இதின் வேர் வாந்திக்கும், பேதிக்கும். தேயம் வேர்த் தாளில் இருபது முதல் நாற்பது கிறேன். இலைச் சாறு அந்தெல்மிந்தியாகச் சேஷ்டிக்குமாம்.

உத்தமாகாணி. *Daemia extensa*. இதற்கு வமன எக்ஸ்பெக்துரத் தன்மைகள் உண்டென்று சுதேசிகள் சொல்லிப் பிள்ளைகளின் நோய்களுக்குப் பெரும்பாலும் வழங்குவார்கள். மைசூர்நகர விசிகத்தில், கதார்நோய்களுக்கு இது பத்துக் கிறேன் தேயமாகக் கொடுக்கப்படுகிறதென்று அஸ்வல்டி பண்டிதர் சொல்லுகிறார். இது பாம்புகடிக்கு மருந்தாகுமென்று சென்னையில் 1858 ம் ஆண்டு கவனித்தார்கள். ஆயினும் மெத்த மோசமான நிலைபரத்திலிருந்த ஒரு ஆளைச் சுகப்படுத்தின இன்னொரு பூண்டு இதுதான் என்று பூரணமாய் மட்டிடப்படவில்லை. பசும்பூக்கோயமில்லையைச் சுதேசிகள் கட்டுகள் விப்புருதி⁷களுக்குப் பெரும்பாலும் போடுவார்கள். உத்தமாகாணியைப் போல இதற்கும் வமன எக்ஸ்பெக்துரத் தன்மைகள் உண்டென்று சுதேசிகள் சாட்சியிடுகிறார்கள்.

1 Emetic, எமி. 2 Diaphoretic, தியபேரே. 3 Expectorant, கிசேடவனி. 4 Dysentery, 5 Catarrh. 6 Antimony tartarate. 7 Abscess.

(51) அனுபந்தம் பார்,

சீறுதறிஞ்சா. *Gymnema sylvestre*. இதற்கு உத்தமாகாணிக்குச்சரி யான தன்மைகள் உண்டென்று சுதேசிகள் சொல்வார்கள். பாம்புகடியில் உன்ருக்குக் கொடுக்கவும் கடிவாய்க்குப்போடவும் இதின்வேர் நல்லதெ ன்று மதிக்கிறார்கள். இந்தப் பூண்டிலுள்ள ஒரு விசேஷத்தை எச்சுவதர் முதன்முதற் கண்டார். இதைச் சப்பினால் சர்க்கரை இனிப்புகளின் சுவை பை நாக்கு அறியக்கூடாமற்போகும். அவர்தாமே இதின் இலையைச் சப் பினவுடன் சர்க்கரை மாவை வாயிற் போட்டு அது மணல்போல இனிப்பி ல்லாதிருந்ததென்றும் ஒருநாளின்பின்பே சர்க்கரையின் சுவை தெரியத்தச் சதாய் வந்ததென்றுங் கண்டார்.

லோகனியாசியங்கள்.

LOGANIACEAE.

காஞ்சிரமரம். NUX VOMICA.

வாசம். இது இந்துவின் மிகுதியான பகுதிகளில் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. கொட்டை. இது ஏறக்குறைய வட்டமும் தட்டையு மானது. முக்கால் இஞ்சு பருமையுள்ளது. ஒரு பக்கத்தின் மையத்தில் ஐலமுள்ளது; ஒருபக்கஞ் சற்றே குவிவானது; வெளிப்பக்கஞ் சாம்பல்நி றமாய்க் குறுகிய சுணையால் அடர்த்தியாய் மூடப்பட்டிருக்கும்; உள்ளே ச ற்றே உருவொளியும், வைரமும் இறுக்கமுமானது; சுவை கடுங் கைப்பு; மணமற்றது. இதிலே ஸ்திரிக்கனி² புருசியம்³ என்ற கிரிஸ்தற்பதார்த்தங்கள் இரண்டு இருக்கும். இவை இகசூரிக்கமில⁴த்தோடு கலந்திருக்கும்.

தன்மை. இது நல்ல சிராதொணிகம்⁵, ஸ்திமுலம்⁶, அதிதேயத்திற் கொ டிய நஞ்சு.

உபயோகம். சோர்வு நோய்கள், நுறல்சி⁷ நோய்களுக்கும், அசத்துவ சியறீயம்⁸, காலிகதிசந்தெரி⁹க்கும், பெருங்குடலின் திமிர்ப்பைச்சார்ந்த வா டிக்கையான மலவரட்சிக்கும், கடைக்குடல் இறங்கல், சலவொழுக்கு, வி ந்துக்கழிச்சல்களுக்கும், கசேரு நரம்புக¹⁰ளின் சேஷ்டையின்மை யல்லது பெலவீனத்தைப்பற்றிய மற்றுநோய்களுக்கும் இது உவந்த மருந்து. முறை ச்சுரங்கள், எபிலெப்சி¹¹, சர்க்கராழுரி¹², அனீமி¹³, குலொரோசி¹⁴ முதலிய நோ ய்களுக்கும் இது நயமாகும்.

தேயம். கொட்டை மாவை, இரண்டுமூன்று கிறேனீர்துவங்கிப் படி ப்படியாய்க் கூட்டிப் பத்துக் கிறேன் வரையில் நாள் இரண்டு மூன்று மு றை கொடுக்கலாம்.

ாசிதங்கள். காஞ்சிராவின்லுசம். *Infusion of Nux Vomica. கொள். காஞ்சிரங்கொட்டை, இடித்து இரண்டு திரும்; கொதிவெந்நீர், பன்னிரண் டு அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் ஒருமணிநேரமுறவிட்டு வடிக்கவும்.

தேயம். காலு திரும் தொடங்கிப் படிப்படியாய்க் கூட்டி எட்டுப் பத் தத் திரும் வரைக்கு நாள் மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம்.

1 Bilium 2 Strychnia 3 Brucia. 4 Igasuric acid. 5 Nervous tonic. 6 Stimulant. 7 Neuralgia. 8 Atonic Diarrhoea. 9 Chronic dysentery. 10 Spinal nerve. 11 Epilepsy. 12 Diabetes. 13 Anaemia. 14 Chlorosis.

காஞ்சிராஞ்சம். Tincture of Nux Vomica. கொள், காஞ்சிரங்கொட்டை, இரண்டு அன்சு; திட்டசீது¹ அரைநாழி. காஞ்சிரங்கொட்டை நல்லாய் மெதுவாகுந்தனையும் நீராவியிற் கொதிப்பித்து, அப்பாற் சுறுக்கு உலர்த்தி, மெல்லிய மாவாக்கவும். மூடிய பாத்திரத்தில் இந்த மாவைப் பதினேந்து அன்சு சீதில் இரண்டுநாளுறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கி, அப்பாற் சியந்தனியில் வார்த்து நீர் ஒழுகித் தீர்ந்தபின், சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும் விட்டு வடிக்கவும். அப்பாற் சக்கையைப் பிழிந்து அந்தநீரைவடித்து இரண்டு நீர்களையுங் கலந்து ஒருநாழி தேறப் போதிய திட்டசீதைக் கூட்டவும்.

தேயம். ஸ்திமுல⁴மாகப் பத்துமுதல் இருபது துளிகொடுக்கலாம். தொணிகமாக ஐந்துமுதற் பத்துத்துளி கொடுக்கலாம்.

காஞ்சிரவெசிறுத்து. Extract of Nux Vomica. கொள். காஞ்சிரங்கொட்டை ஒரு இரூத்தல்; திட்டசீது போதியது. கொட்டை நல்லாய் மெதுவாகுந்தனையும் அதை நீராவியிற் கொதிப்பித்துச் சுறுக்கு உலர்த்தி மாவாக்கவும். இந்த மாவைச் சீதிற் கொஞ்சக் கொஞ்சப் பங்கோடு அவித்துச் சீது கைப்பில்லாமல் வருந்தனையும் திரும்பத் திரும்ப அவித்துச் சாரத்தை வாங்கவும். சாரமுள்ள இந்தச் சீதைச் சீலையில் வடித்துச் சீதைத் திஸ்திலித்துப் பிரித்துச் சாரத்தை நீர்மத்திகத்திற் சூடேற்றி மென்களியாக வற்றப் பண்ணவும்.

தேயம். காற்கிறேன் துவங்கி இரண்டு கிறேன் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். நரம்புத்ததி குறைவாயிருக்கிற குடல்நோய்களுக்கு இது விசேஷமாய் நல்ல மருந்து.

ஸ்திரீக்னி. Strychnia. இது காஞ்சிரங்கொட்டையிலிருந் தெடுக்கும் ஓர் அல்கலைவ⁵ம். இதைக் குறிக்குஞ்சின்னம் கா²¹ ஐ²² நீ² அ². இது மணம் நிறமற்ற, சதுரப் பிரிசங்க⁶ளாக இருக்கும். இதின் கடுங்கைப்புத் தண்ணீரிற் பிடிப்பதேயன்றி அதில் இது கரைவதரிது. கொதிக்கிற திட்டசீதிலும் குலோறுவாமி⁷லும் இது கரையும். கேவல அலக்காலி⁸லாவது ஈதரி⁹லாவது கரையாது. சுத்த சல்புரிக்கமிலம்¹⁰ இதோடு சேர்ந்து நிறமற்ற நீராகும். அந்தநீருக்குப் பதாசிதுவிகுரோமசு¹¹ சேர்க்கச் செந்நீல நிறமாகிச் சுறுக்குச் சிவப்பாகி, மறுபடி மஞ்சளாகும். சோதனைகள். நீதுரிக்கமிலம்¹² இதை நிறப்பிக்கமாட்டாது. பரமாணுவில் எரிக்கச் சாம்பல்விழாது.

தன்மை உபயோகம். காஞ்சிரத்தைப் போலவே. இது சிறு தேயத்திற்றூணும் வீரூன நஞ்சாயிருப்பதால் இதைக் கொடுக்கும்போது கவனமாயும் விழிப்பாயும் பார்க்கவேண்டும். அசத்துவவகை¹³யான சோர்வுகளுக்கே இது உவந்தது. எந்தக் காரணமாயாகிலும் உண்டாகும் நரம்புக்களைக்கு இது உவந்த மருந்து. அமரோசி¹⁴, கண்கூச்சம், கொரியம்¹⁵, முறைச்சுரங்கள் முதலிய நோய்களுக்கு இது நயந்ததாகக் காணப்பட்டது.

தேயம். தொணிக¹⁶மாக ஒருகிறேனில் ஐம்பதில் ஒருபங்கு நாள் மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம். சிரா ஸ்திமுலமாக முப்பதில் ஒருபங்குகிறேன் தொடங்கிப் பன்னிரண்டில் ஒருபங்குகிறேன் வரைக்கும் படிப்படியாய் கூட்டிக்கொடுக்கலாம். கைகால் சொற்பமாகுதல் சுண்டி வலிக்கத்

1 Rectified spirit. 2 Steam. 3 Percolator. 4 Stimulant, தயனி, 5 Alkaloid. 6 Prism. 7 Chloroform. 8 Absolute Alcohol. 9 Ether. 10 Sulphuric acid, 11 Bichromate of potash. 12 Nitric acid. 13 Atonic. 14 Amaurosis, 15 Chorea. 16 Tonic.

தொடங்கினால் உடனே மருந்தைநிறுத்தவேண்டும்.

ரசிதங்கள். ஸ்திரீக்னிநீர். Solution of Strychnia. கொள். ஸ்திரீக்னி, கிரிஸ்தல்¹னாக நாலுகிறேன்; கிருசுவைருகுலோறிக்கமில்², ஆறுமினி³; திட்டசீது⁴ இரண்டுதிரும்; திஸ்திலித்த⁵நீர், ஆறு திரும். ஐருகுலோறிக்கமில்த்தைத் தண்ணீரில் நாலுதிராமோடு கலந்து, அக்கலவையிலே ஸ்திரீக்னியைச் சூடுகாட்டிக் கரைத்து அப்பாற் சிதையும் சேஷமான தண்ணீரையுங் கூட்டவும்.

தேயம். மூன்றுமுதற் பத்து மினிம். ஒவ்வொரு மினிமிலும் ஸ்திரீக்னி தொண்ணூறில் ஒருபங்கு கிறேன் அடங்கியிருக்கும். ஆகையால் ஒன்பதுமினிமிற் பத்தல் ஒருபங்கு கிறேன் ஸ்திரீக்னியிருக்கும். இதிலும் ஸ்திரீக்னியிற் மற்றும் எல்லா ரசிதங்களிலும் தொடக்கத்திற் சிறுதேயங்கொடுத்துப் படிப்படியாய்க் கூட்டுவதே புத்தி.

[சில வருஷங்களுக்கு முன்னே காஞ்சிரம்பட்டையைப் போலிக் கஸ்பாரி⁶ப்பட்டையென்றுசொல்லி யுரோபத்தில் வியாபாரம் பண்ணினார்கள். கள்ளம் வெள்ளமான இவ்விரண்டு பட்டைகளுக்குமுள்ள வித்தியாசத்தை ஒஷானசி பண்டிதரே 1837 ம் ஆண்டு காட்டினார். காஞ்சிரம்பட்டையில் ஸ்திரீக்னியும் புருசிய⁷முமிருப்பதால் இது கொடிய நஞ்சு. இது கற்குத்தாவிற் சேம்பட்டை⁸க்குப் பதிலாக விஸைப்பட்டு வழங்கினது. பட்டைகளின் உள்வளத்துக்கு நீதுரிக்கமில்⁹ம் பூசுவதால் இந்த இரண்டையும் பகுத்தறியலாம். காஞ்சிரம்பட்டையிலே நீதுரிக்கமில்ம் பூசு அது சிவப்பாகும். சேம்பட்டையிற் பூசினாலோ அது அப்படியாகாது. ஸ்திரீக்னி செய்வதிற் காஞ்சிரங்கொட்டைக்குப் பதிலாக அதின் பட்டையை வழங்கலாமென்று கிரிஸ்திசன்பண்டிதர் எண்ணுகிறார். குஷ்டம், சிவ்விசுக்¹⁰கரப்பன், மற்றும் கொடிய சரும நோய்களுக்குப் பெரும்பாலும் பூசும் பிரதான மருத்தெண்ணெயில் இது ஓர் முக்கிய கூறுகின்றது. இந்த மருத்தெண்ணெய்கள் சிலவேளை வாய்க்கிறதென்று முடிவெனச் சொல்லுகிறார்.

அவாகடச்சாக்குகள். Non-Officinal.

பாம்பேட்டிச் சேடி. Strychnos colubrina. இது மலையாளம், சோனமண்டலம், தென்னிந்துவின் மற்றும் பகுதிகள், லங்கை, மொலக்கத்தீவு, முதலிய தேசங்களிலுள்ள ஏறுசேடி. பாம்பு கடிக்கும் நாகநீண்டினதற்குத்தானும், இதின் சிராய் வெளிக்கும் உள்ளுக்கும் வழங்கப்பட்டது. ஆயினும் இதின் சித்தியைப்பற்றி நம்பிக்கையான சாட்சியொன்றும் எழுத்தில் இல்லை. யாவகர் முறைச்சுரங்களுக்கு மருந்தாக இதை வெகுகாலமாய் வழங்கினார்களென்று காசுவீல்டர் சொல்லுகிறார். பெர்கிலு இதை மூன்றாம்முறை நாலாம்முறைச் சுரங்களில் இருபத்திரண்டுபேருக்குக் கொடுத்துப் பார்த்து நயமென்றும் மலிவான மருந்தாகையால் வறியவர்களுக்குக் கொடுக்கலாமென்றுஞ் சொல்லுகிறார். இதிலே ஸ்திரீக்னி அதிகமாயிருப்பதால், கவனமாய்க் கொடுக்கவேண்டும். இதற்குரிய எந்த நயமும் இந்தச்சத்தைப் பற்றியதே. இதின் வீதம் நிதானிக்கப்படாதிருப்பதாலும், பட்டையைச் சேர்க்குங் காலத்துக்குத் தக்கதாய் வீதம் மாறக்கூடியதாயுமிருப்பதால் சமவீதமுள்ளதும் லகுவிற் கூட்டிக் குறைக்கப்படத்தக்கதுமான ஸ்திரீக்னியை

1 Crystal. 2 Dilute Hydrochloric acid. 3 Minim, தனி. 4 Rectified spirit.
5 Distilled water. 6 Cusparia. 7 Brucea. 8 Rohun Bark. 9 Nitric acid.
10 Syphilis.

த்தானே பட்டைக்குப் பதிலாக வழங்குவது புத்தி. நாமறிந்தவரையில் இந்தப்பட்டையை மோசமான சரக்காகவே எடுக்கவேண்டும். இந்துக் கடைகளில் வருவதும் நாட்டு வைத்தியத்தில் அதிகமாய் வழங்கப்படுவதுமாகிய சுயப்பங்கோட்டை¹க்கும் இப்போ சொன்ன குறிப்புகள் ஒக்கும் இதின் உபயோகங்கள் பலவற்றைப் பற்றி நாட்டுவாகடமாகிய தலீவுசெநீவு² கூறுகின்றது. ஸ்திரீக்னியையாவது காஞ்சிரத்தின் வாகடரசிதம் ஏதையாவது வழங்குவதால் இதின் நயமுண்டாகக்கூடுமென்றே தோன்றுகின்றது. இக்கோட்டை ஒலீவப்பழமளவு பருமையும் திரண்டதும் ஒருபக்கத்திற்குவிடும் மற்றப்பக்கத்திற்கு சற்றே கோணலுமானது. வெளிப்பக்கம் நீல நரைநிறங்கலந்த கபிலமானது. பருப்பு மெத்த வைரமாய் உள்ளே முளையை அடக்கியிருக்கும்.

தேற்றங்கோட்டை. Clearing nut. இது தட்டையான உண்டைவடிவும் மஞ்சள்நரைநிறமுமானது. அடர்த்தியான குறுகினமயிரால் மூடப்பட்ட ஒடுள்ளது. பருப்பு வைரமானது, சுவையற்றது; இதற்கு நஞ்சுத்தன்மையிலை; இதை வமனியாகவும் சக்கராமுரி³, கனுறீயம்⁴ முதலிய நோய்களுக்கும் மருந்தாகவுரு சுவேதிகள் வழங்குவார்கள். மண்டித் தண்ணீரைத் தெளியப்பண்ணி அதைக் குடிக்கத் தகுந்ததாக் குவதே இதின் முதல் உபயோகம். மழைகாலத்தில் இந்துதேசத்தில் இராணுவம் பயணம்பண்ணும்போது சொற்ப மண்டித்தண்ணீர்மாத்திரங் கிடைக்கக்கூடியதாயிருக்கையில் அதைத் தெளியப்பண்ணுவதற்கு வைத்தியத் தலைவருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் இது மெத்த உபயோகமாகும். அல்புமினும்⁵ கசியினும்⁶ இதிலடங்கியிருப்பதினாலேயே இத்தன்மை இதற்கிருக்கிறதென்று பெரைரார்பண்டிதர் சொல்லுகிறார். இக்கோட்டையை வெட்டித் தண்ணீரில் ஊறப்போட்டால் தண்ணீர் தடித்த பாகாய் வரும். இதைக் கொதிப்பிக்க அல்புமின் திரைந்திறுகும். பிற்பாடு அசிதிச்சுமிலஞ்⁷சேர்க்க கசியினும் பிரிந்துறையும். இதாற் தண்ணீரைத் தெளியப்பண்ணும் முறை மெத்த லகுவானது. கோட்டையை வெட்டியல்லது துவைத்து ஓர் பாத்திரத்தின் உள்வளத்திற் பூசி அல்லது முழுக்கோட்டையால் உள்வளம் அடங்கலும் தேய்த்துரைஞ்சியபின் அதிலே மண்டித்தண்ணீரை வார்த்துவைக்க அது சீக்கரத்திற் தெளிந்து நன்னீராகும். இத்தன்மையை அத்தாட்சிப்படுத்துவதற்குப் பரிசோதனைகள் இன்னும் கவனமாய்ச் செய்யப்படவேண்டும்.

வாசனைவகிரீயமரம். Fagraea fragrans. இது சீனதேசம் மலாயநாடுகளில் உள்ளது. மலாக்காதேசத்தின் நச்சுக்காய்ச்சலை மாற்றுவதற்கு இதின் பட்டை சித்தியுள்ளதாய்க் காணப்பட்டது. இதை ஆராய்ந்தறியும்படி மென்கை பண்டிதர் வங்காளத்து வைத்திய அதிகாரிகளுக்கு அறிவித்தார். கனலல்லையென்பவர் இதைக் கெமிஸ்தமுறையாகச் சோதித்து இதிலே ஸ்திரீக்னி இருக்கிறதாகக் கண்டார். இம்மருந்தை இன்னும் ஆராய்வது நல்லது.

1 Saint Ignatius's Bean. 2 Taleefshereef. 3 Diabetes. 4 Gonorrhoea. 5 Albumen. 6 Casein. 7 Acetic acid.

ஜென்சியஞ்சியங்கள்.

GENTIANACEAE.

ஜென்சன். YELLOW GENTIAN.

வாயம். இது யுரோபத்தின் மையப்பகுதி தென்பகுதிகளின் மலையடிவாரங்களில் உண்டாகும்.

வாகுடபகுதி. காய்ந்த வேர். இது அரைஇஞ்சு ஒருஇஞ்சு பருமையும் சில இஞ்சு நீளமுமான துண்டுகளாக வரும். பெருமபாலும் திருகினதாயிருக்கும். மெத்தச் சுருக்குந் திரைவுமுள்ளது. அதாவது குறுக்குப் புருவங்கள் அடர்ந்திருக்கும். வெளியிற் கபிலநிறமும் உள்ளே மஞ்சளமானது. உரத்தது, கண்ணறைகள் உள்ளது. சுவை முதலே இனிக்கும், பிறகு மெத்தக் கசக்கும். ஜென்சனீது¹ என்ற கைப்பான எசுரூத்திவி²லேயே இதின் செயல் தங்கும். மேலும் ஜென்சனின்³ என்ற ஓர் கிரிஸ்தர்⁴பதார்த்தமும் ஓர் அத்ஜிர⁵வெண்ணெய்யும் இதிலே அடங்கியிருக்கும்.

தன்மைகள். இது உத்தமமான கைப்புத்தொணிகம்⁶.

உபயோகம். பெலவீனத்துக்கும் கடுமையான நோயினின்று சுகப்பட்டு வருபவர்களுக்கும் அசீரண நோய்களுக்கும் அசீரணத்துக்கும் இது சித்திபெற்ற மருந்து. முன்னே முஹச்சுரங்களுக்கும் இது பெயர்பெற்றிருந்தது.

ரசிதங்கள். ஜென்சன்கூட்டின்வூசம். Compound Infusion of Gentian. கொள். நறுக்கிய ஜென்சன் வேர், துண்டாக்கிய கைச்சற் தோடந்தோல், வகைக்கு அறுபது கிரேன்; பச்சைலெமன்⁷தோல், துண்டாக்கி கால் அன்சு; கொதிவெந்நீர் பத்து அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் ஒரு மணிநேரமூறவிட்டுச் சீலையில் வடித்தெடுக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு வரைக்கு நாள் இரண்டுமூன்றுமுறை கொடுக்கலாம்.

ஜென்சன்மீஸ்தூர். Gentian Mixture. கொள். நறுக்கிய ஜென்சன் வேர், கால் அன்சு; துண்டாக்கிய கைச்சற் தோடந்தோல், இடித்த கொத்தமல்லி, வகைக்கு முப்பது கிரேன்; புருவுசீது⁸, இரண்டு அன்சு; தண்ணீர் எட்டு அன்சு. ஜென்சன் வேர், தோடந்தோல், மல்லி மூன்றையும் புருவுசீதில் இரண்டுமணிநேரமூறப்போட்டுப் பிற்பாடு தண்ணீரைவிட்டுத் திரும்பவும் இரண்டுமணிநேரமூறவிட்டுக் காரிக்கம்புடவையில் வடிக்கவும்.

தேயம். அரை அன்சுமுதல் இரண்டன்சை நாள் இரண்டு மூன்று முறை கொடுக்கலாம்.

ஜென்சனேசுரூத்து. Extract of Gentian. கொள். நறுக்கிய ஜென்சன்வேர், ஒரு இரூத்தல்; கொதிவெந்நீர் ஒரு கலன். ஜென்சன் வேரை அந்த வெந்நீரில் இரண்டுமணிநேரமூறவிட்டுப் பதினைந்து மினி வரைக்கு அவித்து தெளித்து உறந்து சீலையில் வடிக்கவும். நீர்மத்திகத்தில் ஏற்றிக் குளிகைப்பதமாய் வறட்டவும்.

1 Gentianite. 2 Extractive. 3 Gentianin. 4 Crystal. 5 Volatile. 6 Tonic.

7 Lemon. 8 Proof spirit.

தேயம். இரண்டு கிறேன் முதற் பத்துக்கிறேன் கொடுக்கலாம். இது குளிகையில் பெலந்தரும் மற்றும் மருந்துகளுடன் நயமாகச் சேரும்.

தேன்சன்கூட்டிரஞ்சம். Compound Tincture of Gentian. கொள். இடித்த ஜென்சன்வேர், ஒன்றரை அன்சு; வெட்டித் துவைத்த கைச்சற் தோடந்தோல் முக்கால் அன்சு; கோதுரித்து இடித்த ஏலக்கொட்டை கால் அன்சு; புருவுசீது¹ அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்திற் சரக்குகள் எல்லாவற்றையும் பதினைந்து அன்சுசீதில் இரண்டுநாளுறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கவும். அப்பாற் சியந்தனியில்² வார்த்து நீர் வடிந்தொழிந்தபின் சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும் வார்த்து வடியவிடவும். அப்பாற் சக்கை யைப் பிழிந்து வடித்து இரண்டு நீர்களையுங் கலந்து அரைநாழிக்குப் போதிய புருவுசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். அரைத்திரும் முதல் இரண்டுதிருங் கொடுக்கலாம்.

சிரட்டுச்சி. CHIRETTA.(52)

வாசம். மத்திம இமயத்திற் குமயனுருக்குக் கிழக்கே இப்பூண்டு உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. சமூலமும், காய்க்கத்தொடங்கும்போது சேர்க்கப்படும். இந்தப் பூண்டின் லட்சணங்களாவன: தண்டு இரண்டு முழநீளமும் ஈர்க்க ளவு பருமையுமாய்த் திரண்டு அழுத்தமாயிருக்கும். வெண் கபிலநிறமானது; கிளைத்தது; கிளைகள் ஒன்றுக்கொன்று எதிர்நேரில் இருக்கும்; பூக்கள் சிறுத்து அனேகமாய்க் குவிந்திருக்கும். சமூலமும் கடுமையான கைப்பு. இதிலே கைப்பான ஓர் எசுரூத்திவு³ம், ஓர் ராஸப்⁴பதார்த்தமும் இருக்கும். இவைகளிலேயே இதின் சாரம் அடங்கும்.

தன்மை. வீரன சுத்தக் கைப்புத்தொணிகம்⁵.

உபயோகம். ஜென்சனைப்போலவே.

ரசிதங்கள். சிரட்டுச்சியின்வூசம். Infusion of Chiretta. கொள். நறுக்கிய சிரட்டுச்சி, கால் அன்சு; 120 பாகை சூடான நீர், பத்து அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் அரைமணிநேரமுறப்போட்டுச் சீலையில் வடிக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டுஅன்சு, நாள் இரண்டுமூன்றுமுறை கொடுக்கலாம்.

சிரட்டுச்சிக்கூட்டிரஞ்சம். *Compound Tincture of Chiretta. கொள். இடித்த சிரட்டுச்சி ஒன்றரை அன்சு; துவைத்த தோடந்தோல் முக்கால் அன்சு; கோது நீக்கி இடித்த ஏலக்கொட்டை கால் அன்சு; புருவுசீது அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்தில் ஏழுநாளுறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கி இறுத்துப் பிழிந்து சீலையில் வடித்து அரைநாழி தேறப் போதிய புருவுசீதைக் கூட்டவும்.

தேயம். ஒரு திரும் முதல் இரண்டுதிருங் கொடுக்கலாம். மற்றுந்தொணிகங்களுக்கு இது நல்ல துணைமருந்தாகும்.

[தென்னிந்துவில் இந்தப் பூண்டை நிலவேம்பு என்று மாறி வழங்குகிறார்கள்.]

1 Proof spirit. 2 Water bath. 3 Extractive. 4 Resin. 5 Tonic.

(52) அனுபந்தம்பார்.

அவாகடச்சரக்துகள். Non-Officinal.

இமயஜேன்சன். *Gentiana Kuroo*. இமயமலையிலுள்ள இந்தப் பூண்டின் வேர் யுரோபஜேன்சனின் கைப்பு உடையது. அதைப் போலவே இதை வழங்கலாம். அதற்கு இது உத்தம பதிலாகும். இதையுங் கூட்டி இனஞ்சமாகச் செய்து ஜென்சன் கூட்டி இனஞ்சத்தின் தேயமாய்க்கொடுக்கலாம்.

ஒடுக்கிலேச்சிரட்பூடு. *Ophelia angustifolia*. அழகுச்சிரட்பூடு. *O. elegans*. சடைச்சிரட்பூடு. *O. densifolia*. இவைகளெல்லாம் சிரட்டுச்சியின் இனங்கள். இவைகளும் அதைச்சேர்ந்த மற்ற இனங்களும் இமயமலையில் உண்டாகும். இவைகளிற் சில சென்னையின் மலைகளிலும் உண்டு. இவைகள் எல்லாங் கடுங்கைப்பு உள்ளவைகள். ஆகையாற் சிரட்டுச்சி கிடையாத நடுவிந்து தென்னிந்துவிலும் அது அரிதாய்க் கிடைக்கக் கூடிய நேபாளத்துக்கு மேற்குப் பகுதியிலும் இவைகளை அதற்குப் பதிலாக வழங்கலாம். வங்காளத்தின் வடமேற்கு மாகாணங்களில் சிரட்டுச்சிக்குப் பதிலாக இமயமலையில் எராளமாயுள்ள ஒடுக்கிலேச்சிரட்பூடு அதிகமாய் வழங்கப்படும். சென்னையின் மலைகளிலுள்ள அழகுச்சிரட்பூடு நெடுகநிற்கிற கடுங்கைப்புள்ளதென்று கிளைகன் வைத்தியர் சொல்லியிருக்கிறார். இதாற் சீரணஉறுப்புகள் பெலனடைந்து சுகந்தேறுவதைப் பலசோதனைகள் உறுதிப்படுத்துகின்றனவென்று அவர் சொல்லுகிறார். இதற்கு அந்திபிராடி¹த் தன்மையுமுண்டென்று தோற்றுகின்றது. அரைநாழி தண்ணீருக்கு இதில் இரண்டு திரும் வீதமாக ஊறப்போட்டு இனஞ்சமாய்க் கொடுப்பதே உத்தமமான முறை. இது வாகடத்துக்குரிய சிரட்டுச்சிக்குச் சமமும், சிலருடைய எண்ணப்படி கதிப்புமானது. கங்கன் தேச மலைகளுக்குரிய சடைச்சிரட்பூடுக்கு வாய்ப்பான பதிலாய் வம்பாயில் வழங்கப்படுகிறது. பிறவுதன் பண்டிதர் இதை விசேஷித்து விவரித்திருக்கிறார். காய்ந்தவேர் இரண்டு இஞ்சவரைக்கு நீளமும் ஈர்க்களவு பருமையுமுள்ள நொருக்கலான துண்டுகளாக வரும்; இரண்டு மூன்று கூர்தல்கள் உள்ளதாயும் வெண் கபில நிறமான வெளித்தோலால் மூடுண்டு நெடும்பாட்டுக்குச் சுருக்குகள் விழுந்தும் உள்ளே வெண்மையாயுமிருக்குமென்று அவர் சொல்லுகிறார். இதின் தன்மை உபயோகங்கள் ஜென்சன் சிரட்டுச்சியின் தன்மை உபயோகங்களுக்குச் சரியென்றும் அவைகளுக்குப் பதிலாக இதை வழங்கலாமென்றும் அவர் எண்ணுகிறார். காய்ந்த பூண்டும் இதுபோல் வழங்கப்படுகிறதுபோலும்.

சதுரேச்சகப்பூடு. துவிவன்னவேச்சகப்பூடு. *Exacum tetragonum* and *E. bicolor*. இவைகளுள் முதலாவது இமயத்திலும் வங்காளம் மத்தியஇந்துவின் மலைகள் பள்ளங்களிலும் வம்பாய் வரைக்கும் உண்டாகும். இது சமூலமுங் கடுங்கைப்புச் சுவையுள்ளதென்று ரைல் சொல்லுகிறார். தொணிகமாக இது அதிகசெயலுள்ளதுபோலும். இரண்டாவதாகிய துவிவன்னவேச்சகப்பூடு கங்கணம் குத்தாக்கு துவங்கிச் சென்னை முழுதும் உண்டு. இதின் காய்ந்த தண்டுகள் மங்களுரிலும் தென்னிந்துவின் மற்றும் பகுதிகளிலும் நாட்டு நிலவேம்பு என்று விலைப்படும். ஜென்சனுக்குரிய தொணிக ஸ்தோமாகி²த்தன்மைகள் இதற்கு உண்டு. கிடைக்கக்கூடியவிடங்களில் அதற்குப் பதிலாக இதை வழங்கலாம். இந்த இரண்டு பூண்டுக

1 Antiperiodic, சாமீகரி. 2 Stomachic, கேசனி.

ளையுந் தவிர, தாளெச்சகம் *E. pedunculatum* என்று இன்னொரு இனம் மேல்மைசூரிலுண்டென்றும் இவைக்தூரிய தன்மைகளெல்லாம் அதற்கும் உண்டென்றும் பிதிபண்டிதர் சொல்லுகிறார். அதின் கைப்புச் சிரட்டுச் சியைப் போலக் கடுமையுங் கார்ப்புமல்ல. இது ஜென்சனுக்கு அதிகங்கி ட்டியதாதலால் அதற்குப் பதிலாக இதைக் கொள்ளலாமென்றும் அவர்சொ ள்லுகிறார். பூ வாடத்தொடங்கும்போதே இப்பூண்டைப் பிடுங்கிக் கவன மாய் நிழலில் உலர்த்தி எடுக்கவேண்டுமென அவர் சொல்லுகிறார். சிர ட்டுச்சியின் இன்ஞ்சும், ரஞ்சங்களின் வீறுள்ள ரசிதங்கள் செய்தே அதை உள்ளுக்குக் கொடுக்கலாம். இவைகளைத்தவிர எச்சகப்பூண்டில் இன்னும் பல இனங்கள் இந்துவில் உண்டு. அவையுள்ள இடங்களில் அவற்றைச் சோ திப்பது நல்லது.

வேளாறுகு. *Cicendia hyssopifolia*. இது இந்துவின் மிகுதியான பகுதிகளிலே ஈரிப்பான இடங்களில் உண்டாகும். இந்த இனத்தைச் சேர்ந்த மற்றும் பல பூண்டுகளைப்போல இதுவும் கைப்புடையது. சென் னைதேசத்தார் இதை ஸ்தொமாகி¹யாக மெத்த வழங்குகிறார்களென்றும் தொ ணிக²த்தன்மையோடு சற்றே விரேசனத்தன்மையும் இதற்கு உண்டென்று ம் கிளைகன் பண்டிதர் சொல்லியிருக்கிறார்.

எரிதீரப்பூடு. *Erythraea Roxburghii*. இது மைசூர், தெக்கணம், வங்காளங்களிலுள்ள பூடு. சமூலமுங் கடுமையான கைப்பு. சுதேசிகள் இதை மெத்த மதிக்கிறார்கள். இது நல்ல தொணிகமாகுமென்பதற்குச் சந் தேகமில்லை.

பிக்குனியாசியங்கள்.

BIGNONIACEAE.

அவாகடச்சாக்கு. Non-Officinal.

Bignonia xylocarpa. இது கந்தீசு தொடங்கி மலையாளம் வரைக்குமுள் ள காடுகளிலும் இந்துவின் மற்றும் பகுதிகளிலும் நிற்கிற சிறியமரம். சுதே சிகள் இதைக் கூர்சிங்கு (*Kursing*) மரம் என்பார்கள். இதின் சிராயைத் திஸ்திலித்³தெடுக்கும் எண்ணெய் சருமநோய்களுக்கு உத்தம மருந்தாகும். இது இவைகளுக்கு நல்ல பூச்சுமருந்தாகுமென்று கிப்சன் பண்டிதர் சொல் லுகிறார்.

சேசாமியங்கள்.

SESAMEAE.

அவாகடச்சாக்குகள். Non-Officinal.

எள்ளு. *Sesamum Indicum*. இது இந்துதேசத்தின் எப்பகுதியிலும் பூமியின் உஷ்டணப்பகுதிகளிலும் எண்ணெய்க்காக செய்கைபண்ணப்படுகின்றது. இதைப் பிழிந்து சுத்தமாயெடுத்த எண்ணெய் மருந்துப்பிர

1 Stomachic, ரோசனி. 2 Tonic. 3 Distill.

யோகங்களில் ஒலீவெண்ணெய்¹க்குச் சரியாகுமென்று வங்காள தின்பென் சதுறி² என்ற வாகடங் கூறுகின்றது. காயங்கள், விரணங்கள் முதல் பவற் றின் பரிகரிப்பில் எண்ணெய் இடுவது திறமென்று பேண் வைத்தியர் வித ந்துபேசுகிறார். அவர் தமது ஆஸ்பிதல்³களிலே சுத்தஎண்ணெய்யைச் சீலை யிற் தோய்த்து எவ்வகைக் காயங்கள் புண்களுக்கும் இடுவது வழக்கமென் கிறார். எவ்வகையான புண்களுக்கும் விசேஷமாய் உஷ்டண காலங்களில் இந்த எண்ணெய் உத்தமமென்றது அவரது எண்ணம். இந்த நூலைப் பிர சுரஞ்செய்தவர் சுண்ணவினிமென்⁴ செய்வதில் ஒலீவெண்ணெய்க்குப் பதி லாக இதையே வெகுவுருஷங்களாக வழங்கிவந்து மிகத் தகுந்ததென்று கண்டார். சுதேசிகன் இதை அதிகமாய்ச் சாப்பாட்டுக்குச் சேர்ப்பார்கள ன்றி வழக்கமாய்த் தலைக்கும் பூசுவார்கள். எள்ளுக்கு வீரூன எம்மெனக் குத்தன்மை உண்டாம். அதை அதிகமாய்த் தின்றற் கருவையழிக்குமென் று சுதேசிகளும் இந்துபிறித்தரும் நினைக்கிறார்கள். ஒரு சிறங்கை எள்ளை த்துவைத்து, வெந்நீரில் ஊறவிட்டு அதற்குள்ளே நோயாளியை இருத்தத் தீட்டுண்டாகுமென்பதற்குப் போதிய அத்தாட்சியுண்டு. தீட்டை ஒழுக் குந்தன்மை இக்கொட்டைக்கு உள்ளதோ அல்லவோவென்று இன்னும் பா ர்ப்பது நல்லது. எள்ளிலை வாகடத்துக்குரியதென்று அமரிகவாமகுபீய⁵த்தி ற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த இலையிலே பிசுபிசுப்பான தடித்த பாணி நிறையவுண்டு. இது சுறுக்குத் தண்ணீரிற் கரையும். வட அமரிக த்தின் தென்பகுதிகளில் இந்த இன்வூசத்தை திமல்சம்⁶ வேண்டிய எந்தநோ ய்களுக்கும் வழங்குவார்கள். முற்றின இரண்டொரு பச்சை இலையைக் கால்நாழி தண்ணீரில் ஊறப்போட்டால் சுறுக்குத் தகுந்த பிசுபிசுப்பாய் வரும். இலை காய்ந்ததானால் அதற்கு வெந்நீர்வேண்டும். சாந்தன்⁸ பாப் பை செய்வதற்கும் இலைகள் உதவும். இந்துவிலுள்ள எள்ளிலைகளை இதற் கெவ்வளவாய் வழங்கலாமென்று இனிமேல் நிதானிக்கவும்.

பெருநெருஞ்சி. *Pedaliu Murex*. இது சென்னையின் பல பகுதிக ளில் விசேஷமாகக் கடலருகில் உண்டாகிற பூடு. பச்சையான இலைக ளுந் தண்டுகளுமிட்டுக் கலக்கப்பட்ட தண்ணீர் ஏறக்குறையக் கோழிமு ட்டையின் வெள்ளைக்கருவளவு தடிப்புள்ள மணஞ்சுவையற்ற பாணியா கும். இப்படிச் செய்த இன்வூசத்தைக் கணுநீயம்⁹, திசூறி¹⁰ என்னுநோய்களு க்கு உத்தம மருந்தாகத் தெற்கிந்துவின் சனங்கள் மதிக்கிறார்கள். இந்த நோய்களுக்கு இது நயர்த மருந்தென்றும் அமுரிதி¹¹யாக வழங்க இதின் செயல் சீக்கிரந் தோன்றுமென்றுஞ் சந்தேகமற விளங்குகின்றது. இந்தப் பூண்டின் உபயோகத்தைப் பற்றி ஐவீசு பண்டிதரும் மெத்த நயந்து பேசு கிறார். வேறு மருந்தின் உதவியின்றி இந்த முசிலாகு¹² கணுநீயத்தை மாற் றினதென்று அவர் சாட்சியிட்டிருக்கிறதமன்றி தமஸ் பண்டிதரும் அவ்வா று சாட்சியிடமிருக்கிறார். பாணியான தண்ணீர் மறுபடி சுறுக்குத் தடிப் பற்றுப்போதுமாகையால் கொடுக்கும் ஒவ்வொருமுறையும் அதைப் புதுக் கச் செய்துகொள்ளவேண்டும். இதின் செயல் தன்மைகளைப்பற்றி இன் னும் ஆராய்வது நல்லது. இந்துக் கடைகளில் இதின் பழங்கள் வரும். அவை நாகோணமும் அரை இஞ்சு நீளமுமானவைகள்; முள்ளுள்ளவை

1 Olive oil. 2 Dispensatory, கிச்சைதல். 3 Hospital. ஷிகம். 4 Linimentum calcis. 5 Emmenagogue. 6 U. S Pharmacopoeia. 7 Demulcent, சமஇ. 8 Emollient. 9 Gonorrhoea, வெட்டை. 10 Dysuria, சலக்கெட்டி. 11 Diuretic. 12 Muenlage.

கள், மணஞ் சுவையற்றவைகள். இவைக்குத் திமல்ச¹ அமுரிதித் தன்மைகள் உண்டென்று எண்ணிச் சதேசிகள் இவற்றை அதிகமாய் வழங்கிவருகிறார்கள்.

கன்வல்வுலாசியங்கள்.

CONVOLVULACEAE.

ஜலப்பு. JALAP PLANT.

வாசம். இது மெக்சிகுவின் மலைச்சோலைகளில் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. காய்ந்த கிழங்கு. இது கடுக்காய் முதல் மாங்காயளவு பருமையுள்ளது; முட்டை வடிவானது; பருங் கிழங்குகள் பெரும்பாலும் கீறண்டிருக்கும்; கபில²நிறமான மெல்லிய சுருக்கு விழுந்த தோலால் மூடிக் கிடக்கும். வெட்டும்போது மஞ்சள் நரைநிறமுள்ளதாயும் மையத்தை நோக்கிய கருங் கபிலநிறமுள்ள வளையங்களாகவும் தோற்றும்; சொற்ப நாற்றமுள்ளது. சுவை முதலில் இனிப்பும் உவட்டுமாய்ப் பிறகு கார்ப்பாகும். இதின் சத்து கீழே குறிக்கப்படும் ராளமே.

நன்மை. இது விரேசனி, அந்தெல்மிந்தி³.

உபயோகம். மலக்கட்டுக்கும் நீர்க்கோவை நோய்களுக்கும், சுள்ளாப் பான விரேசனந் தேவையான மற்ற நோய்களுக்கும் இது கைகண்ட மருந்து. விசேஷமாய்ப் பின்வரும் முறைப்படி கூட்டுச் சூரணமாய்க் கொடுத்தால் வாய்க்கும். இது சிறுபிள்ளைகளில் கீரைப்பாம்பைக் கழற்றுவதற்கே விசேஷித்த அந்தெல்மிந்தி.

தேயம். கிழங்கு மாவிற்பத்து முதல் முப்பது கிறேன் கொடுக்கலாம். குழந்தைகளுக்கு இரண்டு முதல் ஐந்து கிறேன் கொடுக்கலாம்.

ரசிதங்கள். ஜலப்புக்கூட்டுச்சூரணம். Compound powder of Jalap. கொள். ஜலப்புத்தாள், ஐந்து அன்சு; பதாசியமிலதாத்தரசு⁴, ஒன்பது அன்சு; சுக்குத்தாள், ஒரு அன்சு; நன்றாய்க் கலந்து மெல்லிய அரிப்பெட்டியில் அரித்துக் கடைசியில் குழியம்மியில் இட்டு மெல்ல அரைக்கவும்.

தேயம். ஒருபது கிறேன் முதல் ஒரு திரும் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். ஜலப்பைக் கொடுப்பதற்கு இதுவே உத்தமமான முறை.

ஜலப்பிரஞ்சம். Tincture of Jalap. கொள். ஜலப்புக்கிழங்கு பருக்கன்தாளாக, இரண்டரை அன்சு; புருவுசீது⁵, அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்தில் ஜலப்புத்தாளைப் பதினைந்து அன்சு சீதில் இரண்டுநாளுறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கி, அப்பாற் சிவந்தனியில் வார்த்து, நீர் வடிந்தொழிந்தபின் சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும் விட்டு வடிக்கவும். பின்பு சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து இரண்டு நீர்களையுங் கலந்து அரைநாழிக்குப் போதிய புருவுசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். அரைத்திரும் முதல் ஒருதிரும் கொடுக்கலாம். விரேசனபானங்களுக்கு இது விசேஷமாய் அனுமருந்தாக வழங்கப்படும்.

1 Demulcent சாமி. 2 Brown. 3 Anthelmintic. 4 Acid Tartrate of potash.

5 Proof spirit. 6 Percolator.

ஜலப்பெசிற்த்து. Extract of Jalap. கொள். ஜலப்புக்கிழங்கு பருக்கந்துளாக ஒரு இரூத்தல்; திட்டசீது இரண்டுநாழி; தண்ணீர் ஒருகலன். ஜலப்புத்தாளைச் சீதில் எழுநாளுறவிட்டு அந்த ரஞ்சத்தைப் பிழிந்து வடித்து, அதைத் திஸ்திலித்துச்³ சீதை அகற்ற, மெதுவான எசிரூத்து வரும். அப்பாற் சக்கையைத் தண்ணீரில் நாலுமணிநேரமுறப்போட்டுப் பிழிந்து கம்பளியில் வடித்து, மெதுவான எசிரூத்தாய் வருந்தனையும் நீர்மத்திகத்⁴தில் வறட்டவும். இரண்டு எசிரூத்துக்களையுங்கலந்து, குளிகைக்குத் தகுந்த பதமாய் வருந்தனையும் 140 பாகைக்கு மேற்படாத சூட்டில் வறட்டவும்.

தேயம். ஐந்து முதற் பதினைந்து கிறேன் கொடுக்கவும்.

ஜலப்பிராள். Resin of Jalap. கொள். ஜலப்புக்கிழங்கு, பருக்கந்துளாக எட்டுஅன்சு; திட்டசீது போதியது; தண்ணீர்போதியது. மூடிய பாத்திரத்திலே ஜலப்புத்தாளைப் பதினைந்து அன்சுசீதில் ஒருநாளைக்குமென்ருட்டில் ஊறப்போட்டு அப்பாற் சியந்தனியில் வார்த்து ரஞ்சம் வடிந்தபின், சத்து முழுவதையும் வாங்குந்தனையும் திரும்பத் திரும்பச் சீதைவிட்டு வடிக்கவும். இந்த ரஞ்சத்துக்கு நாலு அன்சு தண்ணீர் கூட்டி நீர்மத்திகத்திற் திஸ்திலித்துச் சீதை அகற்றவும். சேஷமான மண்டியைச் சூடாயிருக்கையில் எடுத்து, திறந்தவோர் பாத்திரத்திலிட்டு ஆறவிடவும். மிதக்கு நீரை ராளத்தை விட்டுத் தெளித்து, ராளத்தை வெந்நீரால் இரண்டு மூன்றுமுறை கழுவிப் பீங்கான் தட்டில் வைத்து அடுப்பின் சூட்டிலாவது நீர்மத்திகத்திலாவது உலர்த்தவும். லட்சணங்கள். இது கருங்கபிலமும் மங்கலுமான நொருக்க¹ற் துண்டுகளாக வரும்; வளிம்புகள் உருவொளியாயிருக்கும்; ராளம்போல் ஒடியும்; வெண்கபில மாவாக லகுவில் அரைபடும்; இனிய மணமுடையது; தொண்டையிற் கரிக்கும்; திட்டசீதிற் சுறுக்குக் கரையும்; ஈதரிற்⁵ சொற்பமாய்க் கரையும்; தர்ப்பந்தின்⁶ எண்ணெயிற் கரையாது.

தேயம். இரண்டு கிறேன் முதல் ஐந்துகிறேன் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். கூடவுங் கொடுக்கலாம். இது விக்கினமற்ற சித்தியான விரேசனி.

[இந்துக்கடைகளிற் பெரும்பாலும் பூச்சி தின்றதாய் வரும் ஜலப்புக்கிழங்கிலே சிராய் பூச்சியாற் தின்னப்பட்டும் ராளம் எடுபடாமலிருப்பதால் இந்த ராளம் செய்வதற்குப் பூச்சிதின்ற கிழங்கு புதுக்கிழங்கைப்போலத் திறமல்லாதிருந்தாலும் உதவும்.]

ஸ்கமுனிக்கோடி. SCAMMONY PLANT.

வாசம். இது கிரேக்கு, சின்னாசியம், சூரிய தேசங்களில் உண்டாகும். வாகடபகுதிகள். 1 காய்ந்த வேர். 2 பிசினிராளம். இது வேரிற் கீறுமிடத்து வடியும். நரைநிறமான ஒப்பரவற்ற அடாவத் துண்டுகளாக வரும். புதுக்க ஒடிந்தவிடத்துக் குங்குலியம்போற் சிம்புசிம்பாயும் மினுக்கமாயுமிருக்கும். காய்ந்தாற் கருமையாகும். சுவை மணங் கேசுபோலிருக்கும். சப்பும்போது தொண்டையின் பின்வளத்திற் சற்றே உறைக்கும். பிசங்கலான நரைநிறத் துளாக இலகுவில் அரைபடும். தண்ணீர்

1 Rectified spirit. 2 Gallon, ஈலுசாழி. 3 Distill. 4 Water-bath. 5 Ether. 6 Turpentine.

ரோடு சேர்ந்து நல்ல இமல்ச¹மாகும். ஐருகுலோறிக்கமில²த்தோடுசேரும் போது நுரையாது. இதின் மாவைக் கொதுவெந்நீர்³ப் போட்டுக் குலுக்கி, ஆறவிட்டு வடித்து, இயோதரஞ்சத்³தோடு கலந்தால், நீலமாகாது. 100 க்கு 80 முதற் 90 பங்கு ராளத்தை ஈதர் கரைக்கும். சேஷமாயிருப்பதில் மிகுதியான பகுதி சொற்ப ஈரிப்புடன் கூட்டி வந்த பிசினே. பின்சொல் லப்படும் ஸ்கமுனிராளமே இதின் சத்து.

தன்மை. இது விடேரசனி, அந்நெல்மிந்தி.

உபயோகம். ஜலப்பைப்போலவே.

நேயம். ஐந்துமுதற் பத்துக்கிறேன் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். இச்ச ரக்குப் பெரும்பாலும் அசுத்தங் கலந்ததாகில் பதினைந்து கிறேன் வரைக் கும் அதிகமாயுங் கொடுக்கவேண்டிவரும்.

ரசிதங்கள். ஸ்கமுனிக்கூட்டுச்சீதரணம். Compound Powder of Scammony. கொள். ஸ்கமுனித்தூள், நாலு அன்சு; ஜலப்புத்தூள், மூன்று அன்சு; சுக்குத்தூள், ஒருஅன்சு. திறமாய்க் கலந்து மெல்லிய அரிப்பெட் டியில் அரித்துக் கடைசியில் குழியம்மியில் இட்டு மெதுவாய் அரைக்கவும்.

நேயம். வளர்ந்தோருக்குப் பத்துமுதல் இருபதுகிறேன்வரையற் கொ டுக்கலாம். பத்துவயசுக்குட்பட்டபிள்ளைகளுக்கு ஆறுமுதல் எட்டுக்கிறேனு ம் குழந்தைகளுக்கு மூன்றுமுதல் ஐந்துகிறேனுங் கொடுக்கலாம்.

ஸ்கமுனிலேகியம். Confection of Scammony. கொள். ஸ்கமுனிமா, மூன்று அன்சு; சுக்குமா, ஒன்றரை அன்சு; கறுவித்தேல்⁴ ஒருதிரும்; கராம் புத்தேல், அரைத்திரும்; சிறுபம்⁵ மூன்று அன்சு; சுத்த தேன் ஒன்றரை அன்சு. மாவிரண்டையும் சிறுபத்தோடும தேனோடும் சேர்த்து ஒன்றரயரைத் துத் தேல்களையுங் கூட்டிச்சேர்க்கவும்.

நேயம். பத்துமுதல் முப்பது கிறேன் அளவு கொடுக்கவும்.

ஸ்கமுனிராளம். Resin of Scammony. கொள். ஸ்கமுனிவேர், பரு க்கன்தூளாக, எட்டு அன்சு; திட்டசீது⁶, போதியது; திஸ்திலநீர்⁷ போதிய து. மூடிய பாத்திரத்திலே ஸ்கமுனிவேரைப் பதினாறு அன்சு சீதில் மெ ன்கூட்டில் ஒருநாளுறப்போட்டு அப்பாற் சியந்தனி⁸யில் வார்த்து ரஞ்சம்வ டிந்தபின் இன்னும் சீதுவிட்டு, வேரின் சத்து வாங்கப்படுந்தனையும் மெல் ல மெல்ல வடியவிடவும். அந்த ரஞ்சத்துக்கு நாலு அன்சு தண்ணீர் சே ர்த்து நீர்மத்திகத்திற்⁹திஸ்திலித்துச் சீதை அகற்றி மீந்த மண்டியைச் சூடாயி ருக்கையில் எடுத்துத் திறந்தவோர் பாத்திரத்தில் வைத்து ஆறவிடவும். மித க்கும் நீரை ராளத்தைவிட்டுத் தெளித்து ராளத்தை வெந்நீராற் பலமுறை க் முவிப் பீங்கான் தட்டில் வைத்து அடுப்பின் சூட்டிலாவது, நீர்மத்திகத்தி லாவது, உலர்த்தவும். ஸ்கமுனி என்ற ராளப்பிசினிலிருந்தும் இதை இப் படியே செய்யலாம். லட்சணங்கள். இது உருவொளியும் கபிலமுமா ன நொருக்கந்துண்டுகளாக வரும்; ஒடிவு குங்குலியம் போன்றது; வேரிற் செய்ததாகில் இனிய சுகந்தமுடையதாகும். இது தனியே தண்ணீர்ற் க ரைந்து இமல்சமாகமாட்டாது. இதின்ரஞ்சம் பச்சையான புடேதுக்கி¹⁰ ங்கின் வெட்டுவாயை நீலமாக்கமாட்டாது. ஈதர்¹¹இதை முற்றாய்க் கரைக் கும்.

1 Emulsion. 2 Hydrochloric acid. 3 Tincture of Iodine. 4 Oil of caraway.
5 Syrup. 6 Rectified spirit, 7 Distilled water, 8 Percolator- 9 Water bath.
10 Potatoe 11 Ethar

தேயம். மூன்று முதல் எட்டுக் கிறேன் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். கலவையாய்க் கொடுப்பதே உத்தமம்.

[வாடிக்கையாய்வரும் ஸ்கமுனியைப்பார்க்க இந்த ராளம் சுத்தமாயிருப்பதாலும் கொடுத்தபின் அது நிச்சயமாயும் ஒரே சரியாயுஞ் சேஷ்டிப்பதாலும் விரேசனத்துக்கு இதுவே உத்தமமானது.]

ஸ்கமுனிமீஸ்துர். Scammony Mixture. கொள். ஸ்கமுனிராளம், காலுகிறேன்; பால் இரண்டு அன்சு. பாலிற் கொஞ்சத்தை விட்டு ஸ்கமுனிராளத்தை அரைத்து படிப்படியாய் மிச்சப் பாஸையும் விட்டு நல்ல இடல் சமாய் வருந்தனையும் அரைக்கவும்.

தேயம். பிள்ளைகளுக்கு அரை அன்சு முதல் இரண்டு அன்சுவரையிலுங் கொடுக்கலாம். இச்சற்குக் கெட்ட சுவையிலையாதலாற் பிள்ளைகளுக்கே உவந்தது.

கலுசிந்தக்கூட்டுக்குளிகை¹, கலுசிந்தயசேமசுக்குளிகை², கலுசிந்துக்கூட்டுடெசுரூத்து³, என்ற சித்தங்களில் ஸ்கமுனி சேருகின்றது.

*ஜி.ரீகிவிரை. KALADANA.

வாசம். இது இத்துவடங்களும் உண்டாகும்.

வாகடபதூதி. விரை. இது கறுப்பு முனையுள்ளது. நீளம் கால் இஞ்சு அல்லது மேற்படவீருக்கும். ஒவ்வொன்றும் அரைக்கிறேன் வரைக்குகிறக்கும். தோடஞ்சுளை வடிவானது. இனித்துப் பிறகு காருகிற சுவையும் அதிக மணமுமுடையது. பின்னே சொல்லப்படும் வாபீதிசின்⁴ என்ற ராளமே இதின் சத்து.

தன்மை உபயோகம். இது சித்தியுள்ள விரேசனி. மோசமற்றது. வாகட ஜலப்பின், தன்மை உபயோகங்களுக்குச் சரியானது. அதைப்போல் இது சுன்னாப்பானதல்லாதிருந்தாலும் அதற்காக இதை வழங்கலாம். (53)

தேயம். விரைத்தாளில் முப்பது கிறேன்முதல் ஐம்பது கிறேன்வரையிற் கொடுக்கலாம்.

ரசித்தங்கள். ஜி.ரீகியேசிறுத்து. Extract of Kaladana. கொள். ஜி.ரீகிவிரை, பருக்கன்தாளாக, ஒரு இரூத்தல்; திட்டசீது⁵ இரண்டு நாழி; தண்ணீர் நாலுநாழி. ஜி.ரீகி விரையைச் சீதிலே ஏழுநாளாறப்போட்டு, ரஞ்சத்தைப் பிழிந்து பிற்பாடு வடித்து, சேதத் திஸ்திலித்தகற்ற, மெதுவான எசுரூத்து வரும். அப்பாற் சக்கையத் தண்ணீரில் நாலுமணிநேரம் ஊறப்போட்டு, பிழிந்து கம்பளியில் வடித்து மெதுவான எசுரூத்தாய் வருந்தனையும் நீர்மத்திகத்தில் வறட்டவும். இரண்டு எசுரூத்துகளையுங் கலந்து குளிகைக்குத்தருந்தபதமாய் வருந்தனையும் 140 பாகைக்கு மேற்படாத சூட்டில் வறட்டவும்.

தேயம். ஐந்து முதற் பத்துக் கிறேன் வரைக்குக் குளிகையாய்க் கொடுக்கலாம். இப்படிச் கொடுத்தால் இதின்செயல் சீக்கரமாயும் நிச்சயமாயுங் காணும். வயிற்று முறுக்காவது சத்தியாவது உண்டாவதரிது.

ஜி.ரீகிரஞ்சம். Tincture of Kaladana. கொள். ஜி.ரீகிவிரை, இரண்டரை அன்சு, புருவுசீது⁶ அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்தில் ஏழுநாளாறப்

¹ Compound pill of colocynth. ² Pill of colocynth and Hyoscyamus. ³ Compound extract of Colocynth. ⁴ Phorbatisin. ⁵ Rectified spirit. ⁶ Distill. ⁷ Water-bath.

⁸ Proof-spirit.

(53) அனுபத்தம்பார்.

போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கி வடித்து, அரைநாழிக்குப் போசிய திட்டசீது சேர்க்கவும். ஜலப்பிரஞ்சஞ் செய்வதுபோற் சியந்தனித்தும் இதைச் செய்யலாம்.

தேயம். இரண்டு மூன்று திரும். வ்ரேசன பாணங்களுக்கு இது நல்ல தணைமருந்து.

ஜிரிக்கூட்டுச் சூரணம். Compound Powder of Kaladana. கொள். ஜிரிகிவிரை, மாவாக, ஐந்து அன்சு; பதாசிபமிஸதாத்ரக¹. ஒன்பது அன்சு; சூக்குமா ஒரு அன்சு. நன்றாயரைத்து மெல்லிய அரிப்பெட்டியில் அரிக் கவும்.

தேயம். ஐம்பது அறுபது கிரேன். ஜலப்புக்கூட்டுச் சூரணத்துக்கு இது நல்ல பதில்.

ஜிரிகிராஸம். Resin of Kaladana. கொள். ஜிரிகிவிரை, பருக்கன் தூளாக, எட்டு அன்சு; திட்டசீது போதியது; தண்ணீர் போதியது. ஜலப்பிராஸஞ் செய்வதுபோல இதையுஞ் செய்யவும். வாபீதிசின்² என்றது ம் இதுதான்.

தேயம். ஐந்து முதல் எட்டுக் கிரேன் வரைக்கும். இது மோசமற்றது ம் சித்தியுள்ளதுமான ஓர் வ்ரேசனி,

[இந்த ராஸம் பிதிவைத்தியரால் வைத்தியத்திற் கொண்டு வரப்பட்டது. இது கட்டியிற் கபிலம். மாவில் நரையானது. இனிமையும் மணமுமுடையது.]

அவாகடச்சுரக்துகள். Non-Officinal.

சிவதை. Turbith root. இது இந்து அடங்கலுமுண்டு. இதின் வேர் வ்ரேசனியென்று ஆசியர் வெகுகாலமாய் வியக்கிறார்கள். இதின் தன்மை உபயோகங்களைப்பற்றி வாஸ்கர், கிளாசர், கோடன் முதலியவர்கள் சொல்லியிருப்பதற்கிணங்க ரக்சுபேகர் விபரித்திருக்கிறார். ஆயினும் யுரோப வைத்தியத்தில் இது முழுதும் வழங்காமற் போயிற்று. இதின் செயல் மெத்தச் சந்தேகமென்று ஒஷானசியர் கண்டு வாமகுபீய³த்தச்சேருவதற்கு இது தகாததென்றார். வேர்த்துளின் தேயம் அரைத்திரும் முதல் ஒரு திரும்; எசுரத்தின் தேயம் பத்து முதல் இருபது கிரேன். இதிலே ராஸம்⁴ 100 க்கு 10-20 வீதமாயிருக்கிறதென்றும் வேரின் வ்ரேசனத்தன்மை அந்த ராஸத்திலேயே இருக்கிறதென்றும் அன்றுனாடர் சோதித்துக்கண்டார். ஜலப்பிராஸத்தை எடுக்கு முறையாய் இந்த ராஸத்திற் பொதியவளவாய்எடுத்துநோயாளருக்குக் கொடுத்துப்பார்ப்பது நல்லது.

சேம்விரை⁵. Laldana. வங்காளம் வடக்கு நாடுகளின் கடைகளில் சார்புசுண்டு⁶ என்று விலைப்படுவதாகிய ஓர்வகைச் ஜிரிகிவிரையைப்பற்றிக் கனிலல்லே என்பவர் சொல்லுகிறார். ஒவ்வொரு காயிலும் மயிர் அடர்ந்து கருஞ் சிவப்பு நிறமுள்ள மூன்று கொட்டை இருக்கும். கொட்டைகளைத் தண்ணீரில் ஊறப்போட அவைகள் பொருமிப் பாணியைக் கக்கும். கொட்டையை வெய்யிலிற் காயவைத்து மாவாக்கி இருபது கிரேன் முதல் முப்பது கிரேன் வரைக்கு உள்ளுக்குக் கொடுக்க மெதுவாய் வ்ரேசிக்கும். இத்துடன் தோல் வியாதிகளுக்கு அல்திரவ⁷மாகும். இது ஜிரிகிவிரையைப்

1 Acid Tartrate of potash. 2 Pharbitisin. 3 Pharmacopoeia. 4 Resin. 5 Probably a species of Pharbitis. 6 Shapussundo. 7 Alterative பிசுமி.

போல நல்ல விரேசனி என்று துரக்குசந்தலார்¹யென்பவர் சொல்லுகிறார். இந்த இரண்டும் குறுத்த கருமையான மயிரால் மூடுண்ட இயுமீபசைமோ²க் கொடி இயுமீபசெபியாரிக்³ கொடி என்ற ஏறுகொடிகளின் கொட்டைகளாயிருக்கவேண்டும். இவை இரண்டும் இந்து அடங்கலும் உண்டாகும்.

சுழத்திராப்பச்சை. *Argyreia speciosa*. இது இந்துவிலுள்ள பொதுவான பூடு. இதின் இலைகளைப் புறம்பு ஸ்திமுல³மாகவும் ரூபிவாஷ⁴மாகவும் சுதேசிகள் வழங்குகிறார்கள். ஒரு ஆளில் இவை கடுமையாய்க் கொப்பளங்கொள்ளப்பண்ணினதை வைற்று வைத்தியர் கண்டார்.

பொறகிஞ்சியங்கள்.

BORAGINACEAE.

அவாகடச் சரக்குகள். Non-Officinal.

பெரியநறுவிலி. *Cordia Myxa*. சிறியநறுவிலி. *Cordia latifolia*. இந்த மரங்கள் இரண்டும் இந்துவின் அனேகம் பருதிகளிற் பொதுவாயுண்டாகும். பழத்தின் பருமையில் மாத்திரமே இவைக்கு வித்தியாசமுண்டு. முற்கால யுரோப பதார்த்தசாரத்தில் இவைகளைப்பற்றிப் பேசியிருக்கிறார்கள். பெரிய நறுவிலிப்பழம் கொட்டைப்பாக்களவு பருமை; சிறிய நறுவிலிப்பழம் இலந்தைப் பழமளவு பருமையானது. இவை கறுப்பும் முட்டைவடிவுமானவைகள்; மணமில்லை; இனிய பாணிச்சுவை உடையவைகள்; இமாலியம்⁵, திமல்சு⁶மாக இவைகள் பேர்பெற்றிருந்தன. விசேஷமாய்ச் சுவாசப்பையின் நோய்களிலும் சனன சலஉறுப்புகளின் நோய்களிலும் அப்படிப் பெயர்பெற்றிருந்தும் இப்போவோ யுரோப வைத்தியத்தில் இவை வழங்கவில்லை. ஆயினும் இந்துக் கடைகளில் வந்து இன்னும் மருந்தாகக் கொள்ளப்படும். இதின் சதை பத்துப் பன்னிரண்டு திரூர் தேயத்தில் இளம்பேதியாய்ச் சேஷ்டிக்கும். பட்டை யாவகருக்குள்ளே சுரமுதலிய நோய்களுக்கு விசேஷமான மருந்தாய் வழங்கப்படுகிறதென்று அஷ்வீல்டர் சொல்லுகிறார். இது லேசான தொணிகம்போலும்.

ஒடுக்கிலை நறுவிலி. *Cordia angustifolia*. இம் மரத்தின் பட்டை தொண்டை அலம்புகிறதற்குத் துவர்நீராகி வழங்கப்படும்.

இந்துத்திரிதடேஸ்மம். *Trichodesma Indicum*. இது இந்துதேசத்திற் பாம்புகடிக்குப் பேர்பெற்ற மருந்து. இம் மருந்தைக் கொடுத்து மக்கவல் வைத்தியர் ஒரு ஆளைச் சுகப்படுத்தினாரென்ற சங்கதி எழுத்தில் இருக்கின்றது. என்றாலும் இதின் நயத்தைப்பற்றி வேறொரு சாட்சியுமில்லையாதலால் அது சந்தேகமானது. இதின் பாணியுள்ள இலைகளையும் லங்கைத் திரிசுடேஸ் மத்தினது பாணியுள்ள இலைகளையும் சாந்தியான பாப்பைசெய்வதற்குத் தெக்கணதேசத்துச் சனங்கள் வழங்குவார்கள்.

எட்டியச்சேடி. *Ehretia buxifolia*. இதுசோளமண்டலக்கரையிலும் இந்துவின் மற்றும் பருதிகளிலும் பாழ் நிலங்களில் உண்டாகும். இதின் பச்சைவேர் இனிதுஞ் சற்றே கார்ப்புமான சுவையையுடையது. இதை இந்து

1 *Ipomoea cymosa*. 2 *I. Sepiaria*. 3 Local stimulant, தானிக நிலை. 4 Rubefacient, சூடுபடுத்தி. 5 Emollient, சந்தன. 6 Demulcent, சாம்பி.

வைத்தியர் அல்திரவ¹மாக வழங்குவார்கள். வேரில் இரண்டு அன்சுக்குத் தண்ணீர் அரைநாழியாகச் சேர்த்துச் செய்த கஷாயத்தைத் தேகத்திலேறிய சிவ்லிசு² நோய்க்கு இரண்டு அன்சு தேயமாகக் கொடுத்து மெத்த நயங்கண்டதாக ரோசு வைத்தியர் எழுதியிருக்கிறார்.

தேட்கோடுக்கி. Tiaridium Indicum. அனேகவிடங்களிலுள்ள இந்தப் பூண்டின் இலை, காயங்கள், விரணங்கள் தானிக தாபிதங்களுக்கு நல்ல மருந்தென்று பூமியின் பல இடங்களிலும் மதிக்கப்படும். இதின் செயல் இமாலியம்³போலும். இதற்கு அமுரிதி⁴த்தன்மையு முண்டென்று ஊனராற் குறிக்கப்பட்டது.

எகியப்பூடு. Echium. இதின் இலையும் காம்பும் பூவும் குசபான்⁵ என்ற பெயருடன் இந்துக்கடைகளில் விலைப்படும். இந்திய பதார்த்தசார வா கடங்கன் பலவற்றில் இது ககாலிக்கிலேனி⁶ என்ற மரத்திலுண்டாகிறதென்கிறது தவறு. சிவ்லிசு, குஷ்டம்⁷, வாதநோய்களுக்கு இந்தச் சரக்கு அல்திரவதொணிக⁸மென்று சுதேச வைத்தியரால் வெகுகாலம் போற்றி வழங்கப்பட்டது. ஒஷானசி முதலியவர்களும் அதற்கு இத்தன்மையுண்டென்று சொல்லுகிறார்கள். இதை அல்திரவ தொணிகமாய் மாத்திரமல்ல, திமல்சம்⁹ அமுரிதியாகவும் முடிசெனீவு போற்றுகிறார். தான் இதை அதிகமாய் வழங்கினதென்றும், பரைரக்கொடி, நன்னூரி என்ற மருந்துகள் கொடுக்கவேண்டிய எந்த நோய்க்கும் இதைக் கொடுக்கலாமென்றும் அவர் சொல்லுகிறார். துவைத்த இலை ஒரு அன்சுக்குக் கொதிநீர் அரைநாழி வீதமாகப் போட்டு இரண்டு மணிநேர ஊறவிட்டு வடித்த திகாகத்த¹⁰தை இரண்டு அன்சு முதல் நாலு அன்சு வரைக்கு நாள் இரண்டுமுறையாகவும் இன்னும் நெருங்கவுங் கொடுக்கும்படி குறிக்கிறார். இதை இன்னும் சோதிப்பது நல்லது. இந்த இலைகளை மட்டிடுவது லகு. இவை தோற்றமான அனேக வெள்ளைப்புள்ளியும் வழுவழப்பும் உடையவைகள். காய்ந்த இலைக்குச் சொற்ப மணம் மாத்திரமுண்டு. பச்சை இலைக்கோ கோனியத்தைப் போன்ற மணம் அதிகமாய் வீசும்.

ஸ்கிறவுலரியாசியங்கள்,

SCROPHULARIACEAE.

திச்சிதாலிஸ்பூடு. DIGITALIS PURPUREA.

வாசம். இது பிறித்தனிலும் யுரோபத்தின் மற்றும் பகுதிகளிலும் விசேஷமாய் மணல்நிலம், மக்கி நிலங்களில் உண்டாகும். இந்துவின் மலைச்சார்புகளிலும் திறமாயுண்டாகும்.

வாகடபகுதி. இலை. பூக்கள் மூன்றிலிருபங்கு மலர்த்திருக்கையில் இலைகளைக் கொய்யவேணும். திச்சிதாலிஸ்பூடு உண்டான இரண்டாம் வருஷத்தில், முற்றின முழு இலைகளைப் பிடுங்கி மட்டான குட்டில் உலர்த்தவேணும். காய்ந்த இலைகளையும் இலைத்தூளையும் காற்று வெளிச்சம்படாமல்

1 Alterative, பரிணமி. 2 Syphilis. 3 Emollient, சாத்தனி. 4 Diuretic. தியுநீசு. 5 Gouzaban. 6 Cacalia Kleinia. 7 Lepa. 8 Alterative tonic. 9 Demulcent, சாசெ. 10 Decoction.

நன்றாயடைத்த சீசாக்களிற் போட்டுவைக்கவேணும். நெடுக வைத்தி ருப்பதாற் சத்துக் கெட்டுப்போருமாகையால், வருஷந்தோறும் புதுக்கத் தேடவேண்டும். காய்ந்த இலைகள் மங்கலான பச்சைநிறமும், சொற்பம ணமும் கைப்பான உவட்டுச் சுவையுமுடையன. பச்சை இலைகள் ஒடுக் க முட்டைவடிவானவைகள். குறுங் காப்பும் சுருக்குகளும் மென்மயிரு முடையன. நிறம் மங்கலான பச்சை; கீழ்ப்பக்கம் வெளிநல். ஓரங் கரு க்ருப் போன்றது. சொற்ப மணமும் கைப்பான உவட்டுச் சுவையுமுண்டு. இலையின் சத்து அதற்கே யுரித்தான திச்சிதாலின்¹ என்ற கைப்புப் பதார்த்த மே.

தன்மை. செரதீவம்²; விசேஷமாய் இதயத்தின் துடிப்பைச் சாந்தமா க்கும். அமுரிதி³. சிறுதேயமாக நெடுகக் கொடுத்தால் உடம்பிற் கூடிச் சடு தியில் நச்சு வீறு காட்டும்; அல்லது மாணமாய் முடியும். இதிலுண் டாகும் மோசத்தைப்பற்றிப் பருப்பித்துப் பேசியிருக்கக்கூடுமாயினும் இ தைக் கொடுக்கும்போது மெத்தக் கவனமாய்க் கொடுப்பது புத்தி. பெரு ந்தேயத்தில் இது மயக்கமுற்சிறஞ்சு.

உபயோகம். நீர்க்கோவை வியாதிகளுக்கு விசேஷமாய் அவைகள் இ தயநோய்களோடு கூடிநின்றால் இது நயந்த மருந்து. இதயநோய்களிற் ப ருத்தறிவின்றி இது கொடுக்கப்படுகின்றது. ஆயினும் இதயத்தின் துடிப்பு ப் பெலப்புமிஞ்சியிருக்கிற இதய வியாதிகளில் இது நல்ல மருந்து. மற் றும் வியாதிகளுட் சலசீடம்⁴, ஈனை⁵, புறங்கீது⁶, கசம், பைத்தியம், வெறிப் பைத்தியம், இரத்த இருமல், எபிலெப்சி⁷, குறுப்பு⁸, மெனுறியம்⁹, மற்றும் வகையான கருப்பை இரத்தப் பெருக்குகளுக்கு இது நயமென்று கொடுக் கப்படும்.

தேயம். இலைத் தூளில் அரைக் கிறேன் முதல் ஒரு கிறேன் வரைக்கு ஆறு எட்டு மணிக்கொருமுறை செரதீவமாய்க்கொடுக்கலாம். அமுரிதியா ய்க் கொடுக்கவேணுமாகில் இன்வூச¹⁰மே திறம். எப்படிக் கொடுத்தாலும் அதின்செயலை விழிப்பாய்ப் பார்க்கவேணும்.

ரசிதங்கள். திச்சிதாலிசின்வூசம். Infusion of Digitalis. கொள். காய்ந்த திச்சிதாலிசிலை முப்பதுகிறேன்; கொதிநீர் பத்து அன்சு. மூடியபா த்திரத்தில் ஒரு மணிநேரமுறவிட்டுச் சீலையில் இறத்தெடுக்கவும்.

தேயம். இரண்டுமுதல் நாலு திரும் வரையில் ஆறு மணிக்கொருமு றை கொடுக்கலாம். ஏதென்பரு தபுளின் பார்மசுபீயத்¹¹தற் சொல்லிய இன்வூ சத்திலும் இது அரைவீறுள்ளது.

திச்சிதாலிசிரஞ்சம். Tincture of Digitalis. கொள். திச்சிதாலிசிலை பருக்கன் தூளாக இரண்டரை அன்சு; புருவுசீது¹² அரைநாழி. அடைத்த பாத்திரத்திற் திச்சிதாலிசிலைத் தூளைப் பதனைந்து அன்சு சீதில் இரண்டுநா றுறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கவும். அப்பாற் சியந்தனி¹³யில் வார்த் து நீர் வடிந்தொழிந்தபின் சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையம் வார்த்து வடி க்கவும். அப்பாற் சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து இரண்டுநீர்களையுங் கலந் து அரைநாழி தேறப் புருவுசீது கூட்டவும்.

தேயம். செரதீவம் அமுரிதியாகப் பத்து மினிம் தொடங்கிப் படிப்படி யாய்க் கூட்டி முப்பது மினிம் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். எபிலெப்சிக்கும்

1 Digitalin. 2 Sedative, சாந்தனி. 3 Diuretic, தியுதி. 4 Hydrocephalus. 5 Asthma. 6 Bronchitis. 7 Epilepsy. 8 Croup. 9 Menorrhoea. 10 Infusion. 11 Pharmacopoeia, செசரவரட்டி. 12 Proofspirit. 13 Percolator.

வெறிப் பைத்தியத்துக்கும் அதிதேயங் கொடுக்கும்படி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆயினும் இதனால் வரக்கூடிய நயமானது நேரிடக்கூடிய மோசத்துக்கச் சமமாகுமோவென்பது சந்தேகம்.

திச்சிதாலின். Digitalin. இது திச்சிதாலிசிலையின் சத்து. இது கண்ணறையுள்ள சிறுக் கட்டிகளாக அல்லது சின்னச் செதில்களாக வரும். வெள்ளையானது, மணமற்றது, கடுங் கைப்பானது. சீதிலே சுறுக்குக் கரையும். தண்ணீரிலுஞ் சுத்த ஈதரி¹லுங் கரைவதரிது. அமிலங்க²ளிற் கரையும். ஆயினும் அவைகளோடு தடஸ்தகலவைக³ளாகச் சேராது. ஐருகுலோறிக்கமிலத்⁴திற் கரைந்தால் சொற்ப மஞ்சள்நிறமாயிருந்து சுறுக்குப் பச்சையாகும். இது நாசித்துவாரங்களைக் கடுமையாய் அழற்றும். இது வீரூன நஞ்சு. இதைப் பரமானுவில் எரித்தாற் சேஷமிராது.

தேயம். கிறேனில் அறுபதிலொருபங்கு முதல் முப்பதிலொருபங்குவரைக்கு அலக்கால்⁵ அல்லது அசிதிக்கமிலத்திற்⁶ கரைத்தாவது குளிகையாக் கியாவது கொடுக்கலாம். இதின் தன்மை உபயோகங்கள் திச்சிதாலிசிலையைப்போலவே. இது காமவிகாரத்தைக் குறைக்குமாதலால் விந்துக்கழிச்சலுக்கு நயமாகக்கண்டது. இது வீரூன நஞ்சாகையால் இதை மெத்தச் சிறுதேயத்திற் கொடுக்கும்போதுதானும் அதிக கவனம்தேண்டும்.

அவாகடச் சரக்குகள். Non-Officinal.

கைச்சல்தண்டான்பூடு. Picrorrhiza kurroa. இது வடக்கிந்துவில் உள்ள பூடு. இதின் வேர் கடுங்கைப்புள்ளது என்றும் சுதேசிகள் அதை மருந்தாக வழங்குகிறார்கள் என்றும் ரோயில் சொல்லுகிறார். தொணி⁷மாக இது வழங்கப்படுகிறதென்று ஏர்வின் சொல்லுகிறார். இது நொருக்கலுங் கருமையுமான கறுத்த வேர்த்துண்டுகளாக வரும். சில முறுகியிருக்கும். மேற்றலைப்பிற் தென்னீர்க்களவு பருமையாய் கீழ்நோக்கிச் சிறுத்துப்போயிருக்கும். கீழ்ப்பகுதியில் வேர்க்கூந்தல்களும் மேற்பகுதியில் இலைக்காம்புகளும் அடர்ந்திருக்கும். இது மெத்தக் கைப்புச் சுவையுள்ளது. இந்தவேரையும் இதின் தன்மைகளையுட்பற்றி இன்னும் அறிவது நன்று. கடுகுரோகணி என்று கடைகளில் விலைப்படும் வேர் பார்வை லட்சணங்களில் இதைப்போன்றது. அது இப் பூண்டுவுகுப்பில் ஓர் இனமாயிருக்கவேணும். ஆயினும் அதின் வரலாறு தெரியவில்லை. இப்பூண்டு சென்னை தேசத்தில் உண்டாகிறதென்றும் தான் அதைக் காணவில்லையென்றும் முடிசெநீவர் சொல்லுகிறார். இது காரேலிபர் வேரென்று என்ஸ்லியரும் அவருக்குப்பின் எழுதின சிலரும் எண்ணுகிறார்கள். என்றாலும் பல இலட்சணங்களில் அதற்கு மெத்த வித்தியாசம். இது நீரடிக்கும் சுள்ளாப்பான பேதியாகும். திற்ப்பு வைத்தியர் இதற்கு அந்திபிராடி⁸த்தன்மையுண்டென்கிறார்.

நீர்ப்பிரம். Herpestis Monniera. இது பூமியின் உஷ்டணமான பகுதிகள் எல்லாவற்றிலும் உண்டாகும் ஓர் சிறிய படர்கொடி. இது கடுமையான அமுரிதி⁹யென்றும் பேதியென்றும் இந்துக்கள் மதிப்பார்கள். ஆயினும் இத்தன்மைகள் உண்டென்பதற்கு நம்பிக்கையான சாட்சியில்லை. இலைச்சாற்றை மண்டைலத்தோடு கலந்து வாதநோய்க்கு இந்துக்கள் பூசுவார்கள்.

1 Ether. 2 Acid. 3 Neutral compound. 4 Hydrochloric acid. 5 Alcohol, 6 Acetic acid. 7 Tonic. 8 Antiperiodic. 9 Diuretic, தியூரிக்

என்று ரக்சபேகர் சொல்லியிருக்கிறார். இந்தப் பூச்சால் வரும் நயம் அதிற்சேர்ந்த மண்டைலத்துக்கே யுரியது.

சேல்சிப்பூடு. *Celsia Coromandeliana*. இது இந்துதேசத்தின் பலபகுதிகளிலும் மாரிகாலத்திற் தோட்டங்களிலுஞ் செய்கைபூண்டநிலங்களிலும் மிகுதியாயுண்டாகும் ஓர்களை. சற்றசியென்ற உதவிச்சத்திரீகன் இதைக்கூறினார். இலையின் இறுகின சாற்றைத் தீவிர்¹ காலிக² திசந்தெரி³க்கு அவர் கொடுத்து நயங்கண்டார். இதின் செயல் துவருஞ் சாந்தமும்பேரலே. தேயஞ் சொல்லப்படவில்லை.

அகந்தாசியங்கள்.

ACANTHACEAE.

*நீலவேம்பு. KARIYAT.

வாசம். இது இந்துதேசமடங்கலும் நிழலான இடங்களில் உண்டாகும். வாகடபகுதி. காய்ந்த தாளும் வேரும். வேரோடிருக்கிற தாள் முக்கால்முழம் ஒரு முழம் நீளமான துண்டுகளாக வரும். சதுரமானது. சற்றே கபிலநிறமுள்ளது. நெடுங் கைப்புச் சுவையையுடையது.

தன்மை. இது கைப்பான தொணிகம்⁴, ஸ்தொமாகி⁵, குவசிக்குச்சரியானது.⁽⁵⁴⁾

உபயோகம். பெலவீனத்துக்கும், காய்ச்சலில்நின்றுசுகப்படும்போதும் திசந்தெரியின் பிற்கூற்றிலும், இது உதவும்.

ரசிதங்கள். நீலவேம்புக்கூட்டின்வாசம். Compound Infusion of Kariyat. கொள். இடித்த நிலவேம்பு, அரை அன்சு, துவைத்த தோடந் தோல், மல்லி, வகைக்கு அறுபது கிரேன்; கொதிநீர் பத்து அன்சு; மூடிய பாத்திரத்தில் ஒருமணிநேரமூறவிட்டுச் சீலையில் வடிக்கவும்.

தேயம். ஒன்றரை அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு வரைக்கும் நாள் இரண்டு மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம்.

நீலவேம்புக்கூட்டிரஞ்சம். Compound Tincture of Kariyat. கொள். நன்றாக நறுக்கின நிலவேம்புவேர், ஆறு அன்சு; சசம்⁷, சகை⁸, பருக்கன் துளாக வகைக்கு, ஒருஅன்சு; பிரண்டி⁹ ஒருநாழி. அடைத்த பாத்திரத்தி ல் ஏழுநாளுறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கி, சீலையில் வடித்து ஸ்திரேனித்¹⁰துப் பிழிந்து வடிதாளுடே வடியவிட்டு ஒருநாழிதேறப் பிரண்டி சேர்க்கவும்.

தேயம். ஒரு திரும் முதல் நாலு திரும் கொடுக்கவும். இது தொணிகம், ஸ்திமுலம்¹¹, மெல்லிய விரேசனி. அசீரண நோய் சிலவற்றுக்கும் மலசுத்தி சுணங்கலுக்கும் இது உவந்தது.

[பச்சை இலைகளைப் பிழிந்தெடுத்த சாற்றைப் பிள்ளைகளின் கழிச்சலுக்கு வாடிக்கையான மருந்தாய்ச் சுதேசிகள் வழங்குவார்கள். இதைக் கொடுப்பதற்கு இதின் கடுங் கசப்பே தடை. இதற்குப் பதிலாக முகீர்ச்சியெ

1 Acute. 2 Chronic. 3 Dysentery. 4 Tonic. 5 Stomachic. 6 Quassia. 7 Myrrh. 8 Aloes. 9 Brandy. 10 Strain. 11 Stimulant.

(54) அனுபந்தர்பார்.

ன்பவர் இரண்டு அன்சு பச்சை இலையை முக்கால்நாழி தண்ணீரில் போட்டு ஆறு அன்சாய் வருந்தனையும் வற்றக் காய்ச்சி அதை ஒரு அன்சு தேய்மாய் இரண்டு மூன்று மணிச்சொருமுறை கொடுப்பார். இது கொடுத்துப் பரிசுரித்த நோயானரைப்பற்றிச் சொல்லியிருக்கிறார். ஆயினும் அத்தோடு மாவியர்¹ கடுகுப்பற்று முதலிய மருந்துகளும் வழங்கப்பட்டனவாதலால் நிலவேம்பைப்பற்றி உண்டான சுகம் எவ்வளவென்று சொல்லக்கூடாது.]

அவாகடச்சாக்குகள். Non-Officinal.

நீர்முள்ளி. *Hygrophila spinosa*. இது இந்துவின் அனேக பகுதிகளில் ஈரமான இடங்களில் உண்டாகும். இதற்கு நல்ல அமுரிதி²த்தன்மை உண்டென்று சுதேசிகள் சொல்லுகிறார்கள். நீர்க்கோவைகாரருக்கு இதைக் கொடுத்தேனென்றும் நல்ல அமுரிதித்தன்மை இதற்கு நிச்சயமாகுண்டென்றும் கொர்ப்திரிக்கு சொல்லியிருக்கிறார் கிப்சன் பண்டதரும் இதைக்குறித்துச் சாட்சியிடுகிறார். ரோசு வைத்தியரும் ஐயாசுவாமியென்ற சுதேசசத்திரீகனும் இதைப்பற்றி நயப்பாய்ச் சொல்லியிருக்கிறார்கள். கனலல்டே யென்பவர் இதைக்கொடுப்பதற்குப் பின்வரும் இரண்டுமுறையைக் கூறுகிறார் திகாக்கீம். கொள். நீர்முள்ளி வேர் ஒரு அன்சு; தண்ணீர் அரைநாழி. பதினாறு அன்சு ஆகுந்தனையும் வற்றக் காய்ச்சிச் சீலையில் வடித்து நாளுக்கொருமுறை ஒரு அன்சுமுதல் ஒன்றரை அன்சு தேயமாகக் கொடுக்கவும். காடி. கொள் புதுக்கக் காய்ந்த நீர்முள்ளியிலே இரண்டு அன்சு; திஸ்திலித்த காடி, பதினாறு அன்சு; மூன்றுநாள் ஊறவிட்டுப் பிழிந்து சீலையில் வடிக்கவும். தேயம் அரை அன்சுமுதல் ஒரு அன்சு. காய்ந்த நீர்முள்ளியை எரித்துச் சாம்பலை வெருகடிதேயத்தில் நான் இரண்டுமூன்றுமுறை கொடுப்பது சுதேசிகளுக்குள் ஒருமுறை.

கருநோச்சி. *Justicia Gendarussa*. மலாயர் இதைச்சுரக்கினி³யாய்வழங்குவார்கள். யாவதேசத்தில் இதற்கு வமனத்⁴தன்மையுண்டென்று அவ்ஸ்வீல்டர் சொல்லியிருக்கிறார். இலைகளையும் இளந்தளிர்களையுந்துவைக்க, வீறும் சற்றுச் சுகந்தமுமான மணம் வீசும். காலிகவாதத்துக்கு இது திகாத்தமாய் வழங்கப்படுகிறதென்று என்ஸ்லி சொல்லியிருக்கிறார். இதின் செயல் சுவேதனி⁵போல விளங்குகின்றது. நாம் இதைப்பற்றியறிந்தவைகளெல்லாம் விசேஷமாய்ச் சுதேசிகள் சாட்சிமூலந்தான்.

ஆடாதோடை. *Justicia Adhatoda*. இது இந்துவின் மிகுதியான பகுதிகளிலுள்ள ஓர் செடி. இதற்கு அந்திஸ்பசு⁶ எக்ஸ்பெக்துற⁷த் தன்மைகள் உண்டென்று சுதேசிகள் சொல்லி, இருமல், ஈளை. முறைச்சுரம் முதலிய நோய்களுக்கு இதைக் கொடுப்பார்கள். இந்த அவுஷத தன்மைகளைப்பற்றி ஜச்சன் பண்டதரும் உதவிச் சத்திரீகன், ஓ. ச. டதரும் தங்கள் சொந்த அனுபவத்திலிருந்து நற்சாட்சி கூறுகிறார்கள். இவர்கள் இதைக் காலிகபுறங்கீத⁸, ஈளை, மற்றும்ஞ் சுவாச, கதார்⁹நோய்களுக்குக் காய்ச்சல் கூடிநில்லாதவேளையிற் கொடுத்து நயங்கண்டார்கள். இது கபத்தை வேட்டுகின்ற தாதலால் கசத்திலும் நயங்காட்டுமென்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். இதின் சாற்றை வறட்டியெடுக்கும் சலவெசிறுத்தின்¹⁰தேயம் நாலுமுதற் பத்துக் கி

1 Morphia. 2 Diuretic. 3 Febrifuge. 4 Emetic. 5 Diaphoretic. 6 Antispasmodic, கருக்கினி 7 Expectorant, கட்டைவன. 8 Chronic Bronchitis. 9 Catarrh. 10 Aqueous extract.

றேன். இது சுறுக்குப் பழுதாகக்கூடியது. இந்த எசுருத்தை அலக்கா¹ லிற் கரைத்துச்செய்யும் ரஞ்ச²மே திறமானது. இதின் தேயம் அரைமுதல் ஒருசீராம். அலக்காவெசுருத்தம் பழுதாகாமலிருக்கும். அதின் தேயம் மூன்று கிறேன் வரைக்கு. இதற்குத் திப்பலி சேர்க்கச் செயல்கூடும். இந்த மருந்தின் நயத்தை அறிவதற்கு இன்னும் பரிசோதனைகள் செய்வது நல்லது. இம் மருந்தைப் பற்றிய விவரத்தோடு கதார், புறங்கீது, கசங்களில் இதின் செயலை விளக்குகிற உதாரணங்களை ஒ. ச. டதர் பிரசுரஞ் செய்திருக்கிறார்.

நாகமல்லி. *Rhinacanthus Communis*. இந்தப் பூண்டின் கொட்டை படர்தேமலுக்கு உத்தமமான பூச்சுமருந்தென்று மதிக்கப்படும். இதின் நயத்தையிட்டு ரோயில் என்பவர் சாட்சிகூறுகிறார். பச்சை வேரை அரைத்து எலுமிச்சஞ் சாற்றோடு கலந்து பூசினால் சருமனோய்களுக்கு உச்சிதமருந்தாகுமென்பது சுதேசிகள் எண்ணம் என்று என்ஸ்லி சொல்லுகிறார். இச்சாட்சிகள் எவ்வளவுதூரஞ் சரியென்று அறிபவேண்டியது.

வேர்பிஞ்சியங்கள்.

VERBENACEAE.

• அவாகடச்சாக்குகள். Non-Officinal.

வேண்ணோச்சி. *Vitex Negundo*. நீர்நோச்சி. *V. Trifolia*. இந்து தேசமடங்கலும் அதிகமாயுள்ள இச்செடிகள் இரண்டும் சுதேச வைத்தியத்தில் வெகுதாலமாகப் பேர்பெற்றவைகள். இரண்டும் ஒத்ததன்மையுடையவைகளாய் விகற்பமின்றி வழங்கப்படுமாயினும் சிறுநொச்சியே அதிகவீறுள்ளதென்று கொள்ளப்படும். பொந்தியுஸ் என்பவர் சிறுநொச்சிக்கு லகொண்டி என்ற மலாயப்பெயரைச்சொல்லி, அதை மெத்தவும்விதந்து இது அனுடைனும்³, அமுரிதியும்⁴, எம்மெனகக்கு⁵ மாயிருக்கிறதென்று சொல்லுகிறார். பெரிபெரி⁶ என்ற சோர்விலும் கால்எரிவு என்று சுதேசிகள் சொல்லும் சிலரோயிலும் இச்செடியிற்செய்த வமன்றாஷமும்⁷ தோயங்க⁸ளுங் காண்பிக்கும் நயத்தைப்பற்றியும் அவர் சாட்சியிட்டிருக்கிறார். வெள்ளை நொச்சியையுஞ் சுதேசிகள் இவ்வளவாய் மதிப்பார்கள். தாம் அறிந்த ணீ⁹ தத் தாவரத்தைப்பார்க்க வெள்ளைநொச்சியிலேயே சோதக்கினி⁹யென்றபெயருக்கு உரித்தானதென்று வினெமிங்கு பண்டிதர் சொல்லி, பொருத்தின்வாதவீக்கங்களைக் கரைப்பதிலும் வெட்டை கட்டுண்டதாலுண்டான பீசவீக்கத்தை மாற்றுவதிலும் இதின் செயலை விதந்துகொள்ளுகிறார். இதை வழங்கும் முறை லகுவானது. பச்சை இலையைச் சட்டியிற்போட்டு நெருப்பிலவைத்து தாங்கக்கூடியருடாக்கி நோய்த்த இடத்தில் அப்பிக் கட்டிவிடுவார்கள். வீக்கம் மாறுந்தனையும் நாள் மூன்றுநாலுதரம் இப்படிச்செய்வார்கள். வினெமிங்குபண்டிதரும் இந்துவிலிருந்த யுரோபவைத்தியர் சிலருஞ் செய்த முறை இதுவே. மைசூர்ச் சனங்கள் காய்ச்சல், கதார்¹⁰, வாதநோய்

1 Alcohol. 2 Tincture. 3 Anodyne. 4 Diuretic, தியூரிக், 5 Emmenagogue.
6 Beri-beri. 7 Fomentation. 8 Bath. 9 Discutient. 10 Catarrh.

களுக்கு நொச்சியிலையை அவித்து வேதுப்பிடிக்கும் முறையைப்பற்றி இங்கிலாது வைத்தியர் விபரித்திருக்கிறார். இந்துக்கள் நொச்சியிலையை அவித்துப் பிரசவஸ்திரிகளுக்குச் குளிக்கவார்ப்பார்கள். மசமதியர் தலையிடி சதாரங்களுக்குக் காய்ந்த இலையைப் புதைப்பார்களென்று என்ஸலி சொல்லியிருக்கிறார். இதின் நெற்று கிருமிகொல்லியாம். வெள்ளைநொச்சியைப் போற் சுதேசிகளுக்குள்ளே அதிகமாய்ப் பிரயோகிக்கப்படும் பூண்டு இன்னொன்றிருப்பது அரிது.

நீலக்குமிழ். *Gmelina parvifolia*. இச் செடியின் இலைகளிலும் இளந்தளிர்களிலும் தடித்த பிசுபிசுப்பான பாணி நிரம்ப உண்டு. அது தண்ணீரிற் கரையும். இது கரைந்து ஊறின தண்ணீரை வெட்டைநோயிற் சலக்கடுப்பை மாற்றுவதற்குச் சுதேசிகள் வழங்குவார்கள். ஆஸ்திரேலியிலைகள் தளிர்களைத் தண்ணீரிற் கலக்கினால் அவையும் இதைப்போலச் சுறுக்கிற் பாணியாய் வருமாயினும் சீக்கரம் அவற்றின் பாணித்தன்மையற்று முன்போலத் தண்ணீராகும். நீலக்குமிழ் இலை போட்ட நீரோ கூறுபடல் தொடங்கும்வரைக்கும் பாணியாகவேயிருக்கும். செங்குமிழ் *Gmelina Asiatica* என்ற பூண்டின் வேர், போர்த்துக்கீசரால் முன்னே மெத்த மதிச்சப்பட்டது. அவர்கள் அதற்கு *Rais Madre de Deos* என்று பேரிட்டிருந்தார்கள். இதற்கு ஏதுஞ் செயல் உண்டோ அல்லவோ இப்போ அறியப்படவில்லை. இந்து வைத்தியர் இதைத் திமல்சம்² அஸ்திரவம்³ என்று எண்ணுகிறார்களென்று மாத்திரம் என்ஸலி சொல்லுகிறார்.

சீறுதேக்கு. *Clerodendron serratum*, இது இந்துவின் அனேக பகுதியில் மலைநாடுகளிலுள்ள செடிப்பூண்டு இதின் வேருக்கு என்ஸலியென்பவர் கந்துப்பிராங்கு *Gantu Bharangi* என்று பேரிட்டிருக்கிறார். இது மருந்தாக விசாகபட்டினத்திலிருந்து அதிகமாய் ஏற்றப்படும் என்று எலியற்றுபண்டிதர் சொல்லியிருக்கிறார். சுதேசிகள் இதைக் காய்ச்சல் சதார்⁴ நோய்களுக்கு வழங்குவார்கள். இது பருக்கண் நூல் முதல் ஈர்க்களவு பருமையுள்ள நொருக்கலான துண்டுகளாக வரும். இடைக்கிடை உண்டையான காய்போற் பொருமியிருக்கும். இதற்கு மணம் கூறவில்லை. மருந்துக்கு இது நயந்ததல்ல. கைப்புக்கிலுறென் *Clerodendron infortunatum* என்ற செடியின் இலை சிரட்டுச்சிக்குப் பதிலாக மலிவான நல்ல தொணிக்⁵மும் அந்திபிராடி⁷யுமாகுமென்று பலதைபோசர் சொல்லுகிறார். இதைப்பற்றி அவர் எழுதின விபரம் இந்நூலாராய்ச்சியாருக்குக் கிடைக்கவில்லை. இதின் பச்சிலைச்சாற்றைக் கிருமிகொல்லியாகவும் நச்சுக்காய்ச்சல்களில் விசேஷமாய்ப் பிள்ளைகளுக்கு உண்டாகும் நச்சுக்காய்ச்சல்களிற் கைப்பான தொணிகமாகவும் சுரக்கினியாகவும் சுதேசிகள் வழங்குவார்களென்று கனலல்டே என்பவர் சொல்லுகிறார்.

தேக்கமரம். *Teak tree*. இந்த மரத்தின் அவுஷத தன்மைகளைப்பற்றி ரம்பியசு, அஷ்வீல்டர் முதலியவர்கள் சொல்லியிருப்பவைகள் மிகச் சந்தேகத்துக்கு இடமானவைகள். ஆயினும் இதின் சிராயைச் சொற்ப தண்ணீர் விட்டுக் கல்லில் உறைத்துப் பசையாக்கிப் பூசப் பிரமதேசக் கறுப்புவாணி¹⁰ சைப் பரிமாறினதினாலுண்டான வருத்தமும் தாபிதமும்¹¹ தணிவது கவனிக்கப்படத்தக்ககாரியம். இதின் உபயோகத்தைப்பற்றிப் பேணியென்பவர்

1 *Pedalinum murex*, 2 Demulcent, 3 Alterative, 4 Catarrh, 5 Chiretta.

6 Tonic, 7 Antiperiodic, 8 Anthelmintic, 9 Febrifuge.

10 Black varnish, 11 Inflammation.

சில நல்ல குறிப்புகளைப் பிரசுரஞ்செய்திருக்கிறார். சேங்கொட்டை¹, காட்டுமுந்திரிக்கொட்டை²யாலுண்டான தாபிதங்களில் இதைப்பூசிப்பார்ப்பது நல்லது. பழத்தை நசுக்கி அடிவயிற்றில் அப்ப சிறுநீர் அதிகப்பட்டதை இரண்டுபேரிற் கானித்தேனென்று கிப்சன் பண்டிதர் சொல்லுகிறார். இனிமேல் சோதனைசெய்பவர்கள் இதைக் கவனிப்பது நல்லதென்கிறார்.

லபியாதியங்கள்.

LABIATAE.

லவந்தர்ப்பூடு. LAVENDER.

வாசம். இது தென் யுரோபத்துக்குரிய பூடு. யுரோபத்தின் எப்பகுதித் தோட்டங்களிலுஞ் செய்கைபண்ணப்படும்.

வாகடபகுதி. பூக்களைத் திஸ்தில்த்³தெடுக்கும்எண்ணெய். இது நிறமற்றதாய் அல்லது வெண்மஞ்சள்நிறமாயும் லவந்தர்க்குரிய விசேஷ நல்மணமுடையதாயும், கார்ப்புங்கைப்புமுள்ள சுகந்த⁴ சுவையுடையதாயுமிருக்கும்.

தன்மைஉபயோகம். இது காமினத்⁵, அந்திஸ்பசி⁶. லவந்தர்க்கூட்டிரஞ்சமாய் மாத்திரமன்றி மற்றும்படி இது உள்ளேகொடுக்கப்படுவதரிது. அன்கெண்டுகள் முதலாஞ் சில மருந்துகளினது கெட்ட நாற்றத்தை மறைப்பதற்கு இது வழங்கப்படும். பூரக்கூட்டுவினிமெ⁸னில் இதுவும் ஓர் கூறுகச்சேருகின்றது.

தேயம். இரண்டு முதல் ஐந்துதுளி.

ரசிதங்கள். லவந்தர்சீது. Spirit of Lavender. கொள். லவந்தர்தேல் ஒருஅன்சு; திட்டசீது⁹ நாற்பத்தொன்பது அன்சு. கரைக்கவும்.

தேயம். முப்பது மினிம்¹⁰ முதல் ஒரு திரும் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். 1864 ம் ஆண்டு பிரசுரஞ்செய்த பிரித்தன் வாமகுடீயத்திற்¹¹ சொன்ன லவந்தர்சீதிலும் இது ஐந்திலொருபங்கு பெலனுள்ளது.

லவந்தர்க்கூட்டிரஞ்சம். Compound Tincture of Lavender. கொள். லவந்தர்தேல், ஒன்றரைத்திரும்; ரோஸ்மரித்தேல், பத்துமினிம்; இடித்த கறுவாப்பட்டை, இடித்த சாதிக்காய், வகைக்கு நூற்றைம்பது கிறேன்; செஞ்சந்தனச் சிராய் முந்நாறுகிறேன்; திட்டசீது ஒருநாழி. கறுவாப்பட்டை, சாதிக்காய், செஞ்சந்தனச்சிராய் மூன்றையும் அடைத்தபாத்திரத்திலே சீதில் ஏழுநாளுறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கவும். அப்பாற் சீலையில் வடித்துப் பிழிந்து தேல்களைக் கரைத்து, வடித்து, ஒருநாழி தேறப் போதிய திட்டசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். அரைத்திரும் முதல் ஒரு திரும் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். இது நல்ல ஸ்திமுலம்¹². சிரா நோய்கள், ஸ்தேரி¹³ நோய்களுக்கும் ஆரம்ப மூர்ச்சைக்கும்¹⁴ வாயுப்பொருமல் வலிகளுக்கும் பெரும்பாலும் இது கொடுக்கப்படும்.

1 Marking nut. 2 Cashew nut. 3 Distill. 4 Aromatic. 5 Carminative. 6 Antispasmodic. 7 Ointment. 8 Compound Liniment of Camphor. 9 Rectified spirit. 10 Minim. 11 Pharmacopoeia. 12 Stimulant. 13 Hysteria. 14 Syncope. கிண்பு.

பெப்பமிந்துப்பூடு. PEPPERMINT.

வாசம். யுரோபம், ஆசியம், அமரிகத்தின் பல பகுதிகளில் ஈரமான இடங்களில் இது உண்டாகும். மிக்கத்திலும் மற்றுமிடங்களிலுஞ் செய்கை பண்ணப்படும்.

வாகடபகுதி. எண்ணெய்; பூடு பூத்திருக்கையிற் பிடுங்கி அதைத் திஸ்திலித்து¹ எடுக்கப்படும். இது வெண்மஞ்சள் நிறமானது. பெப்பமிந்துக்குரிய மணமுடையது. சுவை முதலில் வெஞ்சுகந்தமாகி, பிறகு குளிர்மை போலாகும். இதிலே இரண்டு இசமிற்²தேல்கள்³ அடங்கியிருக்கும். அவைகளிலொன்று நீரானது, மற்றது உரமுங் கிரிஸ்த்⁴லுமானது. இவற்றிற் பிந்தினது, பெப்பமிந்துப் பூசம் அல்லது பெப்பமிந்துத் தேவின் ஸ்தியரப்தி⁵ன்⁵ எனப்படும்.

தன்மை. நல்ல காமினதி⁶, ஸ்தொமாகி⁷, அந்திஸ்பசி⁸.

உபயோகம். வாயுப்பொருமலுக்கும், அதாற் கிளம்பும் வலிக்கும், உவட்டுக்கும், குடலின் ஸ்பசு⁹ நோய்களுக்கும் இது பேர்பெற்ற மருந்து. பிரசவசரப் பரிகரிப்பில், உவட்டான தர்ப்பந்தின் எண்ணெய்க்குப் பதிலாக இது கொடுக்கப்படுமென்று சொல்லப்பட்டது. (55)

தேயம். இரண்டுமுதல் ஐந்து துளியைச் சர்க்கரையில் விட்டாவது முசிலாகில்¹⁰ விட்டாவது கொடுக்கலாம்.

ரசிதங்கள். பெப்பமிந்துநீர். Peppermint water. கொள். பெப்பமிந்துத் தேல், ஒன்றரைத்திரும்; தண்ணீர் ஒன்றரைக் கலன். திஸ்திலித்து ஒரு கலன் எடுக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சுமுதல் மூன்று அன்சுவரைக்குக் கொடுக்கலாம். வாயுப்பொருமலுக்கும் குடலின் மற்றும் ஸ்பசுநோய்களுக்குங் கொடுக்குங் காமினதி மருந்துகளுக்கு இது நல்ல அனுபானமாகும். சுகந்த அயக்கலவை¹¹யில் இது ஓர்கூராகச் சேருகின்றது.

பெப்பமிந்துச்சீது. Spirit of Peppermint. கொள். பெப்பமிந்துத் தேல், ஒரு அன்சு; திட்டசீது¹², நாற்பத்தொன்பது அன்சு. சேர்த்துக் கரைக்கவும்.

தேயம். முப்பது மினிம்¹³ முதல் அறுபது மினிம் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். 1864 ம் ஆண்டு பிரசுரஞ்செய்த பிறித்தன்வாமகுபீய¹⁴த்திற் சொல்லிய பெப்பமிந்துச் சீதில் இது ஐந்திலொருபங்கு பெலனுள்ளது.

ஸ்பீர்மிந்துப்பூடு. SPEARMINT.

வாசம். யுரோபம், ஆசியம், அமரிகத்திற் சேற்றுநிலங்களில் இது உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. எண்ணெய். இப்பூடு பூத்திருக்கும்போதே அதைப் பிடுங்கித் திஸ்திலித்து எண்ணெய் எடுப்பார்கள். அது நிறமற்றது, அல்லது வெண்மஞ்சள் நிறமானது; ஸ்பீர்மிந்துக்குரிய மணமுடையது; அனலுங் கார்ப்பும் வெஞ் சுகந்தமுமான சுவையுள்ளது.

1 Distill. 2 Isomeric. 3 Oil. 4 Crystal. 5 Stearoptene. 6 Carminative, வயக்கினி. 7 Stomachic, வாசனி. 8 Antispasmodic, ஸ்பசக்கினி. 9 Spasmodic, 10 Mucilage. 11 Aromatic mixture of iron. 12 Rectified spirit. 13 Minim. 14 British Pharmacopoeia.

(55) அனுபந்தம்பார்.

தன்மை உபயோகம். பெப்பமிந்தைப் போன்றிருப்பினும் அதைப்பார்க்க இது செயல் குறைந்தது.

தேயம். இரண்டு துளி முதல் ஐந்து துளி வரைக்குச் சர்க்கரையிலாவது இமல்சத்தி¹லாவது விட்டுக் கொடுக்கலாம்.

ரசிதங்கள். ஸ்பீர்மிந்துநீர். Spearmint water. கொள், ஸ்பீர்மிந்துத் தேல் ஒன்றரை அன்சு; தண்ணீர் ஒன்றரைக் கலன். திஸ்திலித்து² ஒரு கலன் எடுக்கவும்.

தேயம். ஒரு திரும் முதல் மூன்று திரும் கொடுக்கலாம். பிரதானமாய் மற்றுங் காமினதி மருந்துகளுக்கு அனுபானமாய் இது சேர்க்கப்படும்.

ரோஸ்மரிச்சேடி. ROSEMARY.

வாசம். தென் யுரோபத்திலும், வட ஆபிரிகத்திலும், சின்ன ஆசியத்திலும் இது உண்டாகும். இங்கிலந்திற் தோட்டங்களிற் செய்கைபண்ணப்படும்.

வாகடபகுதி. எண்ணெய். இது பூத்தளிர்களிலிருந்து திஸ்திலிக்கப்படும். இது நிறமற்றது. ரோஸ்மரிக்குரிய மணமும் கார்ப்பான சுகந்த சுவையுமிதற்குண்டு.

தன்மை உபயோகம். காமினதி³. ஆயினும் உள்ளே கொடுக்கப்படுவதரிது. சிரமொட்டைக்குப் பூசும் தீவன தைலங்களில் ஓர் கூறாக இது வழங்கப்படும்.

தேயம். இரண்டு முதல் ஐந்து துளி வரைக்குக் கொடுக்கலாம். லவந்தர்க்கூட்டிரஞ்சுத்தினும் சபுலினிமென்னிலும் இது ஓர்கூறாகச் சேருகின்றது.

ரசிதங்கள். ரோஸ்மரிச்சீது. Spirit of Rosemary. கொள். ரோஸ்மரித்தேல், ஒரு அன்சு; திட்டசீதூ⁴ நாற்பத்தொன்பது அன்சு. சேர்த்துக் கரைக்கவும்.

லோஷன்⁵களாதி வெளிமருந்துகளுக்கு மணங்கொடுப்பதற்காக இது பிரதானமாய்ச் சேர்க்கப்படும். 1864 ம் ஆண்டு பிரசுரஞ்செய்த பிறித்தன்வாமருபீய்த்திற் சொல்லப்பட்ட ரோஸ்மரிச்சீதில் இது ஐந்திலொருபங்கு பெலனுள்ளது.

அவாகடச்சரக்குகள். Non Officinal.

துளசி. Ocimum sanctum. திருநீற்றுப்பச்சை. O. Basilicum. இவைகளும் இவைகளின் வகுப்பைச் சேர்ந்த மற்றுமினங்களும் இந்துதேசம் அடங்கலும் உண்டு. இவைகள் எல்லாவற்றுக்கும் கார்ப்பூரம்போன்ற வாசனையான மணமும் கார்ப்பான சுகந்த சுவையுமுண்டு. ஸதிமுலுசுவேதன⁶ எக்ஸ்பெக்துற⁷த்தன்மைகள் இவைக்கு உண்டென்று சொல்லிச் சுதேசிகள் அவைகளை வழங்குவார்கள். ஆயினும் யுரோப வைத்தியத்தில் இவை மெத்தக் கவனிக்கப்படத் தகுந்தவைகளாய்த் தோற்றவில்லை. வங்காளிகள் துளசிவிலையைக் காயவைத்து மாவாக்கி அங்கே உண்டாகும் பீனசம் என்ற நாசிப்புழுவுக்குப் பொடியாக வழங்குவார்கள். புழுக்களைக் கொட்டுவதற்கும்

1 Emulsion. 2 Distill. 3 Carminative. 4 Compound tincture of Lavender. 5 Soap liniment. 6 Rectified spirit. 7 Lotion. 8 British pharmacopoeia 9 Stimulant. 10 Diaphoretic. 11 Expectorant.

இது சித்தியானமருந்தென்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். மயிர்த்துளசி O. Pilosum. என்ற துளசி வகையின் கொட்டையைத் தண்ணீரில் ஊறப்போட அது பாணியாகுமென்றும் அப்பாணி கதார்க¹ளுக்குத்திமல்ச²மாகவும் பிரசவத்திற் பின்னோர்க்காட்டைத் தணிப்பதற்கு உபயோகமாகவும் சுதேசிகளால் வழங்கப்படுகிறதென்றும் விளெமிங்குபண்டிதர் சொல்லியிருக்கிறார். எலுமிச்சந்துளசியினது O. Gratissimum. பிசுபிசுப்பான கொட்டையின் கஷாயம், பிறசில் தேசத்தில் வெட்டைநோய்க்குப் பேர்பெற்ற மருந்தாகிறதென்று மர்தியசு சொல்லியிருக்கிறார். வெற்கு என்பவர் எலுமிச்சந் துளசிக்கு தாவுஞ்செலாசு³ என்ற மலாயப்பெயர்கொடுத்து பிள்ளைகளுக்கு உண்டாகும் அக்கரத்துக்கு வாடிக்கையான யுரோப மருந்துகள் எல்லாம் சித்தியாதவிடத்தில் இதின் பெலனான கஷாயஞ் சித்தியாயிற்றென்று சொல்லுகிறார். இது சேர்த்துச் செய்த சுகந்த தோயத்தை அபோஷத்துக்கு வழங்கும்படி அவர் சொல்லுகிறார். மொரீசுத்தீவில் வாதம் சோர்வுகளின் பரிகரிப்பில் இந்தப் பூண்டிற் செய்த தோயமும் புகைகளும் வழங்கப்படும்.

இந்துப் பெப்பமிந்துப்பூடு. Micromeria capitellata. இது நீலகிரி, மகாபிளேசுவா மலைகளிலுள்ள சிறுப்பூடு- தல்செல் என்பவர் மறுபிய மல்கு மியானம்⁴ என்ற பெயரால் முதல்முதல் இதை வெளியாக்கிப் பெப்பமிந்துக்குரிய சுகந்த காமினதித் தன்மைகள் எல்லாம் இதில் அடங்கியிருக்கின்றனவென்று சாதிக்கிறார்.

பேய்மருட்டி. Anisomeles Malabarica. தென்னிந்துவிற் சுதேச வைத்தியத்தில் இதைப் போல மதிக்கப்படுகிறது இதைப் போல மிகுதியாய் வழங்கப்படுகிறதுமான ஓர் பூண்டு அரிது. சுகந்தமுங் கைப்புமான இதின் இலையின் இன்வூசம்⁵ இரைப்பை குடல்களின் நோய்களுக்கும் கதார்நோய்களுக்கும் முறைச்சுரங்களுக்கும் வாடிக்கையாய்க் கொடுக்கப்படும். சுரங்களில் இதை உள்ளுக்குக் கொடுப்பார்களன்றி நோயாளர்க்கு அதிக வெயர்வை உண்டாகத்தக்கதாய்ச் சூடான இன்வூசத்தின் ஆவியை அவர்சனைக் கொண்டு உறிஞ்சுவிப்பார்கள் என்றும் வைற்று பண்டிதர் சொல்லியிருக்கிறார். இலையின் இன்வூசம் நல்ல சுவேதனி⁶ என்றும் சுதேசிகளுக்குண்டாகிப் பெலனைக் கெடுக்கும் விடாச்சுரத்துக்கு மெத்த உவந்ததென்றும் ரோசுவைத்தியர் அறிவித்திருக்கிறார். இலைகளிலிருந்து திஸ்திலித்⁷ தெடுக்கப்படும் எண்ணெய் வாதத்துக்குச் சித்தியான பூச்சு மருந்தென்றுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இந்தப் பூண்டின் நயங்களைப்பற்றி இன்னும் ஆராய்வது நல்லது. அனிசுமேலிசோவாதப்பூடு, Anisomeles ovata. என்ற பூண்டுக்கு இப்பூண்டின் சடதன்மைகள் உண்டு. இதைப்போல் அதையும் சோதிப்பது நல்லது. இலங்கையில் இதிலிருந்து திஸ்திலித்த எண்ணெய் கருப்பைநோய்களுக்கு உபயோகமானதென்று பெர்மன் சொல்லியிருக்கிறார்.

சுகந்தகோலீயஸ் பூடு. Coleus aromaticus. இது மொலக்காவக்குரிய பூடு. இந்துவின் பல பகுதிகளிற் தோட்டங்களிலுண்டாக்கப்படும். நல்ல சுகந்த மணமும் கார்ப்பான சுவையுமுடையது. ஈளை, நாட்பட்ட இருமல், எபிலெப்சி⁸, மற்றும் ஸ்பசு⁹ நோய்களுக்கு இது கொச்சின் சீனத்தில் வழங்கப்படுகிறதென்று லூறியு சொல்லியிருக்கிறார். இது வீரான சுகந்த காமினதியென்றும், பிள்ளைகளின் குடல்வலிக்குக் கொடுக்கப்படுகிறதென்

1 Catarrh. 2 Demulcent. 3 Daunsclasse. 4 Marrubium malcolmianum.

5 Infusion. 6 Diaphoretic. 7 Distill. 8 Epilepsy. 9 Spasm.

றும், பிழிந்த சாறு, சர்க்கரை முதலிய ஏதும் அனுபானத்தோடு கலந்து கொடுக்கப்படுகிறதென்றும், வைற்றுபண்டிதர் சொல்லியிருக்கிறார். ஓர் யுரோபஸ்திரி சுதேசிகள் சொன்ன முறையாய்த் திஸ்பெப்சி என்ற அசீரணத்துக்கு இதை உட்கொண்டபோது நயங்கண்டாலும் வெறியுண்டிபட்டபடியால் அதை நிறுத்தவேண்டியிருந்ததைத் தனது பரீட்சையிற் கண்டோமென்றும் அவர் சொல்லுகிறார். இதைப்பற்றி இன்னும் ஆராய்ந்தறிவது நல்லது. இதின் வெறித்தன்மையை லாங்கென்பவருங் கவனித்தார். வங்காளத்துச் சனங்கள் இதைக் குடவ்வலிக்கும் குன்மத்துக்கும் வழங்குகிறார்கள் என்று சொன்னார்.

இந்த வகுப்பைச் சேர்ந்த பூண்டுகளுள் பின்வருவன சுதேசிகளுக்குள்ளே பேர்பெற்றிருப்பவைகளாயினும் மெத்த முக்கியமானவைகளல்ல. அவையாவன: அழகுரோயிப்பூடு. *Roylea elegans*, இது சுரக்கினியாய் வழங்கப்படும். பாம்புத்தலைப்பூடு. *Dracocephalum Royleanum*. இதின் கொட்டைகளைத் தண்ணீர் போட்டுப் பாணியாக்கிக் குடிப்பார்கள். வங்காளமேரியாண்டப்பூடு. *Meriandra Bengalensis*. ஸ்த்ரேபிலிமேரியாண்டப்பூடு. *M. Strobilifera*. இவை இரண்டும் கர்ப்பூர மணமும் கைப்புச் சுவையுமுடைய பூண்டுகள். சல்லியப்¹ பூண்டின் தன்மைகள் எல்லாம் இவைக்கு உண்டு. இவற்றின் இலைகள் கர்ப்பூர இலைகளென்று சொல்லிச் சுதேசவைத்தியத்தில் அதிகமாய் வழங்கப்படும். அக்கரத்துக்கு² ம் தொண்டைநோவுக்கும் இந்த இலைகளின் இன்ஞ்சம்³ நல்லதென்று, ராமசேன்போசர் சொல்லியிருக்கிறார். பாலூறுதலைக் குறைக்கிற அல்லது மறிக்கிற தன்மையும் இவைக்குண்டென்று சொன்னது சரியென்று அவர் கவனித்தார் நிலச்சேனியுஸ்போறப்பூடு. *Geniosporum Prostratum*. இது புதுச்சேரியிலே சுரக்கினியாய் வழங்கப்படும். அங்கே நசல்நாயகி என்ற தமிழ்ப்பெயரால் இது வழங்கும். கர்ப்பூராவளி. *Anisochilus Carnosum*. ஸ்திரூலம்⁵, சுவேதனி⁶, எக்ஸ்பெக்துற⁷. இது தன்சிற்றப்⁸த்துக்கு வழங்கப்படும். திருவாளங்கோட்டிலே, சுதேசவைத்தியர் இதைக் கதார்⁹ நோய்களுக்கு வழங்குவார்கள். இது சாந்தமான தீவனி, எக்ஸ்பெக்துறமென்றும், பிள்ளைகளின் இருமல்களுக்கு விசேஷமாய் உபயோகமானதென்றும் பிதி வைத்தியர் சொல்லியிருக்கிறார். இதின் தன்மைகள் இதின் அத்திர¹⁰ எண்ணெய்யிலேயே இருக்கும். சோறிலூகஸ் *Leucas aspera*. இது பாம்புகடிக்கு மாற்று என்று அஸ்வென் என்பவரார் சொல்லப்பட்டினும் அவர் சொன்னதற்குப் போதிய சாட்சியில்லை. இதனிலேச்சாறு சிரங்குக்கும் மற்றங் குட்டைகளுக்கும் பூச நல்லதென்று சாற்று வைத்தியர் சொல்லியிருக்கிறார். பக்தூலிப்பூடு. *Pognostemon Patchouli*. இது சைலெற்று மலாக்காய் என்ற தேசங்களிலுண்டாகின்றது. இதின் காய்ந்ததுளிரே பசு குலித்துளிரென்று வியாபாரத்தில் வருவது. இது மருந்துக்குபயோகமாகாமல் வாசனைப்பொருளாய்ப் பெரும்பாலும் வழங்கப்படும்.

புளம்பச்சினியங்கள்.

PLUMBAGINEAE.

அவாகடச்சரக்குகள். Non-Officinal.

செங்கோடிவேலி. *Plumbago rosea*. இது இந்து அடங்கலுமுள்ள

1 Salvium. 2 Aphthus. 3 Infusion. 4 Febrifuge. 5 Stimulant. 6 Diaphoretic. 7 Expectorant, கட்டைவனி 8 Tonsillitis. 9 Catarrh. 10 Volatile.

பூடு. இதின் வேருக்குக் கொப்புளிக்குந் தன்மை உண்டு. பெர்மன், ரம் பியசு முதலிய முற்கால ஆக்கியோர் அத்தன்மையைக் கவனித்தார்கள். ஆ யினும் ஒஷானசியென்பவரே இதை முறைமையாய் ஆராய்ந்தார். அவர் வேர்ப்பட்டையைத் தண்ணீர்விட்டரைத்துச் சொற்ப அரிசிமாவஞ் சேர்த் துப் பசையாக்கித் தோலில் அணைக்க. ஐந்துமினிக்குள்ளே எரிவு துவங்கி, வரவர அதிகப்பட்டுப் பதினைந்துமினிக்குள்ளே ஒரு கொப்புளப்பற்றுப் போட்டதுபோலாகுமென்றும், முந்தூறு நாதூறு பேர்வரையிற் தாங் கண்ட அனுபவத்தின் பேறு இதுவென்றும் சொல்லியிருக்கிறார். அநதப் பசையை அரைமணிநேரத்துக்குள்ளே எடுத்துப்போடப் பன்னிரண்டு பத்னெட்டும ணிக்குள்ளே வசாரீர்² நிறைந்த பெரிய கொப்புளங் கிளம்பும். கொப்புளி த்த புண்ணுமோ தொல்லையின்றிச் சுறுக்கு ஆறும். கந்தாரிசு³ப் பற்றை ப்பார்க்க இது லகுவானதென்றும், அதைப்போல் இது சன்னசல உறுப்பு களை அழற்சிப்படுத்தாததலால் அதிலும் திறமானதென்று அவர் எண்ணுகி றார். ஆயினும் வாறிங்கு பண்டிதர் இதைச் சோதித்தவரையிற் கண்டபே றுகள் அவ்வளவு திருத்தியல்ல. கந்தாரிசுப்பற்றாலுண்டாகுமெரிவைப்பா ர்க்க இதாலுண்டாகுமெரிவு மெத்தக் கடுமையென்றும் கொப்புளித்த புண் மட்டாவதுமில்லைச் சுறுக்கு மாறுவதுமில்லையென்றும் அவர் கண்டார். எப்படியும் இது வீரான கொப்புளமருந்து. கந்தாரிசு கிடையாதவிடத்தில் இதை வழங்கலாம். உட்கொண்டால் இது காரமான ஸ்திமுலுமாகவும் பெ ருந்தேயத்தில் மயக்கழற்சிநஞ்சாகவுஞ் சேஷ்டிக்கும். வங்காளத்தார் இதை நஞ்சாகப் பலவேளைகளிலும் வழங்குவார்கள். இது விசேஷமாய்க் கருப் பையிற் சேஷ்டிக்கும். கருவழிப்பதற்குச் சுதேசிகள் வழங்கும் மருந்துகளு ள் இதுவுமொன்றென்று வேப்பு பண்டிதர் சொல்லியிருக்கிறார். சுறண்டி ன வேர்ப்பட்டையைக் கருப்பைவாயுட் செலுத்துவார்கள். காரமான இ ந்த வேரை இப்படிச் செலுத்துவதால், கருப்பையிலும், வயிற்றின் உள்ளு றைச்சவ்விலும் தாபிதம்⁵சுறுக்குக் கிளம்பப் பலமுறையும் மரணமாய் முடி யும். இதை உள்ளுக்குக் கொடுத்தும் கருப்பைவாயிலிடும் தென்னிந்து விலுள்ள பெண்கள் கருவழிப்பதற்கு இதை வழங்குகிறார்களெனச் சாற்று வைத்தியர் தமது எழுத்திற் குறித்திருக்கிறார். உள்ளே கொடுப்பதற்குப் ப சையாக அரைத்த பச்சை வேரின் தேயம் ஒன்றுமுதல் இரண்டு திராமாகும். வேரைக் காரமில்லாத ஏதும் எண்ணெய்யில் ஊறப்போட்டு வாதங்கள்சோ ர்வுகளுக்குப் பூசுவார்கள். யாவகர் பற்கொதிக்கு இந்த வேரை அட சுவார்கள். அப்போ இது உமிழ்நீரை வடியப்பண்ணும். சாரங் குறைந்த தாகியகாய்ந்தவேர், தென்னிந்துவிலே உபசிவ்விசு⁶க்கும் குஷ்டத்⁷துக்கும் ம ருந்தாக மெத்த மதிக்கப்படும். இதைக் கொடுப்பதில் மெத்தக் கவனம்வே ணும். வெண்கொடிவேலி P. Zelanica. இது செங்கொடிவேலியின் தன்மைகளையுடையதாயினும் அதிலுஞ் சாந்தமான செயலுள்ளதுபோலு ம். வேர்ப்பட்டையினிரஞ்சம்⁸ அந்திபிராடி⁹யாக வழங்கப்படும். முறைச் சுரத்துக்கு இதைக்கொடுத்து நயங்கண்டேனென்று அஷ்வல்டி வைத்தியர் சொல்லுகிறார். இது வீரான சுவேதனி¹⁰யாய்ச் சேஷ்டிக்கின்றது. இந்த இ ரண்டு இனங்களின் சத்தும் பிளம்பசின்¹¹ என்ற கிரிஸ்தம்¹² பதார்த்தத்திலே யேஇருக்கின்றது. இவைகளை இன்னுஞ் சோதிப்பது நன்று.

1 Minute. 2 Serum. 3 Cantharides. 4 Stimulant. 5 Inflammation. 6 Second-
ary syphilis. 7 Leprosy. 8 Tincture. 9 Antiperiodic. 10 Diaphoretic.
11 Plumbagin. 12 Crystalline.

சல்வட்ரோசியங்கள்.

SALVADORACEAE.

அவாகடச்சரக்குகள். Non-Officinal.

களர்வா. *Salvadora Wightiana*. சிலர் இதிலே சிறுகளர்வா¹ பெருக ளர்வா² என்ற இரண்டு இனங்களைச் குறிக்கிறார்கள். இந்தமரம் இந்து அடங்கலுமுள்ளது. ஆயினும் மெத்த மிகுதியல்ல. பிலு³ என்ற இந்துஸ்தானிப் பேராற் பெரும்பாலும் இது வழங்கும். இதின் இலை, பட்டை, கொட்டைகள் எல்லாவற்றுக்கும் ஓர்வகையான கார்ப்பான மணமும் சுவையுமுண்டு. வேர்ப்பட்டை மெத்தக் கார்ப்பானது. அதை மாவாக்கித் தோலில் அணைக்க, கொப்புளமுண்டாகும். ஏர்வின் பண்டிதர் இதை இப்படி வழங்கினார். பட்டையை அசத்துவ⁴ சுரங்களுக்கும் அமெனூறீய⁵த்துக்கும் இந்துவைத்தியர் வழங்குவார்களென்று என்ஸ்லி சொல்லுகிறார். சிந்துவிற்பாம்புகடியைப்பற்றி இம்லக்கு பண்டிதர் எழுதிய பத்திரத்திலே பிலுக்கொட்டையை உள்ளே கொடுத்ததால் நயப்பட்ட பலஉதாரணங்கள் அட்டவணையாகக் குறிக்கப்பட்டன. இக் கொட்டை நல்ல விரேசனமுமாகும். இந்த மரத்தின் பகுதிகள் எல்லாவற்றுக்கும் விசேஷமாய் வேர்ப்பட்டைக்குக் கார்ப்பான ஸ்திமுலீத்தன்மைஉண்டென்பதற்கு மிகச்சந்தேகமில்லை. ரக்சு பேகர் இது உபயோகமான மருந்தாகுமென்கிறார். கிப்சன் பண்டிதர் எண்ணமுமிதுவே. இந்த மரத்தின் தன்மைகளும் பெருங்களர்வா சிறுகளர்வா என்ற இரண்டினது தன்மைகளும் இனிமேல் ஆராயப்படத் தகுந்தனவென்பது ஓஷானசியர் எண்ணம். பெருங்களர்வாவின் கார்ப்புத்தன்மை சிறுகளர்வாவின் அத்தன்மையைப் பார்க்கக் குறைவாம். வடக்கிந்துவின் சனங்கள் பல்லை விளக்கிப் பற்களையும் ஈறுகளையும் பெலப்பிக்கிறதற்கு இதின் கிளைகளைக் குச்சியாக வழங்குவார்களாகையால் இது பற்குச்சிமரம் என்று பெயர்பெறும்.

சோலனாசியங்கள்.

SOLANACEAE.

அத்திரோபபேலடனப்பூடு. *ATROPA BELLADONNA*.

வாசம். யுரோபம் மேற்காசியங்களின் சோலேவேலி முதலிய நிழலான இடங்களில் இது உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. 1. இலைகள். காய்கொண்டபின்னே இலைகள் சேர்க்கப்படும். இவை மூன்று முதல் ஆறு இஞ்சு நீளமும் அயில் வடிவும் கூடும் அழுத்தமும் அறவற்றதுமாய் ஒன்றைவிட்டொன்று மாறியிருக்கும். ஆக மேலிலைகள் சோடாயும் சமவீனமாயுமிருக்கும். பச்சையாயிருக்கையில் சொற்ப கசப்பும், அற்ப கார்ப்புமான சுவையுடையதாய் துவைக்கும்போது நாற்றம் வீசும். இதின் சாற்றையாவது இன்யூசீ⁷த்தையாவது கண்ணுக்கு

1 *Salvadora Persica*, 2 *S. Indica*, 3 *Pilu*. 4. *Adynamic*, 5 *Amenorrhoea*.
6 *Stimulant*. 7 *Infusion*.

ள்ளே ஒழுக்கிவிட நயனைத்துவாரம்¹ விரியும். 2 காய்ந்தவேர். இது இரண்டொரு அடி நீளமும் இரண்டொரு இஞ்சு தடிப்புமுள்ள, கவரான சுருக்கு விழுந்த வெண் கபிலநிறத் துண்டுகளாக வரும். இதின் இன்ஞ்சுத்தைக் கண்ணுக்குள்ளே ஒழுக்க நயனைத்துவாரம் விரியும். இலை வேர் இரண்டின் சத்தும் அத்திரோபியம்² என்ற அல்கலைவத்திலேயே இருக்கும்.

தன்மை. இது வீரூன செரதீவம்³, அனுடைன்⁴, அந்திஸ்பசி⁵, லக்திவூச்⁶. இந்த வகுப்பைச் சேர்ந்த வேறுஞ் சில பூண்டுகளைப் போல உள்ளே தின்றாலென்ன, கண்ணில் இட்டாலென்ன இது நயனைத் துவாரத்தை விரிவிக்குந் தன்மையுள்ளது. மிஞ்சிய தேயத்தில் வீரூன நஞ்சாகும்.

உபயோகம். அந்திஸ்பசியாக இது குக்கல், ஸ்பசநா⁷, கூவுஞ்சுவாசம்⁸, கொரியம்⁹, எபிலெபசி¹⁰யென்ற நோய்களுக்கும், சலபாசையின் ஸ்பசஒடுக்குக்கும் நல்ல மருந்து. செரதீவம் அனுடைனாக பலவகை துறல்சி¹¹, வாதம், ஏர்ப்பு, ஐருவோபி¹², வெறிப்பைத்தியம் என்ற நோய்களுக்கும் திஸ்மெனுறீயம்¹³ வருத்தமான மற்றும் கருப்பைநோய்களுக்கும், கன்சர்ப்புண்க¹⁴ள் வருத்தமான மற்றும் புண்களுக்கும் இது நல்லது. காசநோயி¹⁵லும், சிருங்கை¹⁶யின் ஆழியபுண்முதலிய கண்வியாதிகளில் நயனைத்துவாரத்தை¹⁷விரிவிக்கவேண்டியதாய் அல்லது வருணி¹⁸யின் ஓரங்களை ஒட்டாமற் பேணவேண்டியதாயிருக்கும்போதும் சத்திரவைத்தியஞ்செய்வதற்கு இது உத்தமதுணை மருந்தாகும். வாதம், ஸ்துரூம நோய்கள் காரணமாயுண்டான வருணித்தப¹⁹த்தில் இதால் மெத்தச் சகாயமுண்டாகும். ஸ்காலதீனம்²⁰ வராமற் காக்குந் தன்மை இதற்குண்டென்பதைப்பற்றி இன்னும் ஆராயவேண்டும்.

தேயம். இலைத்தாளில் ஒரு கிறேனிற் துவங்கிப் படிப்படியாய்க் கூட்டி இரண்டு கிறேன் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். அதிகமாயுங் கொடுக்கலாம். பின்வரும் ரசிதங்களில் ஒன்றைக் கொடுப்பதே உத்தமமான முறை.

இலையின் ரசிதங்கள். பெலடனரஞ்சம். Tincture of Belladonna. கொள். பெலடன இலை, பருக்கன்தாளாக ஒரு அன்சு; புருவுசீது²¹ அரைநாழி. அடைத்த பாத்திரத்தில் இலைத்தாளைச் சீதிற் பதினைந்து அன்சில் இரண்டுநாளாறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கவும். அப்பாற் சியந்தனி²²யில் வார்த்து நீர் ஒழுகித் தீர்ந்தபின் மிச்சமான ஐந்து அன்சு சீதையும் வார்த்துவடிக்கவும். அப்பாற் சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து நீர்களைச் கலந்து அரைநாழிதேறப் புருவுசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். ஐந்து முதல் இருபதுமினி²³ லண்டன் தபுளின்வாமகுபீபத்²³ திற் சொல்லிய பெலடனரஞ்சத்திலும் இது அரைவாசி பெலனுள்ளது.

பெலடனவேசிற்த்து. Extract of Belladonna. கொள். பச்சையான பெலடனை இலைகளும் இளங்கொப்புகளும், தூற்றுப் பன்னிரண்டு இருத்தல். இவைகளைக் குழியம்மியிற் துவைத்துச் சாற்றைப் பிழிந்து 130 பாகை சூட்டுக்கு வருந்தனையும் படிப்படியாய்க் காய்ச்சிப் பச்சையான நிறப்பதார்த் சத்தைக் காரிக்கம்புடவையில் வடித்து வேறாயெடுக்கவும். வடித்த நீரை அல்புமின்²⁴ உறைவதற்கு 200 பாகை சூட்டுக்குவரக் காய்ச்சி, மறுபடியும்

1 Pupil. 2 Atropia. 3 Sedative, சாந்தனி. 4 Anodyne, அனுகக்கினி. 5 Antispasmodic, ஸ்பசக்கினி. 6 Lactifuge. 7 Spasmodic asthma. 8 Crowing Inspiration. 9 Chorea. 10 Epilepsy. 11 Neuralgia. 12 Hydrophobia. 13 Dysmenorrhoea. 14 Cancer. 15 Cataract. 16 Cornea. 17 Pupil. 18 Iris, இரிசு. 19 Iritis, இரிசுத்தபம். 20 Scarlatina. 21 Proof spirit. 22 Percolator. 23 Pharmacopoeia. 24 Albumen.

வடிக்கவும். அப்பால் வடித்த நீர் மெல்லிய பாணியாய் வருந்தினையும் நீர்ம த்திகத்¹தில் வறட்டி, முதலே வேரூயெடுத்துவைத்திருந்த பச்சையான நிறப் பதார்த்தத்தையும் சேர்த்து முழுவதையுந் திறமாய்க் கலக்கி, குளிகைக்குத்த குந்த பதமான எசிரூத்தாய் வருந்தினையும் 1+0 பாகைக்குக் கதிக்காத சூட்டில் வரட்டவும்.

தேயம். காற்கிறேன் துவங்கி செயல்தோன்றுந்தினையும் படிப்படியாய்க் கூட்டி ஒரு கிறேன் வரைக்கு நாள் இரண்டு மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம். நயன ரோகங்களில் இது கண்ணுக்குப் பெரும்பாலும் இடப்படும்.

பேலடனவன்கேன். Ointment of Belladonna. கொள். பேலடன வெசிரூத்து எண்பதுகிறேன்; பூதலாடி² ஒருஅன்சு. எசிரூத்துக்குச் சிலதுளி தண்ணீர் விட்டு அரைத்திளக்கி அப்பால் லாட்டைக் கூட்டித் திறமாய்ச் சேர்க்கவும்.

வாதம், துறல்சி³ நோய்களுக்கும் வருத்தமான மற்று நோய்களுக்கு இது நல்ல பூச்சு. சிசிறோத்தை⁴, மூலமுளை, சலப்பையின் நோய்களுக்கு இது விடபத்திற்⁵ பூசப்படும்.

பேலடனபற்று. Belladonna Plaster. கொள். பேலடனவெசிரூத்து, இராபப்பற்று⁶ வகைக்கு மூன்று அன்சு; திட்டசீது⁷ ஆறு அன்சு. எசிரூத்தையுஞ் சீதையுங் குழியம்மியில் இட்டு ஒன்றுயரைத்து, கரையாப்பதார்த்தம் அடைந்தபின் தெளிந்த நீரை இறுத்து சீதைத் திஸ்திலித்⁸தகற்றி பிறப்பதாகிய அலக்காலெசிரூத்தை⁹ நீர்மத்திகத்தில் முதலே உருக்கின ராபப்பற்று⁶ கலந்து பற்றுக்குத் தருந்தபதமாய் வருந்தினையும் ஓயாமற் கலக்கிக் காய்ச்சவும்.

ஈளை, அஞ்சினைபெத்தசு¹⁰, காலிகபுறங்கீது¹¹ என்றநோய்களிலும் மற்றுஞ் சுவாச நோய்களிலும் இப் பற்று நெஞ்சுக்கு இடப்படும். வாத வீக்கம் வருத்தமான மற்றும் வீக்கங்களில் பொருத்துகளுக்கு இடப்படும்.

வேரின் ரசிதங்கள். பேலடன லின்மேன். Liniment of Belladonna. கொள். பேலடனவேர், பருக்கன்தாளாக, இருபது அன்சு; பூரம் ஒரு அன்சு; திட்டசீது போதியது. வேர்த்துளைச் சொற்பசீதால் நனைத்து அடைத்தபாத்திரத்தில் மூன்றுநாளுறவைத்து அப்பாற் சியந்தணி¹²யில் இட்டு, இன்னுஞ் சீதுவார்த்து பூரம் அமைந்த பாத்திரத்துக்குள்ளே அரைநாழிஒழுக்குந்தினையும் வடிக்கவும்.

பேலடனவன்கேனை வழங்கக்கூடிய நோய்களுக்கு இதை வழங்கலாம்.

அத்திரோபியம். Atropia. இது பேலடன வேரிலிருந்தெடுக்கப்படும் ஓர் அல்கலைவம்¹³. இதைக் குறிக்குஞ் சின்னம் கா¹⁷ ஐ¹³ நீ¹⁴ அ¹⁵. லட்சணங்களாவன: இது நிறமற்ற, ஊசிபோன்ற கிரிஸ்தல்க¹⁴ளாகவிருக்கும். தண்ணீரில் சொற்பமாய்க் கரையும். அலக்கால்¹⁵ ஈதர்க¹⁶ளில் சுறுக்குக் கரையும். தண்ணீரில் கரைவுஅல்கலைத்தன்மையுள்ளதாய், பொன்திரிகுலோறிர¹⁷த்தோடு சேரும்போது வெண்மஞ்சள் அடையல்விழும். நயனைத் துவாரத்¹⁸தை நல்லாய் விரிக்கும். பரமானுவில் எரிக்கச் சாம்பல் உண்டுபடாது. இது ஓர் வீரூன நஞ்சு.

1 Water-bath. 2 Prepared Lard, பூதலையம். 3 Neuralgia. 4 Chordee. 5 Perinaeum. 6 Resin plaster. 7 Rectified spirit. 8 Distill. 9 Alcoholic extract. 10 Angina pectoris. 11 Chronic Bronchitis. 12 Percolator.

13 Alkaloid. 14 Crystal, 15 Alcohol 16 Ether. 17 Terchloride of gold. 18 Pupil.

தன்மை உபயோகங்கள். பெலடனத்தைப் போலவே. ஆயினும் அதைப்பார்க்க இது மெத்த வீறுள்ளது. தேயம் கிறேனில் ஐம்பதிலொருபங்கு முதல் இருபதிலொருபங்கு வரைக்குக் கொடுக்கலாம். உள்ளே கொடுப்பதரிது. இது வீறுள்ளதாகையால் உள்மருந்தாகப் பெலடனத்துக்கு இனப்பாகும். நயன ரோகங்களிற் கண்ணுக்கு இடவோ நயந்தது.

அத்திரேபியத்தின் ரசிதங்கள். அத்திரேபியநீர். Solution of Atropia. கொள். அத்திரேபியம், கிரிஸ்தல்¹ளாக, நாலுகிறேன்; திட்டசீது², ஒருதிரும்; திஸ்திலித்த தண்ணீர்³ ஏழுதிரும்; அத்திரேபியத்தைச் சீதிற்கரைத்து அதைப் படிப்படியாய்த் தண்ணீரோடு கலந்து ஒன்றாய்க் குலுக்கவும்.

ஒரு அன்சு நீரில் நாலுகிறேன் அத்திரேபியம் இருக்கும். தேயம் இரண்டு துளிமுதல் ஐந்து துளி. இது சிலவேளைகளிற் தோலுக்கடுக்க உள்ளேபுகட்டப்படும். நயனைத்துவாரத்தை விரியப்பண்ணுவதற்கு இரண்டு துளிமுதல் ஐந்துதுளியைக் கண்ணுக்குள்ளே விடலாம். இந்த மருந்தைக் கவனத்தோடு வழங்கவேண்டும்.

அத்திரேபியவன்கென். Ointment of Atropia. கொள். அத்திரேபியம், எட்டுக்கிறேன்; திட்டசீது அரைத்திரும்; பூதலாடு⁴, ஒரு அன்சு. அத்திரேபியத்தைச் சீதிற் கரைத்து லாட்டைக் கூட்டி நன்றாய்க் கலக்கவும். நுறல்சி⁵க்கும் வருத்தமான மற்றுநோய்களுக்கும் வீரான பூச்சு.

அத்திரேபியசல்வசு. Sulphate of Atropia. கொள், அத்திரேபியம், நூற்றிருபது கிறேன்; திஸ்திலித்த தண்ணீர், நாலுதிரும்; கிருச சல்வுரிக்க மிலம்⁶, போதியது. அத்திரேபியத்தைத் தண்ணீரிற் கலந்து, அமிலத்தைப் படிப்படியாய்ச்சேர்த்து அந்த அல்கலைவங்⁷கரைந்து நீர் தடஸ்த⁸மாகுந்தனையுங் கலக்கவும். அப்பால் அதை 100 பாகைக்கு மேற்படாத குட்டில் உலர வரட்டவும். அப்போது நிறமற்ற மாவாக வரும். இது தண்ணீரிற் கரையக்கூடியது. தண்ணீர்க்கரைவு சோதனைத்தாளுக்குத் தடஸ்தமாய் நிற்கும். அதைக் கண்ணில் விட, அத்திரேபிய நீரைப்போல் நயனைத்துவாரத்தை விரியப்பண்ணும். இந்தமாவைப் பரமானுவில் எரிக்கச் சாம்பல் விழாது.

இது வெளிப்பிரயோகத்துக்கே கூடியது. வீரான நஞ்சு.

அத்திரேபிய சல்வசுநீர். Solution of the sulphate of atropia. கொள். அத்திரேபிய சல்வசு, நாலு கிறேன்; திஸ்திலித்த தண்ணீர், ஒரு அன்சு. கரைக்கவும்.

அத்திரேபியநீரைப் போலவே இதை வழங்கலாம்.

ஸ்திராமுனிப்பூடு. STRAMONIUM.

வாசம். இது யுரோபம் அடங்கலும் இமயமலை வரைக்குஞ் செய்கையற்ற நிலங்களில் உண்டாகின்றது. வட அமரிசத்திலுமுண்டாகின்றது.

வாகடபகுதி. 1 இலை. இது பருத்து வட்டித்து நெழிந்து விளிம்பில் ஆழிய பள்ளங்கள் உள்ளதாயிருக்கும். கடுமையான மணமுடையது. இலை வாடும்போது அதிக மணம் வீசும். அருவருப்பும் சொற்ப கைப்பும், உவட்டுமான சுவையுள்ளது, பூடு பூத்திருக்கையில் இலைகளைச் சேர்க்கவேண்டும்.

1 Crystal. 2 Rectified spirit. 3 Distilled water. 4 Prepared Lard. 5 Neuralgia. 6 Dilute sulphuric acid. 7 Alkaloid, 8 Neutral.

2 கொட்டை. இது கருங்கபில நிறமும் கொள்ளுவடிவும், தட்டையு
ம் முரணுமானது. சுவை சொற்ப கைப்பும் அருவருப்புமானது. துவை
த்தாலன்றி மணம் இல்லை. துவைக்க ஓர்வகையான கடுமணம் வீசும். இலை
கொட்டை இரண்டினதுஞ் சத்து தற்பூநியம்¹ என்ற ஓர் அல்கலைவ²ப்பதார்
த்தத்திலேயே இருக்கும்.

தன்மை. அனுடைன்³, அந்திஸ்பசி⁴, அதிதேயத்திற் கொடிய நஞ்சு.

உபயோகம். பெலடனத்தைப் போலவே. ஆயினும் இதின் செயல் அ
தைப்போல் நன்றாய் ஆராயப்படவுமில்லை, நிதானிக்கப்படவுமில்லை. ஸ்ப
ச ஈனையிலும் கசத்திலுண்டாகும் முட்டுத்தொய்விலும் சுவாசப்பையின் எம்
விசேமத்திலும் சிலவகையான காலிக கதாரிலும் காய்ந்தஇலைத் தண்டுகளைப் பு
கைத்தல் அவதியான குணங்களைத் தணித்துக் கபத்தை வெட்டும். ஆயினு
ம் இதை வழங்குவதிற் கவனம்வேண்டும். இதைக் கண்ணுக்கு இட்டாலு
ம் அதிதேயமாய் உட்கொண்டாலும் நயனைத்துவாரம்⁷விரியும்.

தேயம். இலைத் தூளில் ஒரு கிறேன் முதல் மூன்று கிறேன் வரைக்கு
க் கொடுக்கலாம். காய்ந்த இலைத்தண்டுகளிற் பத்துமுதல் முப்பது கிறேன்
வரைக்குப் புகைக்கலாம். இரண்டுமுறையிலுஞ் சிறுதேயத்திற் துவங்கிப்
படிப்படியாய்க் கூட்டுவதே பத்தி.

ராசிதங்கள். ஸ்திராமுனியேசிறுத்து. Extract of Stramonium. கொள்.
ஸ்திராமுனிச்சொட்டை பருக்கன்தாளாக, ஒரு இரூத்தல்; ஈதர்⁸ அரைநாழி
அல்லது போதியது, துஸ்திலித்தண்ணீர்⁹, புருவுசீது,¹⁰வகைக்குப் போதிய
து. ஈதரைச் சீசாவிலே கால்நாழி தண்ணீரோடு விட்டுக் குலுக்கி ஈதர் பி
ரிந்தபின் அதை வேராய் இறுத்துக்கொள்ளவும். ஸ்திராமுனித்தூளைச் சிய
ந்தனி¹¹யில் இட்டுக் கழுவின ஈதரை அதின்மேல் மெல்ல மெல்ல வார்த்துத்
தூளிலுள்ள எண்ணெய்யை நீக்கவும். சியந்தனியிலிருந்து ஒழுகிய ஈதரை
எடுத்து அகற்றியபின் சியந்தனியில் சேஷமாயிருக்கிற ஸ்திராமுனித் தூளி
ன் மேலே, சீதை வார்த்துத் தூளின் சாரம் வாங்கப்படுந்தனையும் மெல்ல
மெல்ல ஒழுகவிடவும். இந்த ரஞ்சத்திலுள்ள சீதின் மிகுதியான பங்கைத்
திஸ்திலித்தகற்றி, சேஷம் குளிகைக்குத் தருந்தபதமாய்வருந்தனையும் அதை
நீர்மத்திசுத்தில்¹² வறட்டவும்.

தேயம். காற்கிறேனிற் துவங்கிப் படிப்படியாய்க்கூட்டி இரண்டு கிறே
ன்வரைக்குக் கொடுக்கலாம். இதை நாலுமடங்கு நிறையுள்ள லாட்¹³டோ
டுசேர்த்தால், காலிகவாதத்துக்கும், மற்றும் வருத்தமான நோய்களுக்கும் நல்
ல, அனுடைன் பூச்சாகும்.

ஸ்திராமுனிவஞ்சர். Tincture of Stramonium. கொள். ஸ்திராமுனி
ச்சொட்டை இடித்து, இரண்டரை அன்சு; புருவுசீது அரைநாழி. ஸ்தி
ராமுனியைப் பதினைந்து அன்சு சீதில் அடைத்த பாத்திரத்தில் இரண்டுநா
ளுறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கவும். அப்பாற் சியந்தனியில் இட்டு
நீர் ஒழுகினபின் சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும் விட்டு வடிக்கவும். சக்
கையைப் பிழிந்து வடித்து இரண்டு நீர்களையுங் கலந்து அரைநாழி தேறப்
புருவுசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். பத்துமுதல் முப்பது மினிம் வரைக்குக் கொடுக்கலாம்.

1 Daturia. 2 Alkaloid. 3 Anodyne. அனாகென். 4 Antispasmodic. 5 Emphysema.
6 Catarrh. 7 Pupil. 8 Ether. 9 Distilled water. 10 Proof spirit. 11 Per-
colator. 12 Water bath. 13 Lord.

*ஊமத்தை. DHATURA.

வாசம். இது இந்து அடங்கலும் தரிசு நிலங்களில் உண்டாகும். இதை வெள்ளுமத்தை என்றுஞ் சொல்வார்கள்.

வாகடபகுதி. இலையுங் கொட்டையும். 1 இலை வட்டிப்பாயும் கூரான துனியுள்ளதாயும் சொற்பங் கருக்கான ஓரமுடையதாயுமிருக்கும். அடியிற் சமவீனமாய்ச் சுணையுமுள்ளது. கடுமையான நாற்றங்கொண்டது. கசக்கும்போதே நாற்றம் அதிகமாய் வீசும். 2 கொட்டை காலே அரைக்கால் இஞ்சு நீளமும் கொள்ளுச் சாங்கமும் தட்டை வடிவமுமாய்க் கருங் கபிலநிறமுள்ளது. கெட்ட கசப்பும் சற்றே காரமுமான சுவையுள்ளது. இலைகள் கொட்டைகள் இரண்டின் சத்து தற்பூதியம்¹ என்ற ஓர் அல்கலைவ² பதார்த்தத்திலேயே இருக்கும்.

தன்மை. உபயோகம். தேயம். ஸ்திராமுனியைப் போலவே. துவைத்த இலைப்பூச்சுகளும், இடித்த கொட்டையை ஊறப்போட்டுடுத்த எண்ணெய்களும், வாதவீக்கம், கட்டுக் கழலைகள் குல்மங்குளின் வருத்தங்களைத் தணிப்பதற்கு மிக நயமாகும். பெருந்தேயத்தில் இது நஞ்சு. ஆதலாற் ச தேசிகள் சிலவேளை கொலைசெய்யும்நோக்கத்துக்காக இதைவழங்குவார்கள். (56)

ரசிதங்கள். ஊமத்தை ரஞ்சம். Tincture of Dhatura. கொள். ஊமத்தங்கொட்டை, இடித்து இரண்டரைஅன்சு; புருவுசீது⁴ அரைநாழி. அடைத்தபாத்திரத்தில் ஏழுநாளைக்கு ஊறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கி, பிற்பாடு சீலையில் வடித்துப் பிழிந்து அரைநாழிக்குப் போதிய புருவுசீது சேர்க்கவும். அல்லது ஸ்திராமுனி ரஞ்சத்தைப்போற் சியந்தனி⁵க்கவும்.

தேயம். பத்துமினி⁶மிற் தொடங்கிப் படிப்படியாய்க் கூட்டி இருபது முப்பது மினிம் வரைக்குங் கூடவுங் கொடுக்கலாம்.

[வாறிங்கு பண்டிதர், இந்துதேசவிசிகங்களில் ஊமத்தை ரஞ்சத்தைச் சிலவருஷங்களாகக் கொடுத்து அவினாலுண்டாகக்கூடிய செரதிவ⁷நாகதிக⁸ தன்மைகள் எல்லாம் இதனாலுமுண்டாகிறதென்று கண்டார். அவின் விலை பெற்ற சரக்காதலாலும் இந்த ரஞ்சத்தைச் சொற்ப செலவோடு செய்துகொள்ளலாமாதலாலும் இதைப் பாவிப்பதாற் செலவு மிகக் குறையும். இதின் தேயமோ அந்தந்தஆளுக்குத்தக்கதாய் பிரமாணப்படுத்தப்படவேண்டும். சிறு தேயத்திற் துவங்கிக் காரியத்துக்குத்தக்கதாய்க் கூட்டிக்கொடுப்பது நல்லது. இதில் இருபதுதுளி, அவினில் ஒரு கிறேனுக்குச் சரியென்றுங் காணப்பட்டது.]

ஊமத்தையேசிறுத்து. Extract of Dhatura. கொள். ஊமத்தங்கொட்டை பருக்கன் தூளாக, ஒரு இரூத்தல்; ஈதர்⁹ அரைநாழி அல்லது போதியது; புருவுசீது, திஸ்திலித்த தண்ணீர்¹⁰, வகைக்குப் போதியன. ஸ்திராமுனியெசுரத்துச் செய்வதுபோல் இதையுஞ் செய்யவும்.

தேயம். காற்கிறேனிற் துவங்கிப்படிப்படியாய்க் கூட்டி ஒன்றரைக்கிறேன்வரைக்கு நாள்முன்றுமுறைகொடுக்கலாம். பெலடனவெசுரத்¹¹துக்கு இது பதிலாகும்.

[கொட்டைகளிலன்றி இலைகள் தளிர்களிலும் அயசியசெசுரத்தைப்

1 Datura. 2 Alkaloid. 3 Node. 4 Proof-spirit. 5 Percolate. 6 Minim.
7 Sedative. 8 Narcotic. 9 Ether. 10 Distilled water. 11 Extract of Belladonna.

போலும் ஓர் எசுரூத்தைச் செய்து வழங்கலாமென்று பிதி வைத்தியர் சொல்லியிருக்கிறார். இந்த எசுரூத்தில் அவர் பல மாதிரிகள் செய்து அவற்றில் ஒரு மாதிரியைச் சென்னைப்பட்டண சாதாரண விசிகத்துக்கும் அனுப்பினார். அங்கிருந்த பிளக்லக்கு வைத்தியர் அதை இரண்டு கிறேன் தேயமாகக் கசரோகத்துக்குக் கொடுத்து அதினால் முட்டுத்தணிந்ததென்றும், பெலடன வெசுரூத்தில் மூன்றிலொருபங்கு கிறேன் போலவே இது சேஷ்டிக்கிறதென்றும் அறிவித்தார். இந்த மருந்தின் செயலைப்பற்றிப் பிளக்லக்கு வைத்தியர் கண்ட அனுபவத்தைத் தனது சுய அனுபவம் நிச்சயப்படுத்துகிறதென்றும் பிதி வைத்தியர் சொல்லி, வாகடத்துக்குரிய எசுரூத்தைப்பார்க்க இதை அதிதேயத்திற் கொடுக்கக்கூடியதாயிருப்பது நல்லதென்றும், அறிவித்திருக்கிறார்.]

ஊமத்தம்பற்று. Dhatura Plaster. கொள். ஊமத்தையெசுரூத்து, மூன்று அன்சு; சபுப்பற்று¹, ராள்²ப்பற்று வகைக்கு ஒன்றரை அன்சு. பற்று களை ஸ்தீமின்³ சூட்டிலாவது, நீர்மத்திகத்திலாவது உருக்கி, பிறகு ஊமத்தை யெசுரூத்தைக் கூட்டி நன்றாய்ச் சேர்க்கவும்.

வாதநோய்க்கும் காலிகமான வருத்தமுள்ள மற்றுநோய்களுக்கும், இது நல்ல பூச்சுமருந்து. ஈளையிலும் காலிக சுவாச வியாதிகளிலும் நெஞ்சுக்குப் பூசவும் உத்தமமாம்.

ஊமத்தம்பாப்பை. Dhatura Poultice. கொள். துவைத்த பச்சை ஊமத்தயிலையிலும் அரிசிமாலிலும் சமபங்கு. அவற்றைப் பாப்பையாக்கு வதற்குத் தண்ணீர் போதியது.

குல்மம்⁵ பொருத்திலுண்டாகும் வாத வீக்கங்கள், வருத்தமான கழலைகள், வெளிமூலமுளைக்கு இட நல்ல மருந்து. இப்பூண்டின் நஞ்சான சத்தை உறிஞ்ச மோசம்நேரிமொகையால் தோல் வழந்தப்பட்ட அல்லது புண்பட்ட இடங்களுக்கு இதை இடப்படாது.

அவாகடச்சரக்குகள். Non-officinal.

கருவூமத்தை. Dhatura fastuosa. இது தாவர இலட்சணங்களில் மாத்திரமல்ல அவுஷததன்மையிலும் வெள்ளுமத்தையைப் போன்றது. அதிலும் இது வீறு கூடினதென்று எண்ணப்பட்டாலும் அதற்கு அத்தாட்சியில்லை. இவைகள் இரண்டுஞ் சமமான நாகதிகம்⁶, அனுடைன்⁷ களாக இருக்கவேண்டும். ஆயினும் இதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு ஆராய்வுகள் தேவை. கருவூமத்தை யிலையைப் புகைக்க, ஈளை நோயின் முட்டும் அவதியும் உடனே தீருகிறதைக் கண்டோமென்று அஸ்வல்டு பண்டிதர் அறிவித்திருக்கிறார்.

[தென்னிந்துவின் கடைகளில் விலைப்படுகிற சில நெற்றுகளையும் சிறுக் கொட்டைகளையும் மராடிமோக்கு⁸ என்ற தமிழ்ப் பெயரால் என்ஸ்லி என்பவர் விபரித்திருக்கிறார். அவைக்குச் செரதீவ⁹தன்மையும் சற்றே வெறித்தன்மையுமுண்டாம். வைற்று பண்டிதர் அவைகளைச் சோதித்து அவை ஊமத்தையின் மலராத பூவுக்குள்ளடங்கிய பருதிகள் என்று கண்டார்.]

1 Soap plaster. 2 Resin. 3 Steam. 4 Water-bath. 5 Nodes. 6 Narcotic. 7 Anodyne. 8 Maratia Mooghooa. 9 Sedative

அயசீயமசுப் பூடு. HYOSCYAMUS, HENBANE.

வாசம். இது யுரோபம் அடங்கலும் மேற்காசியத்தில் மேற்கிமையம்வரைக்குந் தரிசுநிலங்களில் உண்டாகும் மருந்துச்சாக இந்துவிற் செய்யப் படும. (57)

வாகடபகுதி. காய்ந்த இலை. பூக்கள் மூன்றத்திருபங்கு மலர்ந்திருக்கையில் இலை சேர்க்கப்படும். இதின் நிறம் மங்கலான வெண் பச்சை. விளிம்பில் அறவுள்ளது; பசைப்பும் சுணையுமுடையது. பச்சைப்பூடு கெட்ட மணமும் சற்றே கார்ப்பான சுவையுமுடையது அது காய மணமும் சுவையுங் குறைந்துவிடும். பச்சைச் சாற்றைக் கண்ணுக்குள்ளே ஒழுக்கிவிட நயனை¹த்துவாரம் விரியும். அயசீயமீன்² என்ற அல்கலைவ³த்திலேயே இதின் விசேஷ சத்திருக்கும்.

தன்மை. செரதீவம்⁴, அனுடைன்⁵, அந்திஸ்பசி⁶.

உபயோகம். நரம்புற்சி மனக்கிளர்ச்சி, நித்திரையின்மைகளுக்கும், பெலவீனம் அல்லது ஸ்தேரி⁷ யோடு கூடிய நெஞ்சிடிப்புகளுக்கும் இது நயந்தது. மேலும் துறல்சி⁸ நோய்கள் வாத நோய்களுக்கும் வருத்தமுள்ள கோளவீக்கங்களுக்கும், அழன்ற கன்சர்ப்⁹ புண்கள் மூலமுளைகளுக்கும் இது வெளிக்கு அணைக்கப்படும். நயன ரோகங்களில் இதைக் கண்ணுக்குளிட நயனைத்துவாரத்தைவிரிவிக்குமாகையால் அவைக்கு இது உபயோகமானது.

தேயம். இலையை மாவாக்கி ஐந்து கிறேன் முதற் பத்துக்கிறேன் வரைக்குக் கொடுக்கலாம்.

ரசிதங்கள். அயசீயமசிரஞ்சம். Tincture of Hyoscyamus. கொள். அயசீயம்இலை, பருக்கன் தூளாக, இரண்டரை அன்சு; புருவுசீது¹⁰ அரைநாழி. அடைத்த பாத்திரத்தில் அயசீயமசிலைத் தூளைப் பதினைந்து அன்சு சீதில் இரண்டுநாளுறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கவும். அப்பாற் சியந்தனி¹¹யில் இட்டு நீர் ஒழுகினபின் சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும் விட்டு வடிக்கவும். பிறகு சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து இரண்டு நீர்களையுங் கலந்து அரைநாழி தேறப் போதிய புருவுசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். இருபது மினிம் தொடங்கி அறுபது மினிம் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். தேவைக்குத் தக்கதாய்த் திரும்பத் திரும்பக் கொடுக்கலாம்.

அயசீயமசேசிறுந்து. Extract of Hyoscyamus. கொள். பச்சையான அயசீயமசிலையும் இளங்கொப்புகளும் தூற்றுப் பன்னிரண்டு இராத்தல். குழியம்மியிற் துவைத்துச் சாற்றைப் பிழிந்து, மெல்ல மெல்ல 130 பாகை வரைக்குக் காய்ச்சி, கார்த்தம்புடவையில் வடித்துப் பச்சையான நிறப்பதார்த்தத்தை வேறாயெடுத்துக்கொள்ளவும். வடித்த நீரிலுள்ள அல்புமின்¹²உறையத்தக்கதாய் அதை 200 பாகை வரைக்குக் காய்ச்சி வடித்து, வடித்தநீர் மெல்லிய பாணியாய் வருந்தினையும் நீர்மத்திகத்தில் வறட்டி முன்னமே வேறாயெடுத்துவைத்திருந்த பச்சையான நிறப்பதார்த்தத்தையுங்கூட்டி முழுவதையுந் திறமாய்க் கலக்கி, அந்த எசிறுத்துக் குளிகைக்குத் தகுந்தபதமாய் வருந்தினையும் 140 பாகைக்கு மேற்படாத குட்டில் வறட்டவும்.

தேயம். ஐந்து முதற் பத்துக் கிறேன் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். வரு

1 Pupil. 2 Hyoscyamin. 3 Alkaloid, 4 Sedative, சாந்தனி. 5 Anodyne, அனுக்கினி. 6 Antispasmodic. 7 Hysteria. 8 Neuralgia. 9 Cancer. 10 Proof spirit. 11 Percolator. 12 Albumen.

(57) அனுபந்தம்பார்.

த்தமான நோய்கள் பலவற்றுக்கு இது நல்ல அணைப்பு. இதைக்கட்புருவத்திற் பூச அல்லது தண்ணீரிற் கரைத்துக் கண்ணுக்குள்ளே விட நயனைத்துவாரம் விரியும்.

[அயசியமசுக் கொட்டை, குராசானியோமம் என்ற நாமத்துடன் தென்னிந்துவின் கடைகளில் வரும். இது துருக்கைதேசத்திலிருந்து வருகிறதாம். விசாதம்¹ என்ற பைத்தியத்தில் மனதைச் சாந்தப்படுத்தி நித்திரையை வருவித்து மலமிளகச்செய்வதற்கு மகமதிய வைத்தியர் அதைக் கொடுப்பார்கள்.]

புகையிலை. TOBACCO.

வாசம். உஷ்டண அமரிகத்தில் இது உண்டாகும். பூமியின் உஷ்டண பகுதிகள் எங்கும் இது செய்கைபண்ணப்படும்.

வாகடபகுதி. காய்ந்த இலை. இது பருத்துப் புள்ளிவிழுந்து கருமைநிறமாயும் நீளவட்டமாய் நுனியிலொடுங்கியும் குறுஞ் சுணைகள் நிறைந்ததாயுமிருக்கும். ஒருவகையான கடுமணமும் உவட்டிப்பும் கார்ப்புமான கைச்சற்சுவையுமுடையது. பதாசி²நீரிற்போட்டுத் திஸ்திலிக்க³ ஓர் அல்கலை⁴நீர் பிறக்கும். அதின் மணம் நிகுசின்⁵ மணம்போன்றிருக்கும். பிலாடின துவிகுலோறிர⁶மும், மாசக்சாயிரஞ்ச⁷முங் கூட்ட அடையல் விழும். புகையிலையின் சத்து நிகுதின் என்ற நீர் அல்கலைவ⁸த்திலும் நிகுதியானின்⁹ என்ற அத்திர¹⁰ எண்ணெயிலுமே இருக்கும்.

தன்மை. வீரூன செரதீவ¹¹மும், அந்திஸ்பசி¹²யும். அதிதேயத்தில் மயக்கமுற்சி¹³ நஞ்சு.

உபயோகம். ஏர்ப்பு (58) வயிற்றுநீர்க்கோவை, ஸ்பசநோய்கள், சல அடைப்புகளுக்கு இது கொடுக்கப்படும். மேலுந் தசையை நுகையப்பண்ணி, இறுகினவள்¹³யைத் தள்ளிவிடுவதற்கும், விலகினபொருத்தை எடுத்துவிடுவதற்கும் இது துணையாகக் கொள்ளப்படும். ஆயினும் இதால் நரம்புமண்டலத்தில் அதி களையுண்டாவதால் உள்ளே கொடுக்கப்படுவதற்கு இது உவந்ததல்ல. மேலும், வாத வீக்கம், சிவ்விசு¹⁴ வீக்கம், சருமரோகங்களின் அழற்சியையும் வருத்தத்தையும் தணிப்பதற்கு இது அணைக்கப்படும். ஆயினும் இதை வழங்குவதற்கு இதின் நாற்றந் தடையாகும். இதிலும் நயந்த சமவீறுள்ள வேறு மருந்துகள் உண்டு. ஈளை, ஸ்பச இருமல், நரம்புமுற்சி நித்திரையின்மைகளில் புகையிலையைப்புகைப்பதால் சிலவேளை நயமுண்டாகும்.

ரசிதங்கள். புகையிலையேனிமம். Enema of Tobacco. கொள். புகையிலை, இருபது கிரேன்; கொதிநீர் எட்டு அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் அரைமணிநேரமுறவிட்டுச் சீலையில் வடிக்கவும்.

இறுகின வள்ளினோயிலும், வயிற்றிலுண்டாகும் ஸ்பச¹⁵நோய்களிலும், ஸ்பச சருக்காலுண்டான சல அடைப்பிலும் மாத்திரமே இது அரிதாய் வழங்கப்படும். வழங்கும்போது மெத்தக் கவனம்வேண்டும். தொடக்கத்திற் கிரேன் இருபதுக்குக் கூடக் கொடுக்கப்படாது.

1 Hypochondriasis. 2 Liquor potash, 3 Disti. 4 Alkali. 5 Nicotin. 6 Bichloride of platinum. 7 Tincture of galls. 8 Alkaloid. 9 Nicotianin.

10 Volatile. 11 Sedative. 12 Antispasmodic. 13 Strangulated hernia.

14 Syphilis. 15 Spasmodic.

(58) அனுபர்தம்பார்.

துல்சமாறம். DULCAMARA.

வாசம். இக்கொடி யுரோபத்திலும் மத்திம ஆசியத்திலும் உண்டாகும். வாகடபகுதி. காய்ந்த இளங் கொப்புகள். இலைகள் உதிர்ந்தபின் இவைகள் சேர்க்கப்படும். திரண்டு லேசாயும் உள்ளே குழாயாயும் தென்னீர்க்களவு பருமையாயுமிருக்கும். முதற் கசந்து பிறகு இனிக்கும்.

தன்மை. இது அல்திறவம்¹, அமுரிதி², சுவேதனி³யாகும்.

உபயோகம். காமாலைத் தேகத்தோடு சேர்ந்த சிவ்லிசு⁴க்கும் காலிகவா தத்துக்கும், விசேஷமாய்ச் சொரீயசி⁵, குஷ்டம், எக்ஸீம⁶ முதலிய அடங்கா த சருமரோகங்களுக்கு இது கொடுக்கப்படுமாயினும் நயஞ் சந்தேகம்.

ரசிதம். துல்சமாறவின்லூசம். Infusion of Dulcamara. கொள் துவைத்த துல்சமாறம். ஒரு அன்சு; கொதிநீர், பத்து அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் ஒரு மணிநேரமுறவிட்டுச் சீலையில் வடிக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு வரைக்கு நாள் மூன்று முறையும் நெருங்கியுங் கொடுக்கலாம்.

[பச்சையான நன்னூரிவேருள்ள இந்துதேச வைத்தியனுக்கு இச்சரக்குத் தேவையில்லை]

மிளகாய். CAPSICUM.

வாசம். பூமியின் உஷ்டணப்பகுதி எங்கும் இது உண்டாக்கப்படும்.

வாகடபகுதி. மிளகாய்ச் செத்தல். இது ஐந்து முதல் எட்டு லீன் நீளமும், இரண்டு லீன் பருமையுமானது; நேரியது; அடி விசாலமும் நுனிகுருமானது. அழுத்தமும் மினுக்கமுமாய்ச் சற்றே சுருக்குவிழுந்திருக்கும். தோல் சவ்வு போன்றது. வெண் சிவப்புநிறமும் கடுமையான கார்ப்புச்சுவையுமுடையது. இதின் சத்து கப்சிசின்⁸ என்ற ராஸப்⁹பதார்த்தத்திலேயே இருக்கும்.

தன்மை. கார்ப்பான ஸ்திமுலம்¹⁰, தானிகமாயிட்டால் ருபிவாஷன்¹¹.

உபயோகம். அசத்துவகுண்ம¹²த்திலும் நாறலான அல்லது சீரணியாத பதார்த்தம் குடலிலிருப்பதாலுண்டாகும் கழிச்சலிலும், பித்த சுரத்திற் தோன்றும் வார்த்தியிலும் இதால் நயங்காணுகின்றது. மேற்கிந்து தீவகளில் ஸ்காலதின¹³த்துக்கு இது பேர்பெற்றிருக்கின்றது. பலவகையான சைனன்சியென்ற தொண்டை நோயிலும் குரல்நாண்கள் இளகுவதைப்பற்றி யுண்டாகும் குரற்கம்மல் சுரலின்மைகளிலும் கார்ப்கில்களுக்கு இது நல்லகூட்டு. மிளகாய்ச் செத்தலைக் களியாய் அரைத்து எதிரழற்சியாயும் ருபிவாஷனாகவும் இட்டாற் சிக்கரத்திற் சேஷ்டிக்கும். கடுகுப்பற்றுக்குச் சேர்க்க அன்சு சத்து மெத்தக்கூடும்.

தேயம். ஒரு கிறேன் முதல் நாலுகிறேன் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். இதைத் தனியே கொடுப்பதரிது.

ரசிதங்கள். மிளகாயிரஞ்சம். Tincture of Capsicum. கொள். இடித்த மிளகாய்ச் செத்தல், முக்கால் அன்சு; திடடசீது அரைநாழி. அடை

1 Alterative, பரிணமி. 2 Diuretic, தியுரேசி. 3 Diaphoretic. 4 Syphilis. 5 Psoriasis. 6 Eczema. 7 Line. 8 Capsicine. 9 Resinous. 10 Stimulant, தீவனி. 11 Rubifacient, சேனனி. 12 Atonic. 13 Scarlatica.

த்த பாத்திரத்தில் மிளகாயைப் பதினைந்து அன்சு சீதில் இரண்டுநாளுறப் போட்டு இடைக்கிடை கலக்கவும். அப்பாற் சியந்தனியில் இட்டு அடைசி, நீர் ஒழுக்கித்தீர்ந்தபின் சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும் வார்த்து வடிய விடவும். அப்பாற் சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து நீர்களைக் கலந்து அரை நாழிக்குப் போய் திட்டசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். பத்து முதல் இருபது மினிம். ஸ்திமூல கார்டில்¹களுக்கும் மற்றவ் கார்டில்களுக்கும் இது நல்ல கூட்டு. உதாரணமாக மிளகாயிரஞ்சம் ஒருதிரும்; சிண்கனதிகாத்தம்², ஆறு அன்சு, கல.

அவாகடச் சரக்குகள். Non-Officinal.

மலையயசீயமஸ்பூடு. Hyoscyamus insanus. இது பெலுகிஸ்தானில் உண்டாகும் ஓர் பூடு. அங்கே இது குகீபுங்கு³ அல்லது மலைக்கஞ்சா⁴ என்று வழங்கும். இது வீரூன நஞ்சு. அமார்க்கமான பக்கிரிகள் இதைச் சுருக்கமாய்ப் புகைப்பார்களாம். கொலைக்கும் வழுங்கப்படுமாம். தொண்டை வரட்சியும் இறுக்கமும் வேகமான அலட்டுமே இதாலுண்டாகும் பிரதான குணங்கள். இந்தப் பூண்டையும் இதின் தன்மைகளையும் பற்றி இன்னும் அறிவது நலம்.

ஸ்கபோலிப்பூடு. Scopolia lurida. இது இமய மலையிலுள்ளது. 1824 ம் ஆண்டு யுரோபத்துக்குக் கொண்டுபோகப்பட்டு அங்கே தோட்டங்களில் உண்டாக்கப்படுகின்றது. வெண்பச்சை நிறமான இதின் இலைகள் புகை விலை மணமுடையன. கசக்கினால் மணம் அதிகம். ஒரு பங்கு இலையை எட்டுப்பங்கு அலக்கா⁵வில் ஊறப்போட்டுச் செய்த ரஞ்சு⁶த்தைச் சில நேர யாளருக்கு உள்ளே கொடுத்தபோது கண்ணின் நயனைத்துவாரம்⁷ மெத்தவிரிந்தது. இரண்டு பேருக்குச் குருடுண்டாகி, இந்த மருந்தை நிறுத்த மாறிப் போயிற்று. ரஞ்சத்தில் இருபது துளியே ஒரு நாள்வரையிற் கொடுக்கப்பட்ட பெருந்தேயம். இதைப்பற்றிய ஆராய்வு இன்னும் வேண்டும்.

கண்டங்கத்தரி. Solanum Jacquini. இது இந்துக்களுக்குள்ளே அதிகீர்த்திபெற்ற மருந்துப்பூடுகளுள் ஒன்று. எக்ஸ்பெக்தரம்⁸, அமுரிதி⁹, முதலிய தன்மைகள் இதற்குண்டாம். கதார்¹⁰ காய்ச்சல் நோய்களுக்கும், ஈளை, கசம் முதலியவற்றுக்கும் அதிகமாய்க் கொடுக்கப்படும். வில்சன் பண்டிதர் சொல்லியிருக்கிறபடி இதின் பூ, காய், தண்டுகள் எல்லாம் கைப்புள்ளனவன்றி காமினதியுமாம். நீர்ப்பருவோடு கூடிய கால் எரிவுக்கு இது கொடுக்கப்படுகிறது. இதின் கொட்டையை எரித்துக் காட்டிம்புகை பற்கொதியை மாற்றமென்று பெருங் கீர்த்தியாய்ப் பேசப்படுகிறது. சுதேசிகள் இதை வழங்கும் முறையைப்பற்றி மூறெட்டு வைத்தியர் விபரமாய்ச் சொல்லியிருக்கிறார். இது உமிழ்நீரை அதிகமாய்ப் பெருகப்பண்ணிப் பற்கொதியைத் தணிக்கிறதுபோலும்.

கறுப்புமணத்தக்காளி. Solanum nigrum. இப்பூண்டின் இலையிற் செய்த திகாத்தத்தையும் நீரெசுருத்தையும் பற்றி முடின்செநீவு பேசியிருக்கிறார். நீரெசுருத்தைத் திரும் தேயத்தில் நாள்மூன்றுமுறையாக நீர்க்கோவைநோய்களுக்குக் கொடுத்து நயங்கண்டதாம். இதின் செயல் அமுரிதியும் வீரேசனியுமே. சோலானவிஞ்சேட்டப்பூடு, Solanum incertum.

1 Gargle. 2 Decoction of Cinchona. 3 Koli-bung. 4 Mountain hemp. 5 Alcohol. 6 Tincture. 7 Pupil. 8 Expectorant, 9 Diuretic. 10 Catarrh.

இதின் இலைச்சாறு குழந்தைகளின் அக்ரத்துக்கு உத்தமமான மருந்தென்ற சாற்று வைத்தியர் சொல்லியிருக்கிறார். சொலானப்பூண்டிலே முள்ளி S. Indicum, தூதுளை S. Trilobatum, மலைக்கண்டை S. Verbascifolium, ஆனைச்சுண்டை S. Ferox. என்று வேறுஞ் சில இனங்களைச் சுதேசிகள் மருந்தாக வழங்குகிறார்களென்று, என்ஸலி. துறுறி முதலியவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஆயினும் இவைகள் முக்கியமானவைகளல்ல.

புனீர்ச்செடி. *Withania coagulans*. இது பெலுக்கிஸ்தானிலும் சிந்துவிலும் மேட்டுநிலங்களில் வழக்கமாயுள்ள சிறுச்செடி. அங்கே இது புனீர்¹ என்று சொல்லப்படும். இது கற்றைகளாக இருக்கிற நுண்ணிய புள்ளடிச்சாங்கமான மயிரால் மூடப்பட்டிருக்கும். முழுச்செடிக்கும் இச்சாம்பல் நரைநிற மயிர் போர்வையாகும். இந்தச் சாம்பல்நிறத்தினால் செடியைத் தூரத்தில்நின்று மட்டிடலாம். இளந் தளிர்களோ நீலநிறமாய்த் தோற்றும். செடியின் எப்பகுதியிலாவது பச்சைநிறந் தோற்றாது. பழங் கபிலமும் மினுக்கமுமானது. பச்சையாயிருக்கையில் அது வாந்திமருந்தாக வழங்கப்படும். காய்ந்த வற்றல்கள் சிந்துவின் கடைகளில் புனீரேலம்² என்னும் பேரோடு விலைப்படும். அரபி பார்சிய பதார்த்தசார ஆக்கியோர்க்கிஞ்சு³ என்று சொல்லியிருப்பது இதைத்தானென்று ஸ்தாக்க வைத்தியர் எண்ணுகிறார். இந்த வற்றல்கள் அசீரணத்துக்கும் வாயுக்குத்துக்கும் குடலின் மற்றும் வியாதிகளுக்கும் வழங்கப்பட்டு சிந்து, பெலுக்கிஸ்தான், அபுகானிஸ்தான்களில் வெகு கீர்த்திபெற்றன. இதைத் தனியாவது சிந்துவிலுள்ள உத்தமமான கைப்புத்தொணிகமான ராசையதாவரத்தின் இலைகள் தளிர்களோடாவது ஊறப்போட்டு இன்ஞசமாக்கிக் கொடுப்பார்கள். பழவற்றல்கள் பெலுக்கிஸ்தான், அபுகானிஸ்தான் அடங்கலும் மிகுதியாய்ப் பாலை உறையப்பண்ணும் பிரையாக வழங்கப்படும்.

அமுக்கிரா. *Withania somnifera*. இது இந்துவின் மிகுதியான பகுதிகளிலுள்ள பூடு. இதற்கு நாகதிக⁴ அமுரிதி⁵ முதலிய தன்மைகள் உண்டென்பார்கள். இதின் கிழங்கு தென்னிந்துவில் அமுலங்கிழங்கு என்று விலைப்படும். இது ஜென்சீனின் தோற்றமுடையது. ஆயினும் இதற்குச் சுவை மணம் மெத்த இல்லை. கிழங்கைத் தண்ணீர் விட்டு அரைத்தும் இலையைத் துவைத்தும் பிளவை, புண்கள், நோவான வீக்கங்களுக்கு அப்புவார்கள். வாத நோய்களுக்கும் வாயுப்பொருமலோடுகூடிய குன்மத்துக்கும் இக்கிழங்கு நல்லதென்பது ராசபுத்தர்களுடைய எண்ணம். இக்கிழங்கு கனலானதென்றும், விசர்க்கங்கள் எல்லாவற்றையும் அதிகப்படுத்தக்கூடியதென்றும் மேலே சொன்னவைகளை ஆராய்ந்தெழுதின ஏர்வின் பண்டிதர்தாமே இதைப்பற்றிச் சொல்லியிருக்கிறார். இது விசேஷமாய்ப் பிருக்கங்க⁷ளை அருட்டிவிடுமாம். ஆயினும் தாம் பரீட்சித்த அளவில், இதின் அமுரிதித்தன்மை மெத்தவல்லவென்று அஸ்வல்டி பண்டிதர் சொல்லியிருக்கிறார்.

1 Punir, 2 Punir Cardamoms, 3 Kakinj, 4 Narcotic, 5 Diuretic, 6 Gentian, 7 Kidneys.

பிளந்தச்சினியங்கள்,

PLANTAGINEAE.

*இஸ்பகூல்ச்சேடி. ISPAGHUL.

வாகம். பார்சியம்; இந்துவிலும் செய்யப்படும்.

வாகடபகுதி. விரை. இது நீள வட்டமும், கவிவும், அரைக்கால் இஞ்சு நீளமும், சாம்பல்நிறமுமானது. தண்ணீரில் போடச் சுவையற்ற பாணியை அதிகமாய்க் கக்கும்.

தன்மை. திமல்சம்¹, சொற்ப துவர்.

உபயோகம். சுரநோய்கள், கதார்²நோய்கள், பிருக்க³ நோய்களுக்கு இது உதவும். ஆயினும் தியறீயம்⁴, திசந்தெரி⁵களுக்கு இது உவப்பானது. இந்தக் கொட்டையை இடித்துத் தண்ணீரில் குழைத்தால் சாந்தமான நல்ல களியாகும்.

தேயம். இரண்டு மூன்று திரும்.

ரசிதம். இஸ்பகூல்த்திகாத்தம். Decoction of Ispaghul. கொள், இஸ்பகூல் விரை, இடித்து இரண்டு திரும்; தண்ணீர் அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்திற் பத்துமினி வரைக்கு அவித்துச் சீலையில் வடிக்கவும்.

தேயம். இரண்டு முதல் நாலு அன்சு வரைக்கு நாள் மூன்று நாலுமுறை கொடுக்கலாம்.

[கதார் நோய்கள் பிருக்க நோய்களுக்கு இந்தத் திகாத்தம்⁶ உவந்தது. தியறீயம், திசந்தெரிகளுக்கோ, காலஞ்சென்றுபோன துவைனிங்கு என்பவரார் சொல்லப்பட்ட பின்வருமுறை நயந்தது. அவர் சொல்வதாவது; வெகு காலமாக இந்துவில் வசித்த யுரோபருக்கு உண்டாகுங் காலிக⁷தியறீயத்துக்கு திமல்சங்களும் அவைக்குப் பின் மெல்லிய தொணிகங்க⁸ளும் கொடுப்பதால் நயங்காணும். இதற்கு மற்றெந்த மருந்தைப்பார்க்க இஸ்பகூல் விரை உத்தமம். வளர்ந்தவர்களுக்கு இதில் இரண்டரைத்திரும்மை அரைத்திரும் கற்கண்டோடு கலந்து கொடுப்பதே தேயம். இந்தக் கொட்டைகளை முழுதாயும் விழுங்கலாம். அவை குடல்நெடுகச் செல்லுகையில் தண்ணீரை உறிஞ்சிப் பொருமிக் குடலின் நடுப்பகுதி கீழ்ப்பகுதிகளுக்குச் செல்லுகையில் ஓர் பாணியைக் கக்கும். இறுதியிற் செல்லும்வரைக்கும் பிசுபிசுப்புத் தன்மையுள்ளவைகளாகவே இருக்கும். கழிச்சலின் நெருக்கத்தை அனுடைன்⁹எனீமத்¹⁰தாலும் உணவைச் சொற்பமாய்க் கொடுப்பதாலும் மறித்துக்கொண்டால் இந்தக் கொட்டைகளின் பாணித்தன்மை திறமாய்த் தெரியும். சொற்பமாய்க் கருக வறுப்பதால் இவை சற்றே துவர்த் தன்மையும்தொணிகத்தன்மையுமடையுமாம். யுரோபருக்கும் சுதேச பிள்ளைகளுக்குமுண்டாகும் நெடுகின கழிச்சலில் வேறனேக மருந்துகள் வாயாமற்போக இந்த மருந்தாற் சிலவேளை சுகமுண்டாகும்.

1 Demulcent. 2 Catarrh. 3 Kidney. 4 Diarrhoea. 5 Dysentery. 6 Decoction. 7 Chronic. 8 Tonic. 9 Anodyne. 10 Enema.

வைதுலக்காசியங்கள்.

PHYTOLACCACEAE.

அவாகடச்சாக்குகள். Non-Officinal.

மணற்கீரை. *Gisekia pharnaceoides*. இது இந்துவின் மழை ஒறுத்த பகுதிகளிற் கருநாடகந் தொடங்கிப் பஞ்சாப்பு, அயோத்தி வரைக்கு முள் ள பூண்டு. இது தீனிய¹ப்புழுவைக் கொல்ல நல்ல மருந்தென்று கற்பித்தா ன் லவுதர் கண்டறிவித்தார். இலை குழை காய் சமூலத்திலும் பச்சையாய் ஒரு அன்சு எடுத்துப் பானமாய் வரக்கூடிய அளவு தண்ணீர் விட்டு அரை த்துக் கொடுக்கட்டாம். இதை நாலுநாளுக்கொருதரம் மூன்று முறையாக வெறுவயிற்றிற் கொடுக்கவேணும். இதை லவுதர் கற்பித்தான் மெத்த மதிக் கிரார். ஆயினும் இதின் தன்மையைப்பற்றி வைத்தியசாட்சி இன்னும் அக ப்படவில்லை.

சல்கலாசியங்கள்.

SALSOLACEAE.

அவாகடச் சரக்குகள். Non-Officinal.

பேருமரி. *Salicornia Indica*. சிற்றுமரி. *S. Brachiata*. நீருமரி. *Suaeda nudiflora*. இப்பூண்டுகள் இந்துவின் கடற்கரைகளில் மிகுதி யாயுண்டு. இவற்றை எரிக்க,பரில்லம்² என்ற அசுத்தமான சோடம்³ அதிக அளவாய் வரும். இது உலகம் முழுவதற்கும் சவுக்காரமும் கண்ணாடியும் செய்யப் போதியதென்பது ரோயில் என்பவரது எண்ணம். ஆயினும் இந் துவிற் செய்த பரில்லமானது மலிவில் யுரோபத்திற் செய்ததற்குச் சரிநிற்ரு மோவென்பதைப்பற்றி ஒஷானசி பண்டிதர் சந்தேகிக்கிரார். கார்சுசி Khar suji என்ற பேருடைய ஓர் அசுத்த சோடமானது சிந்துவிலிருந்து வந்து ச வுக்காரம் கண்ணாடிகள் செய்வதில் வழங்கப்படுகிறதென்றும் கழலைகள் வ ற்றும்படி பூச்சுமருந்தாய் இடப்படுகிறதென்றும் ஏர்வின் எழுதின பதார்த்த சாரத்தில் சொல்லப்பட்டது. இது நிலவுமரி⁴ப் பூண்டிலிருந்து எடுபடுமாம். சாசிமித்தி Sajji-mati என்று இந்துக் கடைகளில் விலைப்படும் அசுத்தமா ன சோடத்தின் மிகுதியான பங்கு வங்காளத்தின் சில பகுதிகளில் அதிக மாய் எடுக்கப்படுகிற மினிறற்⁵ பதார்த்தமேயாகும்.

அமரந்தாசியங்கள்.

AMARANTACEAE.

அவாகடச் சாக்குகள். Non-Officinal.

முட்கீரை. *Amarantus spinosus*. இதுவும் நுதீயம்⁶என்ற தொகுதிப் பேருள்ளடங்கிய வேறினங்களும் பாணித்தன்மையுடையவைகள். இலை

1 Taenia. 2 Barilla. 3 Soda. 4 Salsola Indica. 5 Mineral. 6 Nutiya.

யைத் துவைத்துண்டாக்கின களி வங்காள சிகிச்சா வாகடத்துக் குரியதாகும். வேறனேக இமாலிய¹ங்களுக்கு இது குறைந்ததாகையால் அவசியமானதல்ல. மொதீசத் தீவில் இவ்விலைகள் வேரின் திகாக்தம்² அமுரிதி³யாக உள்ளே கொடுக்கப்படும்.

நாயுருவி. *Achyranthes aspera*. இது இந்துவின் மிகுதியான பருதிகளில் உள்ள பூண்டு. துவர்த்தன்மை அமுரிதித்தன்மை இதற்குண்டாம். துவராக இது மெனுறீயம்⁴ தியறீயங்க⁵ளுக்குச் சித்தியோடு வழங்கப்பட்டாலும் இதின் நயத்தைப்பற்றி மெத்தத் தெரியாது. இதின் அமுரிதித்தன்மையைப்பற்றிக் காணிஷ்வைத்தியர் சார்பாகச் சொல்லியிருக்கிறார். அவர் வாரிங்கு பண்டிதருக்கு எழுதின கடிதத்திற் தாம் இதை நீர்க்கோவைக்கு அதிகமாய் வழங்கி மெத்த நயங்கண்டோமென்று சொல்லியிருக்கிறார். சிமிது, சாற்று என்ற வைத்தியர்களும், கனிலல்டே முதலியவர்களும் எழுதின எழுத்துக்களிலும் நீர்க்கோவைக்கு இது நயமானதாகக் கண்டிருக்கிறது. பச்சைப்பூண்டில் இரண்டு அன்சை முக்கால் நாழி வெந்நீரிற் போட்டு அரைநாழியாய் உருந்தனையும் வற்றக் காய்ச்சிச் சீலையில் வடித்து இரண்டு அன்சு அல்லது கூடிய தேயமாகச் சிறுநீர் கதிக்குந்தனையும் கொடுப்பதே முறை. முழுப்பூண்டையும் எரித்துச் சாம்பலாக்கினால் அதிகமான பதாசிவரும். ஆகையால் இச்சாம்பல் சீலவெளுப்பில் வழங்கப்படுவதையீட்டுச் சமஸ்கிருதத்தில் அபாமார்க்கம் என்றபெயர் இதற்குண்டு. இந்தச் சாம்பலைச் சுக்குக் கஷாயத்தோடு சேர்த்தால் நீர்க்கோவை நோய்களுக்கு நல்லதென்று மதிக்கப்படும். பூக்கும் கதிர் மட்டைத்தேளைச் சோரப்பண்ணுமென்றும் அதற்குக் காவலாகுமென்றும் அயோத்தியிலும் இந்துவின் மற்றும் பருதிகளிலும் பேசிக்கொள்வார்கள். தேள் பாம்பு முதலிய விஷமுள்ள செந்துகளின் கடிக்கும் இது மாற்றுமருந்தென்றும் நம்பிக்கை உண்டு. தேட்கடிக்கு இதைப் பூசி மாற்றினோமென்று சாற்று வைத்தியர் சொல்லியிருக்கிறார். பாம்புகடிக்கும் இது மருந்தாகுமென்று தேணர் வைத்தியர் சொன்னார்.

நிக்தச்சினாசியங்கள்.

NYCTAGINACEAE.

அவாகடச்சரக்குகள். Non-Officinal.

பத்தருசு. *Mirabilis Jalapa*. இந்தப் பூண்டு இந்தவடங்கலுந் தோட்டங்களிற் செய்யப்படும். நாலு மணி நேரத்தில் பூ மலருகிறபடியால் நாலு மணிப்பூ எனப்படும். வியாபாரத்தில் வரும் ஜலப்பு⁶ இதிலெடுக்கப்படுவதென்று முன்னே எண்ணியிருந்தும் அந்த எண்ணம் இப்போ தள்ளப்பட்டது. இதின் கிழங்கு சாந்தியான நல்ல விரேசனி, ஜலப்புக்குச் சரியானதென்று தலீச்செறிவிற சொல்லப்பட்டது. குல்பெறட்டு, அந்தர், என்ஸ்லி, ஓஷானசி பண்டிதர்கள் இதைக் கொடுத்துச் சொதித்தவரையில்

1 Emollient. 2 Decoction. 3 Diuretic. 4 Menorrhoea, 5 Diarrhoea. 6 Potash. 7 Jalap.

விரேசனிச்செயல் இதற்கில்லையென்றும் இது பின் ஏதுக்குங் கூடியதல்ல வென்றுங் கண்டார்கள். கட்டுகள், விப்புருதி¹களை நெக்கப்பண்ணுவதற் குச் சுதேசிகள் இதின் இலையைத் துவைத்து அணைப்பார்கள். ஒருமுறை ஓர்துரைசாணி சுதேசியொருவனுடைய புத்திப்படி இந்த இலையைத் துவைத் ததுக் கட்டுக்கு அணைத்ததால் வருத்தமும் தாபித²மும் அதிகரித்ததை வாறி ங்கு பண்டிதர் கண்டார்.

மூக்குரட்டை. *Boerhaavia diffusa*. இது இந்துவடங்கலுமுள்ள செ டி. இது நல்ல ஏக்ஸ்பெக்துற³மென்றும், சிலவேளைகளில் ஈளைக்குக் கொடு த்து நயங்கண்டேனென்றும் உதவிச்சத்திரீகன் சட்டசீ எழுதியிருக்கிறார். அவர் இதைத் தூளாகவும் திகாசத்⁴மாகவும் இன்வூச⁵மாகவும் வழங்கினார். தேயங்கள் வீதங்களோ சொல்லப்படவில்லை. அதிகமாய் உட்கொண்டா ல் வாந்திக்கும்.

பொலிக்கஞ்சியங்கள்.

POLYGONACEAE.

வரியாத்து. RHEUM. RHUBARB.

வாசம். இது திபேத்து தாத்தாரி தேசங்களில் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. தோலுரித்துக் காய்ந்தகிழங்கு. இது சதுரமான திரண்ட துண்டுகளாக, சீனத்திபேத்து, தாத்தாரி தேசங்களிலிருந்து யுரோபத்துக்கு ஏ ற்றப்படும். பெரும்பாலும் ஒரு துளையுள்ளதாயிருக்கும். வெளியில் மஞ்ச ள்நிறம், உள்ளே நரையுஞ் சிவப்புமான நுண்ணிய வரிகள் தோன்றும். கடிக்க நுண்ணிய மணலுள்ளதுபோற் கறகறக்கும். சொற்ப கயர்ப்பான சுகந்த சுவையும் சுய மணமுமுடையது. உக்கியாவது, பூச்சிபரித்தாவது இராது. மஞ்சளான வெளிப்பகுதியைப் பொறசிக்கமில்⁶ கபிலமாக்கமா ட்டாது. இக்கிழங்கு தனக்கே யுரிய ரீயின்⁷ என்ற தடஸ்த⁸ பதார்த்தத்தை யும் தனிக்கமில்⁹ கலிக்கமில்¹⁰ளையும் கைப்பான ஓர்எசுருத்திவை¹¹யும் அடக்கியிருக்கும். இவைகளுள் முதலாவது இதின் சத்து என்றெண்ண ப்பட்டது.

தன்மை. முதலாவதாய் சாந்தியான நல்ல பேதி. இரண்டாவதாய்த் து வர். சிறுதேயத்தில் ஸ்தோமாகி¹²யுந் துவருமாகும்.

உபயோகம். இது சாந்தமான செயலுள்ளதாகையால் பிள்ளைகள் குரத்த ப்¹³பெண்கள் குவாதரோ¹⁴கள், பிரசவஸ்திரிகளுக்குண்டாகும் மலவரட்சி க்கு மெத்த உவந்தது. சீரணியாத உணவு அல்லது அழற்றுமுணவு குட லிலிருப்பதால் உண்டான கழிச்சலுக்கு இது உச்சிதமானது. சிலவகை யான குண்மத்துக்கு இதைத் தனித்தாவது வேறு மருந்துகளோடு கலந்தாவது கொடுப்பது அதிக உபயோகமாகும்.

1 Abscess. 2 Inflammation. 3 Expectorant. 4 Decoction. 5 Infusion,
6 Boracic acid. 7 Rheine. 8 Neutral. 9 Tannic acid. 10 Gallie.
11 Extractive, 12 Stomachic, 13 Anaemia. 14 Gout.

தேயம். விரேசனியாக இருபது முதல் நாற்பது கிரேன் வரைக்கும் ஸ்தொமாகியாக மூன்றுமுதல் எட்டுக் கிரேன் வரைக்குங்கொடுக்கவும்.

ரசிதங்கள். Preparations. வரியாத்தின்வூசம். Infusion of Rhubarb. கொள். வரியாத்துக் கிழங்கு மெல்லிய சீவலாக, கால் அன்சு; கொதிநீர், பத்து அன்சு; மூடிய பாத்திரத்தில் ஒரு மணிநேரமுறவிட்டுச் சீலையில் வடிக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு.

வரியாத்தேசிறுத்து. Extract of Rhubarb. கொள். சீவிய அல்லது இடித்த வரியாத்துக்கிழங்கு, ஒரு இறுத்தல்; திட்டசீது². பத்து அன்சு; திஸ்திலித்த³தண்ணீர், இரண்டரைநாழி. சீதையுந் தண்ணீரையுங் கலந்து, அக்கலவைநீரிலே வரியாத்தை நாலுநாளுறவிட்டுத் தெளித்துப் பிழிந்து கரைவாய் பதார்த்தம் அடையத்தக்கதாய் நிற்கவிடவும். தெளிந்த நீரை இறுத்துச் சேஷத்தை வடித்து, நீர்களைக் கலந்து, குளிகைக்குத் தகுந்த பதமாய்வருமட்டும் 160 பாகைக்கு மேற்படாத குடுள்ள நீர்மத்திக⁴த்தில் வறட்டவும்.

தேயம். ஸ்தொமாகியாக மூன்று முதல் எட்டுக் கிரேன் வரைக்கும். விரேசனியாக பத்து முதல் இருபது கிரேன் வரைக்குங் கொடுக்கலாம்.

வரியாத்திரஞ்சம். Tincture of Rhubarb. கொள். வரியாத்துக்கிழங்கு பருக்கன்பொடியாக இரண்டு அன்சு; கோதுரித்து இடித்த ஏலக்கொட்டை⁵, இடித்த மல்லி⁶, குங்குமப்பூ⁷, வகைக்குக் கால்அன்சு; புருவுசீது⁸ அரைநாழி. இடித்த உரமான சரக்குகளெல்லாவற்றையும் மூடிய பாத்திரத்திலே, பதினேந்து அன்சு சீதில் இரண்டுநாளுறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கவும். அப்பாற் சியந்தனியில்இட்டு அடைசி, நீர் ஒழுகினபின், சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும் வார்த்து வடியவிடவும். அப்பாற் சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து, நீர்களைக் கூட்டி, அரைநாழி தேறப் புருவுசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். ஸ்தொமாகியாக ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திரும் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். விரேசன பானங்களுக்கு இது நல்ல அனுபானம்.

வரியாத்துவைன். Wine of Rhubarb. கொள். வரியாத்துக்கிழங்கு பருக்கன்தூளாக, ஒன்றரை அன்சு; வெண்கனெலப்பட்டை¹⁰ பருக்கன் தூளாக, அறுபது கிரேன்; செரிவைன்¹¹, அரைநாழி. அடைத்த பாத்திரத்தில் ஏழுநாளுறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கி அப்பாற் சீலையில் வடித்துப் பிழிந்து கடுதாசியில்வடித்து அரைநாழிக்குப்போதிய செரிவைன்சேர்க்கவும்.

தேயம். ஒரு திரும் முதல் இரண்டுதிரும்.

வரியாத்துச் சிறுபம். Syrup of Rhubarb கொள். வரியாத்துக் கிழங்கு பருக்கன்தூளாக, மல்லி பருக்கன்தூளாக, வகைக்கு இரண்டு அன்சு; சுத்த சர்க்கரை இருபத்துநாலு அன்சு; திட்டசீது எட்டுஅன்சு; திஸ்திலித்த தண்ணீர் இருபத்துநாலு அன்சு. வரியாத்தையும் மல்லியையுங் கலந்து சியந்தனியில் அடைசி. முன்னமே ஒன்றாகக் கலந்த தண்ணீரையுஞ் சீதையும் அதின்மேல் வார்த்தொழுகவிடவும். இப்படி ஒழுகின நீரைப் பதின்மூன்று அன்சாய் வற்றப்பண்ணி வடித்தபின் அதிலே சர்க்கரையை மென்சூட்டிற் கரைக்கவும்.

1 Stomachic. 2 Rectified Spirit. 3 Distilled water. 4 Water-Bath. 5 Cardamoms. 6 Coriander. 7 Saffron. 8 Proof-spirit. 9 Percolator.

10 Canella bark. 11 Sherry wine,

தேயம். ஒரு திரும் முதல் நாலுதிரும்.

வரியாத்துக்கூட்டுக்குளிகை. Compound Rhubarb Pill. கொள். வரியாத்துக் கிழங்குமா, மூன்று அன்சு; சொகோத்திரசகை¹, மாவாக, இரண்டே கால் அன்சு; சசம்², வன்சபு³, மாவாக வகைக்கு ஒன்றரை அன்சு; பெப்பமிந்துத்⁴ தேல் ஒன்றரைத்திரும்; இக்குப்பாணி⁵ நிறைப்படி நாலு அன்சு. மாக்களைத் தேலோடு கலந்து, அப்பால் இக்குப்பாணியைக் கூட்டி முழுவதையும் ஒரே சரியான திரளையாக்கவும்.

தேயம். ஐந்து முதற் பத்துக்கிறேன்.

வரியாத்துக்கூட்டுக் குரணம். Compound Powder of Rhubarb. கொள். வரியாத்துமா இரண்டு அன்சு; அபாரமக்னிசி⁶, ஆறு அன்சு; குக்குமா⁷, ஒரு அன்சு. திறமாய்க் கலந்து மெல்லிய அரிப்பெட்டியில் அரித்துக்கொள்ளவும்.

தேயம். வளர்ந்தோருக்கு இருபது முதல் அறுபது கிறேன் வரைக்கு பிள்ளைகளுக்கு ஐந்து முதற் பத்துக் கிறேன் வரைக்கு. இந்த மருந்து வீட்டு வைத்தியத்திற் “கிரெக்குரிச்சுரணம்” என்ற நாமத்தோடு வெருகாலமாகக் கீர்த்திபெற்றது.

அவாகடச்சாக்கு. Non-Officinal.

இமயவரியாத்து. Himalayan Rhubarb. இமயத்தின் உயர்ந்தபகுதிகளில் உண்டாகிற எமோதியவரியாத்து Rheum Emodi மூர்குரோவ்வரியாத்து R. Moorcroftianum வெபுவரியாத்து R. Webbianum என்ற இனமான பூண்டுகளின் கிழங்கே இப்பேரிலடங்கிய மிகுதியானபங்கு. இவ்வினங்களெல்லாம் பரிது சிறிது என இரண்டாய் வகுக்கப்படும். 1 பரிது. சுருக்கு விழுந்து பல பருமையுஞ் சாங்கமுமாய்த் திருகின அல்லது திரண்ட துண்டுகளாக வரும். தலைப்பிற் சாய்வாய் வெட்டப்பட்டிருக்கும். ஏறக்குறைய நாலு இஞ்சு நீளமும், ஒன்றரை இஞ்சு பருமையுமானது. கருங் கபிலநிறமும் சொற்ப அளவாய் வரியாத்தின் மணமும் கைப்பான துவர்ச்சுவையுமுடையது. தன்மையில் மெதுவும் விகட⁸முமானது. முறித்தால் வரியாத்துக்குரிய வரிகள் தோற்றுவதில்லை. மாவாக்குவது வில்லங்கம். இதின் மா மங்கற்கபிலமான மஞ்சள் நிறமுடையது. 2 சிறிது, குறுத்த துண்டுகளாக வரும். கருங் கபிலநிறமானது. ஏறக்குறைய மணமற்றது. மெத்தக கைப்பான துவர்ச்சுவையுள்ளது. இரண்டு இனங்களும் இலட்சணங்களில் மெத்த விகற்பமுள்ளன. இந்தக் கிழங்கை ரோயில் பண்டிதரும் துவைனிங்கு பண்டிதருஞ் சோதித்தவரையில் கண்ட பேறுகள் திருத்தியானவைகள். ஸ்தொமாகித் தொணிக⁹மாக இது இறக்குமதியான வரியாத்திலுந்திறமென்றது துவைனிங்கு பண்டிதர் எண்ணமாயினும் பிந்தின சோதனைகளோ இவ்வெண்ணத்தை உறுதிப்படுத்தவில்லை. கடைகளில் விலைப்படும் நாட்டு வரியாத்தைப் பார்க்கப் பிறவூரால் ஏற்றிவரும் வரியாத்தே உத்தமமென்பது இவற்றைப்பற்றி இந்துவிவிருந்தெழுதப்பட்ட எழுத்துகளின் பொழிப்பாம். இமயவரியாத்தைப் பற்றி நயப்பான காரியங்களை எழுதியிருக்கிற கிளேகாண் என்பவர் நாட்டுக்கு வருகிற கிழங்கு

1 Socotrine Aloes. 2 Myrrh. 3 Hard soap. 4 Oil of Peppermint. 5 Treacle, தேய்கம். 6 Light Magnesia. 7 Ginger powder. 8 Radiate. 9 Stomachic Tonic.

கீழ்த்தரமானதென்றும், புதுக் கிழங்கைத் தாம்சோதித்தவரையில் அதின் செயல் ருசிய வரியாத்தின் செயல்போலிருந்ததென்றுஞ் சொல்லுகிறார். இமயவரியாத்தைக் கவனமாய்ச் செய்கைபண்ணினால் சீன, துருக்க வரியாத்துக்குச் சரியான நயந்த கிழங்கு எடுக்கலாமென்று நம்ப நியாயமுண்டு.

தைமேலாசியங்கள்.

THYMELACEAE.

மேசீரியம். MEZEREUM.

வாசம். யுரோபம்.

வாகடபகுதி. காய்ந்த பட்டை. இது பல நீளமுள்ள கீலங்கள் அல்லது சுருள்களாக வரும். உரப்பானது, வசையத்தக்கது, சிராயுள்ளது, வெளியிற் கபிலநிறம்; உள்ளே வெண்மை. சற்றே உவட்டுமணமும், காரமர்ன உறைத்த சுவையுமுடையது. இதின் சத்து அதின்கார்ப்பான ஓர் ராஸ¹த்திலும், அத்சிரதேலி²லும் இருக்கும். இவற்றுடன் தவ்னியம்³ என்ற தடஸ்த⁴மான கிரிஸ்தம்⁵ பதார்த்தமும் இதில் அடங்கியிருக்கும்.

தன்மை. ஸ்திமுலம்⁶, சுவேதனி⁷, அமுரிதி⁸. தோலில் அணைத்தால் ருபிவாஷ⁹னும், வெசிக¹⁰னுமாகும். வெசிகளைக் கொப்புளங்கொள்ளப்பண்ணுவதற்கு இப்பட்டையைச் சூடான வின்றிரியிற் போட்டு இளக்கித் தோலோடணைத்துக் கட்டவேண்டும். கொப்புளித்த புண்ணைப் பரிகரிப்பதில் இது சபீனவன்கெ¹¹னுக்குப் பதிலாகுமென்றுஞ் சொல்லப்பட்டது.

உபயோகம். சிவ்லிசு¹²நோய்கள், வாதநோய்களுக்கும், பலவகையான சருமநோய்களுக்கும் இது வழங்கப்பட்டது. நயமோ சந்தேகம்.

தேயம். பத்துப் பன்னிரண்டு கிறேனை இன்வூசு¹³மாக்கி, நாள் இரண்டு மூன்று முறை கொடுக்கலாம். ஆயினும் இது தனியே கொடுக்கப்படுவதரிது, சார்சு¹⁴கூட்டுத் திகாத்தத்தில் இது ஓர் கூறுகின்றது.

1 சிதங்கள். Preparations. மேசீரியவீதரசெறத்து. Ethereal Extract of Mezereum. கொள். மெசீரிய பட்டை, நறுக்கி, ஒரு இரூத்தல்; திட்ட சீது¹⁵நாலு நாழி; ஈதர்¹⁶ அரைநாழி. மெசீரிய பட்டையை மூன்று நாழி சீதில் மூன்றுநாள் ஊறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கிச் சீலையில் வடித்துப் பிழியவும். சக்கைக்குச் சேஷமான சீதைவிட்டுத் திரும்பவும் இடைக்கிடை குலுக்கி மூன்றுநாள் ஊறவிட்டுச் சீலையில் வடித்துப் பிழியவும். வடித்த நீர்களைக்கலந்து திஸ்திலித்து¹⁷, சீதில் மிகுதியான பங்கைச் சேர்க்கவும். சேஷத்தை மெல்லிய எசிருத்தாய் வறட்டி, அடைத்தவோர் பாத்திரத்திலிட்டு அத்துடன் ஈதர் சேர்த்து, இடைக்கிடைகலக்கி, ஒருநாளுறவிட்டு

1 Resin. 2 Volatile oil. 3 Daphnea. 4 Neutral. 5 Crystal. 6 Stimulant.

7 Diaphoretic. 8 Diuretic. 9 Rubefacient, சோணதி. 10 Vesicant, விஷபொடி.

11 Unguentum Sabinae. 12 Syphilis. 13 Infusion 14 Sarsae,

15 Rectified spirit. 16 Ether. 17 Distil.

இந்த ஈதர்விலயனத்தை இறுத்துத் திஸ்திலிப்பதால் ஈதரிற் சேர்க்கக்கூடிய பங்கைச் சேர்த்துச் சேஷத்தை மெல்லிய எசிரூத்தாய் வறட்டிக்கொள்ளவும்.

இதை மேனியிற் பூச அழற்றும். இது கடுகுக்கூட்டு வினிமெனில் ஓர் கூறுகச் சேருகின்றது.

மைறிஸ்திசியங்கள்.

MYRISTICAE.

சிடமரம். NUTMEG TREE.

வாசம். இது மொலக்கத்தில் உள்ளது. மலாயநாடு, இலங்கை, மலையாளம் முதலிய பகுதிகளிலும், உஷ்டண அமரிகத்தின் சிலபகுதிகளிலும் செய்கைபண்ணப்படும்.

வாகடபகுதி. சாதிக்காய் எனப்படும் இதின் கொட்டை. இது வட்டிப்பும் ஏறக்குறைய ஒரு இஞ்சு நீளமுமானது. வெளிப்பக்கத்திற் பின்னல் போல வரிகளுடையது. உள்ளே கருங்கபில நிற வரிகளும் நரைச் சிவப்புநிறமுமுள்ளது. தனக்கே உரிய வீரூன மணமுங் கைப்பாண சுகந்த சுவையுங்கொண்டது. இதின் சாரம் ஓர் அத்திரதேலில் இருக்கும்.

தன்மை. இது ஸ்திமுலம்², காமினதி³, பெருந்தேயத்தில் நாகதிகம்⁴.

உபயோகம். அசத்துவ தியறீயம், வாயுப்பொருமல் வலி, சிலவகைக்குன்மங்களுக்கு இது கொடுத்து நயங்கண்டது. ஆயினும் இது விசேஷமாய் மற்றும் மருந்துகளுக்குத் துணைமருந்தாக வழங்கப்படும். அதிகமாய்த் தொடுசுவைக்கு வழங்கப்படும்.

தேயம். பத்து முதல் இருபது கிறேன் வரைக்குக் கொடுக்கலாம்.

காசுக்கட்டிக் கூட்டுச்சூரணம்⁵, கிரீதச் சுகந்தபற்பம்⁶, அமுராசிக்கூட்டுச் சீது⁷, லவந்தர்க்கூட்டிரஞ்சம்⁸, இவைகளிற் சாதிக்காய் ஓர் கூறுகச் சேருகின்றது.

ரசிதங்கள். சிடஅத்திரதேல். Volatile Oil of Nutmeg. சாதிக்காயைத் திஸ்திலித்தெடுக்குமெண்ணெய். இது கிறமற்றது அல்லது வெண்மஞ்சள்நிறமுள்ளது. சாதிக்காயின் மணம் சுவைகொண்டது.

தேயம். ஒரு மினிம்⁹ முதல் ஐந்துமினிம். பற்கொதியை மாற்றுவதற்குப் பல்லுக்கு இடப்படும். சிடச்சீது¹⁰ அமோனசுகந்தசீது¹¹களிலும் சொகோத்திரசகைக் குளிகை¹²யிலும் இது ஓர் கூறுகச் சேருகின்றது.

சிடச்சீது. Spirit of Nutmeg. கொள். சிட அத்திரதேல், ஒரு அன்சு. திட்டசீது¹³ நாற்பத்தொன்பது அன்சு. கரைக்கவும்.

தேயம். முப்பது முதல் அறுபது மினிம் வரைக்கு.

ஊற்றின சிடத்தேல். Expressed Oil of Nutmeg. இது சாதிக்காயைச் சூகொட்டிப் பிழிந்தெடுக்கும் தடித்த எண்ணெய். செம்மஞ்சள்நிறமும், இறுக்கமும், சாதிக்காயைப் போல நறு மணமுமுள்ளது. தன்னிலும் நாலு

1 Solution. 2 Stimulant, தீவனி. 3 Carminative, வாயுக்கினி. 4 Narcotic, கிரகி.

5 Compound powder of catechu. 6 Aromatic powder of chalk. 7 Compound spirit of Armoracia. 8 Compound tincture of Lavender. 9 Minim.

10 Spirit of nutmeg. 11 Aromatic spirit of ammonia. 12 Pill of socotrine Aloes. 13 Rectified spirit.

மடங்கு நிறையுள்ள கொதி அலக்கா¹லிலும் அதில் அரைப்பங்கு அளவான ஈத²ரிலும் கரையும்.

வாதம், சோர்வு, சுளுக்குகளுக்கு இது நல்ல பூச்சு. காரமற்ற ஏதும் எண்ணெய்களோடாவது சபுலினி³மெனோடாவது, கலந்து பூசவேண்டும், இது பிற்சுப்பற்று⁴ வெம்பற்று⁵களில் ஓர் கூறுகச் சேருகின்றது.

[சாதிபத்திரி Maceயென்று விலைப்படுஞ் சரக்கு இச் சாதிக்காயைச் சூழும் கம்பியான தகடு. இது தட்டையாய் ஒற்றையல்லது இரட்டையிதழ்களாகச் சமவீனமாய்ப் பிளந்து, அழுத்தமாகி, சற்றே வளையக்கூடியதாய், அல்லது நொருக்கலாயிருக்கும். வெண்மஞ்சள் அல்லது பொன்மஞ்சள் நிறமுஞ் சாதிக்காயைப் போன்ற மணஞ் சுவையுங் கொண்டது. இதைத் திஸ்திலி⁶க்க ஓர் அத்திர எண்ணெய் வரும். இதின் கூட்டு, செயல், உபயோகமெல்லாம் சாதிக்காய் எண்ணெய்யைப் போலவே. இது விசேஷமாய்த் தொசுவைக்கு வழங்கப்படும்.]

அவாகடச்சரக்குகள். Non-Officinal.

மலையாளச் சீடம். *Myristica Malabarica*. இது மலையாளத்திலும் திருவாளங்கோட்டிலுஞ் சோலைகளில் உண்டாகும் மரம். இதிலே சாதிக் காயைப் பார்க்கப் பருத்ததும் மெத்த நீண்டதுமான ஓர்வகைக் காய் காய்க்கும். அதற்குரிய நற்கந்தமாவது உறைப்பான சுகந்தசுவையாவது இதற்கு மெத்த இல்லை. இதை இடித்து அவித்தால், சாதிக்காயிற்பிழிந்த எண்ணெய்யைப் போன்ற மஞ்சள்நிறமான உறைந்த எண்ணெய் கனமாய் வரும்தான். மந்தமான கெட்ட புண்களுக்கு இதை இட்டால் அவற்றைச் சுத்தமாக்கி வருத்தத்தைத் தணித்து மாறப்பண்ணுமாகையால் உத்தமமான மருந்தென்று வாழிங்கு பண்டிதருக்குக் காட்டப்பட்டது. இதை இப்படிப் போடும்போது காரமற்ற எண்ணெய்யிற் சொற்பங் கலந்து உருக்கிக்கொள்ளவேண்டும். வாதத்துக்குப் பூசுவதற்கும் இது உதவக்கூடும்.

லோருசியங்கள்,

LAURACEAE.

கருப்பூரமரம். CINNAMOMUM CAMPHORA.

வாசம். சீனம், சப்பங்கி, கொச்சின் சீனங்களிலுள்ளது. யாவக தேசத்துக்குங் கொண்டுபோகப்பட்டது.

வாகடபகுதி. இம் மரத்திலிருந்து புடஞ்செய்து எடுக்கப்படுகிற இறுகின அத்திரதேல். இதுவே கார்ப்பூரம். இது கிரிஸ்தந் தன்மையான உருவொளிகொண்ட வெண் கட்டிகளாக வரும். ஊடுருவக்கூடிய வீராய்ச் கமழும் மணமும் கார்ப்பான பிறகு குளிருகிற சுவையுமுடையது. தண்ணீரில் மிதக்கும். வாடிக்கையான காங்கையிற் தாமதமாய் ஆவியாகும். தண்ணீரிற் சொற்பமாய்க் கரையும்; திட்டசீதி¹லும், ஈதரிலும், தாராளமாய்க் கரையும். உரப்பானது; இலகுவில் மாவாகாது; பிரவையாய்ச் சுவாலித்து

1 Alcohol. 2, Ether. 3 Soap liniment. 4 Pitch plaster. 5 Warm plaster.
6 Rectified spirit.

எரியும். குடுகாட்டினால் முற்றாய்ப் பஸ்மமாகும். அசுத்தமான கர்ப்பூரம், சீனம், சப்பங்கி தேசங்களிலிருந்து பிறித்தனி தேசத்துக்கு ஏற்றப்படும்.

தன்மை. இதின் முதற்செயல் செறியும் ஸ்திமுல¹மும், சுவேதவை²முமே. இரண்டாஞ்செயல் செரதீவம்³, அனுடைன்⁴, அந்திஸ்பசி⁵களின் தன்மையே. பெருந்தேயத்தில், மயக்கமுற்சி நஞ்சாகும்.

உபயோகம். கர்ப்பூரத்தை அதிகமாய்க் கொடுத்து மெத்த நயங்கண்ட ஏராளமான நோய்களுட் சுரங்கள் தாபிதங்களின் முற்றிய பருவங்களும், அசத்துவ⁶வகைகளும், பைத்தியம், பிரசவபைத்தியம், ஈனா, அஞ்சினபெத்து⁷, குக்கல்⁸ளும், இதயநிபோஷ⁹த்தோடு கூடிய நெஞ்சிடுகளும், சனசல உறுப்புகளின் நோய்களாகிய திஸ்மெனுறீயம்¹⁰, நிவ்வுமானியம்¹¹, ஸ்பமதூறீயம்¹², கருப்பைக்கன்சர்¹³, கருப்பையழற்சி, சிசிளைத்தை¹⁴, சலவொழுக்கு, இஸ்தேரி¹⁵ என்பவைகளும்; வாதம், கோதம்¹⁶ குவாதங்க¹⁷ளுமே முக்கியமானவைகள். ஸ்திரிக்னி¹⁸ நஞ்சுக்கு இது மாற்றாகவழங்கப்பட்டாலும், நயமோ சந்தேகம். மேலும் இது தைலமாய், வாதம், சுளுக்குகள் மற்றுநோக்களுக்கும், கிடைப்புண் வராமற் காப்பதற்கும், தோல்வியாதிகளிற் சொறிவைத் தணிப்பதற்கும் பூச்சு மருந்தாகும்.

தேயம். ஒரு கிறேன் தொடங்கி ஐந்து கிறேன் வரைக்குத் தண்ணீர் கொடுக்கலாம். தேவையாகில் இரட்டத்தனையாய் கொடுக்கலாம்.

ரசிதங்கள். Preparations. பூரநீர். Camphor water. கொள். பூரம், அரை அன்சு; தண்ணீர் நாலு நாழி. பூரத்தைச் சீலைப்பையொன்றுட்போட்டு, பையை ஓர் கண்ணாடித் தடியிற் கட்டி தண்ணீர்ச் சீசாவுட் தாழ்த்து, ஆடித்தடியின் மற்றத் தலைப்பைச் சீசாவின் சடையோடு தொடுத்தபடி நிற்க விட்டுச் சீசாவை மூடிவைக்கவும். இரண்டுநாளாகுதல் ஊறினபின் தேவையான வேளைகளில் நீரைத் தெளித்தெடுக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு வரைக்கும். பிரதானமாய் இது மருந்துகளுக்கு அனுபானமாய் வழங்கப்படும்.

பூரசீது. Spirit of Camphor. கொள். பூரம் ஒரு அன்சு; திட்டசீது¹⁹ ஒன்பது அன்சு. கரைக்கவும்.

தேயம். பத்து மினிம்²⁰ முதல் முப்பதுமினிமைப் பாணியில் மிதக்கவிட்டுக் கொடுக்கவும். பிரதானமாய்ச் சுளுக்குகளுள், நசிவுகள், இமாரம்²¹, காலிகவாதம், சோர்வுகளுக்கு இது பூசப்படும்.

பூர்க்கூட்டிரஞ்சம். Compound Tincture of Camphor. கொள். அவின் பருக்கன் தூளாக, நாற்பது கிறேன்; பெஞ்சோயிக்கமில்²², நாற்பது கிறேன்; பூரம் முப்பது கிறேன்; அனீசுத்தேல்²³, அரைத்திரும்; புருவுசீது²⁴ அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்திலிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கி, ஏழுநாளாய் பின் வடித்து, அரைநாழிக்குப் போதிய புருவுசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். பதினைந்து மினிம் முதல் இரண்டு திரும் வரைக்குக் கொடுக்கலாம்; கூடவுங் கொடுக்கலாம். திருமொன்றிற் காற்கிறேன் அவின் இருக்கும். பெரிகாறிக்கு²⁵ என்னும்பெயருடன் செரதீவமாக இம்மருந்து வெ

1 Stimulant. 2 Diaphoresis. 3 Sedative, சந்தனி. 4 Anodyne. 5 Antispasmodic.

6 Adynamic. 7 Angina pectoris. 8 Hooping cough. 9 Hypertrophy 10 Dysmenorrhoea. 11 Nymphomania. 12 Spermatorrhoea, வித்துலை. 13 Cancer.

14 Chordee, சிசினவளைவு. 15 Hysteria. 16 Gangrene. 17 Gout. 18 Strychnia. 19 Rectified spirit. 20 Minim. 21 Chilblains. 22 Benzoic acid. 23 Oil of Anise. 24 Proof spirit, 25 Paregori.

குதாலமாகப் பெயர்பெற்றிருந்தது. இருமற்கலவைகளில் இது பெரும்பாலும் செரும்.

பூரலினிமென். Liniment of Camphor. கொள். பூரம், ஒரு அன்சு; ஒலீவுத்தேல், நாலு அன்சு. பூரத்தை எண்ணெய்யிற் கரைக்கவும்.

பூரக்கூட்டுலினிமென். Compound Liniment of Camphor. கொள். பூரம் இரண்டரை அன்சு; லவந்தர்த்தேல்¹, ஒரு திரும்; அமோனகரநீர்², ஐந்து அன்சு; திட்டசீது, பதினைந்து அன்சு. பூரத்தையும் லவந்தர்த்தேலையுஞ்சேதிற் கரைத்து, அமோனகரநீரைப் படிப்படியாய்க் கூட்டித் தெளிந்தநீராய் வருந்தியேயுங் குலுக்கவும்.

இந்த லினிமெனும் இதற்கு முன்சொன்ன பூரலினிமெனும் வாதத்துக்கும் மற்றுமோவுகளுக்கும் நல்ல பூச்சு.

வாகடத்துக்குரிய அனேக லினிமென்களில் பூரம் ஓர் கூறாகச் சேருகின்றது. மேலும் வங்கவதவசிடசுக்கூட்டன்கெ³னிலும், இரசகூட்டன்கெ⁴னிலும் இது ஓர் கூறுகின்றது.

[சுமத்திரம், பர்ணியு, யாவகம் என்ற தீவுகளில் உத்தரம் 1 பாகை 10 கலைக்கும், 2 பாகை. 10 கலைக்குமிடையில் உண்டாகிற பூரதிரையுபலனச்சு⁵ என்ற காட்டு மரச்சிராயிலே பூரம் வெண்மையான கிரிஸ்தற் கட்டிகளாய் விளையும். அதைச் சேர்க்கும் வகையாதியைப்பற்றிய விபரம் திவிநீச்சர்வைத்தியரார் பிரசுரமாயிருக்கிறது. அதின் தன்மை உபயோகங்களைப் பற்றிய குறிப்புகளும் மற்வி என்பவரால் எழுதப்பட்டன. தன்மை உபயோகங்களில் வாகடக் கர்ப்பூரத்துக்கு இது மெத்த அதிகப்பட்டதல்ல. விலையோ அதிகம். மற்றும் பூண்டுகளிலும் கர்ப்பூரம் கொஞ்ச அளவாக உண்டு. தெனாசரிம் நாடுகளில் பேர்ப்புளுமீயம்⁶ என்ற மரத்திலிருந்து அதிக அளவாய் அது சேர்க்கப்படும்.]

சசுவிரஸ் மரம். SASSAFRAS OFFICINALE.

வாசம். இது வட அமரிக்கத்தின் சோலைகளில் கனடம்தொடங்கி, விளரிடம் வரைக்கும் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. காய்ந்த வேர். இது கவைத்த துண்டுகளாக வரும். சில அடியில் எட்டு இஞ்சு பருமையாயிருக்கும். பட்டையின் வெளிப்பக்கம் நரைக் கபிலநிறம், உட்பக்கம் கறைக் கபிலநிறம்; நல்ல மணமும் உறைப்பான சுகந்தசுவையுமுடையது. சிராய் இலேசும், கண்ணறைநிறைந்ததும், நரை மஞ்சள் நிறங்கொண்டதுமாய், மணஞ் சுவையிற் பட்டையிற் குறைந்ததாயிருக்கும். இது சீவல்களாகவும் வரும். இதிலே ஓர் அத்திரஎண்ணெய்யும், ராஸமும்⁸, சசுவிரின்⁹ என்ற விசேஷபதார்த்தமும் அடங்கியிருக்கும்.

தன்மை. இது அல்திறவதொணிகம்¹⁰, சுவேதனி¹¹.

உபயோகம். காலிகவாதம், உபசிவ்விசு¹², ஸ்கேவி¹³ சருமநோய்களுக்கு இது கொடுக்கப்பட்டது. இதின் வகுப்பைச் சேர்ந்த சார்சம்¹⁴, குவயகம்¹⁵, முதலிய மருந்துகளுடன் பெரும்பாலும் இது கலந்துகொடுக்கப்படும்.

1 Oil of lavender. 2 Strong solution of Aumoria. 3 Compound ointment of subacetate of Lead. 4 Compound ointment of Mercury. 5 Dryobalanops camphora 6 Blumea grandis. 7 Volatile. 8 Resin. 9 Sassafrin.

10 Alterative tonic. 11 Sudorific. 12 Secondary syphilis. 13 Scurvy.

14 Sarsae. 15 Guaiacum.

சார்சுக்ட்டுத் திகாத்தத்¹திற் சசுவிரஸ்வோர் ஓர் கூறுகச் சேருகின்றது.
[சசுவிரஸ் சிராயைத் திஸ்திலித்தெடுக்கும் அத்திரதேல், இரண்டுதுளிமுதற் பத்துத்துளி தேயத்தில் ஸ்திமுல²மும் காமினதி³யுமாகும். சுவேதனி⁴யென்றும் பெயர் பெற்றது. இதுவும் சோற்றியும் ஐக்கமரிகபார்மகு⁵யத்தில் வாகடத்துக்குரியதாகின்றன. சோற்றியிற் பிசுபிசுப்பான பிசின் மெத்தவுண்டு. திமல்சந்⁶தேவையான நோய்களில் இது இன்வூசமாய் வடிங்கப்படும்]

நெக்தண்ட மரம். NECTANDRA RODIAEI.

வாசம். பிறித்தனிக் கியான தேசத்தில் இது உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. பட்டை. இது பிபேரிப்பட்டையென்றுஞ் சொல்லப்படும். இது இரண்டோரடி நீளமும், இரண்டு இஞ்ச முதல் ஆறு இஞ்ச அகலமும் கால் இஞ்ச தடிப்புமுள்ள பருத்த கனத்த அகலத் துண்டுகளாகவரும். வெளிப்பக்கம் நரைக் கபிலநிறம். உள்ளே கருங் கபிலநிறம். சுவை துவர்ப்புக் கூடி நெடுக நிற்கிற கடுங் கைப்பு.

தன்மை உபயோகம். இது துவரான தொணிகம்⁷. இதிலிருந்தெடுக்கப்படும் அல்கலைவ⁸மாகிய பிபேரிய சல்வசவுக்காக மாத்திரமே இது வாகடத்துக்குரியதாகின்றது.

ரசிதம். பிபேரியசல்வசு. Sulphate of Beberia. இதைக் குறிக்குஞ் சின்னமாவது; கா³⁵ ஐ⁴⁰ நீ² அ⁶ ஐ² கெஅ⁴. இது உருவொளியுள்ள கருங் கபிலநிறமான மெல்லிய செதில்களாக இருக்கும். மாவானால் மஞ்சள்நிறமடையும்; கடுமையான கைப்புச்சுவையுள்ளது; தண்ணீரிலும் அலக் கா⁹லிலுங் கரையக்கூடியது; தண்ணீரிற் கரைத்துப் பாரிய குலோறிரஞ்¹⁰ சேர்க்க வெண்ணடையல்லிழும்; காரச் சோடஞ்¹¹சேர்க்க மஞ்சள்வெண்மையான அடையல் விழும். இக்கலவைக்கு ஈதரை¹² இருமடங்காய்ச் சேர்த்துக் குலுக்க, மஞ்சள் வெண்ணடையல் கரைந்துபோம். ஈதர்க்கரைவைச் சிறிய கண்ணாடிக் குழலாற் பிரித்து வறட்டினால், கிருசஅமிலங்க¹³னில் முற்றாய்க் கரையக்கூடிய உருவொளியான மஞ்சட்சேடம் விழும். பிபேரியசல்வசு, சூட்டுக்கு முற்றாயழிந்துபோம். தண்ணீர் சேர்த்தாற் தெளிந்த கபிலநிற நீராகும்.

தன்மை. தொணிகம்¹⁴, அந்திபிராடி¹⁵.

உபயோகம். முறைச்சுரங்கள், ரிமீஷ¹⁶ சுரங்களிலும், நுறல்சி¹⁷, முக நுறல்சிகளிலும், இடைவிட்டு வரும் மற்ற நோய்களிலும், கினியசல்வசு¹⁸க்கு ப்பதிலாக இது கொடுக்கப்படும். ஆயினும் அதற்கு இது மெத்தக் குறைவானது.

தேயம். தொணிகமாக ஒரு கிறேன் முதல் ஐந்து கிறேன் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். அந்திபிராடியாக ஐந்துமுதற் பத்துக்கிறேன் வரைக்கு நாள் மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம். இதைக் கிருசசல்வரிக்கமில¹⁹த்துளி சிலவற்றுடன் தண்ணீரிற் கரைத்துக் கொடுப்பது வசதி.

1 Compound decoction of sarsae. 2 Stimulant. 3 Carminative. 4 Diaphoretic, 5 U. S. Pharmacopoeia, 6 Demulcent. 7 Tonic. 8 Alkaloid, 9 Alcohol, 10 Chloride of Barium, 11 Caustic soda. 12 Ether. 13 Dilute acid. 14 Tonic. 15 Antiperiodic 16 Remittant. 17 Neuralgia. 18 Sulphate of Quinia. 19 Dilute Sulphuric acid.

கறுவா மரம், CEYLON CINNAMON TREE.

வாசம். இது இலங்கையிலுள்ளது. இந்து, யாவக முதலிய பகுதிகளிலும் செய்கைபண்ணப்படும்.

வாகுடபகுதி. இனங் கொப்புகளின் உட்பட்டை. இது இறுகச் சுருட்டின சுருள்களாக வரும். இவை ஏறக்குறைய நாலு லீன்¹ பருமையாய் உள்ளே சிறிய சுருள்கள் சிலவற்றை அடக்கியிருக்கும். இப்பட்டை வெண்மஞ்சளான கபிலநிறமும் நற்கந்தமும் கார்ப்பான இனிய சுகந்த சுவையுமுடையது. சிராயாக முறியும். இதின் சத்து விசேஷமாய் ஓர் அத்திரி² எண்ணெய்யிலேயே இருக்கும். எண்ணெய்யைத் தவிர தனக்கே உரிய சினாமிக்கமிலம்³ என்ற ஓர் அமிலத்தையும் தனிக்கமில⁴த்தையும் இது அமைத்திருக்கும்.

தன்மை. இது சுகந்த⁵மானது, ஸ்திமுலம்⁶, காமினதி⁷.

உபயோகம், வாயுப்பொருமல், வாயுவலி, குடவின் ஸ்பச⁸ நோய்கள், அசத்துவ⁹கழிச்சல், இரைப்பை அழற்சிகளை இது பெரும்பாலும் மாற்றும். கருப்பையின் தசை இழைகளை இது அருட்டுமென்ற எண்ணத்தினால், மெனுநீய¹⁰த்துக்கும், கருப்பைச் சேஷ்டைக் குறைவைப்பற்றிய கஷ்ட பிரசவங்களுக்கும், கொடுக்கப்படும். காய்ச்சல்களின் பிற்கால்களில், இதின் வகுப்பைச் சேர்ந்த மற்று மருந்துகளோடு ஸ்திமுலமாய்க் கொடுக்கப்படும்.

தேயம். பட்டையை மாவாக்கி, அதில் ஐந்து கிரேன் முதல் இருபது கிரேன் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். இதைத் தனியே கொடுப்பதரிது.

ரசிதங்கள். கறுவா நீர். Cinnamon Water. கொள். இடித்த கறுவாப்பட்டை, இருபது அன்சு; தண்ணீர் எட்டுநாழி. திஸ்திலித்து நா லுநாழி எடுக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு வரைக்குக் கொடுக்கலாம். பிரதானமாய் மற்று மருந்துகளுக்கு அனுபானமாக வழங்கப்படும். கிரீத மிஸ்தர்¹¹, சுவையக¹²மிஸ்தர், பிரண்டி¹³மிஸ்தர்களில் இது சேருகின்றது.

கறுவாதேல். Oil of Cinnamon. இது கறுவாப்பட்டையைத் திஸ்திலித்தெடுக்கும் எண்ணெய். புதிதாயிருக்கையில் மஞ்சள் நிறமாயிருந்து படிப்படியாய்ச் சிவப்பாகும். கறுவாப்பட்டையின் மணமுஞ் சுவையும் இதற்குண்டு. இது தண்ணீரிற் தாழும்.

தேயம். இரண்டுமினிம்¹⁴ முதல் ஐந்து மினிம் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். இது நல்ல ஸ்திமுல காமினதி¹⁵. காய்ச்சலின் பிற்கூறுகளில் மற்றும் ஸ்திமுலங்களோடு கூட்டிக்கொடுக்கப்படும். இரண்டொரு துளியைக் கோறைப்பல்லுக்குளிடப் பற்கொதி சில்வேளை தணியும். கன்னத்திற் பூசத் தலையிடி பெரும்பாலும் தணியும்.

கறுவாரஞ்சம். Tincture of Cinnamon. கொள். கறுவாப்பட்டை பருக்கன் தூளாக இரண்டரை அன்சு; புருவுசீது¹⁶ அரைநாழி. மூடியபாத்திரத்திற் பதினைந்து அன்சு சீதில் கறுவாவைப் போட்டு இடைக்கிடை

1 Line, 2 Volatile, 3 Cinnamic acid, 4 Tannic acid, 5. Aromatic, 6 Stimulant.

7 Carminative, வாயுக்கணி, 8 Spasmodic. 9 Atonic. 10 Menorrhoea, பெருப்பாடு. 11 Chalk mixture, 12 Guaiacum. 13 Brandy. 14 Minim.

15 Stimulant Carminative, 16 Proof spirit.

சூலுக்கி, இரண்டுநாளுறவிட்டு, அப்பாற் சியந்தனி¹யில் ஏற்றி நீர் ஒழுக்கித் தீர்ந்தபின், சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும்விட்டுச் சியந்தனிக்கவும். அப்பாற் சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து இரண்டு நீர்களையுங் கலந்து அரைநாழிக்குப் போதிய புருவுசீது கூட்டவும்.

தேயம். ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திரும் வரைச்சூக் கொடுக்கலாம். ஸ்திமுல காமினதிக் கலவைகளுக்கு இது நல்ல கூட்டு.

கறுவாக்கூட்டுச்சூரணம். Compound Cinnamon Powder. கொள். கறுவாப்பட்டை மா, ஏலக்கொட்டை மா, சுக்குமா, வகைக்கு ஒரு அன்சு. திறமாய்க் கலந்து மெல்லிய அரிப்பெட்டியில் அரித்து குழியம்மியில் இட்டு மெல்ல அரைத்து மூடிய சீசாவிற் பேணிவைக்கவும்.

தேயம். மூன்று முதற் பத்துக் கிரேன் வரைக்குக் கொடுக்கலாம்.

கறுவாப்பட்டை காசுக்கட்டியின்வூசம்², எமதக்சிலதிகாகத்தம்³, சுகந்த சல்புரிக்கமில்ம்⁴, காசுக்கட்டிக் கூட்டுச் சூரணம், கிரீத்⁵ சுகந்த சூரணம், கீனு⁶ கூட்டுச் சூரணம், ஏலக்கூட்டிரஞ்சம்⁷ காசுக்கட்டிரஞ்சம், லவந்தர்க்கூட்டிரஞ்சம், அவின்வைன்⁹ என்பவைகளில் ஓர் கூறாகச் சேருகின்றது.

[இலங்கையில் கறுவா இலையைக் கடற்றண்ணீரில் ஊறப்போட்டு பிற்பாடு திஸ்திலித்து ஓர் எண்ணெய் எடுப்பார்கள். அது கருமஞ்சள் அல்லது கபிலநிறமும் கராம்பைப்போன்ற மணஞ் சுவையுமுடையது. ஸ்தெனோசுவைத்தியர் அதைச் சோதித்துக் கராம்பெண்ணெய்யைப் போல அது கா²⁰, ஐ¹⁶, என்ற சின்னத்தையுடைய யுசெனிக்கமில்மும்¹⁰ ஓர் தடஸ்த¹¹ ஐரு காப¹²னுங் கூடிய கலவையென்று கண்டார். ஆயினுஞ் சொற்ப அளவான பெஞ்சொயிக்கமில்ம்¹³ இதிற் காண்பது ஆச்சரியம். அவுஷத தன்மை உபயோகங்களில் இது கராம்பெண்ணெய்க்கு மெத்தக் கிட்டினது]

அவாகடச்சூரக்துகள். Non-Officinal.

சீனக் கறுவா மரம். Cinnamomum Aromaticum. இது சீன தேசத்திலுள்ளது. இம் மரப்பட்டையைத்தான் இலவங்கப்பட்டை என்பார்களாம். சீனத்தில்நின்று சிங்கப்பூர்வழியாய் யுரோபத்துக்கும், இந்துவுக்கும் ஏற்றப்படும் பட்டையும் இதுதான். பெரிய லவங்கப்பட்டை மலையாளக்கரைக்குரியதென்பதும் நிச்சயம் போல. ஆயினும் இதின் மரம் ஏதென்பது நிதானமாகவில்லை. ஒருவேளை கறுவாமரமாக இருக்கலாம். கறுவாமரம், திருவாளங்கோடு மலையாளங்களிலும் சென்னை மேற்குக் கரையிலுள்ள மற்றும்பகுதிகளிலும் வாடிக்கையாயுண்டு. காட்டுக் கறுவாவின் உட்பட்டை பச்சையாயிருக்கையில் வீரூன கறுவாமணமுஞ் சுவையுமுடையது. கவனமாய்க் காய்ச்சி ஆயத்தப்படுத்தினால் நல்ல பேரிலவங்கப்பட்டையாகும். (58) பேரிலவங்கப்பட்டை ஒற்றைச் சுருள்களாக வரும். இரணைச் சுருள்களுக்கு அதிகமாய் வருவது அரிது. கறுவாப்பட்டையைப் பார்க்கத் தடிப்பானது; வெளிப்பக்கங் கறுவாப்பட்டையைப் பார்க்க, கருமையுங் கருங்கபிலமும், மங்கலுமானது. உட்பங்கின் முறிவு அதிக நொருக்கலும் நார்க்குறைவுமானது. மா அதிலுங் கருங் கபில நிற

1 Percolator. 2 Infusion of Catechu, 3 Decoction of Hematoxylum, 4 Aromatic Sulphuric acid, 5 Chalk. 6 Kino, 7 Compound tincture of Cardamom. 8 Lavender.

9 Wine of opium. 10 Eugenic acid, 11 Neutral, 12 Hydro Carbon,

13 Benzoic acid.

(58) அனுபந்தம்பார்.

மானது. அதிகமாய் இதின் மணமுஞ் சுவையுங் கறுவாவைப் போன்றதாயினும் சுவை அவ்வளவு இனிப்பற்றதும் அதிக காரமுமாய்ப் பிறகு கைக்கும். மணம் அதைப்போல் நல்ல மணமல்ல. இதைத் திஸ்திலிக்க ஓர் அத்திர எண்ணெய்வரும். அதின் தன்மை உபயோகங்கள் கறுவாஎண்ணெய்யைப்போலிருக்கும். ஏதோவகைக் கறுவாவின் மலராத பூக்களாகிய இலவங்கப்பூ, விசேஷமாய்ச் சீனத்திலிருந்து கொண்டுவரப்படும். திருவாளங் கோட்டிக் கடைகளில் வந்த ஓர்வகையான இலவங்கப்பூவை காட்டுக் கறுவாப்பூவென்று வாறிங்குபண்டிதர் கண்டார். அந்த ஊரார் இதைப்பலவகையாகக் கலந்து தியறீயம்¹, திசந்தெரி², இருமல்களுக்குக் கொடுப்பார்கள். கறுவா இலவங்கங்களுக்குரிய காமினதித்தன்மை இதற்கும்உண்டு.

தமாலக்கறுவாமரம். *Cinnamomum Tamala*. யுகலிப்துடிக் கறுவாமரம். *C. eucalyptoides*. இந்த இனங்கள் இரண்டும் தாளிசம் என்றுஞ் சொல்லப்படும். இவைகளின் இலைகளும் ஒருவேளை இந்துவுக்குரியஅல்லது அங்கே வளர்க்கப்பட்ட வேறு இனங்களின் இலைகளுமே தாளிசபத்திரியென்று சொல்லப்படும். இதற்குரிய ரோசன³, சுவேதன⁴ தன்மைகளைப்பற்றி இது முன்னோருக்குள்ளே கீர்த்திபெற்றது. இந்து பதார்த்தசாரத்தில் இது ஓர் சரக்காகும். கறுவாவுக்குரிய சுகந்தம், கார்ப்பு ஒருவேளை காமினதித் தன்மை தானும் இதற்குண்டு. இவை விசேஷமானதல்ல.

பார்தேனச்சீலக் கறுவாமரம். *Cinnamomum parthenoxylon*. இது பிறுங்கு சுமத்திறம் யாவதீவுகளின் சோலைகளிலுள்ள மரம். இதின் பழம் நல்ல பல்சுமணமுடையது. அதிலே ஒரு எண்ணெய் வரும். அது வாத நோய்களுக்கு மெத்த உவந்ததாம். வேரின் இன்வூச்⁵மானது, சசுவிரஸ்⁷ வாடிக்கையாய்க் கொடுக்கப்படும் நோய்களுக்கு வழங்கப்படும். இதுதான்கீழ்த்தேச சசுவிரஸ் என்று ஜக்கென்பவர் உத்தேசிக்கிறார். இந்த எண்ணஞ் சரியானால் தெனசரிம் நாடுகளில் வளர்ந்து பிரமரால் குமாந்தென்⁸ என்று அழைக்கப்படுகிற லொராசி⁹மரங்களுக்கு இம்மரம் சரியாயிருக்கவேணும். இதின் வேர் தச்சுவேலை வீட்டுக்கட்டுகளில் மிகுதியாய் வழங்கப்படும். மணம் சசுவிரசைப் போன்றது. வாறிங்கு பண்டிதரால் அதற்குப் பதிலாக இது வழங்கப்பட்டாலுங் கண்டபேறுகள் திருத்தியானவல்ல. வாகடச்சசுவிரசுக்குப் பதிலாகுமென்றெண்ணப்பட்ட நிபால் சசுவிரஸ்பட்டை கிளாண்டிலிவி¹⁰ கறுவா மரத்தின் பட்டையே. இந்த மரம், நிபால், சிக்கிம், புதான், கசியதேச மலைகளில் உள்ளது. இதைப்பற்றி வாலிக்கு பண்டிதர் விபரம் எழுதியிருக்கிறார். இதுவரையில் ஆராய்ந்ததைவிட, இன்னும் இதைப்பற்றி ஆராய்வது நல்லது.

சந்தலாசியங்கள்.

SANTALACEAE.

அவாகடச் சரக்குகள். Non-Officinal.

சந்தனக்கட்டை. Sandal wood. இது கீழ்த்தேச பதார்த்தசாரத்தில் ஒரு சரக்கு. சுரங்கள், அசீரணம், நெஞ்சிடி, முதல்ய அனேக நோய்களில் வழங்கப்படும். சந்தனக் கட்டையைக் கழியாயரைத்து, எரிசிப்பிலசு¹¹,

¹ Diarrhoea. ² Dysentery. ³ Stomachic. ⁴ Sudorific. ⁵ Balsam. ⁶ Infusion.

⁷ Sassafras, ⁸ Humanthen, ⁹ Lauraceous tree. ¹⁰ Cinnamomum

glanduliferum. ¹¹ Erysipelas.

தானிக தாபிதங்களுக்கும், காய்ச்சல்களிற் கன்னச் சுளிகளுக்கும், சரும நோய்களில் எரிவு சொறிவைத் தணிப்பதற்கும் பூசுதல் எந்த வகுப்பான சுதேசிகளுக்குள்ளேயும், தற்காலத்தில் மெத்த வாடிக்கை. ரோசுவைத்தியர் சந்தனக்கட்டையை மாவாக்கியும் திகாசத்¹மாக்கியுங் கொடுத்துப் பார்த்து, ஸ்திமுல²மாக அதின்செயல் சொற்பமென்றும், இரத்தோட்டத்தைக் குறைக்குந் தன்மையை இதிற் கவனித்தோமென்றும், சிலரில் உஷ்டிப்பை உண்டாக்கினதென்றும் எழுச்சியிருக்கிறார். ரிமீஷ்³ சுரங்களுக்கு இதைக் கொடுத்தபோது, இது சுவேதனியாய்ச் சேஷ்டித்து இதயத்துடிப்பின் பெலனைக் குறைக்காமல் அதின் தெதியைக் குறைத்தது. இக் கட்டையைத் திஸ்திலிச்சு⁴ இதின் வாசனையைமுடைய வெண்டஞ்சள் நிறமான அத்திரி⁵ எண்ணெய் நூற்றுக்கு இரண்டு மூன்று பங்கு வரும். (59) இந்துயல் இந் த எண்ணெய் விசேஷமாய் வாசனைக்காகவே வழங்கப்படும். ஆயினும் கனுறியீத்துக்கு இது மருந்தாகுமென்று கிளஸ்கு நகரத்திலுள்ள என்றேசன் வைத்தியர் காட்டியிருக்கிறார். ஐந்துவருஷத்தில் நூற்றுக்கதிகமானபெருக்கு இதைக் கொடுத்து மெத்த நயங்கண்டேனென்று அவர் வாரிந்து பண்டிதருக்கு அறிவித்திருக்கிறார். அவர் இதில் முப்பது மினிம்⁷ முதல் நாற்பது மினிம் வரைக்கு மும்மடங்கான திட்டசீதி⁸ற்கரைத்து கறுவா அல்லது லவங்கத்தேலையும் வாசனைக்காகச் சேர்த்து நாள் மூன்றுமுறைகொடுப்பார். சிலருக்கு இரண்டுநாளேக்குள் நயங்காணும். வால்மிளகு, கபேவம்⁹ கொடுத்து நயங்காணாத சிலருக்கு இது வாயக்கிறதாக அவர் கண்டு அவற்றுக்கு இது பெரும்பாலும் மேலானதென்று எண்ணுகிறார். இது நல்ல சுவையும்க வாசனையுமுடையதாகையாலும் கபேவத்திலும் திறமாகும். இதற்குச் சிறுநீர் நாற்றம் வீசுவது கவனிக்கப்படவில்லை. என்றேசன் வைத்தியர் இம்மருந்திற் சித்திகண்டிருப்பதால் சொற்ப செலவோடு அதிகமாய் இதைச் சம்பாதிக்கக்கூடிய இந்துதேசத்தில் இன்னும் இதைக்கொடுத்துச் சோதிப்பது சரி.

அரிஸ்துலோகியசியங்கள்.

ARISTOLOCHIACEAE.

சேபந்தாரி. SERPENTARY.

வாசம். வட அமரிகம்.

வாகடபகுதி. காய்ந்த வேர். இது ஏறக்குறைய மூன்றுஇஞ்சு நீளமும் ஏராளமான நுண்ணிய கூந்தல்களையும் உடைய திரண்ட சிறுத்த வேர். இது மஞ்சள்நிறமும் நல்ல பூர மணமும் கார்ப்பும் கைப்புமுள்ள பூரச் சுவையுமுடையது. இதிலே ஓர் அத்திரஎண்ணெய்யும் கைப்பான எகிருத்திவுமிருக்கும்.

தன்மை. ஸ்திமுலம், தொணிகம்¹⁰, சுவேதனி¹¹.

1 Decoction. 2 Stimulant. 3 Remittant Fever. 4 Distil. 5 Volatile. 6 Gonorrhoea. 7 Minim. 8 Rectified spirit. 9 Copiva. 10 Tonic. ௧௧. 11 Diaphoretic.

(59) அனுபந்தம்பார்.

உபயோகம். காய்ச்சலின் பிற்காலிலும் அசத்துவ¹வகைகளிலும் இது உதவும். விஷமுள்ள பாம்புக்கடிக்கு இது மருந்தென்று முன்னே கீர்த்தி பெற்றது. சிலவகையான குன்மம், குவாதம்², சருமநோய்களுக்கும் வழங்கப்பட்டது. பலவகையான தொண்டைநோய்களுக்குக் கார்பி³லாகவும் வழங்கப்பட்டது.

தேயம். காய்ந்த வேரிற் பத்து முதல் முப்பது கிரேன் வரைக்கு இன் வுசமாக்கிக் கொடுக்கவும்.

ரசிதங்கள். சேபந்தாரியின்வூசம் Infusion of Serpentry, கொள். சேபந்தாரி வேர் கால் அன்சு; கொதிநீர் பத்து அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தி ல் இரண்டுமணிநேரமுறவிட்டுச் சீலையில் வடிக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு வரைக்கு நாள் மூன்று நா லுமுறை கொடுக்கவும்.

சேபந்தாரிரஞ்சம். Tincture of Serpentry. கொள். சேபந்தாரி வேர் இடித்து, இரண்டரை அன்சு; புருவுசீது⁴ அரைநாழி. சேபந்தாரிவே ரை, அடைத்த பாத்திரத்திற் பதினைந்து அன்சு சீதில், இரண்டு நாளுறப் போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கி அப்பாற் சியந்தனியில் வார்த்து, நீர் ஒழு கித்தீர்ந்தபின் சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும் வார்த்து வடியவிடவும். அப்பாற் சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து, நீர்களைக் கலந்து அரைநாழிக்குப் போதிய புருவுசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திரும் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். ஸ்திமுல சுவேசன கலவைகளுக்கு இது நல்ல கூட்டு.

சின்கனகூட்டிரஞ்சத்திற் சேபந்தாரிவேர் ஓர் கூறுகச் சேருகின்றது.

அவாகடச்சரக்குகள். Non-Officinal.

ஈச்சுரமூலி. Aristolochia Indica. பெருமருந்தென்றுஞ் சொல்லப் படும் இந்தப் படர்செடி, இந்துவடங்கலுமுள்ளது. மெத்தக் கைப்பான இதின் வேரை, ஸ்திமுலம், தொணிகம், எம்மெனசுக்கு என்று சுதேசிகள் மெத்த மதித்து முறைச்சுரங்களுக்கும் வேறு நோய்களுக்கும் கொடுப்பார் கள் இதின் செயலைப்பற்றி நிச்சயமாய் ஒன்றும் அறியப்படவில்லை. ஆ யினும் சுரக்கினியாக இதின் தன்மைகளை ஆராய்தல் தகுமென்று கெர்க்பா த்திரிக்கு வைத்தியர் சொல்லியிருக்கிறார். வேரின் சுகந்த கைப்பைப் பிடி த்துக் குன்மத்துக்கு இது உதவுமென்று வினெமிங்கு பண்டிதர் எண்ணுகிறார். உயிற்று நோய்களுக்கு நல்லதென்றது கிப்சன் பண்டிதர் எண்ணம். இது தோற்றமான செயல்களுள்ளதாயிருப்பதாலும், சுதேசிகள் இதை மெத் த மதிப்பதாலும் இன்னும் இதை ஆராய்வது நல்லது. இது நாகபாம்பு கடி க்கு மாற்று என்று பேர்பெற்றது. நாகபாம்பின் கடிக்கு இதுமாற்று என் ற எண்ணத்தைப்பற்றியே ஆதியிற் குடியேறின போட்டுக்கீசர் இதற்கு நா கவேர்⁵ என்று பேரிட்டார்கள். இலையும் இலைச்சாறும் இதற்கு நல்லதெ ன்று லவதரும் பிற்காலத்திற் காட்டியிருக்கிறார். அவரது சாட்சி மெத்தப் பெலப்பு. (60) ஆயினும் பாம்புகடியையும் அதற்கு மாற்று என்பதையும்

1 Adynamic. 2 Gout. 3 Gargle. 4 Proofspirit. 5 Perculator. 6 Raiz de eubra. (60) அனுபந்தம்பார்.

பற்றி அனேக சந்தேகங்கள் இருக்கின்றனவாதலால் இதின் தன்மையை உறுதிப்படுத்துவதற்கு இன்னும் அத்தாட்சி வேண்டும்.

ஆடுதின்னாப்பாலை. *Aristolochia bracteata*. இது இந்துதேசம் அடங்கலுஞ் சாதாரணமாயுள்ள பூடு. இதற்குக் கெட்ட கைச்சற் சுவையிருப்பதில் இதுவும் முத்தின இனங்களை ஒத்திருக்கின்றது. இதற்குக் கிருமிகொல்லித் தன்மை உண்டென்ற எண்ணத்தினாலும் ஒருவேளை கிருமிகளைக் கொல்லுவதற்காக, இதின் இலைச்சாறு கெட்ட புண்களுக்கு இடப்படுவதினாலும் இது இந்துஸ்தானிப் பாவையில் கிரமார்¹ எனப்படும். இதின் இலைக்குக் கிருமிகொல்லித் தன்மை உண்டென்ற நம்பிக்கை சுதேசிகருக்குள்ளே இருந்தாலும் அத்தன்மையை உறுதிப்படுத்துவதற்கு யுரோப வைத்தியருடைய அனுபவத்தைக் கொண்ட அத்தாட்சி தெவை. இது முறைச்சுரங்களுக்கு அந்திபிராடியாகப் பெயர்பெற்றிருக்கின்றது என்று தல்செல் கிப்சன் என்பவர்கள் எழுதிய வம்பாய் விலோறம்³ என்ற நூலில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இதற்கு எம்மெனகக்குத்தன்மை⁴யுமுண்டாம். சிந்துதேசத்திலே பிரசவநோக்காட்டை அதிகப்படுத்துவதற்கு இதின் காய்ந்த வேரில் ஏறக்குறைய ஒன்றரைத்திராமைத் தூளாகவாவது இன்யூசுமாயாவது கொடுப்பார்களென்று நூற்றன் பண்டிதர் அறிவித்திருக்கிறார்.

பிறுகந்திவலிச்சிச் செடி. *Bragantia Wallichii*. இது மலையாளக் கரையிலுள்ள சிறுச்செடி. அங்கே அல்பம்⁵ என்ற பெயரால் அது வழங்கும். இதின் இலைச்சாறு இந்த வகுப்பைச் சேர்ந்த வேறும் பல பூண்டுகளின் சாற்றைப் போலப் பாம்பு விஷத்துக்கு, விசேஷமாய் நாகபாம்பின் விஷத்துக்கு மாற்றும். உடம்பில் அல்பம் ஏறினசணமே விஷம் இறங்கும் என்ற கருத்துள்ள ஓர் பழமொழி மலையாளிகளுக்குள்ளே வழக்கம். ரோமப்பிரகந்திச்⁷ செடி என்றது கடுங் கசப்புள்ளது. காசுவீல்டர் சொல்லுகிறபடியாவகர் இதை எம்மெனகக்காய் வழங்குவார்கள்.

யுவார்ப்யாசியங்கள்.

EUPHORBIACEAE.

கஸ்கரிலம். CASCARILLA.

வாசம். பகாமத்தீவுகள்.

வாகடபகுதி. பட்டை. இது இரண்டு மூன்று இஞ்சு நீளமும் இரண்டு லீன்⁸ முதல் ஐந்து லீன்பருமையுமுள்ள சுருள்களாக வரும். மங்கற் கபிலநிறமானது. வெளியில் வெண்மையான தேமல் படர்ந்திருக்கும்; குறுகின ராளமுறிவாக ஒடியும். உறைப்பான கைப்புச்சுவையுள்ளது; எரிக்க

1 Kiramar, 2 Antiperiodic. 3 Flora of Bombay. 4 Emmenagogue. 5 Infusion. 6 Alpan. 7 Bragantia tomentosa, 8 Line.

வாசனை வீசும்; அதிலே அத்திர¹எண்ணெய்யும் தனி²னும்³ கஸ்கரிலின்³என்ற கைப்புள்ள கிரிஸ்தர்⁴ பதார்த்தமும் அடங்கியிருக்கின்றது.

நன்மை. இது சுகந்தமும் கைப்பும் தொணிக⁵முமானது.

உபயோகம். இது தேக பெலவீனத்துக்கும், அசத்துவகுண்மத்துக்கும், திசந்தெரி⁷ தியறியங்குளின் பிற்கால்களுக்கும், உபயோகமானது. முற்காலத்தில் முறைச்சுரங்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்டாலும் தற்காலத்தில் அசற்கு வழங்கப்படுவதில்லை. காய்ச்சல்களினின்று சகாயப்பட்டுத் தேறுகிறவர்களுக்கு இது உத்தமமான தொணிகமாகும்.

தேயம். பட்டையைத் தூளாக்கி அதிற் பத்துக் கிரேன் முதல் மூப்பது கிரேன்வரைக்குக் கொடுக்கலாம்.

ரசிதங்கள். கஸ்கரிலவின்லூசம். Infusion of Cascarilla. கொள். கஸ்கரிலபட்டை பருச்சுந்துளாக ஒரு அன்சு; கொதிலெநீர் பத்து அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் ஒருமணிநேரமூறவிட்டுச் சீலையில் வடிக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு வரைக்கு நாள் இரண்டு மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம்.

கஸ்கரிலவின்லூசம். Tincture of Cascarilla. கொள். இடித்த கஸ்கரிலபட்டை, இரண்டரை அன்சு; புருவசீது⁹அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்தில் கஸ்கரில பட்டையைப் பதினைந்து அன்சு சீதில் இரண்டுநாளுறப் போட்டு இடைச்சிடை குலுக்கவும். அப்பாற் சியந்தனி¹⁰யில் வார்த்து நீர் ஒழுந்தீர்த்தபின் சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும் வார்த்து வடிக்கவும். அப்பாற் சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து, நீர்களைக் கலந்து அரைநாழிக்குப் போதிய புருவசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திரும் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். தொணிகக் கலவைகளுக்கு இது நல்ல அனுமருந்து.

நேர்வாளச்சேடி. CROTON TIGLIUM.

வாசம். இது இந்து இலங்கை மொலக்கத்தில் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி கொட்டை. இது கோப்பிச்செட்டையளவு பருமையும் வட்டிப்பும் உண்டையுமானது. ஒடு கருமையாயும் வரிகள் ஓடிய தாயுமிருக்கும். போர்வைச்சவ்வு மெல்லிதும் நொருக்கலுமாய்ச் சொற்ப மணங்கொண்டிருக்கும். பருப்பு மஞ்சள்நிறமுள்ள அல்புமி¹¹னே. அதற்குள்ளே இலையை உடைய பெரிய துவிகதிலீத¹²முளை இருக்கும். பருப்புக்கு மண்மில்லை. சுவை முதற் சாந்தம்; பிறகு கார்ப்பும் உறைப்புமானது.

நன்மைஉபயோகங்கள். இது கடுமையான நீரடிக்கும் பேதி. மிஞ்சிய தேயத்தில் மயக்கமுற்சி¹³நஞ்சாகும். வெளியிற் பூசினால் அழற்றி, ஸ்தமல¹⁴மும் ருபிவாஷ¹⁵னுமாகும்.(61)

ரசிதங்கள். வாளதேல். Croton oil. இது நேர்வாளச்செட்டையைப் பிழிந்தெடுக்குமெண்ணெய். சற்றே விசுப்பிசுப்பிவருவது; கபிலமான மஞ்சள்நிறமுங் கார்ப்பான சுவையும், சொற்பமான உவட்டுமணமுமுடையது. சோதனை. சமபருமமான அலக்கா¹⁶லோடு குலுக்கிச் சொற்பகுடிகாட்ட, தெ

1 Volatile, 2 Tannin. 3 Cascarilline. 4 Cryst. 5 Tonic, 6 Atonic, 7 Dysentery, 8 Diarrhoea. 9 Proof spirit, 10 Percolator, 11 Albumen, 12 Dicotyledon.

13 Narcotico-irritant, 14 Stimulant, 15 Rubefacient, 16 Alcohol.

(61) அனுபந்தம் பார்.

ளிந்த நீராதம். இது ஆறும்போது ஏறக்குறைய முக்கால்வாசி எண்ணெய் பிரியும்.

தன்மை. இது கடுமையாய் நீரடிக்கிற பேதி. வெளியிற் பூசினால் எரிவுகண்டு ருபிவாஷினும் எதிரழற்சியுமாகும்.

உபயோகம். நீர்க்கோவை விபாதிதளுக்கம், கடுமையான மலக்கட்டுக்கும், விசேஷமாய்ப் பைத்தியமாதி மூளைநோய்களோடு கூடிய மலக்கட்டுக்கும், அபுபிலெச்சி²க்கும், சுறுக்காய்ந் திறமாயும் பேதிபண்ணவேண்டிய மற்றும் நோய்களுக்கும் இதைச் கொடுப்பது நலம்.

தேயம். அரைத்துளி தொடங்கி இரண்டு மூன்று துளி வரைக்கும், அப்பத்துண்டோடு சேர்த்துக் குளிகையாக்கிக் கொடுக்கலாம். அபுபிலெச்சியிலும் மூட்டத்திலும் நோயாளி விழுங்க எலாதிருக்கிற மற்றநோய்களிலும் இந்த எண்ணெய்யை அடிநாவிவிட்டாற் போதும். கடுமையாய்ப் பேதி பண்ணினால் எலுமிச்சஞ்சாற்றையாவது வின்னூரி³யையாவது தண்ணீரோடு கலந்து தாராளமாய்க் குடிக்க நிற்கும்.

வாளதேலினிமேன். Liniment of Croton oil. கொள். வாளதேல் அரைஅன்சு; ஒலீவெண்ணெய் மூன்றரை அன்சு. கலக்கவும்.

காலிக⁴வாதம், சோர்வுகள், பொருத்துநோய்களுக்கும், கசம், காலிகபுறங் கீது⁵, மற்றஞ் சுவாச நோய்களில் நெஞ்சுக்கும் பூச இது நல்ல ஸ்திமுலன்⁶ பூச்சு. பூச நீர்ப்பருச்சுள் தோன்றும்.

பலியாண்டவாளம். Croton Polyandrum. பவானவாளம். C. Pavana. நேட்டிலைவாளம். C. Oblongifolius. என்ற மூன்று செடிகளின் கொட்டைக்கும் நேர்வாளத்துக்குரிய விரேசனத்தன்மையுண்டு. இந்தச்செடிகள் இந்துவடங்கலுமுண்டு.]

ஆமணக்கு. CASTOR OIL PLANT.

வாசம். இது பூமியின் மத்திம உஷ்டண பகுதிகளெங்கும் செய்கைபண்ணப்படும்.

வாகடபகுதி. கொட்டை. (62) இது சற்றுத் தட்டையான நீண்ட வட்டிப்பு வடிவுடையது. ஏறக்குறைய நாலு லீன் நீளமும், மூன்று லீன் அகலமுமானது. நிறை இரண்டு கிறேன் முதல் எட்டுக் கிறேன் வரைக்கிருக்கும். வெளிப்பக்கம் நகரையான அல்லது செங்கபிலமான அல்லது கருங்கபிலமான புள்ளிகளும் வரிகளுமுள்ளது. கொட்டை மெல்லிய அழுத்தமான தோலால் போர்க்கப்படும். இத்தோலில் இரண்டுபடலமுண்டு. வெளிப்படலம் தடித்தது, கருமையானது. உட்படலம் மெல்லிது, வெளுநினைது, பருப்பு எண்ணெயுள்ள அல்புமினே⁷. அதற்குள்ளே பருத்த, துவி கதிலீத⁸, இலையுள்ள முளையிருக்கும்.

தன்மை உபயோகங்கள். இது விரேசனி. பருந்தேயத்தில் மயக்கழற்சி நஞ்சு கொட்டையிலிருந்து எண்ணெய் எடுப்பதினாலேயே அது வாகடத்துக்குரியதாகின்றது.

ரசிதம். ஆமணக்கெண்ணெய். Castor oil. இது ஆமணக்கங்கொட்டையிலிருந்து பிழியப்படும். பிசுபிசுப்பானது; நிறமற்றது, அல்லது

1 Rubefacient 2 Apoplexy. 3 Vinegar. 4 Chronic. 5 Bronchitis. 6 Stimulant. 7 Albumen. 8 Dicotyledon.

(62) அனுபந்தர்பார்.

வெண்மஞ்சள் நிறமுள்ளது. சற்றே உவட்டுமணமும் சொற்பங் கார்ப்பா ன சுவையுமுடையது. சமபங்கு அலக்கா¹லிலும் இரட்டிப்பங்கு திட்ட சீதி²லும் முற்றாய்க் களையும்.

தன்மை உபயோகங்கள். இது இலேசான நல்ல பேதி. பிள்ளைகளு ளுக்கு உவந்தது; பிரசவ ஸ்திரிகளுக்கும், குடல்களின் தாபித³த்தில் விரேச னங் கொடுக்கக்கூடியதாயிருக்கையிலும் சன்னசல உறுப்புகளின் தாபிதத் துக்கும் உவந்தது. சிலவகையான குண்மத்திலும், குடல்களின் ஸ்பச⁴நோ ய்ச்⁵களிலும் இதால் நயமுண்டாகும்.

தேயம். வளர்ந்தோருக்கு ஆறு திரும் முதல் பத்துத் திரும் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். பிள்ளைகளுக்கு ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திரும் கொடுக் கலாம்.

சுவட்கலோடியம்⁶, கடுக்கூட்டுலினிமென்⁷, கலமற்⁸கூட்டுக் குளிகை என்பவற்றில் ஆமணக்கெண்ணெய் ஓர் கூறுகச் சேருகின்றது.

[பாலை ஊறப்பண்ணுந் தன்மை ஆமணக்கமி⁹லக்கு உண்டு. இலையை அவித்தாவது அதின் சாற்றைப் பிழிந்தாவது உள்ளே கொடுக்க அதுஊறும். இலையை அவித்து மென்கூட்டோடு ஸ்தனங்களுக்கு வமன்றாஷம்⁸ பிடிப்ப தும், பாப்பையாய் அணைப்பதும் உண்டு. இலையை வாட்டித் தனங்களுக் கு அணைத்தாலுங் காரியஞ் சித்தியாகுமென்று சாற்றுவைத்தியர் எழுதியிருக்கிறார்.]

கமாலம். KAMALA.

வாசம். இது இந்துவடங்கலும் மலைநாடுகளில் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. கோதை மூடியிருக்கிற துண்ணிய கோளங்களான மா, இது கருஞ்சிவப்புநிறமும் மெல்லிதும் பருபருக்கையுமானது. இதைத் தண் ணீரோடு கலப்பது வில்லங்கம். அலக்காவிற்போட்டுக் காய்ச்ச மிகுதியா ன பங்கு அதிலே கரைவதால் சிவந்த நீராகும். மிகுதியானபங்கை ஈதர்⁹ கரைக்கும். கரையாமற் சேஷமாயிருப்பது மிகுதியாய்க் கற்றையான மயி ரே. இதில் மணலாவது மண்வகையாவது கலவாமல் இருக்கப் பார்க்க வேண்டும்.

தன்மை உபயோகங்கள். இது கிருமிகொல்லியும் விரேசனியுமாகும். விசேஷமாய்த் தீனியப்புழுவை¹⁰ க் கழற்றுவதற்கு உவந்தது. (63)

தேயம். இரண்டு திரும் முதல் மூன்று திரும் வரைக்குக் கொடுக்கலா ம். இந்தப் பிரமாணத்திற் குடலிற் திறமாய்ச் சேஷ்டித்துப் பெரும்பாலு ம் உவட்டிப்பையும் முறுக்கையும் உண்டாக்கும். கிருமிகள் பலமுறையும் மூன்றும் நாலாவ் கழிச்சலிற் செத்து விழும்.

ரசிதம். கமாலரஞ்சம். Tincture of Kamala. கொள். கமாலம், ஆறு அன்சு; திட்டசீது¹¹ அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்தில் எழுநாளுறவிட்டு, இடைக்கிடை குலுச்சி; அப்பால் சீலையில் வடித்துப் பிழிந்து வடித்து அரைநாழி தேற திட்டசீது சேர்க்கவும்.

1 Alcohol. 2 Rectified spirit. 3 Inflammation. 4 Spasmodic. 5 Flexible collo-
dium. 6 Linimentum sinapis compositum. 7 Calomel. 8 Fomentation.

9 Ether 10 Taenia, 11 Rectified spirit.

(63) அனுபந்தம்பார்.

தேயம். அரை அன்சைச் சுகந்தமான தண்ணீர் கொஞ்சத்தில் விட்டு இரண்டு சமதேயமாக்கி, மூன்றுமணிக் கொருமுறை கொடுக்கவும். மாவைப் பார்க்க இது அதிக சாந்தமாய்ப் பேதிபண்ணி கிருமிகளில் அதைப்போலச் சரியாய்ச் சேஷ்டிக்கும்.

அவாகடச்சரக்குகள். Non-Officinal.

நாட்டக்ரோடு. *Aleurites triloba*. மொலக்கத்திலிருந்து பெயர்க்கப்பட்டு இந்துவின் பல பகுதிகளிற் செய்கைபண்ணப்படுகின்ற இந்த மரத்தின் கொட்டைப் பருப்பைப் பிழிய அதிக அளவான திரவெண்ணெய்¹ வரும். இது வருணம் பூசல் முதலியவற்றுக்கு லீன்² வெண்ணெய்யைப்பார்க்கத் திறமானதென்று சென்னைமருந்து ஆராய்ச்சியாராற் தீர்க்கப்பட்டது. இதின் அவுஷத தன்மையை ஒரோக்கி வைத்தியர் ஆராய்ந்து, ஒரு அன்சு, இரண்டு அன்சு தேயத்தில் இது சாந்தமான நிச்சய விரேசனியாய்ச் சேஷ்டித்துக் குடித்த மூன்று மணிமுதல் ஆறு மணிக்குள்ளே, பித்தரைத் தாராளமாய்க் கழிக்கிறதென்றும் உவட்டு வலிப்பு முதலிய கெட்ட குணங்கள் இதாலுண்டாகாதென்றுங் கண்டார் சாந்தமான செயலிலுஞ் சேஷ்டிக்கு நிச்சயத்திலும் இது ஆமணக்கெண்ணெய்ச் கு ஏறக்குறையச் சரியானதாய்க் காணப்பட்டது. மேலும் சுவை மணமற்றதாய், இருக்கிறபடி கொடுத்தாலென்ன, இமல்சுமாய்க் கொடுத்தாலென்ன, உவட்டைக் கிளப்பாமற் பேதிக்கப்பண்ணுகிறபடியால் அதிலும் இது நயந்தது. இன்னும் இதை ஆராய்தல் நல்லது.

காட்டாமணக்கு. *Jatropha Curcas*. இது பூமியின் உஷ்டண பகுதிகளெங்கும் உண்டாகும். இதின் கொட்டையைப் பிழிய, மெத்தச்சலனமுள்ள நிறமற்ற அல்லது வெண்மஞ்சள் நிறமான திரவெண்ணெய் நூற்றுக்கு முப்பது பங்கு வீதமாய் வரும். இது 2½ பங்கு அலக்கா⁴லிற் கரையாமல் மெத்தச் சொற்பமாய் மாத்திரங் கரைவதில் ஆமணக்கெண்ணெய்ச் கு வித்தியாசமானதென்று கூபேட்டர் சொல்லுகிறார். இதிலே பன்னிரண்டு துளிமுதல் பதினைந்து துளி வரைக்கு உள்ளே கொடுக்க அவ்வளவு நிச்சயமாய்ச் சேஷ்டியாதிருந்தாலும் ஒரு அன்சு ஆமணக்கெண்ணெய்யைப் போலச் சேஷ்டித்ததென்று கிரிஸ்திசன் பண்டிதர் பரீட்சித்துக் கண்டார். இது எப்போதும் ஒரே மாதிரியாய்ச் சேஷ்டியாததைப்பற்றி ஏதிர்ப்பு திஸ்பென்சுதறியில்விபரமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. விரேசனியாய் வடிங்குவதற்கு இது பெரிபதையாகும். கொட்டைகள் அதிதேயத்தில் மயக்கமுற்சி⁶நஞ்சாகச் சேஷ்டிக்கும், கிருசு⁷வெண்ணெய் காலிகவாசத்துக்கு நல்ல பூச்சாகும். ஆமணக்கமிலையைப் போலப் பாலை ஊறப்பண்ணுவதற்கு இதன் இலைகளைக் கஷாயமாகவும் பாப்பையாகவும் ஸ்தனங்களுக்கு இடுதல் வேடைல் முனையில் பெருவழக்கம். சீமையாமணக்குக் *J. Multifida* கொட்டைகள் வாஸத்தைப் பார்க்கக் கடுமையானவிரேசனியாய். ஒரு ஆளுக்கு மூன்று கொட்டைகள் நஞ்சாய் முடிந்ததை வாரிங்கு பண்டிதர் கண்டார். கடுமையான வாந்திபேதியும் இரைப்பையிலே கடிய சூத்தும் எரிவும் சீவ தத்துவங்கள் குன்றலுமே பிரதானமாய் இதாற் கண்ட குணங்

1 Fixed 2 Linseed oil. 3 Emulsion. 4 Alcohol, 5 Edinburgh Dispensatory.
6 Narcotico irritant 7 Diluted.

கள். தண்ணீர் கலந்த எலுமிச்சஞ்சாறும் ஸ்திமுலங்க¹ளுங் கொடுத்ததால் வாலிபனான அந்த நோயாளி சுகமடைந்தான். கிளைமுருங்கை²யைப்போற் தோற்றுவதால் முருங்கைப்பூடு என்ற பெயருடன் இது இந்துவினுள்ள யுரோபருடைய தோட்டங்களில் அனேகரால் உண்டாக்கப்படும். ஊதனை J. Glandulifera. என்பது ஆதியில் ஆபிரி⁴த்திலுள்ளதுபோலும். ஆனாலும் இப்போ இந்துவடங்கலுங் குளங்களுக்குக் கிட்ட மித்தியாயுண்டு. இதின் கொட்டையைப் பிழிய ஓர் திரதேல்³வரும். இது வாதம் சோர்வுகளுக்கு நல்ல தீவன பூச்சென்று இந்துக்கள் மகிப்பார்கள்.

சதுரக்கள்ளி. Euphorbia Antiquorum. திரிகள்ளி. E. Tirucalli. நிவூலியக்கள்ளி. E. Nivulia. இந்துவினுள்ள இந்த மூவகைக்கள்ளிகளிலும் பால் நிரம்பஉண்டு. இப்பால் பச்சையாயிருக்கையில் கடுங் கார்ப்பானது, விரேசன, கிருமிகொல்லித் தன்மைகளும் வேறுத் தன்மைகளும் இதற்குண்டென்று சுதேசிகள் சொல்லுகிறார்கள். ஆயினும் இவற்றைப்பற்றி நம்பிக்கையாய் அறியப்பட்டது சொற்பம். கடைகளில் வரும் யுவாபியம்⁴ என்ற சரக்கு நெடுங்காலமாய்ச் சதுரக்கள்ளியின் பேறு என்று எண்ணப்பட்டதை அமில்தன் என்பவர் தவிர்த்திருக்கிறார். திரிகள்ளிப் பால் காய்களை மாற்ற நல்ல பூச்சாகும். இது மற்றங் கள்ளிப் பால்களைப் போலவே காரமற்ற எதும் எண்ணெய்களோடு கலந்து வாதத்துக்குப் பூசப்படும். இறுகின பால்போன்ற சாறு முற்காலத்தில் சிவ்விசு⁵ நோய்களுக்கு மருந்தென்று இந்துவிலே⁶ பேர்பெற்றிருந்தது. இந்த நோய்க்கு அந்தி சந்தி ஐந்துகிறேன் தேயத்தில் இது உத்தமமான அல்கிறவரமானதைக் கண்டேனென்று சாற்று வைத்தியர் அறிவித்திருக்கிறார். நீர்க்கோவை நோயுள்ள ஒரு ஆளுக்கு நிவூலியக்கள்ளி⁷ என்ற கள்ளிச்சாற்றை அமுரிதி⁸யாகச் சில கிறேன் தேயத்திற் கொடுத்துச் சகாயந் தோன்றினதென்று காசுவீல்டர் சொல்லியிருக்கிறார்.

இலைக்கள்ளி. Euphorbia nerifolia. இந்துவின் அனேக பகுதிகளில் சுதேசிகள் சர்ப்பதேவியாகிய முன்சாவே இதற்கு ஆதிதேவதையென்று எண்ணுகிறார்களாம். இதின் வேர் பாம்புகடிக்கு மருந்தென்று மெத்தக் கீர்த்திபெற்றது. ஆயினும் நம்பிக்கையான அத்தாட்சியில்லை. இலையிற் பிழிந்தெடுத்த சாறு ஸ்பசு⁹ ஈனையை மாற்றுவதில் மெத்தச் சித்தியுள்ளதாம். இதால் ஆறுபேருக்கு நல்ல சகாயமுண்டானதென்று வங்காள வைத்திய உத்தியோகத்திலிருந்த அமெஸ்பரி வைத்தியர் குறித்திருக்கிறார். இதின் வகுப்பைச்சேர்ந்த பூண்டுகள் காரமுள்ளவைகளாதலால் இதைக் கவனமாய் வழுங்கவேண்டும்.

நெல்லி. Phyllanthus Emblica. இந்த மரம் இந்துவடங் சலுமுண்டு. பச்சையாயிருக்கையில் இதின் காய் திரண்டு கடுக்காயளவாய் ஆறுபுடையுடையதாய் வட்டிப்பாயிருக்கும். சதை புளிப்பும் விரேசனமுமான சாற்றையுள்ளது. வெள்ளையங் கோணமுமான கொட்டைகள் அதிலே அடங்கியிருக்கும். காய்ந்து வற்றலானபின்போ அக்காய்கள் வட்டிப்பாகி, வற்றிச் சுருங்கி, சுருமையான நரைநிறங்கொண்டு சற்றே சுகந்த மணமுடிகுளிப்பான கபர்ச்சுவையுமுள்ளதாயிருக்கும். தோற்பதனி¹⁰ இவ்வற்றல்

1 Stimulant. 2 Coral. 3 Fixed oil. 4 Euphorbium. 5 Syphilis. 6 Alterative. பரிசுடம். 7 Euphorbia nivulia. 8 Diuretic. 9 Spasmodic Asthma. 10 Tanning.

வழங்கப்படும். குடல்நோய்களுக்குத் துவராக மெத்த மதிச்சுப்படும். பற்றுவியாவின் விசிகங்க¹ளில் தியறீயம்², திசந்தெரி³களின் பரிகரிப்பில் இதா லுண்டான நயத்தைப் பற்றிப் பந்தியசென்பவர் சாட்சியிடுகிறார். மக்நா புவைத்தியர் இது ஸ்கேவ்⁴க்கு மாற்றென்கிறார், ஆயினும் இதுகாரியத்தில் இதற்கு யாதொரு விசேஷ தன்மையிலையென்பதும் புளிப்பான மற்றுந் தாவர துவர்களுக்கு இது மேலானதல்லவென்பதும் ஏர்வின் பண்டிதர் எண்ணம். அவர் இக்வே அதிக வீதமான கலிக்கமில்⁵ இருக்குமென்கிறார். நெல்லிப்பூவுக்குக் குளிர்ந்த விரேசனத்தன்மை உண்டென்று இந்துவைத்தியர் அதை வழங்குவார்கள். பட்டையும் பழத்தின் துவர்த்தன்மையையுடையது. நெல்லிவேரை அவித்து வரட்டிக் காய்ச்சுக்கட்டிக்குச் சரியான தன்மையுள்ள துவரான ஓர் எசிரூத்தைச்⁶செய்தோமென்று ரோசுவைத்தியர் அறிவித்திருக்கிறார். மேலும் அதின் சிராயை அல்லது சிறுக் கொப்புகளைச் சேற்றுத் தண்ணீரிற் போட அத்தண்ணீர் தெளியும். ஆகையாற் சுதேசிகள் நெல்லிமரக் குற்றிகளாற் கிணறுகளைக் கட்டிக்கொள்வார்கள். ஆயினும் அவைகளில் மருந்துக்கு உதவுஞ் சத்து மெத்தக் காணப்படுகிறதில்லை. இதுகாரியத்தைப்பற்றி இன்னும் விசாரிப்பது நல்லது.

கீழ்காய்நெல்லி; *Phyllanthus Niruri*. சீவப்புநெல்லி. *P. Urinaria*. இந்த இரண்டுபூடுகளும் இந்துவடங்கலும் உண்டாகும். அமுரிதி⁷த்தன்மையுடையனவென்று சுதேசிகள் அவற்றை மதிப்பார்கள். நீர்க்கோவை⁸ நோய்களுக்கும் வெட்டைக்கும் சனனசல உறுப்புகளின் நோய்களுக்கும் வழங்குவார்கள். காசவீட்டரும் மற்றும்பேரும் இதற்குச் சார்பாய்ப் பேசியிருக்கிறார்கள். கீழ்காய்நெல்லிச் சாற்றைப் பாலோடு கலந்து செங்கண்மாரிக்குக் குடிக்கக் கொடுப்பார்கள். நோயின் தொடக்கத்திற் கொடுத்தாற்பெரும்பாலும் நயமுண்டாகின்றது.

குப்பைமேனி. *Acalypha Indica*. இது இந்துவடங்கலுமுள்ள ஓர்பூண்டு. இதைப் பற்றிப் பிதிவைத்தியர் எழுதியிருக்கிறதாவது: இதின் இலைச்சாறு பிள்ளைகளுக்குப் பதனமும் நிச்சயமும் கெதியுமான வமனி⁹யென்று மதிக்கப்படும். இபிகாக்கை¹⁰ப் போலவே இதற்கும் பேதிக்குந் தன்மையாவது சீவசத்துவங்களைத் தாழ்த்துந்தன்மையாவது மெத்த இல்லை. சுவாச உறுப்புகளின் விசர்க்கங்க¹¹ளாகிய, சளி கபங்களை இது அதிகப்படுத்தும். இதின் சத்தெல்லாம் காய்ந்த இலையின் இன்யூச¹²த்தில் அல்லது பச்சைப்பூண்டிற் செய்த எசிரூத்திலே இருக்கவேண்டும். பிழிந்த சாற்றின் தேயம் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு சிறுதேய்க்கரண்டி. எக்ஸ்பெக்துற¹³மாக இதின் உபயோகத்தைப்பற்றி ரோசுவைத்தியர் விதந்து பேசி, இத்தன்மையில் செனிக¹⁴த்தோடு இதை வகுக்கிறார். குழந்தைகளின் புறங்கீது¹⁵க்கு இது உவப்பான தென்றும் அவர் கண்டார். மேலும் இலைக்களியைச் சிவ்லிசு¹⁶ப் புண்களுக்கு இடலாமென்றும் அது விஷப் பூச்சிக் கடிகளின் வருத்தம் அழற்றியைத் தணிக்குமென்றும், அவர் சொல்லுகிறார். வேருக்கு விரேசனத்தன்மை உண்டென்று ஏன்ஸ்லி சொல்லியிருக்கிறார். வேர் இலைகளின் பிழிந்தசாற்றைப் பிள்ளைகளுக்கு விரேசனமாகக் கொடுத்ததனால் பஸ்திடு வைத்தியரும் அப்பேச்சை உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார்.

1 Hospital, 2 Diarrhoea, 3 Dysentery, 4 Scurvy, 5 Gallic acid 6 Extract.

7 Diuretic, 8 Dropsy, 9 Emetic, 10 Ipecac, 11 Secretion 12 Infusion.

13 Expectorant, 14 Senega, 15 Bronchitis, 16 Syphilis.

பைபராசியங்கள்.

PIPERACEAE.

மிளகு. BLACK PEPPER.

வாசம். இது இர்துவிலுள்ள கொடி. மேற்கிந்து தீவுகளிலுஞ் செய்கை பண்ணப்படும்.

வாகடபகுதி. காய்ந்த காய். இது சிறுத்தது, உண்டையானது, சுருங்கினது; இதின் தோல் கபிலக் கறுப்புநிறம். அதற்குள்ளே நரை மஞ்சள் நிறமான உருண்ட கொட்டை இருக்கும். இதின் மணம் சுநந்தமும், சுவை கைப்பான காரமுமானது. இதிலே ஓர் அத்திர¹ எண்ணெய்யும் காரமான ராளமும், பைபெரின்² என்ற கிரிஸ்தற்³ பதார்த்தமும் அடங்கியிருக்கும்.

தன்மை. ஸ்திமுலம்⁴, காமினதி⁵, அந்திபிரூடி⁶; வெளியிற் பூசினால் ருபிவாஷன்⁷.

உபயோகம். அரிச⁸ நோய்கள், முறைச்சுரங்கள், வார்திபேதி, வெட்டை முதலிய நோய்களுக்கு இது வழங்கப்படும். பலவகையான தொண்டை நோய்களுக்கு இது கார்கி⁹லாகும்.

தேயம். பத்து முதற் பதினைந்து கிரேன் வரைக்கு. இதில் கூடவுங் கொடுக்கலாம். பைபெரினை அந்திபிரூடியாக ஆறு முதற்பத்துக் கிரேன் வரைக்கு நாள் இரண்டுமுறை கொடுக்கலாம்.

ரசிதம். மிளகுலேகியம். Confection of Pepper. கொள். மிளகு தாளாக, இரண்டு அன்சு; கறுவிக் கொட்டை¹⁰. மாவாக மூன்று அன்சு; சுத்த தேன் பதினைந்து அன்சு. குழியம்மியில் இட்டு நன்றாயரைத்துக்கொள்ளவும்.

தேயம். ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திரும் வரைக்கு நாள் இரண்டு மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம். முதியோர் பெலவீனருடைய அரிசநோய்க்கு இது உவந்தது. கடைக்குடல் நுகைந்து இறங்குதலுக்கும் இது உபயோகமானது.

அவின் லேகியம்¹¹ அவின் கூட்டுச்சூரணங்க¹²ளிலும் மிளகு ஓர் கூறுகச் சேருகின்றது.

வால்மிளகு. CUBE3.

வாசம். யாவகமும் மொலக்கமும்.

வாகடபகுதி. காய்ந்த காய். இது மிளகளைவு பருமையும் உண்டையுமாய்ச் சுருங்கிக் கறுத்துத் தன்னிலும் நீளமான காம்பிற் தொடுத்தபடியிருக்கும். காரமான கர்ப்பூரச் சுவையும், ஓர்வகையான சுநந்த மணமுமுடையது. இதின் ஒட்டுக்குள்ளே வன்மையும், வெண்மையும், உண்டையுமான

1 Volatile. 2 Piperine 3 Crystal. 4 Stimulant, 5 Carminative. 6 Antiperiodic.
7 Rubifacient, 8 Haemorrhoid. 9 Gargle. 10 Caraway fruit. 11 Confection of Opium, 12 Compound powder of opium.

நெய்ப்புள்ள சொட்டை இருக்கும். அதிலே ஓர் அத்திரதேலும்¹, காரமான ராஸ²மும், பைபெரி³னுக்குச் சரிபான குபெபின்⁴ என்ற கிரிஸ்தற்பதார்த்த மும், அமைந்திருக்கும்.

தன்மை. ஸ்திமுலம்⁵. இது விசேஷமாய்ச் சளிச்சவ்வீர்⁶ செஷ்டிக்கும். அதிலும் சன்னசல உறுப்புகளின் சளிச்சவ்விலேயே பிரதானமாய்ச் செஷ்டிக்கும்.

உபயோகம். கனுறீய⁷நோய்க்கு இது கைகண்ட மருந்து. மேலும் லுசறீயம்⁸, சிஸ்திரீயம்⁹, புரஸ்தகோள¹⁰த்தின் காலிகதாபிதம்¹¹, அரிசம்¹², காலிகமான சுவாச¹³நோய்கள், சுவாசக்குழல்நோய்களுக்கு இதைக்கொடுத்து நயங்கண்டது.

தேயம். முப்பது கிரேன்¹⁴ முதல் இரண்டுதிரும்¹⁵வரைக்கு நாள் மூன்றுநாலுமுறை கொடுக்கலாம்.

ரசிதம். வால்மிளகுத்தேல். Oil of Cubebs. வால்மிளகைத் திஸ்திலித்தே இது எடுக்கப்படும். இது நிறமற்றது; அல்லது வெளுநின் பச்சை மஞ்சள் நிறமும் வால்மிளகுக்குரிய மணம் சுவையுமுடையது.

தேயம். ஐந்து முதல் இருபது மினிம் வரைக்கு.

வால்மிளகிரஞ்சம். Tincture of Cubebs. கொள். வால்மிளகு, தூளாக இரண்டரை அன்சு; திட்டசீது¹⁶ அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்தில் வால்மிளகை பதினைந்து அன்சு சீதில் இரண்டுநாளுறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கி அப்பாற் சியந்தனி¹⁷யில் வார்த்தடைசி, நீர் ஒழுகினபின் சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும் விட்டு வடிக்கவும். அப்பாற் சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து நீர்களைக் கலந்து அரைநாழி தேறத் திட்டசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். முப்பது மினிம்¹⁸ முதல் இரண்டு திரும் வரைக்குக் கொடுக்கலாம்.

மதிகச்சேடி. MATICO PLANT.

வாசம். பெருதேசம்.

வாகடபதூதி. காய்ந்த இலை. இது இரண்டு இஞ்சு முதல் எட்டு இஞ்சுவரைக்கு நீளமானது. மேற்பக்கம் நாளங்களும் பல கோடுகளுமுள்ளது. கீழ்ப்பக்கம் மயிருள்ளது; சுகந்தமான சற்றே துவர்ச்சுவையும் நல்ல சுகந்த மணமுமுடையது.

தன்மை. துவர். தானிக¹⁹மாயிட்டால் வீறான ஸ்திப்திகு²⁰.

உபயோகம். இரத்தவாந்தி²¹, இரத்தாமுரி²², இரத்தஇருமல்²³, பெரும்பாடுகளுக்கும்²⁴சபல²⁵வகையானமற்றும் இரத்தப்பெருக்குகளுக்கும், லுகறீயம் அசத்துவ²⁶ கழிச்சலுக்கும், இது கொடுக்க நயங்காணும். வெளியான காயங்களினின்று பெருகும் இரத்தத்தைத் தடுப்பதற்கும் இது சித்தியுள்ளது.

1 Volatile oil. 2 Resin. 3 Piperine. 4 Cubebin. 5 Stimulant. 6 Mucous membrane. 7 Gonorrhoea. 8 Leucorrhoea. 9 Cystirrhoea. 10 Prostate Gland. 11 Chronic. 12 Inflammation. 13 Piles. 14 Grain. 15 Drachm.

16 Rectified Spirit. 17 Percolator. 18 Minim. 19 Local. 20 Styptic.

21 Haematemesis. 22 Haematuria. 23 Haemoptysis.

24 Menorrhoea. 25 Passive. 26 Atonic.

இரத்தத்தைத் தடுப்பதற்கு இலையின் கீழ்ப்பக்கத்தையாவது இலை மாவையா வது அது பெருகுமிடத்துக்கு அணைக்கவேண்டும்.

தேயம். இலையை மாவாக்கி, அரைத்திரும் முதல் ஒரு திரும் வரைக் குக் கொடுக்கலாம்.

ரசீதம். மதிகவின்வூசம். Infusion of Matico. கொள். மதிகவிலை, தாளாக வெட்டி, அரை அன்சு; கொதிநீர் பத்து அன்சு. மூடிய பாத்திரத் தில் அரைமணிநேரம் ஊறப்போட்டுச் சீலையில் வடிக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் நாலு அன்சு வரைக்குக் கொடுக்கலாம்.

அவாகடச்சாத்துகள். Non-Officinal.

நீப்பிலி. Long Pepper. இது இந்துதேசப் படர்செடி. காய்க்காக வங்காளத்திலும் இந்துவின் மற்றும் பகுதிகளிலும் இது செய்கைபண்ணப் படுகின்றது. காய் ஏறக்குறைய ஒரு இஞ்சு நீளமானது; திரண்டது; நரைக் கபிலநிறமும், சொற்ப சுகந்த மணமும், கார்ப்பான மெத்த உறைத்த சுவையுங்கொண்டது, மிளகைப்போல் இதிலேயும் ஓர் அத்திரதே¹லும் கார்ப்பான ராள்²மும், பைபெரி³னும் அடங்கியிருக்கும். அதைப்போலவே இதுவும் ஸ்திமுல⁴வாயுக்கின்⁵ தன்மைகளுடையதாயினும் அதிலும் அதிக வீறுள்ளது. பிரதானமாய்த் தொடுசுவையாக வழங்கப்படுவதே இதின் முக்கிய உபயோகம். பேரிபெரி⁶என்ற நோய்ப் பரிசுரிப்பில் மகமதியருக்குள் வழங்கப்படும் பின்வரும் மருந்தைப்பற்றிக் கொர்குலற்சுவைத்தியர் நயப்பாய்ப் பேசுகிறார். கொள். திப்பிலி இடித்து நாலு அன்சு; மிளகு, சுக்கு, வகைக்கு அரைஅன்சு; அரக்கு⁷ இருபது அன்சு. ஏழுநாளுறப்போட்டுச் சீலையில் வடிக்கவும்.

தேயம். ஒரு திரும் நாள் இரண்டுமூன்றுமுறை. இது வீறுன ஸ்திமுலம். கவனிக்கப்படத்தக்க வேறு விசேஷம் இதற்கில்லை. வேர், இந்துக் களுக்குள்ளே மெத்தப் பேர்பெற்றது; தலீச்செநீவி⁸லே பிப்பலிமூலம்¹⁰ என்று சொல்லப்பட்டது இதுதான். அதிலே இதைக் கைப்புஸ்தொமாகி¹¹, ரோசனியென்றும் சீரணத்தை நயப்படுத்துமென்றுஞ்சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. திருவாளங்காட்டிலே ஸ்திரிகள் பிரசவித்தபின் அணைய¹²த்தை விழுத்துவதற்கு இந்த வேர்க்கஷாயங் கொடுக்கப்படும். காய்க்குரிய ஸ்திமுல தன்மைகள் இதற்குக் கொஞ்சமாயுண்டுபோலும். தென்னிந்துவிலே தேசாவரம்¹³ என்ற பூண்டின் முடிச்சுள்ள சுகந்தமான வேரைக் குன்மத்துக்குக் கொடுக்கிறார்களென்று ஏன்ஸ்லி சொல்லியிருக்கிறார்.

வெற்றிலை. Betle leaf. இலைக்காகவே இந்துதேசமடங்கலும் இக் கொடி செய்கைபண்ணப்படும். இவ்விலையைப் பாக்குஞ் சுண்ணாம்புஞ் சேர்த்து மிகுதியான சனங்கள் சப்புவார்கள். வெற்றிலைச்சாறு நல்ல ஸ்தொமாகியாகக் கொள்ளப்படும். தென்னிந்துவிலுள்ள இந்துபிறித்தர் பொதுவாய் சதா¹⁴ருக்கும் சுவாச நோய்களுக்கும், விசேஷமாய்ப் பிள்ளைகளுக்கு, வெற்றிலையை வாட்டி எண்ணெய் பூசி நெஞ்சிலே படைபடையாய்ப் போடுவார்கள். தாங் கண்ட அளவில் சூட்டினாலும் பரமாணு படாமல் மூடுவதாலும் இதின் ருபிவாஷ¹⁵த்தன்மையினாலும் அனேகருக்குண்டாகக்

1 Volatile oil 2 Resin. 3 Piperine. 4 Stimulant, தீவகி. 5 Carminative. 6 Beri-beri. 7 Long pepper. 8 Arrack. 9 Taleef Shereef. 10 Peep'a mool. 11 Stomachic 12 Placenta. 13 Piper dichotomum. 14 Catarrh. 15 Rubifacient.

கூடிய சகாயத்தைப்பார்க்க இரும்பு முட்டுத்தொய்வில் இதால் அதிக சகாயங் காண்கிறதென்று வாறிங்கு பண்டிதர் சாட்சியிகிறார். இச் சாட்சிக்குச் சாட்சியாய் ஈரற் கஞ்செஸ்தத்¹திலும் மற்று நோய்களிலும் இதை யிட்டதாற் சகாயந்தோன்றினதைச் கண்டோமென்று கிப்சன் பண்டிதர் கூறுகிறார். வெற்றிலையை நெருப்பில் வாட்டிப் படைபடையாய் ஸ்தனங்களுக்கு இட்டால், பாலாறுதல் தடைப்படுமென்று வுட்டர் அறிவித்திருக்கிறார். இதற்குச் சார்பாய்ச் சாற்று வைத்தியரும் எழுதியிருக்கிறாரன்றிக் கோளவீக்கங்களைக் கரைப்பதற்கும் இது இடப்படுமென்கிறார்.

சாப்பு. *Chavica Officinarum*. இது மொலக்கதீவிலுள்ள ஓர் பூடு. காய்க்காக இந்துவீற் செய்கைபண்ணப்படும். இத்துப் பதார்த்தசாரத்தின் ஜாப்பம்² எனப்படுவது இதுவே. மிளகு திப்பிலிகளுக்குரிய ஸ்திமுல³காமினத்⁴த் தன்மைகள் இதற்கிருந்தாலும் கவனிச்சுப்படத்தக்க வேறு விசேஷம் ஒன்றும் இதற்கில்லை. அரிச⁵நோய்களில் இதினாலுண்டாகும் உபயோகத்தாதப்பற்றித் தலீச்செநீவு⁶ தூலிற் சொல்லப்பட்டது.

குபுலிவிரங்கள்

CUPULIFERAE.

குவேகஸ்மரம். QUERCUS ROBUR. OAK.

வாசம். இது யுரோபத்தின் சோலைகள் வேவிகளில் உண்டாகும் பெருமரம்.

வாகடபகுதி. சிறுக் கொப்புகள், இளந்தண்டுகளின் காய்ந்த பட்டை, இது முன் கோடையிற் சேர்க்கப்படும். இது ஒரு அடிமுதல் இரண்டு அடி நீளமுள்ள துண்டுகளாய் நரைநிறமுள்ள மினுக்கமானதோலால் மூடுண்டிருக்கும். உட்பக்கம் கறுவா நிறமுடையது; நாருள்ளது; நொருக்கலானது. ஏறக்குறைய மணமற்றது; வீரூன துவர்ச்சுவைகொண்டது. தனிக் கமில்⁷ கலிச்சமில்⁸களே இதின் சத்தான கூறுகள்.

நன்மை. இது கடுந்துவர்.

உபயோகம். காலிக தியறியத்திலும், திசந்தெரி¹⁰யின் பிற்கூறுகளிலும் முறைச் சுரங்களிலும் உபயோகமாகும். ஆயினும் இது பிரதானமாய் திகாத்த¹¹மாக்கப்பட்டுப்பூச்சாகவும், லுகறீயம்¹², சபலமெனுறீயம்¹³, கருப்பைப்பிதுக்கங்களுச்சுப்புகட்ட¹⁴லாகவும், கடைக்குடல் இறங்கல், அரிசநோய்க¹⁵ளுக்கு எஸீம்¹⁶மாகவும் உண்ணாக்கு¹⁷லகணங்க¹⁸ளின் நுகைவுக்கும், முரசுமெதுவாதல்புண்படல்களுக்குக்காரி¹⁹லாகவும்வழங்கப்படும். மேலும் பட்டைமாவைக் களியாக்கி, அழுகின கெட்ட புண்களுக்குக்கட்டுவதும் நலம்.

தேயம். பட்டையை மாவாக்கி அதில் அரைத்திரும் முதல் ஒருதிரும்வரைக்குக் கொடுக்கலாம்.

ரசீதம். குவேகஸ் திகாக்தம். Decoction of Quercus. கொள். குவே

1 Congestion, சஞ்சயம். 2 Chaab. 3 Stimulant. 4 Carminative. 5 Piles. 6 Taleef Shereef. 7 Tannic acid. 8 Galic acid. 9 Diarrhoea. 10 Dysentery. 11 Decoction. 12 Leucorrhoea. 13 Atonic menorrhoea. 14 Injection. 15 Haemorrhoides. 16 Enema. 17 Uvula. 18 Tonsil. 19 Gargle.

கஸ் பட்டை, இடித்து, ஒன்றேகால் அன்சு; தண்ணீர் அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்திலிட்டுப் பத்துமினி¹நேரம் அவித்துச் சீலையில் வடித்து, வடித்த நீர் அரைநாழியாய் வரத்தக்க அளவு திஸ்தில²நீரைச் சக்கையில் வார்த்து, வடித்துக்கொள்ளவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு வரைக்குக் கொடுக்கலாம். இது பிரதானமாய் வெளிமருந்தாய் வழங்கப்படும்.

மாசக்காய். GALLS.

வாயம். இந்தமரம் பார்சியதேசம்மட்டும் சின்ன ஆசியத்தில் உண்டாகும். வாசுடபநதி. காய்; திப்புலே³ என்ற ஈ முகையிற் குற்றித் தன் முட்டையை இடுவதால் இது உண்டாகும். இது வன்மையுங் கனத்ததுமான உண்டை. பருமை அரை இஞ்சு முதல் முக்கால் இஞ்சுவரைக்கிருக்கும். வெளிப்பக்கத்தில் முளைகள் காணும். முளைகளும் அவைக் கிடைவெளிக்கும் அழுத்தம். வெளிப்பக்கம் நீலமான பச்சைநிறம். உள்ளே வெண்மஞ்சள்நிறம். மையத்திலே ஒரு சிற்றறை காணப்படும். மெத்தத் துவரானது. தனிச்சுமில்⁴ கலிக்கமில்⁵ளே இதின் சத்தான கூறுகள்.

தன்மை. இது துவர், தொணிகம்⁶, அந்திபீராடி⁷. (64)

உபயோகம். குவேகஸ் பட்டையைப் போலவே. எமீதியத்தையும், அல்கலைவங்க⁸ளையும் அவின் அகனீதம்⁹ முதலிய அல்கலைவச்சத்தை அடக்கிய தாவரங்களையும் நஞ்சாகத் தின்றவர்களுக்கு இதின் திகாக்தம்¹¹ மாற்றாகக் கொடுக்கப்படும். அந்திமனிதாத்தரக¹²த்துக்கும் இது மாற்றாகுமென்று சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் இன்னும் இதைத் சோதித்தறியவேண்டும்.

தேயம். மாசக்காயை மாவாக்கி அதிற் பத்துக் கிரேன் முதல் இருபது கிரேன் வரைக்கு நான் மூன்று நாலு முறை கொடுக்கலாம்.

ரசிதங்கள் *மாசக்காய்த் திகாக்தம். Decoction of Galls. கொள். மாசக்காய் இடித்து ஒன்றேகால் அன்சு; தண்ணீர் அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்திற் பத்துமினி நேரங் காப்ச்சிச் சீலையில் வடித்து, வடித்த நீர் அரைநாழியாய் வரத்தக்க அளவு திஸ்தில நீரைச் சக்கையில் வார்த்து வடித்துக் கொள்ளவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு வரைக்குக் கொடுக்கலாம். விசேஷமாய்த்துவர்ச்சார்கில்¹³, எனீம்¹⁴, புகட்டல்¹⁵, லோஷன்க¹⁶ளாக இது வழங்கப்படும். மேலே சொன்ன நஞ்சுகளுக்கு மாற்றாகத் தாராளமாய் இதைக் கொடுக்கலாம்.

மாசக்காயிரஞ்சம். Tincture of Galls. கொள். மாசக்காய், இடித்து, இரண்டரை அன்சு; புருவுசீது¹⁷ அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்தில் மாசக்காயைப் பதினைந்து அன்சு சீதில், இரண்டுநாளுறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கவும். அப்பாற் சியந்தனியில் வார்த்து, நீர் ஒழுகினபின், சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும் விட்டு வடிக்கவும். அப்பாற் சக்கையைப் பிழிந்து, வடித்து, நீர்களைக் கலந்து அரைநாழிதேறப் புருவுசீது சேர்க்கவும்.

1 Minute of time. 2 Distilled. 3 Diplolapis. 4 Tannic acid. 5 Gallic acid. 6 Tonic. 7 Antiperiodic. 8 Emetia. 9 Alkaloid. 10 Aconite. 11 Decoction.

12 Antimony tartarate. 13 Gargle. 14 Enema. 15 Injection. 16 Lotion, தாவணி. 17 Proof spirit.

(64) அனுபத்தம்பார்.

தேயம். அரைத் திரும் முதல் இரண்டு திரும் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். தண்ணீரோடு கலந்து, துவர் லோஷன்களாக்கிச் சிலவேளை இது வழங்கப்படும்.

மாசக்காயன்கேன். Ointment of Galls. கொள். மாசக்காய், மா வாக்கி என்பது கிறேன்; பெஞ்சோயஸ்லாடி¹ அல்லது தனியன்கென்² ஒரு அன்சு. செவ்வையாய்க் கலக்கவும்.

மாசவவினன்கேன். Ointment of Galls with Opium. கொள். மாசக்காயன்கென், ஒரு அன்சு; அவின், மாவாக முப்பத்திரண்டு கிறேன். திறமாய்க் கலக்கவும்.

இந்த இரண்டு தைலங்களும் விசேஷமாய் மாசவவினன்கென், மூல முளைகளுக்குக் கைகண்ட பூச்சு.

தனிக்கமில்ம். Tannic Acid. இது மாசக்காயிலிருந்து எடுக்கப்படும். இதைக் குறிக்குஞ் சின்னமாவது; கா⁷ ஐ²² அ¹⁷. இது வெண்மஞ்சள் நிறமுள்ள பருபருக்கையான கட்டிகளாயாவது, மினுக்கமுள்ள மெல்லிய செதில்களாயாவது இருக்கும். கடுமையான துவர்ச்சுவையும் அமிலச்செயலு³ முள்ளது. தண்ணீரிலும் திட்டீதி⁴லும் தாராளமாய்க் கரையும். ஈதரிற்⁵ சொற்பங் கரையும். தண்ணீர்க்கரைவு செலதீ⁶ரை வெண்மஞ்சளாக அடையப்பண்ணும். அயபிரவுப்பு⁷லே⁸லக்கறுப்பாக அடையப்பண்ணும். இதைத் திறந்தபடி எரிக்க ஒன்றும் எஞ்சாது.

தன்மை. வீரண கயர்.

உபயோகம். சுவாசப்பை, இரைப்பை, கருப்பை, பிறக்கங்குளினின்றுபாயும் சபலவகையான இரத்தப்பெருக்குக்கு இது உபயோகமான உன்மருந்தாகும். முரசு உதிரக்கழலைகள், நாசிகளில் நின்று பாயும் இரத்தப்பெருக்குகளுக்கு இரத்தம் பொசியுமிடத்தில் தனிக்கமில்த்தை இட அது பெரும்பாலுந்தடைப்படும். இதை உள்ளேகொடுப்பதால் அசத்துவ¹⁰குன்மம்¹¹, தியறீயம்¹², புறங்குறீயம்¹³, கசம், குக்கலின் பிற்பாதம், லுகறீயம்¹⁴, நரம்புக்கலை¹⁵, முறைச்சுரங்கள் முதலான அனேகநோய்கள் நயமடையும். கசத்திற்காணும் கடும் வெயர்வையையும் கழிச்சலையும் மாற்றுவதற்காகவும் இது கொடுக்கப்படும். கண்ணோ¹⁶, மற்ற நயன ரோகங்கள், விரணங்கள்¹⁷, நீர் அதிகமாய்ப் பாயுஞ் சருமநோய்கள், ஈறு மூலமுளை¹⁸கள், அபானப்பிதக்கம், வெடிப்பு¹⁹கள், கணுறீயம்¹⁹, கிலீற்று²⁰, உமிழ்நீர்ப் பெருக்கு, பல்லீற்றிளக்கம், முலைப்புண்கள், வெடிப்பு²¹களைவிசேஷமாய் மாற்றுவதற்கே இது உபயோகமாகும்.

தேயம். இரண்டு கிறேன் முதற் பத்துக் கிறேன் வரைக்கு மாவாயாவது குளிகையாயாவது தண்ணீரிற் கரைத்தாவது, நாள் மூன்று நாலுமுறை கொடுக்கலாம். நெருக்கமாயுங் கொடுக்கலாம்.

தனிக்கமில்லரசிதங்கள். தனிக்கமில்சப்பாசிதுறி. Tannic Acid suppository, கொள். தனிக்கமில்ம் முப்பத்தாறு கிறேன். பெஞ்சோயஸ்லாடி¹ நாற்பத்துநாலு கிறேன். வெண்மெழுகு பத்துக்கிறேன்; தியுபுரோமதே²¹, தொண்ணாறுகிறேன். மெழுகையும் தியுபுரோமதே²¹யும்மென்ருட்டில் உருக்கி, தனிக்கமில்த்தையும் பெஞ்சோயஸ் லாட்டையும் முன்னமே குழி

¹ Benzoated Lard. ² Simple ointment. ³ Acid reaction. ⁴ Rectified spirit.

⁵ Ether. ⁶ Gelatine. ⁷ Persalt of iron. ⁸ Kidneys. ⁹ Passive. ¹⁰ Atonic.

¹¹ Dyspepsia. ¹² Diarrhoea. ¹³ Bronchorrhoea. ¹⁴ Leucorrhoea.

¹⁵ Nervous exhaustion. ¹⁶ Ophthalmia. ¹⁷ Ulcer. ¹⁸ Piles.

¹⁹ Gonorrhoea. ²⁰ Gleet. ²¹ Oil of Theobroma.

யம்மியில் ஒன்றாக அரைத்து, இவற்றோடு சேர்த்து எல்லாவற்றையும் தீர்ப்பாய்க் கலந்துகொள்ளவும். இக்கலவையை, நீர்த்திருக்கையிற் பதினைந்து கிதேன் கொள்ளத்தக்க தகுந்த குகைகளில் வார்க்கவும். அல்லது அதை ஆறவிட்டுப் பண்ணிரண்டு சமபங்குகளாகப் பிரித்துச் சப்பாசிதுறிக்குத் தகுந்த சாங்கமாக்கிக் கொள்ளவும்.

கடைக்குடலின் சளிச்சவ்வும் அயற்பகுதிகளும் நுகைவதாலுண்டான நோய்களுக்கு இடுவதற்கு இது உவந்தது. ஒவ்வொரு சப்பாசிதுறியிலும், இரண்டு கிதேன் தனிக்கமிலம் அடங்கியிருக்கும்.

தனிக்கமில் வில்லை. Tannic Acid Lozenges. கொள். தனிக்கமிலம், முந்நூற்றறுபது கிதேன்; தொலூரஞ்சம்¹ அரை அன்சு; சுத்தசர்க்கரை, மாவாக இருபத்தைந்து அன்சு; அகசிப்பிசின்², மாவாக ஒரு அன்சு; அகசிமுசிலாகு³ இரண்டு அன்சு; திஸ்திலித்த⁴ தண்ணீர் ஒரு அன்சு. தனிக்கமிலத்தைத் தண்ணீரிற் கரைத்துக்கொண்டு இதை முன்னமே முசிலாகோடு கலந்த தொலூரஞ்சத்தோடும், முன்னே சர்க்கரை மாவோடு கலந்த பிசினோடுஞ் சேர்க்கவும். முழுவதையுஞ் சரிபான திரளையாக்கி 720 வில்லைகளாகத் தட்டி வெப்பமான அறையில் உலர்த்தவும்.

ஒவ்வொரு வில்லையிலும் தனிக்கமிலம் அரைக்கிதேன் இருக்கும்.

துவர்மருந்து இடப்படவேண்டியதாய் வாய் தொண்டையிலுண்டாகும் பலவகையான நோய்களில் இந்த வில்லைகளை வாயிவிட்டு மெல்லக் கரையவிடுவது நலம். உள்மருந்தாக இவைகளில் நாள்வீதம் இருபது முப்பது வரைக்குத் தின்னலாம்.

தனிக்கமில் கிலேசரின். Glycerine of Tannic Acid. கொள். தனிக்கமிலம், ஒரு அன்சு; கிலேசரின் நாலு அன்சு. குழியம்மியில் இட்டு நன்றாயரைத்தபின்பு ஓர் பீங்கான் பாத்திரத்தில் வார்த்து, நன்றாய்க் கரையுந்தனையும் மென் குடு காட்டவும்.

இது ஓர் நயந்த கயரான வெளிப்பூச்சு.

கலிக்கமில்ம். Gallic Acid. இது மாசக்காயிலிருந்தெடுக்கப்படும் கிரிஸ்தலான்⁵ அமிலம். ஐ3 கா7 ஐ3 அ5 ஐ2 அ. என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்படும். இது சற்றுப் பளபளப்பும் மெல்லிதுமான ஊசிபோன்ற கிரிஸ்தலனாக இருக்கும். சிலவேளை ஏறக்குறைய வெண்மைபாயும் பெரும்பாலும் வெண்மஞ்சள் நிறமாயுமிருக்கும். இது நூறுபங்கு தண்ணீரிலும் மூன்றுபங்கு கொதிவெந்நீரிலுங் கரையும். திட்டசீதி⁶ லுங்கரையும். இதைத் தண்ணீரிற் கரைத்து, ஐசிங்கிளாகு⁷ க்கரைவோடு சேர்த்தால் அடையல்விழாது. அயபிரவுப்⁸ போடுசேர்த்தால் நீலக்கருமைமையான அடையல்விழும். கிரிஸ்தலான இந்த அமிலத்தை 212 பாகை சூட்டில் உலர்த்தினால் அதின் கிறையில் நூற்றுக்கு 9.5 பங்கு வீதமாய்க் குறையும். இதைத் திறத்தபடி வரிக்க ஒன்றும் எஞ்சாது.

தன்மை உபயோகம். தனிக்கமிலத்தைப் போலவே. இரத்தோட்டத்திற் செல்லுகையில் தனிக்கமிலமானது, கலிக்கமிலமாயும் திராட்சச்சர்க்கரையாயும் மாற அகிலோர்பங்குமாத்திரம் துவராய்ப் பிடிக்குமாகையால் இத்தன்மையில் கலிக்கமிலம் சமபங்கான தனிக்கமிலத்தைப்பார்க்கவீறுள்ளதாகும்.

1 Tincture of Tola. 2 Gum Acacia. 3 Mucilage. 4 Distilled. 5 Crystal. 6 Rectified Spirit. 7 Isinglass. 8 Persalt of Iron. 9 Grape Sugar.

தேயம். இரண்டு கிறேன் முதற் பத்துக் கிறேன் வரைக்கும் நாள் மூன்றுநாலுமுறையுங் கூடவுங் கொடுக்கலாம்.

ரசிதம். கலிக்கமில் கிலேசரின். Glycerine of Gallic Acid. கொள். கலிக்கமில் ஒரு அன்சு; கிலேசரின் நாலு அன்சு. இவற்றை உரலில் இட்டு ஒன்றாயரைத்துப் பின்பு ஒர் பீங்கானில் வார்த்துச் செவ்வையாய்க் கரையுந்தனையும் மென்குடு காட்டவும்.

அவாகடச்சரக்குகள். Non-Officinal.

ஆற்றுப்பாலை. Salix tetrasperma. இது இந்துவின் வடபகுதி மையப்பகுதிகளிலுள்ள சிறப்பான சிறுமரம். இதின் பட்டை கொஞ்ச அளவிற் சுரக்கினியாகுமென்று தல்செல் கிப்சன் என்பவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். பட்டையிலிருந்து ஓர் தொணிக²ப்பதார்த்தம் வருமென்று லாங்கு என்பவர் சொன்னார். யுரோபத்திலுள்ள சலிசு³ என்ற இனமான மரங்களினின்று எடுக்கப்படும் கிரிஸ்தற் பதார்த்தமாகிய சலிசைன்⁴ என்பது இதுதான் என்றதே அவர் எண்ணமாகில் அவ்வெண்ணந் தவறாகும். ஒஷான சிபண்டிதர் இப் பட்டையைக் கவனமாய்ச் சோதித்து அதிலே இது சொற்பமும் இல்லையென்று கண்டார். Salix Caprea. இம்மரம் இந்துஸ்தானி பாஷையிற் கிலாவு மரம் Khilaf எனப்படும். இதின் பூவிலிருந்து சுகந்தமும் தீவனமுமான நீரை வடிக்கிறார்கள். சிலவகையான நோய்களுக்கு இது நல்லதென்று பெயர்பெற்றிருக்கிறது. இந்த மரத்தின் சாம்பலை இரத்த இருமலுக்கு மருந்தாகக் கொள்வார்கள்.

உல்மாசியங்கள்.

ULMACEAE.

உல்மஸ்மரம். ULMUS.

வாகடம். இது யுரோபத்திலும் மத்திம ஆசியத்திலுமுண்டாகும்.

வாகடபகுதி. காய்ந்த உட்பட்டை. இது கபில மஞ்சள் நிறமும், உரப்பும், அரை லீன்⁵ தடிப்புமானது; மணமற்றது. சுவை வாணித்தன்மையும் சற்றே கைப்பும் துவருமானது. இதின் திகாத்த⁶த்துக்கு அயபிரகுலோறி ரஞ்சேர்க்கப் பச்சையாகும். செலத⁸நீர் சேர்க்க அடையல் விழும். மேற் சொன்ன சோதனைகள் காட்டுகிறபடி இதிலே தனின் இருப்பதன்றி உல்மின்⁹ என்ற ஓர் வகைப் பிசின் பதார்த்தமும் இருக்கும்.

தன்மை. இது அல்திறவ¹⁰ தொணிகமும் திமல்ச¹¹முமாகும்.

உபயோகம். காலிகமான சரும நோய்களுக்கு விசேஷமாய், குஷ்டம், சொறியி¹², ஏர்பிசு¹³ என்ற நோய்களுக்கு இதைச் சகாயமுண்டாசுமாம்.

ரசிதம். உல்மஸ்திகாத்தம். Decoction of Ulmus. கொள். உல்மஸ் பட்டை சிறிதாய் நறுக்கி இரண்டரை அன்சு; தண்ணீர் அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்திற் பத்துமினி நேரமாக அவித்துச் சீலையில் வடித்து அரைநா

1 Febrifuge. 2 Tonic. 3 Salix. 4 Salicine. 5 Line. 6 Decoction. 7 Perchloride of iron. 8 Gelatine. 9 Ulmin. 10 Alterative. 11 Demulcent.

12 Psoriasis. 13 Herpes.

ழிக்குப் போதிய தண்ணீரைச் சக்கையில் வார்த்து வடித்துக்கொள்ளவும்.
தேயம். இரண்டு அன்சு முதல் நாலு அன்சு.

வர்திசியங்கள்.

URTICAE.

லுப்புலஸ்கோடி LUPULUS, Hop plant.

வாசம். யுரோபத்திலும் மத்திம ஆசியத்திலும் இது வாடிக்கையாயுண்டாகும். மத்திம யுரோபத்திலும் ஐக்கமரிகத்திலும் அதிகமாய்ச் செய்கை பண்ணப்படும்.

வாகடபகுதி. பெண்கொடியின் காய்ந்த காய்கள். இவை பச்சை மஞ்சள்நிறமான செதில்களாக வரும். செதிலடியில் ஒட்டுந்தன்மையுள்ளபொன்மஞ்சள் நிறமான தூள் பிடித்திருக்கும். இதுவே லுப்பிலின்¹ எனப்படும். மணம் சுகந்தம், சுவை கைப்பு. இவற்றில் ஓர் அத்திரதே²லும் லுப்பிலீது³ என்ற ஓர்வகைப் பதார்த்தமும் அடங்கியிருக்கும்.

தன்மை. தொணிகம்⁴, ஸ்தொமாகி⁵, சொற்பநாகதிகம்⁶. லுப்பிலின் காமத்தைச் குறைக்குந் தன்மையுடையது.

உபயோகம். இதால் நயங்கண்டநோய்களுள், அபலகுண்மம்⁷, நித்திரையின்மையோடு கூடிய சிராநோய்கள், இஸ்தேரி⁸, முறைச்சுரங்கள், வாதம் என்பனவே விசேஷமானவைகள். சன்னசல உறுப்புகளின் சில அழற்சி நிலைமையில் உதாரணமாக ஸ்பமதுறீயம்⁹, சலவொழுக்கு, காட¹⁰ என்ற சிசினவளைவு முதலியவற்றில் லுப்புலின் மெத்த நயஞ்செய்யும்.

தேயம். லுப்புலினில் ஆறு கிறேன் முதற் பன்னிரண்டு கிறேன் வரைக்குக் குளிகையாக்கிக் கொடுக்கவும்.

ரசிதங்கள். லுப்புலசின்லுசம். Infusion of Lupulus. கொள். லுப்புலஸ்காய், அரை அன்சு; கொதிவெந்நீர் பத்து அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் இரண்டுமணிநேரமுறவிட்டுச் சீலையில் வடிக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு வரைக்குக் கொடுக்கலாம்.

லுப்பிலசிரஞ்சம். Tincture of Lupulus. கொள். லுப்புலஸ் காய் இரண்டரை அன்சு; புருவுசீது அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்தில் லுப்புலசைப் பதினைந்து அன்சு சீதில் இரண்டுநாளுறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கி அப்பாற் சியந்தனி¹¹யில் வார்த்து, நீர் ஒழுக்கினபின் சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும் வார்த்து வடிக்கவும். அப்பாற் சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து இரண்டு நீர்களையுங் கலந்து அரைநாழி தேறப் போதிய புருவுசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். அரைத் திரும்முதல் இரண்டு திரும்வரைக்குக் கொடுக்கலாம்.

1 Lupn'ine, 2 Volatile oil. 3 Lupulite. 4 Tonic. 5 Stomachic. 6 Narcotic.

7 Atonic Dyspepsia. 8 Hysteria. 9 Spermatorrhoea, 10 Chordee.

11 Percolator.

பூஷம். MULBERRY TREE.

வாசம். இது மேற்காசியத்திலுள்ளமரம். பூமியின் மத்திமபகுதிகள் அடங்கலும் செய்கைபண்ணப்படுகின்றது.

வாகடபகுதி. கனிந்த பழத்தின் சாறு. இது கருஞ்சிவப்புநிறமும் சொற்ப மணமும் புளிப்பான இனிய சுவையுமுடையது.

தன்மை. உபயோகம். இது நிறக்கும் பொருளாக மாத்திரம் வழங்கப்படும்.

ரசிதம். பூஷச்சிறுபம். Syrup of Mulberries. கொள். பூஷச்சாறு அரைநாழி; சுத்த சர்க்கரை இரண்டு இரூத்தல்; திட்டசீது, இரண்டரை அன்சு. பூஷச் சாற்றைக் கொதிக்கக் காய்ச்சி, ஆறினபின் அதை வடிக்கவும். வடித்த நீரைச் சொற்ப சூடாக்கி, அதிலே சர்க்கரையைக் கரைத்துச் சீதைக் கூட்டவும். இந்தக் களி 1.33 என்ற விசேஷகிராவிதம்¹ உடையதாயிருக்கவேண்டும்.

நேயம். ஒரு சிரும். இது சுறுக்கு நொதித்துப் பழுதாகுமாகையால் உஷ்டண தேசங்களில் வழங்கத் தகுந்ததல்ல. காக்கணங்கொடிப் பூவிற்குச் செய்த லோர் சிறுபம் இதற்குப் பதிலாகுமென்று சொல்லப்பட்டது.

சீமையத்தி. FIG.

வாசம். ஆசியம், தென்யுரோபம்.

வாகடபகுதி. பழவற்றல். இது சுருங்கி மெதுவானதாய் உரப்பும் கபிலநிறமுமாய் சர்க்கரை போன்ற பொருள்கால் மூண்டிருக்கும். பச்சுபிசுப்பான இனித்த பாணியையும் ஏராளமான சிறுத்த வைரக் கொட்டைகளையும் அடக்கியிருக்கும்.

தன்மை, உபயோகம். இமாலியம்⁴, திமல்சம்⁵, விரேசனி, போஷணி⁶. இது நிலவாகை லேகியத்திலோர் கூறாகுமன்றி மருந்தாய் வழங்கப்படுவது அரிது.

சுதேச ஆக்கியோர் சொல்லுகிறபடி இதின் அவுஷத தன்மையைப்பற்றிய முழு விபரமும் தாகஸ்தா என்பவரால் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

கஞ்சா. INDIAN HEMP.

வாசம். பார்சியத்தில் மேற்கு இமயம் வரைக்கும் இது வளரும். அதிக மாய்ச் செய்கைபண்ணப்படும்.

வாகடபகுதி. இந்துவில் வளரும் பென்செடியிற் பாணி வடியாமற் பூக்கிற காய்ந்த தலைப்பு. இலட்சணங்கள். தலைப்புகளானவை பூக்கள் சிறிலைகள், முற்றிய காய்களின் சேடத்தை தாங்கி மாறிமாரியிருக்கிற இரண்டொரு கிளைகள் பொருந்தியிருக்கும். ஏறக்குறைய இரண்டு இஞ்ச நீளமான திரளைகளாகச் சேர்ந்து முரனாயும் கரும்பச்சை நிறமாயும், தனக்

1 Rectified spirit, 2 Specific gravity. 3 Clitoria ternatea. 4 Emullient.
5 Demulcent. 6 Nutritive.

கேயுரிய மணங்கொண்டிருக்கும். கைப்புங் காரமுமான ஓர் ராள்¹மே இதின் சத்து.

தன்மை. ஸ்திமுல²மே இதின் முதற் தன்மை. இரண்டாவதாய் அனுடை³னும், செரத்வ⁴மும், அந்திஸ்பசி⁵யுமாகும். நாகதிக⁶அமுரிதி⁷த்தன்மை களும் பிரசவ நோக்காட்டைக் கிளப்புத்தன்மையும் இதற்குண்டென்று சொல்லப்பட்டது. ஆயினும் இதற்குப் போதிய அத்தாட்சியில்லை.⁽⁶⁵⁾

உபயோகம். ஏர்ப்பு, ஐருவோபி⁸, வெறிப்பைத்தியம் வெறிகளுக்கும், குழந்தைகளின் வலிப்புகளுக்கும், பலவகையான நுறல்சி⁹, சிரா¹⁰நோய்களுக்கும், இது கொடுத்து நயங்கண்டது. மேலும் வாந்திபேதி மெனுறீயம்¹¹, கருப்பை இரத்தப்பெருக்கு, வாசம், அருவிச்சுரம்¹², ஈளை, இதயத்தின் கரணப்பிசுகுகளுக்கும், மெத்த வருத்தம், சொறிவுடன் கூடிய சரும நோய்களுக்கும், இது வழங்கப்படும். கருப்பையின் செயலின்மையைப் பற்றி நெடுகநிற்கும் பிரசவத்தில் நோக்காட்டைக் கிளப்புவதற்காகவும் இது கொடுக்கப்படும்.

ரசிதங்கள். கஞ்சாவெசிறுத்து. Extract of Indian Hemp. கொள். கஞ்சா பருக்கன்துளாக ஒரு இரூத்தல்; திட்டசீது¹³, இரண்டுநாழி. கஞ்சாவைச் சீதில் ஏழுநாளுறப்போட்டு அந்த ரஞ்சத்¹⁴தைப் பிழிந்தெடுத்து, சீதின மிருதியான பங்கைத் திஸ்திலித்¹⁵தகற்றி, சேஷத்தை இளக்கமான எசிறுத்துப் பதமாய் வரத்தக்கதாய் நீர்மத்திக¹⁶த்தில் வரட்டிக்கொள்ளவும்.

தேயம். அரைக்கிறேன் முதல் இரண்டுக்கிறேன். கூடவுங்கொடுக்கலாம்.

கஞ்சாரஞ்சம். Tincture of Indian Hemp கொள். கஞ்சாவெசிறுத்து, ஒரு அன்சு; திட்டசீது அரைநாழி. கரைத்துக்கொள்ளவும்.

தேயம். ஐந்து முதல் இருபது மினிம்¹⁷ வரைக்கு. செயல்கண்டு திருப்பிக்கொடுக்கவும்.

[இந்து தேசத்திலே கஞ்சா பிரதானமாய் மூன்று வகையாய் வரும். 1 ராளம் எடுக்கப்பட்டாத காய்ந்த செடி. இது கஞ்சம்¹⁸ எனப்படும். 2 இலை. தான், பூக்களில் நின்று வடியும் ராளம். இது சுருசு¹⁹ என்று சொல்லப்படும். 3 இலையும், காயும். இது பாங்கி²⁰ எனப்படும். இவைகளை விட மாகுன்²¹ என்ற லேகியமும் ஒன்று உண்டு. இது இலை, காய்களோடு, வெண்ணெய் சர்க்கரை, மா, பால், சேர்த்துச் செய்த கூட்டு. கஞ்சாவையும் அதின் ரசிதங்களையும் பற்றிய கவனமான கெமிஸ்தசோதனை அவசியம் வேண்டும்]

அவாகடச்சாக்து. Non-Officinal.

ஆல். Banyan Tree. ஆலமரத்தில் வடியும் வெள்ளையான பால், இந்துக்களின் உள்ளங்காலில் உண்டாகும் தொல்லையான வெடிப்புக்கு மெத்தச் சித்தியான பூச்சாம். யுரோப மருந்துகள் இந்த நோய்க்குப் பலமுறையும் வாயாதபடியால் இந்தப் பாலைச் சோதிக்கலாம். ஆலம் பட்டைக்கு நல்ல தொணிக²²த்தன்மையுண்டென்று சுதேசிகள் கொள்ளுகிறார்களென ஏன்ஸ்லி சொல்லியிருக்கிறார். இதற்கு வேறு சாட்சியில்லை.

பேயத்தி. Ficus oppositifolia. இது வங்காளம், சோழமண்டலத்தி

1 Resin. 2 Stimulant. 3 Anodyne 4 Sedative, 5 Antispasmodic. 6 Narcotic. 7 Diuretic. 8 Hydrophobia. 9 Neuralgia. 10 Nervous disease. 11 Menorrhoea, 12 Hay fever. 13 Rectified spirit. 14 Tincture. 15 Distil. 16 Water bath. 17 Minim. 18 Gunjah. 19 Churru. 20 Bang 21 Majoon. 22 Tonic.

(65) அனுபந்தம்பார்.

லும் இந்துவின் மற்றும் பகுதிகளிலும் ஆற்றங்கரைகளில் உண்டாகிற சி
றுமரம். முடின்செநீவர் எழுதியிருக்கிறபடி இதின் பழமும், கொட்டையு
ம், பட்டையும், வீரூன வமனத்தன்மையுடையன. பழக் கொட்டையே
வமனத்துக்கு உவந்தது. காய்ந்தபின் ஈரம் படாதபடி நன்றாயடைத்த சீ
சாக்களிற் பேணியவைத்த கொட்டையே வாய்ப்பு. தேயம் ஏறக்குறைய ஓ
ருதிரும். இவ்வளவும் செயலில் நாலு ஆறு பழத்துக்குச் சரியாகும். பட்
டையின் வமனத்தன்மையோடு பேதியும் பெரும்பாலுங் காணும். பட்டை
யின் தேயம் நாற்பது முதல் அறுபது கிறேன்வரைக்காகும். பட்டையை
ப் பதினைந்து கிறேன் முதல் முப்பதுகிறேன் வரையில் நாள் மூன்று நாலு
முறை கொடுக்க அந்திபிராடி¹யாகிறதென்றும், இதில் அரைவாசிப்பிரமாண
த்தில் நல்ல தொணிகமாகிறதென்றுஞ் சொல்லியிருக்கிறது. சிறிய பேயத்
தி. *F. polycarpa*. முடின செநீவருடை பரீட்சையின்படி பேயத்தியின் அ
வுஷத தன்மைகள் எல்லாம் இதற்குமுண்டு. இந்த இரண்டு மரங்களின் த
ன்மைகளைப்பற்றி இன்னுமதிகமாயறிவது நல்லது.

அத்தி. *Ficus Racemoza*. Country fig tree. இதின் பால் துவர். அ
தை வெண்ணெய்யில் கலந்து இரத்தப்பெருக்கு, சர்க்கராமுரி, இரத்தாமுரி,
இவைகளுக்குக் கொடுப்பது நாட்டு வைத்தியம். அத்திப்பிஞ்சு பத்தியத்
துக்குதவும். அத்திக்கள்ளுத் தொணிகம், அல்திறவமாக வழங்கப்படும்.

நெட்டாவில் மரம். *Antiaris saccidora*. இது இந்துவின் மேற்கூப்
பகுதியிற் சோலைகளிலுள்ள மரம். அங்கே அதற்கு சுருக்கிறை² என்றும்
சூர்வுட்டு³ என்றும் நாமமிட்டிருக்கிறார்கள். பெலப்பும் இறுக்கமுமான
சிராயுள்ள இதின் பட்டைக்காகவே இது விசேஷமாய் மதிக்கப்படும். இப்
பட்டையை லகுவிற் பெயர்க்கலாம். கடுங் கைப்புள்ள இதன் கொட்டை
களுக்காகவே இது இங்கே குறிக்கப்பட்டது. இக்கொட்டையிலே அவு
ஷதத்துக்கு ஏற்ற ஓர் சத்து அடங்கியிருக்கிறதென்று நிம்மு என்பவர் சொ
ல்லியிருக்கிறார். இக் கொட்டையின் தன்மையைப் பற்றி இன்னும் ஆராய்
வது நல்லது.

மிரைசியங்கள்.

MYRICEAE.

அவாகடச்சரக்குகள். Non-official.

மருதமரம். *Myrica Sapida*. இது சற்லெச்சு⁴ தொடங்கி சில்கெற்று⁵
வரைக்கும் இமயமலையிலுள்ளது. இதின் பட்டை பற்னவுக்கும் பதிந்த
தேசங்களுக்கும் ஏற்றப்படும். அங்கே சுகந்த ஸ்திமுல⁶மென்று இது மெ
த்தப் பேர்பெற்றிருப்பதால் ருபிவாஷ⁷னாகவும் நாசிப்பொடியாகவும் அதை
வழங்குவார்கள். வாந்திபேதியால் வருந்தும் ஆளின் நாடித்துடிப்பைக் கி
ளப்புவதற்கு மருதம்பட்டையையும் சுக்கையும் மாவாக்கிக் கலந்து தேய்
ப்பது உத்தமமென்று ஏர்வின் பண்டிதர் சொல்லியிருக்கிறார்.

1 Antiperiodic. 2 Juzongry. 3 Kurwut. 4 Suttlej. 5 Silhet. 6 Aromatic
stimulant, 7 Rubetacient.

சவுக்துமாம். *Casuarina muricata*. இது அரக்கன் மலாக்காளிலுள்ள மரம். இந்துவிலும் அதிகமாய் வளர்க்கப்படும். இதின் பட்டை காலிக¹தியறீயம்² திசந்தெரி³யின் பரிகரிப்பிற் சுறுக்குச் சம்பாதிக்கக்கூடிய உத்தமமான துவர்மருந்தென்று கிப்சன் பண்டிதர் சொல்லியிருக்கிறார். இவ்வருப்பான நோய்களுக்கு இது வழங்கப்படுவதைப் போதன் என்பவரும் குறித்திருக்கிறார்.

கோனிவ்விரங்கள்.

CONIFERAE.

கனடபல்சமரம். BALM OF GILEAD FIR.

வாசம். வட அமரிகத்தில் கனடம் நவஸ்கஷம் தொடங்கி சுறுலீனம் வரைக்கும் இது உண்டாகும்.

வாகுடபகுதி. தண்டிற் கீற வடியுந் தர்ப்பந்தின்⁴. இது கனடபலசம்⁵ எனப்படும். இது மெல்லிய தேன்பதமும் வெண்மஞ்சள் நிறமுமுள்ள, மெதுவான தேலராளமாய் வரும். தனக்கேயுரிய ஓர்வகை நல்மணமும் சற்றே கைப்புங் கார்ப்புமான ஈவையும் இதற்குண்டு. திறந்தபடி வைத்துவிட்டால் மெல்ல வரண்டு உருவொளியுள்ள, ஒட்டத்தக்க வாணிசாய் வரும். இஃதையும் இதின் நிறையில் ஆறிலொருபங்கு அளவான மக்னீசிய⁷ையுங்கலக்க இறகும்.

தன்மை. உபயோகம். இது, ஸ்திமுலம்⁸. விசேஷமாய்ச் சளிச்சவ்வி⁹லே சேஷ்டிக்கும். உன்மருந்தாய் வழங்கப்படுவதரிது. கொப்புளத்தாளிலும் சவட்கலோடிய¹⁰த்திலும் இது ஓர் கூறுகின்றது.

தேயம். இருபது தொடங்கி மூப்பது கிறேன்வரைக்கு.

பெர்கன்றிராள¹¹மரம். SPRUCE FIR.

வாசம். நோர்வே, ருசியம், ஜேர்மனி, சுவிற்சலந்து தேசங்களிலும் யுரோபத்தின் மற்றும் பகுதிகளிலும் ஆசியத்தின் வடபகுதிகளிலும் இது உண்டாகும். இங்கிலந்தில் வாடிக்கையாய் வளர்க்கப்படும்.

வாகுடபகுதி. அடிமரத்தில் வடியும் ராளம். இது உருக்கி வடிக்கப்படும். இதுவே பெர்கன்றிராளம். வன்மையும் நொருக்கலுமானது. ஆபினும் படிப்படியாய் அது விடப்பட்டிருக்கும் பாத்திரத்தின் சாங்கமாய்ப் படியும். மங்கலானது. நிறத்தில் விகற்பமடையக்கூடியதாயினும் பெரும்பாலும் மங்கலான செங்கபிலநிறமாயிருக்கும். ஓர்வகையான புகைத்த நறுமணமும் சுகந்த¹²மான ஈவையுமுடையது. கைப்பற்றது. வாயுக் குமிழ்க¹³ளில்லை. குடாக்க நீராவியைக் கக்காது.

தன்மை. உபயோகம். இது ஸ்திமுலம், ருபிவாஷன்¹⁴, பற்றாக மாத்திரம் வழங்கப்படும்.

1 Chronic. 2 Diarrhoea. 3 Dysentery. 4 Turpentine. 5 Canada Balsam. 6 Oleo-resin. 7 Magnesia 8 Stimulant. 9 Mucous membrane. 10 Flexible collodium. 11 Burgundy pitch. 12 Aromatic, 13 Vesicle. 14 Rubefacient.

ரசிதம். பிற்சுப்பிலாஸ்தர். Pitch Plaster. கொள். பெர்கன்றிராளம், இருபத்தாறு அன்சு; தெறிபிந்தம்¹, பதின்மூன்று அன்சு; குங்குலிய²மும், செம்மெழுகும், வகைக்கு நாலரை அன்சு. பிழிந்த சிடத் தேலம்³, ஒரு அன்சு; ஒலீவதேலம்⁴ இரண்டு அன்சு; தண்ணீர் இரண்டு அன்சு. தெறிபிந்தம், பெர்கன்றிராளம், குங்குலியம், மெழுகு இந்த நாலையும்து முன்னமே உருக்கி. அவற்றோடு எண்ணெய்களையும் தண்ணீரையுஞ் சேர்த்து, ஓயாமற் கலக்கித் தகுந்த பதத்துக்கு வறட்டிக்கொள்ளவும்.

நாட்பட்ட இருமல்கள் மற்றும் சுவாசநோய்களில் நெஞ்சுக்கு இடுவதற்கும், இடுப்பு வலியில் இடுப்புக்கு இடுவதற்கும் இது சொற்ப தீவனியான பற்று.

அயபற்றில் இது ஓர் கூறுகச் சேருகின்றது.

சதுவற்பைன் மரம். SWAMP PINE.

குந்துருப்பைன்மரம். FRANKINCENSE PINE.

வாசம். வட அமரிகத்தின் தென் நாடுகளில் இது உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. உறைந்த பாணி. இது தெறிபிந்தம் எனப்படும். இது மெதுவும் நன் மஞ்சள் மங்கலுமான கட்டி. ராளத்⁵தன்மை கொண்டதாயினும் உரத்தது. தர்ப்பந்தீனின்⁶மணமுடையது.

தன்மை உபயோகம். இது ஸ்திமுலம், உள்மருந்தாகக் கொடுப்பதில்லை. இது பிற்சுப்பிலாஸ்தரில் ஓர் கூறுகச் சேருகின்றது.

ரசிதம். தெறிபிந்துத்தேலம். தர்ப்பந்தீன். Oil of Turpentine. இது மேலே சொன்ன இரண்டு மரங்களில் நின்றும், சிலவேளை பிளாஸ்தர்⁸ என்ற பைன் மரத்தினின்றும் வடிகிற தேலராளத்தைத் திஸ்திலித்⁹தெடுக்கும் எண்ணெய். இது நிறமற்றதும், தெளிந்ததும், லேசிற சுவாலிக்கக் கூடியதுமான நீர். தனக்கேயுரிய வீருன மணமுங் கார்ப்பான சுவையுங் கொண்டது. தண்ணீரிற் சொற்பமாய்க் கரையும். அலக்காலில்¹⁰ மட்டாய்க் கரையும். ஈதரிற்¹¹ கெதியாய்க் கரையும். திர எண்ணெய்¹²களில் எந்தவீதமாயுங் கலக்கும். குங்குலியங்களையும் நிணங்களையும் கூச்சுக்கை¹³யும் இது கரைக்கும். 0.86 என்ற விசேஷகிராவிதம்¹⁴ உடையது. பரமானுவில் வைத்தால் அக்சித¹⁵ வாயுவை உறிஞ்சி சாடையான மஞ்சள்நிறமுஞ் சற்றே தடிப்புமாய் வரும். சுத்தமாயிருக்கையில் சோதனைத்தா¹⁶ளுக்குத் தடஸ்தமாய் நிற்கும்.

தன்மை. ஸ்திமுல¹⁷மே இதின் முதலான தன்மை. பிரதானமாய்ச் சளிச்சவ்¹⁸விலும் அதிலும் விசேஷமாய்ச் சன்னசல உறுப்புகளின் சளிச்சவ்வினும் இது சேஷ்டித்துச் சிறுநீரை அதிகப்படுத்தித் தன் சுயமணத்தையும் அதற்குவிடும். இரண்டாவதான தன்மை, செரதீவ¹⁹மும், அந்திஸ்பசி²⁰யுந்துவருமே. பெருந்தேயத்தில் விரேசனியும் கிருமிகொல்லியுமாகும். தானிகமாய் அணைத்தால் நல்ல ருபிவாஷ²¹னும் எதிரழற்சி²²யுமாகும்.

உபயோகம். சன்னிச்சுரம், சன்னிவச்சுரங்களிலும் எவ்வகைத் தொ

1 Common frankincense or Terebinthina. 2 Resin. 3 Oil of nutmeg. 4 Olive oil. 5 Resin. 6 Turpentine. 7 Pitch plaster. 8 Pinaster. 9 Distil. 10 Alcohol. 11 Ether. 12 Fixed oil. 13 Caoutchouc. 14 Specific gravity. 15 Oxygen. 16 Test paper. 17 Stimulant. 18 Mucous membrane. 19 Sedative. 20 Antispasmodic. 21 Rubefacient. 22 Counter irritant.

டக்கமுன்ன சுரங்களின் பிற்கூற்றிலும் அசத்துவ தாபிதங்களில் விசேஷமாய்ச் சுஷாசப்பைத் தாபிதத்திலும் சீவசத்துவங் குன்றின மற்றுநோய்களிலும் இது உத்தம ஸ்திமுலமாகும். பிரசவ சுரத்துக்கு இது கைகண்ட மருந்தென்று பாராட்டப்பட்டாலும் அதற்குப் போதிய அத்தாட்சியில்லை. இரத்த இருமல் முதலிய சபல இரத்தப்பெருக்குக்கும் விசேஷமாய்க் கசத்திற் காணும் இரத்தப்பெருக்குக்கும், இரத்தவார்தி¹, இரத்தாமூரி², மெனுறியங்க³ளுக்கும் கருப்பை, மூலமுளைகளினின்றுபாயும் இரத்தப்பெருக்குக்கும், இத்துவர் நன்றாய்ப் பிடிக்கும். இஸ்தேரி⁴, எபிலெப்சி⁵, பிரசவ வலிப்புக்கள் மற்றும் உலிப்புகள், ஏர்ப்புகளுக்கும், குடலடைப்பு, வங்கவலி⁶, வாயுப் பொருமல் வலிகளுக்கும் இது உத்தம அந்திஸ்பசியாகும். கீரைப்பாம்பு, தீனியப்புழுக்க⁷ளைக் கழற்றுவதற்கு இது நல்ல கிருமிகொல்லியாகும். மேலும் எமஹெச்சப்பெபூறம்⁸, தளர்ச்சியோடு கூடிய மூலனோய்கள் பித்தக்கற்கள் திசந்தெரி⁹யின் பிற்கூறு, கனுறியம்¹⁰, லுகறியம்¹¹, நீர்க்கோவை வார்தி பேதிகளுக்கும், கண் வியாதிகளுக்கும், அவைகளுள் விசேஷமாய் வாதம் சிவ்வி¹²க¹³ காரணமாயுண்டான இரிசீது¹⁴க்கும், கர்ணி¹⁵யமுகவின் தொடக்கத்துக்கும் இம் மருந்து கொடுத்து நயங்கண்டது. ஈத¹⁶ரோடு சேர்த்துக் கொடுத்தாற் பித்தக் கல்லைக் கரைக்குமாம். வெளிமருந்தாக இது வேக்காட்டுக்காய்கள், கோதங்கள்¹⁷, சீர்கெட்ட மந்த விரணங்களுக்கும், காலிகவாதம் நூறல்¹⁸, ஈனை¹⁹, குறுப்பு²⁰ பொருத்து வீக்கங்களுக்கும் பல்லுப் பிடுங்கினபின் காணும் இரத்தப்பெருக்குக்கும் வழங்கப்படும். சீர்கெட்ட புண்களில் உள்ளுக்குங் கொடுக்கலாம்.

தேயம். அமுரிதி²¹, துவராக இதை எட்மீனியம்²² முதல் முப்பது மினிம் வரைக்கும் ஸ்திமுலம்²³ அந்திஸ்பசியாக அரைத்திரும் முதல் ஒரு திரும் வரைக்கும் விரேசனி கிருமிகொல்லியாக அரை அன்ச முதல் ஒரு அன்ச வரைக்குங் கொடுக்கலாம். எதிரழற்சியாக இதை லீனிமெனாக²⁴வாவது அன்செனாக²⁵வாவது பூசலாம். அல்லது தர்ப்பந்தீன் தேலைச் சீலையிற் தோய்த்துத் தோலில் இட்டு அனலாக்கிய கம்பளியை மடித்து அதற்கு மேலே அணைத்துவிடலாம். இப்படி இட்டாற் சுறுக்கு நிச்சயமாய்ப் பிடிக்கும்.

தர்ப்பந்தீனின் சித்தங்கள். Preparations of oil of Turpentine. தர்ப்பந்தீன் லேகியம். Confection of Turpentine. கொள். தர்ப்பந்தீன் தேல் ஒரு அன்சு; அதிமதுர வேர்த்தாள் ஒரு அன்சு; சுத்த தேன் இரண்டு அன்சு. தர்ப்பந்தீன் தேலை அதிமதுரத் தூளோடு சேர்த்து அரைத்துத் தேனைக் கூட்டிச் செவ்வையாய்க் கலக்கவும்.

தேயம். ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திரும் வரைக்குக் கொடுக்கலாம்.

தர்ப்பந்தீனேனீம். Enema of Turpentine, கொள். தர்ப்பந்தீன், ஒரு அன்சு; தடித்த கஞ்சி பதினைந்து அன்சு. கலக்கவும்.

இஸ்தேரி வலிகள் மற்றும் வலிகளுக்கும், அங்கவிகிர்தி²⁶க்கும், தர்ப்பந்தீனை வாயாலே கொடுக்கக்கூடாத வேளைகளுக்கும் இது உபயோகமானது. காய்ச்சலின் பிற்பாதங்களில் வாயுப்பொருமலைத் தணிக்க உவந்தது. கடை

1 Haematemesia, 2 Haematuria. 3 Menorrhoea, 4 Hysteria. 5 Epilepsy
6 Lead colic. 7 Antispasmodic, 8 Taenia. 9 Purpura Haemorrhagica; 10 Dysentery. 11 Gonorrhoea. 12 Leucorrhoea. 13 Syphilis. 14 Iritis.
15 Cornea. 16 Eiter. 17 Gangrene. 18 Neuralgia. 19 Asthma.
20 Croup. 21 Diuretic. 22 Minim. 23 Stimulant. 24 Liniment. 25 Unguent, 26 Apoplexy.

ச்குடலினின்று தானப் புழுவைக் கழற்றத் தகுந்தது.

தர்ப்பந்தீன் லினிமென். Liniment of Turpentine. கொள். மென் சபு¹ இரண்டு அன்சு; பூரம்² ஒரு அன்சு; தர்ப்பந்தீன்³ தேல் பதினாறு அன்சு. பூரத்தைத் தர்ப்பந்தீன் தேலிற் கரைத்துச் சபுவையுஞ் சேர்த்து இவை தீர்ப்பாய்க் கலக்குந்தனையும் அரைக்கவும்.

தர்ப்பந்தீனசீதிக்மில் லினிமென். Liniment of Turpentine and Acetic acid. கொள். தர்ப்பந்தீன் தேல், அசிடிக்மில்ம், பூரலினிமென், வகைக்கு ஒரு அன்சு. கல.

வாதம், துறல்சி⁴, மற்றும் வருத்தமான காலிக நோய்களுக்கு இந்த லினிமென்கள் இரண்டும் உவந்த ஸ்திமுலஸ்⁵ ரூபிவாஷ⁶ பூச்சுகளாகும்.

தர்ப்பந்தீனஓகென். Ointment of Turpentine. கொள். தர்ப்பந்தீன் தேல், ஒரு அன்சு; ராளம், பருக்கன் தூளாக, அறுபதுகிறேன்; செம்மெழு கு, பூதலா⁷, வகைக்கு அரை அன்சு. எல்லாவற்றையும் ஸ்தீம்⁸ சூட்டி லாவது நீர்மத்திக்⁹த்தின்சூட்டிலாவது ஒன்றாகக் கலந்து பாத்திரத்தோடு இறக்கி, ஆறும்போது ஓயாமற் கலக்கவும்.

மந்தமான சீர்கெட்ட புண்களுக்கு இது நல்ல தீவன பூச்சாகும்.

ராளம். Resin. இது பைன், அபீஸ்¹⁰ என்ற மர இனங்களினின்று வடியும் தர்ப்பந்தீனைத் திஸ்திலிக்க எஞ்சும் சேடம். இது உருவொளியும் சற்றே மங்கலும் சாடையான மஞ்சள்நிறமும் நொருக்கலும் மாவாக்கப்படக் கூடியதுமானது. ஒடிவு மினுக்கமுள்ளது, மணம் சுவை சொற்பமாய்த் தர்ப்பந்தீனைப் போன்றது. லகுவில் உருக்கூடியது. கனத்த மஞ்சள்நிறச் சுவாலெகொண்டு அதிகமாய்ப் புகைத்து எரியும். தண்ணீரிற் கரையாது. அலக்கால்¹¹, ஈதர்¹²களிலும் அத்திர எண்ணெய்களிலும் கரையும். மெழுகு, திரஎண்ணெய்¹³கள், திமிநெய்க்¹⁴ளோடு உருகிச்சேரும். இதைத் திஸ்திலிக்க, ராளத்தேல் என்ற எண்ணெய்யும் தாரும்¹⁵ பிறக்கும்.

தன்மை உபயோகம். இது ஸ்திமுலம். வெளிமருந்தாக மாத்திரம் வழங்கப்படும். வாகடத்துக்குரிய பல பிலாஸ்தர்களில் இது ஓர் கூறுகச் சேருகின்றது.

ரசிதங்கள். ராளப்பிலாஸ்தர். Resin Plaster. கொள். ராளம், அரை இருத்தல், ஈயப்பிலாஸ்தர் மூன்று இருத்தல். ஈயப்பிலாஸ்தரை மென்சூட்டில் மெல்ல உருக்கிக்கொண்டு, வேராய் உருக்கின ராளத்தை அத்துடன் சேர்த்து இரண்டுந் தீர்ப்பாய்ச் சேருந்தனையுங் கலக்கவும்.

இது தானிக ஸ்திமுலம்¹⁶; காயங்கள் முதலியவற்றுக்குத் தாபரமாயிடப்படும். அவின்பற்று, பெலடன¹⁷ப்பற்று, வெம்பற்று¹⁸, ஈயவியோதிரப்பற்று¹⁹களில் இது ஓர் கூறுகச் சேருகின்றது.

ராளவன்கென். Ointment of Resin. கொள். ராளம் பருக்கன் மாவாக, எட்டு அன்சு; செம்மெழு கு, நாலு அன்சு; லாடன்கென்²⁰, பதினாறு அன்சு. எல்லாவற்றையும் மென்சூட்டில் ஒன்றையுருக்கிச் சூடாயிருக்கையிற் கம்பளியில் வடித்து, ஆறும்போது ஓயாமற் கலக்கவும்.

மந்தமான சீர்கெட்ட புண்களுக்கும் விசேஷமாய் வேங்காட்டுப் புண்க

1 Soft soap. 2 Camphor. 3 Turpentine. 4 Neuralgia. 5 Stimulant. 6 Rubefacient.

7 Prepared lard. 8 Steam. 9 Water bath. 10 Abies. 11 Alcohol. 12 Ether.

13 Fixed oil. 14 Spermaceti. 15 Tar. 16 Local stimulant.

17 Belladonna. 18 Warm plaster. 19 Plaster of Iodide of lead.

20 Simple ointment.

ஞக்கும், இது தீவன தைலம். மேலும் கொப்புளித்த புண்களை ஆறும்ஸ் நீர் பொசிந்துகொண்டிருக்கப்பண்ணுவதற்கும் இது உவந்தது.

காட்டுப்பைன். WILD PINE.

வாசம். இது ஸ்கற்லந்து, தென்மார்ச்சு, நோவேயின் மேட்டுப்பகுதிகளிலும் யுரோபத்தின் மற்றும் வடபகுதிகளிலும் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. நாச திஸ்த்லிப்¹பாற் பைன் மரங்களினின்று எடுக்கும் கிசில். இது மரத்தார்²எனப்படும். இது தடித்த பிசுபிசுப்பான ஒட்டுநீர். கருங்கபிலநிறமும் ஒர்வகைச் சுகந்த மணமுமுடையது. தண்ணீரை இதோடு சலக்க, அத் தண்ணீர் வெண் கபில நிறமாயுங் கார்ப்பான் புகைமணங்கொண்டதாயும் அமிலத்தகை³ உடையதாயும் வரும்.

தன்மை. இது ஸ்திமுலம்⁴. இதின் செயல் விசேஷமாய்ச் சளிச்சவ்வினும் தோலிலுமே விளங்கும்.

உபயோகம். சருமநோய்களுக்கு இது உள்ளுக்கும் வெளிக்கும் வழங்கப்பட்டு நயங்கண்டது. மேலும் சன்னிவச்சுரத்துக்⁵கும் வாடிக்கையான மலவரட்சிக்கும், காலிக புறங்கீது⁶க்கும் வழங்கப்பட்டது. எரியுந் தாரினின்று எழும்பும் ஆவி கசரோகத்துக்கும், மற்றும் காலிக சுவாச நோய்களுக்கும் உவந்ததாகக் காணப்பட்டது.

தேயம். அரைத் திரும் முதல் ஒரு திரும் வரைக்கு கோதுமை டாவோடு சேர்த்துக் குளிகையாக்கி நாள் மூன்று நாலு முறை கொடுக்கலாம்.

ரசிதங்கள். தாரன்கென். Ointment of Tar. கொள். தார், ஐந்து அன்சு; செம்மெழுகு இரண்டு அன்சு. மெழுகை மென்சூட்டிலுருக்கித் தாரைக் கூட்டி அக்கலவை ஆறுப்போது செதியாய்க் கலக்கவும்.

படர்⁷தேமாலுக்கும், சொறியசிக்கு⁸ மற்றும் சருமநோய்கள் புண்களுக்கு இது இடப்படும்.

கிரீயசற்று. Creasote. மரத் தாரைத் திஸ்திலிக்க வரு நீர். இது நிற மற்றது அல்லது சற்றே மஞ்சள் நிறமுடையதாய் வீரான புகைமணங்கொண்டிருக்கும். தண்ணீரிற் சொற்பமாய்க் கரையும். அலக்கால்⁹ ஈதர்¹⁰களிலும் கிலாசியலசுதிக்கமில¹¹த்திலும் தாராளமாய்க் கரையும். 1.071 என்ற விசேஷகிராவிதம்¹² உடையது. இது அல்புமி¹³னை உறைவிக்கும். பைன்¹⁴ தடியை இதிற்தொட்டுப் பின்பு ஐருகுலோறிக்கமில¹⁵த்திஸ்தொட அது சற்று நேரம் பரமானுவிலிருந்தபின் பச்சையான நீலநிறமடையும். ஊறுதாளி¹⁶லே ஒரு துளியை விட்டு 212 பாகை சூட்டில் பிடிக்க தெளிந்த பொட்டு, நில்லாது. போலறிச வெளிச்ச¹⁷கிரணத்தின் பரவையை இது வலப்பக்கத்துக்குத் திருப்பும். ஐருகுலோறிக்கமிலமும் சோடசல்வசு¹⁸ஞ் சேர்த்த கலவையிலுண்டாகுங் குளிரால் இது இறுகாது.

தன்மை. முதலாவதாய் ஸ்திமுலம், இரண்டாவதாய் செரதீவம்¹⁹. தானிகமாய் இட்டால் அழற்சி²⁰யும் காரமு²¹மாகும். மேலும் அல்புமினை உறைவிக்கும் தன்மையைக்கொண்டு அந்திசெப்தி²²யாய்ச் சேஷ்டிக்கும்.

1 Destructive distillation. 2 Tar. 3 Acid reaction. 4 Stimulant 5 Typhoid fever. 6 Chronic Bronchitis. 7 Ring worm. 8 Psoriasis. 9 Alcohol. 10 Ether. 11 Glacial acetic acid. 12 Specific gravity. 13 Albumen. 14 Pine. 15 Hydrochloric acid. 16 Filtering paper. 17 Polarized light. 18 Sulphate of soda 19 Sedative. 20 Irritant. 21 Caustic. 22 Antiseptic.

உபயோகம். இரைப்பை அழற்சியிலும் குன்மத்திலும் தாபிதத்தோடு கூடாத வாந்தியிலும் இதால் மெத்த நயமுண்டாகும். மேலும் தியறீயம்¹ விபல இரத்தப்பெருக்கு² கனுறீயம்³ லுகறீயங்க⁴ளுக்கு இது கொடுத்துச் சித்தி பெற்றது. சர்க்கராழிரீ⁵க்கும் நல்லதாம். வெளிமருந்தாகச் சருமநோய்களுக்கும் காதனப்புண்⁶ சயதப்புண்⁷, கிடைப்புண்களுக்கும் நீவசு⁸, எரிசிப்பிலசு⁹, சிவ்விசு¹⁰க் கழலைகளுக்கும் இது உழங்கப்பட்டது. கிறீயசற்றுத்தாவனியை¹¹ நாசித்துவாரங்களுக்குள்ளே நாள்தோறும் பலமுறை புகட்டுவதால் பார்சிளோமம்¹² நயந்திருக்கின்றது. கோறைப்பல்லுச்சுள் அடைசப் பற்கொதி பலமுறையுந் தணியும். இது உமிழ்நீரைப்பெருக்கும். இதின் ஆவியைச் சுவாசித்தல் காலிகபுறங்கீது¹³க்கும் காலிகமான மற்றுஞ் சுவாச வியாதிகளுக்கும் உபயோகமாய்க் காணப்பட்டது.

தேயம். ஒரு மினிம்¹⁴ முதல் மூன்று மினிம் வரைக்குக்குளிகையாக்கியாவது பின்வருங் கலவையையாவது கொடுக்கலாம்.

ரசிதங்கள். கிறீயசற்றுக் கலவை. Creasote Mixture. கொள். கிறீயசற்று, பதினாறு மினிம்; கிலாசியல் அசிதிக்கமில்¹⁵ பதினாறு மினிம்; சூனிபச்சீது¹⁶, அரைத்திரும்; சிறுபம்¹⁷ ஒரு அன்சு; தண்ணீர் பதினைந்து அன்சு. கிறீயசற்றை அசிதிக்கமில்த்தோடு சேர்த்துத் தண்ணீரைப் படிப்படியாய்க் கலந்து கடைசியாய்ச் சிறுபத்தையும் சூனிபச்சீதையுஞ் சேர்க்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு வரைக்கு நான் மூன்றுநாலு முறை கொடுக்கலாம். ஒவ்வொரு அன்சிலும் கிறீயசற்று ஒரு மினிம் இருக்கும்.

கிறீயசற்றன்கென். Ointment of Creasote. கொள். கிறீயசற்று, ஒரு திரும்; லாடன்கென்¹⁸, ஒரு அன்சு. திறமாய்க் கல.

இது சரும நோய்களுக்கும் புண்களுக்கும் ஓர் தீவன பூச்சாகும்.

கிறீயசற்றுச்சுவசனம். Inhalation of Creasote. கொள். கிறீயசற்று, பன்னிரண்டு மினிம்; கொதிநீர் எட்டு அன்சு. கலவைக்கூடே காற்றுச் செல்லத்தக்கதாக ஒரு அணியஞ்செய்து அதற்குள்ளே கிறீயசற்றையும் வெந்நீரையுங் கலந்து அதற்கூடே வருங் காற்றைச் சுவாசிக்கவும்.

சூனிபச்சேடி. COMMON JUNIPER.

வாசம். இது யுரோபம் ஆசியங்களின் வடபகுதிகளிலும் அமரிக்கத்திலும் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. பளம். இது மிளகனவு பருமையுங் கருந் தூமில்¹⁹ நிறமுமாய் வெண்பச்சை நிறமான மாவால் மூடப்பட்டிருக்கும். மேல்வளத்திற் திரிவிசு²⁰ வரையையும் கீழ்வளத்தில் புள்ளடிச்சாங்கமாய் அடுக்கியிருக்கிற செதில்களையும் உடையது. தர்ப்பந்தின்²¹ போன்ற இனிய சுவையும், பல்சம்²² போன்ற நற்கந்தமுங் கொண்டது. ஓர் அத்திரதே²³லே இதின் சத்து.

தன்மை. இது ஸ்திமுல²⁴மும், அமுரிதி²⁵யும், காமினதி²⁶யுமாகும்.

1 Diarrhoea, 2 Passive Haemorrhage, 3 Gonorrhoea, 4 Leucorrhoea, 5 Diabetes.
6 Phagedenic ulcer, 7 Scrofulous, 8 Naevi, 9 Erysipelas, 10 Syphilis
11 Lotion, 12 Farcinoma, 13 Chronic bronchitis, 14 Minim, 15 Glacial acetic acid, 16 Spirit of Juniper, 17 Syrup, 18 Simple ointment, 19 Blackish purple, 20 Tri-radiate, 21 Turpentine, 22 Balsam, 23 Volatile oil, 24 Stimulant, 25 Diuretic, தியுசெசி, 26 Carmi.
native, வாயுக்கினி,

உபயோகம். அசத்துவ¹மான நீர்க்கோவை வியாதிகளுக்கும், வாயுப் பொருமல்², வாயு வலி³க்கும், குடவின் ஸ்பசு⁴நோய்களுக்கும், காலிக⁵கனு றியம்⁶, லுகறியங்க⁷ளுக்கும் இது உவந்ததாய்க் காணப்பட்டது.

தேயம். நாற்பது கிரேன் முதல், இரண்டு திரும் வரைக்கு, இன்வூசு⁸ மாக்கிக் கொடுக்கலாம். அத்திரதேலாக அல்லது சீதாகக் கொடுப்பதே உ த்தமமான முறை.

ரசிதங்கள். துனிபதேல். Oil of Juniper. இது காயைத்திஸ்திவிச்⁹ கப் பிறக்கும் அத்திர எண்ணெய்¹⁰. இது நிறமற்றது. அல்லது வெண்மஞ் சள்நிறமானது. இனிய மணமும் வெம் சுகந்த¹¹ சுவையுமுடையது.

தேயம். ஒரு மினிம்¹² முதல் ஐந்துமினிம் வரைக்குக் கொடுக்கலாம்.

துனிபசீது. Spirit of Juniper. கொள். சூனிபதேல் ஒரு அன்சு; திட்டசீது¹³ நாற்பத்தொன்பது அன்சு. இவற்றைக் கலந்து கரைக்கவும்.

தேயம். முப்பது மினிம் முதல் ஒரு திரும் வரைக்கு நாள் மூன்றுநா லுமுறை கொடுக்கலாம். 1864 ம் ஆண்டு பிரசுரஞ்செய்த பிறித்தனி வாக டத்திற் சொல்லப்பட்ட சூனிப சீதைப்பார்க்க இது ஐந்திலொருபங்கு பெ லளுனது.

சபீனச் செடி. SABINA. SAVINE.

வாசம். இது யுரோபத்தின் மத்தியபகுதிகள் தென்பகுதிகளிலும் ஆசிய ருசியத்திலும் உண்டாகும். இங்கிலாந்திலும் வளர்க்கப்படும்.

வாகடபகுதி. பச்சையுங் காய்ந்ததுமான துளிர்கள். இவை வசந்தகா லத்திற் சேர்க்கப்படும். லட்சணங்கள். கவிந்து தண்டோடே அணைந்து நெருங்கி நாலு நிகரயாயிருக்கிற நுண்ணிய இலைகளாற் கொழுந்து மூட ப்பட்டிருக்கும். வீரூன ஓர்வகைக் கெட்ட மணங்கொண்டது. கார்ப்பு ங் கைப்புமான ராளம் போன்ற கெட்ட சுவையுள்ளது. ஓர் அத்திரதே¹³லு ம், கார்ப்பான ஓர் ராளமுமே இதின் சத்து.

தன்மை. இது கார்ப்பான ஸ்திமுல¹⁴மும் ஏம்மெனகக்கு¹⁵மாகும். பெரு க்தேயத்தில் நஞ்சு.

உபயோகம். அமெனூறீய¹⁶ம், லுகறீயம்¹⁷ விபலமெனூறீயம்¹⁸, வாடிக்கை யான கருவழிவுகளுக்கும் கருப்பையின் செயற்குறைவைப்பற்றிய மற்று நோய்களுக்கும் இது கொடுத்து நயந்தது. மேலும் சிவ்விசுக்காய்க¹⁹ளுக்கு ம் சருமநோய்களுக்கும் வெளிமருந்தாக வழங்கப்படும்.

தேயம். மூன்று கிரேன் முதற் பத்துக் கிரேன் வரைக்கு இன்வூசுமாக் கிக்கொடுக்கலாம். பிரதானமாய்ப் பின்வரும் ரசிதங்களாகவே இது கொ டுக்கப்படும்.

ரசிதங்கள். சபீனத்தேல். Oil of sabina. பச்சையான சபீனத்துளிர்க ளைத் திஸ்திவித்தெடுக்குமெண்ணெய். இது தெளிந்து நிறமற்றதாய் அல்ல து வெண்மஞ்சள் நிறமாய்ச் சபீனச் செடிக்குரிய மணங்கொண்டு, கைப் புங் கார்ப்புமான சுவையுள்ளதாயிருக்கும்.

1 Asthenic. 2 Flatulence. 3 Flatulent colic. 4 Spasm. 5 Chronic. 6 Gonorrhoea;

7 Leucorrhoea. 8 Infusion. 9 Distil. 10 Volatile oil. 11 Aromatic,

12 Minim. 13 Rectified spirit 14 Stimulant. 15 Emmenagogue.

16 Amenorrhoea, 17 Passive menorrhoea. 19 Syphilis.

தேயம். ஒரு மினிம முதல் ஐந்து மினிம் வரைக்கு. உள்ளே கொடுக்க இதுவே உத்தமமான முறை.

சபீனாஞ்சம். Tincture of sabina. கொள். காய்ந்த சபீனத்தளிர், புருஷசீது¹ அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்திற் சபீனத்தளைப் பதினைந்து அன்சு சீதில் இரண்டுநாளேக்கு ஊறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கவும். அப்பாற் சியந்தனி²யில்வார்த்து நீர் ஒழுகினபின் சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும் வார்த்து ஒழுகவிடவும். பிற்பாடு சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து நீர்களைக் கலந்து அரைநாழிக்குப் போதிய புருஷசீது அத்தோடு சேர்க்கவும்.

தேயம். இருபது மினிம் முதல் அறுபது மினிம் வரைக்குக் கொடுக்கலாம்.

சபீனவன்கேன். Ointment of sabina. கொள். பச்சையான சபீனத்தளிர், துவைத்து, எட்டு அன்சு; வெண்மெழுகு மூன்று அன்சு; பூதலாடு³ பதினாறு அன்சு. லாட்டையும் மெழுகையும் நீர்மத்திகத்⁴திவிட்டு உருக்கிச் சபீனத்தோடு கூட்டி இருபது மினிநேரம் ஊறவிட்டு அப்பால் எடுத்துக் காரிக்கம்புடைவையில் வடிக்கவும்.

இது தீவனியான தைலம். கொப்புளித்த புண்கள் ஒடுக்களினின்று நீர் பாய்ந்துகொண்டிருக்கப்பண்ணவேண்டியிருக்கிற இடத்து இதை மிகுதியாய் வழங்குவார்கள்.

அவாகடச்சாக்குகள். Non-Officinal.


நெட்டிலைப்பைன்மரம். Pinus Longifolia. இது இமயமலையில் 2000 அடி உயரமுதல் 6000 அடி உயரம் வரையில் உண்டாகும். வட இந்தியின் சனங்கள் இதினின்று தாரும்⁵ தர்ப்பந்தீனு⁶மெடுப்பார்கள். இத்தார் யுரோபத்தில் சுத்தமாய்ச் செய்யப்படும் தாருக்குச் சரியானதாம். யுரோபத்தால் வருந் தர்ப்பந்தீனுக்கு இத் தர்ப்பந்தீனைச் சரியாக்குவதற்குச் சொற்ப மாறுதலாகவேணும். சுதேசிகள் இவற்றைச் செய்யும் முறையைப்பற்றி, வங்காள ஆசியசங்கம் என்ற புஸ்தகத்திலே விவரஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த மரத்தினின்றும் உயர்பைன்⁷ தேவதருபைன்⁸ என்ற மரங்களினின்றும் தார் செய்யும் முறையைப்பற்றி கிளேகாண் என்பவர் நயப்பான சில குறிப்புகள் சொல்லியிருக்கிறார். இந்தத் தாரானது உத்தமமானதென்றும் சுவிதேன் தேசத்திற் செய்யப்பட்ட தாருக்குச் சரியானதென்றும் அவர் சொல்லுகிறார். இது மலிந்த சரக்காகுமாதலால் இதுகாரியத்தைக் கவனிப்பது நல்லது. இந்தப் பைன் மரத்தில் வடியுந் தர்ப்பந்தீனை, சீர்கெழுண்டு⁹, பீர்சி¹⁰, குண்டபிரோசம்¹¹ என்ற இந்துஸ்தானிப்பெயர்களால் ரோயில் என்பவர் குறித்திருக்கிறார். என்றாலும் கடைசியானபெயர் குந்துருக்கத்¹²துக்கே விசேஷமாய் வழங்கப்படும்.

தேவதருபைன்மரம். Pinus Deodara. இமயமலையிலுள்ள இந்த மரத்துக்குத் தேவதரு என்றும் கெலுன்¹³ என்றும் பேரிட்டிருக்கிறார்கள். தம்சன் பண்டிதர் சொல்லுகிறபடி தேவன் தந்த மரம் என்ற கருத்துள்ள இந்தப் பெயர் வேறு மரங்களுக்கு வழங்குமாயினும் குமையன்¹⁴ காசுமீரம் என்ற

1 Proof spirit. 2 Percolator, 3 Prepared lard. 4 Water bath, 5 Tar, 6 Turpentine. 7 Pinus Excelsa. 8 P. Deodara, 9 Cheer-ke-goond. 10 Birjee, 11 Gunda Beroza, 12 Olibanum. 13 Kelon 14 Kumaon.

இடங்களில் இதற்கு மாத்திரமே வழங்குகிறார்கள். சிம்லாவில் இம்மரம் கெ
லுன் எனப்படும். அங்கே தேவதரு என்ற பெயர் முடிச்சுச்சைபிரஸ்¹ எ
ன்ற மரத்துக்கு வழங்குமென்று மடெனர் சொல்லியிருக்கிறார். இதிலே
மிக மெல்லிதான ஒர்தர்ப்பந்தின் பிறக்கும். அது புண்கள் தோல்வியா
திகளுக்கு நல்ல பூச்சுமருந்தென்று சுதேசிகள் அதை மெத்தவும் மதிப்பார்க
ள். மேலும் அவர்கள் குஷ்டத்துக்குக் கொடுக்கும் மருந்துகளில் இது அ
திகமாய்ச் சேர்ந்திருக்கும். பெருந்தேயத்திற் கொடுத்தால் இந்த நோய்க்கு
இது வாய்க்குமென்பது கிப்சன் பண்டிதர் எண்ணம். இம் மரத்தினின்று
குடுகாட்டி எடுத்த எண்ணெய்யை உண்டுக்கும் வெளிக்கும் பிரயோகித்து
ப் பரிசுரிக்கப்பட்ட, கடுமையான இதரச் குஷ்டத்தில் வருந்தின ஆளைப் ப
ற்றி ஜான்ஸ்தன் பண்டிதர் விபரமாய் எழுதியிருக்கிறார். தேவதரு எண்
னெய் இந்த ஆளில் நோயைச் சடுதியில் தடுத்து அதைச் சுறுக்கு மெத்த வா
ய்ப்பாய் மாற்றியதென்று அவர் குறித்திருக்கிறார். இந்த எண்ணெய்யில்
நோயாளியின் இரைப்பை தாங்கக்கூடிய பெருந் தேயம் ஒருதிறமே. இது
எப்போதுஞ் சுவேதனியாகச் சேஷ்டித்ததன்றி வேறொருசெயலுங் காட்ட
வில்லை. இதின் செயலில் மெத்த விகற்பமுண்டு. சிலரில் ஒரு திறம் வா
ந்தியை உண்டாக்க வேறு சிலரில் அரை அன்சு சொற்ப உவட்டிப்பைமா
த்திரமுண்டாக்கினதாய்க் காணப்பட்டது. மற்றுஞ் சருமநோய்களுக்கும்
ஜான்ஸ்தன் பண்டிதர் இதை வழங்கி நயமென்று கண்டார். தேவதருவின்
இலைகளுந் தளிர்களும் மலையிலிருந்து நாடுகளுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டுச்
சுதேச வைத்தியத்தில் மெத்த வழங்கப்படுகின்றனவென்று ரோயில்பண்டி
தர் சொல்லியிருக்கிறார். சொற்ப சாந்தமான, தர்ப்பந்தின் தன்மை இவை
க்கு இருக்கக்கூடும்.

1 Cupressus torulosa. 2 Lepra Mercurialis, 3 Diaphoretic.



II வகுப்பு. ஏகக்திலீதங்கள். Monocotyledons.

ஸ்மைலாசியங்கள்.

SMILACEAE.

சார்சவேர். JAMACA SARSAPARILLA.

வரசம். இது நடு அமரிகத்தில் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. காய்ந்தவேர். இது ஜமேகத்திலிருந்து பிறித்தனிக்கு எ
ற்றப்படும். வேர் பெரும்பாலும் தென்னீர்க்களவு பருமையும் பல அடி
நீளமுமானது. செங்கபில நிறமுள்ளது, வேர்க் கூந்தல்களால் மூடப்ப
ட்டு ஒரு முழ நீளமான கட்டுகளாக மடக்கப்பட்டுவரும். மணமற்றது.
சுவை பிசுபிசுப்பும் சற்றே கைப்பும் சொற்ப கார்ப்புங் கொண்டது. இதி
லே காரமுங் கைப்புமான சொற்பராள¹மும் அற்பமான அத்திரதே²லும்,
ஸ்மைலாசின்³ என்ற கிரிஸ்தந்⁴பதார்த்தமும் அடங்கியிருக்கும்.

தன்மை. இது அல்திறவ தொணிகம்⁵.

உபயோகம். சிவ்லிக⁶ நோய்கள், காலிகமான வாத⁷நோய்களுக்கு இ
து நெடுங்காலமாய்ப் பெயர்பெற்ற மருந்து. மேலுங் காலிகமான ஈரல்
நோய்களுக்கும் நெடுகிரிற்ருஞ் சருமநோய்களுக்கும் விசேஷமாய்ச் சிவ்
லிகத்தன்மைகொண்ட சருமநோய்களுக்கு இது வழங்கப்படும்.

தேயம். வேரை மாவாக்கி அதிலே அரைத்திரும் முதல் ஒரு திரும்
வரைக்கும் கொடுக்கலாம்.

ரசிதங்கள். சார்சதிகாத்தம். Decoction of Sarsaparilla. கொள்
சார்சவேர், குறுக்கே நறுக்கி, இரண்டரைஅன்சு ; கொதிநீர் முக்கால்நாழி.
சார்சவேரைக் கொதிநீரில் ஒருமணிநேரமுறப்போட்டு அப்பால் பத்துமி
னி வரைக்கு மூடி அவித்து, ஆறினபின் சீலையில் வடிக்கவும். தேவையா
கில் அரைநாழி தேற இன்னும் வெந்நீரைச் சக்கையில் வார்த்தவும்.

தேயம். இரண்டு அன்சு முதல் நாலு அன்சு வரைக்கு நாள் மூன்றுநாலு
முறை கொடுக்கலாம்.

சார்சகூட்டுத் திகாத்தம். Compound Decoction of Sarsaparilla.
கொள். சார்சவேர் குறுக்கே நறுக்கி இரண்டரை அன்சு; சசவிர⁸வேர்,
சீவலாக கால் அன்சு. குவயகச்⁹ சிராய், பருக்கன் தூளாக, கால் அன்சு;
அதிமதுர வேர், துவைத்து கால் அன்சு; மெசீரிய¹⁰ பட்டை, அறுபது கிறே
ன் ; கொதிநீர் முக்கால் நாழி. உர கூறுகள் எல்லாவற்றையும் வெந்நீரிலே
ஒரு மணிநேரம் ஊறப்போட்டு, அப்பாற் பத்துமினி¹¹வரைக்கு மூடி அவி
த்து, ஆறினபின் சீலையில் வடித்துக் கொள்ளவும். தேவையாகில் இன்னும்
வெந்நீரைச் சக்கையில் வார்த்து அரைநாழி நீர் வடித்துக்கொள்ளவும்.

1 Resin, 2 Volatile oil. 3 Smilacine, 4 Crystal. 5 Alterative Tonic,

6 Syphilis. 7 Chronic Rheumatism. 8 Sassafras. 9 Guaiacum wood,

10 Mezereon, 11 Minute.

தேயம். இரண்டு அன்சு முதல் நாலு அன்சு வரைக்கு நாள் மூன்று நா லுமுறை கொடுக்கலாம். முந்தின மருந்தைப்பார்க்க இது நன்றாய்ப் பவி க்கும்.

சார்சநீரேசிறத்து. Liquid Extract of Sarsaparilla. கொள். சார் சவேர் குறுக்குச் சீவல்களாக, ஒரு இரத்தல்; 160 பாகை குடுள்ள வெந் நீர், ஏழுநாழி; திட்டசீது¹ ஒரு அன்சு. சார்சவேரை அரைவாசி வெந்நீ ரிலே ஆறு மணிகேரம் ஊறப்போட்டு நீரை இறுக்கவும். சக்கையை மிச் சமான நீரிலே அவ்வளவு நேரம் ஊறப்போட்டுப் பிழிந்து முன்னிறுத்த நீ ருடன் கலந்து வடித்து, அது ஏழு அன்சாய் வருந்தனையும் அல்லது 1.13 எ ன்ற விசேஷகிருவித²முடையதாய் வருந்தனையும் நீர்மத்திக³த்தில் வறட்ட வும். ஆறினபின் சீதைச் சேர்க்கவும். இதின் விசேஷகிருவிதம் 1.095 வரைக்கு இருக்கவேண்டும்.

தேயம். இரண்டு திரும் முதல் நாலு திரும் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். இதுவே உத்தமமான முறை.

அவாகடச்சாக்குகள். Non-Officinal.

அழுக்தஸ்மைலச்சுப்பூடு. Smilax Glabra. இப் பூண்டு சைலெற்றி லும் கறு அயல் நாடுகளிலுமுள்ளது. அங்கே இதற்கு கூரீன்சுக்கீனம்⁴என் று பேர்சொல்லுவார்கள். இதின் பெரிய கிழங்கைக் கஷாயமாக்கிச் சிவ் லிசு நோய்க்குக் கொடுப்பார்கள். S. lanceaefolia ஒடுக்கிலை ஸ்மைலச்சு என்ற பூண்டின் கிழங்கையும் இப்படியே வழங்குவார்கள். இந்த இரண்டு கிழங்குகளும் சீனக் கிழங்குக்கு மெத்தச் சரியென்றும் அவற்றைப் பருத் தறிவதரிதென்றும் ரக்கபேகர் சொல்லியிருக்கிறார். சீனக் கிழங்கு சீனதே சத்தினின்று இந்துவுக்கு வரும். இது சப்சீனம்⁵என்ற பெயருடன் கடை களிற் கிடைக்கும். பெரும்பாலும் பூச்சியரித்து உதவாததாயிருக்கும்.

மலைத்தாமரை. S. Ovalifolia. இதை வட்டிலை ஸ்மைலச்சு என்றும் சொ ல்லலாம். இது சென்னையிலும் மலாய நாடுகளிலுமுள்ள பள்ளக்காடுகளி ல் மிகுதியாயுண்டு. இதின் வேர் சடலட்சணங்களில் வேரகுருசிலிருந்து வரும் சார்ச வேர்போலிருப்பதையிட்டு, வாறிங்கு பண்டிதர் பிரமதேசத் திலிருந்தபோது இதை விசிக வைத்தியத்தில் வழங்கினார். நயங்காணத்தி னால் இதைவிட்டு அதற்குப் பதிலாக திசைனவு Tseinapho என்று பிரமர் சொல்லுகிற வேரொரு கிழங்கை வழங்கினார். இதின் மாதிரி வர்த்தன ஸ் மைலச்சுப் பூண்டுக்கு மெத்தக் கிட்டினது. காலிகவாதத்துக்கும் விசேஷ மாய் உபசிவ்லி⁶சோடு தொடுத்த வாதத்துக்கும், கச்செக்கி⁷க்கும், கடுமை யான சருமனோய்கள் சிலவற்றுக்கும் இதைக் கொடுத்தபோது மெத்த நயங் கண்டது. இரண்டரை அன்சு பச்சைக் கிழங்கை ஒருநாழி தண்ணீரில் அவித்து அரைநாழியாய் வற்றக் காய்ச்சி இரண்டு அன்சு முதல் நாலு அ ன்சு தேயம் வரைக்கு நாள் மூன்றுமுறையாகக் கொடுக்கப்பட்டது. காய் ந்ததினாலும் நெடுக வைத்திருந்ததினாலும் இதின்சாரங் கெட்டுப்போகுமோ தெரியாது. பிரமதேசத்திலிருக்கும் வைத்தியர் இதைப் பச்சையாயெடுக்கலா மாகையால் இது ஓர் நயந்த அல்திறவதொணிக¹⁰மாகுமென்பதை அவர்கள்

1 Rectified spirit. 2 Specific gravity. 3 Water bath, 4 Hurina Shuk-China.

5 Chub-china. 6 Vera-Cruz. 7 Smilax prolifera. 8 Secondary syphilis.

9 Cachexia. 10 Alterative tonic.

கவனிப்பது நன்று. சீனதேசத்தாற் கொண்டுவரப்பட்டிக் கடைகளில் திசைனவு தூப்பு¹ என்ற பிரமநாமத்தால் விலைப்படுஞ் சீனக்கிழங்கும் இது போற் தோற்றுமாதலால் அதை வழங்காமற் பதனம்.

சிற்றமீனியங்கள்.

SCITAMINEAE.

இஞ்சி. GINGER.

வாசம். உஷ்டண தேசங்கள் எவற்றிலும் உண்டாக்கப்படும்.

வாகடபகுதி. காய்ந்த கிழங்கு. இதற்கு சுக்கு என்று பெயர். இது ஒழுங்கீனமாய்த் திரண்டதும், தோலுரிந்ததும் மூன்று நாலு இஞ்சு நீளமு மான துண்டுகளாக வரும். இடைக்கிடை ஒடுங்கியிருக்கும். வெண் மஞ் சள் நிறங்கொண்டது. வெளிப்பக்கத்தில் மாப்பிடித்திராது. முறித்தால் மா த்தெரியும். கார்ப்பான சுவையுஞ் சுகந்த மணமு முடையது. மா வெண் மஞ்சள் நிறமானது. ஓர் அத்திரஎண்ணெய்²யும் மென்மையான கார்ப்புள் ள ராளமுமே இதின் சத்தாகும்.

தன்மை. இது ஸ்திமுல³மும், ஸ்தொமாகி⁴யும், காமினதி⁵யுமாகும்.

உபயோகம். வாயுப்பொருமல்⁶, வாயுவலி⁷, குடலின் ஸ்பச⁸ நோய்க ளுக்கும் காலிக⁹ வாதத்துக்கும் இது கொடுத்து நயங்கண்டது. வெளியிற் பிரயோகித்தால் இது சிலவகைத் தலையிடி பற்கொதிகளுக்கும் பலவகை யான தொண்டைநோய்களுக்கும் வருணி¹⁰சுருங்குந்தன்மை குறைந்ததைப் பற்றி உண்டான குறும் பார்வைக்கும் குணமான ஸ்திமுலமும் ருபிவா ஷ¹¹முமாகும். (66)

தேயர். சுக்குமாவிற் பத்துக் கிறேன்முதல் இருபது கிறேன் வரைக் குக் கொடுக்கலாம்.

ரசிதங்கள். சுக்கிரஞ்சம். Tincture of Ginger. கொள். சுக்கு, பரு க்கன்தூளாக, இரண்டரை அன்சு; திட்டசீது¹², அரைநாழி. மூடிய பாத்திர த்திற் சுக்கைப் பதினைந்து அன்சு சீதில் இரண்டுநாளுறப்போட்டு இடை க்கிடை குலுக்கவும். அப்பாற் சியந்தனியில் ஏற்றி நீர் ஒழுக்கித்தீர்ந்தபின் சேஷ்மான ஐந்து அன்சு சீதையும் வார்த்து வடிக்கவும். அப்பாற் சக்கை யைப் பிழிந்து வடித்து, நீர்களைக் கலந்து அரைநாழிக்குப் போதிய திட் டசீது கூட்டவும்.

தேயம். பதினைந்து மினிம் முதல் ஒரு திரும் வரைக்குக் கொடுக்க லாம். அமிலக்கின¹³ வாயுக்கின பாணங்களுக்கு இது நல்ல அனுமருந்து.

சுக்குக்கிரஞ்சம். Strong Tincture of Ginger. கொள். சுக்கு, மா வாக, பத்து அன்சு; திட்டசீது போதியது. சுக்குமாவைச் சியந்தனி¹⁴யில் இறுக்கமாயடைசி அதற்கு மேலே கால்நாழி சீதைக் கவனமாய் வார்க்க வும். இரண்டு மணிநேரஞ் சென்றபின் இன்னுஞ் சீது வார்த்து அரைநா ழி ரஞ்சமாகுந்தனையும் மெல்ல மெல்ல வடிய விடவும்.

1 Tsein-apho-taroup. 2 Volatile. 3 Stimulant. 4 Stomachic, சீசனி. 5 Carminative, வாயுக்கின. 6 Flatulence. 7 Colic. 8 Spasm. 9 Chronic. 10 Iris, 11 Rubefacient. 12 Rectified spirit, 13 Antacid, 14 Percolator.

(66) அனுபந்தம்பார்.

தேயம். ஐந்து மினிம் முதல் இருபது மினிம் வரைக்குக் கொடுக்கலாம்.

சுக்குச் சீராபம். Syrup of Ginger. கொள். சுக்குக்கரஞ்சம் ஆறு திரும்; சிறுபம் பத்தொன்பது அன்சு. குலுக்கிக் கலக்கவும்.

தேயம். ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திரும் வரைக்குக் கொடுக்கலாம்.

***சுக்கின்லுசம்.** Infusion of Ginger. கொள். இடித்த சுக்கு, அரை அன்சு; கொதிவெந்நீர் பத்து அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் ஒருமணிநேரம் ஊறவிட்டுச் சீலையில் வடிக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சுமுதல் இரண்டு அன்சு; இது நல்ல வாயுக்கினி. எப்போதுங் கிடைக்கக்கூடியதாகையால் மெத்த உபயோகமானது. கதார் நோய்கள் வாத நோய்களிற் சூடான இன்லுசத்தில் மூன்று அன்சை இரவில் உறங்கமுன் குடித்தால் நல்லாய் வெயர்க்கும். மேலும் ஸ்திமுல கார்டிக்ஸ்களுக்கும் இது நல்ல அனுபானம்.

அவின் லேகியம்¹, ஸ்கமுனி²லேகியம், நிலவாகையின்லுசம்³, ஸ்குவீர்⁴கூட்டுக் குளிகை, கறுவாக் கூட்டுச் சூரணம், ஜலப்புக்⁵கூட்டுச் சூரணம், அவின் கூட்டுச் சூரணம், வரியாத்துக்⁶கூட்டுச் சூரணம், ஸ்கமுனிக் கூட்டுச் சூரணம், ரம்னஸ்⁷சிறுபம், சகை⁸வைன்⁹ என்பவற்றிற் சுக்குங்குடுகின்றது.

செறும்பெற்றிஞ்சி¹⁰ கசுமுனாவி ஞ்சி¹⁰ என்பவற்றின் கிழங்குகளுக்குச் சுக்குஞ்சுரிய வாயுக்கின தன்மைகள் சொற்ப அளவாயுண்டன்றி அவற்றைப் பற்றிய வேறு விசேஷமில்லை.

மலையாள வேலம். MALABAR CARDAMOM.

வாசம். இது சென்னையின் மேற்குக் கரையிலுள்ள மலைத்தொடரில் உண்டாகும். மலையாளத்திலுஞ் செய்யப்படும்.

வாகடபதூதி. காய்ந்த காய். இதின் அரிசி கூர்கொண்டு, சுருங்கிச் செங்கபில நிறமாயும், உள்ளே வெண்மையாயும் இருக்கும். கார்ப்பான சுகந்த நஞ்சுவையும் மணமுமுடையது. நீள வட்ட உண்டையும் முக்கோண வடிவுங் கொண்ட புருகமுள்ள வெண் கபில நிறமான உரத்த கோதுக் குள்ளே அடங்கியிருக்கும். இதிலே ஓர் அத்திர எண்ணெய்யும் கார்ப்பான ராளமும் செறிந்திருக்கும். இதைக் கோதோடே வைத்திருந்து தேவையான வேளைகளில் கோதை உரித்துத்தள்ளிப்போட்டு அரிசியை எடுப்பதே உத்தமம்.

தன்மை. இது ஸ்திமுல¹¹மும், காரமினதி¹²யுமாகும்.

உபயோகம். அசத்துவ குன்மம், வாயுப்பொருமல், குடவின் ஸ்பச¹³ நோய்களுக்கும், நரம்புத் தியக்கத்துக்கும் இது உவந்தது.

தேயம். அரிசியை மாவாக்கி அதிலே பத்து முதல் இருபது கிறேன் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். ஆயினும் பின் வரும் ரஞ்சமாயன்றி அதைக் கொடுப்பதரிது.

ராசிதங்கள். ஏலக்கூட்டிரஞ்சம். Compound Tincture of Cardamom. கொள். கோதுரித்து இடித்த ஏலரிசி, கால் அன்சு; இடித்த கறுவிக்

1 Confection of opium 2 Scammony. 3 Squill. 4 Jalap. 5 Rhubarb. 6 Rhamnus. 7 Aloes. 8 Wine. 9 Zingiber Zerumbet. 10 Z. Cassumunar.

11 Stimulant. 12 Carminative. 13 Spasm.

கொட்டை கால் அன்சு ; கொட்டை நீக்கின திராட்சப்பழவற்றல்¹, இரண்டு அன்சு ; இடித்த சுறுவாப்பட்டை, அரை அன்சு ; கச்சினில்² மாவாக, அறு பது கிறேன் ; புருவுசீது³ அரைநாழி. அடைத்த பாத்திரத்திலே உர சரக் குகள் எல்லாவற்றையும் பதினைந்து அன்சு சீதில் இரண்டுநாள் ஊறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கவும். அப்பாற் சியந்தனியில்⁴ வார்த்து நீர் ஒழு கித் தீர்த்தபின் சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும் வார்த்து வடியவிடவும். அப்பாற் சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து நீர்களைக் கலந்து அரைநாழிக்குப் போதிய புருவுசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். அரைத் திரும் முதல் இரண்டு திரும் வரைக்குக் கொடுக்க லாம்.

கலுசிந்துக்கூட்டுடெசுரூத்து⁵, சுறுவாக்கூட்டுச் சூரணம்⁶, கிரீத சுகந்தபற் பம்⁷, ஜென்சன்கூட்டிரஞ்சம்⁸, வரியாத்⁹ திரஞ்சம், சகைவைன்¹⁰ என்ற கூட் டுகளில் ஏலம் ஓர் கூறுகச் சேருகின்றது. மேலும் சகைக் கூட்டுத் திகாக் தம்¹¹, அயசுகந்தகலவை¹², நிலவாகைக்¹³ கூட்டுக் கலவை, அயகூட்டிரஞ்சம் என்ற கூட்டுகளிலும் ஏலக்கூட்டிரஞ்சம் ஓர் கூறுகச் சேருகின்றது.

இலங்கை ஏலம். Ceylon Cardamoms. தன்மை உபயோகங்களில் வாகட ஏலத்துக்குச் சரியானது. இது நீண்டொடுங்கினதும், முக்கோண மானதுமான வளைந்த கோதுக்குள்ளிருக்கும். ஒன்றரை இஞ்சு நீளமும், மூன்றிலொருபங்கு இஞ்சு அகலமுமாய்ப் புருவமுள்ளதாயாவது தட்டை யாயாவது இருக்கும். கோது உரத்த வன்சவ்வாலானது. கபில நிறமாயா வது மஞ்சள் நகரநிறமாயாவதிருந்து மூன்று அறையை அடக்கியது. கொ ட்டை கோணம் விழுந்தது; ஒப்பமற்றது; செம்மஞ்சள் நிறமானது. நற் கந்தமும் உறைப்பான சுவையுமுடையது. என்ஸ்லியும் அவருக்குப் பின் இந்துபதார்த்தசாரத்தை எழுதினவர்களும் பரதீசரிசி¹⁴ என்ற பெயரை இட் டிருப்பது இந்த ஏலத்துக்குத்தானென்று எண்ணவேண்டும்.

மஞ்சள். TURMERIC PLANT.

வாசம். இது ஆசியத்தின் உஷ்டண பகுதிகள் எவற்றிலும் செய்கை பண்ணப்படும்.

வாகடபகுதி. கிழங்கு. இது ஏறக்குறைய இரண்டு இஞ்சு நீளமும் ஒரு இஞ்சு அகலமுமான திரண்ட துண்டுகளாக வரும். ஒரு தலைப்பிற் கூராயிருக்கும்; வளையம் வளையமாக ஒடுங்கி, ஏறக்குறைய இரண்டு இஞ்சு நீளமான தேறுகளாய்ச் சற்றே திருகியுமிருக்கும். வெளியிற் பீத¹⁵ நிறமும், உள்ளே செம் பீத நிறமுமுள்ளது. தனக்கே யுரிய சுகந்த¹⁶ மணமும், சுகந்தசுவையுங் கொண்டது. சப்பினால் உமிழ்நீரைத் தன் நிறமாக்கும்.

தன்மை உபயோகம். இது காமினதி¹⁷. இதைப் பெரும்பாலுங் ஈறிக்குச் சேர்ப்பார்கள். இது கெமிஸ்தசோதனைக்கு¹⁸ உதவுவதினால் மாத்திரம் வாகடத்துக்குரியதாகின்றது.

ரசீதங்கள். மஞ்சளிரஞ்சம். Tincture of Turmeric. கொள். இடித்த

1 Raisins. 2 Cochineal, ஒருமஞ்சள்பூ. 3 Proof spirit. 4 Percolator. 5 Compound extract of Colocynth. 6 Compound powder of cinnamon. 7 Aromatic powder of chalk. 8 Compound tincture of Gentian. 9 Rhubarb.

10 Wine of aloes. 11 Decoction. 12 Aromatic mixture of iron.

13 Senna. 14 Grains of Paradise. 15 Yellow. 16 Aromatic.

17 Carminative, வாய்க்கனி. 18 Chemical test.

மஞ்சள், ஒரு அன்சு; புருவுசீது¹ ஆறு அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் ஏழு நாளுறவிட்டு வடிக்கவும்.

மஞ்சட்தாள். Turmeric Paper. மஞ்சளிரஞ்சத்திற் தோய்த்துக் காற்றில் காயவைத்த கஞ்சியிடாத வெள்ளைக் கடுதாசி.

இது அல்கலைகளைச் சோதிப்பதற்கு வழங்கப்படும். அல்கலைகள் இதைச் சிவப்பாக்கும் அல்லது கபில நிறமாக்கும்.

[பின்வரும் இரண்டு முறையாயும் மஞ்சளைப் பிரயோகித்ததினால் அதிக நயமுண்டானதை வாறிங்கு பண்டிதர் கண்டிருக்கிறார். 1. சலதோஷ³த்துக்கு மஞ்சளை எரித்து அதின் புகையை நாசித்துவாரங்களுக்குள்ளே செல்லவிடச் சற்றே காரமான அப்புகை நாசிச் சவ்வினின்று அதிகமாய்நீர் வடியப்பண்ணினதால், வருத்தமான கஞ்செஸ்தம்⁴ தணிந்தது. 2. கதார்க்கண்ணை⁵வுக்கும் சீழ்க்கண்ணை⁶வுக்கும் இடித்த மஞ்சளில் அரை அன்சைப் பத்து அன்சு தண்ணீரில் அவித்து அக்கஷாயத்தாற் கண்ணைக் கழுவ அது எரிவையும்வருத்தத்தையுந் தணித்தது. இதினாற் சலதோஷத்தில் உண்டான நயத்தைப்பற்றி அந்தர் பண்டிதருங் குறித்திருக்கிறார்.]

அவாகடச்சாக்குகள். Non-Officinal.

கஸ்தூரி மஞ்சள். Curcuma aromatica. இது இந்துவின் அனேக பகுதிகளில் உண்டு. இதின் கிழங்கு உண்டையாய் அரைவாசி கால்வாசியாயும் இன்னும் சிறு துண்டுகளாகவும் வெட்டப்பட்டதாய் வரும். வெளிப்பக்கத்தில் வேர்க்கூந்தலின் சொச்சமிருக்கும். வெண்மஞ்சள் நிறம் அல்லது கபில நரைநிறமானது. காரமான கைப்புச் சுவையும் சுந்தமணமுங்கொண்டது. இதிலே ஓர் அத்திர எண்ணெய்யையும் ராளத்தையும், மாறீன் என்பவர் கண்டுபிடித்தார். இதின் சாரம் இவற்றிலேயே அமையும். இதற்கு வாயுக்கினை⁸ தொணிக⁹த்தன்மைகள் உண்டாம். கிச்சிலிக் கிழங்கு Curcuma Zedoaria. இந்தக் கிழங்கு சின்ன விரலளவு நீளமும், அரை இஞ்சு பருமையுமாய்ச் சற்றே வளைந்த துண்டுகளாக வரும். இது சாங்கத்தை விட மற்றெல்லா இலட்சணங்களில் கஸ்தூரி மஞ்சளை மெத்த ஒத்திருக்கும்.

மாவிஞ்சி. Mango Ginger. மாம்பழத்தின் மணங்கொண்டதால் இங் கிலர் இதற்கு இப்பெயரிட்டார்கள். இக்கிழங்கு வாயுக்கினியாகவும் ஸ்தொமாகி¹⁰யாகவும் சுதேசிகளால் வடிங்கப்படும். ஆயினும் மற்றுமினங்களைப் போல் இதுவும் இஞ்சியைப்பார்க்க நயந்ததல்ல. ஆகையால் இவைகளை வழங்காமலும் விட்டுவிடலாம். ஒடுக்கிலைக் கர்கூமம்¹¹, செங்கர்கூமம்¹² என்ற பூண்டுகளிலிருந்து நடுத்தரமான குவாமா¹³ எடுக்கப்படுகின்றது. இவை இரண்டும் இந்துவுக்கு ஆதியாயுரிய தாவரங்கள்.

அசை வல்பீனியப்பூடு. Alpinia nutans. இது மலாய நாடுகளில் ஆதியாயுள்ளது. இந்துவிலே தோட்டங்களில் அதிகமாய்ச் செய்கைபண்ணப்படும். இதின் வேரை அரத்தை வேரென்று மாறுவார்களாம். பேரரத்தை கலாங்க வல்பீனியப்¹⁴ பூண்டினதும், சிற்றரத்தை சீன வல்பீனியப்பூண்டி¹⁵

1 Proofspirit. 2 Alkali. 3 Coryza. 4 Congestion, சஞ்சயம். 5 Catarrhal ophthalmia. 6 Purulent ophthalmia. 7 Volatile oil. 8 Carminative.

9 Tonic. 10 Stomachic. 11 Curcuma angustifolia. 12 Curcuma rubescens. 13 Arrowroot. 14 Alpinia galanga.

15 Alpinia Chinesis.

னதும் வேராம். இவ்விரண்டும் சிங்கப்பூருக்குக் கிழக்கேயிருக்குந் தேசங்
களில் உண்டாகும். அங்கிருந்து இந்துவுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டு இந்து
பதார்த்தசாரத்தில் கொலிஞ்சான்¹ என்றபேரால் வழங்கும். கிச்சிலிக் கிழ
ங்கு கஸ்தூரி மஞ்சள் என்பவைகளாகிய செடுவாரிகளைப்² போல இவைக
ளும் யுரோப வைத்தியத்தில் வெகுகாலமாகத் தள்ளுபிடியாய்விட்டன. இ
ஞ்சிக்கு இல்லாத தன்மையொன்றும் இவற்றுக்கு இல்லை. சுதேசிகள் மரு
ந்தாக வழங்கும் கச்சொலக் கிழங்கும் உண்டைக் கெம்வேரியக்³ கிழங்கும்
இப்படியே தள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகளுக்கு பூச்சம்பம்⁴, சுண்டு
மூலம்⁵ என்ற இந்துப் பெயர்கள் உண்டு. சாராயத்தை அதிகமாய் வெறிக்
கச் செய்வதற்குச் சுதேசிகள் அரத்தை வேரை அதிலே ஊறப்போடுவார்க
ளென்று ஏர்வின் பண்டிதர் சொல்லியிருக்கிறார்.

இமயமலைக் கிச்சிலிப்பூடு. *Hedychium Spicatum*. இது இமயமலை
யிலுள்ள பூடு. நற்கந்தமும் சுகந்தமுமான இதின் கிழங்கே கடைகளில் வ
ருஞ் சிற்றரத்தை. ஏன்ஸ்லி என்பவர் சிற்றரத்தை என்றது இதைத்தானெ
ன்று ரோயில் எண்ணுகிறார். மணங் குணத்தைப் பிடித்து இதற்கு ஸ்தொ
மாகி⁶ வாயுக்கின⁷ தன்மைகள் இருக்கவேண்டுமென்று தீர்க்கத் துணியலாம்.

மலாயுவேலம். *Amomum Zanthioides*. இது மலாக்காவிலுள்ளது.
மலையாள ஏலத்தின் சாங்கமுள்ள சுகந்தமான இதின் கொட்டைகள் சில
வேளை லண்டன் கடைகளில் வரும். இதின் கனி நீண்டு கபிலநிறமானது.
சுணையுள்ள கோதையுடையதாய்ப் படரும் காம்பிலே திரண்ட குலைகளாக
இருக்கும். உள்ளே மலையாள ஏலத்தைப் போன்ற கொட்டைகளை அட
க்கியிருக்கும். அதைப்போற் சுருங்கினதல்ல. அவைக்குரிய சுகந்த சுவை
யினாலும் மணத்தினாலும் அவைகளைப் பகுத்தறியலாம். அன்புரியென்பவர்
இதைச் சோதித்துச் சியாமேலத்துக்குச் சரியென்று கண்டார். அவர் இதை
விளக்கும் நேர்த்தியான படங்களைத் தீட்டியிருக்கிறார். வங்காள ஏலக்கா
ய் வங்காளத்தின் கிழக்கெல்லையைச் சேர்ந்த பள்ளத்தாக்குகளில் சுதேசிக
ளாற் சேர்க்கப்படுகின்றதென்றும், அது அவ்விடத்துக்குரியதென்றும் மரு
ந்து முதலியவற்றுக்காக மொருங்கேலாச்சி⁸ என்ற நாமத்தால் விலைப்
படுகிறதென்றும், ரக்சபேகர் சொல்லியிருக்கிறார். இதின் காய் நீள வட்
டமும் சாதிக்காயளவு பருமையும் தசைத்துச் சுருங்கினதுமாய் மலையாள
ஏலக்கோதுக்கு வித்தியாசப்பட்டாலும் கொட்டை சாங்கத்திலும் மணத்தி
லும் அதற்குச் சரியென்று அவர் சொல்லுகிறார்.

முசாசியங்கள்.

MUSACEAE.

அவாகடச்சாக்குகள். Non-Officinal.

வாழை. Plantain. இது உஷ்டண பூமியடங்கலும் காய் பழங்களுக்
காகச் செய்கைபண்ணப்படும். இவ்விரண்டும் உத்தமமான உணவுவகை
யாகும். இந்துதேசத்தில் வாழைக்குருத்துக் கொப்புளித்த புண்களுக்கு

1 Kholinjan, 2 Zedoary. 3 Kaempferia rotunda. 4 Bhu champa, 5 Chundumula,
6 Stomachic. 7 Carminative. 8 Morung Elachi.

இடப்படுவது வாடிக்கையாதலால், இங்கே அது சொல்லப்படுகின்றது. புண்ணைவு விசாலமான வாழைக்குருத்திலே காரமற்ற ஏதும் எண்ணெய் யைப் பூசி அதற்கு இட்டுக் கட்டிவிடுவார்கள். வம்பாயிலுள்ள பெரிய வி சிசுத்திலும் மற்றும் விசிகங்களிலும் இப்படியே வழங்கப்படுகின்றது. இது நயமென்பதைப்பற்றி அனேக வைத்தியர் சாட்சியிட்டிருக்கிறார்கள். இத ற்குரிய சாந்தி செய்யுந் தன்மையினால் நாலு ஐந்து நாளுக்குள்ளே புண்செ வ்வையாய் மாறும். முதல் இரண்டு நாளைக்கும் இலையின் உள்வளத்தையும் பிற்பாடு புண் மாறுந்தனையும் புறவளத்தையும் அதில் அணைப்பார்கள். பி ராணிய நெய்கள் சுறுக்குப் பழுதாகும் உஷ்டண தேசங்களிற் திமிநெய் அ ழற்சிப்படுத்துமாய்கையால் அதிலும் வாழைக்குருத்துப் பெரும்பாலும் வாய் ச்கும். காயங்கள் புண்களுக்குத் தண்ணீர் தோய்த்து அணைகட்டுவதிற் கற் றபேட்சத்துக்குப்¹ பதிலாக வாழை இலையை வழங்குகிறோமென்றும், அது வாய்த்ததென்றும் வஞ்சோமரின் வைத்தியர் அறிவித்திருக்கிறார். ஆசியத் தின் உஷ்டண தேசங்களில் வாடிக்கையாயுண்டாகிற பலவகையான கண் ணேவுக்கு ஒருதுண்டு பச்சை வாழை இலையாற் கண்ணை மறைத்தல் அவ் வேளைக்குக் குளிர்மையுஞ் சுகமுமாயிருக்கும். வாழைப்பழ வற்றல் நெடு ம் பயணக்காரருக்குப் போஷணையுள்ளதும் ஸ்கேவி²வராமற் காப்பதுமான உணவாகும். சரியான வற்றல் அத்திப்பழ வற்றலைப் போன்ற சுவையு டையதாய்ச் சொற்ப விலைக்குக் கிடைக்கவும் வெகுநாளைக்கு இருக்கவுங் கூடியது.

அமரிலிடாசியங்கள்.

AMARYLLIDACEAE.

*விஷமூங்கில். CRINUM ASIATICUM.

வாசம். இது வங்காளம் கொங்கணம் முதலான இந்துப் பகுதிகளின் தாழ்வும் ஈரமுமான இடங்களிலும், இலங்கை, மொலக்கம், கொச்சின், சீனங் களிலும் உண்டாகும். தோட்டங்களிற் செய்கைபண்ணப்படுகிறது.

வாகடபகுதி. பச்சைக் கிழங்கு. இது பருத்தது ; நுனியிலிருந்து ஸ்தோ ல்³ முகை கிழம்பும். செட்ட மயக்கு மணங் கொண்டது. இதை நெருப் பில் சுறுக்கு உலர்த்தி மாவாக்கலாம்.

தன்மை. இது வமனி⁴. சிறு தேயத்தில் அரோசியத்தையும் வெயர்வை யையும் உண்டாக்கும்.

உபயோகம். ஸ்குவிலைப்⁵போலச் சேஷ்டிக்கும்.

ரசிதங்கள். விஷமூங்கிற் சாறு. Juice of Crinum. கொள். பச்சை யான விஷமூங்கிற் கிழங்கு, அரை அன்சு ; தண்ணீர் இரண்டு அன்சு. கிழ ங்கைக் கல்லுரலிற் துவைத்து, தண்ணீரைப் படிப்படியாய்ச் சேர்த்துப் பி ழிந்து, காரிக்கம் புடைவையில் வடித்துப் பிழியவும்.

தேயம். இரண்டு திரும் முதல் நாலு திரும் வரைக்கு, இருபது மினிக்

1 Gutta percha. 2 Scurvy. 3 Stolon. 4 Emetic. 5 Squill.

கொருமுறை கொடுக்கவும். வாந்தி காணுந்தனையும் இப்படியே கொடுக்கவும்.

விஷமூங்கிற் சிறுபம். Syrup of Crinum. கொள். விஷ மூங்கிற் கிழங்கு, சீவி எட்டு அன்சு; கொதிநீர் அரைநாழி. சுத்த சர்க்கரை ஒரு இரூத்தல். கிழங்கை வெந்நீரில் இரண்டு மணிநேரம் ஊறப்போட்டு உரலிற் துவைத்து, காரிச்சம் புடைவையில் வடித்துப் பிழிந்து சர்க்கரையைச் சேர்த்து இளஞ் சூட்டிற் திரும்பத் திரும்பக் கரைக்கவும்.

தேயம். இரண்டு திரும் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். தேவைக்குத் தக்கதாய்த் திரும்பவுங் கொடுக்கலாம். பிள்ளைகளுக்கு உவட்டிப்பையும் வாந்தியையும் உண்டாக்குவதற்காகக் கொடுக்கப்படும்.

[காய்ந்த விஷமூங்கிற் கிழங்குச் சீவல்தரும் நல்ல வமனியாகும். பச்சைக் கிழங்கைப்பார்க்க இதை இரட்டிப்பாய்க் கொடுக்கவேண்டும். சுதேச தாபர பதார்த்தங்களுட் தாமறிந்தவரையில் வயிற்று முறுக்கு, கழிச்சல்முதலிய அவக்குணங்களை உண்டாக்காமல் தாராளமாய் வாந்தி செய்யக்கூடியது இது மாத்திரந்தானென்று ஒஷானசி பண்டிதர் சொல்லுகிறார். அவர் வாறிங்கு பண்டிதருக்கு எழுதின எழுத்தில், இபிகாக்கு¹க் கிடையாத வேளையில் இது நல்ல வமனி²யும் சுவேதனி³யுமாகுமென்றும், அதற்கு இதைப் பதிலாக்கிக்கொள்ளாமல் அவசரத்துக்கு மாத்திரமே வழங்கலாமென்றுஞ் சொல்லியிருக்கிறார்.]

அவாகடச்சரக்குகள். Non-officinal.

ஆனைக் கற்றளை. Agave Americana. இது அமரிசு தேசத்துக்குரிய பூண்டு. இந்துவிற் பல பகுதிகளிற் செய்கைபண்ணப்படும். இதின் கிழங்கு அமுரித⁴ அல்திறவ⁵த் தன்மைகள் உண்டென்று மெக்சிகர்⁶சொல்வார்கள். ஐந்து அன்சு தண்ணீருக்கு இதில் ஒரு அன்சு வீதமாய்ப் போட்டு அவித்த கஷாயத்தை⁷ ரோசு வைத்தியர் உபசிவ்விசுக்குக்⁸கொடுத்து மெத்த நயங்கண்டோமென்கிறார். அச்சின் வைத்தியர் இந்த மருந்தை இன்னுஞ் சோதிப்பது நல்லதென்றெண்ணுகிறார். மேலும் பருத்த, சதைத்த இலையின் மெல்லிய சீவலைப் பாப்பையாய் அணைக்கலாமென்றுஞ் சொல்லுகிறார்.

கைபக்சிடியங்கள்.

HYPOXIDEA.

அவாகடச்சரக்குகள். Non-Officinal.

நிலப்பனைக் கிழங்கு. Curculigo orchioides. இந்துவின் அனேசபகுதிகளிலுள்ள சிறிய இப்பூண்டின் கிழங்கு சுருங்கி, ஏறக்குறைய நாலு இஞ்சு நீளமுள்ளதாய்ச் சற்றே கைப்பான பிசுபிசுப்புச் சுவைகொண்டிருக்குமென்று ஏன்ஸ்லியர் விபரித்திருக்கிறார். சுதேச பதார்த்தசாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற சவீர்முஸ்லி⁹என்ற கூட்டான மருந்தில் இது எம்மட்டுக்குக் கூறாகுமென்பதை இன்னும் அறியவில்லை. பெர்வுட்டு, ரோயில் பண்டிதர்கள் இந்தச்சரக்கு முர்தனிய ஸ்காபிவிலோறம்¹⁰என்றபூண்டின்கிழங்கு

Ipecac. 2 Emetic. 3 Diaphoretic. 4 Diuretic, தியூரெசு. 5 Aterative. 6 Mexican. 7 Decoction. 8 Secondary syphilis. 9 Siled Musli. 10 Murdannia scapifolia.

என்கிறார்கள். இது எத்தாவரத்தின் பேறு என்று நிச்சயித்தறிய இன்னும் ஆராயவேண்டியது. இக்கிழங்கு, சுணுநீயம்¹, திருநீ², மெனுநீயம்³ முதலிய நோய்களுக்கு உத்தமமென்று திருவாளங்கோட்டு வைத்தியரால் மெத்த மதிக்கப்படுகின்றது. இந் நோய்களுக்கும் இவைக்கினமான நோய்களுக்கும் இக்கிழங்கு திறமென்று அவர்கள் எல்லாரும் இடும் சாட்சியைக் கொண்டு இது சனன சல உறுப்புகளின் சேஷ்டிக்கிறதென்று எண்ண நியாயம் உண்டு. ஆயினும் இந் நோய்களுக்கு இது நயமென்பதைப்பற்றியுரோப வைத்தியருடைய ஆராய்வைக்கொண்ட சாட்சியில்லை.

இரிடியங்கள்.

IRIDEAE.

குங்குமப்பூ, SAFFRON CROCUS.

வாசம். இது சின்னாசியத்துக்குரியது. பிரான்சு, ஸ்பேன் தேசங்களிலும் யுரோபத்தின் மற்றும் பகுதிகளிலும் காசுமீரத்திலும் செய்கைபண்ணப்படும்.

வாகடபகுதி. காய்ந்த பூக் காம்புகளும், முடிச்சுகளும். காம்புகள் ஒவ்வொன்றும் செங்கபில நிறமான நீண்ட மும்முன்று முடிச்சுகளில் முடியும். முடிச்சுகளின் துனி விசாலமானது. இவற்றிற்கு வீரான சுகந்த மணமுண்டு, நனைந்த விரலில் உரைஞ்சச் செம் மஞ்சள் நிறமான அடையாளங் காணும். வெண்மையான வடிதாளின் மடிப்புகளுக்கிடையில் அமர்த்த எண்ணெய் சுவரூது.

தன்மை. உபயோகம். முன்னே இதை அந்திஸ்பசி⁴யென்றும், எம்மெனகக்கு⁵ என்றும், நினைத்தார்தள். தற்காலத்திலோ பிரதானமாய் நிறம் மணங்களுக்காக இது வழங்கப்படும்.

தேயம். பத்துக் கிறேன் முதல் நாற்பது கிறேன் வரைக்கு இன்வூசமோய் அல்லது பொடியாய்க் கொடுக்கலாம்.

ரசிதம். குங்குமப்பூவிரஞ்சம். Tincture of Saffron. கொள். குங்குமப்பூ, ஒரு அன்சு; புருவுசீது, அரைநாழி. அடைத்த பாத்திரத்திற்கு குங்குமப்பூவைப் பதினைந்து அன்சு சீதில் இரண்டுநாள் ஊறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கிக்கொள்ளவும். அப்பாற் சியந்தனியில் ஏற்றி, அடைசி நீர் ஒழுகித் தீர்ந்தபின் சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும் வார்த்து வடியவிடவும். அப்பாற் சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து நீர்களைக் கலந்து அரைநாழிக்குப் போதிய புருவுசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். அரைத் திரும் முதல் இரண்டு திரும் வரைக்கு.

சகைக்கூட்டுத் திகாத்தம்⁷, சகைசசக்குளிகை⁸, கிரீத சுகந்தப்பற்பம்⁹, சின்னக்கூட்டிரஞ்சம்¹⁰, அவினமோனரஞ்சம்¹¹, வரியாத்¹²திரஞ்சம் என்ற கூட்டுகளில் குங்குமப்பூ வோர்கூறுகச் சேருகின்றது.

1 Gonorrhoea. 2 Dysuria, சலகடம்பு. 3 Menorrhoea, பெரும்பாடு. 4 Antispasmodic. 5 Emmenagogue. 6 Infusion. 7 Compound decoction of aloes, 8 Pill of Aloes and Myrrh. 9 Aromatic powder of Chalk. 10 Compound Tincture of Cinchona. 11 Ammoniated Tincture of opium. 12 Rhubarb.

லிலியாசியங்கள்.

LILIACEAE.

சோகோத்திரசகை. SOCOTRINE ALOES.

வாசம். இது சோகோத்திர தீவில் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. இறுகின இலைச்சாறு. இது செங்கபில நிறமான கட்டி
களாக வரும். விளிம்பிற் சற்றே உருவொளிகொண்டது. ஒழுங்கீனமா
யாவது மினுக்கமும் அழுத்தமுமாயாவது ராளம்¹போல் உடையும். கைப்
புச் சுவையும் வீரூன நற்கந்தமுமுடையது. புருவசீதில் முற்றாய்க் கரை
யும். கரையும்போது ஏராளமான நுண்ணிய கிரிஸ்தல்²கள் சூக்குமாட்சிக்
குத் தெரியும். இதின் சத்து ஓர் ராளத்திலும் அலுவின்⁴ என்றவிசேஷபதா
ர்த்தத்திலுமே இருக்கும்.

தன்மை. சிறு தேயத்தில் ஸ்தொமாகித் தொணிகுமாகும். பெருந்தேய
த்தில் விரேசனியும், எம்மெனகக்குமாகும்.

உபயோகம். மலவரட்சிக்கும் பிரதானமாய் ஸ்தேரீ⁵ நோயோடாவது சூ
டலின் அசத்துவத்தோடாவது கூடினதாய்க் காய்ச்சல் முதலிய பெலவீன
ப்படுத்து நோய்களிற் காணும் மலவரட்சிக்கும் இது உத்தம மருந்து. மே
லும் அசத்துவகுன்மம்⁸, செங்கண்மாரி⁹, அமெனூறியம்¹⁰, சூலொரோசி¹¹ என்னு
நோய்களுக்கும் இது உவந்தது. கிலேசரினிற்¹² கரைத்துப் பூசினால் சரும
நோய்களுக்குத் தீவனியாய் நயஞ்செய்யும்.

தேயம். ஸ்தொமாகித்தொணிகமாக இரண்டுகிறேன் முதல் மூன்றுகிறே
ன்வரைக்கு இரண்டு மூன்று நாளுக்கொருமுறை கொடுக்கலாம். விரேச
னியாக ஐந்து கிறேன் முதற் பத்துக் கிறேன் வரைக்குக் கொடுக்கலாம்.
இது பெரும்பாலும் மற்றும் மருந்துகளோடு கலந்து கொடுக்கப்படும்.

ரசிதங்கள். சோகோத்திரசகையெசிறுத்து. Extract of Socotrine
Aloes. கொள். சோகோத்திரசகை, சிறுத்துண்டுகளாக, ஒரு இரூத்தல்;
கொதிவெந்நீர் ஒரு கலன். சகையை வெந்நீரிற் போட்டுச் செவ்வையாய்
க் கரையுந்தனையும் கலக்கினபின் அரை நாள் வரைக்கு வைத்துவிடவும்.
அப்பாற் தண்ணீரை இறுத்துச் சேஷத்தைச் சீலையில் வடித்து இரண்டு நீர்
களையுங் கலந்து நீர்மத்திகத்திலாவது சூடான காற்றிலாவது வறட்டவும்.

தேயம். இரண்டு கிறேன் முதல் ஆறு கிறேன் வரைக்கு. இது சகை
க்கூட்டுத் திகாத்தத்திலும் கலுசிந்துக்கூட்டெசிறுத்திலும் சேருகின்றது.

சோகோத்திரசகைக் துளிகை. Pill of Socotrine Aloes. கொள். சோ
கோத்திரசகை, மாவாக, இரண்டு அன்சு; வன்சபு¹³, மாவாக ஒரு அன்சு; சி
டவத்திரதேல்¹⁴, ஒரு திரும்; ரோசைலேகியம்¹⁵, ஒரு அன்சு. நன்றாய்ச் சே
ருந்தனையும் எல்லாவற்றையும் அரைத்துக்கொள்க.

தேயம். ஐந்து கிறேன் முதற் பத்துக் கிறேன் வரைக்கு.

சகை சசக் துளிகை. Pills of Aloes and Myrrh. கொள். சோகோத்திர

1 Resin. 2 Crystal. 3 Microscope. 4 Aloine. 5 Stomachic tonic. 6 Emmenagogue.
7 Hysteria. 8 Atonic Dyspepsia. 9 Jaundice. 10 Amenorrhoea. 11 Chlorosis.
12 Glycerine. 13 Hard soap. 14 Volatile oil of nutmeg. 15 Confection of rose.

சகை இரண்டு அன்சு; சசம் ஒரு அன்சு; காய்ந்த குங்குமப்பூ, அரை அன்சு; ரோசைலேகியம், இரண்டரை அன்சு. சகை, சசம், குங்குமப்பூ, மூன்றையும் ஒன்றாய் அரைத்துத் தெள்ளி, ரோசை லேகியத்தைச் சேர்த்து ஒன்றாக்கிக்கொள்ளவும்.

தேயம். விரேசனி, எம்மெனகக்காக¹, ஐந்து கிறேன் முதற் பத்துக் கிறேன் வரைக்கு இதைக் கொடுக்கலாம்.

சகை யிங்குக் துளிகை. Pill of Aloes and Assafoetida. கொள். சொகோத்திரசகை, மாவாக, ஒரு அன்சு; இங்கு, ஒரு அன்சு; வன்சபு, மாவாக, ஒரு அன்சு; ரோசை லேகியம், ஒரு அன்சு. நன்றாய்ச் சேருந்தனையும் இவை எல்லாவற்றையும் ஒன்றாய் அரைக்கவும்.

தேயம். ஐந்து கிறேன் முதற் பத்துக் கிறேன் வரைக்கு. இஸ்தேரி² கோயானருக்கு இது நல்ல அந்திஸ்பசி³யும், விரேசனியுமாகும்.

சகைக்கூட்டீத் திகாத்தம். Compound Decoction of Aloes. கொள். சொகோத்திரசகை யெசுரத்து, நூற்றிருபது கிறேன்; சசம்⁴, குங்குமப்பூ, வகைக்கு, தொண்ணூறு கிறேன்; பதாசிகாபனசு⁵, அறுபது கிறேன்; அதிமதரவெசுரத்து⁷, ஒரு அன்சு; ஏலக்கூட்டி⁸ரஞ்சம்⁸, எட்டு அன்சு; தண்ணீர், போதியது. சகையெசுரத்தையும் சசத்தையும் பருக்கன் மாவாக்கிப் பதாசிகாபனசு, அதிமதரவெசுரத்துகளோடு சேர்த்து ஏற்ற எனத்திற் போட்டு அரைநாழி திஸ்திலித்த⁹தண்ணீர் வார்த்து மூடி, ஐந்துமினி வரைக்கு மென் சூட்டில் கொதிப்பித்து அப்பாற் குங்குமப்பூவைச் சேர்க்கவும். ஆறினாயின், ஏல ரஞ்சத்தையுஞ் சேர்த்துப் பாத்திரத்தை இறுக்கமாய் மூடி இரண்டு மணிரேம் ஊறவிட்டு அப்பாற் கம்பினியில் வடித்து, வடித்த நீர் முப்பது அன்சாவதற்கு வேண்டிய திஸ்திலித்த நீரைச் சக்கையில் வார்த்துக் கொள்ளவும்.

தேயம். அரை அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு வரைக்குக் கொடுக்கலாம்.

இத் திகாத்தத்தில் ஒரு அன்சிலே சகை யெசுரத்து நாலு கிறேன் இருக்கும். ஆனாலும் 1864 ம் ஆண்டு பிரசுரஞ் செய்த பார்மகுபீயத்திற் சொல்லப்பட்டதில் 5.6 கிறேனும் லண்டன் பார்மகுபீயத்திற் சொல்லப்பட்டதில் 3.3 கிறேனுமிருக்கும்.

சகைவைன். Wine of Aloes. கொள். சொகோத்திரசகை, ஒன்றரை அன்சு; கோது நீக்கி இடித்த ஏலரிசி, எண்பது கிறேன்; சுக்கு பருக்கன் துளாக, எண்பது கிறேன்; செரிவைன்¹⁰ ஒருநாழி. அடைத்த பாத்திரத்தில் ஏழுநாள் இவைகளை ஊறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கிக்கொள்ளவும். அப்பால் வடித்து ஒருநாழிக்குப் போதிய செரிவைன் சேர்த்து வடிக்கவும்.

தேயம். ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திரும் வரைக்குக் கொடுக்கலாம்.

சகைராஞ்சம். Tincture of Aloes. கொள். சொகோத்திரசகை பருக்கன் துளாக, அரை அன்சு; அதிமதரவெசுரத்து ஒன்றரை அன்சு; புருவுசீது¹¹ போதியது. அடைத்த பாத்திரத்திற் சகையையும் அதிமதரவெசுரத்தையும் பதினைந்து அன்சு சீதில் ஏழுநாள் ஊறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கி, அப்பால்வடித்து, அரைநாழிக்குப் போதிய புருவுசீது சேர்க்கவும்.

1 Emmenagogue. 2 Hysteria. 3 Antispasmodic. 4 Myrrh. 5 Saffron. 6 Potash Carbonate. 7 Extract of Liquorice. 8 Compound Tincture of Cardamoms.

9 Distil, 10 Sherry wine. 11 Proof spirit.

தேயம். ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திரும் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். விசேசன பானங்கள்¹ எம்மெனகக்கு²ப் பானங்களுக்கு இது நல்ல அனுமருந்து.

சகையெனீமம். Enema of Aloes. கொள். சகை, நாற்பது கிறேன்; பதாசிகாபனசு³பதினைந்து கிறேன்; அமைல முசிலாகு⁴ பத்து அன்சு. இவற்றைச் சேர்த்துக் கரைக்கவும்.

அமெனூறியத்⁵தோடுகூடிய இஸ்தேரி⁶க்கும் கடைக்குடலினின்று தானப் புழுவைக் கழற்றுவதற்கும் இது உபயோகமானது.

வரியாத்துக் கூட்டுக் குளிகை⁷, சாம்பிராணிக் கூட்டிரஞ்சம்⁸, கலுசிந்துக் கூட்டெசுரூத்து⁹களிற் சோகோத்திரசகை சேருகின்றது.

பபாசுகை. BARBADOES ALOES.

வாசம். இந்துவிலும் மேலிந்துவிலும் வட ஆபிரிக்கத்திலும் தென் யுரோபத்திலும் இது உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. இறுகின இலைச்சாறு. இது பபாடுவிலிருந்து இங்கிலாந்துக்கு ஏற்றப்படும். மஞ்சட் கபிலநிறம் அல்லது கருங் கபில நிறமான மங்கற் கட்டிகளாக வரும். பள்ளந் திட்டியாய் உடையும். கைப்பான உவட்டுச் சுவையும் வீரூன கெட்ட மணமுமுடையது. புருவுசீதில்¹⁰ ஏறக்குறைய முற்றாய்க் கரையும். கரையும்போது ஏராளமான கிரிஸ்தல்¹¹கள் சூக்குமாட்சி¹²க்குத் தோற்றும். இது சுரைக் குடுக்கைகளில் ஏற்றப்பட்டு வருவது வழக்கம். இதின் சத்து ஒரிராளத்திலும் அலுவின்¹³ என்ற பதார்த்தத்திலுமே இருக்கும்.

தன்மை, உபயோகம், தேயங்கள். சோகோத்திரசகைக்குரியவைபோலவே.

ரசிதங்கள். பபாசுகையெசிற்த்து. Extract of Barbadoes Aloes. சோகோத்திரசகை யெசுரூத்தைப் போலவே இதுவுஞ் செய்யப்படும்.

தேயம். இரண்டு கிறேன் முதல் ஆறு கிறேன் வரைக்கு.

பபாசுகைக் துளிகை. Pill of Barbadoes Aloes. கொள். பபாடுசகை, மாவாக்கி, இரண்டு அன்சு; வன்சபு¹⁴ மாவாக்கி ஒரு அன்சு. கறுவீத்தேல்¹⁵, ஒரு திரும்; ரோசை லேகியம்¹⁶, ஒரு அன்சு. செவ்வையாய்க் கலக்குந்தனையும் இவற்றை அரைக்கவும்.

தேயம். ஐந்து முதற் பத்துக் கிறேன் வரைக்கு.

சகையயக் துளிகை. Pill of Aloes and Iron. கொள். அன்னபேதி¹⁷, ஒன்றரை அன்சு; பபாசுகை, மாவாக்கி இரண்டு அன்சு; கறுவாக் கூட்டுச் சூரணம்¹⁸, மூன்று அன்சு; ரோசை லேகியம், நாலு அன்சு. அன்னபேதியை மாவாக்கிச் சகையோடும் கறுவாக் கூட்டுச் சூரணத்தோடும், அரைத்து ரோசை லேகியத்தையுங் கூட்டித் திரளையாய் அரைத்துக்கொள்ளவும்.

தேயம். ஐந்து கிறேன் முதற் பத்துக் கிறேன் வரைக்கும்.

1 Purgative draught. 2 Emmenagogue. 3 Potash carbonate. 4 Mucilage of Amylum.
5 Amenorrhoea. 6 Hysteria. 7 Compound pill of Rhubarb. 8 Compound Tincture of Benzoin. 9 Compound extract of Colocynth. 10 Proof spirit.
11 Crystal. 12 Microscope. 13 Aloine. 14 Hard soap. 15 Caraway oil.
16 Confection of rose. 17 Sulphate of iron. 18 Compound powder of cinnamon.

மற்றும்¹சிதங்கள். சொகோத்திரசகையும் பபாடுசகையும் தேகத்திலே மெத்த வித்தியாசமான செயலை வருவிக்கவில்லையென்று கண்டிருக்கிறபடியாற் சொகோத்திரசகை வழங்கவேண்டிய இடங்களிலெல்லாம் இந்தப் பபாடுசகையை வழங்கலாம்.

மக்²கி¹கூட்டுக் குளிகை, கலுசிந்து²கூட்டுக் குளிகை, கலுசிந்தயசிய மசுக்³குளிகைகளில் பபாடுசகை கூடுகின்றது.

ஸ்குவில். SQUILL. SCILLA.

வாசம் மத்தித்தரைக் கடலின் கரைகளில் இது உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. சீவிக் காய்ந்த கிழங்கு. இக் கிழங்கு நீள உண்டையானது. அரை இருத்தல் முதற் பத்து இருத்தல் வரைக்குக் கனம் உள்ளது. வெளிப் படலங்கள் சவ்வாயும், கபிலச் சிவப்பு அல்லது கபில வெண்மை நிறமாயும் இருக்கும். உட்படலங்கள், தடிப்பும் வெண்மையும் தசைப்பும் சாறுள்ளதுமாயிருக்கும். சுவை பிசுபிசுப்பும், கடுங் கைப்பும் சற்றே கார்ப்புமானது. காய்ந்த சீவல்கள் வெண்மையாய் அல்லது மஞ்சள் வெண்மையாயும், சற்றே உருவொளியாயும், மணமற்றதாயும், கெட்டகைப்பாயும், நொருக்கலாயும், நன்றாய்க் காய்ந்தால் லகுவில் மாவாக்கப்படக் கூடியதாயும் இருக்கும். வெளியாய் வைத்தாற் சுறுக்கு ஈரிப்படைந்து வசையக்கூடியதாகும். இதின் சத்து இதற்கேயுரிய ராளம்⁴ போன்ற கார்ப்பான ஓர் எசுரூத்திவி⁵லே இருக்கும்.

தன்மை. சிறு தேயத்தில் எக்ஸ்பெக்தர⁶மும், அமுரிதி⁷யுமாகும். பெருந்தேயத்தில் வமனி⁸யும் விரேசனி⁹யுமாகும். அதிதேயத்தில் அழற்சி நஞ்சாகும்.

உபயோகம். அசத்துவ¹⁰வகையான நீர்க்கோவைக்கும், காலிக புறங்கீது¹¹, ஈளை, கதார்¹² நோய்களுக்கும் இது உபயோகமானது. குறுப்பு¹³, குக்கல்¹⁴களில் இதை எக்ஸ்பெக்தரமாய்க் கொடுக்கலாமாம்.

தேயம். கிழங்கு மாவில் ஒரு கிறேன் துவங்கி மூன்று கிறேன் வரைக்கு எக்ஸ்பெக்தரம் அமுரிதியாகக் கொடுக்கலாம். பத்துக் கிறேன் துவங்கிப் பதினைந்து கிறேன் வரைக்கு வமனியாகக் கொடுக்கலாம்.

ராசிதங்கள். ஸ்குவிலிரஞ்சம். Tincture of Squill. கொள். ஸ்குவில் கிழங்கு, இடித்து இரண்டரை அன்சு; புருவுசீது¹⁵ அரைநாழி. அடைத்த பாத்திரத்தில் ஸ்குவிலைப் பதினைந்து அன்சு சீதில் இரண்டுநாள் ஊறப் போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கி, அப்பாற் சியந்தனியில்¹⁶ ஏற்றி அடைசி, நீர் ஒழுகினபின் சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும் விட்டு வடிக்கவும். சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து, நீர்களைக் கலந்து அரைநாழிக்குப் போதிய புருவுசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். பத்துத் துளி முதல் முப்பது துளி வரைக்கு. இருமற் கலவைகள் அமுரிதிக் கலவைகளுக்கு இது நல்ல துணை மருந்து.

ஸ்குவில் காடி. Vinegar of Squill. கொள். ஸ்குவில் கிழங்கு இடி

1 Gamboge. 2 Colocynth. 3 Colocynth and Hyoscyamus pill. 4 Resin. 5 Extractive

6 Expectorant கட்டைவளி. 7 Diuretic தியுத்சம். 8 Emetic. 9 Cathartic. 10 Asthenic

11 Chronic Bronchitis. 12 Catarrh. 13 Croup. 14 Hooping cough.

15 Proof spirit. 16 Percolator.

த்து, இரண்டரை அன்சு ; கிருச அசிதிக்கமில்¹ அரைநாழி ; புருவுசீது² ஒன்றரை அன்சு. ஸ்குவிலை அசிதிக்கமில்த்தில் ஏழுநாளுறப்போட்டு சீலையில் வடித்துப் பிழிந்து, தெளித்து அப்பாற் சீதைச் சேர்த்து வடிக்கவும்.

தேயம். பதினைந்து மினி³தொடங்கி, நாற்பது மினிம் வரைக்கு.

ஸ்துவிலக்சிமேல். Oxymel of Squill. கொள். ஸ்குவிற் காடி, அரைநாழி ; சுத்த தேன், இரண்டு இரூத்தல். இரண்டையுங் கலந்து நீர்மத்திக⁴த்திற் காய்ச்சி, ஆறும்போது 1.32 என்ற விசேஷகிராவித⁵முள்ளதாய் வரும்படி வற்றப்பண்ணவும்.

தேயம். அரைத் திரும் முதல் ஒரு திரும் வரைக்கு.

ஸ்துவிற் சிறுபம். Syrup of Squill. கொள். ஸ்குவிற் காடி, அரைநாழி ; சுத்த சர்க்கரை இரண்டரை இரூத்தல். இவற்றைச் சூட்டிற் கரைக்கவும்.

தேயம். அரைத் திரும் முதல் ஒரு திரும் வரைக்கு.

ஸ்துவிற்கூட்டுக்துளிகை. Compound Squill Pill. கொள். ஸ்குவிற் மெல்லிய மாவாக, ஒன்றேகால் அன்சு ; சுக்குமா ஒரு அன்சு ; அமுனீயகம்⁶, மாவாக, ஒரு அன்சு. வன்சபு⁷ மாவாக, ஒரு அன்சு ; தெறீயகம்⁸, நிறுத்து, இரண்டு அன்சு, அல்லது போதியது. மாவான சரக்குகள் எல்லாவற்றையுங் கலந்து, தெறீயகத்தைக் கூட்டி, நல்ல திரளையாக்கிக் கொள்ளவும்.

தேயம். ஐந்து கிரேன் முதற் பத்துக் கிரேன் வரைக்கு. இபிகாக் ஸ்குவிற் குளிகையிலும் ஸ்குவில் கூடுகின்றது.

அவாகடச்சரக்துகள். Non-Officinal.

நரிவெங்காயம். Indian Squill. இது இந்துவின் கடற்கரைகளில் உள்ளது. இதின் கிழங்கு ரச்சுபேகர் சொல்லுகிறபடி விளாம்பழமளவு பருமையும் வெண்மையும் ஸ்குவிலைப் போல உவட்டான கைச்சற் சுவையுமுள்ளது. இவ்விலட்சணங்களையிட்டு இதற்கு வீரான அவுஷத தன்மையிருக்கவேண்டுமென்று அவர் நினைத்தார். ஆயினும் ஒஷானசியர் இக் கிழங்கைச் சோதித்தவரையில் அது மணம் சுவை அவுஷத தன்மைகள் அற்ற தென்று கண்டார். இந்த ஒவ்வாமை முடிவன் செறீவர் சொல்லியதால் தெளிவாகும். அவர் சொல்லியது இக் கிழங்கு இளசாயுஞ் சிறிசாய் எலுமிச்சம் பழத்திற் பருச்சாமலும் இருக்கையில் அதைப் பத்துப் பதினைந்து இருபது கிரேன் தேயத்திற் கொடுத்தால், ஸ்குவிலைப் பார்க்க வீரான அமுரித⁹யாய்ச் சேஷ்டிக்கும். பருத்த பின்போ இத்தன்மையை இழந்து உதவாததாகும். பாகாரிலுள்ள நரி வெங்காய வகைகளை எல்லாம் அ. ச. டதர் அதிகமாய்ச் சோதித்து, அதைத் தனியே கொடுத்தபோது தானும் அவ்வளவு நயங் கண்டதால் ஸ்குவிலைத் தான் வழங்கினதருமையென்று சொல்லியிருக்கிறார். இன்னும் இதின் அவுஷத செயலைப் பற்றிக் கனிலல்டே என்பவருஞ் சாட்சியிட்டிருக்கிறார். ஆதலால் ஸ்குவினுக்குப் பதினாகத் தாராளமாய் இதை வழங்கலாம் என்பதற்குச் சந்தேகமில்லை. ஆயினும் இவ்விரண்டினது சத்தும் ஒன்றுக்கொன்று எவ்வீதம் என நிதானிக்கவேண்டியது. இக்கிழங்கின் இன்வூச¹⁰த்தைத் தான் நீர்க்கோவைக்காரருக்குக் கொடுத்தேன்

1 Diluted Acetic acid. 2 Proof spirit. 3 Minim. 4 Water bath. 5 Specific Gravity. 6 Ammoniacum. 7 Hard soap. 8 Treacle இசுருப்பான். 9 Diuretic, 10 Infusion.

என்றும், அது கடுஞ் செயல் காட்டாதிருந்தாலும் அமுரிதியாய்ச் சேஷ்டித்ததென்றும் அஸ்வல்டர் சொல்லியிருக்கிறார். மேலும் அவர் புறங்கீது¹ நோய்களில் ஐந்து கிறேன் தேயத்தில் எக்ஸ்பெக்து²மாயும் இதை வழங்கினார். ஆனால் உண்டான நயஞ் சொல்லப்படவில்லை.

சிறு நீர்வெங்காயம். *Ledebouria hyacinthoides*. இப் பூண்டு இந்துவின் பல இடங்களில் மணற்றரைகளிலுள்ளது. இதின் கிழங்கு தோற்றத்தில் ஸ்குவிலைப் போன்றது. பருப்பத்தில் அதிலுஞ் சிறுத்தது. கைப்பும் உவட்டுமான காரச் சுவையுடையது. குதிரைகளுக்கு உண்டாகும் கடுமையான சலக்கடுப்பையும், காய்ச்சலையும் மாற்றுவதற்காக இதை வட. இந்துவிலுள்ள குதிரை வைத்தியர் வழங்குவார்கள். சில வருஷங்களுக்காவம்பாய் மருந்துச்சாலையில் ஸ்குவினுக்குப் பதிலாக இது வழங்கப்பட்டது. ஆயினும் ஒஷானசியென்பவர் சோதித்துப் பார்த்தஅளவில் இதை நல்ல மருந்தென்று ஒப்புக்கொள்ளவில்லை.

கற்றழை. *Aloe Indica*. சிறுகற்றழை. *Aloe litoralis*. கற்றழை தென்மேற்கு இந்துவின் காய்ந்த மணல் நிலங்களில் உண்டாகின்றது. சிறு கற்றழை சென்னைத் தேசத்தின் கடற்கரையடுத்த மணல் நிலங்களில் உண்டாகும். பெரைர் சொல்லுகிறபடி கற்றழையினின்றே இந்துச் சகை எடுக்கப்படும். கன்னியாகுமரியில் சிறுகற்றழை மிகுதியாதலால் அவ்விடம் பிடுங்கப்பட்ட இலையிற் பிழிந்த பிசுபிசுப்பான சாற்றை 1853 ம் ஆண்டு வாரிங்கு பண்டிதர் வறட்டி அன்சுக் கணக்காக உத்தமமான சகை எடுத்தார். இது வாகட சகையின் தேயத்தில் நல்ல விரேசனியாய்ச் சேஷ்டித்தது. இப் பூண்டினின்று நல்ல சகை எடுக்கலாம் என்பதைத் திமக்குபண்டிதரும் உறுதிப்படுத்தினாரென்றி அதைப் பச்சையாயுங் காய்ந்ததாயும் தாம் கொடுத்திருக்கிறோமென்றெழுதியிருக்கிறார். பிறவூரால் ஏற்றிவரும் சகையின்செலவைப்பார்க்க மெத்தக்குறைந்த செலவில் இதிலின்று நல்ல சகை எடுக்கலாம் என்பது நிச்சயம். கடைகளில் வாங்கக் கூடிய சகை மிகுதியாய்ப் பிறவூரால் வருவது. மெத்தச் சக்கட்டையானது. பச்சையாய்ப் பிழிந்த சாறு, வெளித்தாபிதம்³ தானிக⁴தாபிதம் எல்லாவற்றுக்கும் குளிர்ச்சியான பூச்சாகப் பெரும்பாலும் வழங்கப்படும்.

கலைப்பைக் கிழங்கு. *Gloriosa Superba*. இந்து அடங்களும் தாழ்வான காடுகளில் உள்ள இந்தச் சிறப்பான படர்கொடிக் கிழங்கு அலுஷுத செயலுடையதாம். பெர்மனர், ரக்சபேகர், என்ஸ்வியர் முதலியவர்கள் இதைக் கொடிய நஞ்சென்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். சீவர் வைத்தியர் பிரசுரஞ் செய்த நஞ்சு இடாப்பில் இதுவும் சேருகின்றது. ஆயினும் அது நஞ்சென்றதற்கு ஒரு திருட்டாந்தம் ஒருவராலுங் காட்டப்படவில்லை. என்றாலும் இந்துவின் எப் பகுதிகளிலுமுள்ள சனங்களும் பொதுவாய் அதை நஞ்சென்று நம்பி வருகிறார்கள். மேலும் மைசூரிலே நாவிக்⁵ கிழங்கோடு இக் கிழங்கைக் கள்ளமாய்க் கலப்பதைக் கண்டேனென்று பிதி வைத்தியர் வாரிங்கு பண்டிதருக்கு அறிவித்திருக்கிறார். இதின் தன்மைகளைப்பற்றி இன்னும் அறிவது அவசியம். திருவாளங் கோட்டிலே இக் கிழங்கை இடித்துத் திரும்பத் திரும்ப ஊறவைத்துக் கழுவி எடுத்த வெள்ளை மாவைக் கனூறிய⁶ நோய்க்குப் பேர்பெற்ற ஓர் மருந்தாக வழங்கிவருகிறார்கள்.

1 Bronchitis. 2 Expectorant, 3 Inflammation. 4 Local. 5 Bikh. 6 Gonorrhoea.

கிளவரி. *Asparagus Sarmentosus*. இந்துதேசம் அடங்கலும் உள்ள இப் பூண்டின் கிழங்கு பதுமபுரிக்¹கடைகளில் உதீசு²என்ற பேரால் விலைப்படும். அங்காடிகளில் வரும் அதிவடய³த்தில் இதுவும் ஓர் பங்கென்ற நினைக்கிறார்கள். அச்சின்சன் பண்டிதருடைய எழுத்தும் இவ்வெண்ணத்தை உறுதிப்படுத்துகின்றது. ஆனாலும் இது சுவையற்றதாயும் அதிவடயம் சுத்த கடுங் கைப்புள்ளதாயும் இருப்பதால் இவற்றைப் பகுத்தறிவது லகு. இது சவீர் முஸ்வி⁴ என்ற சரக்கிற் கலந்துவருமென்று எண்ண நியாயமுண்டு. சதாவரி⁵ ஏறவரி⁶ என்பவற்றின் கிழங்குகளும் சுதேசிகளால் மருந்தாக வழங்கப்படுமாயினும் பெருதவை போலும்.

மேலந்தாசியங்கள்.

MELANTHACEAE.

கோல்சிகப் பூ. COLCHICUM.

வாசம். இது யுரோபம் அடங்கலும் புற்றரைகளில் உண்டாகும்.

வாகடபகுதிகள். 1. பச்சைக் கிழங்கு. ஆனிக் கடைசி வரையிற் கிண்டித் தோலுரித்துச் சீவல்களாக குறுக்கே வெட்டி 150 பாகைக்குக் சதிக்காத சூட்டிற் காயவைக்கப்படும், பச்சைக்கிழங்கு பாக்களவு பருமையாயும், முகையிற் தட்டையாயும், கபிலமான வெளித்தோலும் மஞ்சளான உட்டோலுமுடையதாயுமிருக்கும். உட்பகுதி வெண்மையாய் உரத்துச் சதைத்திருக்கும். வெட்டும்போது பால்போன்ற, காரமான, கைச்சற் சாறு பொடியும். காய்ந்த சீவல்கள் ஒரு லீன்⁷தடிப்பாயும் அரிதாய் இரண்டு அருகிலும் வழக்கமாய் ஒரு அருகிலும் சற்றே அறவாயும் மாப்பிடித்து உரப்பும் தட்டையும் வெண்மையுமாயுமிருக்கும். 2. விதை. பூரணமாய் முற்றினபின் இது சேர்க்கப்படும். செங்கபில நிறமும், கடுகளவு பருமையும் மெத்த வன்மையுமானது. மணமற்றது, கைப்பான காரச் சுவை கொண்டது. கிழங்கு, விதை, இரண்டினது சத்தும் கொல்சின்⁸என்ற கிரிஸ்தலிக்கக்⁹ கூடிய பதார்த்தத்திலேயே இருக்கும்.

தன்மை. இது ஸ்திமுலம்¹⁰, விசேஷமாய்க் குடலிலும் ஈரலிலும், சன்னசல உறுப்புகளிலும் சேஷடிக்கும். குடலிற் சேஷடிக்கும்போது விரேசனியும் வமனியுமாகும். ஈரலிற் பித்தக்கினியாகும். சன்னசல உறுப்புகளில் அமுரிதியாகும். குவாத¹¹ வாத நோய்களில் இது செரத்வ¹²மாகிறது போலும். பெருந்தேயத்தில் வீரூன மயச்சுழற்சி நஞ்சாகும்.

உபயோகம். குவாத வாத நோய்களில் இது கைகண்ட மருந்து. ஆயினும் மதியோடு மட்டாய்க் கொடுக்கவேண்டும். மற்றும் நோய்களுள் நீர்க்கோவைகளுக்கு இதால் நயமுண்டாகும். பிரதானமாய் அது ஸ்காலதீன்¹³, இதயவியாதிகள், சலப்பை, பிருக்கங்க¹⁴ளின் தாபிதம், சலத்திற் காணும் லிதிக்கமில¹⁵ அடையல்களோடு கூடிய நீர்க்கோவைக்கு நயந்தது. மேலும்

1 Patna. 2 Utees. 3 Atis. 4 Safed musli. 5 *Asparagus racemosa*. 6 *Asparagus ascendens*. 7 Line. 8 Colchicine. 9 Crystallizable. 10 Stimulant. 11 Gout, 12 Sedative. 13 Scarlatina. 14 Kidney. 15 Lithic acid.

வயோதிகரிற் காணும் புரஸ்தகோள¹ வீக்கத்துக்கும், கனுரீயத்துக்²கும், பிரதானமாய்ச் சிசினோத்தையை³ மாற்றுவதற்கும், வாதத்தைப் பற்றி யுண்டான இரிசுத்தாபிதத்திற்கும், செங்கண்மாரி, கொடிய மலவரட்சி, காலி கபுறங்கீது⁴, குக்கல், எரிசிப்பிலசு⁵களுக்கும் தீனியப்புழு⁶வுக்குக் கிருமிகொல்லியாகவும் இது உவந்தது.

தேயம். கிழங்கை மாவாக்கி, அதில் இரண்டு கிறேன் தொடங்கி எட்டுக் கிறேன் வரைக்கு நான் மூன்றுமுறையாவது அதிக முறையாவது கொடுக்கலாம். சுகந்தங்களோடு சேர்த்துக் கொடுப்பதே உத்தமம்.

கிழங்கின் ரசிதங்கள். Preparations of the corm. கோல்சிகவேசிறுத்து. Extract of Colchicum. கொள். பச்சைக் கொல்சிகக் கிழங்கு, தோலுரித்து, ஏழு இரூத்தல்; துவைத்துச் சாற்றைப் பிழிந்து, மண்டி அடையும்படி வைத்துத் தெளிந்த நீரை 212 பாகை சூட்டிற் காய்ச்சி அப்பாற் கம்பளியில் வடித்துக் குளிகைப்பதமாய் வருந்தினையும் நீர்மத்திகத்திலே 160 பாகைக்குச் சூடாக்கி வறட்டிக்கொள்ளவும்.

தேயம். அரைக் கிறேன் முதல் இரண்டு கிறேன் வரைக்கு நாலு ஆறு மணிக்கு ஒவ்வொரு முறை கொடுக்கலாம்.

கோல்சிக அசிதிகவேசிறுத்து. Acetic Extract of Colchicum. கொள். தோலுரித்த பச்சைக் கொல்சிகக் கிழங்கு, ஏழு இரூத்தல்; அசிதிக்க மிலம்⁷, ஆறு அன்சு. கிழங்கைத் துவைத்து அசிதிக்க மிலத்தைச் சேர்த்து, சாற்றைப் பிழிந்து, மண்டி அடையும்படி வைத்துத் தெளிந்த சாற்றை 212 பாகை மட்டும் சூடாக்கி கம்பளியில் வடித்து, மெல்லிய எசிரூத்தாய் வர நீர்மத்திகத்தில் 160 பாகைக்குக் கதிக்காத சூட்டில் வறட்டிக்கொள்ளவும்.

தேயம். அரைக்கிறேன் தொடங்கி இரண்டு கிறேன் வரைக்கு நான் மூன்று நாலு முறை கொடுக்கலாம்.

கோல்சிக வைன். Wine of Colchicum. கொள். கொல்சிகக் கிழங்கு, சீவிக் காயப்போட்டு இடித்து நாலு அன்சு. செரிவைன்¹⁰, அரைநாழி. அடைத்த பாத்திரத்திற் கொல்சிகத்தை ஏழுநாளைக்கு வைனிவிட்டு ஊறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கி அப்பாற் பிழிந்து காரிக்கம் புடைவையில் வடித்து அத்துடன் அரைநாழிக்குப் போதிய செரிவைன் சேர்க்கவும்.

தேயம். பத்து முதல் முப்பது மினிம் வரைக்கு நான் மூன்றுமுறை கொடுக்கவும். நெருக்கடியுங் கொடுக்கலாம்.

விதையின் ரசிதங்கள். Preparations of the Seeds. கோல்சிக விதை ரஞ்சம். Tincture of Colchicum seed. கொள். கொல்சிக விதை இடித்து, இரண்டரை அன்சு; புருவுசீது¹¹ அரைநாழி. அடைத்த பாத்திரத்திற் கொல்சிகத்தைப் பதினைந்து அன்சு சீதில் இட்டு இரண்டுநாள் ஊறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கவும். அப்பாற் சியந்தனியில்¹² ஏற்றி அடைசி நீர் ஒழுகினபின் சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும் விட்டு வடிக்கவும். அப்பாற் சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து, முன் வடித்த நீரோடு கலந்து அரைநாழி தேறப் புருவுசீதைக் கூட்டிக்கொள்ளவும்.

தேயம். பத்து மினிம் முதல் முப்பது மினிம் வரைக்கு நான் மூன்று நாலு முறை கொடுக்கலாம். கொல்சிகத்தை உள்ளுக்குக் கொடுப்பதற்கு

1 Prostate gland. 2 Gonorrhoea, 3 Chordee, 4 Iritis. 5 Chronic Bronchitis.
6 Erysipelas. 7 Taenia. 8 Water bath. 9 Acetic acid, 10 Sherry
wine. 11 Proof spirit, 12 Percolater.

இந்த ரசிதம் மெத்த உவப்பு. குவாத வாத நோய்களுக்குப் பெரும்பாலும் அபாயிலிக¹ளோடு கலந்து கொடுக்கப்படும்.

பச்சைக் கடுரோணி. GREEN HELLEBORE.

VERATRUM VIRIDE.

வாசம். இப் பூடு வட அமரிகத்தின் கிழக்குக் கரையிற் கனடம் துவங் கி, கருலீனம் வரைக்கும் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. வேர்த்தண்டு. இது பின் கோடை காலத்திற் சேர்த்துக் காயப்போடப்படும். தோலால் மூடப்பட்ட துனியும் தடித்த உரத்த அடியும் இதற்குண்டு. அதிலே அநேக வேர்க்கூந்தல்கள் பொருந்தியுமிருக்கு ம். புதிதாயிருக்கையில் அதின் மணங் கெட்டதாயிருந்துங் காய அற்றுப் போகும். சுவை முதல் இனிப்பாயிருந்து பின்பு கசந்து கடைசியிற் கார் ந்து வாயில் நெடுக எரியும்.

தன்மை. வீரூன செரதீவம்². விசேஷமாய் இரத்தோட்டத்தை இதுகு றைக்கும். பெருந்தேயத்தில் வமனியும் வீரூன அவசாதனியுமாகும்.

உபயோகம். துமோனி³ முதலிய தீவிர⁴ தாபிதங்க⁵ள் சிலவற்றுக்கும், தீவி ரகாலிக⁶வாதங்கள், குவாதம்⁷, நுறல்சி⁸, ஈளைகளுக்கும், இதயத் துடிப்பின் கெதியோடு கூடிய இதய வியாதிகள் சிலவற்றுக்கும், இது உபயோகமாய் க் காணப்பட்டது. அந்திரசுர⁹த்துக்கும் கொடுக்கப்பட்டதாயினும் அதிநு லுண்டான நயஞ் சந்தேகம்.

தேயம். வேர்த்தண்டுத் தூளில் ஒரு கிறேன் முதல் இரண்டு கிறேன் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். ரஞ்சமாய்க் கொடுப்பதே உத்தமம்.

ரசிதம். பச்சைக் கடுரோணி ரஞ்சம். Tincture of Green Hellebore. கொள். பச்சைக் கடுரோணி வேர்த்தண்டு பருக்கன் தூளாக, நாலு அன்சு; திட்டசீது¹⁰ அரைநாழி. அடைத்த பாத்திரத்தில் வேர்த் தண்டுத் தூளைப் ப தினைந்து அன்சு சீதில் இரண்டுநாள் ஊறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்க வும். அப்பாற் சியந்தனி¹¹யில் இட்டு நீர் ஒழுகினபின் சேஷமான ஐந்து அ ன்சு சீதையும் விட்டு வடிக்கவும். அப்பாற் சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து, முன் வடித்த நீருடன் கலந்து அரைநாழி தேறத் திட்டசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். ஐந்து மினிம் முதல் இருபது மினிம் வரைக்குச் செயல் கா ணுந்தனையும் மூன்று நாலு மணிக்கொருமுறை கொடுக்கவும். அப்பால் மருந்தை நிறுத்த அல்லது குறைக்கவேணும்.

சபதிலம். SABADILLA.

வாசம். இப் பூண்டு மெக்சிகு தேசத்தில் உண்டாகின்றது.

வாகடபகுதி. கொட்டை. இப் பூண்டின் கனி அரை இஞ்சி நீளமா னது. மெல்லிய சுவரையுடைய வெண் கபிலநிறமான மூன்று அறையுள் ளது. அவ்வறை ஒவ்வொன்றுக்குள்ளேயும் ஒன்று முதல் மூன்று கொட் டைகள் இருக்கும். கொட்டை கால் இஞ்சு நீளமும் கருங் கபில நிறமும் மினுக்கமுமானது. சொற்ப சிறையுள்ளது. கடுங் கார்ப்பும் நெடுங் கை

1 Antacid, 2 Sedative, சர்தனி. 3 Pneumonia. 4 Acute, 5 Inflammation. 6 Chronic. 7 Gout, 8 Neuralgia, 9 Enteric fever. 10 Rectified spirit, 11 Percolator.

ப்புமான சுவைகொண்டது. இதின் சத்து விருத்தியென்ற இதின் அல்கலை வர்த்திலேயே இருக்கும்.

தன்மை உபயோகம். இது அழற்றுந்தன்மை கொண்டது. அந்தெல்மிந்தி. வாதம், துறல்சி நோய்களுக்குக் கொடுக்கப்படும். பேனைக் கொல்லுவதற்கு வெளிமருந்தாக வழங்கப்படும். எவ்விதத்திலும் இது மோசமான மருந்தே. விருத்தியை அடக்கியிருப்பதால் மாத்திரமே இக்கொட்டை வாகடத்துக்குரியதாகின்றது.

ரசீதம். விற்றீதி. Veratria. இது சபதிலக் கொட்டையில் எடுக்கப்படும் ஓர் அல்கலைவம். பூரண சுத்தமானதல்ல. லட்சணங்கள். வெண்ணரை நிறங் கொண்டது. அமாவ³மானது; மணமற்றது; மெத்தச் சொற்ப அளவிற்குநும் நாசித்துவாரங்களைக் கடுமையாய் அழற்றும். அதிகங்கொடிய கைப்பு; மிகக் கார்ப்புக் கொண்டது; நீரிற் கரையாது; சீது⁴, ஈதர்⁵களிலும் கிருச அமிலங்க⁶ளிலும், சொற்பங் கரையக் கபிலமான ராளப் பதார்த்தம் கரையாத அடையலாய்க் கிடக்கும். திறந்தபடி பரமாணுவில் காய்ச்ச, மஞ்சள் நிற நீராக உருகிக் கடைசியிற் சேஷமில்லாமல் எரியும். இது ஓர் வீரண நஞ்சு.

தேயம். கிறேனிற் பன்னிரண்டிலொரு பங்கு முதல் ஆறிலொரு பங்கு வரைக்குக் குளிகையாக்கிக் கொடுக்கலாம். கொடிய நஞ்சாதலால் இதை உள்ளே கொடுப்பது புத்தியல்ல.

விற்றீதியன்கேன். Ointment of Veratria. கொள். விருத்தி எட்டுக் கிறேன்; பூதலாடு⁷ ஒரு அன்சு; ஒலீவ தேலம் அரைத்திரும். விருத்தியையும் தேலத்தையுஞ் சேர்த்தரைத்து லாட்டோடு அவற்றைத் திறமாய்க் கலக்கவும்.

துறல்சி⁸, வாதம்⁹, சோர்வு¹⁰களுக்கு இது நல்லபூச்சு. தேண்புல் வைத்தியர் இந்த அன்கெனை ஒரு அன்சு லாட்டுக்கு விருத்தியிற் பத்து முதல் இருபது கிறேன் வீதமாகச் சேர்த்து வழங்கினார். இதை வழங்குவதிற் கவனம்வேண்டும். கொப்புளங்கொண்ட அல்லது தோல் வழந்தப்பட்ட பகுதிகளுக்கு இதை இட்டால் அல்லது தோலில் அதிகமாய்ப் பூசினால் தேகத்திற் சுவறி நஞ்சாகக் கூடும்.

அவாகடச்சாக்கு. Non-Officinal.

சுரிஞ்சான். Hermodactyl. இச்சரக்கு முன்னே வாத குவர்த பரிகரிப்பிற் பேர்பெற்றிருந்தது. இந்துக் கடைகள் சிலவற்றில் இது இன்னும் வருகின்றது. இதிலே இரண்டு வகை உண்டென்று ஒஷானசி பண்டிதர் சொல்லியிருக்கிறார். ஒன்று கைப்பானது, மற்றது சுவையற்றது. முதலாவதைச் சோதித்த அளவில் கொல்சிகத்தின் தன்மையெல்லாம் இதற்குண்டு என்று அவர் முடிவுகட்டினார். ஆயினும் யுரோப வைத்தியத்தில் இது வெகு காலமாக விலக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதினால் உண்டாகக் கூடிய நயமெல்லாங் கொல்சிகத்தால் இலகுவாயுந் திறமாய் முண்டாகுமாயை யால் இதைத் திரும்ப வழக்கத்திற் கொண்டுவருவதில் ஒரு பலனும் இல்லை. பிள

1 Veratria. 2 Alkaloid. 3 Amorphous. 4 Spirit. 5 Ether. 6 Dilute acid. 7 Prepared Lard ஐதரீயம். 8 Neuralgia. 9 Rheumatism. 10 Paralysis.

ஞ்சென் என்பவர் இதைப்பற்றி விஸ்தாரமாய் எழுதிய விபரத்தில் இதை வாறியக் கொல்சிகம்¹ என்று குறித்திருக்கிறார்.

பல்மாசியங்கள்:

PALMACEAE.

அவாகடச்சரக்குகள். Non-Officinal.

தேன்னை. Cocoanut tree. மரங்களுள் அதி நயங்கொண்டிருக்கிற இந்த மரத்தின் பிரயோசனங்களுள் இதின் பருப்பிற் பிழிந்தெடுக்கும் எண்ணெய்யே இவ்விடத்திற் சொல்லப்படவேண்டியது. புதுத் தேங்காய் எண்ணெய் வெண் மஞ்சள் நிறம் உள்ளது. மணமற்றது. சில நாள் சென்றபின் அதிக நிறமும் பாண்டல் மணமுஞ் சுவையுங் கொள்ளும். 7(1) பாகை சூட்டில் உறையும். இதிலே கொசின்² என்ற உரமான நிணமும் ஒலீயின்³ என்ற நீரான நிணமும் அடங்கியிருக்கும். கொசின் என்பது கிலேசரி⁴ னும் கொசினிக்கமில்⁵ முஞ் சேர்ந்த கலவையேயாகும். இது மலிந்த பொருளாதலால் அதிகமாய் வினிமென் முதலிய பூச்சுகளுக்கு யானமாக வழங்கப்படும். ஆயினும் இந்நோக்கத்துக்கு இது வேர்க்கடலைத் தேலம்⁶ நல்லெண்ணெய்⁷ களைப்பார்க்க இளப்பம். மயிரைப் பெலப்பிக்குந் தன்மை இத்தற்குண்டாம். ஆதலாற் சிர மொட்டைக்கும், காய்ச்சலின்பின்னும் பெலவீனப்படுத்தும் மற்று நோய்களின்பின்னும் தலைமயிர் கொட்டுண்டதற்கும் இது பெரும்பாலும் பூசப்படும். மறுவித்தே⁸ லுக்குப் பதிலாக இதைப் பிரயோகிக்கலாமென்று தம்சன் வைத்தியர் சொல்லியிருக்கிறார். வாறன் முதலியவர்களும் அதின்பேரில் நயந்த சாட்சியிட்டிருக்கிறார்கள். இப்படி வழங்கப்படும் எண்ணெய் வியாபாரத்தில் வாடிக்கையான எண்ணெய்யல்ல. அது இங்கிலாந்துக் கடைகளிற் கட்டி கட்டியாக விருக்கும். அது கட்டியாய் உறைந்த எண்ணெய்யிலிருந்து பிழிந்து, அல்கலைக⁹ னால் சுத்திசெய்து, திஸ்திலித்த தண்ணீராற் திரும்பத் திரும்பக் கழுவின ஒலீயினே. இதைக் கசரோகிகள் 53 பேருக்குக் கொடுத்துப் பரிகரித்துக் கண்ட பலனைப் பற்றித் தம்சன் வைத்தியர் சொல்லியிருக்கிறார். அவைகளுள் முதற்பகுதியான 30 பேரில், 19 பேருக்கு மெத்த நயமுண்டானது. 5 பேருக்கு வியாதி நிலையாய் நின்றது; மிச்சமான ஆறு பேரிலும் நோய் தடங்காமல் அதிகரித்தது. இரண்டாம் பகுதியான 23 பேருள் 15 பேருக்கு மெத்த நயங்கண்டது. 3 பேரில் நோய் நிலையாய் நின்றது; 5 பேரில் அதிகரித்தது. மேலும் இது மறுவித்தேலைப் போல உடம்பின் நிறையையுங் கூட்டுமென்று காறடு வைத்தியர் காட்டியிருக்கிறார். இதை நெடுகக் குடித்தாற் சீரணக் குடிப்பமும் கழிச்சலும் உண்டாகக்கூடுமென்று தம்சன், காறடு பண்டிதர்களும் இதைச் சற்றே சோதித்துப் பார்த்த வாறிங்கு பண்டிதருந் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். இதை வழங்கி வருவது நயமென வன்சொமறின், அஸ்வலுடன் வுட்டரும் எழுதியிருக்கிறார். பெலவீனத்துக்கும் ஆரம்ப கசத்துக்கும் காமாலை நோய்களுக்கும் தேங்காய்ப்பாலை நாலு முதல் எட்டு அன்சு

1 Colchicum Variegatum. 2 Cocin. 3 Oleine. 4 Glycerine. 5 Cocinic acid. 6 Ground-nut oil. 7 Jinjili oil. 8 Cod-liver oil. 9 Alkali.

தேயமாக நான் இரண்டு மூன்று முறையாகக் கொடுத்து நயங்கண்டேன் என்று சாற்று வைத்தியர் எழுதியிருக்கிறார். இது நல்ல சுவைகொண்ட தாதலாற் கோப்பித் தண்ணீர் பசுப்பாலுக்குப் பதிலாக இதைச் சேர்க்கலாம். பிள்ளைகளுக்கும் இதைக் கொடுக்கலாம். பெருந் தேயத்தில் இளம் பேதியாகும். சிலவேளை கமம் பேதியாகவுங்குடமொகையால் உவட்டிப்பை உண்டாக்குகிற ஆமணக்கெண்ணெய் முதலிய பேதி மருந்துகளுக்குப் பதிலாக இதைக் கொடுக்கலாமென்று வுட்டர் சொல்லுகிறார். தென்னங்கள் நொதிப்பாப்பை¹க்கு உவந்தது. பணங்களும் அவ்வாறாகும். இவ்விரண்டிலுமிருந்து சேர்க்கப்படுங் கள்ளுகளிற் சாராயமும் காடி²யும் வடிக்கிறார்களன்றிப்பணங்கட்டியென்ற அசுத்தசர்க்கரையுங்காய்ச்சுவார்கள்.

பனை. Palmyra Palm. அதி பிரயோசனமும் லட்சணமுமான இந்த மரம் இந்துவின் மிகுதியான பகுதிகளில் மணற்றரைகளில் உத்தராட்சம் 30 பாகை வரையில் உண்டாகின்றது. மருந்தாகப் பார்க்கில் இதின் பானையில் ஊறும் சாறே மிக விசேஷித்தது. இளம் பானைகளைத் தட்டிச் சீவி முட்டிகட்டிக் காலை மாலைகளில் அதிகமாய் இதை இறக்குவார்கள். பதநீர் என்னும் நொதிய சாறு இனிக்குமாயினும் சற்றே உவட்டிக்கும். கால் நாழியளவு சில காலை தோறுங் குடித்து வந்தால் இளம் பேதியாகும். இறக்கினபின் நெடுநேரமாய்த் திறந்தபடி வைத்தால் நொதிக்கத் துவங்கி வெறி பானங்களுனொன்றாகிய சாராயமாகும். இந்தக் கள்ளை 920 என்ற விசேஷுகிராவிதம்³ வருந்தனையுந் திஸ்திவி⁴த்தால், வாசுடத்துக்குரியரஞ்சங்கள் முதலான சிவச்சச் செயல்களில் இதையும் புருவுசீதை⁵ப் போலவே வழங்கலாம். யீஸ்துப்பாப்பை⁶க்குப் பதிலாக மெத்த உபயோகமாய் அருட்டக் கூடிய ஓர் பாப்பையைக் கள்ளுமண்டியிற் செய்யலாம். புதிய கள்ளை அரிசி மாவில் விட்டுக் களியாய் வரக் குழைத்து நொதிக்கத் தொடங்குந்தனையும் இளஞ் சூட்டில் வைக்கப் பாப்பையாகும். இதைச் சீலையிற் பரவி அழுகற் புண்கள், பிளவைகள், மந்தமான புண்களுக்கு அணைக்க நன்றாய் அருட்டும். இதை வாரிங்கு பண்டிதர் பலமுறையில் வழங்கி நயமென்று கண்டார். வெளியான காயத்தாலாகும் இரத்தப்பெருக்கைத் தடுப்பதற்கு பனைமட்டைக் கருக்கிற் பிடித்திருக்கும் பஞ்சு போன்ற பூசைச் சிங்கள வைத்தியர் இடுவார்கள். தென்னோலை மட்டையிற் பிடித்திருக்கும் பஞ்சையும் வங்காளிகள் இந்நோக்கமாய் வழங்குவார்கள். திருவாளங்கோட்டிலும் இது இப்படியே வழங்கப்படும். இதனால் மெத்தச் சித்தியாகும். வழக்கமான மருந்து கிட்டாதவிடத்து இது தாவினையாகும். அந்தரிப்பான இடங்களில் இடையூறுகள் சம்பவித்தால் இம் முறைகளை நினைத்திருப்பது நல்லது.

கூந்தற்பனை. Bastard Sago Tree. இது சென்னையின் மேற்குக் கரையிலுள்ளது. இம்மரத்திற் சேர்க்குங் கள்ளைத் திஸ்திவித்து நயந்த ஓர் சீதை⁷எடுப்பார்கள், இது சிகிச்சா செயல்களுக்கு உவப்பாகும். இம்மரத்தின் சோற்றியிற் கீழ்த்தரமான சவ்வரிசி செய்வார்கள். இதின் பதநீரில் கால் நாழியைக் காலை மாறு குடிக்க விரேசனமாகும். மலையாளிகள் இதை அதிகமாய் இப்படி வழங்குவார்கள்.

1 Fermenting poultice. 2 Vinegar. 3 Specific gravity. 4 Distil, 5 Proof spirit. 6 Yeast Poulitice. 7 Spirit,

கழுது. Areca Palm. இது ஒலையையுடைய ஓர் சிறந்த சிறுமரம். வெற்றிலை சுண்ணாம்போடு பாக்கைச் சேர்த்துச் சப்புதல் கீழ்த்தேசங்களில் மெத்த வழக்கம். இது முரசைப் பெலப்பித்து, மூச்சை வாசனையாக்கி, சீரண உறுப்புகளைப் பெலப்படுத்துகிறதென்று நினைக்கிறார்கள். ஆயினுஞ் சுண்ணாம்பு, பாக்கு வெற்றிலையின் நயத்தைக் கெடுத்து சீரணத்துக்கு இடைஞ்சலாகும் அல்லாமல் பலமுறையுங் கொடுப்புப் பீறி என்ற மாறாத புண்ணுக்கு இடமாகின்றது. மாரின் என்பவர் பாக்கைக் கூறுபடுத்திப்பார்த்த அளவில் அதிலே தனிக்கமிலம், கலிக்கமிலங்கள் அதிகமாய் உண்டு என்றுகண்டார். தலீவுச்செறீ¹வில் இதைத்துவரென்று சொல்லியிருப்பது சரி. இந்துவின் சில பகுதிகளில் இதில்லின்று ஓர்வகையான காசுக்கட்டி செய்வார்கள். இக் காசுக்கட்டி இரண்டு மூன்று இஞ்சு அகலமும் அரை இஞ்சு ஒரு இஞ்சு தடிப்பும் இரண்டு மூன்று அன்சு நிறையும்உள்ள வட்டித்தகடுகளாக வரும். உள்ளே கருங் கபில நிறங் கொண்டது. மணமற்றது. வீரான கயர் அல்லது கைப்புச் சுவை உடையது. இது வொதலை மரத்தில் நின்றெடுக்கும் வாகடத்துக்குரிய காசுக்கட்டியின் தன்மைகளை உடையது. அதைப் போலவே வழங்கப்படும். பாக்கைச் சுட்டு அரைத்த பாக்குத் தூள் உத்தமமான பற்பொடியாகும். பாக்குக்குக் கிருமிகொல்லித் தன்மை உண்டென்று சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் இதை வாடிக்கையாய்ச் சப்புகிற இந்துக்கள் பிரமர்களுக்குக் கீரைப்பாம்பு பெரும்பாலும் உண்டாகின்றதாகையால் அத்தன்மை இதற்குண்டெனல் பொருந்தாது. பாக்கை மாவாக்கிப் பத்துப் பதினைந்து கிறேன் தேயமாக மூன்று நாலு மணிக்கொருமுறை கோடுக்க, அது பெலவீனத்தைப் பற்றி உண்டான கழிச்சலைத் தடுக்குமென்று சாற்று வைத்தியர் சொல்லியிருக்கிறார். காய்ந்த கழுக மடல் முறிவுகளுக்குக் கட்ட நல்ல தப்பையென்று பலனாத போசர் சொல்லுகிறார். இந்துவடங்கலும் விசிகங்களில் வழங்குவதற்கு இது மெத்தத் திறமல்லவென்பது அவரது எண்ணம்.

அறுவிடயங்கள்.

AROIDEAE.

அவாகடச் சரக்குகள். Non-Officinal.

வசம்பு. Sweet Flag. இதுவோர் நடபடியான பூண்டு. யுரோபம், ஆசியம், வட அமரிகம் அடங்கலும் ஈரிப்பான இடங்களில் வாடிக்கையாய் உண்டாகும். இதின்வேர்த்தண்டு ஸ்தொமாகி², தொணிக³மாக வெகு காலம் மதிக்கப்பட்டது. இத் தன்மைகளில் இதை வழங்கலாமென்பதற்கு இதற்குரிய சுகந்த கைப்புத்தானே சாட்சி. இதன் காய்ந்த தேறு, சுதேச வைத்தியர் மிகுதியாய் வழங்கும் மருந்துகளில் ஒன்று. இந்துவின் எப்பகுதிக் கடைகளிலும் அகப்படும். வாயுப் பொருமலோடு கூடிய அசத்துவ⁴ குன்மத்துக்கு இது உவந்தது. இது விசேஷமாய்க் குவாத⁵ தேகிகளுக்குண்டாகுங் குன்மத்துக்கு உவந்ததென்று பெரைர் வைத்தியர் சொல்லுகிறார். அந்

1 Taleef shereef, 2 Stomachic, 3 Tonic. 4 Atonic. 5 Gout.

திபிராடி¹யாக இது உதவுமென்று தம்சண்பண்டிதர் கவனித்திருக்கிறார். இந் துக்களுக்குண்டாகும் முறைச் சுரங்களுக்கு இதைப் பெரும்பாலும் கொடு த்துச் சித்திபெற்றோமென்று ரோயில் பண்டிதர் சொல்லியிருக்கிறார். கள ச்சிக்காய்², சிரட்டுச்சி³ முதலிய கைப்புகளோடு கலந்தே அவர் இதைக் கொ டுத்தார். பெலன் குன்றின் அசத்துவ காய்ச்சல்களுக்குக் கொடுக்கும் இவ் வகுப்பைச் சேர்ந்த மற்ற மருந்துகளுக்கு இது தகுந்த அனுமருந்தாகும். அந்நோய்க்கு இது ஓர் உச்சிதமான ஸ்திமுல சுவேதனியென்று, ரோசுவை த்தியர் சொல்லுகிறார். அசத்துவ கழிச்சலுக்கும் வாந்திபேதியைப்போ ண்ற கழிச்சலுக்கும் இது உவந்ததென்றும் கூறினார். வசம்பு மாவைக் கா ட்டுமுந்திரிச் சீதிற்⁴ குழைத்துப் பூசல் காலிகவாதத்துக்கு ஓர் நயந்த பூச்சு என்றுஞ் சொன்னார். இதால் இவற்றிற் காணும் நயத்தைப்பற்றி அவர் மெத்தவும் பாராட்டுகிறார். தெள்ளு முதலிய பூச்சிகளைக் கொல்லுந் தன் மையுங் கீலக்குந்தன்மையும் இதற்குண்டென்று இந்துவிவ்ருந்துவந்த எழு த்துக்கள் பலவற்றிற் கண்டிருக்கின்றது. காய்ந்த வசம்பு மாவின் தேயம் இருபது கிறேன் முதல் நாற்பது கிறேன் வரைக்குமாம். கூடவுங் கொடு ச்சலாம். இவ்வுசுமாய்க் கொடுப்பதே உத்தமம். அதற்கு வீதம் இடித்த வசம்பு ஒரு அன்சு; கொதிநீர் பத்து அன்சு. தேயம் ஒன்றரை முதல் இர ண்டு அன்சு வரைக்கு, வசம்புத் தேறு பல நீளமும் பெருவிரலளவு பரு மையும், தட்டையுமான துண்டுகளாக வரும். மெதுவானது. உறைபோ ண்ற வளையங்கள் பலவற்றை உடையது, ஓர்வகையான சுகந்த மணமுங் கைச்சலான கார்ப்புச் சுவையும் அதற்குண்டு. அதிலடங்கிய ஓர் அத்திர எண்ணெய்யில்⁵ அதின்சத்து இருக்கும். லண்டன் ஏதிர்பரு வாமகுபீயங் க⁷ளில் அது வாகடச் சரக்காயொப்புக்கொள்ளப்பட்டும், பிரித்தன்வாமகுபீ யத்திலோ விடப்பட்டது.

அத்தித்திப்பிலி. *Scindapsus officinalis*. இந்தப் பூண்டு இந்துவின் அனேக பகுதிகளில் உள்ளது. இதின் காய்ந்த பழச் சீவலாகிய வற்றல் இந்து பதார்த்தசாரத்தில் குச்சுப் பிப்பிலி⁸ என்ற பெயரால் வழங்கும். இத ற்கு ஸ்திமுல⁹, சுவேதன¹⁰, அந்தெல்மிந்தி¹¹ த்தன்மைகள் உண்டாம். ஆயினும் இதின் தன்மையைப்பற்றி நாம் அறிந்ததெல்லாம் முற்றாய்ச் சுதேசிகளின் சாட்சியைப்பற்றியே. சாமக்கிழங்கின் *Colocasia* சாற்றுக்கு ஸ்திப்திகு¹² த்தன்மை உண்டென்று பலநாற்போசர் மெத்த விதக்கிறார். நாடியாற் பெ ருரும் இரத்தத்தைத் தானும் இது தடுக்குமென்றும் இது இடப்பட்ட காய ம் பெரும்பாலும் முதல் முறையில் ஒன்றி மாறுகிறதென்றும் அவர் சொல் லுகிறார். கருணைப்பூ¹³, பலவிலைத்திரகந்திப்பூ¹⁴, பெருங்கிழங்குக்கோ லுநாசிப்பூ¹⁵, மலையலுநாசிப்பூ¹⁶ என்பவைகளினதும் இந்துவில் ஆதி யாயுண்டாகும் இவற்றின் வகுப்பைச் சேர்ந்த சில பூடுகளினதும் கிழங்கு எல்லாம் பச்சையாயிருக்கையில் மெத்தக் கார்ப்பானவைகள். இவைகளைச் சுதேசிகள் பலவகையான நோய்களிலும் ஸ்திமுலவணைவுகளாக வழங்கு வார்கள். ஆயினும் இவைகளால் உண்டாகக்கூடிய நயம் கடுகுப்பற்றற் சுறுக்கிலுண்டாகும். இவற்றிலுள்ள கார்ப்பான சாரஞ் சுறுக்கு ஆவியாய்

1 Antiperiodic. 2 Bonduc nut. 3 Chiretta. 4 Cashew spirit. 5 Infusion.

6 Volatile oil. 7 Pharmacopoeia. 8 Gujipul. 9 Stimulant. 10 Diaphoretic.

11 Anthelmintic. 12 Styptic. 13 Typhonium orixense. 14 Dracontium

Polyphyllum. 15 Colocasia macrorrhiza. 16 Alocasia montana.

ப் போகக்கூடியது. குடுபட்டால் அல்லது காய்ந்தால் இக் கிழங்குகள் கார்ப்பற்று நல்ல உணவாகும். திரகந்தி¹ப் பூண்டின் பச்சைக் கிழங்குக்கு வீரூன அந்திஸ்பசத் தன்மை உண்டென்று மலையாளத்துச் சனங்கள் சொல்வார்கள்.

சைபராசியங்கள்.

CYPERACEAE.

கோரை. *Cyperus rotundus*. இப் பூண்டு இந்துவடங்களும் ஈர நிலங்களிலுள்ளது. இதின் கிழங்கு நீள வட்டமானது. பிற முட்டையளவு பருமையுள்ள இலைபோன்ற வேரால் இணைந்திருக்கும். உள்ளே வெண்மையும் நொருக்கலும் கண்ணறையுமானது. இனிப்புஞ் சற்றே சுகந்தமணமுள்ளது. சுவை கைப்பு ; காய்ந்ததானால் ராளமும் பல்சமும் போலக்காட்டும். இதற்கு ஸ்திமுல² சுவேதன³ அமுரிதித்⁴ தன்மைகள் உண்டாம். மேலும் தலீவுச்செரீவிலே துவரென்றும் அந்தெல்மிந்தியென்றும் இது சொல்லப்பட்டது. கற்குத்தாலிலுள்ள சனங்களுக்குள்ளே இது வீரூன தொணிகமாகக் கீர்த்திபெற்று விசேஷமாய் இரைப்பைப் பிசுகளுக்குக் குடலழற்சிக்கும் அவர்களால் வழங்கப்படுகின்றது. இதைக் கொடுத்ததால் இரண்டுபேர் வாந்திபேதியினின்று சுகப்பட்டார்களெனக் காடுவிக்கர் எழுதியிருக்கிறார். ஆயினும் இந்நோய் இம்மருந்தால் எவ்வளவுக்கு இளகி நதென்பதுசந்தேகம். முத்தக்காசுக் கிழங்கு *Cyperus pertenuis* க்கும் கோரைக் கிழங்கின் சுகந்ததன்மைகள் உண்டு. அது சுவேதனி, அமுரிதியென்று கொள்ளப்படும். இவ்விரண்டு கிழங்குகளும் அற்ப சரக்குகளேயாகும்.

கிறமீனியங்கள்.

GRAMINEAE.

இரூய்த் தானியம். RYE.

வாசம். இது யுரோபம் அமரிகம் என்ற தேசங்களின் அனேக பகுதிகளில் செய்கைபண்ணப்படும்.

வாகடபகுதி. இரூய்த் தானியத்தின் உமிக்குள் கட்டும் சக்காகிய செங்கிலாவிசெப்பு⁵ என்ற வங்கசு⁶. இது ஏர்கற்று⁷ எனப்படுகிறது. இதின் லட்சணங்களாவன : இது திரண்ட முக்கோணமாயும் வளைந்ததாயும் கவிந்தபக்கம் நெடுகவோர் தவாளிப்புள்ளதாயும் இரண்டு தலையும் மழுங்கலானதாயுமிருக்கும். நீளம் இஞ்சில் மூன்றத்தொரு பங்கு முதல் ஒன்றை இஞ்சுவரைக்கிருக்கும். வெளிப்பக்கம் செங்கபில நிறமுள்ளது, உட்பக்கம் வெண் சிவப்புநிறமுள்ளது; உரமானது; நொருங்கக்கூடியது; குறுக

1 Dracontium Polyphyllum, 2 Stimulant, தீவன. 3 Diaphoretic, தியுநீச்சம். 4 Diuretic தியுநீச்சம். 5 Claviceps purpurea. 6 Fungus. 7 Ergot.

ஒடியும்; சொற்ப மணமுடையது; இதை மாவாக்கிப் பதாசி நீர்¹ விட்டு அரைத்தால் வீரூன மணம் வீசும்; இதின் சத்து சேகலீனம்² என்ற எசுரூத் திவு³போன்ற அல்கலவத்திலேயே⁴ இருக்கும்; இதிலே ஓர் திர எண்ணெய்⁵ யுமுண்டு. இது செகலீனத்தின் ஒரு பங்கை அடக்கியிருக்கிற கார்ப்பற்ற எண்ணெய்போலும், ஏர்கற்றை 212 பாகை சூட்டில் உலர்த்தி நன்றாயடைத்த சீசாக்களிவிட்டு வைத்திருக்கவேண்டும்.

தன்மை. இது ஸ்திமுலம். இதின் செயல் விசேஷமாய்க் கருப்பைப் பேசித் திசுவினும் சனை உறுப்புகளிலுமே விளங்கும். ஆகையால் பிரசவ நோக்காட்டை உண்டாக்குவதற்கும், எம்மெனகக்காகவும் இது உபயோகமானது. துவர்த்தன்மையும் இதற்குண்டென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. உணவாயாவது மற்றெவ்வகையாவது நெடுகத் தின்றால் நஞ்சாகும். அதினால் உடம்பிற் கோத⁶ ஏர்கற்றிசம்⁷, ஸ்பச⁸ ஏர்கற்றிசம் என்னும் இரண்டு கேடான நிலையுண்டாகும்.

உபயோகம். கருப்பைத் தசையான சுவர் சுருங்காததினால் நோக்காடு குறைந்து பிரசவம் நெடுகிநிற்பதற்குக் கொடுக்கப்பெயரான மருந்து. இக் காரணமாகவே உண்டான அணைய மறிக்கும்⁹ பிரசவத்திற் காணும் இரத்தப்பெருக்குக்கும் உவந்தது. மேலும் சனைசல உறுப்புகளின் நோய்களுள் அமெனுறீயம்¹⁰, லுகறீயம்¹¹, குலொரோசி¹², அபலமெனுறீயம்¹³, கருப்பை நிபோஷங்களுக்கும்¹⁴, சலப்பையின் பேசிக்கவசம் இளகிக் குறைவாய்ச் சுருங்குதலாலாவது சோர்வினாலாவது உண்டான சல அடைப்புக்கும் சல வொழுக்கு, கனுறீயம்¹⁵, கிலீற்று¹⁶, ஸ்பமதுறீயங்க¹⁷ளுக்கும் இது கைகண்டது. மேலும் அசத்துவமான இரத்தாமுரி¹⁸க்கும் சபலவகையான மற்றும் இரத்தப்பொசிவு காலிக தியறீயங்க¹⁹ளுக்கும் கண்ணை அதிகமாய் வழங்கினதாற் பெலக்குறைவைப்பற்றியாவது இசைவுக் குழப்பத்தைப்பற்றியாவது நிற்கிற கண் வியாதிகள் சிலவற்றுக்கும் இது உபயோகமானது.

தேயம். நோக்காட்டைக் கிளப்புவதற்குப் புது ஏர்கற்றைத் தூளாக்கி அதில் இருபது கிரேன் முதல் முப்பது கிரேன் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். பின்னுங் கொடுக்கவேணுமாகில் இருபது முப்பது மினி வேளையால் இரண்டொருமுறை கொடுக்கலாம். எம்மெனகக்குத் துவர்களாக நாலு முதல் ஆறு கிரேனை நான் இரண்டு மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம்,

ரசிதங்கள். ஏர்கற்றின்வூசம். Infusion of Ergot. கொள். ஏர்கற்று பருக்கன்பொடியாக கால் அன்சு; கொதிவெந்நீர் பத்து அன்சு. மூடியபாத்திரத்தில் அரை மணிநேரம் ஊறவிட்டுச் சீலையில் வடிக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சுவரைக்கு. ஏர்கற்றுத் தூளைப் போலவே இதையுந் திரும்பத் திரும்பக் கொடுக்கலாம். இன்வூசம் தேவையானபொழுதே அதைப் புதிதாய்ச் செய்துகொள்ளவேண்டும்.

ஏர்கற்றிரஞ்சம். Tincture of Ergot. கொள். ஏர்கற்று பருக்கன்தூளாக, ஐந்து அன்சு; புருவுசீது²⁰ அரைநாழி. ஏர்கற்றை மூடிய பாத்திரத் திற் பதினைந்து அன்சு சீதிவிட்டு இரண்டுநாள் இராப்பகலூற விட்டு இடைக்கிடை குலுக்கவும். அப்பாற் சியந்தனி²¹யில் வார்த்து நீர் ஒழுகித்தீர்

1 Liquor Potash. 2 Secalina. 3 Extractive. 4 Alkaloid. 5 Fixed oil. 6 Gangrene. 7 Ergotism. 8 Convulsive. 9 Retention of placenta. 10 Amenorrhoea. 11 Leucorrhoea 12 Chlorosis. 13 Atonic Menorrhoea. 14 Hypertrophy. 15 Gonorrhoea ஹெட்டை. 16 Gleet. 17 Spermatorrhoea தாதுக்கழிச்சல். 18 Haematuria, 19 Diarrhoea, 20 Proof Spirit, 21 Percolator.

ந்தபின் சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும் வார்த்து வடியவிடவும். சக் கையைப் பிழிந்து வடித்து நீர்களைக் கலந்து அரைநாழி தேறச் சீது கடட் டவும்.

தேயம். பத்து மினிம்¹ முதல் அறுபது மினிம் வரைக்குக் கொடுக்க லாம்.

ஏர்கற்றுநீரெசிற்த்து. Liquid Extract of Ergot. கொள். ஏர்கற்று பருக்கன் தூளாக ஒரு இரூத்தல்; ஈதர்² அரை நாழி, அல்லது போதியது; திஸ்திலித்த தண்ணீர், ஒன்றேழுக்கால் நாழி; திட்டசீது³, எட்டு அன்சு. ஈதரைக் கால் நாழி தண்ணீரோடு ஒரு சீசாவில் விட்டுக் குலுக்கிப் பிரிந்த பின் ஈதரைத் தெளித்தெடுக்கவும். ஏர்கற்றுத் தூளைச் சியந்தனியில் ஏற்றி அடைசிக் கழுவின ஈதரை அதின்மேல் மெல்ல மெல்ல வார்த்து அதிலுள் ள எண்ணெய்யைக் கழற்றவும். பின்பு ஏர்கற்றை எடுத்து 160 பாகை சூடு ள்ள ஒன்றரை நாழி நீரில் பன்னிரண்டு மணி நேரம் ஊறப் போட்டுப் பி ழிந்து சீலையில் வடித்து அந்த நீர் ஒன்பது அன்சாய் வருந்தனையும் அதை நீர்மத்திகத்தின் சூட்டில் வற்றப்பண்ணி ஆறினபின் சீதைக் கூட்டி ஒரு மணி நேரம் ஊறவிட்டு அப்பால் வடிக்கவும். வடிந்த நீர் பதினாறு அ ன்சாய் இருக்கவேண்டும்.

தேயம். பிரசவ நோக்காட்டைக் கிளப்புவதற்குப் பத்து மினிம் முதல் முப்பது மினிம் வரைக்கு இதிற் கொடுக்கலாம்.

[இரூய்த் தானியத்தில் உண்டுபடுவது போன்ற ஓர் சக்கு இந்துவின் வட பகுதிகளிற் செய்கையாகும் வாற்கோதுமைகளில் உண்டுபடுவதைத் தலர் பண்டிதர் கண்டார். இப்படிச் சக்குப்பிடித்த தானியம் கொடிய நஞ்சா னதாம். ஒற்ஸ் தானியத்திலும் சிலவேளை ஒல்கஸ்பிகாது⁴ என்ற சாமையி லும் இப்படிச் சக்குப்பிடித்ததை அவர் கண்டார். நெல்லிலும் இது உண் டாகிறது.]

பிறித்தனிற் பதினைந்துக்குக் குறையாத தானிய வகைகளில் ஏர்கற்று உண்டாவதைக் குக்கென்பவர் கண்டார். இரூய் ஏர்கற்றைப் பார்க்கக் கோதுமையில் உண்டாகும் ஏர்கற்றே பிரசவ நோக்காட்டைக் கிளப்புவத ற்கு உத்தமமானதாம்.

கரும்பு. SUGAR CANE.

வாகம். இது பூமியின் உஷ்டண பகுதிகள் எல்லாவற்றிலும் உண்டா க்கப்படும்.

வாகடபகுதி. 1. சுத்தசர்க்கரை. இது கருப்பந் தடிகளின் சாற்றிலிரு ந்து எடுக்கப்படும். இது நல்ல வெண்மையும் இனிப்புமானதாய் மணமற் ற வரைக் கிரிஸ்தல்க⁵ளாக இருக்கும். இதின் கெமிஸ்த கூட்டைக் குறிக் குஞ் சின்னமாவது: கா¹² ஐ²² அ¹¹. 2. சர்க்கரையைச் சுத்தமாக்கும்போ து கிரிஸ்தலாகாமல் எஞ்சியிருக்கும் தடித்த பாணி. இது கபில நிறமான து; மெத்த இனிப்புள்ளது; நொதிக்கக் கூடியது. கிரிஸ்தலாகமாட்டாதது. ஏறக்குறைய 1.40 என்ற விசேஷகிறாவிதம்⁶ உடையது. சோதனை. புகை ச்த மணம் சுவையற்றது.

1 Minim. 2 Ether. 3 Rectified spirit. 4 Hocus spicatus. 5 Crystal.
6 Specific gravity.

தன்மை உபயோகம். இது திமல்சம்¹, போஷணி², உணவுக்கேற்றது. உவட்டு மருந்துகளின் சுவையை மறைப்பதற்கும், சிறுபங்கள், லேகியங்கள், வில்லைகள் செய்வதற்கும் இது அதிகமாய் வழங்கப்படும். குளிகை உருட்டுவதற்குக் கருப்பம் பாணி விசேஷமாய் வழங்கப்படும். குளிகை மருந்து பசைகொண்டு மெதுவாய் இருப்பதற்கும் சக்குப் பிடியாமலுஞ் சில வேளைகளிற் கெமிஸ்த மாறுதல் அடையாமலும் இருப்பதற்கும் இது உதவுகின்றது. சர்க்கரை இக்குப்பாணி இவ்விரண்டின் அலுஷத் தன்மைகளும் முக்கியமல்ல.

சர்க்கரை ரசிதம். சிறுபம். Syrup. கொள், சுத்த சர்க்கரை ஐந்து இரூத்தல்; தண்ணீர் ஒருநாழி. சர்க்கரையைத் தண்ணீரிலே சூட்டாற் கரைத்து ஆறவிட்டு அப்பாணி ஏழரைஇரூத்தல் நிறுக்கப் போதிய தண்ணீர் சேர்க்கவும். பாணியின் விசேஷகிருவிதம் 1:330 ஆயிருக்கவேண்டும். இது பிரதானமாய்ச் சுவை ருசிக்காக வழங்கப்படும்.

வாற்கோதுமை. BARLEY.

வாசம். இது மத்திம பூமி அடங்கலுஞ் செய்யப்படும்.

வாகடபகுதி. தீட்டின அரிசி. இது வெள்ளையாயும் உண்டையாயும் சொற்ப பிளவுள்ளதாயும் இருக்கும்.

தன்மை உபயோகம். திமல்சம். நோயாளருக்குப் போஷணை கொடுக்கும் உணவாகப் பெரும்பாலும் இது வழங்கப்படும்.

ரசிதம். வாற்கோதுமைத் தீகாக்தம். Decoction of Barley. கொள். வாற்கோதுமை அரிசி, இரண்டு அன்சு; தண்ணீர் முக்கால் நாழி. வாற்கோதுமை அரிசியை வேறு தண்ணீரில் அலம்பி யெடுத்து முக்கால்நாழி தண்ணீருடன் சேர்த்து மூடிய பாத்திரத்தில் இருபது மினி நேரமாக அவித்துச் சீலையில் வடிக்கவும். இது நல்ல திமல்ச பானம். இவ் வகுப்பான மருந்துகள் தேவையான போதெல்லாம் விரும்பிய அளவுக்கு இதிற் குடிக்கலாம்.

கோதுமை. WHEAT.

வாசம். இது பூமியின் மத்திம பகுதிகள் அடங்கலுஞ் செய்கைபண்ணப்படும்.

வாகடபகுதி. 1. இடித்துத் தெள்ளியெடுத்த அரிசிமா. 2. தானியத்தில் இருந்தெடுத்த அமைலம்³. இது வெண்மையான கட்டைக் கம்பிகளாக இருக்கும். இதைக் குழி அம்மியிற் போட்டுச் சுத்த தண்ணீர் சொற்பமாய் விட்டு அரைத்துச் சோதனைத்தானைப் போட்டுப்பார்த்தால் அமிலமா⁴யாவது அல்கலீயாயாவது தோன்றாது. அதிலே வடிந்த நீரில் இயோதீ⁵ரை விட்டால் அது நீலமாகாது. வெந்நீரோடு கலந்து ஆறினபின் இயோதீ⁶ரை விட அது கருநீலமாகும்.

தன்மை உபயோகம். இது திமல்சமும் போஷணியுமானது. கோதுமைமா, எரிசிப்பிலசுக்கும் மற்றும் வெளித் தாபிதங்களுக்கும் சாந்தியான

1 Demulsion. 2 Nutritive. 3 Amylum or starch. 4 Acid. 5 Alkali. 6 Iodine. 7 Erysipelas. 8 Inflammation.

மருந்தாகும். வெந்து தோலுரிந்த இடங்களைப் பரமாணு படாமற் காப்பதற்காக அவைகளிற் தூவப்படும். மேலும் இரசம், செம்பு, துத்தம், வெள்ளி, தகரம், இயோத¹ ரசிதங்க²ளின் நஞ்சுண்டவர்களுக்குக் கோதுமை மாவைத் தண்ணீரிற் கரைத்து கெமிஸ்த³ மாற்றாக உள்ளே கொடுப்பார்கள். லீனக் களி⁴யிலும் மற்றுங் களிகளிலும் இது ஓர் கூறுகின்றது. குளிகை செய்வதிற் கோதுமை அப்பம் வழங்கப்படும். மேலும் அதைத் தண்ணீரில் நனைத்துக் களியாகவும் கட்டுவார்கள்.

ரசிதங்கள். அமைலழ்சிலாது. Mucilage of Amylum. கொள். அமைலம், தூற்றிருபது கிறேன்; தண்ணீர் பத்து அன்சு. அமைலத்துக்குத் தண்ணீரைப் படிப்படியாய்க் கூட்டி யரைத்துப் பிற்பாடு ஓயாமற்கலக்கிச் சில மினி நேரமாகக் காய்ச்சவும்.

இது திமல்சமானது; திசந்தெரி⁵க்கும் மற்றுங் குடல்நோய்களுக்கும் மருந்துகளைப் புகட்டுவதற்கு நல்ல யானமாகும்.

அமைல கிலேசரின். Glycerine of Amylum. கொள். அமைலம் ஒரு அன்சு; கிலேசரின், எட்டு அன்சு. நன்றாய்ச் சேருந்தனையும் அவைகளை அரைத்துப் பீங்கான் பாத்திரத்தில் வார்த்துப் படிப்படியாய் 240 பாகை வரைக்குச் சூடேற்றி அமைல அணுக்கள் முற்றாய்க் கரைந்து உருவொளிப்பாணியாய் வருந்தனையும் ஓயாமற் கலக்கவும். சரும நோய்கள், வழந்தல்கள், மற்றுந் தானிக நோய்களுக்கு இது நல்ல திமல்ச அணைவாகும்.

*நெல்லு. RICE.

வாசம். இது உஷ்டண தேசம் அடங்கலும் செய்கைபண்ணப்படும்.

வாகடபகுதி. 1. அரிசி. இது ஒரு லீன் முதல் மூன்று லீன் வரைக்கு நீளமுள்ளது; வெண்மையும் சற்று உருவொளியுமானது; திரண்டது; தவாளிப்புகளுடையது; இரு தலைப்பும் ஒடுங்கினது; நொருக்கலானது. 2. மா. இது நெல்லரிசியை இடித்துத் தெள்ளி எடுக்கப்படும்.

தன்மை உபயோகம். கோதுமையைப் போலவே. உஷ்டண தேசங்களில் அதிலும் இது கிட்டடியில் மணியாய்க் கிடைக்கக் கூடியதாயிருப்பது இதின் ஒரு விசேஷம்.

ரசிதங்கள். நெல்லரிசித் திகாத்தம். கஞ்சி. Decoction of Rice. கொள். நெல்லரிசி ஒரு அன்சு; தண்ணீர் ஒருநாழி மூடிய பாத்திரத்தில் இருபது மினிநேரம் கொதிப்பித்துக் காய்ச்சிச் சீலையில் வடித்தெடுக்கவும்.

காய்ச்சல் தாபித நோய்களிலும், சலக்கடுப்பிலும் இந்த வகுப்பு மருந்துகள் வேண்டிய மற்ற நோய்களிலும், இது நல்ல திமல்சக் குளிர்த்தியான பானமாகும். உப்புப் போட்டுக் குடித்தாற் சுவைகொடுக்கும். எலுமிச்சம் புளியும் சர்க்கரையும் சேர்க்க அதிக ருசியாகும். யுரோபர் எலுமிச்சம் புளியும் சர்க்கரையும் சேர்த்துக் குடிப்பார்கள்.

நெல்லரிசிப் புற்கை. Poultice of Rice. கொள். நெல்லரிசிமா, போதியது. அதைத் திறந்த பாத்திரத்திற் போட்டு நெருப்பின்மேல் வைத்துப் படிப்படியாய்த் தண்ணீர் சொர்த்துத் தகுந்த பதமான களியாய்வருந்தனையும் ஓயாமற் கிளறவும்.

இந்து வைத்திய சாலைகளில் இப் புற்கை அதிகமாய் வழங்குகின்றது.

1 Iodine. 2 Preparations. 3 Chemical. 4 Linseed poultice. 5 Dysentery.

லீனமாப் புற்கை¹ வேண்டிய தோயாளர்களுக்கெல்லாம் வாறிங்கு பண்டிதர் இதை வெகுகாலமாகப் பிரயோகித்து வந்தார். அதற்குப் பதிலாக இதை வழங்கல் நயமென்று சாட்சியுமிடுகிறார்.

*காமாக்ஷிப் புல். LEMON GRASS. (67)

வாசம். இது இந்து தேசத் தோட்டங்களிற் பெரும்பாலும் உண்டாகப்படும். இலங்கையிலும் இதின் அத்திரதே²லுக்காக அதிகமாய் உண்டாக்கப்படும்.

வாகடபகுதி. அத்திரதேல். இது பச்சைப் புல்லினின்று திஸ்திலித்து எடுக்கப்படுவது; வெண் சிவப்பு நிறங் கொண்டது; உருவொளியானது; மெத்த உறைப்பான சுவையுடையது. எலுமிச்சை போன்ற வாசனை உள்ளது.

தன்மை. இது ஸ்திமுலம்³, காமினதி⁴, அந்திஸ்பசி⁵, சுவேதனி⁶. தானிக மாயிட்டால் ருபிவாஷ⁷னாகும்.

உபயோகம். குடல்களில் உண்டாகும் வாயுப் பொருமலுக்கும் ஸ்பச நோய்களுக்கும், இரைப்பை அழற்சிக்கும் இது நயந்த மருந்து. வாந்திபேதியிலும் வார்தியைத் தணிப்பதற்கு மாத்திரமல்ல, ஆளை அருட்டித் தேற்று வதற்கும் உபயோகமானது. மேலும், காலிகவாதம், துறல்சி⁸, சுளுக்கு முதலிய வருத்தங்களுக்குப் பூசுவதற்கு உவந்தது. (68)

தேயம். மூன்று துளி முதல் ஆறு துளி வரைக்குச் சர்க்கரையிலாவது, இமல்சத்தி⁹லாவது, விட்டுக் கொடுக்கலாம். வெளிப் பூச்சுக்கு இரண்டு மடங்கான ஏதும் மெண்ணெண்ணெயோடாவது சபுலினிமேனோ¹⁰டாவது கலந்துகொள்ளவேண்டும்.

*மாந்தப் புல். CITRONELE.

வாசம். இது சென்னையிலும் இலங்கையிலும் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. பச்சைப் புல்லிலிருந்து திஸ்திலித்தெடுக்கும் அத்திரதேல்¹¹. இங்கிலாந்தில் வாசனைப் பொருட்களை விற்பவர்களுக்கு இந்த எண்ணெய் இலங்கையிலும் சென்னையிலும் இருந்து அனுப்பப்படும். இலட்சணம் தன்மை உபயோகங்களில் இது காமாக்ஷிப்புல் எண்ணெயை ஒத்தது.

*மொக்கிலாமிச்சைப்புல். ANDROPOGON PACHNODES.

இதின் தேல் அத்திரமானதாய்க் காமாக்ஷிப் புல்லினதும் மாந்தப் புல்லினதும் தேலை ஒத்தது. இது வடநடு இந்துவில் வடிக்கப்படும். இது இந்துஸ்தானியில் ருசகாதெல்¹² எனப்படும். இது ஓர்வகை வாசனைப் புல்.

1 Linseed poultice. 2 Volatile oil. 3 Stimulant. 4 Carminative. 5 Antispasmodic. 6 Diaphoretic, திவந்தி. 7 Rubefacient. 8 Neuralgia. 9 Emulsion. 10 Soap liniment, 11 Volatile oil. 12 Rusa-ka tel.

(67) (68) அனுபந்தப்பார்.

இது வாதம், துறல்சி முதலிய வருத்தங்களில் அணைவு மருந்தாக வழங்கப்படும். (69)

அவாகடச்சரக்குகள். Non Officinal.

இலாமச்சை. *Andropogon muricatus*. இப்புல் இஃது அடங்கலும் உண்டு. வாசனை உள்ள அதின் வேருக்காக மெத்த விரும்பப்படும். இதற்கு வெட்டி வேர் என்றும் பேர். இவ் வேர் யுரோப தேசத்துக்கு ஏற்றப்பட்டு அங்கே வாசனைப் பண்டமாக வழங்கப்படும். அந்திஸ்பசு, சுவேதன, அமுரித, எம்மெனகக்குத் தன்மைகள் இசற்குண்டாம். ஆயினுஞ் சொற்ப தீவன சுவேதனியாய் இருப்பதன்றி, மருந்தாகக் கொள்ளப்படத் தகுந்ததல்ல. யுரோப தேசத்தில் இது வழங்கப்படும் வகைகளைக் குறித்துப் பெரைரர் வைத்தியர் சொல்லியிருக்கிறார். சுசேசிகளுக்குள்ளே வழங்கப்படும் வகையைக் குறித்து தலீவுச்செநீவு என்ற நூல் கூறுகின்றது. கைகர் என்பவர் இதைக் கூறுபடுத்தி இதிலே ஓர் ராளமும் கைப்பான எசிறுத்திவும் அத்திரதேலும் அடங்கியிருக்கின்றனவென்று கண்டார். வேர்த்தூளின் தேயம் இருபது கிறேன் வரைக்கு. இதில் இடித்த வேர் இரண்டு திராமைப் பத்து அன்சு கொதி வெந்நீரில் ஊறப்போட்டு இன்வூசு¹ மாக்கி அதிலே ஒரு அன்சு வரைக்குக் கொடுக்கலாம். இதுவரையில் அறிந்த அளவில் இது முக்கியமான ஓர் மருந்தல்ல.

முங்கில். *Bambusa arundinacea*. உஷ்டண தேசங்களில் மூங்கில் அனேக பிரயோசனம் உடையதாய் இருப்பதன்றி இந்துப் பதார்த்தசாரத்தில் ஓர் விசேஷமான சரக்குமாகின்றது. இதின் நயங்களைப்பற்றி தலீவுச்செநீவு வாகடம் விபரமாய்க் கூறுகின்றது. எம்மெனகக்குத்² தன்மை மூங்கில் இலைக்கு உண்டென்ற எண்ணம் இந்துக்களுக்குள்ளேயும் சீனருக்குள்ளேயும் உண்டு. என்றாலும் இந்த நோக்கத்துக்காவது வேறெந்தநோக்கத்துக்காவது இது மருந்தென்று எடுக்கப்பட நியாயங் காணவில்லை. முறிவுகளைக் கட்டுவதற்குத் தப்பைகள்³ சம்பாதிக்க வசதியில்லாதவிடங்களில் வேண்டிய நீளமகலமுள்ள தப்பைகளை மூங்கிற்றடியில் இலேசாய்ச் செய்துகொள்ளலாம். இளமையான பச்சைத் தடி வசையும் ஆகையால் முற்றின காய்ந்த தடியே இதற்குத் திறம். முளிகளிற் பிடித்திருக்கும் கட்டியாகிய மூங்கில் உப்பைப் பற்றி இங்கே குறிப்பாய்ச் சொல்லலாம். இதுண்டாகும் வகை தன்மை முதலியவற்றைப் பற்றிய பூரண விபரம் புரூஸ்தர் பண்டிதராற் பிரசுரஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இதின் பெயர் உபயோகம் முதலியவற்றைப் பற்றிய சில குறிப்புகளை வில்சன் பண்டிதர் சமஸ்கிருத நூல்களிலிருந்து எடுத்து அவற்றோடு அணைத்திருக்கிறார். சிமித்சன், வர்க்கிராய், வெராகிலான், யோன்; தேணர் என்பவர்கள் இதை வெவ்வேறாய்க் கூறுபடுத்திக் குறித்திருக்கிறார்கள். தம்சன் பண்டிதர் கடைசியாய்ச் செய்த சோதனையே அதி பூரணமானது. அவர் சோதனைப்படி இதில் 100 பங்கிலே சிலிசா⁴ 90.5 பங்கும், பதாசி⁵ 1.10 பங்கும், அயபிரவக்சிரம்⁶ 0.90 பங்கும், அலுமினியம்⁷, 0.40 பங்கும், தண்ணீர் 4.87 பங்கும்,

1 Infusion, 2 Emmenagogue 3 Splint. 4 Silica, 5 Potash. 6 Peroxide of iron. 7 Alumina.

(69) அனுபத்திப்பார்.

நஷ்டம் 2.23 பங்கும் சேர்ந்திருக்கின்றன. சுதேச வைத்தியத்தில் ஸ்திமுலும்¹ அபூர்சியுமாக இது மெத்த மதிக்கப்படுகின்றது. ஆயினும் இதின் கூட்டைப் பார்க்கிறவரையில் இது மருந்தாகுஞ்சத்தற்றதென்றே நம்பவேண்டும்.

வீலிசிகள்.

FILICES.

ஆண்வீலிஸ் பூடு. MALE FERN.

வாசம். இது யுரோபம், ஆசியம், வட ஆபிரிகம், அமரிகம் என்ற தேசங்களின் பல பகுதிச் சோலைகள் நிழல்களில் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. காய்ந்த வேர்த்தண்டும், இலைக் காம்பின் அடிகளும் வேர்க்கூத்தல்களும் திரண்ட பங்கு. இது கோடைகாலத்திற் பிடுங்கிச் சேர்க்கப்படும். மணம் தெட்ட மண்மணம். சுவை முதலில் இனித்துப் பிறகு கசந்து உவட்டிக்கும். வேர் மாவும் வேரின் மணம் சுவையை உடையது. அது பச்சையான மஞ்சள் நிறங்கொண்டிருக்கும். அதை நன்றாயடைத்த சோக்களிற் போட்டு வைக்கவேண்டும். இதின் சத்து ஓர் தேல ராளத்தி³ லேயே இருக்கும்.

தன்மை உபயோகம். அந்தெல்மிந்தி⁴; தீனியப்⁵ புழுவைக் கொல்லுவதற்கே விசேஷமாய் உவந்தது.

தேயர். புதுக்க இடித்த வேர்த்துளில் ஒரு திரும் முதல் மூன்று திரும் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். பின் வரும் ரசிதமாய்க் கொடுப்பதே அதிக சித்தியாகும்.

ரசிதம். வீலிஸ்⁶ ரேசி⁷ ரூத்து. Liquid Extract of Male Fern. கொள். ஆண் வீலிஸ் வேர், பருக்கன் தூளாக, இரண்டு இராத்தல்; ஈதர்⁸ இரண்டு நாழி அல்லது போதியது. வீலிஸ் வேரைச் சியந்தனி⁹யில் இறுக்கமாய் அடைசி, ஈதர் நிறமற்றதாய் வடியுந்தனையும் அதை மெல்ல மெல்ல வார்த்து அந்த ஈதரை நீர்மத்தி¹⁰த்தில் வறட்டவும். அல்லது திஸ்திலித்து மறுபடி சேர்க்கவும். ஏண்ணெய் போன்ற எசிரூத்தைப் பேணவும்.

தேயம். விரேசனம்பண்ணியபின் இதில் பதினைந்து மினிம் முதல் முப்பது மினிம்வரைக்கு லேகிய⁹மாயாவது இமல்ச¹⁰மாயாவது கொடுக்கலாம். கைகண்ட ரசிதமாகிய இது வீலிசீத ரேசி⁷ரூத்து என்றும் வீலிசீதர்த்தேல் என்றுஞ் சொல்லப்பட்டதுண்டு.

வங்கஸ்கள்.

FUNGI.

அவாகடச்சரக்குகள். Non-Officinal.

புழங்கோல்பிரமாம்பி. Polyporus Anthelminticus. இது பிரமதேசத்தில் உண்டாகுங் காளான். பிரமர் இதை மூங்கிற் காளான் என்றார்

1 Stimulant. 2 Aphrodisiac. 3 Oleo-resin. 4 Anthelmintic, குமுகொல்லி.

5 Tenia. 6 Ether. 7 Percolator, 8 Waterbath, 9 Confection. 10 Emulsion.

த்தம்பட வாழ்¹ என்றும் புழுக்காளான் என்ற அர்த்தம்பட தான்மூ² என்று சொல்லுவார்கள். அவர்களுள் இது கிருமிகொல்லியாகக் கீர்த்திபெற்றது. இது 1840 ம் ஆண்டில் பக்மன் வைத்தியரால் சென்னை வைத்திய வர்த்தமானியில் முதல் வெளியாக்கப்பட்டது. அதிலே ரிச்சமந்து வைத்தியர் இதை மூன்றுபெயருக்கும் ஷா வைத்தியர் பின் ஒருவனுக்குங் கொடுத்துப் பார்த்த விவரம் இருக்கிறது. கீரைப்பாம்புக்கு³ இதைக் கொடுத்துச் சோதிக்கலாம் என்றே இந்த நாலு உதாரணங்களாலும் விளங்குகின்றது. இதைக் காயவைத்துத் துருவியாவது மாவாக்கியாவது இரண்டு திரும் தேயமாக, வசதியான ஏதும் யானத்திற்கொடுக்கலாம். இது தேகத்தில் யாதொரு செயலுங் காட்டாது. ஆயினும் மூன்றுநாட் காலமே விரேசனங் கொடுக்கக் கீரைப்பாம்பு செத்ததாக விழும். இதினால் இந்த மருந்தே அதைக் கொன்றதென்று விளங்கும். இது மணம் சுவையற்றதாகையால் பிள்ளைகள் தடையின்றித் தின்பார்கள். முதற் தேயத்துக்குக் கீரைப்பாம்பு சமூலா திருந்தால் திரும்ப மூன்றுநாலு திரும் தேயத்திற்குநும் இரண்டு மூன்று நாளுக்கொருமுறை கொடுக்கலாம். அதிகமாய்க் கொடுத்தாலும் இதால் மோசம் உண்டாகிறதாகத் தோற்றவில்லை. இதை இன்னுஞ் சோதிப்பது நல்லது. என்றாலும் பொதுவாய் வழங்கிவருவதற்குப் போதிய அளவாய் இதைச் சம்பாதிக்கக் கூடாதுபோலும். பிரமதேசத்தாருக்குட்தானும் இதற்குப் பதிலாகச் சந்துனின்⁴ சேர்ந்த ஓர் கட்டு மருந்து பிறதேசத்தால் வந்து அதிகமாய் வழங்கப்படுகின்றதென்று மார், ரீன் என்ற வைத்தியர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள். இக் காணானைப் பற்றிய தாவர⁵ விபரத்தை 1866 ம் ஆண்டுத் தோட்டச் சங்கதி⁶யிற் பார்க்கவும்.

லைகேனிகள்.

LICHENES.

ஐசிலன் பாசி. ICELAND MOSS.

வாசம். இது யுரோப அமரிக தேசங்களின் வட பகுதிகளில் வறட்சியான மலைநாடுகளில் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. முழுப் பாசியும். இது இலையைப் போன்ற தகடுகளுள்ளதாய், சுருண்டு வறண்டது. முருந்து போன்றது. கபில வெண்மை நிறமுள்ளது. கீழ்வளம் வெளுத்தது. கசப்பும் வாணித் தன்மையுங் கொண்டது. இதை அதிகமாய்ப் போட்டவித்த நீர் ஆறும்போது களி⁷யாக இறுகும். இதிலே அதிக வீதமான செதிராரின்⁸ என்றும் செதிராரிக்கமிலம்⁹ என்றுஞ் சொல்லப்படும் ஓர் கைச்சற் சத்து அடங்கியிருக்கும்.

தன்மை. இது திமல்சம்¹⁰, போஷணி, தொணிகம்¹¹.

உபயோகம். அதி பெலவீனத்தோடு கூடிய ஸ்துரும¹²நோய்கள், ஸ்கேவி¹³நோய்களுக்கும், தியறீயம்¹⁴, திசந்தெரி¹⁵ முதலிய வியாதிகளிற் காணும்

1 Wamo. 2 Than-mo, 3 Lumbricus 4 Santonine, 5 Botanical, 6 Gardener's chronicle, 7 Gelatine, 8 Cetrarin, 9 Cetraric acid, 10 Demulcent.

11 Tonic, 12 Struma, 13 Scurvy, 14 Diarrhoea, 15 Dysentery,

பெலவீனத்துக்கும் இந்தப் பாசியைத் திகாக்த¹மாயாவது ஜெல்வி²யாயாவது கொடுத்தால் தொணிகமும் போஷணியுமாய் அது சேஷ்டித்து மெத்த நயஞ்செய்யும். கசரோகத்துக்கும் இது நல்லதாம். சிதிரிரின்³ அந்திபிராடி⁴ யாகுமென்றஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ரசிதம். ஐசிலன்பாசித் திகாக்தம். Decoction of Iceland Moss. கொள். ஐசிலன் பாசி ஒரு அன்சு. திஸ்திலித்த தண்ணீர் அரைநாழி. பாசியை வேறு தண்ணீரில் அலம்பிச் சுத்தமாக்கித் திஸ்திலித்த தண்ணீரில் இட்டு மூடிய பாத்திரத்திற் பத்து மினி வரைக்கு அவித்துச் சூடாயிருக்கும் போதே பிழிந்து சீலையில் வடிக்கவும். அப்பால் வடித்தநீர் அரைநாழியாய்வரப் போதிய திஸ்திலித்த⁵ தண்ணீரைச் சக்கையில்வார்த்து வடித்துக்கொள்ளவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் மூன்று அன்சு வரைக்கு நாள் மூன்று நாலு முறை கொடுக்கலாம்.

[இதைப் போஷணியாய் மாத்திரங் கொடுக்க வேண்டுமாகில், இதினுள்ள கைப்புப் பதார்த்தத்தை நீக்க வேண்டும். அதை நீக்க இரண்டு வகை உண்டு. 1 ஒருபங்கு அல்கலைக் காபனசு⁶ம், 375 பங்கு தண்ணீரும் சேர்த்துச் செய்த காரங் குறைந்த அல்கலை நீரில் இந்தப் பாசியின் நிறைப்படி இரு பத்தநாலு பங்கெடுத்து அதில் இதை ஊறப்போடுதல். 2. திஸ்திலித்த தண்ணீரில் அதை ஊறப்போட்டு 180 பாகை சூடு வரைக்கு இரண்டொரு முறை காய்ச்சுதல். இவ்வாறு செய்தபின் அதைத் தண்ணீரிலாவது பாலிலாவது அவிக்கவேண்டும். இந்தத் திகாக்தம் போதிய சாரமுள்ளதானால் ஆறும்போது இறுகிக் களி⁷யாகும். அதற்குச் சர்க்கரை, எலுமிச்சந் தோல், வைண், சுகந்தங்கள் ஏதுஞ் சேர்த்துச் சுவையாக்கலாம். அப்போ அது நோயாளருக்கு உவந்த போஷணையாகும்.]

லிற்மஸ்பாசி. ORCHELLA WEED, LITMUS.

வாசம். இது அத்லாந்திக் சமுத்திரத்திலுள்ள மடேரம் முதலிய தீவுகளிலும் தென்னமரிகத்திலும் கடற்கரைக் கற்பாறைகளிலுண்டாகும். இதைப் போன்ற வுசிவாமி⁸யென்ற ஒரு இனமான பாசி, இந்துவிலும் இலங்கையிலும் ஆகியாய் உள்ளது.

வாகடபதூதி. பாசி முழுவதும். இதின் கஷாயத்திற் சோடம்⁹ அல்லது பதாசி¹⁰யின் செயலால் லிற்மஸ் என்ற நிறப் பொருள் செய்யப்படும்.

தன்மை உபயோகம். இந்த லிற்மஸ், கெமிஸ்த சோதனைக்கு மாத்திரம் உரியதாயிருப்பதாலே வாகடத்துக்குரியதாகின்றது.

ரசிதங்கள். லிற்மசிரஞ்சம். Tincture of Litmus. கொள். லிற்மஸ் மாவாக ஒரு அன்சு; புருவுசீது¹¹ பத்து அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் இரண்டுநாள் ஊறப்போட்டு வடிக்கவும்.

நீல லிற்மஸ்தாள். Blue Litmus Paper. லிற்மசிரஞ்சத்திற் தோய்த்து காற்றில் உலர்த்திய பசையிடாத கடதாசியே.

அமிலம் அமில உப்புகள் இருக்கிறதோ அல்லவோ என்பதைத் தெளிவதற்கு இது வழங்கப்படும். அவை இதைக் கூடக்குறையச் சிவப்பாக்கும்.

1 Decoction. 2 Jelly. 3 Cetrarin. 4 Antiperiodic. 5 Distilled. 6 Alkaline carbonate 7 Gelatine. 8 Fusiformis. 9 Soda. 10 Potash. 11 Proof spirit.

சிவத்த லிம்மஸ் தாள். Red Litmus Paper. பசையிடப்படாத கடு தாசியைச் சொற்ப அளவான சல்பூரிக் கமிலஞ்¹ சேர்த்துச் சிவப்பாக்கப்பட்ட லிம்மசிரஞ்சத்திற் றேய்த்துப் பரமாணுவில் உலர்த்துவார்கள்.

இது அல்கலை²களைச் சோதிப்பதற்கு வழங்கப்படும். அவைகள் இக்கடு தாசியை லிம்மசுக்குரிய நீலநிறமாக மாற்றும்.

[படர்தேமலுக்கு நல்ல மருந்தென்று இந்துவின் சில பகுதிகளிற் பேர் பெற்றிருக்கின்ற 'கோவைத்தூள்'³] என்ற கட்டு மருந்திலே லிம்மஸ் பாசித் தூளும் அதைச் சேர்ந்த இனங்களின் தூளும் சேருகின்றனவென்று கேன்ஸ் வைத்தியர் சொல்லியிருக்கிறார்.]

அவாகடச்சரக்குகள். Non-officinal.

வட்டுக்கற்பாசி. *Parmelia perlata*. இது சென்னையின் அணைக பகுதிக் கற்பார்களில் உண்டாகும். சில வருஷங்களுக்கு முன்னே இதை அழரிதியென்று கவனித்துத் தண்ணீரில் அவித்துக் களியாக அரைத்து இடுப்பில் அணைப்பார்கள். நீர்க்கோவை நோய்க்கு இது நயமென்பதைப் பற்றி ஸ்தீவென்சன், ராட்வடு முதலியவர்கள் சாட்சியிடுகிறார்கள். இவர்கள் சாட்சிப்படி கற்பாசிக் களியை இடுப்புக்கு அணைக்கச் சலம் அடிக்கும். வாடிக்கையான பிரயோகங்களுக்கு மாறா நீர்க்கோவை நோய்கள் இதால் மாறியிருக்கின்றன. ராச்சர் பண்டிதரோ சென்னை விசிகமொன்றில் இதைத் தாம் அதிகமாய்க் கொடுத்துப் பார்த்தோமென்றும் ஒருவரிலாகுதல் சலம் அதிகப்பட்டதைக் காணவில்லையென்றுஞ் சொல்லியிருக்கிறார். இதைச் சோதித்தறிவதற்கு நீர்க்கோவை நோயாளிற் சிலருக்குக் கற்பாசிக் களியையும் வேறு சிலருக்கு லீனக்களி அல்லது அரிசிமாக்களியையும் அணைத்துப் பார்க்கவேண்டும். ஒருவேளை இவைகளை நெடுக அணைப்பதால் உண்டாகும் அனலும் ஈரிப்புமே சலம் விடவில் ஏறக்குறைய ஒரே சரியான செயல் காட்டும்.

அல்கங்கள்.

ALGAE.

*இலங்கைக் கடற்பாசி. CEYLON MOSS.

வாசம். இது இலங்கையிலும் மற்றும் இந்தத் தீவுகளிலும் கடற்கரையில் உண்டாகும்.

வாகடபகுதி. காய்ந்த பாசி. இது வெண் மஞ்சள் நிறமும் ஒரு இஞ்சு முதல் பல இஞ்சு வரைக்கு நீளமுமான கிளைக் கூந்தல்களாக வரும். பருங் கூந்தல்களின் அடி ஈர்க்களவு பருமையும் சிறுக் கூந்தல்களின் அடி தூலளவு பருமையுமாய் இருக்கும். முருந்துபோல் உரப்பானது. கடற்பாசியின் மணமும் உவர்ப்பான சுவையும் உடையது. இதின் சத்து பெத்தின், என்ற இதின் பாணியிலேயே இருக்கும். அதின் வீதம் 100 க்கு 37 முதல் 78 வரைக்கு இருக்கும். (70)

1 Sulphuric acid. 2 Alkali. 3 Goa Powder. 4, Pectin.
(70) அனுபத்தம்பார்.

தன்மை உபயோகம். இது திமல்சம்¹, போஷணி. நோயாளிகள் பிள்ளைகளுக்கு இது சுறுக்கிற் சீரணிக்கும் லேசான உணவு. திசந்தெரி²க்கும் குடலழற்சியை உடைய மற்ற நோய்களுக்கும் உவந்தது.

ரசிதம். இலங்கைக் கடற்பாசித் தீகாக்தம். Decoction of Ceylon Moss. கொள். இலங்கைக் கடற்பாசி மாவாக்கிக் கால் அன்சு; தண்ணீர் ஒரு நாழி. இருபது மினி நேரமாக அவித்துச் சீலையில் வடிக்கவும்.

தேயம். விரும்பிய அளவுக்குக் குடிக்கலாம்.

[இப் பாசியைத் தண்ணீருக்குப் பதிலாகப் பாலில் அவித்தால் அதிக சுவையும் போஷணியுமாகும். மேலும் அதற்குக் கறுவா முதலிய ஏதும் சுகந்தம் சேர்த்தால் இன்னும் இதமாகும். பாசியின் வீதத்தை அரை அன்சாய்ப் போட்டு அவித்து வடித்தால், வடித்த நீர் ஆறும்போது இறுக்கமான களியாகும். அதற்குச் சொற்ப வைன், சர்க்கரை, சுகந்தங்கள்சேர்க்க, தேறு நோயாளருக்கும் நோய்த்த பிள்ளைகளுக்கும் உத்தமமான மெல்லிய உணவாகும்.]

அவாகடச்சரக்குகள். Non-Officinal.

இனியப்படலப்பாசி. Gillur ka putta. இது இந்துஸ்தானிப் பெயரால் வடக்கிந்துவில் வழங்கும். காய்ந்த இலை போன்றது. புறங்குசி³லுக்குப் பேர்பெற்ற மருந்தென்று கொள்ளப்படுகிறது. இது ஓர் கடற்பாசியே. அதை இரவிற் தண்ணீரில் ஊறப்போட்டுக் கஷாயமாக்கிக் காலமே வெறுவயிற்றிற் குடிப்பார்கள். கோப்பென்பவர் அதைப்பற்றி விபரமெழுதியிருக்கிறார். மாதிரிக்காக அதிற் கொஞ்சத்தைத் தம்சன் பண்டிதரிடத்தில் அவர் அனுப்பினார். பிறித்தன் தொடங்கிச் சப்பங்கி வரைக்கும் மத்திம தேசக் கடல்களிலுள்ள பாசியென்று அவர் இதை எண்ணுகிறார். அமூர் ஆற்றுப் பகுதிகளில் நின்று பஞ்சாப்புக்கு இது வருகிறதென்கிறார். இதின் கட்டம் இதில் அடங்கிய இயோத⁴த்தைப்பற்றியதாம்.

1 Demulcent. 2 Dysentery. 3 Bronchocele, 4 Iodum.

நொதிப்புத் திஸ்திலிப்புகளாற்பிறக்கும்

பதார்த்தங்கள்.

PRODUCTS OF FERMENTATION AND DISTILLATION.

பீர் யீஸ்து. BEER YEAST.

இது பீர் என்ற நீரை நொதிப்பிக்கும்போது பிறக்கும் பொருள். இது பிசுபிசுப்பான பாணிபோல் இருக்கும். நுரைக்கும். சூக்குமாட்சி¹யாற் பார்க்கும்போது கம்பேவெச் செல்கள்² அதிலே தோற்றும். இவை தொரு லசெரிவிசி³ எனப்படும். ஆயினும் உள்ளபடி இவை பெனிசிவி⁴ முதலிய சில சக்குகள் அச்சமயம் கொண்டிருக்கும் நிலைமையே.

தன்மை உபயோகம். இது ஸ்திமுலம்⁵; அசத்துவீவகையான காய்ச்சல், திசந்தெரி⁷களுக்கு உபயோகமானது. பிரதானமாய் வெளி ஸ்திமுலமாகக் களியாய் வழங்கப்படும்.

தேயம். அரை அன்சு முதல் ஒரு அன்சு வரைக்கு.

ரசிதம். யீஸ்துப் பாப்பை, Yeast Poultice. கொள். பீர் யீஸ்து, ஆறு அன்சு; கோதுமை மா பதினாறு அன்சு; 100 பாகை சூடான வெந் நீர் ஆறு அன்சு. யீஸ்தை வெந்நீரோடு கலந்து மாவைப் போட்டுக்கிளறிப் பொங்குந்தனையும் நெருப்புக்குக் கிட்ட வைக்கவும்.

நாற்றமான அழுகற் புண்களுக்கும், கன்சர்ப் புண்களுக்கும் இது நல்ல பாப்பை.

[யீஸ்துக் கிடை யாத இந்துதேசத்திற் கள்ளுமண்டிப் பாப்பையை இதற்குப் பதிலாக வழங்கலாம். இதைப் பற்றிப் பனைமரத்தைக் குறித்த விபரத்தில் 260 ம் பக்கத்தில் சொல்லியிருக்கிறது.]

சேரீவைன், SHERRY WINE.

இது திராட்சப் பழச் சாற்றிலிருந்து நொதிப்பால் எடுக்கப்படுகின்ற ஸ்பானிய வைன். வெண் மஞ்சட் கபில நிறமானது. இதிலே அலக்கால் 100 க்கு பதினேழு பதினெட்டுப் பங்கு வீதமாய் இருக்கும்.

தன்மை உபயோகங்கள். இது செறியும் ஸ்திமுலம். பல வகையான பெலவீனங்களுக்கு உவந்தது. வாகடத்துக்குரிய வைன்கள் எல்லாஞ் செய்வதில் இதுவே வழங்கப்படும்.

பிரண்டி. BRANDY.

இது பிரான்சிய வைனைத் திஸ்திலித்தெடுக்கப்படுஞ் சீது. இது வெண்

¹ Microscope. ² Contervoid cells. ³ Torula Cerevisiae. ⁴ Pennicillia. ⁵ Stimulant
⁶ Adynamic. ⁷ Dysentery,

மை அல்லது சற்றுக் கபில மஞ்சள் நிறமும் ஓர்வகையான சுகந்த வையன் மணமுமுடையது.

தன்மை உபயோகங்கள். இது செறியும் ஸ்திமுலம். பின் வருங் கலவையாகக் கொடுப்பதே உத்தமம்.

ரசீதம். பிரண்டிங்கலவை. Brandy Mixture. கொள். பிரண்டி, கறுவாரீர், வகைக்கு நாலு அன்சு ; கோழிமுட்டை இரண்டின் மஞ்சட்கரு; சுத்த சர்க்கரை, அரை அன்சு. மஞ்சட் கருவையுஞ் சுத்த சர்க்கரையையும் சேர்த்துரைத்துக் கறுவாரீரையும் பிரண்டியையுஞ் சேர்க்கவும்.

தேயம். இரண்டொரு அன்சு. காரியங்கண்டு நெருக்கமாய்க் கொடுக்கலாம். காய்ச்சலின் பிற்கால்கள் அசத்துவ¹வகைகளுக்கும் கருப்பை இரத்தப்பெருக்கு மற்றும் இரத்தப் பெருக்குகளாலுண்டாகும் ஆயாசத்துக்கு ம் சீவகரணக் குறைவுகளுக்கும் இது நல்ல ஸ்திமுல²மும் உயிர்ப்பிக்கு மருந்தமாகும்.

அலக்கால். ALCOHOL.

இது தமிழ் அலக்கால். Absolute Alcohol. இது திட்டசீதைச் சுண்ணும் போடு சேர்த்தத் திஸ்திலித்தெடுக்கும் ஓர் அத்திர நீர். இதைச் குறிக்குங் கெமிஸ்த சின்னம் கா³ ஐ⁴ அ. இதின் லட்சணங்கள் சோதனைகளாவன: இது நிறமற்றது; புனைமணமற்றது; விசேஷகிராவிதம்⁵ 0.795 குட்டுக்கு முற்றாய்க் குடிபோகும். தண்ணீர் கலக்க மங்கலாகாது. அநீர⁶துரிசி⁷யிற் படும்போது அதை நீலநிறமாக்காது. இது கெமிஸ்தஅனாவிசு⁸க்கு வழங்கப்படும்.

திட்டசீது. RECTIFIED SPIRIT.

இது கா³ ஐ⁴ அ என்ற சின்னத்தையுடைய அலக்காலும் அதோடு 100 ச்குப் பதினாறு பங்கு வீதமாய்த் தண்ணீருஞ் சேர்ந்த நீர். இனிப்பான நொதிக்கு நீர்களிலிருந்து திஸ்திலித்து எடுக்கப்படும். லட்சணங்களாவன: நிறமற்றது, தெளிந்தது, அதி சலனமுள்ளது, எரியக்கூடியது, சுறுக்கு நெருப்புப் பற்றிப் புகையாமல் நீலச் சுவாலையெகொண்டு எரியும். சோதனைகள். 0.838 என்ற விசேஷ கிராவிதம் உடையது. திஸ்திலித்த தண்ணீரைச்சேர்க்கத் தெளிந்தபடியே இருக்கும். சுத்த அலக்காலுக்குரிய மணஞ் சுவை உடையது. இதில் நாலு அன்சை வெள்ளிநீதுரசு⁷ப் பருமவிலயன⁸த்தில் முப்பது கிறேன் அளவோடு கலந்து ஒருநாளாகப் பிரபையான வெளிச்சத்தில் வைத்து அதில் அடையுங் கருமையான தூளை வேறுக்கியபின் மறுபடியும் அந்தச் சோதனைநீரிலே கலந்து வெளிச்சத்தில் வைத்தால் திரும்ப யாதொரு மாறுதலுமடையாது.

இது பார்மசியில், ரஞ்சங்கள் செய்வதற்கு வழங்கப்படும்.

புருவுசீது. PROOF SPIRIT.

கொள். திட்டசீது, இரண்டரை நாழி ; திஸ்திலித்ததண்ணீர் ஒன்றரை

1 Aodynamic. 2 Stimulant. 3 Specific Gravity. 4 Anhydrous. 5 Sulphate of copper. 6 Chemical Analysis. 7 Nitrate of Silver. 8 Volumetric solution. 9 Pharmacy.

நாழி. கல. சோதனை. விசேஷகிருவிதம்¹ 0.920. மற்றுஞ் சோதனைகள் திட்டசீது²க்குப் போலவே.

தன்மை உபயோகங்கள். வீரான செறியுமிஸ்திமுலம், அதிதேயத்திலுந். ஆறு மடங்கு எட்டு மடங்கு தண்ணீர் கலந்த புருஷசீது³ நல்ல குளிர்ச்சியான லோஷ⁴னாகும். இது காய்ச்சல் தாபிதம் முதலிய நோய்களுக்கு அதிகமாய் இடப்படும். புருஷசீது தனியே உள் மருந்தாகக் கொடுக்கப்படுவதில்லை.

அகனீதம்⁵, ஆணிகம்⁶, இங்கு, பெஞ்சோயின்⁷, கஞ்சா, மிளகாய், கஸ்தூரி⁸, வால்மிளகு, அயப்பிரகுலோறிர்⁹, அயவசிதக¹⁰, இயோதம்¹¹, கீனு¹², லவந்தர், சசம், காஞ்சிரம், அவின்மோனம்¹³, பைரீதிரம்¹⁴, தொலு¹⁵, பச்சைக்கடுரோணி, சுக்கு இவற்றினிரஞ்சம் மாத்திரம் திட்டசீதற் செய்யப்படும். இவற்றைத் தவிர்ந்த மற்றும் வாகட ரஞ்சங்கனெல்லாம் புருஷசீதற் செய்யப்படும். திட்டசீதம் புருஷசீதம் மற்றுஞ் சிகிச்சை முகாந்தரங்களுக்கும் வழங்கப்படும்.

[திட்டசீதுக்குரிய 0.838 என்ற விசேஷகிருவிதமுடைய சீதம், புருஷசீதுக்குரிய 0.920 என்ற விசேஷகிருவிதமுடைய சீதம் இந்தவிலே பனங்கள்த் தென்னங்கள்களிலிருந்து வடிபடும் அரக்கு என்ற சீதிவிருந்தும் சீனர் நெல்மணியிலிருந்து வடிக்கும் சங்கு¹⁶ என்ற சீதிவிருந்தும் செய்யப்படக்கூடியது. காட்டிலுப்பைப்பூவினின்று திஸ்திலித்தெடுக்கப்படும் சீது மணத்தினிமித்தம் உதவாததாம்.]

ஈதர். ETHER.

இது அலக்காலிலிருந்து செய்யப்பட்டு 100 க்கு 92 பங்கு குறையாத வீதமாய்ச் சுத்த ஈதரை அடக்கியிருக்கிற அத்திர¹⁷ நீர். சுத்த ஈதரின் கெமிஸ்தசின்னம் கா⁴ ஐ¹⁰ அ. லட்சணங்கள். இது நிறமற்றதும் சுறுக்குக் குடி போகக்கூடியதும் லேசில் நெருப்புப் பற்றிச் சுவாவிக்கக்கூடியதுமான நீர். தனக்குரிய வீரான மணத்தை வீசும். 105 பாகைக்குக் குறைந்த குட்டிற் கொதிக்கும். சோதனைகள். விசேஷகிருவிதம் 0.735. ஐம்பது பங்கு ஈதரைச் சமபங்கு தண்ணீரோடு கலக்கினால் அத் தண்ணீர் 100 க்கு 10 பங்கு வீதமாய் ஈதரை உறிஞ்சுவதால் அது 45 பங்காகும். சேஷமின்றி ஆவியாய்ப்போகும்.

தன்மை. இது வீரான செறியுமிஸ்திமுல¹⁸மும் அந்திஸ்பசி¹⁹யுமாகும். இதின் ஆவியை உறிஞ்ச அறிவு மயங்கும். இதை மேனியில் அணைத்துப் பறவாமல் அடைக்கத் தோல் சிவக்கும். தண்ணீர் கலந்தனைக்க அது ஆவியாகி குளிர்ச்சியான லோஷனாகும்.

உபயோகம். ஈனைக்கும், குடலின் ஸ்பசனோய்களுக்கும், வாயுப் பொருமல் வலிக்கும், வாந்திபேதியின் தியக்கத்துக்கும், காய்ச்சல்களின் பிற்கால்களுக்கும், பெரும்பாலும் சீவதத்துவக் குறைவுகளுக்கும் இது உபயோகமானது. மயக்கு மருந்தாக இதின் பிரயோகம் குலோறுவா²¹மைப் போலவே. உளுக்கு இதை ஈதர்ச் சீதாகக் கொடுப்பதே உத்தமம்.

1 Specific Gravity. 2 Rectified spirit. 3 Proof spirit. 4 Lotion. 5 Aconite.

6 Arnica. 7 Benzoin. 8 Castor. 9 Perchloride of Iron. 10 Acetate of Iron.

11 Iodum. 12 Kino. 13 Ammoniated opium. 14 Pyrrhira. 15 Tolu,

16 Shumshoo, 17 Volatile. 18 Diffusible Stimulant. 19 Antispasmodic.

20 Spasmodic. 21 Chloroform.

தேயம். இருபது மினிம் முதல் அறுபது மினிம் வரைக்கு அதிகமான தண்ணீரோடு கலந்து கொடுக்கவும்.

கலோடியம்¹, சவட்² கலோடியம், கொப்புளநீர்³, ஈதர்ச் சீது என்ற மருந்துகளைச் செய்வதற்கு ஈதர் வழங்கப்படும்.

ரசீதம். ஈதர்ச் சீது. Spirit of Ether. கொள். ஈதர் பத்து அன்சு; திட்டசீது⁴ அரைநாழி. கல. இதின் விசேஷகிரூவிதம்⁵ 0.809.

தன்மை உபயோகங்கள். ஈதரைப் போலவே, ஆயினுஞ் செயலிற் குறைந்தது.

தேயம். முப்பது மினிம்⁶ முதல் ஒன்றரைத் திரும் வரைக்குக் கொடுக்கவும். தேவை கண்டு அடிக்கடியுங் கொடுக்கலாம்.

லொபீலியீதரிரஞ்சு⁷த்தில் இது ஓர் கூறுகச் சேருகின்றது.

[சுத்த ஈதர் அதாவது அலக்கால்⁸ தண்ணீர் கலவாததும் கா⁴ ஐ¹ அ என்ற சின்னத்தையுடையதும் 0.720 க்கு மேற்படாத விசேஷகிரூவித முள்ளதுமான ஈதர் பிறித்தனி வாமகுபீயு⁹த்தில் வாகடத்துக்குரியதாகின்றது. சில சிசிச்சை முகாந்தரங்களில் மாத்திரம் அது வழங்கப்படும்.]

நீதுரோசீதர்ச் சீது. SPIRIT OF NITROUS ETHER.

இது நீதுரோசீதரின் அலக்காற் கலவை. இதைக் குறிக்குஞ் சின்னம் கா² ஐ³ ரீ⁴ அ⁵. லட்சணங்கள். தெளிவானது, ஏறக்குறைய நிறமற்றது; சொற்ப மஞ்சள்நிறம் தாவியது; சுவாலித்தெரியக்கூடியது. ஓர்வகையானசுகந்தமும், இனிமையான குளிர்ந்த காரச்சுவையுமுடையது. சோதனைகள். விசேஷகிரூவிதம் 0.845. சோடதுவிகாபன¹⁰செற் சொற்பத்தோடு கலக்க நுரையாது; அல்லது சொற்பமாய் நுரைக்கும். அயசல்வசு¹¹நீரும், சல்வுரிக்கமில¹²த்திற் சில தளியுஞ் சேர்த்துக் குலுக்கினால் அது கருஞ் சிவப்பு அல்லது கறுப்பாகும். இதைக் கல்சிகுலோறிர¹³பூர்த்த விலயன¹⁴த்தில் இருமடங்கோடு அடைத்தவோர் குழுவில் விட்டுக் குலுக்கினால் 100 ல் இரண்டு பங்கும் நீதுரோசீதரென்ற வாயுவாகப் பிரிந்து, கலவையின்மேல் நிற்கும்.

தன்மை. இது ஸ்திமுலம், சுவேதனி, அமுரிதி, அந்திஸ்பசி.

உபயோகம். சொற்பமான காய்ச்சல் கோய்கள், கதார்¹⁵நோய்கள், சல நோஷம், இன்வுலென்சி¹⁶களுக்கும், திகுறி¹⁷க்கும், அற்பமான நீர்க்கோவைகளுக்கும், இது உவந்தது. இது பெரும்பாலும் மற்றும் தகுந்த மருந்துகளோடு கலந்து கொடுக்கப்படும். உவட்டிப்பு, வாயுப்பொருமல்களை இது மாற்றக்கூடியது.

தேயம். முப்பது மினிம் முதல் இரண்டு திரும் வரைக்கு.

குலோறுவாம். CHLOROFORM.

இது வாமைல்திரிகுலோறிரம்¹⁸. இதின் சின்னம் கா ஐ கு³. லட்சணங்கள். இது நிறமற்ற தெளிந்த நீர். ஈதர் போன்ற நல்ல மணமும் இனிய சுவையுமுடையது. அலக்கால் ஈதர்களில் எப்பிரமாணத்திலுங் கரையும்; தண்ணீரிற் சொற்பமாய்க் கரைந்து அதை இனிப்பாக்கும். பச்சையான

1 Collodion. 2 Flexible. 3 Blistering liquid. 4 Rectified spirit. 5 Specific Gravity.

6 Minim. 7 Etherial Tincture of Lobelia. 8 Alcohol. 9 British pharmacopoeia.

10 Bicarbonate of Soda. 11 Sulphate of Iron. 12 Sulphuric acid, 13 Chloride of Calcium, 14 Saturated solution, 15 Catarrh. 16 Influenza, 17 Dysuria.

18 Ter-chloride of Formyle.

புகைச் சுவாலையெகொண்டு தாமதமாய் விரியும். சோதனைகள். விசேஷகிருவிதம் 1.49. சல்புரிக் கமில¹த்தோடு கலக்குவதால் நிறவாது; ஆவியாய்ப் போனபின் சேஷமாவது நூற்றமாவது இராது.

தன்மை. இதை ஆவியாக உறிஞ்சினால் அறிவை மயக்கும். குடித்தால் நாகதிகம்², செரதீவம்³, அந்திஸ்பசி⁴யுமாகும். தண்ணீர் கலவாமல் மேனித்தோலில் அணைத்தால் ருபிவாஷ்⁵னும் எதிரழற்சி⁶யுமாகும். தண்ணீர் கலந்து அணைத்தால் தோலை அழற்றாமல் வருத்தத்தைத் தணிக்கும்.

உபயோகம். மயக்கு மருந்தாக இதின் பிரயோகம் அனேகமும் முக்கியமுமாம். விசேஷமாய்ச் சத்திரப்பிரயோகங்களில் வருத்தம் தெரியாமற்பண்ணவும் பிரசவ வருத்தத்தைத் தணிக்கவும் விலகின் பொருத்தை வேசிற் சரிப்படுத்தவும் முறிந்த எலும்பை இசைக்கவும் இறுகினவளியை உள்ளே தள்ளிவிடவும் சலபாதை வலித்துச் சுருங்கியிருக்கையில் சலக் கம்பியைச் செலுத்தவும் தக்கதாய்ப் பேசிகளைச் சோரப்பண்ணுவதற்கு இது பிரயோகிக்கப்படும். மற்ற நோய்களுள், பிரசவ வலிகள், எபிலெப்சி⁷ வலிகள், கொரியம்⁸, ஏர்ப்பு⁹, ஸ்பசுவீனை¹⁰, கூவுஞ்சுவாசம்¹¹, இலீயசு¹², மற்றும் ஸ்பச நோய்களிலும், பிருக்கக் கற்கள்¹³, பித்தக் கற்கள் இறங்கும்போதும் குலோறுவாம் ஆவியால் அறிவை மயக்குதல் உபயோகமாய்க் காணப்பட்டது. மேலும் ஏற்ற கருவி வழியாய்க் குலோறுவாம் ஆவியைத் தானிகமாயிடல், கருப்பை¹⁴, கடைக்குடல்களிலுண்டாகுங் கன்சர்¹⁵ முதலிய வருத்தமான நோய்களின் உபாதியைத் தணிப்பதற்கு மெத்த உபயோகமாய்க் காணப்பட்டது. உவட்டிப்பு, குக்கியழற்சி, வாந்திபேதி, வங்கவலி¹⁶, இருமல்களுக்கும் கசத்திலுண்டாகும் முட்டுத்தொய்வுக்கும் இதை உள்ளே கொடுப்பது நயம். மேலும் பலவகையான வாத நோய்கள், துறல்சி¹⁷ நோய்களுக்கும், சுருக்குகள், நசிவுகளுக்கும், இதை லினிமெ¹⁸னாக இடல் நயமாகும்.

தேயம். உள்ளுக்கு மூன்று மினிம் முதற் பத்து மினிம் வரைக்கு, முசிலாகு¹⁹, சிறுபம்²⁰, முட்டையின் மஞ்சட்கரு ஏதுமொன்றுடன் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம். ஆளை மயக்குவதற்குச் சிறு தேயத்திற்கொடங்கிப் பரமானுவோடு தாராளமாய்க் கலந்து கொடுக்கவும். மயக்க வேண்டிய அளவுக்குத் தக்கதாய்க் கூட்டியும் நெருக்கியுங் கொடுப்பதே முறை. தொடக்கத்திற் கொடுப்பதற்கு ஒரு திருமே ஏகசகடான தேயமாகும். மயக்கக் கொடுப்பதில் மெத்தக் கவனமாயும் விழிப்பாயும் இருக்கவேண்டும். மயக்கத் தேறுவதற்கு ஆளை நிலத்தில் வளர்த்தித் தலையைத் தூங்கவிடவேண்டும்.

ரூபம். குலோறுவாம் சீது. Spirit of Chloroform. கொள். குலோறுவாம், ஒருஅன்சு; திட்டசீது²¹, பத்தொன்பது அன்சு. கரைக்கவும். சோதனை. விசேஷகிருவிதம்²² 0.871.

தேயம். இருபது மினிம் முதல் அறுபது மினிம் வரைக்குத் தேவைகண்டால் நெருக்கமாயுங் கொடுக்கலாம். குலோறிக் கீதர்²³ என்று தவறாய்ச் சொல்லப்பட்ட இம்மருந்து உள்ளபடி கீர்த்திபெற்றிருக்கிறது. இது ஸ்திமுலம்²⁴, அனுடைன்²⁵, அந்திஸ்பசியாக மெத்த வழங்கப்படுகின்றது.

1 Sulphuric acid. 2 Narcotic. 3 Sedative. 4 Antispasmodic. 5 Rubefacient 6 Counter-irritant. 7 Epilepsy. 8 Chorea. 9 Tetanus. 10 Spasmodic Asthma. 11 Laryngismus stridulus. 12 Ileus அடைப்புமல. 13 Renal calculus. 14 Womb.

15 Cancer. 16 Lead colic. 17 Neuralgia. 18 Liniment. 19 Mucilage.

20 Syrup பண்ணி. 21 Rectified spirit. 22 Specific Gravity. 23 Chloric Ether. 24 Stimulant. 25 Anodyne.

குலோறுவாம் கூட்டிரஞ்சம். Compound Tincture of Chloroform. கொள். குலோறுவாம், இரண்டு அன்சு; திட்டசீது, எட்டு அன்சு; ஏலக்1 கூட்டிரஞ்சம், பத்து அன்சு. கல.

தேயம். இருபது முதல் அறுபது மினிம் கரைக்கு.

குலோறுவாம் லின்மென். Liniment of Chloroform. கொள். குலோறுவாமும் பூரலினிமெ²னும் வகைக்கு இரண்டு அன்சு. கல.

இது துறல்சீ3நோ, வாத நோக்களுக்கும் கழலைகள் மற்றும் தானிக நோக்களுக்கும் நல்ல பூச்சு.

குலோறல். CHLORAL.

இது சுத்தமான அநீர அலக்காலோடு குலோறவாயு கூடி நெடுநேரஞ் சேஷடிப்பதாலுண்டாகும் பதார்த்தம். குலோறமும் அலக்காலுங் கூடி யுண்டாவதால் இசற்குக் குலோறல் என்ற பெயர் வந்தது. இப்படி உண்டாகும் அசுத்தமான, எண்ணெய் போன்ற நீரை முதல் சல்வுரிக்கமிலமும் பிற்பாடு சொற்ப சுண்ணாம்புஞ் சேர்த்துத் திஸ்திலித்துச் சுத்தமாக்கும்போது, எண்ணெய் போன்றதும், நிறமற்றதுமானவோர் நீர் பிறக்கும். இது அநீர குலோறல் எனப்படும். இது தண்ணீரோடு சேர்ந்து ஊசிபோன்ற கிரிஸ்தல்களாகிய கட்டிப் பதார்த்தமாகும். இது குலோறலை⁴ எனப்படும். இதற்குச் சின்னம் கா² ஐரு³ அ.ஐ² அ = 165.5. இது தன்னிலும் குறைந்த நிறையுள்ள திஸ்திலித்த தண்ணீர், திட்டசீது அல்லது ஈதரிலும் தன்னிலும் நாலு மடங்கு நிறையுள்ள குலோறவாயிலுங் கரையக்கூடும். அலக்கலைகளாற் கூறுகளாகப் பிரிய, அதிலிருந்து சுத்தமான குலோறுவாம் பிறக்கும். உடம்பிலே இரத்தோட்டத்தில் இது செல்லும்போது இப்படிச் கூறுபட்டுக் குலோறுவாம் பிறப்பதைப்பற்றியே இதின் சில செயல்கள் உண்டாகிறது.

இலட்சணங்கள், சோதனைகள். இது நிறமற்ற கிரிஸ்தல்களாக இருக்கும். நிறந்தபடி பரமானுவில் வைத்தாற் கரையாது. உறைத்த மணமும் உறைத்த கைச்சற் சுவையும் உள்ளது. சொற்ப குடு காட்டினால் உருகி நிறமற்ற உருவொளியான நீராகும். இந்த நீர் குளிரும்போது மறுபடி 120 பாகை காங்கையளவில் உரமாகும். இதைக் கண்ணாடித் துண்டுகளோடு சோதனைக் குழுவில் இட்டுக் காய்ச்சினால், 205 பாகை காங்கையளவிற்கு கொதிக்கும். பிலாடினத்தகட்டில்⁶ இட்டு இன்னுஞ் சொற்பமாய்க் கதித்த குடு காட்டினால் சேஷமின்றி ஆவியாகும். இதின் தண்ணீர்க் கரைவு சோதனைத்தாளுக்கத் தடஸ்தமாய்⁷ அல்லது சொற்ப அமிலமாய்த் தோன்றும். குலோறலை⁴சைக் குலோறவாயிற் கரைத்துச் சல்வுரிக்கமிலத்தோடு குலுக்கினால் அது அந்த அமிலத்தை நிறப்பிக்கமாட்டாது. 100 கிரேன் குலோறலை⁴சை ஒரு அன்சு திஸ்திலித்த தண்ணீரிற் கரைத்து, அதோடு நீற்றின சுண்ணாம்பிலே 30 கிரேன் கலந்து, தருந்த அணியத்திலிட்டுக் கவனமாய்த் திஸ்திலித்தால் 70 கிரேனுக்குக் குறையாமற் குலோறுவாம் பிறக்கும்.

தன்மை, உபயோகம். இது அயர்ந்த நித்திரையை வருவிக்கும். பைத்தியம், கொரியம்⁹, நித்திரையின்மை முதலிய சீரில், அவின் கஞ்சா இணங்

1 Cardamom. 2 Liniment of camphor. 3 Neuralgia. 4 Anhydrous Chloral, 5 Chloral Hydrate. 6 Platinum foil 7 Neutral 8 Sulphuric acid. 9 Chorea.

காதிருக்குப்போது இது உவந்தது. பெலவீனம், மலவரட்சி, உவட்டிப்பு முதலிய குணக் கேடுகளைத் தோற்றுவித்தது. இதின் செயல் மற்றும் இதின் வருப்பைச் சேர்ந்த மருந்துகளைப்பார்க்க நெடுக நிற்கும். மேலும் நனை, குக்கல், வெறிப் பைத்தியம், துறல்சி முதலிய நோய்களுக்கு நல்லது. உடம்பின் சூட்டைக் குறைக்கும். சுய ஈர்ப்பில் முப்பது முதல் அறுபது கிரேன் தேயமாகக் கொடுத்து நயங்கண்டது. கன்சர் நோயில் இருபது முப்பது கிரேன் கொடுப்பது நல்லது.

தேயம். ஐந்து முதல் பத்துக் கிரேன்.

மிஞ்சிய தேயமாயாவது, நெருக்கமாயாவது கொடுத்தால், கெண்டையேறல், தலைக்கிறுதி, முகச்சினப்பு, கண்சிவப்பு, கண் மூடுதல், முதலிய அவக்குணங்கள் உண்டாகும். சிலவேளை மரணமும் நேரிடும். பிருக்கரோகத்தில் இதைக் கொடுக்கப்படாது.

மாற்று. முப்பது கிரேன் குலோறலுக்கு இருபதிலொருபங்கு கிரேன் பிக்குருதாக்கின்¹ போதிய மாற்றாகும்.

ரசிதம். குலோறற்சிறுபம். Syrup of Chloral. குலோறலைரசு என்பது கிரேன்; தண்ணீர் அரை அன்சு; சிறுபம் அரை அன்சு. கல.

தேயம். அரைத்திரும் முதல் இரண்டு திரும்.

காடி. VINEGAR. ACETUM.

இது நனைத்து முளைகட்டினதும் கட்டாததுமான வாற்கோதுமையிலிருந்து அசித நொதிப்பாற்² செய்யப்படும் புளிப்பான நீர். லட்சணங்கள். கபிலநிறமுந் தனக்கேயுரிய ஓர்வகை மணமுமுள்ளது. சோதனை. விசேஷகிருவதம்³ 1.017 முதல் 1.019 வரைக்கிருக்கும். இதில் நிறைப்படி 445.4 கிரேனை அதாவது ஒரு அன்சைத் தடஸ்திப்ப⁴தற்குச் சோடபரும விலயனத்தில் 402 கிரேன் அளவாகுதல் வேண்டும். அதாவது இதில் தூறு பங்கில் 4.6 பங்கு அநீர்வசிதிக்கமில⁷மிருக்கும். பாரிதகுலோறிரீ⁸நிற் பத்துமினிமை ஒரு அன்சு காடியில் விட்டு ஏதும் அடையல்காணுமாகில் அதை உடித்து வேறுக்கினால் மறுபடியும் பாரித குலோறிரீ⁸நில் கொஞ்சம் விட அடையல்காணாது. ஐருசல்வுரிக்கமிலம்⁹இதின் நிறத்தை மாற்றாது.

நன்மை. இது குளிர்ச்சியானது, செரதீவம்¹⁰, அந்திசெப்தி¹¹.

உபயோகம். காய்ச்சல்கள், தாபித நோய்களுக்குத் தண்ணீர் கலந்த காடி நல்ல குளிர் உணவாகும். மேலும் விசிககோதம்¹² முதலிய அழுகல் கள், ஆரம்ப ஸ்தனவிப்புருதி, நசிவுகள், சுளுக்குகள் மற்றுந் தானிக ரோகங்களுக்கும் இது இடபபடும். அல்கலை நஞ்சுகளுக்கு இது நல்ல மாற்று. மயக்கு நஞ்சுகளைத் தின்றவர்களுக்கு வமனி மருந்து கொடுத்தாவது குக்கிரேசகி¹³ வழியாயாவது இரைப்பையை வெறுமையாக்கினபின் காடியைக் கொடுக்கலாமாம். ஆயினும் காடி மாவியத்தோடு கூடி மாவியவசிதசு என்ற கரைவுப்பு உண்டாகுமாதலால் அவின் நஞ்சு தின்றவர்களுக்கு இதைக் கொடுப்பது உதவாது. காடியையுந் தண்ணீரையுந் கலந்து கொதிப்பித்து அவற்றின் ஆவியைஉறிஞ்சுதல் குவின்சி¹⁴யிலும் மற்றும் வகையான தோண்டைநோக்களிலும் மெத்த ஆற்றியாகும்.

1 Picrotoxicine. 2 Acetous fermentation. 3 Specific Gravity. 4 Neutralize, 5 Volumetric solution of Soda. 6 Anhydrous 7 Acetic acid. 8 Chloride of Barium. 9 Hydro sulphuric acid. 10 Sedative. 11 Antiseptic. 12 Hospital Gangrene. 13 Stomach Pump. 14 Quinsy.

தேயம். ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திரும்வரைக்கு. ஏதும் மென்ஸீரில் வீட்டுக் கொடுக்கலாம். ஒருநாழி தண்ணீருக்கு இரண்டொரு அன்சு வீதமாய்ச் காடி கலந்து அதைச் சுவைக்குத் தத்தைய இனிப்பாக்கிக் காய்ச்சல்களிற் கொடுக்க நல்ல குளிர்மையான பானமாகும். காடியை இரு மடங்கு தண்ணீர் கலத்தால் லோஷி¹னாக இடலாம்.

[இந்துவிலே பனங்கன்றத் தென்னங்களிலும் கருப்பஞ்சாற்றிலுமிருந்து காடி அதிகமாய்ச் செய்யப்படும். அமரிகத்தல் அப்பில்² பழச்சாற்றில் ஏராளமாய்ச் செய்யப்படும்.]

அசிதிக்கமில்லம், ACETIC ACID.

இது வீறகிலிருந்து நாசதிஸ்திலிப்பால் செய்து சுத்தமாக்கப்பட்ட புளிப்பான நீர். இதில் நிறைப்படி 100 பங்கிலே ஐகா³ ஐ³ அ³ என்ற சின்னத்தையுடைய அசிதிக்கமில்லம் முப்பத்துமூன்று பங்கு அடங்கியிருக்கும். அது கா⁴ ஐ⁶ அ³ என்ற சின்னத்தையுடைய அரீ⁴ அசிதிக்கமில்லத்திலே 28 பங்குக்குச் சரியானது. லட்சணங்கள். வீறான அமிலத்தன்மையும் காரமான மணமுமுள்ள நிறமற்றநீர். சோதனைகள். விசேஷகிருவீதம்⁵ 1.044. இதில்நிறைப்படி 182 கிரேனைத்தடஸ்தி⁶ப்பதற்குச் சோடபருமவிலயன⁷த்தில் 1000 கிரேன் அளவு வேண்டும். இதை ஆவியாக்கினுற் சேடமிராது. இதற்கு ஐருசல்வரிக்கமில்ல⁸மாவது, பாரிதகுலோறி⁹மாவது, வெள்ளிநீது¹⁰சாவது கூட்ட அடையல்விழாது. இதில் ஒரு திரும்மோடு திஸ்திலித்த நீரில் அரைஅன்சும் சுத்த ஐருகுலோறிக்கமில்ல¹¹த்தில் அரைத்திரும்மும் சேர்த்து ஓர் சிறுக் கண்ணாடிக் குடுக்கையிலிட்டு அத்தோடு பொடித் துத்தத்திற் சில துண்டுகளும் போட்டு நுரைக்கவிட்டு சுவறக்கூடிய கடுதாசியில் ஒரு துண்டை ஈயவதவசிக¹² நீரிற் றேய்த்து குடுக்கையின் மேற்பகுதியில் நீருக்கு மேலே ஐந்து மினி வரைக்குப் பிடிக்க அக்கடுதாசி நிறக்காது.

தன்மை உபயோகம். காடியைப் போலவே.

தேயம். ஐந்து துளி முதற் பதினைந்து துளி வரைக்குத் தண்ணீர் கலந்து கொடுக்கவும்.

ரீதிங்கள். கிருசவசிதிக்கமில்லம். Dilute Acetic acid. கொள். அசிதிக்கமில்லம், அநரநாழி; சுத்த தண்ணீர் மூன்றரை நாழி. கல. சோதனைகள். விசேஷகிருவீதம் 1.006. இதில் ஒரு அன்சைத் தடஸ்திப்பதற்குச் சோடபருமவிலயனத்தில் 313 கிரேன் அளவு வேண்டும்.

தேயம். ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திரும் வரைக்குக் கொடுக்கலாம்.

அக்சிமெல். Oxymel. கொள். சுத்த தேன், நாற்பது அன்சு; அசிதிக்கமில்லம், ஐந்து அன்சு; தண்ணீர், ஐந்து அன்சு. தேனை உருக்கி அத்தோடு தண்ணீரையும் அசிதிக்கமில்லத்தையுங் கலக்கவும்.

தேயம். ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திரும் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். சொற்ப கதார்¹³நோய்களுக்கு நல்ல கபமக்கி. காய்ச்சல்நோய்கள் தாபித¹⁴நோய்களில் வாற்கோதுமைக் கஞ்சியோடு கலந்து குடிக்க நல்ல குளிர்ச்சி

1 Lotion. 2 Apple. 3 Destructive distillation. 4 Anhydrous. 5 Specific gravity.

6 Neutralize. 7 Volumetric solution of soda. 8 Hydro sulphuric acid.

9 Chloride of Barium. 10 Nitrate silver. 11 Hydrochloric acid.

12 Solution of Subacetate of lead. 13 Catarrh 14 Inflammation.

யான பாணமாகும். மேலும் கார்ப்கில்கன்¹ இரும்பு கலவைகளுக்கு இது சிலவேளை ஓர் கூட்டாகின்றது.

கந்தாரிசுக் காடி², கொல்சிகவசிடசெசிரூத்து³, தர்ப்பந்தீனசிடிக்மில்லினிமென்⁴, கொப்புளநீர்⁵, அக்சிமெல்⁶ இவைகளில் அசிடிக்மில்லம் ஓர்கூறுகச் சேருகின்றது. மேலும் வாகடத்துக்குரிய அசிடிக்⁷ என்ற உப்புகளிலும் அவைகளின் விலயனங்ககளிலும் உள்ள அமிலக் கூறும் இதுவே. ஸ்குவிற் காடி⁹செய்வதில் வழங்கப்படுகிற, கிருசவசிடிக்மில்லமே.

கிலாசியலசிடிக்மில்லம். GLACIAL ACETIC ACID.

இது சாரதித்த அசிடிக்மில்லம். கா⁴ ஐ⁶ அ³ என்ற சின்னத்தையுடைய அநீர்¹⁰ அசிடிக்மில்லத்தில் தூற்றுக்கு 34 பங்குக்குச் சரியானது. லட்சணங்கள், சோதனைகள். 34 பாகை வரைக்குக் குளிர இது கிரிஸ்தலித்து¹¹, மறுபடி சூடு 43 பாகை வரைக்கு ஏறுந்தனையும் கிரிஸ்தலாகவே இருக்கும். விசேஷகிருவிதம், 1.065 முதல் 1.066 வரைக்கிருக்கும். தூற்றுக்குப் பத்து வீதமாய்த் தண்ணீர் கூட்ட, கிருவிதம் அதிகப்படும். பரமானுவின் சராசரி காங்கையில், இது காரமான புளிப்பு மணமுடைய நிறமற்ற நீராக விருக்கும். இதிலே கிடைப்படி 60 கிரேனை ஒரு அன்சு சுத்த தண்ணீர் ரோடு கலந்தால் அதைத் தடஸ்திப்பதற்குச் சோடபருமவிலயனத்தில் 990 கிரேனைவாகுதல் வேண்டும். இதில் ஒரு திராமோடு அரைஅன்சு திஸ்திலித்ததண்ணீரும் அரைத்திராஞ் சுத்த ஐருகுலோறிக்கமில்லமுங் கலந்து ஓர் சிறுக் கண்ணாடிக் குடுக்கையில் விட்டு அவற்றோடு பொடித்துத்தத்திற் சில துண்டுகளும் போட்டு நுரைத்துக்கொண்டிருக்கும்போது, சுவறத்தக்க கடுதாசியில் ஒருதுண்டை ஈயவதவசிடசு¹²நீற்றோய்த்துக் குடுக்கையின் மேற்பகுதியில் நீருக்கு மேலே ஐந்து மினி வரைக்குப் பிடித்தால் அக் கடுதாசித் துண்டின் நிறம் மாறாது.

இது மெத்தக் காரமானது; கொப்பளிக்கும்; வெளிமருந்தாக மாத்திரம் வழங்கப்படும். இது காய், சிவ்லிசு¹³முளை, நீவசு¹⁴ என்ற பொட்டு என்பவைகளை அரித்து நீக்குவதற்கும் இலகுவிற் கேளாத தோல்வியாதி சிலவற்றை மாற்றுவதற்கும் தானிகமாய் வழங்கப்பட்டதுண்டு. இதைத் தோலில் இட்டால் சீக்கிரத்திற் கொப்புளங்கொள்ளும். ஆகையாற் கந்தாரிசின்¹⁵செதங்கள் கிடையாத தறுவாயிலும் பிருக்க¹⁶நோய்கள் சிலவற்றிற் சம்பவிக்கக் கூடியது போலக் கந்தாரிசு சோஷிக்கப்பட்டு மோசமாய் முடியக்கூடுமென்ற நோய்களிலும் இடையிடலாம்.

கந்தாரிசுக்காடி¹⁷யிலும், கிறீயசற்றுக்கலவை¹⁸யிலும் இது ஓர்கூறுகச் சேருகின்றது.

காபலிக்கமில்ம். CARBOLIC ACID.

இது மரத்தாரெண்ணெய்¹⁹யிலிருந்து அமிச²⁰ திஸ்திலிப்²¹பால் எடுத்துப் பின்பு சுத்தமாக்கப்படுகிற ஓர் அமிலம். இதற்குக் கெமிஸ்த சின்னம்

1 Gargle. 2 Acetum cantharides. 3 Acetic extract of Colchicum, 4 Liniment of Turpentine and Acetic acid. 5 Blistering liquid. 6 Oxymel. 7 Acetate.

8 Solution. 9 Vinegar of squill. 10 Anhydrous. 11 Crystallize. 12 Lead subacetate. 13 Syphilis. 14 Naevus. 15 Cantharides. 16 Kidney.

17 Vinegar of Cantharides. 18 Creasote Mixture, 19 Coal tar.

20 Fractional. 21 Distillation.

ஐதா, ஐ. அ. லட்சணங்கள், சோதனைகள். நிறமற்ற ஊசிபோன்ற கிரிஸ்தல்¹களாக இருக்கும். 95 பாகை சூட்டில் உருகித் தடித்த நீராகும். கிறீயசு² ஹைப் போல வீரூன மணம் சுவை உடையது. லட்சணங்கள் தன்மைகள் பலவற்றில் அடையொத்தது. இதின் விசேஷகிராவிதம்³ 1.065. கொதிநிலை 370 பாகை சூடு. கிரிஸ்தல்களில் காற்று நெடுகப் பட்டால் அவை சுறுக்கில் ஈரிப்பை உறிஞ்சி நீராகும். ஆயினும் இந்த அமிலம் தண்ணீரில் சொற்பமாய் மாத்திரங் கரையக்கூடியது. அலக்கால்⁴ ஈதர்⁵ கிலேசரின்⁶ என்பவற்றிலோ இது தாராளமாய்க் கரையும். நீல விற்பா⁷ தர்⁸ இது சிவப்பாக்கமாட்டாது. இதிறோய்த்த பைன்⁹ மரச்சிராய்த் துண்டொன்றை ஐருகுலோறிக்கமில்லத்திற் றோய்த்துக் காற்றில் உலரவிட்டால் அது பச்சை நீலநிறமடையும். இவ்வமிலம் அல்புமினை¹⁰ உறைவிக்கும். போலறி¹¹ சித்த வெளிச்ச கிரணம் இதற்குடே செல்வதால் அதின் போலறிசு நேர் மாறாது. தன்மை. இது எஸ்கரா¹², ஸ்திமுலம்¹³, ரூபிவாஷன்¹⁴. மேலும் வீரூன தியோடறிசரும்¹⁵ திசின்வெத்து¹⁶மாகும்.

உபயோகம். இரைப்பையழற்சியில் விசேஷமாய் அது மியாஸம்¹⁷ குவர்காயு¹⁸ என்ற நச்சுக்காற்றைச் சுவாசிப்பதாலுண்டானால் இது கிறீயசு¹⁹ ஹைப் போலச் சாந்திசெய்யும். தானிகமாய், அழுகுவிரணம், கன்சர்¹⁹ புண், சிவ்விசுப்²⁰ புண்கள் முதலிய மாறாப் புண்களுக்கும் நாட்பட்ட சருமனோய்களுக்கும் பீனசம் முதலிய நாற்றமான நீர்வடியுநோய்களுக்கும் இது உபயோகமானது. சிவ்நீர்²¹யில் இதைக் கிலேசரினிற் கரைத்து இடுவது நலம்.

தேயம். ஒரு கிறேன் முதல் மூன்று கிறேன் வரைக்கும் தண்ணீரில் அதிகமாய்க் கலந்து கொடுக்கவேண்டும்.

மீசம். காபலிக்கமில்லகிலேசரின். Glycerine of Carbolic acid. கொள். காபலிக்கமில்லம் ஒரு அன்சு; கிலேசரின் நாலு அன்சு. அமிலங் கரையுந்தனையுங் குழியம்மியில் ஒன்றுயரைக்கவும்.

இது வெளிப் பூச்சுக்கு நல்ல முறை. பிள்ளைகளுக்கும் மெல்லிய தோலுள்ளவர்களுக்கும் கிலேசரினின் வீதத்தைக் கூட்டவேண்டும்.

அவாகடச்சாக்கு. Non-Officinal.

பெற்றோலியம். Petroleum. இது மண்டைலம் எனப்படும். நிலத்திலிருந்து வலியப் பொசிகின்றது. கருப்பம் பாணி போன்ற நிறமுந் தடிப்பும் உள்ளது; புகைமணமுள்ளது. இது ரங்குனுக்குக் கிட்டவும் அரக்கன் கரையில் எரிமலைத் தீவுகளிலுமுள்ள சில வாவிக்களில் மிதக்கும். கிரிஸ்தின், கிரேக்குரி என்பவர்களுடைய ஆராய்வுகளின்படி இந்திர பதார்த்தங்களிலிருந்து அதி சூட்டால் எடுபடும். பரவின்²², யூபியன்²³, என்ற பதார்த்தங்கள் இதில் அடங்கியிருப்பதால் இது நாச திஸ்திலிப்²⁴ பால் பிறந்த பொருளாயிருக்கவேண்டும். உடம்பில் இது காட்டுஞ் செயல் தெறிபிந்த²⁵ தைத் தப் போன்ற ஸ்திமுலத்தின் செயலே. அத்தன்மையில் ஏறக்குறைய அரைத்திராமை முசிலாகில்²⁶ விட்டு வாதம், கனுறிய²⁷ நோய்களுக்குக் கொடுப்பது.

1 Crystal. 2 Creasote. 3 Specific Gravity. 4 Alcohol. 5 Ether. 6 Glycerine.

7 Litmus paper. 8 Pine. 9 Hydrochloric acid. 10 Albumen, 11 Polarized.

12 Escharotic, தகை. 13 Stimulant. 14 Rubefacient. 15 Deodorizer,

சத்தகினி. 16 Disinfectant, அபசஞ்சரி. 17 Miasma, 18 Sewer. 19 Cancer.

20 Syphilis. 21 Diphtheria. 22 Paraffine, 23 Eupion. 24 Destructive

distillation. 25 Terebinthum. 26 Mucilage. 27 Gonorrhoea.

பார்கள். இது வீரூன அமுரிதி¹யுமாம். பெரிபெரி² என்ற சோர்வு நோயுண்டான ஒரு ஆளுக்கு இதை உள்ளுக்கும் வெளிக்கும் பிரயோகித்து மாற்றினதாக ஆரோக்கியம் என்பவர் எழுதியிருக்கிறார். ஆயினும் பெற்றோலியத்தால் அச் சுகமுண்டானதென்பது சந்தேகம். காலிக சருமரோகங்களுக்கு இது நல்ல பூச்சு மருந்து. ஒரு ஆளிலே பலவகையான உள் மருந்துகள் வெளிமருந்துகளுக்கெல்லாம் எடுபடாமலிருந்த காலிக எக்சீமம்³ இதால் மாறினதென்று முட்சு வைத்தியர் பிரசுரஞ் செய்திருக்கிறார். அவர் இதைச் சபு⁴வோடு ஒரு அன்சுக்கு ஒரு திரும் பிரமாணமாகக் கலந்து வழங்கினார். மேலும் காலிகவாதத்துக்குப் பூச இது நல்லதென்றுங் கண்டார்.

1 Diuretic, தியூர்சம், 2 Peri-beri. 3 Eczema. 4 Soap.

பிராணிய பதார் த்தசாரம்.

ANIMAL MATERIA MEDICA.

அனெலிடங்கள். Annelida.

அட்டை. LEECH.

வாசம். வாகடத்துக்குரிய இருவகை அட்டையாகிய பச்சை அட்டை புள்ளியட்டை யென்பவைகள் யுரோபத்திலும் வடக்காபிரிகத்தின் சில பகுதிகளிலுமுண்டு. பிரதானமாய் ஸ்பேன், பிரான்சு, இத்தலி, அங்கரி தேசங்களிலே பிடித்துப் பாவிக்கப்படும்.

வாகடவுரிமை. உயிரட்டை.. அதின் லட்சணங்களாவன: உடம்பு நெடுகி இரண்டு மூன்று இஞ்சு நீளமானது; இரண்டு தலைப்பிலும் ஒடுங்கியது; தட்டைக் குவிவானது; குறுக்குப்பாட்டுக்குச் சுருக்குகள் விழுந்தது; முதுகு செம்பச்சை நிறமாயும், மங்கற்சிவப்பான ஆறு நெடு வரிகளுள்ளதாயுமிருக்கும். மேற்சொல்லிய இரண்டு இனமான அட்டையில் ஒன்றுக்கு வயிற்றுப்பக்கம் பச்சை, புள்ளிஅற்றது; மற்றதுக்குப் பச்சை மஞ்சள், கரும்புள்ளி விழுந்தது.

தன்மை உபயோகங்கள். வெளித்தாபிதங்கள்¹, கஞ்செஸ்தங்களில்² ஫ோய்த்த இடத்தில் இரத்தம்வாங்குவதற்கே இவை வழங்கப்படும். மேலும் பிளூதீ³, பெரிதனீ⁴ முதலிய உட்தாபிதங்களில் தாபிதங்கொண்டபகுதிக்கும் தோலுக்கும் தந்துகி⁵த் தொடர்பிருக்குமிடத்து அட்டைவிடுவார்கள். மேலும் காளம் திறந்து இரத்தம்வாங்குதல் புத்தியல்லவென்று காண்கிற தாபிதங்களிலும் அட்டைவிடலாம். குழந்தைகள், சிறுவர்களுக்குண்டாகு⁶த் தாபித நோய்களில் சிலவேளை அட்டைவிடுவது விசேஷம்.

எத்தனை அட்டை விடவேண்டுமென்பதை அந்தந்தக் காரியத்துக்குத்தக் கதாய்த் தீர்மானிக்கவேண்டும். ஒரு அட்டை ஒன்றரைத்திரும் இரண்டு திரும் இரத்தம்வரைக்கு வாங்கும். அவ்வளவு இரத்தங் கடிவாயாலும்பா யும். இர்துவட்டை தன் நிறையிலும் நாலு ஐந்து மடங்கு இரத்தத்தைவாங்கும். (71) அட்டை கடித்த வாயினின்று இரத்தம் அதிகமாயல்லது நெடுகப் பெருகிக்கொண்டிருந்தால் அழுக்கமும் அத்துடன் மதிசு⁷, சீனக்காரம்⁸, காடிக்காரம்⁹ அல்லது வேறேதும் ஸ்திப்திசு மருந்தும் இடலாம்.

[அட்டை இர்துதேசத்தின் மிகுதியான பகுதிகளிலும் இலங்கையிலும் மாரிகாவத்திற் குளங்கள் வரிகளிற் பிடிக்கலாம். தெக்கணத்திலும் இர்துவின் மற்றும் பகுதிகளிலும் கொஞ்சத் தொகையாய் வளர்க்கவும்படுகின்றன. (72) இர்து அட்டை எந்த இனத்துக்குச் சேர்ந்ததென்று இன்னும்

1 Plano-convex. 2 Inflammation 3 Congestion. 4 Pleuritis. 5 Peritonitis. 6 Capillary. 7 Matico. 8 Alum, 9 Nitrate of Silver.

(71) (72) அனுபந்தம்பார்.

நிதானிக்கப்படவில்லை. சென்னையிலிருந்து டே வைத்தியரார் கொண்டு வரப்பட்டு இந்து தூதனசாலையில் வைக்கப்பட்ட பெரிதும் சிறிதுமான இரண்டு இனங்களும் இன்னும் சாத்திரத்திற் குறிக்கப்படவில்லை. அவற்றிற் பெரியது நீலாற்றுத் தேலம்¹ என்றதைப் போன்றது. வம்பாயில் வடிவந்தபவைகள் சொறியட்டைய² (73) ப் போன்றவைகள் என்று காட்டர் பண்டிதர் சொல்லுகிறார். இதுகாரியத்தைப்பற்றி இன்னும் ஆராய்வது நல்லது]

இஞ்செத் துகள். Insects.

கோலியப்திறங்கள். COLEOPTERA.

கந்தாரிசு. CANTHARIS.

வாசம். இவ் வண்டு யுரோபத்தின் பல பகுதிகளில் உள்ளது. காய்ந்த வண்டு, ருசியம், சிசிலி, அங்கரி என்ற தேசங்களிலிருந்து இங்கிலாந்துக்கு வரும்.

வாகடவுரிமை. காய்ந்த வண்டு. அதின் லட்சணங்கனாவன: எட்டுப் பத்து லீன் நீளமானது; சிறகுகளை மூடுகிற மினுக்கமான பச்சை நிறமுள்ள இரண்டு ஓடுகளையுடையது; ஓடுகளுக்குள்ளே உருவொளியுள்ள சவ்வான இரண்டு சிறகுகள் இருக்கும்; வீரான நாற்றங்கொண்டது; நரைக்கபிலநிறமான இதின் தூளுக்குள்ளே மினுக்கமான பச்சைத் துகள்கள் கிடக்கும். மீத்து³ என்ற கிருமிகளற்றது. இதின் சத்து கந்தாரிடின⁴ என்ற பகுதியில் அடங்கியிருக்கும்.

தன்மை. உள்ளே கொடுத்தால் இது கார்ப்பான ஸ்திமுல⁵ அமுரித்⁶யாகும். சன்னசல உறுப்புகளின் சளிச்சவ்விலேயே பிரதானமாய்ச் சேஷ்டிக்கும். அதிலும் விசேஷமாய்ச் சலப்பைக்கழுந்திற் சேஷ்டிக்கும். அதிதேயத்தில் நஞ்சாகும். வெளிமருந்தாக இட்டால் இது நல்ல எதிரழற்சியும் வெசிக⁷னுமாகும்.

உபயோகம். கந்தாரிசு உள்ளே கொடுக்கப்பட்டு நயப்பட்ட நோய்கள் சலப்பையசத்துவத்தைப்பற்றிய சலவொழுக்கு, லுகறீயம்⁸, அமெனூறீயம்⁹, அல்புமினூறி¹⁰, சிலவகையான சோர்வு, எபிலெப்சி¹¹, அனிமி¹²யைச்சார்த நீர்க்கோவை, குக்கலின் பிற்பாதமும், சிலவகையான சரும ரொகங்களுமே. அவற்றுள், குஷ்டம்¹³, சொறீயசி¹⁴ என்பவைகளே அதி விசேஷமானவைகள். வெளியிற் கொப்புளப்பற்றாக இதின் உபயோகம் அனேகமும் முக்கியமுமாகும். தீவிர¹⁵தாபிசத்தின்¹⁶ பிற்கால்கள் உட்கஞ்செஸ்தங்க¹⁷ளிலும் சோர்வு, எபிலெப்சி, கொரீயம்¹⁸ முதலிய சிராநோய்கள், கசேருநோய்களிலும். சியதிகம்¹⁹ முதலிய துறல்சி²⁰ நோய்களிலும் குவாதப்பற்றிய பொரு

1 Bdella Nelotica, 2 Hirudu Granulosa, 3 Mite, 4 Cantharidin, 5 Stimulant, 6 Diuretic, அமுரிதி. 7 Vesicant 8 Leucorrhoea. 9 Amenorrhoea. 10 Albuminuria. 11 Epilepsy. 12 Anaemia, 13 Lepa, 14 Psoriasis. 15 Acute, 16 Inflammation. 17 Congestion. 18 Chorea, 19 Sciatica, 20 Neuralgia,

(73) அனுபந்தம்பார்.

த்துவீக்கங்களிலும் ஐருகெவலம்¹, ஐருபெறுகடியம்², ஐருதோறகு³, ஐராதசு⁴, முதலிய நீர்க்கோவை நோய்களிலும், கண் காதுகளிலுண்டாகும் அனேக தீவிர காவிக நோய்களிலும் கொப்புளப்பற்று இடப்படும். இதைப் போடும் வகை அந்தந்த நோயின் சீர்நிருவாகங்களுக்குத் தக்கதாய் நிதானிக்கப்படவேண்டும்.

தேயம். கந்தாரிசை மெல்லிய மாவாக்கி, அதில் ஒரு கிறேன் முதல் இரண்டு கிறேன் வரைக்குக் குளிகையாக்கிக் கொடுக்கலாம். ஆயினும் ரஞ்சமாகக் கொடுப்பதே உத்தமம்.

ரசிதங்கள். கந்தாரிசிரஞ்சம். Tincture of Cantharides. கொள். கந்தாரிசு பருக்கன்பொடியாக கால் அன்சு; புருவுசீது⁵ அரைநாழி. அடைத்தபாத்திரத்தில் ஏழுநாளுறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கிச் சீலையில் வடித்துப் பிழிந்து திரும்பவும் கடுதாசி முதலியவற்றில் துட்பமாய் வடித்து அரைநாழி தேறப் போதிய புருவுசீதைக் கூட்டவும்.

தேயம். ஐந்து முதல் இருபது மினிம் வரைக்கு நான் இரண்டு மூன்று முறை கொடுக்கலாம்.

கந்தாரிசுக் காடி. Vinegar of Cantharides. கொள். கந்தாரிசு, பொடியாக இரண்டு அன்சு; கிலாசியல் அசிதிக்கமில்ம்⁶, இரண்டு அன்சு; அசிதிக்கமில்ம் பதினெட்டு அன்சு அல்லது போதியது. அசிதிக்கமில்த்திற்ப தின்மூன்று அன்சைக் கிலாசியலசிதிக்கமில்த்தோடு கலந்து, அக் கலவை நீரிலே கந்தாரிசுப் பொடியை இரண்டு மணி நேரம் வரைக்கு 240 பாகை குட்டில் ஊறப்போட்டு, அப்பால் ஆறினபின்பு முழுக் கலவையையும் சியந்தனி⁷யில் வார்த்து, நீர் ஒழுகவிட்டெடுத்தபின் அசிதிக்கமில்த்தில் இன்னும் ஐந்து அன்சைச் சியந்தனியிலுள்ள சேடத்தின்மேல் வார்க்கவும். நீர் வடிந்தபின் சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து, நீர்களைக் கலந்து, அரைநாழிக்குப் போதிய அசிதிக்கமில்ஞ்⁸ சேர்க்கவும்.

இது தோலிற் கொப்புளிக்கப்பண்ணுவதற்கு மாத்திரம் வழங்கப்படும்.

கொப்புள நீர். Blistering liquid. கொள். கந்தாரிசு, பொடியாக, எட்டு அன்சு; அசிதிக்கமில்ம் நாலு அன்சு; ஈதர்⁹, போதியது. கந்தாரிசையும் அசிதிக்கமில்த்தையுங் கலந்து சியந்தனியில் ஏற்றி அடைசி இரண்டு நாட் சென்றபின் சியந்தனிக்குள்ளே ஈதரை வார்த்து, இருபது அன்சு நீர் சேருந்தனையும் அதை மெல்ல மெல்ல வடிய விடவும். வடிந்தநீரை அடைத்த சீசாவிற் பேணவும்.

இது வீருண கொப்புளமருந்து. கந்தாரிசுக் காடியைப் பார்க்க இது சேயலிற் சீக்கரமானது.

கொப்புளத்தாள். Blistering Paper. கொள். வெண்மெழுகு, நாலு அன்சு; திமிர்மெய், ஒன்றரை அன்சு; ஒலீவுதேல், இரண்டு அன்சு; குங்குலியம் முக்கால் அன்சு; கனடபல்சம் கால் அன்சு; கந்தாரிசுத் தூள் ஒரு அன்சு; திஸ்திலித்ததண்ணீர் ஆறு அன்சு. கனடபல்சத்தைத்தவிர்ந்தமற் றெல்லாக் கூறுகளையும் நீர்மத்திக¹⁰த்தில் இரண்டுமணித்தியாலம் ஊறப்போட்டு ஓயாமற் கலக்கி அப்பாற் சீலையில் வடித்து நீரை விட்டுப் பற்றைப் பிரித்தெடுக்கவும். பற்றையுங் கனடபல்சத்தையும் தட்டையான வோர்பா

1 Hydrocephalus. 2 Hydropericardium. 3 Hydrothorax. 4 Hydrarthrus, உதச்சி.

5 Proof spirit, 6 Glacial Acetic acid, 7 Percolator. 8 Acetic acid. 9 Ether.

10 Water bath.

த்திரத்தில் உருக்கி, உருகிய நீர் சூடாயிருக்கையிற் கடுதாசிக் கீலங்களின் ஒருபக்கத்தில் மெல்லிய படலம் பிடிக்க அதிற் தோய்க்கவும்.

சுதூ இஞ்சுக் கோடுகளைக் காட்டத்தக்கதாய் வரியிட்ட கடுதாசியை இதற்கு வழங்கினால் வசதி.

இதை வெதுப்பி மேனித் தோலில் அணைக்க கொப்புளங்கொள்ளும்.

கந்தாரிசுப்பற்று. Plaster of Cantharides. கொள். கந்தாரிசு, தூளாக, பன்னிரண்டு அன்சு; செம்மெழுகு, பூதச்சீபம்¹, வகையொன்றுக்கு ஏழரை அன்சு; பூதலாடு², ஆறு அன்சு; குங்கிலியம், மூன்று அன்சு. மெழுகு, சீபம், லாடு மூன்றையும் நீர்மத்திகத்தில் ஒன்றாயும், குங்கிலியத்தை வேறாயு முருக்கிக் கூட்டி அப்பால் கந்தாரிசுத் தூளைப் போட்டு முழுவதையுந் திறமாய்ச் சேர்த்து அக்கலவை ஆறுந்தனையும் கலக்கவும்.

கொப்புளிக்கப்பண்ணுவதற்கு இப்பற்றை வாடிச்சகையாய் வழங்கப்படுவது. இந்த நோக்கமாய் இது வழங்கப்படும் அணைக உபயோகங்கள் கந்தாரிசின் விபரத்தில் முன்னே சொல்லியிருக்கும்.

கந்தாரிசன்கென். Ointment of Cantharides. கொள். கந்தாரிசு, செம்மெழுகு, வகைக்கு ஒரு அன்சு; ஒலீவுதேல்³ ஆறு அன்சு. மூடிய பாத்திரத்திலே விட்ட எண்ணெய்யில் கந்தாரிசுத் தூளைப் பன்னிரண்டு மணி நேரம் ஊறப்போட்டு, அப் பாத்திரத்தைக் கொதிநீரிற் பதினைந்து மினி நேரம் வைத்து, சீலையில் வடித்துப் பிழிந்து, முன்னமே வேறாயுருக்கின மெழுகோடு கலந்து அக்கலவை ஆறுந்தனையும் ஓயாமற் கலக்கவும்.

கொப்புளித்த புண்கள் சியன்னிகளை அழற்றுவதற்கு இது இடப்படும்.

வேம்பற்று. Warm Plaster. கொள். கந்தாரிசு, பருக்கன் பொடியாக, ஊற்றின சிடத்தேல்⁴, செம்மெழுகு, குங்கிலியம், வகைக்கு நாலு அன்சு; சப்பிலாஸ்தர்⁵ மூன்றேகால் இருத்தல்; குங்கிலியப்பிலாஸ்தர், இரண்டு இருத்தல்; கொதிவெந்நீர் அரைநாழி. கந்தாரிசுப் பொடியைக் கொதிநீரில் ஆறு மணிநேரம் ஊறப்போட்டுக் காரிக்கம் புடைவையில் இறுக்கமாய்ப் பிழிந்து, பிழிந்த நீர் மூன்றத்தொரு பங்காய் வருந்தனையும் அதை நீர்மத்திகத்தில் வறட்டி, அப்பால் மற்றங் கூறுகளைக் கூட்டி நீர்மத்திகத்தில் உருக்கி, முழுதுந் திறமாய்ச் சேருந்தனையும் ஓயாமற் கலக்கவும்.

மந்தமான கழலைகள் நாட்பட்ட கோள வீக்கங்கள் பொருத்து வீக்கங்களுக்கு இது நல்ல ஸ்திமுலமான அணைவாகும்.

*மைலாபிரிச் சிசுரி வண்டு.

MYLABRIS CICHORII. TELINI FLY.

வாசம். இது தென் யுரோபத்திலுள்ளது. இத்தவியிலிருந்து கிரேக்கு வசித்து வழியாய்ச் சீனத்துக்குச் செல்லும். இந்துவடங்களும் இது வாடிக்கைப்பட்டது.

வாகடபகுதி. காய்ந்த வண்டு. அதின் லட்சணங்களாவன: ஏறக்குறைய ஒரு இஞ்சு நீளமும் மூன்றிலொருபங்கு இஞ்சு அகலமுமானது. ஒடுமங்கலான மஞ்சள்நிறம். அது மூன்று பெரிய வளைந்த குறுக்குவரிகளுள்

1 Prepared suet. 2 Prepared Lard, ஷயம். 3 Olive oil. 4 Issue, இசு. 5 Expressed oil of Nutmeg. 6 Soap plaster.

எது. முதலாம் வரி முறிந்து சிலவேளை மூன்றுநாலு புள்ளிகளாய் மாத்திரமிருக்கும். இதின் சத்து கந்தாரிடின¹.

தன்மை, உபயோகம். கந்தாரிடி வண்டைப் போலவே. வெசிக்²னாக அதற்குப் பதிலாக இதை வழங்கலாம். கந்தாரிசிரஞ்சுத்தின் பெலனுஞ் செயலும் பூரணமாய் விளங்கியிருப்பதாலும் இதின் பெலன் செயல் தெரியாதிருப்பதாலும் அதற்குப் பதிலாக இதை உள்மருந்தாக வழங்கப்படாது. கந்தாரிசைப்பார்க்க இது அதிக வீறுள்ளதாகக் கொள்ளப்படுகின்றது. (74)

[இதைவிட இந்துயன் பலபகுதிகளில் வேறு கொப்புளவண்டுகளும் உண்டு. உதாரணமாக, வடக்கிந்து மத்திய இந்துவில் மெலுவீத் திரியந்திமம்³, லித்த சிகாக⁴, லித்த வியொலாசி⁵, புதுச்சேரிக்குக்கிட்ட மைலாபிரிப் பஸ்துலாது⁶, மைலாப்பிரிப் பந்தம்⁷ என்ற இனங்கள் உண்டு. பிந்தின இரண்டு இனங்களின் தன்மைகளைப்பற்றிக் கொலாசு பண்டிதர் எழுதிப் பிரசுரஞ் செய்திருக்கிறார். இந்த இனங்களை விட மைலாபிரி யிந்துகம்⁸, மைலாபிரி மெலனாரம்⁹, மைலாபிரி யுமராவி¹⁰, மைலாபிரிப் பிரசுச்சிமம்¹¹, மைலாபிரி யோரியந்தல்¹², லித்த வசமேஞ்சி¹³, எபிகோத்த நிபலேஞ்சி¹⁴ என்னும் இனங்கள் உண்டென்று இந்துநாதனசாலையைச் சேர்ந்த மூர் என்பவர் குறித்திருக்கிறார். என்றாலும் மைலாபிரிச் சிகுரி¹⁵ என்ற கொப்புளவண்டு இந்துவின் மிகுதியான பகுதிகளில் இருப்பதால் இந்தக் கொப்புளவண்டினங்களின் தொகையைப் பெருக்கத் தேவையில்லை.]

கைமேனாப்திரங்கள்.

HYMENOPTERA.

தேனீ. HONEY BEE.

வாசம். இது பூமியின் பல பகுதிகளில் ஆதியாயுள்ளது. இப்போ மிகுதியான தேசங்களில் வளர்க்கப்படுகின்றது.

வாகடபகுதி. 1. தேன். இது தேனீயாற் கூட்டிற் சேர்த்து வைக்கப் படுகின்ற சர்க்கரையுள்ள விசர்க்க¹⁶மான பாணி. கூட்டிலிருந் தெடுத்தவுடன் பிசுபிசுப்பும் சற்றே உருவொளியும், கபிலமான மஞ்சள் நிறமுமுள்ள நீராகவீருக்கும். படிப்படியாய்ச் சற்றே கிரிஸ்தலித்து மங்கலாகும். இது ஓர்உகைச் சுய மணமும் நல்ல இனிப்புச் சுவையுமுடையது. இதை வெந் நீரோடு சில மினி வரைக்குக் கொதிப்பித்து ஆறவிட்டு இயோதநீரோடு சேர்த்தால் நீலமாகாது. 2. செம்மெழுகு. இது தேன்கூட்டைக் காய்ச்சி வடித்தெடுக்கப்படுவது. கட்டியாகவீருக்கும். உரப்பானது, பருபருக்கையாய் ஒடியும். மஞ்சள் நிறமும் தேன்போல் நல்ல மணமுமுடையது. தொட்டால் ஒட்டாது. 140 பாகை சூட்டுக்குக் குறைந்த சூட்டில் உருகாது. குளிர்ந்த திட்டசீதிற் கரையாது; தர்ப்பந்தின் எண்ணெயில் முற்றாய்க் கரையும். இதைப் போட்டுக் குலுக்கின கொதிவெந்நீர் ஆறியபின் இயோதநீருக்கு நீலநிறங் காட்டாது. 3. வெண்மெழுகு. செம்மெழுகை

1 Cantharidin. 2 Vesicant. 3 Meloe-Trianthema. 4 Lytta gigas. 5 L. violacea. 6 Mylabris pustulata. 7 M. punctum. 8 M. Indica. 9 M. melanura. 10 M. humeralis. 11 M. proxima. 12 M. orientalis. 13 Lytta Assamensis.

14 Epicauta Nipalensis. 15 Mylabris Cichorii.

16 Secretion.

(71) அனுபந்தமார்.

ஈரிப்பு, ப்ரமாணு, வெளிச்சங்களால் வெளுக்கும்போது அது வெண்மெழு
காகும். இது வட்டித்த சில்லுகளாக வரும். வன்மையும், ஏறக்குறையச்
சுத்த வெள்ளையும் சற்று உருவொளியுமானது. தொட ஓட்டாது. 150 பா
கைக்குக் குறைந்த சூட்டில் உருகாது.

தன்மை உபயோகங்கள். தேன் இமாலியம்¹. சொற்பமான இளம்பேதி.
இருமற் கலவைகள், சார்கில்²களுக்குச் சுவைக்காகச் சேர்க்கப்படும். மெ
ழுகு இமாலியமும் திமல்ச³முமாகும். திசந்தெரி⁴ தியறீயம்⁵, கதார்க⁶ளுக்குச்
சிலவேளை கொடுத்ததுண்டு. ஆயிலும் அன்கென்கள்⁷, பிலாஸ்தர்கன்⁸, சப்
பாசிதுறிகளில் ஓர் கூறுகச் சேர்க்கப்படுவதே இதின் விசேஷ உபயோகம்.

தேயம். வெண் மெழுகிற் பத்துக் கிறேன் முதல் இருபது கிறேன் வ
ரைக்கு முசிலாகின்¹⁰ துணையாற் கலவையில் நீந்தவிட்டுக் கொடுக்கலாம்.

ரசிதங்கள். சுத்ததேன். Clarified Honey. கொள். தேன், ஐந்து இ
ரூத்தல். தேனை நீர்மத்திகத்தில்¹¹ உருக்கி, அது சூடாயிருக்கையில் வேர்நீ
ரில் நனைத்த சம்பளியில் வடிக்கவும்.

இது திமல்சம். அச்சிமெல்¹² ஸ்குவி¹³லச்சிமெல், போறசதேன்¹⁴, மிளகு
லேகியம், ஸ்கமுனி¹⁵ லேகியம், தர்ப்பந்தின்¹⁶ லேகியம், இவைகளில் தேன்
ஓர்கூறுகச் சேருகின்றது.

தனியன்கென். Simple ointment. கொள். வெண்மெழுகு, இரண்
டு அன்சு; பூதலாடு¹⁷ மூன்று அன்சு; வாதுமைத்தேல்¹⁸ மூன்று அன்சு. மெழுகு,
லாடு, எண்ணெய் மூன்றையும் நீர்மத்திகத்தில் ஒன்றாயுருக்கி, அக்கல
வையை நெருப்பால் இறக்கி அது ஆறும்போது ஓயாமற் கிளறவும்.

இது புண்களுக்கு இட நல்ல அணைவு. வாசட அன்கென்கள் பலவற்
றுக்கு இது அடியாக வழங்கப்படுகின்றது.

*செறுமெல். Ceromel. கொள். செம்மெழுகு, ஒரு அன்சு; தெளி
த்த தேன், நாலு அன்சு. மென்சூட்டில் உருக்கிச் சேர்த்துச் சீலையில் வ
டிக்கவும்.

மந்தவிரணங்கள், மற்றும் விரணங்களுக்கு இது நல்ல ஸ்திமுல அணை
வு. இந்துவிலும் மற்றும் உஷ்டண தேசங்களிலும் பிராணிய கொழுப்பு
கள் சுறுக்காய்ப் பழுதாகி உதவாமற்போய்விடுவதால் இது மிக உபயோ
கமானது.

[நல்ல தேனும் மெழுகும் இந்துவில் அகப்படும். அவை அபி சோசியாலி¹⁹
அபிஸ் தருசாதம்²⁰, அபிஸ் நிகிரிபெனு²¹, அபிஸ் பைகொலா²² என்ற தேனீச்
களினதும் ஒருவேளை வேறும் இனமான தேனீயினதும் பேறு.]

கெ மி ப் தி ர ங் க ள் .

HEMIPTERA.

கிரிமிஞ்சிப்புழு. COCHINEAL INSECT. கக்கசு, COCCUS.

வாசம். இது மெச்சிகு தெனரீவு தேசங்களில் வளர்க்கப்படும்.

வாகடபகுதி. காய்ந்த பெண்புழு. வட்டிப்பானது; தனக்குவிவானது²³;

1 Emollient சாந்தனி. 2 Gargle. 3 Demulcent, சாமகி. 4 Dysentery. 5 Diarrhoea.
6 Catarrh. 7 Unguenta. 8 Plaster. 9 Suppository. 10 Mucilage. 11 Water-bath.
12 Oxymel. 13 Squill. 14 Mel-Boracis. 15 Scammony. 16 Turpentine.
17 Prepared Lard ஷெயம். 18 Oil of Almond. 19 Apis Socialis. 20 A.
dorsata. 21 A. nigripennis. 22 A. bicolor 23 Plano convex.

ஏறக்குறைய இரண்டு லீன் நீளமுள்ளது; சுருக்குவிழுந்தது; கருமை அல்லது சாம்பல் வெண்மை நிறங்கொண்டது. நருக்கினுற் கருங் கபில நிறமான தாளாகும். வெண் நரை நிறமான புழுவை நெருப்பில் வெதுப்பச் சுறுக்காய்க் கறுக்கும்.

தன்மை, உபயோகம். இதற்கு அந்திஸ்பசு¹ தன்மையும் மற்றுந் தன்மை களுமுண்டென்று சொல்லியிருப்பதுண்டு. ஆயினும் தவறு. நிறங்கொடுக்க மாத்திரம் இது உபயோகமானது.

ரசிதம். கிருமீஞ்சிரஞ்சம். Tincture of Cochineal. கொள். கிரிமிஞ்சிப் புழு மாவாக இரண்டரை அன்சு; புருவுசீது² அரைநாழி. ஏழு நாளுறப்போட்டு வடித்து அரைநாழிக்குப் போதிய புருவுசீது சேர்க்கவும்.

வலக்கூட்டிரஞ்சம், சின்கன³க்கூட்டிரஞ்சங்களிற் கிரிமிஞ்சிப்புழு ஓர் கூறுகச் சேருகின்றது.

மீன்கள். FISHES.

ஸ்தேர்ச்சன் மீன். STURGEON.

வாசம். இது கஸ்பிக்கடல் கருங்கடல்களில் உள்ளது.

வாகடபகுதி. சவுன்⁴ என்னும் மிதப்புப் பை. இது பக்குவமாக்கிக் கீலங் கீலமாகக் கிழிக்கப்பட்டுவரும். ஐசிங்கிளாகு⁵ எனப்படுவது இது தான். இது லேசானது; தோல்போல் உரத்தது; வெண்மையானது; சற்றே உருவொளியானது; சுவை மணமற்றது; தண்ணீரிற் கரையாதது; கொதிவெந்நீரிற் சுறுக்குக் கரைந்து ஆறும்போது உருவொளியான களியாகும். ஒரு அன்சு வெந்நீரைத் தடித்த இறுகின களியாக்குவதற்குப் பதினைந்து கிறேன் ஐசிங் கிளாகு போதும். வியாபாரத்திற் பலவகையான ஐசிங்கிளாகு வரும். (75) செலத்தேன⁶ இதின் பிரதானகூறு.

தன்மை, உபயோகம். இது திமல்சம்⁷, போஷணி⁸. இது களியாக நோயாளரின் பத்தியத்துக்கு அதிகம் வழங்கப்படும். மேலுங் கலிக்கமிலத்தையும⁹, தனிக்கமிலத்தையும¹⁰ பகுத்தறியச் சோதனைபார்ப்பதற்கு இதை வெந்நீரிற் கரைத்து வழங்குவார்கள். தனிக்கமிலத்தோடு இதைச்சேர்க்க வெள்ளையான அடையல் விழும். கலிக்கமிலத்தோடோ அடையலுண்டுபடுவ தில்லை.

கட்மீன். CODFISH.

வாசம். இது நோர்வே, பிரான்சு, பிரித்தனி, ஈர்லன் தேசக் கரைகளில் மிகுதியாய் உண்டு. பிரதானமாய் நூவன்லந்துக் கரைகளில் அதிகம்.

வாகடபகுதி. எண்ணெய். இது பச்சை ஈரலை 180 பாகைக்கு மேற்படாத குடு காட்டி எடுக்கப்படுவது. இதற்கு மறுவித்தேல்¹¹ என்று பெயர். இந்த எண்ணெய் வெண்மஞ்சள் நிறமானது; சற்றே புலால்மணமுஞ் சுவை

1 Antispasmodic. 2 Proofspirit. 3 Cinchona. 4 Sound. 5 Isinglass. 6 Gelatine. 7 Demulcent சமகம். 8 Nutritive. 9 Gallic acid. 10 Tannic acid.

11 Oleum Morrhuae.

(75) அனுபந்தம்பர்.



யுமுள்ளது. இதில் சில துளியை ஒர் பீங்கான் தட்டில் விட்டு அதற்குச் சல்புரிக் கமில¹த்திலே ஒரு துளியைக் கூட்டினால் செந் நீல² நிறமுண்டாகிச் சுறுக்கு மஞ்சள் நிறமாயாவது கபிலச்³ சிவப்பு நிறமாயாவது மாறும். இதிலே பித்த பதார்த்தங்கள் இருப்பதன்றிச் சொற்ப வீதமான இயோதம்⁴, புரோமம்⁵, குலோறம்⁶, பாஸ்வரம்⁷, பாஸ்வரிக்கமிலம்⁸, சல்புரிக் கமிலங்களும் சுண்ணம்⁹, மக்னீசு¹⁰ சோடங்க¹¹ளின் சாடையும் அடங்கியிருக்கும்.

தன்மை. இது நல்ல அஸ்திவம்¹², போஷணி.

உபயோகம். கசம் முதலிய ஸ்துருமம்¹³ நோய்களுக்கு இது உத்தம மருந்து. மேலும் கசரோகம், ரிக்சு¹⁴, மதியாந்திரகசம்¹⁵, தீவிர காலிக ஐரு கெவலம்¹⁶, கண்ணோக்க¹⁷ளுக்கும் ஸ்துரும நோயாளருக்குண்டாகும் அற்றுவி¹⁸யென்ற மெலிவுக்கும் இது கைகண்ட மருந்து. மேலும் அனீமி¹⁹க்கும் விசேஷமாய் அனீமியோடு கூடிய நுறல்சி²⁰, சியதிகத்துக்கும்²¹ மாறாதசரும நோய்கள், காலிகவாதம், சர்க்கராமுரி²²யென்ற நீரழிவு, எபிலெப்சி²³, கொரியங்க²⁴ளுக்கும் தூர்விபாகத்²⁵தோடுகூடிய குண்மத்துக்²⁶கும், இது நயந்த மருந்து.

தேயம். ஒருதிரும், நாள் இரண்டு மூன்று முறை கொடுக்கலாம். நோயாளி தாங்கக் கூடிய வரைக்குங் கொஞ்சங் கொஞ்சமாய்க் கூட்டிக் கொடுக்கலாம். மிஞ்சினால் வீணிலே சுழியும். விழுங்கக் கூடாதவர்களுக்கு பாயுவாலாகுதல் தோலில் பூசி உரஞ்சுவதாலாகுதல் உட்செலுத்தலாம். சாப்பிட்டவுடன் கொடுப்பதே உத்தமம்.

*பாற்சுரு. WHITE SHARK.

வாசம். இது எல்லாச் சமுத்திரங்களிலும் உண்டு. இந்துக் கடல்களில் மிகுதி.

வாகடபகுதி. ஈரலை மென்குட்டிற் காய்ச்சியெடுக்கும் எண்ணெய். இது வெண் மஞ்சள் நிறமுடையது. மணம் சுவை மறுவித்தேலைப் போலவே. அதிலும் வீரனது; கெட்டது. 86 பாகை காங்கையில் நல்ல தெளிவாகும். கொஞ்ச வேளை கலக்காமல் விட்டால் ஸ்தியரின்²⁷ பொடியாகவும் சந்தனமாகவும் அடையும். இது ஸ்குவாலின்²⁸ எனப்படும்.

தன்மை, உபயோகம், தேயம். மறுவித்தேலைப் போலவே. அதற்குப் பதிலாக இதை வழங்கலாம். இந்து வைத்திய சாலைகளில் வழங்கத் தகுந்தது. உவட்டுச் சுவையே இதை வழங்குவதற்குப் பெரியதடை. ஆயினும் அதிக கவனமாய் உண்டுபண்ணினால் ருசிக்கக்கூடும்.

[புதுச்சேரியிலிருந்த கலாசு பண்டிதர் இந்த எண்ணெய்யைப்பற்றி மெத்த வியப்பாய் எழுதியிருக்கிறார். மே பண்டிதரும் இதை நயக்கிறார். சென்னையில் குஷ் - வைத்தியசாலையிலும் மற்றும் இடங்களிலும் இது நயப்பாய் வழங்கப்படுகின்றது. உஷ்டண தேசங்களிலே ஸ்குவாலின் நல்ல மருந்தாகுமென்பது கலாசு பண்டிதர் எண்ணம். இது புண்கள் காயங்களுக்கே நல்ல தைலமாவதுமன்றி லாட்டைப்பார்க்கத் தடிப்பாய் அதைப்போ

1 Sulphuric acid. 2 Violet, 3 Brown, 4 Iodum. 5 Bromum. 6 Chlorum. 7 Phosphorus. 8 Phosphoric acid. 9 Lime. 10 Magnesia. 11 Soda. 12 Alterative பரிமாசு.

13 Struma. 14 Rickets 15 Tabes Mesenterica. 16 Hydrocephalus.

17 Ophthalmia. 18 Atrophy. 19 Anaemia. 20 Neuralgia. 21 Sciatica.

22 Diabetes. 23 Epilepsy. 24 Chorea. 25 Mal assimilation. 26 Dyspepsia.

27 Stearine. 28 Squalin.

லப் பழுதாகாமலிருப்பதால் அதற்கு இது நல்ல பதிலாகும். ஸ்குவாலினேச் சீலையிற் பூசிப் புண்களுக்கு இடலாம். மறுவித்தேலைப் பார்க்கச் சுருத்தேவிலே சில சத்துக்களின் வீசங் கூட என்று தேலாற்றர் சொல்லுகிறார் இதுவே இயோதீ¹மும் பாஸ்வரீ²முங் கூடவும், புரோமீ³முங் கெந்தகமுங் குறையவுமிருக்கும். சில வருஷங்களுக்கு முன் இந்துவிலே அறுக்கினாமீனின்⁴ ஈரலெண்ணெயைச் சோதித்துப்பார்த்தார்கள். நயமென்று சொல்லப்பட்டாலும் அது வழக்கத்துக்கு வரவில்லை. இந்து மீன்களின் ஈரலெண்ணெயைப் பற்றிப் பிதி வைத்தியர் எழுதினவைகளிலும் பார்க்கலாம். இந்து மீனெண்ணெய்களின் நாற்றமுங் கெட்ட சுவையும் மிகுதியாய் உருக்கமுன் ஈரல்கள் நாறுவதைப்பற்றி உண்டாகுமென்று அவர் நினைத்துப் புதிய ஈரல்களை வெந்நீரிற் போட்டு அவித்து எண்ணெய் எடுக்கும்படி சொல்லுகிறார்.

பட்சிகள். AVES. BIRDS.

கோழி. DOMESTIC COCK AND HEN.

வாசம். பூமியினெப்பகுதியிலும் வீடுகளில் இது வளர்க்கப்படும்.

வாகடபகுதிகள். 1. முட்டையின் வெள்ளைக்கருவாகிய அல்புமின்⁵. இது நிறம் மணம் சுவையற்ற வழுவுழுப்பான நீர். சூட்டுக்கு உறையும். அசிதிக்கமிலத்துக்கு மாறுதல் அடையாது. 2. மஞ்சட் கரு. இது தடித்த மஞ்சள்நிறமான எண்ணெய் போன்ற நீர். மங்கலானது. மணமற்றது. காரமற்ற நற் சுவை உடையது. தண்ணீரோடு கலக்க,பால்போன்ற இமல்சீ⁷மாகும்.

தன்மை,உபயோகம். இது இமாலியம்⁸, திமல்சம்⁹, போஷணி¹⁰. சவ்வீரம்¹¹,செம்பு¹²,துத்தங்க¹³ளிற் கரையக்கூடிய உப்புக்கள், கிறீயசற்று¹⁴ என்ற நஞ்சுகளுக்கு வெள்ளைக்கரு, கெமிஸ்த¹⁵ மாற்றாகும். காரமான மற்றும் லோகவுப்புகளாகிய கஞ்சுகளைத் தின்றவர்களுக்கோ, அது நஞ்சிம்மிகளை மூடி, இரைப்பை சூடல்களின் சளிச்சுவ்வைப் போர்த்து இப்படி மிகானிக¹⁶மாற்று ஆகும். மஞ்சட்கரு நோயாளருக்குப் போஷணையுள்ள உணவாயிருப்பதன்றி, இமல்சவ்களை உண்டாக்கவும், எண்ணெய்கள், தேல ராளங்கள்¹⁷, ராளங்கள் அடையாமற் காக்கவும் வழங்கப்படும்.

ஈசிடங்கள். அல்புமின் நீர். Solution of Albumen. கொள். கோழி முட்டையொன்றின் வெள்ளைக்கரு; திஸ்திலித்த தண்ணீர் நாலு அன்சு. குழியம்மியிலிட்டு அரைத்துத் திஸ்திலித்த தண்ணீரால் நனைத்த சணற்பஞ்சில் வடிக்கவும். இந்த நீரைப் புதிது புதிதாகத் தேவையானபொழுதே செய்துகொள்ளவேண்டும்.

இது கெமிஸ்த சோதனையாக மாத்திரம் வழங்கப்படும்.

கோழிமுட்டையின் மஞ்சட்கருப் பிரண்டிக் கலவை¹⁸யிலோர்குருகின் தது.

1 Iodum. 2 Phosphorus. 3 Bromum. 4 Sier Fish. 5 Albumen. 6 Acetic acid. 7 Emulsion. 8 Emollient. 9 Demulcent. 10 Nutritive. 11 Corrosive sublimate. 12 Copper. 13 Zine. 14 Creasote. 15 Chemical 16 Mechanical. 17 Oleo resin. 18 Brandy mixture.

மமலியங்கள். MAMMALIA.

சேதசீயங்கள். CETACEA.

ஸ்பேந் திமிங்கலம். SPERM WHALE.

வாசம். இது பசீவிச் சமுத்திரம் இந்து சமுத்திரங்களில் வசிக்கும்.

வாகடபகுதி. செதீன்¹. இது திமிங்கிலத்தின் தலைக்குள்ளிருக்கிற நெய்யைச் சுத்தியாக்கிக் குளிரால் உறையப்பண்ணி யெடுக்கும் வஸ்து. இது சுயமே ஏறக்குறையச் சுத்தமானது. முத்துப் போல வெண்மையும் மினுக்கமும் உருவொளியும் கிரிஸ்தம்²தன்மையுமானது. மணம் சுவை மெத்த வில்லை. திட்டசீதிற்³ சொற்பஞ் சேர்த்து மாவாக்கலாம். தொட நெய் பிடியாது. 100 பாகைக்குக் குறைவான கூட்டில் உருகாது.

தன்மை, உபயோகம். இது திமல்சம்⁴, இமாலியம்⁵. தைலமாக வெளிமருந்தாய் வழங்கப்படுவதன்றி உள்ளே கொடுக்கப்படுவதரிது.

ரசிதம். திமிநெய் யன்டுகன். Spermaceti Ointment. கொள். திமிநெய், ஐந்து அன்சு; வெண்மெழுகு, இரண்டு அன்சு; வாதுமைத் தேல் அரைநாழி அல்லது போதியது. எல்லாவற்றையும் ஒன்றாய் மென்கூட்டில் உருக்கி, சூட்டாலெடுத்து ஆறந்தனையும் ஓயாமற் கலக்கவும்.

புண்களுக்கும் தோலுரிந்த கொப்பளித்த இடங்களுக்கும் இது சாந்தியான தைலம்.

கொப்புளத் தாளிற் திமிநெய் ஓர் கூறாகச் சேருகின்றது.

ரு மி னு ன் சி க ள் .

RUMINANTIA.

கஸ்தூரிமான். MUSK DEER. MOSCHUS MOSCHIFERUS.

வாசம். இது திபெத்திலும் மத்திய இந்துவிலும் ஆதியாயுள்ளது.

வாகடபகுதி. கஸ்தூரி. இது கஸ்தூரிமானின் முன்றோற் குதுவங்க⁶ளிலிருந்து ஊறி இறுகின காய்ந்த விசர்க்கம். இது செங்குறுப்பும் ஒழுங்கற்றதும் சற்று நெய்ப்புமான குறுமணிகளாகவிருக்கும். செறியக் கூடிய நல்ல மணமும் கைப்பும் கார்ப்பும் நற்சுவையுமுடையது. ஏறக்குறைய இரண்டு இஞ்சு பருமையான வட்டித்த சவ்வுப் பைக்குள்ளே இருக்கும். பையின் வெளிப்பக்கம் முரணான நரை மயிரால் மூடப்பட்டிருக்கும். பையின் மையத்திலுள்ள துவாரத்தைச் சுற்றிச் சற்றியிருக்கும்.

தன்மை. இது ஸ்திமுல⁷மும் அந்திஸ்பசி⁸யுமாகும்.

உபயோகம். சன்னிச்சுரம்⁹, சன்னிவச்சுரம்¹⁰ளுக்கும், மற்றஞ் சுரநோய்களின் பிற்கூற்றுக்கும், அசத்துவ¹¹துமோனி¹², ஒதுங்கு¹³குவாதம்¹⁴, விசாதகம்¹⁵, அசத்துவ வனகயான வேறு நோய்களுக்கும், இது ஸ்திமுலமாக நயந்தது. மேலும் ஸ்பச நோய்கள், சிரா¹⁶நோய்களுள், ஸ்பசநை¹⁷, கூவுஞ்சுவாசம், குக்கவின் பிற்பாதம், குழந்தைகளுக்குண்டாகும் வலிகள், எபிலெப்சி¹⁸

1 Cetine. 2 Crystal. 3 Rectified spirit. 4 Demulcent. 5 Emollient. 6 Follicle.

7 Stimulant. 8 Antispasmodic. 9 Typhus, 10 Typhoid. 11 Atonic. 12 Pneumonia.

13 Retrocedent, 14 Gout, 15 Hypochondriasis. 16 Nervous. 17 Spasmodic Asthma. 18 Epilepsy.

சொரியப் பலவகையான ஸ்தேரீகளுக்கும், விசேஷமாய் நித்திரையின்மைக்கும், இது உபயோகமானது. ஆயினும் இக்காலத்தில் இது வழங்கப்படுவதரிது.

தேயம். ஐந்து முதற் பத்துக் கிறேன் வரைக்குக் குளிகையாக்கியாவது பாணித் கலவையிற் பிசினிட்டு அடையாமற் காத்தாவது கொடுக்கலாம்.

ஆடு. THE SHEEP.

வாசம். இது எத் தேசங்களிலும் வளர்க்கப்படும்.

வாகடபகுதி. வயிற்றின் உட் கொழுப்பு. இது உருக்கி வடித்துச் சுத்தமாக்கப்படுவது. பூதசீபம்³ என இது பெயர்ப்படும். இது வெள்ளையும் மெதுவும் அழுத்தமுமான உர பொருள். மணமிருக்கிற் சொற்பம். 103 பாகை சூட்டில் உருகும். இதில் மிகுதியான ஸ்திரியின்⁴ ஒவியினும் சொற்ப மாசரினும்⁵ அடங்கியிருக்கும்.

தன்மை, உபயோகம். இது இமாலியம்⁷, சிலவேளை பாப்பைகளுக்குச் சேர்க்கப்படும். போஷணையாகவும் வழங்கப்படுவதுண்டு. பூதசீபம் கந்தாரிகப்⁸ பற்றிலும் இரசவன்கெனினும்⁹ ஓர் கூறுகச் சேருகின்றது.

மாடு. THE OX.

வாசம். இது பூமியின் எப்பகுதியிலும் வளர்க்கப்படும்.

வாகடபகுதி. பால். இது மடியிலுறுவது. மங்⁴லும் வெள்ளையுமான இமல்ச¹⁰ நீர். இனிப்பான சற்றுங் கார்ப்பற்ற சுவையும் ஓர்வகையான சொற்ப மணமுமுடையது. உண்டையான நெய் இம்மிகள் ஏராளமாயுள்ளது.

தன்மை, உபயோகம். இது உத்தம போஷணி. சாந்தனி. மெத்த உபயோகமான உணவு. விசேஷமாய்ச் சிலவகையான இரைப்பைப் புண்ணுக்கு உவந்தது. அழற்று நஞ்சுகள் அரிக்கு நஞ்சுகளுக்கு இது மாற்றுவதன்றி உட்பக்கங்களைச் சாந்தமாய்க் காக்கும்.

பால், ஸ்கமுனி¹¹க் கலவையில் ஓர் கூறுகச் சேருகின்றது.

ரசிதம். பாற் சீனி. Sugar of Milk. பசுப்பாலின் தயிர்த் தண்ணீரை உறட்டக் கிரிஸ்தலித்த¹² சீனி வரும். இது பெரும்பாலும் மைய வரியில் ஓர் கொடியை அல்லது தடியை உடைய இரண்டு இஞ்சு பருமையான கம்பிகளாயாவது சிறுக் கட்டிளாயாவது இருக்கும். நரை வெண்மையானது. கிரிஸ்த¹³ தன்மையுந் தோற்றமுங் கொண்டது. சற்று உருவொளியானது. வன்மையானது; மணமற்றது; சொற்ப இனிப்புக் கொண்டது; சப்பக் கரகரக்கும்.

இது போஷணி என்பது சந்தேகம். நயநட்டமற்றதுபோலும். பெரும்பாலும் தூள் மருந்தைச் செலுத்துகிறதற்குத் துணையாய் வழங்கப்படும்.

சுத்தகோபித்தம். Purified Ox Bile. கொள். புதியகோபித்தம், அரைநாழி; திட்டசீது¹⁴ ஒருநாழி; இரண்டையும் சீசாவில் விட்டுக் குலுக்கிச் சேர்த்து மண்டி அடையுந்தனையும் அரைநாள்வரைக்கு வைத்துவிடவும். அப்பாற் தெளிந்த நீரைத் தெளித்துப் பீர்கான் கிண்ணத்தில் விட்டுக் குளி

1 Chorea. 2 Hysteria. 3 Prepared suet. 4 Stearine. 5 Oleine. 6 Margarine.

7 Emollient. 8 Emplastrum Cantharides. 9 Mercurial ointment. 10 Emulsion.

11 Scammony 12 Crystallized 13 Crystal. 14 Rectified spirit.

கைக்குத் தகுந்த பதமாய் வருந்தனையும் நீர்மத்திகத்¹திலே உறட்டவும். லட்
சுணங்கள். இது குளிகைப் பதமான மஞ்சட் பச்சை நிறக் களியாய் இரு
க்கும். இனிப்புங் கைப்புங் கலந்த சுவை உள்ளது. தண்ணீரிலுஞ் சீதி
லுங்கரையக்கூடியது. இதில் இரண்டொரு கிறேனை ஏறக்குறைய ஒரு
திரும் தண்ணீர் கரைத்து அதோடு ஒரு பங்கு சர்க்கரைக்கு நாலு பங்கு
தண்ணீர் வீதமாய்க் கரைத்த சிறுபத்³தில் ஒரு துளியை முதற் கூட்டி அப்
பால் முதல் உண்டாகும் அடையல் கரையுந்தனையும் சல்வூரிக்கமிலத்தை⁴க்
கவனமாய்க் கூட்டினால் அக் கவனவநீர் முதல் நல்ல சிவப்பு நிறமாகிப்
பின்பு கருஞ் சிவப்பு, தூமில்⁵, செந்நீலம் என்ற நிறங்களாகப் படிப்படி
யாய் மாறும். இதின் தண்ணீர்க்கரைவுக்குத் திட்டசீதைச்⁶சேர்க்க அடையல்
விழாது.

தன்மை, உபயோகம். இளம் பேதி. குன்மம், மலவரட்சி, கழிச்சல்க
ளிலும், பித்த நீர்க் குறைவைப்பற்றி உண்டாகும் மற்றுங் குடல்நோய்களிலும்
இது பித்த நீரைச் சரிக்கட்டக் கூடியதாதலால் அவற்றிற்கு உபயோ
கமாய்க் காணப்பட்டது. சில வகையான செங்கண்மாரி⁷, மதியாந்திரகச
ம்⁸, விசாதகங்க⁹ளுக்கும் இது உபயோகமானதென்று எண்ணுகிறார்கள். மே
லும் எபிலெப்சி¹⁰, வெறிப்பைத்தியம்¹¹, சர்க்கராமுரி¹²களுக்குக்கொடுத்தாலு
ம், இதால் நயமுண்டானது நிச்சயமல்ல. பலவகையான நிபோஷம்¹³,
காலிகவாதர், சுளுக்குகளுக்கும், கற்குறும்பி திரண்டு அடைத்ததால் உண்
டான செவிட்டுக்கும், புதிய கோபித்தம் பூசினதால் நயமுண்டானது.

தேயம். ஐந்து கிறேன் முதற் பத்துக் கிறேன் வரைக்குக் குளிகையா
க்கியாவது கப்சல்¹⁴களில் போட்டாவது கொடுக்கலாம். வெளியிற்பூசுவ
தற்கு ஆறு முதல் எட்டு மடங்கு நிறையான கார்ப்பற்ற ஏதும் எண்ணெய்
யோடாவது பூர ரஞ்சத்¹⁵தோடாவது கலந்துகொள்ளவேண்டும்.

பகிடே.மங்கள்.

PACHYDERMATA.

பன்றி. THE HOG.

வாசம். இது பூமியின் எப்பகுதிகளிலும் வளர்க்கப்படும்.

வாகுடபகுதி. நெய். இது சவ்வுகள் நீக்கி உருக்கிச் சுத்தமாய் எடுக்கப்
படுவது. இதை லாடு என்றும், கிடியம்¹⁶ என்றும் சொல்லுவார்கள். இது
மெதுவும் வெள்ளையுமான கொழுப்பு. 100 பாகை சூட்டில் உருகும். பா
ண்டல் மணமற்றது; ஈதரில்¹⁷முற்றாய்க் கரையும். இதையிட்டுக் கொதிப்
பித்த திஸ்திலித்த தண்ணீரை ஆறினபின் வடித்து அதற்கு வெள்ளிநீரா
சைச்¹⁸ கூட்டினால் அடையல் விழாது. இயோத¹⁹ நீரைக் கூட்டினால் நீல
மாகாது.

பன்றிநெய்யிலே ஒலீயின்²⁰ நூற்றுக்கு 62 பங்கு வீதமாயும், மாகரின்²¹,
ஸ்தியரின்²², 38 பங்கு வீதமாயும் இருக்கும்.

1 Water bath. 2 Spirit. 3 Syrup சளிப்பாணி. 4 Sulphuric acid. 5 Purple. 6 Rectified spirit. 7 Jaundice. 8 Tabes Mesenterica. 9 Hypochondriasis. 10 Epilepsy.
11 Delirium Tremens. 12 Diabetes 13 Hypertrophy. 14 Capsule. 15 Tinc-
ture camphor. 16 Lard. 17 Ether. 18 Nitrate of Silver. 19 Iodum.
20 Oleine. 21 Margarine. 22 Stearine.

தன்மை, உபயோகம். இது இமாலியம்¹. உண் மருந்தாய்க் கொடுக்கப் படுகதில்லை. ஸ்காலதீனம்², எக்சந்திம்³, எரிசிப்பிலசு⁴ என்ற நோய்களுக்கும் மற்றும் வெளித் தாபிதங்கள், நசிவுகள், சுளுக்குகளுக்கும் பன்றி நெய் பூசுதல் மிகுதி. முதல் மூன்று நோய்களிலும் உள்ள குணங்களை அது அதிகமாய் மாற்றுகிறதென்று எண்ணுகிறார்கள். வாகடத்துக்குரிய அன்கென்சன் பலவற்றுக்கு இது அடியாகும்.

பெஞ்சோயஸ் லாடு. Benzoated Lard. இதைப்பற்றி 143 ம் பக்கத்திற் சாம்பிராணி மரத்தின்கீழ்ப் பார்க்கவும்.

[இந்ததேசத்தில் வைத்தியஞ் செய்பவர்கள் பன்றியையும் அதிலிருந்தெடுக்கும் பொருள்களையும் பற்றி மகமதியர்களுக்குள்ளிருக்கும் வெறுப்பை நினைத்திருப்பது நல்லது.]

ரோடென்சிகள்.

RODENTIA.

நீர்நாய். THE BEAVER.

வாசம். இது கனடம், சிபேரி என்ற தேசங்களில் ஆதியாயுள்ளது.

வாகடபகுதி. காய்ந்த திரட்சிகளாகிய சிசின நுனியின் குதுவங்களும் அவைகளில் ஊறும் விசர்க்க⁵மும். இவற்றிற்குக் கஸ்தர்⁶ என்றுபேர். லட்சணங்கள். திரட்சிகள் சோடு சோடாயிருக்கும்; ஏறக்குறைய மூன்று இஞ்சு நீளம்; நீள உண்டை வடிவம்; உரப்புங் கனமும், கபிலம் அல்லது நரைக் கறுப்பு நிறமுமானது. உள்ளே மெத்த வாசனையுள்ளது; காய்ந்த ராளம்⁷போன்ற செங்கபிலநிறமான விசர்க்கத்தை அடக்கியிருக்கும். இந்த விசர்க்கத்தின் மிகுதியான பங்கு திட்டசீது⁸லும் ஈதரி⁹லும் கரையக் கூடியது. இதிலே ஓர் அத்திரதேலும்¹⁰ காரமும் கைப்புமுள்ள ஓரிராளமும் கஸ்தரின்¹¹ என்ற கிரிஸ்தம்¹² பதார்த்தமும் அடங்கியிருக்கும். கஸ்தர் கட்சன் குடாக் கடற்கரையிலுள்ள நாடுகளிலிருந்து பறித்தனுக்கு ஏற்றப்படுகின்றது.

தன்மை. சொற்ப ஸ்திமுலம், அந்திஸ்பசி.

உபயோகம். இஸ்தேரி¹³ நோய்கள், சிரா¹⁴ நோய்கள், ஸ்பசு¹⁵ நோய்களில் இந்த வகுப்பைச் சேர்ந்த வீரூன மற்று மருந்துகளுக்கு இது நல்ல அனுமருந்தாகும். மேலும் ஈளை¹⁶, திஸ்மெனூரியம்¹⁷, எபிலெப்சி நோய்களுக்கு இது நயமென்று கொடுக்கப்படும். ஆயினும் இதைத் தனியே கொடுத்தால் செயலுண்டோவென்பது மிகச் சந்தேகம்.

தேயம். ஐந்து கிரேன் முதற் பத்துக் கிரேன் வரைக்கும் இன்னும் கூடவுங் குளிகையாய்க் கொடுக்கலாம்.

ரசிதம். கஸ்தரிரசிதம். Tincture of Castor. கொள். கஸ்தர் ஒரு அங்கு; திட்டசீது அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்தில் எழுநாளாறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கிச் சீலையில் வடித்துப் பிழிந்து இன்னும் வடித்து அரைநாழிக்குப் போதிய திட்டசீது சேர்க்கவும்.

தேயம். ஒரு திரும் முதல் ஓரண்டு திரும் வரைக்கு.

1 Emollient ரச்தனி. 2 Scarlatina. 3 Exanthemata. 4 Erysipelas. 5 Secretion. 6 Castor. 7 Resin. 8 Rectified spirit. 9 Ether. 10 Volatile oil. 11 Castorin. 12 Crystal. 13 Hysteria. 14 Nervous. 15 Spasmodic. 16 Asthma. 17 Dysmenorrhoea.

அவாகடச்சரக்குகள். Non-officinal.

நாவிப்பூனை. Civet Cat. இந்த மிருகத்தினது வாசனையான நெய்ப்புள்ள விசர்க்கம்¹, தென்னிந்துவிலுள்ள சுதேச வைத்தியரால் புணுகு என்று வழங்கப்படும். வாசனையாகவும் மருந்தாகவும் வழங்கப்படுகிற இந்த விசர்க்கத்துக்காக நாவிப்பூனைகள் திருவாளங்கோட்டிலே ராசாங்கத்தார் செலவில் வளர்க்கப்பட்டன. இப்போதும் வளர்க்கப்படுகின்றது போலும். இதற்கு நல்ல ஸ்திமுல², அவுரீச³தன்மைகள் உண்டென்பார்கள். ஆயினும் விசேஷமாய் இச்செயல்கள் இதற்கு இல்லைப்போலும். இந்த விசர்க்கமானது அபானத்துக்குஞ் சனன உறுப்புகளுக்கும் இடையிலிருக்கிற தட்டையான ஓர் பைக்குள்ளே கூடும். இப்பையானது கொட்டைப்பாக்களவு பருமையான இரண்டு சிறிய கோளங்களோடு தொடுத்திருக்கும். இச்சிறிய பைகளின் உள்வளத்தில் இந்த விசர்க்கம் ஊறுகிற கோளத்தோடு தொடர்பான பல சிறுத்துவாரங்கள் திறக்கும். இந்த உறுப்புகள் எல்லாவற்றையும் மூடுகிற வோர் பேசு⁴, கோளங்களையும் பையையும் சுருக்கி விசர்க்கத்தைக் கழித்துவிடும். கழிந்தவுடன் இந்த விசர்க்கம் பாணிபோற் தடிப்பும் மஞ்சள் நிறமுமாகும். ஆயினுஞ் சுறுக்குத் தடித்துக் கபில்⁵நிறமடையும். இது அமோனத்⁶தின் நாற்றமுங் கார்ப்பான உறைப்புச் சுவையுமுடையது.

1 Secretion. 2 Stimulant, ³வன, 3 Aphrodisiac ⁴சுரு, 4 Muscle, 5 Brown, 6 Ammonia,

அநிந்திர பதார்த்தசாரம்.

INORGANIC MATERIA MEDICA.

தண்ணீர். WATER.

சுத்தமான ஊற்றுத் தண்ணீரை எடுத்து, தேவையாகில் வடித்துக்கொள்ளவும். சோதனைகள். மணம் சுவையற்றது; தோற்றக்கூடிய அசுத்தங்கள் அற்றது.

தன்மை, உபயோகம். இது மற்றும் பதார்த்தங்களைக் கரைத்து அவைகளின் காரத்தைக் குறைக்கும்; குளிர்மையானது; உள்ளே குடித்தாலென்ன வெளியிலிட்டாலென்ன இச்செயல்கள் அதற்கு உண்டு. வைத்தியத்தில் இதின் உபயோகம் அனேகமும் முக்கியமுமாகும்.

ரீதி. திஸ்திலித்த தண்ணீர். Distilled Water. இதற்குச் சின்னம் ஐ.அ. கொள். சுவை மணமற்ற தண்ணீர், பத்துக் கலன்; தகரக் குழலோடு தொடுத்ததாய்ச் செம்பாற் செய்த வோர் வாலையிற் தண்ணீரை வார்த்துத் திஸ்திலித்து¹, முதல் வரும் அரைக்கலனையும் தள்ளிப்போட்டுப் பிறகு வரும் எட்டுக் கலனையும் சேர்த்துப் பேணவும். சோதனைகள். இதில் ஒரு அன்சைச் சுத்தமான கண்ணாடிக் கிண்ணத்தில் வார்த்து வறட்டினால் பெத்தத் தோற்றக் கூடிய சேடமொன்றுமிராது. மேலும் ஐருசல்வரிக்க மிலம்², அமோனவச்சலசு³, வெள்ளிநீதரசு⁴, பாரிதகுலோறிம்⁵, சுண்ணீர் இவைகளிலெதையும் இதில் விட்டால் யாதொரு செயலுங் காட்டாது. மருந்துகளை உண்டுபண்ணுவதில் இது அதிகமாய் வழங்கப்படும்.

காபன். CARBON.

சின்னம், கா; அணுப்பாரம் 12: கா=12.

காபன் இயல்பிலே ஏராளமாய் உண்டுபட்டுப் பிராணி தாவர வஸ்துக்களெவற்றிலும் பெரும் பங்காய்ச் சேர்ந்திருக்கும்.

மரக்கரி. WOOD CHARCOAL.

இது விறகை காற்றுப்படாமற் செஞ்சூட்டில் எரித்து எடுக்கப்படும். கண்ணறை நிறைந்த நொருக்கலான கரிபு கட்டிகளாக வரும்: மணம் சுவையற்றது; இலேசானது. எரிந்த விறகின் சாங்கந் தன்மைகளைக் கொண்டிருக்கும். காற்றுப்படக் கடுஞ் சூட்டில் இதை எரித்தால், ஏறக்குறைய நூற்றுக்கு இரண்டு பங்கு சாம்பல் அதில் விழும்.

தன்மை. அந்திசெப்தி⁶, தியோடறி⁷, திசின்வெ⁸து¹⁰.

உபயோகம். மலவரட்சியோடுகூடிய குண்மத்துக்கும், கடியல்சிக்கும்¹¹

1 Still. 2 Distill. 3 Hydrosulphuric acid. 4 Oxalate of Ammonia. 5 Nitrate of Silver. 6 Chloride of Barium. 7 Lime water. 8 Antiseptic. பூதிகனி. 9 Deodorizer, கத்திகனி. 10 Disinfectant, அபசஞ்சரி. 11 Cardialgia.

சிலவகையான தியறீயப்¹, திசந்தெரி²க்கும், முறைச்சுரங்களுக்கும் இது கொடுக்கப்படும். சிலவேளை நயஞ்செய்யும். பாப்பையே இதின் பிரதான பிரயோகம். பற்பொடியாகவும் இது அதிகம் வழங்கப்படும். பல்லுக் கோறையை இது தடுக்குமென்றெண்ணுகிறார்கள்.

தேயம். இருபது முதல் அறுபது கிறேன் வரைக்கும், கூடவுங் கொடுக்கலாம்.

பரிசுதம். கரிப்பாப்பை. Charcoal Poultice. கொள். மரக்கரி மாவாக, அரை அன்சு; கோதுமை அப்பத் துணிச்சை, இரண்டு அன்சு; லீன்மா³, அல்லது அரிசிமா ஒன்றரை அன்சு; கொதிவெந்நீர் பத்து அன்சு. அப்பத்தை வெந்நீரிற் போட்டு நெருப்புக்குக் கிட்ட வைத்துப் பத்துமினி நேரம் ஊறவிட்டு அப்பால் மசித்து லீன்மா அல்லது அரிசிமாவைப் படிப்படியாய்ப் போட்டுக் கிளறிக் கிளறி மெதுவான பாப்பையாக்கிக் கரியிற் பாதியை அதிஞோடு சேர்த்தும் மற்றப்பாதியை அதின்மேற் தூவவும்.

இது அழுகற் புண்களின் நாற்றத்தை மாற்றி அவைகளைச் சுகப்பட அருட்டுவதற்கு நயந்த அணைவாகும்.

சுத்த ஏணக்கரி. PURIFIED ANIMAL CHARCOAL.

ஏணக் கரியை ஐருகுலோறிக்கமிலத்திற் போட்டால் அதிலுள்ள மண்ணுப்புகள் ஏறக்குறைய முழுவதும் எடுபட்டுப் போகக் கரி சுத்தமாகும். லட்சணங்கள். இது மணமற்றதும் ஏறக்குறையச் சுவையற்றதும் கறுப்புமான பொடி. லீம்மசிரஞ்சத்தை⁴ இருபது மடங்கு தண்ணீரோடு கலந்து இதோடு கலக்கி யோர் வடியில் வார்க்க அது நிறமற்றதாய் வடியும். இக் கரியைக் காற்றுப்படத் தக்கதாய்க் கடுஞ் சூட்டில் எரித்தால் சொற்ப சேஷம் மாத்திரம் அதிற் காணும்.

தன்மை, உபயோகம். இது தியோடறி⁵, அந்திசெப்தி⁶, அல்கலைவ⁷ நஞ்சுகளுக்கு இது மாற்றாக வழங்கப்படும். நயமோ சந்தேகம். ஏதும் நயமிருக்கில் அது இதின் மிகானிக⁸செயலைப்பற்றியதேயாம். ஸ்திரிக்னி⁹, மாவியம்¹⁰ அல்லது வேறு அல்கலைவங்களில் ஒரு கிறேனாலுண்டாகும் நச்சுச் செயலைக் கெடுப்பதற்கு அரை அன்சு ஏணக்கரி வரைக்குப் போதுமென்று எண்ணுகிறார்கள். சிகிச்சம் முதலிய வேலை வித்தைகளிலும் வைத்தியர்¹¹ ஸ்திரி¹² நிறத்தை அழிப்பதற்காக இக் கரி வழங்கப்படும்.

தேயம். இருபது கிறேன் முதல் அறுபது கிறேன்.

பாஸ்வரம். PHOSPHORUS.

சின்னம், பா; அணுப்பாரம், 31. பா=31.

இது லோகமல்லாப் பூதியம். எலும்பிலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது. இலட்சணங்கள். இது சற்றே மெழுகு போன்ற கட்டி. உருவொளியானது. நிறமற்றது; பரமாணுப்பட வெண் புகை யெழும்பும்; இதின் விசேஷகிறுவிதம் 183. வாடிக்கையான சூட்டில் இது மெதுவாயும்வசையக் கூடியதாயும் இருக்கும். 110 பாகை சூட்டில் உருகும். உருகு நிலயத்துக்குச் சற்றுக் கூடிய காங்கையில் பரமாணுவிற் பற்றிப் பிரவையான சுவாலையோடு எரிந்து அடர்ந்த வெண் புகையைக் கக்கும். தண்ணீரிற் கரையாது.

¹ Diarrhoea, ² Dysentery. ³ Linseed meal. ⁴ Tincture of Litmus. ⁵ Deodorizer, ⁶ கசகினி. ⁶ Antiseptic, ⁷ பூதிக்கினி, ⁷ Alkaloid. ⁸ Mechanical, ⁹ Strychnia, ¹⁰ Morphia.

ஈதரிலும்¹ கொதிக்கிற தர்ப்பந்தின்² எண்ணெயிலும் காபந்துவிசல்விரத்தி³ லுங் கரையும்.

தன்மை. சிறு தேயத்தில் ஸ்திமுலம்⁴; பருந்தேயத்தில் வீரூன அழற்று நஞ்சு. ஒன்றரைக் கிரேன் ஒரு ஆளைக் கொன்றதுண்டு.

உபயோகம். எபிலெப்சி⁵, மூளை மெதுவாதல், கிலீபம்⁶, கசம், மாறாச் சருமநோய்கள், வார்திபேதி முதலிய நோய்களுக்கு இதைக் கொடுக்கலாமாம். ஆய்னும் பதனத்திலும் நயத்திலும் இது வேறேனேக மருந்துகளுக்குக் குறைந்தது.

தேயம். ஒரு கிரேனில் நாற்பதிலொருபங்கு. இதை ஈதரிலாவது ஒலீ வெண்ணெயிலாவது ஒரு அன்சுக்கு நாலு கிரேன் வீதமாய்க் கரைத்து ஐந்து துளி முதல் பத்துத் துளி வரைக்கு நான் இரண்டு மூன்று முறை கொடுப்பதே உத்தமம்.

பாஸ்வரம், கிருசபாஸ்வரிக்கமில்ம்⁷ என்ற அக்சிராமாகவே முக்கியமாய் வழங்கப்படும்.

கிருச பாஸ்வரிக்கமில்ம். DILUTED PHOSPHORIC ACID.

இது தண்ணீரில் கரைந்த பாஸ்வரிக்கமில்ம். இதற்குச் சின்னம் ஐ3 பாஅ4. இதுபா3 அ3 என்ற சின்னத்தையுடைய அவைரு9 பாஸ்வரிக்கமிலத்தக்கு நிறைப்படி துற்றுக்குப் பத்துக்குச் சரியாயிருக்கும். இலட்சணங்கள். இது புளிப்புச் சுவையும் வீரூன அமிலத் தன்மையுமுள்ள நிறமற்ற நீர். இதின் விசேஷகிராவிதம் 1.08. இதோடு வெள்ளியமோன நீதரசை¹¹ச் சேர்த்தால், அமோனத்திலும், கிருசநீதரிக்கமிலத்தி¹²லுங் கரையக்கூடிய வெண் மஞ்சள் நிற அடையல் விழும். வறட்டினால் சேஷம் விழும். அச் சேஷம் குறைவான செஞ்சூட்டில் உருகி, ஆறும்போது, ஐஅ, பாஅ3 என்ற சின்னத்தையுடைய கிலாசியல்¹³ பாஸ்வரிக்கமிலத்தை விடும். சோதனைகள். ஐருசல்வுரிக்கமில¹⁴மாவது பாரிதகுலோறி¹⁵மாவது நீதரிக்கமிலங் கலந்த வெள்ளிநீதரசாவது, அல்புமின்¹⁶நீராவது இதோடு கலந்தும் அடையல்விழாது. இதைச் சுத்தமான சல்வுரிக்கமில¹⁷த்தோடு சமபங்காய்க் கலந்து அயசல்வசு¹⁸ நீருக்குள்ளே விட்டால் அதைக் கருமையாக்கமாட்டாது. இரசபிரகுலோறி¹⁹நீரில் சமபங்காய்க் கலந்து, சூடாக்கினாலும் அடையல் உண்டாகாது. இதில் நிறைப்படி 355 கிரேனை ஈய வக்சிர²⁰ மாவில் 180 கிரேனில் வார்த்து வறட்டி, உண்டாகுஞ் சேடத்தைச் சற்றே சிவக்கக் காய்ச்சினால் அது 215.5 கிரேன் நிறுக்கும். இச் சேடத்தில் ஈயபாஸ்வசே மிகுதியான பங்கு. ஆகையால் இந்தநீரில் ஆறுதிரும் அவைரு பாஸ்வரிக்கமிலத்தில் 35.5 கிரேனுக்குச் சரியாகும்.

தன்மை. சிறுதேயத்திற் தொணிகம்²¹, குளிர்ச்சியானது, அவுரிச²² தன்மை உள்ளது. சற்றுக் கதித்த தேயத்தில் ஸ்திமுலம்²³, விசேஷமாய் நரம்புமண்டலத்தை அருட்டும். அதிதேயத்தில் நஞ்சாகும்.

உபயோகம். சன்னிச்சரம்²⁴, சன்னிவச்சரங்க²⁵ளின் பிற்பாதங்களுக்கு ம் ஸ்துருமம்²⁶, லீதியசி²⁷ என்னுங் கல்லடைசல்களின் பல வகைகளுக்கும்,

1 Ether. 2 Turpentine. 3 Bisulphide of Carbon. 4 Stimulant. 5 Epilepsy. 6 Impotence. 7 Dilute Phosphoric acid. 8 Oxide. 9 Anhydrous. 10 Specific gravity.

11 Ammonio-Nitrate of Silver 12 Diluted Nitric acid. 13 Glacial. 14 Hydro-sulphuric acid. 15 Chloride of Barium. 16 Albumen. 17 Sulphuric acid.

18 Sulphate of iron. 19 Perchloride of Mercury. 20 Oxide of Lead.

21 Tonic. 22 Aphrodisiac. 23 Stimulant. 24 Typhus. 25 Typhoid.

26 Struma, 27 Lithiasis.

சர்க்கராமுரி¹, என்முமக்கல், நீர்க்கோவைகளுக்கும், கடியல்செய்க்கும் இது நயமென்று கொடுக்கப்படும்.

தேயம். பத்து முதல் முப்பது மீனீர் வரைக்குப் போதிய அளவு தண்ணீர் கலந்து கொடுக்கவேண்டும்.

[சுண்ணம்³, பதாசி⁴, சோடம்⁵, அமோனம்⁶, அயம்⁷ என்பவற்றின் அதபாஸ்வசுக்கள்⁸, பாஸ்வரத்தை உள்ளுக்குக் கொடுப்பதால் உண்டாகும் அழற்சியையும் மற்றும் அவக் குணங்களையும் உண்டாக்காமல் அதின் நயந்தகுணங்களையெல்லாம் உண்டாக்கும் என்ற எண்ணத்தையிட்டு மெத்த விதத்து கொள்ளப்பட்டன. கசம்⁹, அனீமி¹⁰, லுகுசைதீமி¹¹, குன்மர், எபிலெப்சி¹² என்ற நோய்களுக்கும், உடம்பிற் பாஸ்வசுக்கள் குறைவதாலுண்டாகிறதென்றெண்ணப்பட்ட மற்ற நோய்களுக்கும் இவைகள் கொடுக்கப்படும். இவைகளை இரண்டு கிறேன் முதல் ஐந்து கிறேன் பிரமாணத்தில் ஏதங் கைப்புக் கஷாயத்திலாவது சிறுப¹³மாயாவது கொடுக்கலாம்.]

கேந்தகம். SULPHUR.

சின்னம், கெ; அணுப்பாரம், 32. கெ=32.

இது எரி மலைகளுள்ள சில தேசங்களில் விசேஷமாய்ச் சிசிலியில் விளைகின்றது. மேலும் இயல்பிலே ஷோகம் பவவற்றுடன் இணைந்த கல்வகைகளாகிய சல்விரங்களாக ஏராளமாயிருக்கும். தாவர பிராணியபதார்த்தங்கள் அனேகத்திலும் சொற்ப பிரமாணமாயிருக்கும்.

உச்சிக கேந்தகம். SUBLIMED SULPHUR.

இது விளை கெந்தகத்திலிருந்து புடமிட்டு எடுக்கப்படும் சுத்த கேந்தகம். லட்சணங்கள். பச்சை மஞ்சள் நிறமுள்ள சற்றே கரகரப்பான மா. சுவையற்றது. சூடாக்கினாலன்றி மணவாது. திறந்த பாத்திரத்திற் போட்டு எரித்தால் நீலச் சுவாலையொண்டு சல்விரோசமிலத்தை¹⁴க் கக்கி எரியும். சோதனைகள். சூட்டுக்கு முற்றாய் எடுபட்டுப்போம். நனைத்த விறமஸ் தானைச்¹⁵ சிவப்பாக்கமாட்டாது அமோன நீரை¹⁶ இதோடு கலக்கி வடித்து வறட்டினால் சேஷம் விழாது.

தன்மை. சிறு தேயத்தில் அல்திறவம்¹⁷, சுவேதணி¹⁸ பெருந் தேயத்தில் இளம் விரேசனி.

உபயோகம். சிரங்குக்கும் மற்றும் சரும நோய்களுக்கும் இது உத்தம உண்மருந்தும் வெளிமருந்துமாம். மேலும் மற்ற நோய்களுள் வங்கவலிக்கும்¹⁹ பவவகையான ஈப நஞ்சுகளுக்கும், வாயவிதல், இரசநடுக்கம், சோர்வுகளுக்கும், காலிக²⁰வாதம், ஸ்பசவீனை²¹, அஞ்சினபெத்து²², குக்கலின் பிற்பாதம், காலிகபுறங்கீது²³, கொரியம்²⁴, ஸ்துரூமம்²⁵, என்பவற்றுக்கும், இது உள்ளே கொடுத்து நயந்தது. மேலும் இது சாந்தமான செயலுடையதாயிருப்பதால் அரிசு²⁶நோய்கள், கடைக்குடலொடுக்கம், பிதுக்கம், காலிக திசந்தெரிசுகளுக்கு உவந்த பேதியாகும்.

1 Diabetes. 2 Cardialgia. 3 Lime, 4 Potash 5 Soda. 6 Ammonia. 7 Iron.

8 Hypophosphites. 9 Phthisis. 10 Anaemia 11 Leucocythemia. 12 Epilepsy.

13 Syrup. 14 Sulphurous acid. 15 Litmus paper. 16 Solution of Ammonia.

17 Alterative பசினம். 18 Diaphoretic. 19 Lead colic. 20 Chronic.

21 Spasmodic Asthma. 22 Angina pectoris. 23 Bronchitis. 24 Chorea.

25 Struma. 26 Piles. 27 Dysentery.

தேயம். அல்திறவம், சுவேதனியாகப் பத்துக் கிரேன், முதல் மூப்பது கிரேன்வரைக்கும், விரேசனியாக ஒரு திரும் முதல் மூன்று திரும் வரைக்குங் கொடுக்கலாம். மேலும் நீர்த்தோயமாகவும் ஆவித்தோயமாகவும் கெந்தகம் பலமுறையும் அசிசுமாய் வழங்கப்படும்.

ஈசிதங்கள். கேந்தக லேகியம். Confection of Sulphur. கொள். உச்சிககெந்தகம், நாலு அன்சு; பதாசியமிலதாத்தாசு¹. மாவாக ஒரு அன்சு; தோடந்தோற்சிறாபம்², நாலு அன்சு. சேர்த்து நன்றாய் அரைக்கவும்.

தேயம். ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திரும் வரைக்கு நாள் இரண்டொரு முறை கொடுக்கலாம்.

கேந்தக வன்கென். Ointment of Sulphur. கொள். உச்சிக கெந்தகம், ஒரு அன்சு; பெஞ்சோயஸ் லாடி³ அல்லது பூத லாடி⁴ நாலு அன்சு. திறமாய்க் கலக்கவும்.

இது சிரங்குக்கு உத்தமமான பூச்சு மருந்து. அரித்தெடுத்து இரண்டுநாள்க்குச் காலை மாலை பூசித் திறமாய்த் தேய்த்துவிட வேண்டும். இதைப் பூசியிருக்கையில் குளிர்பிடியாமல் உடம்பைத் திறமாய்ப் போர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். மூன்றுநாள் சவுக்காரமாதியால் மருந்தைக் கழற்றி வெந்நீரில் குழிக்கச் சிரங்கு மாறிப்போம். சிலருக்கு மூன்றுநாளும் பூசவேண்டிய தாயிருக்கும்.

அடை கேந்தகம். PRECIPITATED SULPHUR.

இது கல்சியசல்விரத்தை⁵ ஐருகுலோறிச்சுமிலத்தாற்⁶ கூறுபடுத்தி வரும் அடையல். இது கழுவி உலர்த்தி எடுக்கப்படும். இலட்சணங்கள். நரை மஞ்சள் நிறமும் கரகரப்பற்ற மெதுவுமான பொடி. இதற்கு ஐருசல்வரிக் கமிலத்துக்⁷ குரிய கூழ் முட்டை மணமில்லை. திறந்த பாத்திரத்தில் வேக நீலச் சுவாலை விட்டுச் சல்விரோசமிலத்தை⁸க் கெட்ட நாற்றமாய்க் கக்கும். சோதனைகள். சூட்டுக்கு முற்றும் ஆவியாய்விடும். சூக்குமாட்சியில் பார்க்கிறவிடத்து கிரிந்தல்கு⁹ எல்லாத் மங்கலான குறு முண்டைகளால் உண்டுபட்டிருக்கிறதாய்த் தோற்றும். மற்றும்படி உச்சிக்கெந்தகத்தை ஒத்தது. தன்மை, உபயோகம், தேயம். உச்சிக கெந்தகத்தைப் போலவே.

கந்தியியோதரம். IODIDE OF SULPHUR.

இது நாலு பங்கு இயோத¹⁰த்தையும் ஒரு பங்கு கெந்தகத்தையும் ஒரு குடுக்கைக்குள்ளே போட்டு அவை உருகுந்தனையுங் காய்ச்சுவதாலுண்டாகும் ஓர் கூட்டு. இலட்சணங்கள். கிரணித¹¹மான கிரிஸ்தத்தோற்றமுடைய நரைக் கறுப்பான கட்டி. இது மணத்திலும் தோலிற் பூசும்போது அதை நிறப்பிக்குந் தன்மையிலும் இயோதத்தை ஒத்தது. ஏறக்குறைய அறுபதுபங்கு கிலேசரி¹²னிற் கரையும். தண்ணீரிற் கரையாது தண்ணீரோடு காய்ச்சும்போது கூறுபடும். சோதனை. 100 கிரேனைத் தண்ணீரோடு திறமாய்க் காய்ச்ச இயோதம் ஆவியாய்ப் பறந்துவிடும். ஏறக்குறைய 20 கிரேன் கெந்தகம் எஞ்சும். அடைத்த சீசாவில் இதைப் பேணவேண்டும்.

1 Acid Tartrate of Potash. 2 Syrup. 3 Benzated Lard. 4 Prepared Lard. 5 Sulphuret of Calcium. 6 Hydrochloric acid. 7 Hydrosulphuric acid. 8 Sulphurous acid. 9 Crystal. 10 Iodum. 11 Radiated விசுமம். 12 Glycerine.

தன்மை, உபயோகம். இயோதத்தைப் போலவே.

தேயம். அரைக் கிறேன் துவங்கிப் படிப்படியாய்க் கூட்டி ஐந்து கிறேன் வரைக்குங் கூடவுங் கொடுக்கலாம். இதைப் பின் வரும் ரசிதமாய் வெளியிற் பூசுவதன்றி உள்ளே கொடுப்பதரிது.

கந்தியியோத்ரவன்கென். Ointment of Iodide of Sulphur. கொள்: கந்தியியோத்ரம், முப்பது கிறேன்; பூதலாடு¹ ஒரு அன்சு. கந்தியியோத்ரத்தைப் பீங்கான் உரலில் அரைத்து மாவாக்கி, லாட்டைக் கொஞ்சங் கொஞ்சமாய்க் கூட்டி சேர்வை சற்றும் கரகரப்பில்லாமல் நன்றாய்ப் பசையுந்தனையும் அரைக்கவும்.

எக்சீமம்², குஷ்டம்³, சொறீயசி⁴, சைகோசி⁵ முதலிய நாட்பட்ட தோல்வியாதிகளுக்கு இது உத்தம தைலமாகும்.

சல்வுரிக்கமிலம். SULPHURIC ACID.

இது கெந்தகத்தை எரித்து வரும் சல்வுரோசமிலத்தை⁶ நீதுரோசாவி⁷யால் அக்சிரிக்கப்⁸ பிறக்கும் அமிலம். இதிலே ஐ² கெஅ⁴ என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்படுகிற சல்வுரிக்கமிலம் நிறைப்படி நூற்றுக்கு 96.8 வீதமாய் அடங்கியிருக்கும். கெஅ³ என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்படுகிற அவைரு⁹ சல்வுரிக்கமிலத்தில் நூற்றுக்கு 79 பங்குக்குச் சரியாகும். இலட்சணங்கள். இது எண்ணெய்யின் தோற்றமும் கடுங் காரமும் புளிப்புமுள்ள நிறமற்ற நீர். சோதனைகள். விசேஷகிறாவிதம்¹⁰ 1.843. இதோடு தண்ணீர் கூட்ட மெத்தச் சூடு பிறக்கும். இப்படியே தண்ணீர் கலந்தபின் பாரித குலோறிரஞ்¹¹ சேர்க்க, கன அடையல் விழும். நிறைப்படி 50.6 கிறேனை ஒரு அன்சு திஸ்திலித்த¹² தண்ணீரோடு கலந்தால் அதைத்தடஸ்திப்ப¹³தற்குச் சோட பரும விலயனத்தில்¹⁴ 1000 கிறேன் அளவு வேண்டும். ஓர் பிலாடின¹⁵ கிண்ணியில் இதை வறட்டினால் சேஷம் விழுநிற் சொற்பம் விழும். அன்னபேதி¹⁶ நீரை இதின்மேல் பதனமாய் வார்த்தால் இரண்டு நீர்களுக்குச் சந் திக்குமிடத்து தாமிர¹⁷ நிறமுண்டாகாது. இரு மடங்கு திஸ்திலித்த தண்ணீரோடு இதைக் கலந்து ஐருசல்வுரிக்கமிலஞ்¹⁸ சேர்க்கும்போது அடையல் விழாது.

தன்மை, உபயோகம். இது வீரூன எஸ்கராட்¹⁹டி¹⁹. இதாற் தொட்ட உடற்பகுதி முதல் வெண்மையாகி, மறுபடி கபிலக் கறுப்புநிறமடையும். குடித்தால் வீரூன அரிக்கு நஞ்சாகுமாய்கையால் உண்மருந்துக்குச் சற்றும் இது உதவாது. எஸ்கராட்¹⁹டித்தன்மையில் நீதுரிக்கமிலத்துக்கு²⁰ இது குறைந்தது.

ரசிதங்கள். கிருச சல்வுரிக்கமிலம். Diluted Sulphuric acid. கொள். சல்வுரிக்கமிலம் ஏழு அன்சு; திஸ்திலித்த தண்ணீர் போதியது. அமிலத்தை 77 அன்சு தண்ணீரோடு கலந்து, அக்கலவை குளிர்ந்து 60 பாகைக்கு வந்தபின்பு அது 83½ அன்சு அளக்கத் தக்கதாய் இன்னுந் தண்ணீர் சேர்க்கவும். சோதனைகள். விசேஷகிறாவிதம், 1.094. நிறைப்படி இதில் 359 கிறேனை அதாவது 6 திறுமைத் தடஸ்திப்பதற்குச் சோடபரும விலயனத்தில் 1000 கிறேன் அளவு வேண்டும். இது அவைருசல்வுரிக்

1 Prepared Lard. 2 Eczema. 3 Lepa. 4 Psoriasis. 5 Sycosis. 6 Sulphurous acid. 7 Nitrous Vapour. 8 Oxidize. 9 Anhydrous. 10 Specific gravity. 11 Chloride of Barium. 12 Distilled. 13 Neutralize. 14 Volumetric solution of soda. 15 Platinum. 16 Sulphate of Iron. 17 Purple. 18 Hydrosulphuric acid. 19 Escharotic, தடிவி, 20 Nitric acid.

கமிலத்தில் நூற்றுக்கு 10.14 பங்குக்குச் சரியாகும். ஆகையால் இதில் ஆறு திரும், அவைரு அமிலத்தில் 40 கிறேனுக்குச் சரியாகும்.

தன்மை. இது குளிர்ச்சியானது, துவர், தொணிகம்¹.

உபயோகம். வங்கவலிக்கும்², பொதுவாய் ஈய நஞ்சுகளுக்கும், இது நல்ல காவல் மருந்தும் மாற்றுமருந்துமாகும். இரைப்பை, சுவாசப்பை, பிருக்கங்க³ளில் நின்று வரும் விபல இரத்தப்பெருக்குக்கு⁴ இது உவந்தது. விசேஷமாய்க் கலிக்கமிலத்⁵தோடு கலந்து கொடுத்தால் வாய்ப்பு. பலவகையான கழிச்சல்களுக்கும் கசத்திற் காணும் அதி வெயர்வைக்கும் வை குரி, கொப்புளிப்பான், சின்னமுத்து முதலிய எக்சந்திம⁶ங்களுக்கும், விடாச்சுரங்களின் பிற்பாதங்களுக்கும், தோல் வியாதிகள் சிலவற்றிற்கும், சிவ்லிக⁷ நோய்களுக்கும் இது கொடுத்து நயங்கண்டது. ஸ்கால⁸தினத்துக்கும் மற்றும் வகையான தொண்டை நோக்களுக்கும் வழங்குங் கார்கில்⁹களுக்கு இது நல்ல கூட்டாகும்.

தேயம். ஐந்து மினிம் தொடங்கி முப்பது மினிம் வரைக்குக் கன தண்ணீரிற் கலந்து ஒருநாளிற் பலமுறை கொடுக்கலாம். பல் அரிக்கப்ப டாமல், உடனே பச்சைத் தண்ணீரால் வாயை அலம்பவேண்டும்.

சுகந்த சல்வுரிக்கமிலம். Aromatic Sulphuric acid. கொள். சல்வு ரிக்கமிலம், மூன்று அன்சு; திட்டசீது¹⁰ ஒருநாழி; கறுவாய்ப்பட்டை, பருக்கன் பொடியாக, இரண்டு அன்சு; சுக்கு, பருக்கன் தூளாக, ஒன்றேகால் அன்சு. சல்வுரிக்கமிலத்தைப் படிப்படியாய்ச் சீ¹¹தோடு கூட்டி, கறுவா, சுக்குத் தூள்களைப் போட்டு ஏழுநாளுறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கி அப்பால் வடிக்கவும். சோதனைகள். விசேஷகிருவிதம் 0.927. இதில் நிறைப்படி 304.2 கிறேனை அதாவது 6 திருமைத் தடஸ்திப்பதற்குச் சோட பரும விலயனத்தில் 330 கிறேன் அளவு வேண்டும். இது அவைரு சல்வு ரிக்கமிலத்தில் நூற்றுக்கு 10.91 பங்குக்குச் சரி. ஆகையால் இதில் ஆறு திரும், அவைரு அமிலத்தில் 33.2 கிறேனுக்குச் சரியாகும்.

தேயம். ஐந்து மினிம்¹² முதல் முப்பது மினிம் வரைக்குப் போதுமான தண்ணீரிற் கலந்து கொடுக்கவேண்டும். விபல கழிச்ச¹³லுக்கும், கசத்தில் உண்டாகும் வெயர்வைக்கும், பெலவீனப்படுத்தும் மற்ற நோய்களுக்கும் இது நல்ல இணக்கமான சுகந்த தொணிகம்.

சல்வரோசமிலம். SULPHUROUS ACID.

கெஅ² என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்படுகிற சல்வரோசமில வாயு தண் ணீரிற் கரைந்து அதில் நிறைப்படி நூற்றுக்கு 9.2 பங்காயிருக்கும். இலட்சணங்கள். இது காரமான கெந்தக நாற்றமுடைய நிறமற்ற நீர். சோதனைகள். விசேஷகிருவிதம் 0.41. இத்தோடு பாரிதகுலோறிரத்தை¹³க் கூட்டும்போது அடையல் தோன்றாது. தோன்றினால் மிகச் சொற்பமாய்த் தோன்றும். குலோறநீரைப்¹⁴ கூட்டினாலோ கன அடையல் உண்டாகும். இதில் நிறைப்படி 34.7 கிறேனைத் திஸ்திலித்த தண்ணீர்¹⁵ ஒரு அன்சோடும் அமைலமுசிலா¹⁶கிற் கொஞ்சத்தோடுங் கலந்தால் இயோதபருமவிலயன¹⁷த்

1 Tonic, 2 Lead colic 3 Kidney. 4 Passive Hemorrhage. 5 Gallic acid. 6 Exanthemata 7 Syphilis. 8 Scarlatina. 9 Gargle. 10 Rectified spirit. 11 Minim.

12 Passive diarrhoea. 13 Chloride of Barium. 14 Solution of chlorine.

15 Distilled water, 16 Mucilage of Amylum. 17 Volumetric solution of Iodine.

தில் 1000 கிறேன் அளவு கூட்டும்வரைக்கும் அது நிலையான நீலநிறம் கொள்ளாது. உறட்டினால் சேஷமிராது.

தன்மை, உபயோகம். இது தாவரவந்தை¹களை அழிக்குந் தன்மை உடையதாதலால் தாவரவந்தைகளைப் பற்றி உண்டாகிற படர்தேமல் முதலிய தோல் வியாதிகள் பலவுக்கும் வழங்கப்படும். இவ்வயிலத்தை இரண்டுமூன்று மடங்கு தண்ணீரோடு கலந்து துணியிற் தோய்த்து நோய்த்த பகுதிக்கு அணைக்கலாம். அல்லது சமபங்கு கிலேசரி²னோடு கலந்து பூசலாம். இதின் ஆவி மூச்சை அடைக்குமாதலால் அதிக தண்ணீரோடு கலக்கப்பட்டாலன்றி உள்ளே கொடுக்க உதவாது.

தேயம். முப்பது மினிம் முதல் ஒரு திரும் வரைக்கு.

குலோறம். CHLORUM. CHLORINE.

சின்னம், கு; அணுப்பாரம் 35.5.

இது அநிந்திர பொருள்களில் ஏராளமாயுள்ளது. லோகங்களோடு கூடி குலோறிரங்கள்³ என்ற உப்புகளாகும். உதாரணமாக இது சோடம் என்ற லோகத்தோடு கூடுவதாற் சோடதகுலோறிரம்⁴ என்ற கறியுப்பு உண்டாகும். மேலும் இது பிராணிகள் தாவரங்களிற் குலோறிரங்களாகவும் இருக்கும். வாடிக்கையான காங்கையிலும் அழுக்கத்திலும் இது மஞ்சட் பச்சை நிற வாயுவாக இருக்கும். மூச்சை அடைக்கக்கூடிய கார்ப்பான மணமும் துவர்ச் சுவையுமுள்ளது.

தன்மை, உபயோகம். இது தியோடறிசர்⁵, நிகின்வெத்து⁶, அந்திசெப்தியாகப் பிரயோசனமான தன்மைகள் உடையது. ஐருசல்வரிக்கமில்ம் ஐருசையனிக்கமில் நஞ்சுகளை உட்கொண்டார்க்கு இது நயந்த மாற்றாகும். கசம், காலிகபுறங்கீது⁸, ஈரல் வியாதிகளுக்கு, வீறு குறைந்த குலோறவாயுவை ஏற்ற இயந்திரம் வழியாய்ச் சுவாசித்தல் வழக்கம். (கல்சிகுலோறகம் பார்.)

ரசிதம். குலோறநீர். Solution of Chlorine. இது தண்ணீரிற் கரைந்த குலோற வாயு. லட்சணங்கள். வீரூன குலோற மணமுடைய மஞ்சட் பச்சைநிற நீர். தண்ணீர் அதிகமாய்க் கலந்த இந்திகுசல்வக⁹ நீருடன் இதைக் கலக்க அதின் நிறத்தைச் சட்டென அழிக்கும். சோதனைகள். விசேஷகிராவிதம்¹⁰ 1.003. உறட்டினால் சேஷம்விடாது. பதாசியவியோதிரத்தில்¹¹ இருபது கிறேனை ஒரு அன்சு திஸ்திலித்த¹² தண்ணீரிற் கரைத்து 439 கிறேன் அல்லது ஒரு அன்சு குலோறிர நீரோடு சேர்க்க, அக் கலவை நீர் கடுஞ் சிவப்புநிறமடையும். இந்நிறத்தைக் கெடுப்பதற்குச் சோடவதசல்வக¹³ப் பரும நீரில் 750 கிறேன் அளவு வேண்டும். இது 2.66 கிறேன் குலோறத்துக்குச் சரி.

தன்மை. காரமானது, அழற்று நஞ்சுத் தன்மை கொண்டது. கன தண்ணீரோடு கலந்தால் ஸ்திமுலம்¹⁴, அல்திறவ¹⁵மாம். பெரும்பாலும் வெளி மருந்தாகவே வழங்கப்படும்.

உபயோகம். ஸ்காலதினத்¹⁶துக்கும், சன்னிச்சுரத்துக்கும், காலிகமான

1 Vegetable parasite. 2 Glycerine. 3 Chlorides. 4 Chloride of Sodium.

5 Deodorizer, கத்தகினி. 6 Disinfectant, அபசஞ்சரி. 7 Antiseptic, பூதிக்கினம்.

8 Chronic Bronchitis. 9 Sulphate of Indigo. 10 Specific Gravity.

11 Iodide of Potassium. 12 Distilled. 13 Hyposulphite of soda.

14 Stimulant, தீவனி. 15 Alterative, பரிணமி. 16 Scarlatina,

ஈரல்நோய்களுக்கும் இது கொடுக்கப்பட்டது. நயந்ததோவென்பது சந்தேகம். எட்டு மடங்குக்கு அதிகமான தண்ணீரோடு கலந்து தொண்டைத் தாபிதம், அக்கரம், வாய்த்தாபிதம், வாய்ப்புண், உமிழ்நீர்ப் பெருக்குக்கு வாயலம்ப உதவும். மேலும் தொல்லையான சிலவகைச் சரும நோய்களுக்கும் அழுகற் புண்களுக்கும் இடப்படும். அழுகற்புண்களுக்கு இட்டால் அவற்றின் நாற்றத்தை மாற்றி அருட்டிச் சுகப்படுத்தும்.

தேயம். பத்து முதல் முப்பது மினிம் வரைக்கும் அதிக தண்ணீர் கலந்து கொடுக்கலாம்.

ஐருகுலோறிக்கமிலம். HYDROCHLORIC ACID.

இது ஐரு என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்படுவது. தண்ணீரிலே நிறைப் படி நூற்றுக்கு 31.8 பங்கு வீதயாய்க் கரைந்திருக்கும். லட்சணங்கள். இது ஏறக்குறைய நிறமற்ற, வீரூன அமிலநீர். காரமான மணத்தையுடைய வெண்மையான ஆவியைக் கக்கும். சோதனைகள். விசேஷகிராவிதம் 1.16. வறட்டினாற் சேஷம் விடாது. வெள்ளிநீதுர¹சோடு கூட்டினால் மிஞ்சிய அமோன²த்திற் கரையக்கூடியதும் நீதுரிக்கமில³த்திற் கரையமாட்டாததுமான தயிர் போன்ற அடையலுண்டாகும். நிறைப்படி 114.8 கிறேனை அரைஅன்சு திஸ்திலித்த தண்ணீரோடுகலந்தால், அதைத் தடஸ்திப்பதற்குச் சோடபரும விலயன⁵த்தில் 1000 கிறேன் அளவு வேண்டும். நாலு மடங்கு திஸ்திலித்த தண்ணீரோடு கலந்து பாரித குலோறி⁶ நீரையாவது, ஐருசல்வுரிக்கமில⁷ வாயுவையாவது சேர்க்கும்போது அடையல்விழாது. மினுக்கமான செம்புத் தகட்டை இதற்குள்ளிட்டு அவித்தால் அது மங்கி நிறம் மாறமாட்டாது. இந்த அமிலத்தில் ஒரு திருமை அரை அன்சு திஸ்திலித்த தண்ணீரோடு கலந்து ஓர் சிறுக் குடுக்கைக்குள்ளே விட்டு அத்தோடு சிலதுண்டு துத்தமும் போட்டு, நுரைத்துக்கொண்டிருக்கும்போது ஈயவதவசெதசு⁸ நீரில் நனைத்த ஒரு துண்டு ஊறுதானை அக் குடுக்கையின் மேற்பகுதியில் நீருக்கு மேலே ஐந்து மினி வரைக்குப் பிடித்திருந்தால் அக் கடுதாசியின் நிறம் மாறாது.

தன்மை, உபயோகம். இது வீரூன எஸ்கராட்டி⁹; அழற்று நஞ்சு. அழு குப்புண்களுக்கும், அழுகல் வாய்த்தபத்தக்கும், வாய்ப்புண்ணுக்கும், காய்களுக்கும், சிலவேளை எஸ்கராட்டியாக இடப்படும். உள்மருந்தாகத் தண்ணீர் கலந்த கிருச அமிலம் மாத்திரங் கொடுப்பும்.

ரசிதம். கிருசவைருகுலோறிக்கமிலம். Diluted Hydrochloric acid. கொள். ஐருகுலோறிக்கமிலம், எட்டு அன்சு; திஸ்திலித்த தண்ணீர், போதியது. அமிலத்தோடு பதினாறு அன்சு தண்ணீர் கலந்து அப்பால் 60 பாகை காங்கையில் அது இருபத்தாறரை அன்சு அளக்கத்தக்க போதிய தண்ணீர் சேர்க்கவும். சோதனைகள். விசேஷகிராவிதம் 1.052, இதில் 345 கிறேனை அடாவது ஆறு திருமைத் தடஸ்திப்பதற்குச் சோடபருமவிலயனத்தில் 1000 கிறேன் அளவு வேண்டும். இது தண்ணீர் கலவாத அமிலத்திலே நூற்றுக்கு 10.58 பங்குக்குச் சரியாகும். ஆறு திரும் கிருசவமிலத்திலே

1 Nitrate of silver 2 Ammonia. 3 Nitric acid. 4 Neutralize. 5 Volumetric solution of soda 6 Chloride of Barium 7 Hydro-sulphuric acid. 8 Subacetate of Lead.

9 Escharotic, தகனி.

ஐ1 கு என்ற சின்னத்தையுடைய ஐருகுலோறிக்கமிலத்தில் ஒரு மொல்குல் அதாவது 36 5 கிறேன் அடங்கியிருக்கும்.

தன்மை. இது அல்கலீ²யைக் கெடுக்கும். ஸ்திமுலம்³, தொணிகம்⁴.

உபயோகம். சன்னிச்சுரம்⁵, சன்னிவச்சுரங்க⁶ளுக்கும், பிள்ளைகளுக்கு ண்டாகும் விடாச்சுரத்துக்கும், ஸ்காலதீனத்துக்கு⁷ம், சில வகையான குன்மத்துக்கும், கல்லடைசல்களுக்கும். விசேஷமாய் அக்சலிக்கமிலக்கல்⁸, பாஸ்வரக்⁹ற்களுக்கும், சிவ்லிசு¹⁰ நோய்க்கும் குக்கலின் காலிகபருவங்களுக்கும் இது உபயோகமானது. கசத்தில் மற்று மருந்துகளுக்கு இது மெத்தஉதவியானது. பலவகையான சைனன்கி¹¹யிலும், சொற்ப அருட்சி தேவையான தொண்டைநோய் மிடற்று நோய்களிலும் கார்கில்¹² மருந்துகளுக்கு இது நல்ல துணையாகும். இதாற் பல்லுக் கெட்டுப் போகாமற் பேணுவதற்கு இதைக் குடிக்கும் ஒவ்வொருமுறையும் தண்ணீராலாவது காரமில்லாத அல்கலீ¹³ராலாவது வாயைச் செவ்வையாய் அலம்பவேண்டும்.

தேயம். பத்து முதல் முப்பது மினிம் வரைக்குத் தண்ணீரிற் தாராளமாய்க் கலந்து கொடுக்கவேண்டும்.

இயோதம். IODUM. IODINE.

சின்னம் இ; அணுப்பாரம், 127.

இயோதம் ஓர் நிர் லோகமான பூதியம். இது பெரும்பாலும் கடற்பாசிச் சாம்பலிலிருந்து எடுக்கப்படுவது. தகடான கிரிஸ்தல்களாக இருக்கும். ஓர்வகை மணமும், கருமை நிறமும், லோகத்துக்குரிய மினுக்கமும் இதற்குண்டு. சூடேற்றும்போது சிறந்த செந்நீல நிறமான ஆவியைக் கக்கும். தண்ணீரில் மெத்தச் சொற்பமாய்க்கரையும்; அலக்கால்¹³, ஈதர்க¹⁴ளிலும், பதாசியவியோதிர¹⁵ நீரிலுமோ தாராளமாய்க் கரையும். இது கரைந்திருக்குந் தண்ணீரில் அமைலத்தை¹⁶யிடக் கரு நீலநிறம் பிறக்கும். சோதனைகள். சூடெற்ற இது சேஷம்விடாமல் ஆவியாகும். முதலெழும்பும் பங்கிலே காரமான மணமுடைய நிறமற்ற மெல்லிய கிரிஸ்தல்கள் ஒன்றுமிராது. 12.7 கிறேன் இயோதத்தை 15 கிறேன் பதாசியவியோதிரங் கரைத்த ஒரு அன்சு தண்ணீரிற் கரைத்தால் அதின் நிறத்தை முற்றாய் அழிப்பதற்குச் சோடவதசல்விசின்¹⁷ பருமவிலயனத்தில் 1000 கிறேன் அளவு வேண்டும்.

தன்மை. சிறு தேயத்தில் அல்திறவ¹⁸மும் தொணிகமுமாகும். பெருந்தேயத்தில் அழற்றி நஞ்சாகும். நெடுக்க கொடுத்தால் இயோதனம் என்ற அழற்சிக் குணங்கள் தொடர்பாயுண்டாகும். வெளிமருந்தாக இட்டால் ஸ்திமுலமும் எதிரழற்சி¹⁹யுமாகும். அமைலத்தோடு கூடும்போது கருநீல நிறமாகுமாகையால் இதை அமைலத்துக்குச் சோதனையாகக் கெமிஸ்தர் வழுங்குவார்கள்.

உபயோகம். ஸ்துரும²⁰ நோய்க்கும் அதைப்பற்றி உண்டாகிற பிறநோய்களுக்கும் சோஷணக்கிரந்திக²¹ளின் வீக்கம் விப்புருதிகள்²² புண்களுக்கும் ஸ்துருமத் தன்மை கொண்டவர்களுக்கு ண்டாகிற கண்ணோம், என்புமங்கல், பொருத்து வீக்கங்களுக்கும் இது உத்தமமான உண்மருந்தும் வெளி

1 Molecule. 2 Alkali. 3 Stimulant, தீவனி. 4 Tonic, ஓஷி. 5 Typhus. 6 Typhoid. 7 Scarlatina. 8 Oxalic acid. 9 Phosphate. 10 Syphilis. 11 Cynanche. 12 Gargle. 13 Alcohol, 14 Ether. 15 Iodide of Potassium. 16 Amylum. 17 Hyposulphite of soda. 18 Alterative, பரிமாமி. 19 Counter-irritant. 20 Struma. 21 Lymphatic Gland. 22 Abscess.

மருந்துமாம். இதின் ஆவியை உறிஞ்சல் கசத்துக்கு உபயோகமாம். மற்று
நோய்களுள் புறங்குசில்¹, கபாலநீர்க்கோவை, பொருத்துநீர்க்கோவை, மற்
றுநீர்க்கோவைகளுக்கும், சினைப்பைவியாதிகள், திஸ்மெனுரீபம்², புரஸ்த
கோளவீக்கம்³, குரண்டங்க⁴ளுக்கும் ஈரல்வியாதிகள்⁵பிளிகைவியாதிகளுக்
கும் வாதம், வாதகுவாதம்⁷ எரிசிப்பிலக⁸, உபசிவ்லிக⁹ அதைப்பற்றிய புண்க
ள், சருமநோய்களுக்கும் இது கொடுத்து நயங்கண்டது.

தேயம். அரைக்காற் கிறேன் முதற் காற்கிறேன் வரைக்குத் துவங்கி
ப் படிப்படியாய் ஒரு கிறேன் வரைக்கு இன்னுங் கூடவுங் கூட்டித் தண்
ணீர்த் கரைத்துக் கொடுக்கலாம். இதைத்தனியே கொடுப்பதரிது. பதா
சியவியோதிரத்¹⁰தோடு கலந்துகொடுப்பதே திறமென்று காணப்பட்டது.

ரசிதங்கள். இயோத ரஞ்சம். Tincture of Iodine. கொள். இயோ
தம், அரைஅன்சு; பதாசியவியோதிரம் கால் அன்சு; திட்டசீது¹¹ அரைநா
ழி. இயோதத்தையும் பதாசியவியோதிரத்தையும் சீதிற் கரைக்கவும்.

தேயம். ஐந்து மினிம் முதல் இருபது மினிம் வரைக்கு நாள் இரண்டு
மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம். இதில் நாற்பது மினிமிலே ஒரு கிறேன் இ
யோதமும் அரைக்கிறேன் பதாசியவியோதிரமும் அடங்கியிருக்கும்.

உபயோகம். பருத்த கோளங்கள் நோய்த்த பொருத்துகளுக்கும், கா
லிக சருமநோய்கள் சுவாச நோய்களுக்கும் வெளிமருந்தாக இதை இறகாற்
பூசுவது உத்தமம். மேலும் இதை மும்மடங்கு தண்ணீரோடு கலந்து குர
ண்டத்துக்குப் புசட்டுவார்கள்.

இயோத நீர். Solution of Iodine. கொள். இயோதம் இருபது கி
றேன்; பதாசியவியோதிரம், முப்பது கிறேன்; திஸ்திலித்த தண்ணீர் ஒரு
அன்சு. கரைக்கவும்.

இயோத லினிமென். Liniment of Iodine. கொள். இயோதம் ஒன்
றேகால் அன்சு; பதாசியவியோதிரம் அரை அன்சு; பூரம் கால் அன்சு. தி
ட்டசீது பத்து அன்சு. முதல் மூன்று கட்டிச் சரக்குகளையும் திட்டசீதிற்
கரைக்கவும்.

இது புறங்குசில், கழலைகள், முதலிய வீக்கங்களுக்குப் பூசப்படும். கொ
ப்புளிச்சப்பண்ணுவதும் வீருன எதிரழற்சியாவதுமே இதின் செயல்.

இயோத வன்கென். Ointment of Iodine. [இது 1864 ஆண்டிற் பிர
சுரமான பிறித்தனிச் சிகிச்ச வாகடத்திற் சொல்லப்படுவது.] கொள். இ
யோதம், பதாசியவியோதிரம், வகைக்கு முப்பத்திரண்டு கிறேன், புருவுசீ
து, ஒரு திரும்; பூதலாடு¹² இரண்டு அன்சு. இயோதம், பதாசியவியோதிரம்
இரண்டையும் பீங்கான் உரவிலாவது, கல்லுரவிலாவது போட்டு சீதையும்
விட்டு நன்றாய் அரைத்து லாட்டைப் படிப்படியாய்ச் சேர்த்துச் செவ்வை
யாய்க் கலக்கவும்.

முந்தின மருந்துகள் இரண்டும் வழங்கப்படும் நோய்களுக்கே இதுவும்
பூச்சுமருந்தாக உதவும்.

இயோத வினலாசம். Inhalation of Iodine. கொள். இயோதரஞ்
சம் ஒரு திரும்; தண்ணீர் ஒரு அன்சு. இவைகளைக் கலந்து ஏற்ற பாத்திர
த்தில் விட்டுச் சொற்ப குடேற்றினபின் கிளம்பும்ஆவியைச் சுவாசிக்கவும்.

1 Bronchocele. 2 Dysmenorrhoea. 3 Prostate Gland. 4 Hydrocele. 5 Liver
6 Spleen. 7 Rheumatic gout. 8 Erysipelas. 9 Secondary syphilis. 10 Iodide of
Potassium. 11 Rectified spirit. 12 Prepared Lard, கடியம்.

புரோமம். BROMUM. BROMINE.

சின்னம், பு; அணுப்பாரம், 80.

இது கடற்றண்ணீரிலும் சவருற்றுகளிலுமிருந்து எடுக்கப்படும் லோகமல்லா நீர்ப் பூதியம். இது கருமையான கபிலச் சிவப்புநிறமானது, சுறுக்கில் ஆவியாய்ப் போகும்; வீரூன நாற்றங்கொண்டது. இதின் விசேஷகிராவிதம்¹ 2.966. பரமானுவின் வாடிக்கையான காங்கையில் இது சிவப்பாய்ப் புகையும். 145½ பாகையிற் கொதிக்கும். சோதனை. இந்த நீர் சற்றே அல்கலீயாய் நிற்கத்தக்க அளவான சோடீரை³ இத்தோடு சேர்த்துக் குலுக்கினால் இது நிறமற்ற நீராகும். அதோடு இன்னுஞ் சொற்ப அளவான புரோமம் சேர்த்து நிறக்கச்செய்து பிற்பாடு சூடற்ற அமைல⁴நீர் கூட்டினால் அது செம்மஞ்சள் நிறமான கலவையாகும்.

தன்மை. சுத்தமாயிருக்கையிற் காரமும்⁵ அழற்றியுமாகும். தண்ணீரோடு முறையாய்க் கலந்து சிறுதேயமாய்க் கொடுத்தாற் தொணிக⁷மும் தியுநீர் சமும்⁸அல்திறவ⁹மும் ஆகும். இதின் செயல் விசேஷமாய்ச் சோஷணிக¹⁰ள்ளேயே செல்லும். செயலில் இது இயோதத்தைப் போன்றது. மேலும் இது தியோடரிசரும்¹¹ திசின்வெக்து¹²மானது.

உபயோகம். ஸ்துரமத்துக்கும்¹³ அதை யடுத்த நோய்களுக்கும் இது உள்மருந்தாகக் கொடுக்கப்படும். அழுகற்புண்கள், எரிசிப்பிலக¹⁴ தொல்லை யான சரும நோய்களுக்கு வெளிமருந்தாயிடப்படும்.

தேயம். ஒரு பங்கு புரோமத்தை 40 பங்கு தண்ணீரோடு கலந்து அதிலே ஆறு மினிம் முதல் எட்டு மினிம் வரைக்கு உள்ளே கொடுக்கலாம். வெளிமருந்தாக இடுவதற்கு இதில் ஐந்து முதற் பதினைந்து கிறேனை ஒரு அன்சு லாட்டிற் சேர்த்துப் பூசலாம். அமோனதபுரோமிரம்¹⁵ பதாசியபுரோமிரம்¹⁶ என்ற மருந்துகளில் புரோமமே அதி சத்தான கூறாய்ச்சேர்ந்திருக்கும். அதைச் செலுத்துவதற்கு இவைகள் உத்தமம்.

நீதுருசம். NITROGEN.

சின்னம், நீ; அணுப்பாரம், 14.

நீதுருசம் என்பது நிறம், மணம், ருசியற்ற ஓர் வாயு. இது பரமானுவிலே நூற்றுக்கு 77 பங்கு வீதமாய்ச் சேர்ந்திருக்கின்றது. பிராணியபதார்த்தங்களெல்லாவற்றிலும் தாவர பதார்த்தங்கள் பலவற்றிலும் ஓர் கூறுகின்றது. இதை அதிகமாய் அடக்கியிருப்பவைகள் அதி போஷணையுள்ள உணவாம். இது வேறு பூதியங்களோடு சேர்ந்து நீதுரிக்கமிலம்¹⁷, அமோனம்¹⁸, முதலியவை போன்ற முக்கியமான அனேக கலவைகளாகின்றது.

நீதுரிக்கமிலம். NITRIC ACID.

இது வெடியுப்போடாவது இந்துப்போடாவது சல்வுரீக்கமிலமும்¹⁹ தண்ணீருங் கலந்து திஸ்கிலிக்கப்²⁰ பிறக்கும் அமிலம். இதிலே ஐநீ^{அ3} என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்படுவதாகிய நீதுரிக்கமிலம் அளவின்படி நூற்றுக்கு

1 Specific Gravity. 2 Alkali. 3 Soda. 4 Amylum, 5 Caustic. 6 Irritant. 7 Tonic
8 Diuretic. 9 Alterative. 10 Lymphatic. 11 Deodorizer, சுத்தகிளி. 12 Disinfectant, உபசஞ்சாரி. 13 Struma. 14 Erysipelas. 15 Bromide of Ammonium.
16 Bromide of Potassium, 17 Nitric acid. 18 Ammonia. 19 Sulphuric acid.
20 Distill.

70 பங்கு வீசுமாய் அடங்கியிருக்கும். அது நீ² அ⁵ என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்படுவதாகிய அவைரு¹நீதுரிக்கமில்லத்தில் நூற்றுக்கு 60 பங்குக்குச் சரியாகும். லட்சணங்கள். இது நிறமற்ற நீர்; விசேஷகிராவிதம்² 1.42. பரமானுவிலே திறந்துவைத்தால் காரமான அரிக்குமாவியாகப் புகையும். சோதனைகள். இதைச் செப்புப் பொடியின்மேல் வார்த்தால் உடனே அடர்த்தியான சிவந்த ஆவி உண்டாகும். இந்த அமிலத்தைச் சம அளவு தண்ணீரோடு கலந்தபின் செம்பிற் சேர்ந்தாலோ நிறமற்ற வாயு உண்டாகும். இந்த வாயு பரமானுவோடு கலக்கும்போது வெண்சிவப்பு நிறமடையும். இதை அன்னபேதி நீரோடு கலந்தால் அது கருங் கபிலநிறமாகும். நீதுரிக்கமில்லம் 250) பாகை சூட்டிற் கொதிக்கும். இதைத் திஸ்திலித்தால் முடியுந்தனையும் பிறக்கும் ஆவி ஒரே தன்மையாகவேயிருக்கும். முற்றாய் வறட்டிநாற் சேஷமிரது. இதை அளவின்படி ஆறுமடங்கு திஸ்திலித்த நீரோடு சலந்து பாரிதகுலோறி³மாவது வெள்ளி நீதுர⁴சாவது சேர்க்க அடையல் உண்டாகாது. இதில் நிறைப்படி தொண்ணூறு கிறேனை அரை அன்சு திஸ்திலித்த நீரோடு கலந்தால் அதைத் தடஸ்திப்ப⁵தற்குச் சோடபருமவிலயனத்தில் 1000 கிறேன் அளவு வேண்டும்.

தன்மை. வீரூன எஸ்கராட்டி, காரம். இதைத் தோலிற்பூசினால் அது நிலையான மஞ்சள்நிறமடையும். அதில் அல்கலைநீர் இட்டால் அந்நிறங் கதிக்கும். முழுப் பெலனான நீதுரிக்கமில்லத்தைக் குடித்தால் அது கொடிய அழற்றுநஞ்சாய்ச் சேஷ்டிக்கும்.

உபயோகம். முக்காதனியாகிய வாயில் அழுகற்புண்கள், மூலமுளைகள், சிவ்விசு⁷ப் புண்கள், காய்ச்ள் முதலிபவற்றைச் சாரமான நீதுரிக்கமில்லத்தாற் கருக்கினால் அது அவற்றை அழித்துச் சுகப்படுத்தும். மற்றுமின்றி மிலங்க⁸ளெவற்றிலும் இதுவே இவற்றிற்கு உவந்தது.

ரசிதங்கள். கிருசநீதுரிக்கமில்லம். Diluted Nitric acid. கொள். நீதுரிக்கமில்லம், ஆறு அன்சு; திஸ்திலித்த⁹ தண்ணீர், போதியது; அமிலத்தை இருபத்துநாலு அன்சு தண்ணீரோடு கலந்து, அது 60 பாகை காங்கையில் முப்பத்தொரு அன்சு அளக்கத்தக்கதாய்ப் பின்னுந் தண்ணீர் கூட்டவும். லட்சணங்கள், சோதனைகள். நிறமற்றது; விசேஷகிராவிதம், 1.101. இதில் நிறைப்படி 361.3 கிறேனை, அதாவது ஆறுதிராமைத் தடஸ்திப்பதற்குச் சோடபருமவிலயனத்தில் 1000 கிறேனளவு வேண்டும். இதிலே அவைரு நீதுரிக்கமில்லம்¹⁰ நூற்றுக்கு 14.95 பங்கு உண்டென்று விளங்குகிறது. ஆகையால் ஆறுதிராமும் அவைரு அமிலத்தில் ஐம்பத்துநாலு கிறேனுக் ச்ச சரி.

தன்மை. அபால்கலை¹¹, தொணிகம்¹², அல்திறவம்¹³, குளிர்ச்சிபானது. வெளியிலிட்டால் ஸ்திமுலம்¹⁴.

உபயோகம். சிவ்விசுக்கும் அதைப்பற்றிய நோய்களுக்கும் இரசபாண்டி¹⁵, ஈரல், பிளிகைகளின் காலிகநோய்கள், கல்லடைசல்களுக்கும், விசேஷமாய்ப் பாஸ்வசு¹⁶ கல்லடைசுஞ் சார்புள்ளவர்களுக்கும் சலப்பைத்தாபிதம், சிஸ்தறீயங்க¹⁷ளுக்கும் இது உயந்த மருந்து. மற்று நோய்களுள் நீர்க்கோவை விசேஷமாய் ஈரல்வியாதியைப் பற்றியாவது இரசத்தை நெடுகத்

1 Anhydrous. 2 Specific gravity. 3 Chloride of Barium. 4 Nitrate of silver. 5 Neutralize. 6 Volumetric solution of soda. 7 Syphilis. 8 Mineral acid, 9 Distilled water. 10 Nitric acid. 11 Ant-alkaline. 12 Tonic. 13 Alterative. 14 Stimulant. 15 Mercurial cachexia. 16 Phosphate. 17 Cystirrhoea.

தின்றதினாலாவது உண்டான நீர்க்கோவைக்கும், சர்க்கராழுரி¹, குக்கலின் பிற்பாதம், வாந்திபேதி, அதைப் போன்ற கழிச்சல், கடியல்², காலிகவா தங்களுக்கும் இது சித்தியாகக் கொடுக்கப்படும். நாட்பட்ட புண்கள், என் புமக்கல், தொல்லையான சருமனோய்களுக்கு இதைக் கன தண்ணீரோடு க லந்து லோஷனாக³ இடுவது நலம்.

தேயம். பத்துத் தொடங்கி முப்பது மினிம்⁴ வரைக்குக் கன தண்ணீ ரிற் கலந்து நாள் இரண்டு மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம், இதைக் குடிக்கு ம் ஒவ்வொருமுறையும் பல்லிற் கேளாதபடி வீறுகுறைந்த ஏதும் அல்கலை⁵ நீரால் வாயை அலம்பவேண்டும். லோஷனாக வெளியிலிடுவதற்கு இரண் டு முதல் நாலு திரும் அமிலத்தை அரைநாழி தண்ணீரிற் கலந்துகொள்ள வேண்டும்.

கிருசநீதுருவைருதுலோறிக்கமிலம். Diluted Nitro-hydrochloric acid. கொள். நீதுரிக்கமிலம், மூன்று அன்சு; ஐருகுலோறிக்கமிலம்⁶, நாலு அன் சு; திந்திலித்த தண்ணீர்⁷ இருபத்தைந்து அன்சு. அமிலங்களைக் கலந்து சீசாவில் வார்த்து அதின் வாயைக் கொஞ்சம் மூடியபடி ஒருநாள் நிற்கவி ட்டிப் பிற்பாடு தண்ணீரைப் படிப்படியாய்க் கூட்டிக் கூட்டும் ஒவ்வொ ருமுறையும் சீசாவை நன்றாய்க் குலுக்கவும். அடைந்த சீசாவிலே இக் கலவையைப் பேணவும். லட்சணங்கள், சோதனைகள். நிறமற்றது; விசேஷகிருவிதம்⁸ 1.074. இதிலே 352.4 கிரேனை அதாவது ஆறு திரை மைத் தடஸ்திப்பதற்குச்⁹ சோடபருமவிலயன¹⁰த்தில் 920 கிரேன் அளவு வேண்டும்.

தன்மை. கிருச நீதுரிக்கமிலத்தைப்¹¹ போலவே.

உபயோகம். நாட்பட்ட ஈரல் வியாதிகளுக்கும், அவைகளைப் பற்றிய திசந்தெரி¹²க்கும், செங்கண்மாரி¹³க்கும் ஈரல் வியாதியையாவது பிளிகை¹⁴வி யாதியையாவது பற்றி உண்டான நீர்க்கோவைக்கும், இதை உள்ளே கொ டுக்கவும். தோயம்¹⁵, லோஷன், எபிதெம்¹⁶ என்ற ஏதும் வகையாய் வெளி யிலிடவும் உத்யம மருந்து. மேலும் அச்சலிக்கமிலபகவம்¹⁷ சிஸ்திக்கக்சிரி¹⁸ பவகமுள்ளவர்களுக் குண்டாம் கல்லடைசலுக்கும் காலிகபுறங்கீது¹⁹ சுவா சப்பை அழுகல், ஸ்காலதீனம்²⁰, சன்னிச்சுரம்²¹, சன்னிவச்சுரம்²², உபசிவ்வி சு²³ நோய்களுக்கும் இது உவந்தது.

தேயம். ஐந்து மினிம் முதல் இருபது மினிம் வரைக்குத் தண்ணீரிற் தாராளமாய்க் கலந்து நாள் இரண்டு மூன்று முறை கொடுக்கலாம். தோய ங்களுக்கும், வெளிப் பூச்சுக்கும், ஆறு அன்சு முதல் எட்டு அன்சு வரையி ல் நாலுநாழி தண்ணீரிற் கலப்பதே வாடிக்கையான பிரமாணம்.

அமோனம். AMMONIA.

சின்னம், நீறு; அணுப்பாரம் 17.

இது தனித்தாவது கலந்தாவது இந்திர அரிந்திர பதார்த்தங்கள் அடங்க லும் மெத்தச் செறிந்திருக்கும். பரமானுவிற் சொற்பமாயிருக்கின்றது.

1 Diabetes, 2 Cardialgia, 3 Lotion, 4 Minim, 5 Alkali, 6 Hydrochloric acid, 7 Distilled water, 8 Specific gravity, 9 Neutralize 10 Volumetric solution of soda, 11 Diluted Nitric acid, 12 Dysentery, 13 Jaundice 14 Spleen, 15 Bath, 16 Epithem, 17 Oxalic acid diathesis, 18 Cystic oxide, 19 Chronic Bronchitis, 20 Scarlatina, 21 Typhus, 22 Typhoid, 23 Secondary syphilis.

மனுஷ சிறுநீரின் கூறுகளுள் இதுவுமொன்று. அதிலே பாஸ்வரிக்கமிலம்¹ ஐருகுலோறிக்கமிலம்², லிதிக்³கமிலங்களோடு இது கலந்திருக்கும். அழுகும் பிராணிபபதார்த்தங்களிலிருந்தும் இது பிறக்கும். இது வீரூன மணமும், காரமான அல்கலைச்⁴ சுவையுமுள்ள நிறமற்ற உருவொளியான வாயு. மஞ்சட்டாணை⁵ இது சிவப்பாக்கும். அதைப் பரமானுவில் வைக்க அது மறுபடி முந்தின நிறத்தை அடையும். இது ஐருகுலோறிக்கமில் ஆவியோடு அணையும்போது வெண் புகைகையைக் கக்கும். இதின் விசேஷகிருவிதம்⁶ 0.59.

அமோனகர நீர்- STRONG SOLUTION OF AMMONIA.

நீஐ³ என்ற அமோன வாயு தண்ணீரில் கரைத்து அதிலே நூற்றுக்கு 32.5 பங்காயிருக்கும், லட்சணங்கள். இது நிறமற்ற நீர். தனக்கேயுரிய மெத்தக் காரமான மணமும் வீரூன அல்கலைத் தன்மையுமுடையது. சோதனைகள். விசேஷகிருவிதம், 0.891. இதில் நிறைப்படி 52.3 கிறேனைத் தடஸ்திப்பதற்கு⁷ அக்சலிக்கமில் பருமவிலயனத்தில்⁸ 1000 கிறேனளவு வேண்டும். இதில் ஒரு திராமிலே நீஐ³ என்ற அமோனம் 15.83 கிறேன் இருக்கும். இதை நாலுமடங்கு திஸ்திலித்த தண்ணீரோடு கலந்தால் சுண்ணீராவது அமோனவக்சலக்⁹ அமோனதசல்விரம்¹⁰ செம்பமோனசல்வசு¹¹ என்பவற்றில் ஏதும் ஒன்று கரைத்த நீராவது சேர்க்கும்போது அடையல் தோன்றாது. மிஞ்சிய நீதுரிக்க¹²மில்லு சேர்த்தால், வெள்ளிநீதுரசு¹³க்காவது பாரிதகுலோறிரத்துக்¹⁴காவது கலங்கலாகாது.

தன்மை. பெலஞான ஸ்திமுலமும்¹⁵, அழற்றியும்; தானிகமாயிட்டால் காரம்; கொப்புளிக்கப்பண்ணும். இதின் ஆவியும் வீரூன ஸ்திமுலம். அதிதேயத்தில் நஞ்சாகும்.

உபயோகம். பின்னே வரும் அமோன நீரைப் போலவே.

தேயம். மூன்று மினிம் முதற் பத்து மினிம் வரைக்குத் தண்ணீரில் தாரானமாய்க் கலந்து கொடுக்கவேண்டும்.

ரகீதங்கள். அமோனநீர். Solution of Ammonia. கொள். அமோனகர நீர், அரைநாழி; திஸ்திலித்த தண்ணீர் ஒருநாழி. கலந்து கண்ணாடிச் சடையுள்ள சீசாவில் அடைத்துப் பேணவும். சோதனைகள். விசேஷகிருவிதம், 0.959. இதில் நிறைப்படி எண்பத்தைந்து கிறேனைத் தடஸ்திப்பதற்கு அக்சலிக்கமில்பருமவிலயனத்தில் 500 கிறேன் அளவு வேண்டும். இது நிறைப்படி நீஐ³ என்ற அமோனத்தில் நூற்றுக்கு 10 பங்குக்குச் சரியாகும். இதில் ஒரு திராமிலே 5.2 கிறேன் அமோனம் அடங்கியிருக்கும்.

தன்மை. இதை உள்ளே கொடுத்தாலென்ன, வெளியிலே வழங்கினால் என்ன ஆவியாய்ப் பிரயோகித்தாலென்ன நல்ல ஸ்திமுலமாகும்.

உபயோகம். காய்ச்சல் தாபித நோய்களின் பிற்கூற்றிலும், வார்திபேதி முதலிய நோய்களில் சீவகரணங்கள் குன்றியிருக்கும்போதும் கொடுக்க இது உத்தம ஸ்திமுலமாகும். விசேஷமாய் இவ்வகைப்பைச் சோந்த மற்றுமருந்துகளோடு கலந்து கொடுப்பதே உத்தமம். விஷப்பாம்பு விஷப்பூச்சி

1 Phosphoric acid. 2 Hydrochloric acid. 3 Lithic. 4 Alkali. 5 Turmeric paper. 6 Specific gravity. 7 Neutralize. 8 Volumetric solution of oxalic acid. 9 Oxalate of Ammonia. 10 Sulphide of ammonium. 11 Ammonio-sulphate of copper. 12 Nitric. 13 Nitrate of silver. 14 Chloride of Barium. 15 Stimulant.

கடித்தவர்களுக்கு உள்ளே கொடுக்கவும் வெளியிலிடவும் இது கைகண்ட மருந்து பெலவீனத்தோடு தொடுத்த சிராநோய்க¹ளுக்குப் பெரும்பாலும் உவந்தது. சிங்குபி²க்கும், அஸ்விக்சிக்கும்³, இதின் ஆவியை வீறுகுறைக்கக் காற்றுடன் கலந்து மணக்கக் கொடுப்பது மெத்தநயம்.

தேயம். பத்து முதல் முப்பது துளி வரைக்குத் தண்ணீரில் தாராளமாய்க் கலந்து கொடுக்கவும்.

அமோனலினிமென். Liniment of Ammonia. கொள். அமோனரீர், ஒரு அன்சு; ஒலீவுத்தேல்⁴ மூன்று அன்சு. குலுக்கிக் குலுக்கிக் கலக்கவும்.

இது நல்ல ஸ்திமுலமும் ருபிவாஷனுமாகும்.

அமோனசுகந்த ஸ்பிரிது⁶ இங்கமோனஸ்பிரிது⁷, பூரக்கட்டுவினிமென்⁸ இரசலினிமென்⁹, அவினமோனரஞ்சம்¹⁰, என்ற வாகட ரசிதங்களில் அமோனரீர் ஒர் கூழுக்கச் சேருகின்றது.

அமோனகாபனசு. CARBONATE OF AMMONIA.

இதற்குச் சின்னம் நீ⁴ ஐ¹⁶ கா³ அ⁸. இது குடிபோகக்கூடிய கார்ப்பாண அமோன உப்பு. அமோனசல்வசை¹¹ பாவது, அமோனதகுலோறிரத்தை¹² பாவது சுண்ணகாபன¹³ சோடு கலந்து, புடஞ்செய்து, இது எடுக்கப்படும். லட்சணங்கள். இது சற்றெ உருவொளியான கிரிஸ்தற் கட்டி¹⁴. கார்ப்பாண அமோன மணமும் அல்கலி¹⁵த் தன்மையுமுடையது. தண்ணீரில் கரையும். சீதிற்¹⁶ சொற்பமாய்க் கரையும். சூடுகாட்ட முற்றாய்ப் பறந்துபோகும். அமிலங்களிற் போட உடனே நுகைகொண்டு கரையும். சோதனைகள். இதற்குக் கிருசரீதுரிக்கமில்¹⁷த்தைச் சற்று மிஞ்சக் கூட்டிக் காய்ச்சி னாற்பாரிதகுலோறிர¹⁸ மாவது, வெள்ளிரீதுரசாவது¹⁹ சேர்க்க அடையல் காணாது. ஐம்பத்தொன்பது கிறேனை ஒரு அன்சு திஸ்திலித்த²⁰ தண்ணீரில் கரைத்துத்தடஸ்திப்பதற்கு அக்சலிக்கமில்²¹ பருமவிலயனத்தில்²² 1000 கிறேனை வு வேண்டும்.

தன்மை. இது அபாமிலி²³ ஸ்திமுலம்²⁴, சுவேதனி²⁵, எக்ஸ்பெக்துறம்²⁶; பருந்தேயத்தில் வமனி²⁷; மிஞ்சிய தேயத்தில் நஞ்சு.

உபயோகம். கடியல்சியையும்²⁸ குக்கிக்கேதத்தையும்²⁹ இது சுறுக்குத் தணிக்கும். ஸ்காலதீனம்³⁰, சின்னமுத்து, வரிசிப்பிலசு³¹, எட்டிகாறி³² என்ற நோய்களுக்கும் சில சரும நோய்களுக்கும், விசேஷமாய், குஷ்டம், செரீயசிக்³³ இது உத்தம மருந்து. காலிக்³⁴ மத்திம்³⁵ சுவாச நோய்களுக்கு இது ஸ்திமுலஎக்ஸ்பெக்துறமாய் உபயோகமானது. விசேஷமாய்ச் செனிகவேரோடு³⁶ கூட்டிக் கொடுத்தால் அப்படியாகும். மற்றநோய்களுள் இஸ்தேரி³⁷ எபிலெப்சி³⁸, பிரசவபத்தியம், சோர்வு³⁹, பார்சிளோம்⁴⁰, விலெக்மாசியல்பம்⁴¹

1 Nervous affections. 2 Syncope. 3 Asphyxia. 4 Olive oil. 5 Rubeficient. 6 Aromatic spirit of Ammonia. 7 Fetid spirit of Ammonia. 8 Compound Liniment of camphor. 9 Mercurial liniment. 10 Ammoniated tincture of Opium. 11 Sulphate. 12 Chloride. 13 Carbonate of lime. 14 Crystal. 15 Alkali. 16 Spirit. 17 Diluted Nitric acid. 18 Chloride of Barium. 19 Nitrate of Silver. 20 Distilled water. 21 Oxalic acid. 22 Volumetric solution. 23 Antacid. 24 Stimulant. 25 Diaphoretic. 26 Expectorant. 27 Emetic. 28 Cardialgia. 29 Gastrodynia. 30 Scarlatina. 31 Krysipelas. 32 Urticaria. 33 Psoriasis. 34 Chronic. 35 Sub-acute. 36 Senega. 37 Hysteria. 38 Epilepsy. 39 Palsy. 40 Farcinoma. 41 Phlegmasia Alba.

நனை யென்பவற்றுக்குக் கொடுத்து நயங்கண்டது. சர்க்கராழுரிக்கும் இது அவுஷதம் என்று சொல்லப்பட்டது. கடுங் குளிர், வாதங்களுக்குப் பிரயோஜிக்கப்படும் வெந்தோயத்துக்கு இது நல்ல கூட்டாகும். சிந்து பி², அஸ்விக்சிக்கு³ இதின் ஆவி மெத்த உவர்த்தது.

தேயம். ஐந்து முதற் பதினைந்து கிரேன் வரைக்குக் கரைத்துக்கொடுக்கவும். முப்பது கிரேன் சேயத்தில் இது வமனிபாகும்.

ரகீதங்கள். அமோனசுநீர் ஸ்பிரிது. Aromatic Spirit of Ammonia. கொள். அமோனகாபனசு எட்டுஅன்சு; அமோனகரநீர் நாலு அன்சு; சிட வத்திரதேல்⁴ நாலுதிரும்; சபபந்தேல்⁵ ஆறுதிரும்; திட்டசீது⁶ மூன்றுநாழி; தண்ணீர் ஒன்றரைநாழி. கலந்து திஸ்திலித்து மூன்றரைநாழி எடுக்கவும். சோதனை. விசேஷகிரூவிதம், 0.870.

தன்மை, உபயோகம். இந்த மருந்து அத்திர வவண ஸ்பிரிது⁷ என்ற பெயருடன், சிந்துபி, இஸ்தேரி⁸, நரம்புப் பெலவீனம், வாயுவலி முதலியவற்றிற்கு ஸ்திமுலமாய் வெகுகாலம் பெரும்பெயர்பெற்றிருந்தது. இதின் சுவை மணம் நல்லதாயிருப்பதால் அமோனநீருக்குப் பதிலாக இதையே பெரும்பாலும் எடுத்துக்கொள்வார்கள். அதிலும் இது பெலன்குறைந்ததாயினும் தன்மையில் அதற்கு நிகரானது.

தேயம். முப்பது முதல் அறுபது மினிம் வரைக்குத் தண்ணீரிற் தாராளமாய்க் கலந்து கொடுக்கவும்.

குடியகவமோனரஞ்சம்⁹, வலீரியன மோனரஞ்சங்களில்¹⁰ இது ஓர்கூறுகச் சேருகின்றது.

இங்கமோனஸ்பிரிது. Fetid Spirit of Ammonia. கொள். இங்கு¹¹, ஒன்றரை அன்சு; அமோனகர நீர் இரண்டு அன்சு; திட்டசீது போதியது. இங்கை நொருக்கி மூடிய பாத்திரத்திற் பதினைந்து அன்சு சீதில் ஒருநாள் ஊறப்போட்டு அப்பாற் சீதைத் திஸ்திலித்து¹² எடுத்து அதை அமோன நீருடன் கலந்து, அரைநாழியாகப் போதிய திட்டசீது சேர்க்கவும்.

தன்மை. இது நயந்த ஸ்திமுலம்¹³ அந்திஸ்பசி¹⁴.

தேயம். அரைத்திரும் முதல் ஒரு திரும் வரைக்குக் கொடுக்கவும்.

அமோனவசிதக நீர்.

SOLUTION OF ACETATE OF AMMONIA.

இது நீர்¹, கா² ஐ³ அ² என்ற சின்னத்தைபுடைய அமோனவசிதகைத்¹⁵ தண்ணீரிற் கரைத்த நீர். கொள், அசிதிக்கமில்ம்¹⁶ பத்து அன்சு; அமோனகாபனசு¹⁷ மூன்றேகால் அன்சு அல்லது போதியது; திஸ்திலித்த தண்ணீர் ஒன்றேகால் நாழி. அமோனகாபனசை மாவாக அரைத்து அதைப் படிப்படியாய் அசிதிக்கமில்த்தோடுதடஸ்தவிலயன¹⁸மாகுந்தனையுங்கூட்டி அப்பாற் தண்ணீரைச் சேர்க்கவும்.

தன்மை. இது குளிர்மையானது, சுவேதனி.

உபயோகம். சுரநோய்களிலும் தா¹⁹த¹⁹நோய்கள் கதார்²⁰நோய்களிலும்,

1 Diabetes, 2 Syncope, 3 Asphyxia, 4 Volatile oil of nutmeg, 5 Lemon oil, 6 Rectified spirit, 7 Spirit of sal Volatile, 8 Hysteria, 9 Ammoniated Tincture of Guaiac, 10 Ammoniated Tincture of Valerian, 11 Assafoetida, பெருக்கம்.

12 Distil, 13 Stimulant, 14 Antispasmodic, 15 Acetate of Ammonia.

16 Acetic acid, 17 Carbonate of ammonia, 18 Neutral solution,

19 Inflammation 20 Catarrh.

குளிர்த்த, சுவேதனக்கலவைகளுக்கு இது நல்ல துணைமருந்தாகும். தண்ணீரோடு கலந்து வெளிமருந்தாக, தானிக¹தாபிதங்களுக்குக் குளிர்த்த லோஷனாக² இடப்படும். சிலவகையான கண்ணீய்களுக்குக் கலுறிய³மாய் விடப்படும்.

தேயம். இரண்டு திரும் முதல் ஆறு திரும் வரைக்குத் தண்ணீரோடு முறையாய்க் கலந்து மூன்று நாலு மணி நேரத்துக் கொருமுறை கொடுக்கவும்.

அமோனசித்ரிக் நீர்.

SOLUTION OF CITRATE OF AMMONIA.

இது 3^{நீ}ஐ⁴ கா⁶ ஐ⁵ அ⁷ என்ற சின்னத்தையுடைய அமோன சித்ரிகைத் தண்ணீர் கரைத்த நீர். கொள். சித்ரிச்சுமிலம்⁴, மூன்று அன்சு; அமோன கரீர்⁵ இரண்டே முக்கால் அன்சு, அல்லது போதியது; திஸ்திலித்த தண்ணீர் அரைநாழி. சித்ரிச்சுமிலத்தைத் தண்ணீர் கரைத்து அது சோதனைத் தாளுக்குத்⁶ தடஸ்த⁷ நீராய் வருந்தனையும் அமோன நீரைக் கூட்டவும்.

தன்மை, உபயோகம், தேயம். அமோனவசுதக நீரைப் போலவே. இதின் ருசி அதிலும் நயந்தது.

அமோனபெஞ்சோவக.

BENZOATE OF AMMONIA.

இதற்குச் சின்னம், நீ⁸ஐ¹ கா⁷ ஐ⁹ அ⁸. இதைச் செய்யுமுறையாவது: கொள். அமோன நீர் மூன்று அன்சு அல்லது போதியது. பெஞ்சோயிக்கமிலம்⁸, இரண்டு அன்சு; திஸ்திலித்த தண்ணீர் நாலு அன்சு; அமோன நீர் மூன்று அன்சைத் தண்ணீரோடு கலந்துகொண்டு அக்கலவையிலே பெஞ்சோயிக்கமிலத்தைக் கரைத்து அமோனம் சற்று மிஞ்சியிருக்க மெஞ்சுட்டில்வறட்டிக் கிரிஸ்தல்கள்⁹ விளையத்தக்கதாய் வைத்துவிடவும். லட்சணங்கள். நிறமற்ற தகட்டுக் கிரிஸ்தல்களாய் இருக்கும். தண்ணீரிலும் அலக்காலிலும்¹⁰ கரையக்கூடும். அப்பிரவுப்பு¹¹ளோடு கூடினால் மொத்தமான மஞ்சள் நிற அடையலைவிழுத்தும்; தண்ணீர் கரைத்துக் காரப்பதாசி¹²யோடு காய்ச்சினால் அமோனத்தைக் கக்கும். கொஞ்சத் தண்ணீர் கரைத்து, ஐருகு லோறிக்கமிலத்தாற்¹³ புளிப்பாக்கினால், பெஞ்சோயிக்கமிலம் அடையும். சோதனை. சூடு ஏற்றினால் சேஷமில்லாமற் குடிபோகும்.

தன்மை. இது ஸ்திமுலம். விசேஷமாய்ச் சன்னசல உறுப்புகளின் சளிச்சவ்வை அருட்டும்.

உபயோகம். சலப்பையின் காலிக¹⁴தாபிதங்க¹⁵ளுக்கும், சிறுநீரிலுண்டாகும் பாஸ்வரக்¹⁶ கல்லடைசலை மாற்றுவதற்கும் இது கொடுத்து நயந்ததாம்.

தேயம். பத்து முதல் இருபது கிரேன் வரைக்குத் தண்ணீர் கரைத்து நாள் இரண்டு மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம்.

அமோன பாஸ்வக.

PHOSPHATE OF AMMONIA.

இதற்குச் சின்னம் (நீ⁸ஐ⁴)₂ ஐபாஅ⁴. கொள். கிருசபாஸ்வரிக்கமிலம்¹⁷

1 Local. 2 Lotion. 3 Collyrium. 4 Citric acid. 5 Strong solution of Ammonia.

6 Test paper. 7 Neutral. 8 Benzoic acid. 9 Crystal. 10 Alcohol. 11 Persalt of Iron. 12 Caustic Potash. 13 Hydrochloric acid. 14 Chronic.

15 Inflammation. 16 Phosphate. 17 Diluted Phosphoric acid.

இருபது அன்சு; அமோனகர¹ நீர் போதியது. பாஸ்வரிக்கமிலஞ் சற்றே அல்கலைத் தன்மை கொள்ளுந்தனையும் அதற்கு அமோனநீரைக் கூட்டி, அப்பால் அக்கலவையை வறட்டி இடைக்கிடை அமோனநீரை மிஞ்சச் சேர்த்து ஆறிக் கிரிஸ்தல்கள் விளையுபோது அவைகளை கண்ணறைத் தட்டின் மேல் வைத்த ஊறுதாளில் சுறுக்கு உலர்த்திக் கண்ணாடிச் சடையுள்ள சோவில் இட்டு அடைத்துவைக்கவும். லட்சணங்கள். இவை உருவொளியான நிறமற்ற பிரிசங்கள்². தண்ணீரில் கரையும். திட்டசீதி³ கரையாது, காரப்பதாசி⁴யோடுகாய்ச்சும்போது, அமோனம் பறியும். தண்ணீரில் கரைத்து அத்தோடு காடிக்காரஞ்சேர்க்க, மஞ்சள்நிற அடையல் விழும். சோதனைகள். இந்த உப்பில் இருபது கிறேனைத் தண்ணீரில் கரைத்து அதற்கு மக்னீசியமோனசல்வசு⁵நீரைக் கூட்டினால் கிரிஸ்தலான⁷ அடையல்விழும். இந்த அடையலை வடியில்⁸இட்டுச் சமபங்கு தண்ணீரோடு கலந்த அமோனநீரால் கண்ணாய்ச் கழுவி. உலர்த்திச் சிவக்கக் காய்ச்சினால் 16.8 கிறேன் மக்னீசைபறுபாஸ்வசு⁹ எஞ்சும்.

தன்மை. இது ஸ்திமுலன்¹⁰. இதன் செயல் விசேஷமாய்ச். சல உறுப்புக்களிலேயே தோற்றும்.

உபயோகம். லிதிக்மில¹¹பவகத்தோடு¹²தொடுத்த தீவிரகாலிக நோய்களுக்கும் விசேஷமாய்ச் சிலவகையான குவாதத்¹³துக்கும் இதுகொடுத்து நயந்தது.

தேயம். ஐந்து முதல் இருபது கிறேன் வரைக்கு நாள் மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம்.

அமோனத குலோறிரம். நவச்சாரம்.

CHLORIDE OF AMMONIUM.

இதற்குச் சின்னம் நீஹ் கு. ஐருகுலோறிக்கமிலத்தை¹⁴ அமோனத்தாற்¹⁵ திஸ்தித்து உலர்த்த இது வரும். கரிவாயுவும்¹⁶ ஏணக்கரியும்¹⁷ செய்யும்போது பிறக்கும் அசுத்தமான அமோன நீர்களிலிருந்து இது விசேஷமாய்ச் செய்யப்படும். லட்சணங்கள். நிறமற்றது; மணமற்றது; உருவொளியானது; கூந்தலுள்ள கட்டியாயிருக்கும். உரப்பானது; மாவாக்குவது பிரயாசம். தண்ணீரிலும் திட்டசீதிலும் கரையக்கூடியது, சோதனைகள். இதைத் தண்ணீரில் கரைத்துக் காரப்பதாசியோடு காய்ச்ச அமோனம் பிறக்கும். காடிக்காரஞ் சேர்க்க தயிர் போன்ற கன அடையலுண்டாகும். காய்ச்சும் போது கூறுபடாமலும் சேஷம்விடாமலும் ஆவியாகும்.

தன்மை. சிறு தேயத்தில் நெடுகக் கொடுத்தால் அல்திறவம்¹⁸. பெருங் தேயத்தில் ஸ்திமுலன். இது விசேஷமாய்ச் சோஷணிகளிலும்¹⁹ கோளங்களிலும்²⁰ சேஷ்டிக்கும்.

உபயோகம். சுவாசப்பை, ஈரல், பிளிகைகளின் காலிக நோய்களுக்கும், ஈரல் நோய்கள், சினைப்பை நோய்களைப் பற்றிய நீர்க்கோவைக்கும், விபல²¹ இரத்தப்பெருக்குக்கும் விசேஷமாய் இரத்த இருமலுக்கும், முகத்திலு

1 Strong solution of Ammonia. 2 Prism. 3 Rectified spirit. 4 Caustic potash. 5 Nitrate of silver. 6 Ammonio-sulphate of magnesia.

7 Crystal. 8 Filter. 9 Pyro-phosphate of magnesia. 10 Stimulant.

11 Lithic acid. 12 Diathesis. 13 Gout. 14 Hydrochloric acid. 15 Ammonia. 16 Coal gas. 17 Animal charcoal.

18 Alterative. 19 Absorbent. 20 Gland. 21 Passive.

ண்டாகும் துறல்சி¹,வாத நோய்களுக்குப், சிலவகையான சிரத்தலைவலிச்
கும், தீட்டின்மைக்கும். குச்சலுக்கும், முறைச்சுரம் விடாச்சுரங்களுக்கும்
இது உண்மருந்தாய் நயந்தது. வெளியில் மந்தச்சுழலைகள், வீங்கின கோ
ளங்களுக்கும் ஆரம்பமான ஸ்தன விப்புருதி²க்கும், குரண்டத்துக்கு³, சு
ருக்குகள் நசிவுகள் சிலவகையான சருமநோய்களுக்கும், இதைத் தண்
ணீர் சீதீற் கரைத்து இடுவார்கள்.

தேயம். நாட்பட்ட நோய்களுக்கு ஐந்து முதற் பதினைந்து கிறேன் வ
ரைக்கு தண்ணீராதியிற் கரைத்து நாள் இரண்டு மூன்றுமுறை கொடுக்க
லாம். கடுமையான துறல்சி நோ வாதநோக்களைத் தணிப்பதற்கு இதில் இ
ரண்டு சீரூம் உள்ளே செல்லுமட்டும் மூன்று நாள் மணி நேரத்துக்கொ
ருமுறை அரைத்திராங் கொடுப்பதே உத்தமம். வெளியிலிடுவதற்கு அ
ரை அன்சு முதல் ஒரு அன்சு வரைக்குப் பத்து அன்சு தண்ணீரிற் கரைத்
து இடுவது வாடிக்கை. இந்த உப்பில் ஐந்து அன்சையும் வெடியுப்பில் ஐ
ந்து அன்சையும் பதினாறு அன்சு தண்ணீரிற் கரைக்க ஓர் வீரீசுக்கலவை⁴
உண்டாகும். ஐசு⁵ கிடையாதவிடத்தில் இது உவப்பு.

[நவச்சாரம் என்று தமிழில் சொல்லப்படும் இச்சரசு மணமற்றது. கா
ரமான கைச்சற்சுவையுள்ளது. தடித்த கூந்தல்களுள்ள உருவொளியான
தகட்டுக் கட்டிகளாக இது இந்துக் கடைகளில் வரும். ஒருவராட்டியை
விசேஷமாய் ஒட்டக ஒருவராட்டியை விறகாகப் போட்டுச் சுட்ட செவ
சற்குளையில் எரியாமல் எஞ்சிய அடிப்படையிலிருந்து இந்த நவச்சாரம் எ
டுக்கப்படும். இது அசுத்தமானது. இதை மருந்துக்குச் சேர்க்கில் வெந்
நீரிற் கரைத்துக் காரிக்கப்புடைவையில் வடித்து வறட்டிக் கிரிஸ்தல்க⁶ளா
க எடுக்கவேண்டும்.]

அமோனத புரேமீரம்.

BROMIDE OF AMMONIUM.

சீதற்குச் சின்னம். நீஜ⁴ பு. இது நிறமற்ற கிரிஸ்தல்களாக இருக்கும்.
பரமானுபடுவதாற் சற்றே மஞ்சள்நிறமடையும். காரமான உப்புச் சுவை
உடையது இதைக் கூறுபடாமல் குடேற்றி, அதின் தன்மையை மற்
றாமற் புடஞ்செய்யலாம். தண்ணீரிற் சுறுக்குக் கரையும். சீதீற்⁷சொற்ப
மாய்க் கரையும். சோதனை. இந்த உப்பைத் தண்ணீரிற் கரைத்து அமை
லமுசிலாகு⁸டன் கலந்து அத்தோடு குலோறநீரில்⁹ ஒரு துளியைக் கூட்டி
னால் நீலநிறம் தோன்றாமற் செம்மஞ்சள் நிறம் தோன்றும்.

தன்மை. இது உத்தமமான அல்திறவம்¹⁰.

உபயோகம். கோள வீக்கங்கள், ஸ்தூருமக் கண்ணேய், குச்சலுக்கும்,
நரம்புக்கிரந்தி மையங்களின் தொழிற் பிசுபட்டிருக்கிற நோய்கள் பஸவ
ற்றிற்கும் இதைக் கொடுப்பது நயம்.

பதாசியம். POTASSIUM.

சின்னம், K; அணுப்பாரம். 39.

இது பதாசி¹¹ என்ற அச்சிரத்து⁴சுத்¹² தாரகமாகிய லோகம். பதாசிக்குச்

1 Neuralgia, 2 Mammary abscess 3 Hydrocele, 4 Freezing mixture, 5 Ice,
6 Crystal, 7 Spirit, 8 Mucilage of amylin, 9 Solution of Chlorum,
10 Alterative, 11 Potash, 12 Oxide,

சின்னம் பாஅ=14. இப்படியே பதாசி என்ற அச்சிரமாக இந்த லோகமானது அமிலங்கள்¹, மண்களோடு கலந்ததாய் இந்திர அரிந்திர பதார்த்தங்களில் அதிகஞ் செறிந்திருக்கும்.

காரப்பதாசி. CAUSTIC POTASH.

இது பதாசியை² எனப்படும். சின்னம், பஐஅ. பதாசி நீரை வெள்ளிப் பாத்திரம் அல்லது இரும்புப் பாத்திரத்தில் விட்டு எண்ணெய்த்தடிப்பாய் வருந்தினையுங் காய்ச்சி, குகைகளில் வார்த்து வைரமான வெள்ளைக் கம்பிகளாக எடுப்பார்கள். இது லகுவீற் கரையக்கூடியது. வீருன அலகலையும் காசமுமாகும். அதைத் தண்ணீரில் கரைத்து நீதுரிக்கமில்³ விட்டுப் புளிப்பாக்கினால் ப்லாடினபிரகுலோதிரம்⁴ சேர்க்கும்போது மஞ்சள்நிற அடையல் உண்டாகும். வெள்ளிநீதுரசு⁵, பாரிதகுலோதிரஞ்⁶சேர்க்கும்போது சொற்ப வெண்ணடைபல் விழும். சோதனைகள். ஐம்பத்தாறு கிரேனை தண்ணீரில் கரைத்தாற் சொற்ப அடையல்மாத்திரங் காணும். இதைத் தடஸ்திப்பதற்கு⁷ அச்சலிக்கமில்⁸ பருமலிலயன⁹த்தில் 900 கிரேனைவாகுதல் வேண்டும். இதைத் திறந்தபடி வைத்தாற் கரையுமாதலால் கண்ணாடிச் சடையால் நன்றாகடைத்த சீசாக்களில் வைக்கவேண்டும்.

தன்மை. இது வீருன காரம், எஸ்கராட்டி¹⁰. உட்கொண்டால் அழற்று நஞ்சாகும்.

உபயோகம். விசிக கோதத்தக்கு¹¹ இடுவதற்கும், பிறப்பு வாசியாய் வெளியிலுண்டாயிருக்கும் நீவசைக்¹² உடுப்பதற்கும் விவார நாளங்களை¹³ அழிப்பதற்கும் சலத்துவாரத்திலுண்டாயிருக்கும் நிலையான ஒடுக்கைத் திறப்பதற்கும் ஸ்துரும¹⁴ விப்புருதி¹⁵, னை வெட்டுவதற்கும் இக் காரப்பதாசியை வழங்குதல் நயம். திரியேற்றுவதற்கும் இது வழங்கப்படும். சுறுக்கிற் கரையுந் தன்மையே இதை வழங்க நேரிடுந்தடை.

[காரப்பதாசியையும் சுண்ணத்தையும் சமபங்காய்க் கலந்த ஓர் கலவை காரப்பதாசியைப் போல நயந்தது. இக்கலவை காரப்பதாசியைப் போல லகுவீற் கரைபாதாசலால் அசிலும் மேலானது. இது சீதற் குழைத்த பசையாக வழங்கப்படும், இதற்குச் சுண்ணப்பதாசி¹⁶யென்று பெயர்.]

பதாசினீர். LIQUOR POTASH.

நீரின சுண்ணத்தில்¹⁷ அரைப்பங்கை, பதாசிகாபனசில்¹⁸ 1 பங்கோடு சேர்த்து 12 பங்கு தண்ணீரில் கரைத்துக் காய்ச்சப் பதாசினீர் பிறக்கும். இது ஆறினபின் நீரை இறத்துச் சுண்ணகாபனசை வேருக்கலாம். லட்சணங்கள். இது நீரடி மணமற்ற நீர். மெத்தக் காரமான சுவையுள்ளது; உருவொளியானது, வீருன அலகலை; விரல்களில் தொட்டுப் பூசு. சவுக்காரம் போல வழுவழுக்கும். பிராணி தாவர பதார்த்தங்களை அரிக்கும்; விசேஷவிதம் 1.053. சோதனைகள். இதில் நிறைப்படி 462.9 கிரேனை அடையது ஒரு அங்கைத் தடஸ்திப்பதற்கு 482 கிரேனைவு அச்சலிக்கமில்

1 Acids. 2 Hydrate of potash. 3 Nitric acid. 4 Perchloride of Platinum. 5 Nitrate of silver, 6 Chloride of Barium. 7 Neutralize. 8 Oxalic acid. 9 Volumetric solution. 10 Escharotic, தகனி. 11 Hospital gangrene 12 Naevus. 13 Varicose Veins. 15 Struma. 15 Abscess. 16 Potassa cum calce. 17 Slaked lime. 18 Carbonate of Potash.

பருமவிலயனம் வேண்டும். இது பஐஅ என்ற சின்னத்தையுடைய பதாசிகையரசில் நிறைப்படி நூற்றில் 5.84 பங்குக்குச்சரியானது. மிஞ்சிய கிருசுவை ருசுவோறிக்கமில¹த்தோடு இதைச்சேர்க்கும்போது இது நுரைக்காது. சமஅ ளவான திஸ்திலித்த² தண்ணீரோடு இதைக் கலந்து சுண்ணீராவது³ அமோனவக்சலசாவது⁴ கூட்டும்போது அடையல் உண்டாகாது. கிருசு நீதுரிக் கமிலத்தை⁵மிஞ்சக் கூட்டி வறட்டும்போதுண்டாகுஞ் சேடத்தைத் தண்ணீரிற் கரைத்தால் அது ஏறக்குறையத் தெளிவான நீராகும். இதற்குப் பாரித குலோறி⁶மாவது வெள்ளிநீது⁷சாவது சேர்க்கச் சொற்ப அடையலுண்டாகும்; அதற்கு அமோனஞ்⁸ சேர்த்தாலோ மெத்த மாறுது. இதில் ஒரு அன்சிலே 27 கிறேன் பதாசிகையரசு இருக்கும். இது பரமானுவிலிருந்து காபனிக்கமிலத்தைச்¹⁰ சுறுக்கு உறிஞ்சுவதாலும் பிளிஸ்டியை¹¹ அரிப்பதாலும் பச்சைக் கண்ணாடிச் சீசாக்களிலே விட்டு நன்றாய் இதை அடைத்து வைக்கவேண்டும்.

தன்மை. இது முதலாவது அபாமிலி¹², இரண்டாவது அல்திறவம்¹³, தியூரிசம்¹⁴. அதிதேயத்தில் நஞ்சு.

உபயோகம். இரைப்பை குடல்களின் புளிப்பைப் பற்றி யுண்டான கடியல்சி¹⁵யும் தீவிரகாலிக வாதங்களும், துபேகுல¹⁶ நோய்கள் விசேஷமாய்க் கசமும் விதிக்கமிலபவகம்பற்றிய கல்லடைசல்களும், புறங்குசில்¹⁷ நீர்க்கோவை நோய்களும் காலிகமான சருமநோய்கள் விசேஷமாய்ச் சொறியசி¹⁸ குஷ்டங்களும்¹⁹ அசுகக் கஞ்செஸ்தம்²⁰ கதார்²¹களும் நுமோனி²²யின் பிற்கால்களுமே இம் மருந்தால் நயப்படக்கூடிய விசேஷ நோய்கள்.

தேயம். பதினைந்து மினிம் முதல் அறுபது மினிம் வரைக்குத் தண்ணீரிற் தாராளமாய்க் கலந்துகொடுக்கவும்.

பதாசிகாபனசு, CARBONATE OF POTASH.

இதற்குச் சின்னம் ப₂ காஅ₃. இதிலே கிரிஸ்தல்²³நீர் நூற்றுக்கு ஏறக்குறைய 16 பங்கு சேர்ந்திருக்கும். வியாபாரத்தில் வரும் அசுத்த பதாசிகாபனசாகிய பேளசைச்²⁴ சமநிறையான சுத்த தண்ணீரிற் கரைத்துக்கெதியாய்க் கலக்கிக் கலக்கி வற்றப்பண்ணிச் சுத்தமான பதாசிகாபனசை எடுப்பார்கள். மரச் சாம்பலைச் சாரநீரிற் கலால் பேளசு எடுக்கப்படும். லட்சணங்கள். பதாசிகாபனசு வெண்மையான கிரிஸ்தல்²⁵மா; சுவைக்கு அல்கலை²⁶யாயும் காரமாயுமிருக்கும்; பரமானுவில் வைக்கச் சுறுக்குக்கரையும்; தண்ணீரிற் சீக்கரமாய்க் கரையும்; சீதிற்²⁷கரையாது; கிருசுவை ருசுவோறிக்கமிலஞ் சேர்க்க நுரைக்கும். இக் கலவையிலே பிலாடின²⁸பிரசுவோறி²⁹த்தைப் போட மஞ்சள்நிற அடையல் விழும். சோதனைகள். செஞ்சுடேற்ற நூற்றுக்கு ஏறக்குறையப் பதினாறு பங்கை இழக்கும். நீதுரிக்கமிலத்³⁰தால் அதி பூர்த்தித்து³¹ வறட்ட, வரும் சேஷம் தண்ணீரில் ஏறக்குறைய

1 Diluted hydrochloric acid. 2 Distilled. 3 Lime water, 4 Oxalate of Ammonia. 5 Dilute nitric acid. 6 Chloride of barium. 7 Nitrate of silver. 8 Ammonia. 9 Hydrate of potash. 10 Carbonic acid. 11 Flint glass. 12 Antacid.

13 Alterative. 14 Diuretic கவேதி. 15 Cardialgia. 16 Tubercular.

17 Brouchocele 18 Psoriasis. 19 Lepa, வெம்பிதம். 20 Bronchial congestion. 21 Catarrh. 22 Pneumonia. 23 Water of crystallization.

24 Pearlash. 25 Crystal. 26 Alkali. 27 Spirit. 28 Platinum.

29 Perchloride. 30 Nitric acid. 31 Supersaturate.

முற்றாய்ச் கரையச் சொற்ப சிலிசி¹ மாத்திரங் கரையாமலிருக்கும். இந்த நீருக்குப் பாரிதகுலோறிரம்² வெள்ளிநீதரசு³ கூட்டச் சொற்ப அடையல் மாத்திரமுண்டாகும். இதிலே எண்பத்துமூன்று கிறேனைத் தடஸ்தி⁴ப்பதற்கு அக்சலிக்கமில்⁵ பருமவிலய⁶னத்தில் 980 கிறேனைவாகுதல் வேண்டும். பரமானு படச் சுறுக்கிற் கரையுமாதலால் இதைக் கண்ணாடிச் சடையால் நன்றாயடைத்த சீசாக்களில் வைக்கவேண்டும்.

தன்மை, உபயோகம். பதாசி நீரைப் போலவே. ஆயினும் தேகத்தில் இதின் செயல் குறைவதால் அதைப் பார்க்க மோசமின்றி இதை நெடுகக் கொடுக்கலாம். அரைநாழி தண்ணீருக்கு அரைத்திரும் வீதமாக இதைக் கரைத்தாற் சரும நோய்கள் பலவற்றுக்கு உபயோகமான அல்கலை லோஷனாகும்.

தேயம். பத்து முதல் முப்பது கிறேன் வரைக்குத் தண்ணீரிற் கரைத்துக் கொடுக்கலாம். அல்லது தாவரஅமிலங்க⁷ளோடு சேர்த்து நுரைபானமாய்க் கொடுக்கலாம்.

[இந்துவின் சிலபகுதிகளிலே ஓலைகள் வாழைச்சருகுகளை எரித்து அசுத்தமான ஓர் பதாசிகாபனசு செய்வார்கள். அது சுத்தியாக்கப்படாமல் மருந்துக்கு உதவாது. நாயுருவிச் சாம்பலிற் பதாசி அதிகமாயுண்டாம்.]

பதாசிதுவிகாபனசு. BICARBONATE OF POTASH.

இதற்குச் சின்னம் பஐ காஅ⁸. பதாசிகாபனசைத் தண்ணீரிற் கரைத்து அதற்கூடே காபனிக்கமில் வாயுவை⁹த் தாரையாய்ப் பூர்த்தியாய்ச் செலுத்திப் பதாசிதுவிகாபனசாக்குவார்கள். கிருசுவைருகுலோறிக்கமில்¹⁰த்தை மாபின்¹¹ என்ற கல்லின் துண்டுகளில் விடக் காபனிக்கமில் வாயுப் பிறக்கும். லட்சணங்கள். இது நிறமற்றதாய் நேரிரம்பப் பிரிசங்க¹²ளாகக் கிரிஸ்தலிக்கும்; பரமானுவிற் கரையாது; உவரான சற்றே அல்கலைச்¹³சுவையுள்ளது; அரிக்கமாட்டாது. இத்தோடு கிருசுவைருகுலோறிக்கமில்ம் சேர்க்கப்பெலளாய் நுரைக்கும். இக் கலவை நீரோடு பிலாடின பிரகுலோறிரஞ்¹⁴சேர்க்க மஞ்சள்நிற அடையல் தோற்றும். சோதனைகள், இதிலே ஐம்பது கிறேனை எடுத்துச் சொற்ப அளவான செஞ்சூடு ஏற்ற வெண்மையான செஷம் முப்பத்துநாலரைக் கிறேனுக்கு இருக்கும்: இதைச் சரியாய்ப் பூர்த்திப்பதற்கு அக்சலிக்கமில் பருமவிலயனத்தில் 500 கிறேனைவு வேண்டும்.

தன்மை, உபயோகம். பதாசிகாபனசைப் போலவே. அதிலும் இதின் செயல் குறைவு.

தேயம். பத்து முதல் நாற்பது கிறேன் வரைக்குங் கூடவுங் கொடுக்கலாம். நுரைபானஞ் செய்வதற்குப் பதாசிதுவிகாபனசில் இருபது கிறேன், சிதிறிக்கமில்த்திற்¹⁵ பதினாறு கிறேனுக்குச் சரி; அல்லது தாத்தரிக்கமில்த்தில்¹⁶ பதினைந்து கிறேனுக்குச் சரி.

ரசிதம். பதாசிநுரைநீர். Effervescing solution of Potash. கொள். பதாசிதுவிகாபனசு, முப்பது கிறேன்; தண்ணீர் அரைநாழி. பதாசிதுவி

1 Cilica. 2 Chloride of barium. 3 Nitrate of silver. 4 Neutralize.

5 Oxalic acid. 6 Volumetric solution. 7 Alkaline lotion.

8 Vegetable acid. 9 Carbonic acid gas. 10 Dilute hydrochloric acid.

11 Marble. 12 Prism. 13 Alkali. 14 Perchloride of platinum.

15 Curie acid, 16 Tartaric acid.

காபனசைத் தண்ணீரிற் கரைத்து, வடித்து அதற்குள்ளே ஏழு பரமானுவின் அழுக்கத்தில் வைத்திருக்கக் கூடிய சுத்தமாய்க் கழுவிய காபனிக்கமில் வாயுவைச்¹ செல்லவிடவும். மேலே சொல்லிய முறையாயாவது சல்புரிக்க²மிலத்தைக் கிரீதத்திற்³ சேர்ப்பதாலாவது காபனிக்கமில் வாயுவை எடுக்கலாம். நீரைச் சீசாக்களில் விட்டு, அழுக்கப்பட்ட வாயு பறிந்துபோகாமல் இறுக்கமாய் அடைத்துவைக்கவும். லட்சணங்கள். சீசாவைத் திறந்தவுடன், காபனிக்கமில் வாயு பறிய, நீர் கெதியில் நொதிக்கும். இந்த நீர் தெளிந்தது, தளதளக்கும், புளிப்பான நஞ்சுவை கொண்டது. சோதனைகள். இதிற்பத்து அன்சை ஐந்துமினி நேரமாகக் கொதிப்பித்தபின் தடஸ்திப்பதற்கு⁴ அச்சலிக்கமில்⁵ பருமவிலயன⁶த்தில் 150 கிறேன் அளவு வேண்டும். ஐந்து அன்சை ஒரு அன்சாய் வறட்டியதற்கு தாத்தரிக்கமில் த்திலே பன்னிரண்டு கிறேனைச் சேர்க்க கிரிஸ்த⁷லான ஒரு அடையல் விழும். இந்த அடையலை வறட்டும்போது பன்னிரண்டுகிறேனுக்குக் குறையாமல் நிறுக்கும்.

பதாசிசல்வுகம். SULPHURATED POTASH.

பதாசிகாபனசையும் உச்சிக கெந்தகத்தையும் உருக்கி இச் சல்வுகம் எடுக்கப்படும். லட்சணங்கள். வைரமான பச்சை நிறத் துண்டுகளாகவிருக்கும்; முறித்தவுடன் கபில நிறங் காட்டும்; அல்கலையானது; காரமான சுவையுள்ளது; தண்ணீரிலே சுறுக்குக் கரைந்து மஞ்சள் நிறமடையும்; இந்த நீர் ஐருசல்புரிக்கமில்⁸வாயுவின் மணமுடையது; அதிலே ஐருகுலோறிக்கமில்த்தை⁹மிஞ்ச விட்டால் இவ்வாயு தாராளமாய்ப் பறியக் கெந்தகம் அடையும். இந்த அமில நீரைக் காய்ச்சி வடித்தபின் பிலாடினபிரகுலோறி ரஞ்¹⁰ சேர்த்தால் மஞ்சளாகும். பாரிதகுலோறி ரஞ்¹¹சேர்த்தால் வெண்மையாகும். சோதனைகள். இதிலே நிறைப்படி முக்காற்பங்கும் திட்டசீதிற்¹² கரையும்.

தன்மை. ஸ்திமுலம்¹³; இது விசேஷமாய்த் தோலிற்சேஷ்டித்துச் சுவேதனி¹⁴யாகும். சுவாசக்குழற் சளிச்சவ்விற் சேஷ்டித்து எக்ஸ்பெக்துற¹⁵மாகும். பெருந்தேயத்தில் இது மயக்கமுற்சி நஞ்சாகும்.

உபயோகம். தொல்லையான சருமநோய்களுக்கும், காலிக¹⁶புறங்கீது¹⁷, கதார்¹⁸நோய்களுக்கும், குறுப்பு¹⁹, அசத்துவ²⁰குன்மம்²¹, காலிகவாதங்களுக்கும் இது நல்ல உண்மருந்து. சிரங்குக்கும் மற்றுஞ் சருமநோய்களுக்கும், தோயம்²² லோஷன்²³, அன்கென்²⁴ என்றமாதிரியாகஇட நயந்தவெளிமருந்து.

தேயம். மூன்று கிறேன் முதல் ஐந்து கிறேன் வரைக்கும் படிப்படியாய்க் கூட்டிப் பத்துக் கிறேன் வரைக்கும் அதிற் கூடவும் தண்ணீரிற் கரைத்தாவது சபுவோடு²⁵கூட்டிக் குளிகையாயுருட்டியாவது கொடுக்கலாம். லோஷனுக்கு வீதம் அரைநாழி தண்ணீருக்கு ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திரும் வரைக்கு. தோயத்துக்கு வீதம் முப்பது²⁶தண்ணீருக்கு மூன்று நாளு அன்சு.

1 Carbonic acid. 2 Sulphuric acid 3 Chalk. 4 Neutralize. 5 Oxalic acid. 6 Volumetric solution. 7 Crystal. 8 Hydrosulphuric acid. 9 Hydrochloric acid.

10 Perchloride of platinum. 11 Chloride of Barium. 12 Rectified spirit. 13 Stimulant. 14 Diaphoretic. 15 Expectorant, சிசேடவனி

16 Chronic. 17 Bronchitis. 18 Catarrh. 19 Croup. 20 Atonic.

21 Dyspepsia. 22 Bath. 23 Lotion. 24 Ointment, தயிலம்.

25 Soap. 26 Gallon.

ரசித்ம். பதாசிசல்வசுவன்கேன். Ointment of Sulphurated Potash. கொன். பதாசிசல்வசு, முப்பது கிறேன்; பூதலா¹ ஒரு அஞ்சு. பதாசிசல்வசுத்தைப் பீங்கானுரலில் அரைத்து லாட்டைப் படிப்படியாய்ச் கூட்டி அன்கென் பருபருக்கையில்லாமல் அழுத்தமாய் வருந்தினையும் நன்றாய் அரைக்கவும். வழங்கும் ஒவ்வொருமுறையும் இந்த அன்கெனை புதிதாய்ச் செய்துகொள்ளவேண்டும்.

பதாசிசல்வசு. SULPHATE OF POTASH.

பதாசிசல்வசுக்குச் சின்னம் ப₂ கெஅ₄. நீதுரிக்கமிலச்²செய்கையில் எஞ்சுவதாகிய அசுத்தமான பதாசிசுவிசல்வசைப்³பதாசிகாபனசாற்⁴ தடஸ்தித்து⁵ இதை எடுப்பார்கள். அநிந்திர இந்திர பதார்த்தங்களில் இது இயல்பாயுள்ளது. லட்சணங்கள். இது நிறமற்ற வன்மையான அறுபுசபிரிசு⁶ங்களாக இருக்கும். அந்தங்கள் அறுபுசசிகரங்க⁷ளாய் முடியும். சூடேற்றப் படபடென்று வெடிக்கும். தண்ணீரில் அரிதாய்க் கரையும். அலக் காலிற்⁸ கரையாது. சோதனைகள். இதைத் தண்ணீரில் கரைத்து ஐருகுலோறிக்கமிலத்தாற்⁹புளிப்பாக்கி பாரிதகுலோறிரஞ்¹⁰சேர்க்க வெண்ணடைபல் விழும். பிலாடின பிரகுலோறிரஞ் சேர்க்க மஞ்சள் அடையல் விழும். சோதனைத் தாளுக்குத் தடஸ்தமாய் நிற்கும். இதின் கரைவு அமோன வக்சலசுக்கு¹²மாறுதலடையாது.

தன்மை. இனம் விரேசனி. பாலுறச்செய்யுமாம். மிஞ்சிய தேயத்திற்¹³ நஞ்சு.

உபயோகம். குன்மநோய், ஈரல் நோய்களுக்கும், விசேஷமாய்ச் செங்கண்மாரிக்கும் இரைப்பையைப்பற்றிய ரிமீஷ்¹³சுரங்களுக்கும், அல்புமினாறிக்கும்¹⁴, அரிசமுனை¹⁵க்காரருக்கும், இதுசாந்தமான செயலையுடையதாதலால் நல்ல இனம் பேதி. ஆயினும் இவ் வகுப்பைச் சேர்ந்த மற்று மருந்துகளுக்கு இது மேலானதல்ல.

தேயம். பதினைந்து கிறேன் முதல் அறுபது கிறேன் வரைக்கும். பெரும்பாலும் வரியாத்துடன்¹⁶ கலந்து கொடுக்கப்படும்.

இபிகாக்¹⁷கூட்டுச் சூரணம், கலுசிந்துக்¹⁸கூட்டுக்குளிகை, கலுசிந்தயசீய மசுக்¹⁹குளிகைகளில் பதாசிசல்வசு ஒர்குருகச் சேருகின்றது.

பதாசிசுலோறசு. CHLORATE OF POTASH.

இதற்குச் சின்னம் பகுஅ₃. இதையெடுக்குமுறையாவது; பதாசிகாபனசு²⁰, நீற்றின சுண்ணாம்பு, தண்ணீர் மூன்றையுங் கலந்துவைத்துக்கொண்டு, மங்கனீச காரக்கிரத்தின்²¹மேல் ஐருகுலோரிக்கமிலத்தை வார்த்து அதிற் பிறக்குங் குலோறவாயுவை²² இக் கலவைக்கூடே தாரையாகச் செல்லவிட்டுப் பிறகு அந்த நீரைக் காய்ச்சி வடித்து வறட்ட, இந்த உப்புச் கிரிஸ்தல்க²³ளாக விளையும். லட்சணங்கள். இது நிறமற்ற சதுரக் கிரிஸ்தற் தகடுகளாகவிருக்கும்; குளிர்மையான உப்புச் சுவை கொண்டது. தண்ணீரில்

1 Prepared lard, ஷெய். 2 Nitric acid. 3 Bisulphate. 4 Carbonate. 5 Neutralize. 6 Prism. 7 Pyramid. 8 Alcohol. 9 Hydrochloric acid. 10 Chloride of barium. 11 Perchloride of platinum. 12 Oxalate of ammonia.

13 Remittent fever. 14 Albuminuria. 15 Haemorrhoides. 16 Rhubarb.

17 Ipecac. 18 Colocynth. 19 Hyosciamus. 20 Carbonate.

21 Black oxide of manganese. 22 Chlorine gas. 23 Crystal.

சொற்பமாய்க் கரையும். கெந்தகத்தோடு சேர்த்தரைக்கும்போது படபடென்று வெடிக்கும். சோதனைகள். சூட்டுக்கு உருகி, அச்சித¹ வாயுவைக் கக்கி வெண்மையான சேடத்தை விடும். அது பதாசியகுலோறிரம்². அது தண்ணீரில் கரைந்து தடஸ்தவிலயனமாகும். அத்தோடு வெள்ளீநீதுரசு³ சேர்க்க வெண்ணடை யலுண்டாகும். பிலாடின பிரகுலோறிரஞ்⁴ சேர்க்க மஞ்சள்நிற அடையல் உண்டாகும்.

தன்மை. இது குளிர்மையானது, சுவேதனி, அல்திறவம்.

உபயோகம். சன்னிச்சுரம்⁵, ஸ்காலதீனம்⁶, பொதுவாய் ஏக்சந்திம்⁷ சுரங்களுக்கும், பிறகுண்டாகும் நீர்க்கோவைகளுக்கும் இது உத்தம மருந்து. மற்றும் வியாதிகளுட் காலிகபுறங்கீது⁸, சசம், வாந்திபேதி, அதின் தன்மையான கழிச்சல், செங்கண்மாரி⁹, இரசகச்செக்சி¹⁰, சிவ்லிசு¹¹ கச்செக்சி¹² திவ் திரி¹³, ஸ்கேவி¹³ என்பவற்றுக்கு இதை உண்மருந்தாய்க் கொடுப்பது நலம். வெளிமருந்தாக வாய்ப்புற்று¹⁴, அக்கரம்¹⁵, அக்கரப்புண்¹⁶, பலவகையான சைனன்கி¹⁷, உமிழ்நீர்ப்பெருக்கு, சயதபுண்கள்¹⁸, சிவ்லிசு புண்களுக்கும், கனுறியம்¹⁹ லுகறியங்களுக்கும்²⁰ புகட்டல்களாகவும் இது நயஞ்செய்யும்.

தேயம். பத்து முதல் இருபது கிறேன் வரைக்குக் கரைவாக்கிக் கொடுக்கலாம். காய்ச்சல்களில் குளிர்ந்த பானமாய்க் குடிப்பதற்கு இதில் ஒரு திரும்மை அரை நாழி தண்ணீரில் கரைத்துக்கொள்ளவும். வெளிமருந்தாயி வேதற்கு இதில் ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திரும் வரைக்கு அரைநாழி தண்ணீரில் கரைத்துக்கொள்ளவும்.

ராசீதம். பதாசீ துலோறசு வில்லை. Chlorate of Potash Lozenges. கொள். பதாசிகுலோறசு மாவாக மூவாயிரத்தறுதூறு கிறேன்; சுத்தசர்க்கரை. மாவாக இருபத்தைந்து அன்சு; அகசிப்பிசின்²¹, மாவாக ஒரு அன்சு; அகசிமுசிலாகு²² இரண்டு அன்சு; சுத்த தண்ணீர் ஒரு அன்சு, அல்லது போதியது. மாவான முதல் மூன்று மருந்துகளையுங் கலந்து சரியான பதமாய் வரத்தக்கதாய் முசிலாகையும் தண்ணீரையுங் கூட்டியரைக்கவும். 720 வில்லைகளாகத் தட்டி சூடான பரமானுவுள்ள அறையில் மட்டான சூட்டில் உலர்த்தவும். ஒவ்வொரு வில்லையிலும் பதாசிகுலோறசு ஐந்து கிறேன் இருக்கும்.

தேயம். ஒன்று துவங்கி ஆறு வில்லை வரைக்கும்.

பதாசீநீதுரசு. வேடியுப்பு, NITRATE OF POTASH.

இதற்குச் சின்னம் பரீஅ³. இது வியாபாரத்தில் வரும் அசுத்தமான வெடியுப்பிலிருந்து கரைத்து வறட்டிச் சுத்தமாய் எடுக்கப்படுவது. வெடியுப்பு இந்துவின் அனேக பகுதிகளிலும் மற்றுந் தேசங்களிலும் நிலத்தில் விளைந்திருக்கும். இது வெண்மையான கிரிஸ்தற் கட்டிகளாக அல்லது துண்டுகளாக வரும். வரியுள்ள அறுபுச பிரிசங்க²³ னாயிருக்கும். நிறமற்றது; ஓர்வகையான குளிர்ந்த உவர்ப்புச் சுவையுள்ளது. நெருப்பிலிட்டாற் படபடென்று வெடிக்கும். சோதனைக்குழவிலே செம்புப் பொடியோடும்

1 Oxygen. 2 Chloride of potassium. 3 Nitrate of silver. 4 Perchloride of platinum.

5 Typhoid fever. 6 Scarlatina. 7 Exanthemata. 8 Chronic Bronchitis.

9 Jaundice. 10 Mercurial cachexia. 11 Syphilis. 12 Diphtheria.

13 Scurvy. 14 Cancrum oris. 15 Aphthae. 16 Aphthous ulcer.

17 Cynanche. 18 Scrofulous ulcer. 19 Gonorrhoea. 20 Leucorrhoea.

21 Gum acacia, 22 Mucilage, 23 Prism.

சல்வுரிக்கமிலத்¹தோடும் காய்ச்சினுற் சிவந்த புகையைக் கக்கும். தண்ணீரில் கரைத்து ஐருகுலோறிக்கமிலத்தாற்²புளிப்பாக்கிப் பிலாடினபிரகுலோறிரஞ்³சேர்த்தால் ஓர் மஞ்சள்நிற அடையல் உண்டாகும். இதின் கரைவு பாரிதகுலோறிரத்தாலாவது வெள்ளிநீதுரசா⁵லாவது மாறுதலடையாது. தன்மை. இதைத் தாராளமாய்த் தண்ணீரில் கரைத்துக் கொடுத்தால் குளிர்மையும், அமுரிதியும், சுவேதனியுமாகும். கட்டியாய்க் கொடுத்தால் அல்லது சொற்ப தண்ணீரில் கரைத்துக் கொடுத்தால் அழற்றும், பிந்தின வகையிற் பெருந்தேயமாய்க் கொடுத்தால் நஞ்சாகும். கரைத்து வெளிமருந்தாயிட்டாலுங் குளிர்மையானது.

உபயோகம். சுர நோய்கள் தாபித்⁶நோய்களுக்கும், காலிக⁷தீவிர⁸வாதத்துக்கும், தசிரக் கிளர்ச்சியோடு கூடிய இரத்தப்பெருக்குக்கும், ஸ்கேவி⁹, எமற்சுப்பெபூறம்¹⁰, நீர்க்கோவைநோய்கள், திவ்மெனுறியம்¹¹, கனுறியம்¹², லுகறியம்¹³, சிலவகையான குன்மங்களுக்கும் இது உள்ளே கொடுக்கப்படும். வெளிமருந்தாக. தீவிரவகையான கண்ணோவுக்குக் கலுறியமாய்¹⁴இடப்படும். சைனன்கிக்குக்¹⁵ கார்கிலாக¹⁶ வழங்கப்படும். சமபங்கு அமோனத குலோறிரத்தோடு¹⁷கலந்து தண்ணீரில் கரைத்து குளிர்ந்த லோஷனா¹⁸ இடப்படும். வெடியுப்பைப் பூர்த்தியாய்க் கரைத்து அதிலே கடுதாசியைத் தோய்த்துக் காயவைத்து, எரித்து, அதிலெழுப்பும் புகையைச் சுவாசிப்பதால் ஈனையும் ஸ்பச¹⁹இருமல்களும் பெரும்பாலுஞ் சகாயப்படும்.

தேயம். பத்து முதல் முப்பது கிறேனை ஒரு அன்சுக்கு எட்டுக் கிறேன் வீதமாய் ஏதும் காரமற்ற நீரில் கரைத்துக் கொடுக்கவும்.

[இந்துக் கடைகளில் வரும் வெடியுப்புப் பெரும்பாலும் அசுத்தமானது. அதை உண்மருந்தாய் வழங்கவேண்டில் முதல் வெந்நீரில் கரைத்து நுரையைத் தன்னிப்போட்டு அடையலிட்டிப் பின்பு சணற்புடைவையில் வடித்து கிரிஸ்தலிக்க வைத்துச் சுத்தமாக்கிக்கொள்ளவேண்டும். சுத்தி செய்யும் முறையைப்பற்றி ஸ்தீவென்சன் பண்டிதர் விபரமாயெழுதியிருக்கிறார்.]

பதாசிபிரமங்கனசு. PERMANGANATE OF POTASH.

இதற்குச் சின்னம் பமங்அ₄. இது கருஞ் சிவப்பு நிறமான மெல்லிய பிரிசுக்²⁰ கிரிஸ்தல்களாக²¹இருக்கும்; மணமற்றது; இனிமையானதுவாரச்சுவை உடையது; தண்ணீரில் கரையக்கூடியது. ஒரு அன்சு²²தண்ணீரை நல்ல சிவப்புநிறமாக்குவதற்கு ஒரேயொரு சிறிய கிரிஸ்தற் துண்டு போதும். அந்த நீரைத் திட்டசீதிற்²³ சொற்பத்தோடு கலந்து காய்ச்ச, அது மஞ்சட் கபிலநிறமாகும். இக் கிரிஸ்தல்களைச் சிவக்கக் காய்ச்சினுற் படபடென்று வெடித்து, அச்சித்²⁴வாயுவைக் கக்கிக் கறுப்பான சேடத்தை விடும். இச் சேடத்தினின்று தண்ணீர் பதாசியை வாங்கும். அத் தண்ணீரின் அல்லைத்²⁵தன்மையினாலும் அதை ஐருகுலோறிக்கமிலத்தாற் புளிப்பாக்கிப் பிலாடின பிரகுலோறிரஞ் சேர்க்க, மஞ்சளடையலுண்டாவதாலும் அதிலே பதாசியிருப்பதைப் பகுத்தறியலாம். சோதனை. தண்ணீரில் முற்றாய்க்

1 Sulphuric acid. 2 Hydrochloric acid. 3 Perchloride of Platinum. 4 Chloride of Barium. 5 Nitrate of silver. 6 Inflammation. 7 Chronic. 8 Acute. 9 Scurvy. 10 Purpura haemorrhagica. 11 Dysmenorrhoea. 12 Gonorrhoea. 13 Leucorrhoea. 14 Collyrium. 15 Cynanche. 16 Gargle. 17 Chloride of ammonium. 18 Lotion. 19 Spasmodic. 20 Prism, 21 Crystal, 22 Ounce. 23 Rectified spirit, 24 Oxygen gas. 25. Alkali.

கரையும். ஐந்து கிறேனைத் தண்ணீரிற் கரைத்தால் அதின் நிறத்தைக் கொடுப்பதற்கு இரண்டு திரும் கிருசசல்வுரிக்கமில்¹த்தாற் புளிப்பாக்கப்பட்ட அயசல்வசுப்²பொடியில் நாற்பத்துநாலு கிறேன் கரைக்கப்பட்ட நீர் வேண்டும்.

தன்மை. அல்திறவம்³, வீரூன கந்தக்கினி⁴, பூதிக்கினி⁵.

உபயோகம். சர்க்கராழுரிக்கு இது உள்ளே கொடுக்கப்படும். நயமோசந்தேகம். மேலும் கீழே வரும் லோஷனாக⁶வும், சமபங் து கிரீத்⁷ மாவோடு கலந்து தூளாகவும், சீர்கெட்ட புண்களுக்கும் சளிச்சவ்விவூறு நீர்களின் நாற்றத்தை மாற்றுவதற்கும், தொண்டை தன்சில்களின்⁸ புண்ணுக்குக் கார்கிலாகவும் வெளிமருந்தாய் வழங்கப்படும்.

தேயம். ஒரு கிறேன் முதல் மூன்று கிறேன் வரைக்குத் தண்ணீர் தாராளமாய்க் கலந்து கொடுக்கவும்.

ரசிதம். பதாசி பிரமங்கனசு நீர். Solution of Permanganate of Potash. கொள். பதாசிபிரமங்கனசு, நாலுகிறேன்; திஸ்திலித்த தண்ணீர் ஒரு அன்சு. கரைக்கவும்.

இந்த நீர் கன்றியர் நீரிலும்¹⁰ வீறு குறைந்ததானாலும் அதற்கு ஒப்பானது. இது நல்ல கந்தக்கினி. ஆயினும் இதால் நயமுண்டாவதற்கு இது நாற்றமான பொருளிற் படவேண்டும். வெளிமருந்தாய் வழங்குவதற்குப் பத்து அன்சு தண்ணீருக்கு இதிலே ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திரும் வரைக்குக் கலக்கவேண்டும்.

தேயம். இரண்டு திரும் முதல் நாலு திரும் வரைக்கு.

பதாசிதாத்தரசு. TARTRATE OF POTASH.

இதற்குச் சின்னம் ப₃ கா₄ ஐ₄ அ₆. பதாசியமில்லதாத்தரசைப்¹¹பதாசிகாபனசால் தடஸ்தித்துப்¹³ பதாசிதாத்தரசு எடுக்கப்படும். இது நிறமற்ற சிறிய நாலு ஆறு பச்சமுன்ன பிரிசங்களாக¹⁴இருக்கும். சல்வுரிக்கமில்¹⁵தோடு காய்ச்சினால் கறுப்பான தார்¹⁶ போன்ற நீராகி எரியக் கூடியவாயுவையும், காய்ச்சிய சர்க்கரையின் மணத்தையும் வீசும். இந்த உப்பைத் தண்ணீர் கரைத்து அதற்குச் சல்வுரிக்கமில்த்தைச் சொற்பமாய்க் கூட்டினால் கிரீம் தாத்தர்¹⁷ என்ற வெண்மையான கிரிஸ்தல் அடையல் பிரியும். சோதனைகள். சமநிறையான தண்ணீரிலே முற்றாய்க் கரையும். வாயுகக்குதல் ஒழியுந்தனையும் 113 கிறேனைச் சிவக்கக்காய்ச்சினால் அல்கலையான¹⁸ ஓர் சேடம் மிஞ்சும். இதைச் சரியாய்ப் பூர்த்திப்பதற்கு அக்சலிக்கமில்¹⁹பருமவிலயனத்தல்²⁰ 1000 கிறேனைவு வேண்டும்.

தன்மை. சிறு தேயத்தில் அழுரிதி²¹, பருந்தேயத்தில் விரேசனி.

உபயோகம். சொற்ப காய்ச்சல் கூடிய குன்ம நோய்கள், ஈரல் நோய்களுக்கு இதை விரேசனியாய்க் கொடுப்பது நலம். விதீயசியில்²² சிறுநீரை அல்கலையாக்குவதற்காக இது கொடுக்கப்படும்.

1 Dilute sulphuric acid. 2 Sulphate of iron- 3 Alterative. 4 Deodorizer.

5 Antiseptic, 6 Lotion 7 Chalk. 8 Tonsil, லசனம். 9 Gargle. 10 Condyl's fluid. 11 Acid tartrate of potash, 12 Carbonate of potash. 13 Neutralize.

14 Prisin, 15 Sulphuric acid 16 Tar. 17 Cream tartar. 18 Alkali,

19 Oxalic acid, 20 Volumetric solution, 21 Diuretic,

22 Lithiasis.

தேயம். அமுரிதியாக நாற்பது கிறேன் முதல் ஒன்றரைத் திரும் வரைக்கும், விரேசனியாக இரண்டு திரும் முதல் அரை அன்சு வரைக்கும் அல்லது கூடவும் தண்ணீர் கரைத்துக் கொடுக்கலாம்.

பதாசியமிலதாத்தரசு. ACID TARTRATE OF POTASH.

இதற்குச் சின்னம் ப ஐ கா⁴ ஐ¹ அ⁶. இது ஓர் அமில உப்பு. திராட்சப் பழச்சாறு நொதிக்கும்போது அடைந்து காயும் ஓடான அடையலிலிருந்து இது எடுக்கப்படும். லட்சணங்கள், இது கரகரப்பான வெள்ளை மாவாயாவது, ஒரு பக்கத்திற் கிரிஸ்தலித்த தகட்டுத் துண்டுகளாயாவது இருக்கும். நல்ல புளிப்புச் சுவை கொண்டது. தண்ணீர்ச் சொற்பமாய்க் கரையும்; சீதிற் கரையாது. குகையில் இட்டுக் காய்ச்சினால் எரியக் கூடியவாயுவையும் காய்ச்சிப் சர்க்கரையின் மணத்தையும் வீச, காபனையும்¹ பதாசி² காபனையும் அடக்கிய கறுப்பான சேஷம் எஞ்சியிருக்கும். கிருசுவை ருகுலோறிக்கமில்³ சேர்க்க இது தீரைத்துக் கலவையாகும். இக் கலவையை வடித்துப் பிலாடின பிரகுலோறி⁴ஞ்சேர்க்கும்போது மஞ்சள்நிற அடையல் விழும். அமோனீ⁵த்தாற் தடஸ்தித்து அச்சலிக்கமில்⁶ஞ் செர்க்க அது சற்றே கலங்கலாகும். சோதனை. இதிலே 188 கிறேனை வாயுக் கக்குதல் ஒழியுந்தனையும் சிவக்கக் காய்ச்சி வரும் அல்கலைச் சேடத்தைச் சரியாய்ப் பூர்த்திப்பதற்கு அச்சலிக்கமில்பருமவிலயனத்தில் 1000 கிறேனை வடிவ வேண்டும்.

தன்மை. இது குளிர்மையானது. அமுரிதி, இளம் விரேசனி, பெருந்தேயத்தில் நீரடிக்கும் பேதி.

உபயோகம். சுரகோய்கள், தாபிதீ⁶ நோய்களுக்கு ஒரு அன்சுக்கு ஒரு கலன் வீதமாய் இதைத் தண்ணீர் கரைத்துச் சுவைப்படுத்திக் குடித்தால் உவப்பாயிருக்கும். நீர்க்கோவை நோய்களுக்கும், விசேஷமாய் அவை தீவிர சபல⁷ தன்மையாயிருக்கும்போதும், அல்புமினுரி⁸, ஈற்றம்ப⁹, திசந்தெரி¹⁰, பெரிபெரி¹¹, அரிச முளைக¹²ளுக்கும் மற்றும் விரேசன அமுரித மருந்துகளோடு இது நல்ல அனுமருந்தாகும்.

தேயம். இருபது கிறேன் முதல் நாற்பது கிறேன் வரைக்குக் கன தண்ணீர் கரைத்துக் கொடுத்தால் நல்ல குளிர்மையும் அமுரிதியுமாகும். ஒரு திரும் இரண்டு திரும் கொடுத்தால் இளம் பேதியாகும். மூன்று திரும் முதல் ஆறு திரும் வரைக்குக் கொடுத்தால் கடும் பேதியாகும்.

ஐலப்பு¹³க்கூட்டுச் சூரணத்திலும், கெந்தக லேகியத்திலும் பதாசியமிலதாத்தரசு ஓர் கூறுகச் சேருகின்றது.

பதாசிசிதிறசு. CITRATE OF POTASH.

இதற்குச் சின்னம் ப₃ கா⁶ ஐ³ அ⁷. பதாசிகாபனசைச்¹⁴சுதிறிக்கமில்¹⁵தால் கூறுபடுத்த இது பிறக்கும். லட்சணங்கள். இது வெள்ளையானது; உவர்ப்பான சொற்ப புளிப்புச் சுவையுள்ளது; பரமாணுவில் வைத்தால் நீரை உறிஞ்சிக் கரையும். தண்ணீர்ச் சுறுக்குக்கரையும். சல்புரிக்கமில்¹⁶

1 Carbon, 2 Potash. 3 Dilute hydrochloric acid, 4 Perchloride of platinum.

5 Ammonia, 6 Inflammation, 7 Acute. 8 Albuminuria, 9 Hepatitis.

10 Dysentery. 11 Beri beri, 12 Haemorrhoid, 13 Jalap, 14 Carbonate of potash. 15 Citric acid, 16 Sulphuric acid.

த்தோடு கலந்து காய்ச்சினுற் கபிலநிறமான நீராடி, எரியக்கூடிய வாயுவைக் கக்கி, அசிதிக்கமில்த்தின்¹ மணத்தை வீசும். இதின் கரைவைக் கல்சிகு லோறிர²நீரோடு கலந்தாற் கொதிக்கக் காய்ச்சுந்தனையும் அது தெளிவாயிருக்கும். கொதிக்கவோ அசிதிக்கமில்த்திற் சுறுக்காய்க் கரையக்கூடிய வெண்ணடையல் பிரியும். இதின் கரைவை ஐருகுலோறிக்கமில்³த்தாற் புளிப்பாக்கிப் பிலாடினபிரகுலோறிரஞ்⁴ சேர்க்க, மஞ்சள்நிற அடையலுண்டாகும். சோதனை. இதில் 102 கிறேனை வாயுக்கக்குதல்ஒழியுந்தனையும் சிவக்கக் காய்ச்சி வரும் அல்கலைச் சேஷத்தைச் சரியாய்ப் பூர்த்திப்பதற்கு அக்சவிக்கமில்⁵ பருமவிலயன⁶த்தில் 1000 கிறேனைளவு வேண்டும். பரமாணுபட்டாற் கரையுமாதலால் கண்ணாடிச்சடையால் அடைத்த சீசாக்களிற் போட்டு வைக்கவேண்டும்.

தன்மை, உபயோகம். சுர நோய்கள், தாபித⁷நோய்களுக்குக் கொடுக்க இது உத்தமமான குளிர்மையும், அமுரிதியுமான மருந்து, இதைக் குடிக்கச் சிறுநீர் அல்கலை⁸யாகுமாதலால் வீதியிக்கும்⁹, சிறுநீரின் அமில நிலைமைக்கும் இது உவந்தது.

தேயம். இருபது கிறேன் முதல் நாற்பது கிறேன் வரைக்குத் தண்ணீரிற் கரைத்து நாள் மூன்றுநாலுமுறை கொடுக்கலாம்.

பதாசியசிதசு. ACETATE OF POTASH.

இதற்குச் சின்னம் K^{A} ஐ³ அ². பதாசிகாபனசை அசிதிக்கமில்த்தாற் கூறுபடுத்த இது பிறக்கும். லட்சணங்கள். வெண்மையானது; பட்டுளுந்திரனையாலான படலம் போன்றது. பரமாணுவிற் சுறுக்குக் கரையக்கூடியது. இதைத் தண்ணீரிற் கரைத்துத் தாத்தரிக்கமில்ஞ்¹¹ சேர்த்தால் கிரிஸ்தலான அடையலுண்டாகும்; சல்வுரிக்கமில்ஞ்¹² சேர்த்தாலோ அதினின்று அசிதிக்கமில்ம் பறியும்; சாரங் குறைந்த அயபிரகுலோறிர கரைவைச் சேர்த்தால் இரத்தம்போற் சிவப்பாகும். சோதனைகள். சோதனைத் தாளுக்குத்¹³ தடஸ்தமாய்¹⁴ நிற்கும்; திட்டசீதிலே¹⁵ முற்றாய்க் கரையும். இதின் விலயனம் அமோனதசல்விரத்தால்¹⁶ மாறுதலடையமாட்டாது,

தன்மை. இது அல்திறவம்¹⁷, அனுகூலமான அமுரிதி; பெருந்தேயத்திற் பேதி; ஆனால் அப்படிக் கொடுப்பதரிது.

உபயோகம். நீர்க்கோவை¹⁸நோய்கள், தீவிர¹⁹வாதம், காலிக²⁰சருமநோய்கள், கனுறீயம்²¹, குடல்வீக்கம், கோளவீக்கங்களுக்கு இது அதிஉபயோகமானது.

தேயம். அமுரிதி அல்திறவமாக இருபது கிறேன் முதல் நாற்பது கிறேன் வரைக்கு நாள் மூன்று நாலு முறை கொடுக்கலாம். விரேசனியாக இரண்டு மூன்று திராங் கொடுக்கலாம்.

பதாசியவியோதிரம். IODIDE OF POTASSIUM.

இதற்குச் சின்னம் பஇ. இது நிறமற்றது. பெரும்பாலும் மங்கலாய்க் கன வடிவக் கிரிஸ்தல்களாகவிருக்கும். தண்ணீரிற் சுறுக்குக் கரையும்;

1 Acetic acid. 2 Chloride of calcium. 3 Hydrochloric acid. 4 Perchloride of Platinum. 5 Oxalic acid. 6 Volumetric solution. 7 Inflammation.

8 Alkali. 9 Lithiasis, அமுரிக்கல். 10 Carbonate of potash. 11 Tartaric acid. 12 Sulphuric acid. 13 Test paper. 14 Neutral. 15 Rectified spirit. 16 Sulphide of Ammonium. 17 Alterative. 18 Dropsy. 19 Acute. 20 Chronic. 21 Gonorrhoea.

சீதற் கொஞ்சங் கரையும். இதற்குப் பெரும்பாலும் சொற்ப அல்கலைத் தன்மையுண்டு. இதைத் தண்ணீர் கரைத்து அமைல¹முசிலாகுடன்² கலந்து குலோற்³நீர் சொற்பங் கூட்டினால் வெண்மஞ்சள் நிறங் காட்டும். தாத்தரிக்கமில்⁴ சேர்க்கக் கிரிஸ்தலான அடையல் காணும். சோதனைகள், இதைத் தண்ணீர் கரைத்துத் தாத்தரிக்கமில்மும் அமைலமுசிலாகுஞ் சேர்க்க நீலநிறந் தோன்றாது. தாத்தரிக்கமில்ங்கூட்டக் கபிலமாகாது. வெள்ளிநீதரசை⁵ மிஞ்சக் கூட்டினால் வெண் மஞ்சள் நிற அடையலுண்டாகும். இந்த அடையலை அமோனத்⁶தோடு குலுக்கினால் அமையும்போது தெளிந்த நீராகும். இதை நீதரிக்கமில்ங்⁷ கரைக்கமாட்டாது. இந்த உப்பினை தண்ணீர்க்கரைவுக்கு இனிப்பான சுண்ணநீரைக் கூட்டச் சொற்ப அடையல் மாத்திரம் தோன்றும்.

தன்மை. உச்சித அல்திறவும், அமுரிதி, சோஷணிகளை அருட்டும்; தானிகமாயிட்டால் அழற்றும்.

உபயோகம். இயோதத்தைப் போலவே. உபசிவ்லிக⁸ நோய்க்கும் விசேஷமாய் ஏலும்பையும் அதின் உறையையும் பற்றியதற்கும், ஸ்துரும⁹ நோய்க்கும் பிரதானமாய்க் கண்ணைப்பற்றியதற்கும், தாபிதத்தின்¹⁰ பிற்கூற்றில் பொசிந்த நீர்கள் வைப்புகளை வற்றப்பண்ணுவதற்கும் இது நயந்தது. மற்ற நோய்களுட் காலிகதாபிதம், ஈரலின்¹¹ காலிகதாபிதமான வீக்கம், பிளிகை¹² வீக்கம், நீர்க்கோவைகள், பொருத்துநீர்க்கோவை, கபாலநீர்க்கோவை, குவாதம்¹³, வாதம், காலிகபுறங்கீது¹⁴, மச்யாந்திரகசம்¹⁵, புறங்குசில்¹⁶, செறியுநஞ்சுகள், ஈயம், இரகநஞ்சுகளுக்கும், சிலவகையான நுறல்சி¹⁷ நோய்கள், சிரா¹⁸ நோய்களுக்கும், விசேஷமாய் இவை சிவ்லிகக் கறையைப் பற்றியிருக்கும்போது இது உபயோகமானது. வெளிமருந்தாயிட்டால் பொசிந்த நீர்கள் வைப்புகளை வற்றப்பண்ணுவதில் உள்ளே கொடுத்ததற்கு உதவியாகிப் பலவகையான சருமநோய்கள் தொல்லையான புண்களை மாற்றும்.

தேயம். இரண்டு கிரேன் முதற் பத்துக் கிரேன் வரைக்குத் தண்ணீர் கரைத்து நான் இரண்டு மூன்று முறை கொடுக்கலாம்.

ரசிதங்கள். பதாசியவியோதிரவன்கென். Ointment of Iodide of Potassium. கொள். பதாசியவியோதிரம் அறுபத்துநாலு கிரேன்; பதாசிகாபனசு¹⁹ நாலு கிரேன்; தண்ணீர் ஒருதிரும்; பூதலாடு²⁰ ஒரு அன்சு. பதாசியவியோதிரத்தையும் பதாசிகாபனசையுந் தண்ணீர் கரைத்து லாட்டோடு திறமாய்ச் சேர்க்கவும்.

இயோத²¹லினிமென்²², இயோதநீர், இயோதரஞ்சம்²³, இயோதவன்கென்சு விந் பதாசியவியோதிரம் ஒர் கூராகச் சேருகின்றது.

பதாசியவியோதிரசுபுலின்மென். Liniment of Iodide of Potassium and Soap. கொள். வன்சுபு, சிறுக வெட்டி, பதாசியவியோதிரம், வகைக்கு ஒன்றரை அன்சு; கிலைசரின்²⁴ ஒரு அன்சு; லெமன்²⁵தேல் ஒரு திரும்; தண்ணீர் பத்து அன்சு. சபுவை ஏழு அன்சு தண்ணீரில் நீர்மத்திகத்²⁶ தன் குட்டிற் கரைத்துப் பதாசியவியோதிரத்தையும் கிலைசரினையும் சேஷ

1 Amylum. 2 Mucilage. 3 Chlorum. 4 Tartaric acid. 5 Nitrate of silver. 6 Anemia. 7 Nitric acid. 8 Secondary syphitis. 9 Struma. 10 Inflammation.

11 Liver. 12 Spleen. 13 Gout. 14 Bronchitis. 15 Tabes mesenterica.

16 Bronchocele. 17 Neuralgia. 18 Nervous. 19 Carbonate of Potash.

20 Prepared Lard. 21 Iodum. 22 Liniment. 23 Tincture.

24 Glycerine. 25 Lemon oil. 26 Water bath.

மான தண்ணீரில் கரைத்து, இரண்டு நீர்களையும் ஒன்றாகக் கலந்து அக்கலவை ஆறியபின் வெமன் தேலைக் கூட்டி முழுவதையும் சிறமாய்க் குலுக்கவும்.

பதாசியவியோதிரத்தை வெளிமருந்தாய் வழங்குவதற்கு மேற்கண்ட இரண்டு ரசிதங்களும் தகுதியானவைகள்.

பதாசியபுரோமீரம். BROMIDE OF POTASSIUM.

இதற்குச் சின்னம், பபு. இது நிறமற்ற கன வடிவக் கிரிஸ்தல்களாகவிரும்பும்; மணமற்றது; காரமான உவர்ப்புச் சுவையுள்ளது; தண்ணீரில் சுறுக்குக் கரையும்; சீதிலே சொற்பங் கரையும்; இதின் தண்ணீர்க்கரைவுக்குத் தாத்தரிக்கமில்லா¹ சேர்க்க வெண்மையான கிரிஸ்தல்கள் அடையும். இதின் தண்ணீர்க்கரைவைச் சொற்ப குலோறத்²தோடு கலந்து அத்தோடு ஈதரைக்³கூட்டிக் குலுக்கினால் அந்த ஈதர் மேலாய் வரும்போது சிவத்த நிறங் காட்டும். சோதனைகள். இந்த உப்பிலே பத்துக் கிரேனைப் பூரணமாய்க் கூறுபடுத்துவதற்கு வெள்ளீநீரசுப்⁴ பருமவிலயன⁵த்தில்த் 840 கிரேனைளவு வேண்டும். இந்த உப்பின் விலயனத்தை அமைவமு சிலாகுடன்⁶ கலந்து குலோறநீரிலே ஒரு துளியை அதற்குள்ளே விட்டால் நீலநிறங் காட்டாமற் செம்மஞ்சள் நிறங் காட்டும்.

தன்மை. பதாசியவியோதிர⁷த்தின் தன்மை போலவே. ஆயினும் இது சனன உறுப்புகளிலும் சனனத் தொழிலிலும் வீரான சாந்தன⁸செயல் காட்டும். மேலும் இது சளிச்சவ்விலும் விசேஷமாய்த் தொண்டை குரல்வளைகளின்சளிச்சவ்விலும் உணர்ச்சியின்மையை உண்டாக்கும். ஆகையால் குரல்வளையைச் சோதிப்பதற்கும் அதிற் சத்திரமிடுவதற்கும் ஆன ஆயத்தப்படுத்துவதற்கு இது உவந்தது. வெளிமருந்தாயிட்டால் இது ஸ்திமுல¹⁰மாகும்.

உபயோகம். நிம்வுமானியை¹¹, பிரீயபிசம்¹², பங்குரம்¹³ என்ற நோய்களுக்கும் சிலவகையான ஸ்பமதுறீயம்¹⁴, மெனுறீயம்¹⁵, என்பவற்றுக்கும், காமக் கிளர்ச்சியைப்பற்றிய எபிலெப்சி¹⁶, இஸ்தேரி¹⁷ நோய்களுக்கும், இது உத்தம மருந்து. மேலும் ஸ்துரூம்¹⁸ நோய்களுக்கும் ஈரல் பிளிகைகளின் வீக்கத்துக்கும் அமெனுறீயம்¹⁹, ஈனுறீயம்²⁰, பிள்ளைகளிலுண்டாம் சலவொழுக்குக்கும் ஈளை, ஸ்பச இருமல்களுக்கும்²¹, இதயநிபோஷம்²², தொல்லையான சருமநோய்களுக்கும் இது கொடுக்கப்படும்.

தேயம். ஐந்து முதல் முப்பது கிரேன் வரைக்குத் தண்ணீரில் கரைத்தாவது குளிகையாக்கியாவது கொடுக்கலாம்.

சோடதம். SODIUM.

சின்னம், சோ; அணுப்பாரம். 23.

சோடதம் என்பது சோடத்²³துக்குத் தாரக²⁴மாகியலோகம். இது மெழுகு போல் மெதுவானது; பலகையாய் அடிபடக் கூடியது. வெள்ளிபோல்

¹ Tartaric acid. ² Chlorum. ³ Ether. ⁴ Nitrate of Silver. ⁵ Volumetric solution.

⁶ Mucilage of starch. ⁷ Iodide of Potassium. ⁸ Sedative. ⁹ Larynx. ¹⁰ Stimulant.

¹¹ Nymphomania. ¹² Priapism. ¹³ Chordee. ¹⁴ Spermatorrhoea.

¹⁵ Menorrhoea. ¹⁶ Epilepsy. ¹⁷ Hysteria. ¹⁸ Struma. ¹⁹ Amenorrhoea.

²⁰ Gonorrhoea. ²¹ Spasmodic cough. ²² Hypertrophy of heart.

²³ Soda, ²⁴ Base.

மினுக்கமுடையது; பரமானுவிலே வைத்தாற் சுறுக்கு அக்சிரித்துப்¹ பிரபையான மஞ்சட்சுவால கொண்டு எரியும். 207.7 பாகையில் உருகும். இதின் விசேஷகிராவிதம்² 0.97. இது தண்ணீரைக் கூறுகளாகப் பிரித்து ஐருத³ வாயுவை விட்டுக் காரச் சோடமாகக் கரையும். இது சோது என்ற சின்னத்தையுடைய சோடதகுலோறி⁴ரம் என்ற கறியுப்பாக இயற்கையில் அதிகமாயுண்டு. பிராணியநீர்கள் அனேகத்தில் இதுவுமோர் கூறு.

காரச் சோடம். CAUSTIC SODA.

இதற்குச் சின்னம், சோஐஅ. இதைச் சோடவைரசு என்றும் சொல்வார்கள். சோடநீரை வெள்ளிக் கலத்திலே வற்ற வறட்டி மறுபடி உருக்கிக் காரச் சோடத்தைச் சொற்ப அசுத்தங் கலந்தாயெடுப்பார்கள். லட்சணங்கள். வன்மையாய் நரை வெள்ளை நிறமான தகட்டுத் துண்டுகளாகவிருக்கும். மெத்த அல்கலையானது. அரிக்கக்கூடியது. இது சுவாலைக்கு மஞ்சள்நிறங் கொடுக்கும். இதைத் தண்ணீர் கரைத்து நீதுரிக்கமில்த்தால்⁵ புளிப்பாக்கினால் இதிலே அசுத்தங்களிருப்பதால் வெள்ளிநீதுரசை⁷யாவது, பாரியகுலோறி⁸ரத்தை⁸யாவது சேர்க்கும்போது சொற்ப வெண்ணடையல் காணும். பிலாடின பிரகுலோறி⁹ரஞ் சேர்த்தாலோ அடையல் காணாது. சோதனை. இதிலே நாற்பது கிறேனைத் தண்ணீர் கரைத்தால் அதிலே மண்டிவிடுவதரிது. இவ்வளவையுந் தடஸ்திப்பதற்கு அக்சலிக்கமில்¹⁰பரும விலயனத்தில்¹¹ 900 கிறேனளவு வேண்டும். பரமானுவில் வைத்தால் இது கரைந்துபோகுமாதலால் பச்சைக்கண்ணாடிச் சீசாவில் இட்டு கண்ணாடிச் சடையால் நன்றாயடைத்து வைக்கவேண்டும்.

தன்மை, உபயோகம். இது காரம். தகனி. காரப் பதாசியைப் போல அது வழங்கும் நோய்களுக்கே இதுவும் வழங்கப்படும். அதைப் போல இது சுறுக்கு உருகாதாகையால் அதிலும் இதை வழங்குவது இலகு.

சோடநீர். SOLUTION OF SODA.

சோடகாபனசைத் தண்ணீர் கரைத்துக் காய்ச்சிக் கொதிக்கும்பொழுது நீறின சுண்ணாம்போடு கலக்க அடையும் மண்டி சுண்ணகாபனசாகும்; அதிலே தெளிந்த நீர் சோடநீராகும். லட்சணங்கள். இது தெளிந்த உருவொளியானதாய் மணமற்ற வீரூன அல்கலைச் சுவையுள்ள நீர். சோதனைகள். விசேஷகிராவிதம் 1.047. இதிலே ஒரு அன்சைத் தடஸ்திப்பதற்கு அக்சலிக்கமில்பருமவிலயனத்தில் 470 கிறேனளவு வேண்டும். இதை மிஞ்சிய கிருசுவைருகுலோறிக்கமில்¹²தோடு கூட்டும்போது நுரைக்காது. சுண்ணநீரோடாவது அமோனவச்சலசு¹³நீரோடாவது கூட்டும்போது அடையல்தோன்றாது. இதை மிஞ்சிய கிருசநீதுரிக்கமில்¹⁴தோடு¹⁴ கலந்த முற்றாய் வறட்டி அடையும் சேடத்தைத் தண்ணீர் கரைத்தால் தெளிந்த நீராகும், அதிலே அசுத்தங்கள் இருப்பதால் பாரியகுலோறி⁸ரமாவது, வெள்ளிநீதுரசாவது சேர்க்கக் கலங்கலாகும். அமோனத்துக்கோ கலங்காது. இதில் ஒரு அன்சிலே சோடவைரசு 18.8 கிறேன் அடங்கியிருக்கும்.

1 Oxydize. 2 Specific gravity. 3 Hydrogen. 4 Chloride of sodium. 5 Alkali. 6 Nitric acid. 7 Nitrate of silver. 8 Chloride of Barium. 9 Perchloride of Platinum. 10 Oxalic acid. 11 Volumetric solution. 12 Dilute Hydrochloric acid. 13 Oxalate of Ammonia. 14 Dilute Nitric acid.

இதைப் பச்சைச் சீசாக்களிலிட்டுக் கண்ணாடிச்சடையால் நன்றாய் அடைத்துவைத்திருக்கவேண்டும்.

தன்மை, உபயோகம். பதாசி நீரைப் போலவே. பித்தக் குழப்பத்தோடு கூடிய சிலவகைக் குன்மத்துக்கு இது விசேஷமாய் உவர்த்தது.

தேயம். பத்துத்துளி முதல் ஒரு திரும் வரைக்குத் தண்ணீரில் தாராளமாய்க் கலந்துகொடுக்கவும்.

கரரச் சோடம் செய்வதற் சோடநீர் வழங்கப்படும்.

சோடகாபனசு. CARBONATE OF SODA.

இதற்குச் சின்னம் சோ₂ கா₂ 10ஐஅ. இது கடற் பூண்டுகளின் சாம் பலிலிருந்து எடுக்கப்படும். அல்லது சோடசல்வசைக்¹ கெமிஸ்த முறையாய்க் கூறுபடுத்தி எடுக்கப்படும். லட்சணங்கள். உருவொளியான நிறமற்ற சதுபுச கிரிஸ்தற் தகடுகளாக விருக்கும். பரமாணுவில் வைத்தாற் தூளாகும். கார்ப்பான அல்கலைச்² சுவையும் அல்கலைத் தன்மையுமுடையது. இது சுவாலைக்கு மஞ்சள் நிறங் கொடுக்கும். கிருசவைருகுலோறிக்கமில³த்திற் போட்டால் நுரைகொண்டு கரையும். அக் கரைவுக்குப் பிலாடினபிரகுலோறிரஞ்⁴ சேர்த்தால் அடையலுண்டாகாது. சூட்டுக்குக் கரைந்துருகிக் காய்ந்து தன் நிறையில் நூற்றுக்கு அறுபத்துமூன்று பங்கை இழக்கும். சோதனைகள். நீதுரிக்கமிலத்தை⁵ மிஞ்சக் கூட்டினாற் பாரியகுலோறிர⁶மாவது வெள்ளநீதுரசாவது⁷சேர்க்கும்போது சொற்ப அடையல்மாத்திரமுண்டாகும். இதிலே நூற்று நாற்பத்துமூன்று கிறேனைத் தடஸ்திப்பதற்கு அக் சலிக்கமில⁸பருமவ்லயனத்தில் 960 கிறேனளவாகுதல் வேண்டும்.

தன்மை, உபயோகம். சோடதுவிகாபனசைப் போலவே. அதிலும் இது காரமானது.

தேயம். ஐந்து கிறேன் முதல் முப்பது கிறேன் வரைக்குத் தண்ணீரில் கரைத்துக் கொடுக்கவும். நுரைபானங்கள் செய்வதற்கு இதில் இருபது கிறேனை, சிதறிக்கமிலத்தில்⁹ ஒன்பதேழுக்காற் கிறேனும் தாத்தரிக்கமிலத்திற்¹⁰ பத்தரைக் கிறேனும் எலுமிச்சம் பழச்சாற்றில் இரண்டரைத்திரும்பும் பூர்த்திக்கும்.

ரசிதம். வறுத்த சோடகாபனசு. Dried carbonate of Soda. கொள். சோடகாபனசு, எட்டு அன்சு. சோடகாபனசை மணல் மத்திகத்திற்¹¹ போட்டு நல்ல மணற் சூட்டில் வறுத்து முதல் உருகு நீர் வற்றி இறுகுந்தனையும் வறுத்து அதை மாவாக அரைத்துக் கண்ணாடிச் சடையால் அடைத்த சீசாக்களற் போட்டு வைக்கவும்.

தேயம். மூன்று கிறேன் முதற் பத்துக்கிறேன் வரைக்குங்கொடுக்கலாம்.

[இந்துவில் பிறுக்கிச் சலிகோனிப்பூடு¹², துடிவிலோரச் சுவீதப்பூடு¹³, உமரியென்றவைகளையும் ஒருவேளை இவைபோன்ற மற்றும் பூடுகளையும் சாம்பலாக்கி அச் சாம்பலிலிருந்து அசுத்தமான சோடகாபனசை அதிகமாய் எடுப்பார்கள். இது இந்துஸ்தானிப் பாஷையில் காரச்சர்ச்சி¹⁴ எனப்படும். வங்காளத்தில் மண்கேர்¹⁵ முதலிய சில பகுதிகளில் நிலத்திலிருந்து ஒரு வகையான மண் எடுக்கப்படும். இவ்விரண்டையும் மாறிவழங்கப்படாது.

1 Soda sulphate. 2 Alkali. 3 Dilute Hydrochloric acid. 4 Perchloride of Platinum. 5 Nitric acid. 6 Chloride of Barium 7 Nitrate of Silver. 8 Oxalic acid, 9 Citric acid. 10 Tartaric acid. 11 Sand bath. 12 Salicornia Brachiata. 13 Suaeda nudiflora. 14 Khar-suji, 15 Monghyr.

இந்த மண்ணிலே துற்றுக்கு 40 முதல் 50 பங்கு வீதமாய்ச் சோடகாபனகம், நற்ப அளவான சோடசல்வசம், இந்திர பதார்த்தம், களிமண், மணல், இரும்புக் கறைகளும் அடங்கியிருக்கும். இதிலிருந்து சோடகாபனக செய்யுமுறையை வங்காள சிகிச்சா வாகடங் கூறுகின்றது. ஆயினும் இங்கிலாந்திலிருந்து வரும் சரக்கைப்பார்க்க மலிவாய் இதிலிருந்து செய்யக்கூடுமென்பது சந்தேகம். பரமகால் என்ற இடத்திலுள்ள சோடமண்ணிலங்களைப் பற்றி கம்பெல் தனகர்த்தன் விவரித்திருக்கிறார்.]

சோடதுவிகாபனக. BICARBONATE OF SODA.

இதற்குச் சின்னம் சோ ஐ கா அ³. மாபிட் கற்றுண்டுகளிலே ஐருகு லோறிக்கமிலத்தை வார்த்து அக்வெழுமும்பும் காபனிக்கமில¹வாயுவை ஒரு பங்கு சோடகாபனகம் ஒன்றரைப்பங்கு வறுத்த சோடகாபனகங் கலந்த கலவைக்கூடே தாரையாகச் செல்லவிட்டுப் பூர்த்திக்கச் சோடதுவிகாபனக பிறக்கும். லட்சணங்கள். இது வெள்ளை மாவாக அல்லது மங்கற்செதில்களாக இருக்கும்; உவர்ப்புச் சுவைகொண்டது; சுவாலைக்கு மஞ்சள்நிறங் கொடுக்கும்; கிருசுவைருகுலோறிக்கமில²த்திலே மெத்த நுரைத்துக் கரையும்; இக்கரைவிலே பிலாடின பிரகுலோறிர்³ யாதொரு அடையலுமுண்டாக்காது. சோதனைகள். இதைத் தண்ணீர் கரைத்து நீதுரிக்கமிலத்தாற்⁴ புளிப்பாக்கினாற் பாரியருலோறிர்⁵மாவது வெள்ளிநீதுர்⁶சாவது அதிலே அடையலைத் தோற்றுவிப்பதரிது, என்பத்துநாலு கிறேனைச் செஞ்சுட்டில் வைத்தால் ஐம்பத்துமுன்று கிறேன் அல்கலை⁷ மிஞ்சும். அவ்வளவையும் தடஸ்தி⁸ப்பதற்கு அக்சலிக்கமில⁹பருமவிலயன¹⁰த்தில் 1000 கிறேனைவு வேண்டும்.

தன்மை. முதலாவது அபாமிலி¹¹, இரண்டாவது அல்திறவம்¹².

உபயோகம். சீரணபாதையிலுண்டாகும் புளிப்புக்கும், கடியல்சு¹³, தியறீயம்¹⁴, வாயுப்பொருமல், அவற்றைச் சார்ந்த வாந்திக்கும், இது உத்தம மருந்து. விதிபசி¹⁵, வாதம், அல்புமினூறி¹⁶, ஏமநெச்சுப்பெபூறம்¹⁷, என்றநோய்களுக்கும் இது உபயோகமானது. நாட்பட்ட சருமநோய்கள், சிலவற்றுக்கு விசேஷமாய்ப் பருக்கள், செதில்கள் வகையைச் சேர்ந்த சருமநோய்களுக்கு இது உன்மருந்தாயும் தோயம்¹⁸, லோஷன்¹⁹, அன்கென்²⁰ என்றவகையான வெளிமருந்தாயும் சித்தியாய் வழங்கப்படும்.

தேயம். பதினைந்து கிறேன் முதல் நாற்பது கிறேன் வரைக்குத் தண்ணீர் கரைத்துக்கொடுக்கவும்.

ரசிதங்கள். சோடதுவிகாபனக. Effervescing solution of soda. கொள். சோடதுவிகாபனக, முப்பது கிறேன்; தண்ணீர் அரைநாழி. சோடதுவிகாபனகைத் தண்ணீர் கரைத்து வடித்துவைத்துக்கொண்டு, சல்வூரிக் கமிலத்தைக்²¹ கிரீதத்தின்²²மேல்வார்த்து அதிலுண்டாகுங் காபனிக்கமில வாயுவைச் சுத்தியாகக் கழுவி அந்த நீருக்குள்ளே ஏழு பரமானுவின் அழுக்கத்தோடு செலுத்தவும். அழுக்கப்பட்ட வாயு பறிந்துபோகாதபடி அந்த

1 Carbonic acid. 2 Dilute. 3 Perchloride of Platinum. 4 Nitric acid 5 Chloride of Barium 6 Nitrate of silver. 7 Alkali. 8 Neutrallize. 9 Oxalic acid, 10 Volumetric solution. 11 Antacid. 12 Alterative. 13 Cardialgia. 14 Diarrhoea. 15 Lithiasis. 16 Albuminuria. 17 Purpura Haemorrhagica. 18 Bath. 19 Lotion. 20 Ointment. 21 Sulphuric acid. 22 Chalk.

நீரைக் கண்ணாடிச் சடையால் நன்றாயடைத்த சீசாக்களிற் பேணீவைக்கவும். லட்சணங்கள். இந்நீரை அடக்கிய சீசாவைத் சிறந்தவுடன் காபனிக்கமில் வாயுப் பறிய நீர் பெலனாய்க் குமிழித்துப் பொங்கும். இந்த நீர் தெளிந்தது; குமிழிக்கும்; உவப்பான புளிச் சுவையுள்ளது. சோதனைகள். இதற் பத்து அன்சை ஐந்துமினி நேரமாகக் காய்ச்சினபின் அதைத் தடஸ்திப்பதற்கு அக்சலிக்கமில்¹ பருமவிலயனத்தில்² 178 கிறேனை வு வேண்டும்.

இது பேர்பெற்ற அபால்கலையும்³ குளிர்மையுமானது. வாடிக்கையான பேச்சில் சோடநீர்⁴ என்று சொல்லப்படுவதாகிய காபனிக்கமில்மும் தண்ணீருஞ் சேர்ந்த நீர் என்று இதை எடுத்துக்கொள்ளப்படாது.

நுரைசோடசீதிநுதாத்தரசு. Effervescent citro-tartrate of soda. கொள். சோடதுவிகாபனசு, மாவாக, பதினேழு அன்சு; தாத்தரிக்கமில்⁵ மாவாக எட்டு அன்சு; சிதிறிக்கமில்⁶ மாவாக ஆறு அன்சு. மாக்களை த்திறமாய்க் கலந்து, 200 பாகைக்கும், 220 பாகைக்குமிடையான சூடு கொள்ளக் காய்ச்சத் தகுந்த பாத்திரத்தில் இட்டு, மாவின் இம்மிகள் திரளத் துவங்கின நேரந் தொடங்கி, அவை சிற்றுண்டையாகுந்தனையும் கெதியாய்க் கலக்கி, ஒரே பருமையும் வசதியான அளவுமான உண்டைகளைத் தகுந்த அரிப்பெட்டியாற் பிரித்து, நன்றாயடைத்த சீசாக்களில் இட்டு வைக்கவும்.

நன்மை. இது நல்ல குளிர்மையானது.

தேயம். அரைத்திரும் முதல் இரண்டு திரும் வரைக்குத் தண்ணீரிற் கரைத்துக் கொடுக்கவும்.

சோடதுவிகாபனசு வில்லை. Bicarbonate of soda Lozenges. கொள். சோடதுவிகாபனசு, மாவாக, மூவாயிரத்தறுநூறு கிறேன்; சுத்தசர்க்கரை மாவாக, இருபத்தைந்து அன்சு; அகசிப் பிசின்மா⁷ ஒரு அன்சு; அகசிமுசிலாகு⁸ இரண்டு அன்சு; திஸ்திலித்த தண்ணீர் ஒரு அன்சு. மாக்கள் எல்லாவற்றையுஞ் சேர்த்து தகுந்த பதம் வரத்தக்கதாய் முசிலாகையும் தண்ணீரையுஞ் சேர்த்து 720 வில்லையாகத் தட்டி வெப்பமான அறையில்⁹ மட்டான அனலிற் காயவைக்கவும்.

தேயம். ஒன்று முதல் ஆறு வில்லை வரைக்கு. ஒவ்வொரு வில்லையிலும் ஐந்து கிறேன் சோடதுவிகாபனசு இருக்கும்.

சோடதுவிபோறசு. வெண்காரம்.

BIBORATE OF SODA. BORAX.

இதற்குச் சின்னம் சோ₂ போ₄ அ₇ 10ஐ₃ அ. திபெத்திலும் மற்றும் ஆசியத்தின் உஷ்டண பகுதிகளிலுமுள்ள வாலிக்கரைகளிற் தண்ணீர் வலிய வற்றுவதால் அசுத்தமான வெண்காரம் விளைகின்றது. மேலும் சோடகாபனசைப்¹⁰ போறசிக்கமில்¹¹நீரிற் தகுந்த பிரமாணமாய்க் கரைத்துக்காய்ச்சி இது உண்டாக்கப்படும். லட்சணங்கள். இது உருவொளியான நிறமற்ற கிரிஸ்தல்களாக இருக்கும். பரமானுவில் வைத்தாற் சில்வேனை

¹ Oxalic acid. ² Volumetric solution. ³ Antalkaline. ⁴ Soda water. ⁵ Tartaric acid. ⁶ Citric acid, ⁷ Gum Acacia. ⁸ Mucilage. ⁹ Hot air chamber. ¹⁰ Carbonate of soda. ¹¹ Boracic acid.

சற்றே பூக்கும். சொற்ப அல்கலை¹த்தன்மை கொண்டது. திட்டசீதிற்² கரையாது; 12 பங்கு தண்ணீரிலும் அரைப்பங்கு வெந்நீரிலும் கரையும். இதை வெந்நீர் பூர்த்தியாய்க் கரைத்து, ஏதும் மினிறலமிலத்தால்³ புளிப்பாக்கினால், ஆறும்போது செதிலான கிரிஸ்தல்கள் அடையும். இவ்வடையல் போறசிக்கமில். அதைச் சீதிலேகரைத்தால் அக்கரைவு பச்சைச்சவால்கொண்டு வரையும். சோதனைகள். இதில் 191 கிறேனைப் பத்து அன்சு திஸ்திலித்த தண்ணீர் கரைத்தால் அதைப் பூர்த்திப்பதற்கு⁴ அச்சவிக்கமில்⁵ பருமவிலயனத்தில் 1000 கிறேனைவ வுேண்டும்.

தன்மை. குளிர்மையானது, அமுரிதி⁷, எம்மெனகக்கு⁸, பிரசவநோக்காட்டை உண்டாக்கக்கூடியதாம். சலக்கல்லைக் கரைக்கக்கூடியது; தானிகமாயிட்டால் ஸ்திமுலம்⁹.

உபயோகம். குலொரேசி, அமெனுறீயம், திஸ்மெனுறீயம் என்ற நோய்களுக்கும், சிலவகையான கருப்பை இரத்தப்பெருக்குக்கும் இது நயமென்று கொடுக்கப்பட்டதுண்டு. மேலும் நீர்க்கோவை நோய்கள், எபிலெப்சி, பிரசவக் கழிச்சல், பிரசவ நோய்களுக்கும், அலுப்பான பிரசவங்களிற் பிரசவ நோக்காட்டைக் கிளப்புதற்கும் இது உள்ளே கொடுக்கப்படும். ஆயினும் இந்த நோய்களுக்கெல்லாம் வீரான வேறு மருந்துகளோடு இது கலந்து கொடுக்கப்படுவதால் இதாலுண்டாகு நயத்தை நிதானிப்பது பிரயாசம். இதற் கொஞ்சததைத் தண்ணீர் கரைத்துச் சலப்பைக்குட் புகட்டினால் விதிக்கமில்¹⁰ கற்களைக் கரைக்கும். தானிக மருந்தாக அக்கரம்¹¹, அக்கரப் புண்கள், வாயவியல், மூலைக்காம்புப் புண்கள், வெடிப்புகள், கோதம்¹² பலவகையான சருமநோய்களுக்கு இது உவந்தது. சருமநோய்களிற் சொறிகைத் தணிப்பதற்கு இது உத்தமமானது.

தேயம். இருபது கிறேன் முதல் நாற்பது கிறேன் வரைக்கு.

ரசிதங்கள். வெண்காரதேன். Borax Honey. கொள். வெண்காரம் மாவாக, அறுபத்துநாலு கிறேன்; சுத்ததேன், ஒரு அன்சு. கலக்கவும். அக்கரத்துக்கும் வாயிலுண்டாகும் வேறும் சில நோய்களுக்கும் பூசுவதற்கு இது சல்ல மருந்து.

போறசிக்கிசரின். Glycerine of Borax. கொள். வெண்காரம், மாவாக, ஒரு அன்சு; கிலேசரின்¹³ நாலு அன்சு. குழியம்மியிலிட்டு வெண்காரம் கரையுந்தனையும் அரைக்கவும்.

சருமநோய்கள் சிலவற்றுக்கு இது நல்ல பூச்சுமருந்து.

[இந்துக் கடைகளிலிருக்கும் வெண்காரம், திபெத்து, அசம், நேபாளம் என்ற தேசங்களிலிருந்து வரும். அதைச் சுத்திசெய்யவேண்டுமாயின் அநிலொரு இரத்தலை ஒரு திரும் சுண்ணாம்பும் ஒன்றரைநாழி தண்ணீரும் சேர்த்துக் காய்ச்சிச் சீலையில் வடித்து உற்றவைத்துக் கிரிஸ்தலாக்கி எடுக்கலாம்.]

சோடபாஸ்வக. PHOSPHATE OF SODA.

இதற்குச் சின்னம் சோ¹ ஐபாஅ² 12ஐ³ அ. இது இந்திர அரிந்திர பதார்த்தங்களில் சுயமாயுள்ளது. மருந்துக்கு இதை எடுக்கவேண்டுமாயின்

1 Alkali. 2 Rectified spirit. 3 Mineral acid. 4 Saturate. 5 Oxalic acid.
6 Volumetric solution. 7 Diuretic. 8 Emmenagogue. 9 Stimulant,
10 Lithic acid, 11 Aphroe. 12 Gangrene, அழுச்சு. 13 Glycerine.

எரித்த எலும்புத் தூள்¹ சல்வுரிக்கமிலத்தை² வார்த்து அதிற் பிறக்கும் சுண்ணவதிபாஸ்வசைத்³ தண்ணீரிற் கரைத்துச் சோடகாபனசாற்⁴ தடஸ்தித் து எடுக்கலாம். இது உருவொளியான நிறமற்ற நாலு பக்கமுள்ள கூரை யுடைய ரம்பப் பிரிசங்களாக⁵ இருக்கும். இது பரமானுவிலே பூக்கும். கறியுப்பைப் போன்ற சுவைகொண்டது. சோதனைகள். சுவாலைக்கு இ து மஞ்சணிறங் கொடுக்கும். இதைத் தண்ணீரிற் கரைத்து வெள்ளிநீதர கூட்டவுண்டாகும் மஞ்சணிற அடையல் அமோன⁷ நீரிலும் நீதுரிக்கமில த்திலும்⁸ கரையும். பாரிய குலோறிர்⁹ சேர்த்தால் நீதுரிக்கமிலத்திற் கரை யக்கூடிய வெண்ணடையல் பிறக்கும். சற்றே சிவக்கக் காய்ச்சினால் இ திலே நிறைப்படி நூற்றில் அறுபத்துமூன்று பங்கும் இழந்துபோக எஞ்ச ன் சேடத்தைத் தண்ணீரிற் கரைத்துப் பாரிய குலோறிர்⁹ சேர்க்கக் கிருச¹⁰ நீ துரிக்கமிலத்திற் கரையக்கூடிய வோர் அடையல் தோன்றும். ஐருகுலோ றிக்கமிலத்தாற்¹¹ புளிப்பாக்கி ஐருசல்வுரிக்கமிலஞ்¹² சேர்த்தாலோ அடையல் தோன்றாது.

தன்மை. இது வாய்ப்பான இளம் பேதி. சிறுதேயத்தில் அல்திறவம்¹³.

உபயோகம். சுர நோய்கள், தாபித நோய்களுக்கும், மலவரட்சிக்கும் இது உவந்த விரேசன மருந்து. செயலில் இது இளக்கமாயும் சுவையில் மெத்தப்பழுதற்றதாயுமிருப்பதாற் பிள்ளைகளுக்கு விசேஷமாய் உவந்தது. மே லும் சர்க்கராழுரியென்ற நோயுள்ளவர்களுக்கு மெத்தஉவந்ததாம். இது விதி க்கமில கற்களைக் கரைக்குந் தன்மை உடையதாதலால் இவ்வகையான கல் லடைசலுக்குங் கொடுக்கப்படும். வார்திபேதிக்கும் இது நல்ல மருந்தா கும்.

தேயம். விரேசனியாய் இரண்டு திரும்முதல் ஒரு அன்சுவரைக்கும், அ ல்திறவமாய் இருபது கிறேன் முதல் நாற்பது கிறேன் வரைக்குங் கொடுக் கலாம். இதின் சுவை கறியுப்பின் சுவைக்கு மெத்த வித்தியாசமில்லாதி ருப்பதால் அதைப்போலவே இதையுங் கஞ்சி ஆணம் முதலிய உணவிற் போட்டுக் கொடுக்கலாம்.

சோடத குலோறிர்ம். கறியுப்பு.

CHLORIDE OF SODIUM. COMMON SALT.

கறியுப்பாகிய சோடதகுலோறிரத்துக்குச் சின்னம் சோது. இது இந்தி ர அநிந்திர கணங்கள்¹⁴ இரண்டிலும் சுயமாய் மெத்தவுண்டு. கடற்றண்ணீரி ல் நூற்றுக்கு 2.5 பங்கும் இதுவே. மேலும் கல்லுப்பு¹⁵ எனப்பட்டு நில த்திலே மெத்த நீளம் அகலமான பெரிய பாராகவிருக்கும். உவருற்றுக ளிற் கரைந்திருக்கும். இவைகளிலிருந்து இது பலவகையாய் எடுக்கப்ப டும். லட்சணங்கள். இது சிறிய வெள்ளையான கிரிஸ்தற் தூளாகவாவ து உருவொளியான கன வடிவக் கிரிஸ்தற் கட்டிகளாகவாவது இருக்கும். சுத்த உவர்ப்புச் சுவைகொண்டது; சுவாலைக்கு மஞ்சணிறங் கொடுக்கும்; தண்ணீரிற் கரையும். இதின் கரைவுக்குப் பிலாடின பிரகுலோறிர்ம்¹⁶

1 Bone ash. 2 Sulphuric acid. 3 Super phosphate of lime. 4 Carbonate of soda. 5 Prism. 6 Nitrate of silver. 7 Ammonia. 8 Nitric acid. 9 Chloride of Barium. 10 Dilute. 11 Hydrochloric acid. 12 Hydro sulphuric acid. 13 Alterative, 14 Kingdoms, 15 Rock salt. 16 Perchloride of platinum.

சேர்த்தால் அடையல் தோன்றாது; வெள்ளிநீதுரசு¹ சேர்த்தாலோ வெண்ணடையல் விழும். இந்த அடையல் அமோன² நீரிற் கரையும், நீதுரிக் கமிலத்திலோ³ கரையாது.

தன்மை. இதைச் சிறுதேயத்தில் நெடுகக்கொடுத்தால் பசியைத் தூண்டிச் சீரண விபாகத்⁴ தொழில்களுக்குத் துணைசெய்யும். பெருந்தேயத்திற் கரைத்துக்கொடுத்தால் வாந்திசுகும் பேதிக்கும். மேலும் இது கிருமி கொல்லி. தானிகமாயிட்டால் ருபிவாஷ⁵னாகும்.

உபயோகம். சிலவகையான குன்மத்துக்கும், குழந்தைகளுக்குண்டாகுங் கழிச்சலுக்கும், முறைச்சுரங்கள், இரத்த இருமல், சுசரோகங்களுக்கு ம், கறியுப்பு நயமென்று கொடுக்கப்படும். வாந்திபேதி நோயில் லவண பரிகாரம் என்றதில் இது முக்கியமான மருந்தாகின்றது. வெள்ளிநீதுரசை நஞ்சாகத் தின்றவர்களுக்கு இது கெமிஸ்த மாற்று. உப்பை வறுத்து ஸ்தூரம்⁶ கோள வீக்கங்களுக்கும்⁷ பொருத்து வியாதிகளுக்கும் அணைவாகக் கட்டுதல் நயமாகக் காணப்பட்டது.

தேயம். சீரணியாகப் பத்துக் கிறேன் முதல் இருபது கிறேன் வரைக்கும் இன்னுங் கூடவுங் கொடுக்கலாம். விரேசனியாக அரைஅன்சு ஒரு அன்சு கொடுக்கலாம். வமனியாக ஒன்றரை அன்சு முதல் இரண்டு அன்சை இளவெந்நீரில் கரைத்துக் கொடுக்கலாம். கடற்றண்ணீரின் வீறுள்ள தோயங்கள் செய்வதற்கு மூன்று கலன் நீருக்கு ஒரு இரூத்தல் உப்பு வீதமாகக் கரைக்கவேண்டும்.

[இந்துக்களுக்குள்ளே வெகுவாய்ப் பேர்பெற்றிருக்கிற கறுப்புப்பு என்பது அயசல்வெற்று⁸ சொற்பமாய்ச் கலந்த அசுத்த கறியுப்பேயன்றி வேறல்ல. அது செய்யும் முறை தலீவுசெநீவு என்ற வாகடத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சுதேசிகளுக்குள்ளே அதின் பிரயோகம் அனேகம். இதன்பேரில் என்றேசன் துவைனிங்கு என்பவர்கள் சொல்பவைகளால் நச்சுக்காற்றுக் காரணமாய்ப் பிளிகை ஈரல்களிலுண்டாகுங் காலிகவீக்கங்களுக்கு இது நயமென்று நம்ப நியாயமுண்டு. அக்கம் என்பவர் இதைச் சிலவருஷங்களுக்கு முன் பரும்படி கூறுபடுத்தியிருக்கிறார். வாறிங்கு பண்டிதர் இதற்கு மேறும் அவுஷத பேறும் உண்டு என்று சொல்லுகிறார்.

சோட குலோறக நீர்.

SOLUTION OF CHLORINATED SODA.

இது சோடவதகுலோறிசு⁹, சோடதகுலோறிரம்¹⁰, சோடதுவிகாபனசு¹¹ என்ற மூன்று உப்புங் கலந்த நீர். மணமற்றது; அல்கலைத்தன்மையுள்ளது; துவர்ச் சுவையும் சொற்ப குலோற¹² மணமுமுடையது. சோதனைகள். இந்திகுசல்வசின்¹³ நிறத்தைக் கெடுக்கும். ஐருகுலோறிக்கமிலத்¹⁴ தோடு சேர்த்தால் இது நுரைத்துக் குலோறம் காபனிக்கமிலம்¹⁵ என்ற வாயுக்களைக் கக்கும். இந்த நீருக்குப் பிலாடினபிரகுலோறிரஞ்¹⁶ சேர்த்தால் அடையல் தோன்றாது. விசேஷகிருவிதம் 1.103. பதாசியவியோதிர¹⁷த்தில் இருபதுகிறே

1 Nitrate of silver 2 Ammonia. 3 Nitric acid. 4 Assimilation. 5 Rubefacient. 6 Struma. 7 Glandular swelling. 8 Sulphuret of iron. 9 Hypochlorite of soda. 10 Chloride of sodium. 11 Bicarbonate of soda. 12 Chlorum. 13 Sulphate of indigo. 14 Hydrochloric acid. 15 Carbonic acid. 16 Perchloride of platinum. 17 Iodide of Potassium.

னை நாலு அன்சு தண்ணீரில் கரைத்து அத்தோடு சோட குலோறக நீரில் நிறைப்படி எழுபது கிறேனைக் கூட்டி ஐருகுலோறிக்கமில்த்தில் இரண்டு திராஞ் சேர்த்துப் புளிப்பாக்கினால், இக் கலவையின் கபில நிறத்தைக் கொடுப்பதற்குச் சோடவதசல்விசுப்¹ பருமவிலயனத்தில்² 500 கிறேனைவு வேண்டும். இது அமோனவக்சலசுக்கு³ அடையல் காட்டாது.

தன்மை. இது ஸ்திமுலம்⁴, தொணிகம்⁵, அந்திசெப்தி⁶, வெளியிலிட்டால் ஸ்திமுலம், துவர், தியோடறிசர்⁷.

உபயோகம். சன்னிச்சுரம்⁸, சன்னிவச்சுரங்க⁹ளுக்கும், ஸ்காலதீனத்துக்கு¹⁰, சுரநோய்கள், தாபித நோய்களின் பிற்கூற்றுக்கும், பொதுவாய் எக் சந்திமங்களுக்கும்¹¹, இவைகள் அசத்துவ¹² கோலங்கொள்ளும்போது கொடுக்க இது உத்தம மருந்து. முறைச்சுரங்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்குண்டாகும் மதியாந்திர¹³ நோய்களுக்கும் இது நயமென்று கொடுக்கப்படும். இமெருந்தாக இது வாயில் உண்டாகும் அக்கரம், ஸ்கேவி¹⁴, இரசபுண்களுக்கும், பலவகையான சைனன்கி¹⁵க்கும், விசேஷமாய் ஸ்காலதீனத்தோடு கூடி வருவதற்கும், யோனி, கேள்வித்துவாரம் முதலியவற்றினின்று நாற்றமான நீர் பொசிவதற்கும், தொல்லையான சருமநோய்களுக்கும், விசேஷமாய்ச் சிவ்விசை¹⁶ ப்பற்றி உண்டாகிற நோய்களுக்கும் அழுகும் புண்களுக்கும் இது உவந்தது. அழுகற் புண்களின் நாற்றத்தை மாற்றுவதற்குமாத்திரமல்ல அவற்றைச் சுகசீருக்கு வர அருட்டுவதற்கும் இது உதவும். ஐருசல்வுரிக்கமில்ம்¹⁷, ஐருசல்விரங்கன்¹⁸, ஐருசையனிக்கமில்ம்¹⁹ என்ற நஞ்சுகளுக்கு இது மாற்று.

தேயம். பத்து முதல் முப்பது மினிம்²⁰வரைக்குக் கன தண்ணீரில் கலந்து கொடுக்கவும். கார்கிலாக²¹ வழங்க இதைப் பதினைந்து மடங்கு தண்ணீரோடும் லோஷனாம்²² வழங்கப் பத்துப் பதினைந்து மடங்கு தண்ணீரோடுங் கலந்துகொள்ள வேண்டும்.

ரசிதர். குலோறப் புற்கை. Chlorine Poultice. கொள். சோட குலோறக நீர் இரண்டு அன்சு; நெல்லரிசி மா, நாலு அன்சு; கொதிவெந்நீர், எட்டு அன்சு. அரிசிமாவை வெந்நீரில் கொஞ்சங் கொஞ்சமாய்த் தூவி ஓயாமற் கிளறி, அப்பாற் சோடகுலோறக நீரைச் சேர்க்கவும்.

காதனப் புண்கள், நாற்றமான புண்கள், தொல்லையான சரும ரோகங்களுக்கு இது உவந்த புற்கை.

சோடவாசெனசு.

ARSENATE OF SODA.

இதற்குச் சின்னம் சோ₂ ஐஆஅ₄. 7 ஐ₂ அ. ஆசெனோசமில்ம்²³ 10 பங்கை சோடநீதுரசு²⁴ 8½ பங்கோடும், சோடகாபனசு²⁵, 5½ பங்கோடும் கலந்து காய்ச்சி, உருகின கட்டி ஆறினபின் அதற்குத் தண்ணீர் விட்டு வைக்கச் சோடவாசெனசு அந்த நீரை விட்டுக் கிரிஸ்தல்களாகப் பிரியும். இது நிறமற்ற உருவொளியான பிரிசங்க²⁶ளாக இருக்கும். தண்ணீரில் கரையும். அத்தண்ணீர் அல்கலி²⁷த்தன்மை கொண்டது. அதற்குப் பாரியகுலோறிரம்²⁸,

1 Hyposulphite of soda, 2 Volumetric solution, 3 Oxalate of Ammonia, 4 Stimulant, 5 Tonic, 6 Antiseptic, 7 Deodorizer, 8 Typhus, 9 Typhoid, 10 Scarlatina, 11 Exanthemata, 12 Adynamic, 13 Mesentery, 14 Scurvy, 15 Cyanche, 16 Syphilis, 17 Hydrosulphuric acid, 18 Hydrosulphides, 19 Hydrocyanic acid, 20 Minim, 21 Gargle, 22 Lotion, 23 Arsenious acid, 24 Nitrate of soda, 25 Carbonate of soda, 26 Prism, 27 Alkali, 28 Chloride of Barium.

கல்சிகுலோறிரங்கன்¹ கூட்ட வெண்ணடையல்விழும்; வெள்ளிநீதரசு²சேர்க்கக் கபிலநிற அடையல் விழும். இவ்வடையல் நீதுரிக்கமில்த்திற்³ கரையும். இதை ஐருகுலோறிக்கமில்த்தாற் புளிப்பாக்கி ஐருசல்வரிக்கமில்லஞ் சேர்த்தாற் கொதிக்கும்போது மஞ்சணிற் அடையல் விழவேண்டும். சோதனைகள். இதை 300 பாகைக்கு வரக் காய்ச்சினால் தன் நிறையில் நூற்றுக்கு 40.38 பங்கை இழந்துவிடும். இச்சேஷத்திற் பத்துக் கிறேனைத் தண்ணீர் கரைத்துச் சோடபரும விலயனத்தில் 53 கிறேனைவைக் கூட்டி வெள்ளிநீதரசுப் பருமவிலயனத்தில் படிப்படியாய் 1613 கிறேனைவு வரைக்குச் சேர்த்தால் அடையல் உண்டாகிக்கொண்டிருக்கும்.

தன்மை உபயோகம். அல்திறவ தொணிகம்; ஆசெனோசமிலம் ஆசெனிக நீர் என்பவற்றைப் போலவே. அழற்றுந் தன்மையில் இது அவைகளிலுங் குறைந்தது.

தேயம். கிறேனிற் பதினாறிலொருபங்கு முதல் எட்டிலொருபங்கு வரைக்குக் கொடுக்கலாம். பின் வரும் ரசிதமாகக் கொடுப்பதே உத்தமம்.

ரசிதம். சோடவாசெனசுநீர். Solution of arseniate of soda. கொள், சோடவாசெனசு, 300 பாகைக்கு மேற்படாத சூட்டில் உருக்கி, காலு கிறேன்; திஸ்திலித்த தண்ணீர் ஒரு அன்சு. கரைக்கவும்.

தேயம். ஐந்து மினிம் முதற் பத்து மினிம் வரைக்கும் படிப்படியாய்க் கூட்டிக்கொடுக்கலாம். ஒவ்வொரு திராயிலுங் அவைரு⁴சோடவாசெனசு அரைக்கிறேன் அடங்கியிருக்கும்.

சோடவசிதசு. ACETATE OF SODA.

இதற்குச் சின்னம். சோ கா² ஐ³ அ² 3ஐ² அ. சோடகாபனசை⁵ அசு திக்கமில்த்தாற்⁶கூறுபடுத்தச் சோடவசிதசு பிறக்கும். லட்சணங்கள். இது உருவொளியான நிறமற்ற கிரிஸ்தல்களாக இருக்கும்; தண்ணீர் கரையும், அக்கரைவு சோதனைத்தாளுக்குத் தடஸ்தி⁷மாய் நிற்கும். சோதனைகள். கரைவு வீறு குறைந்ததானால் பாசியகுலோறிரஞ்சேர்க்க அடையல் விழாமல் வெள்ளிநீதரசு⁹, இரசவநீதரசு¹⁰சேர்க்க அடையல் விழும்; அயபிரகுலோறிரஞ்சேர்க்க அதிகபிலச் சிவப்புநிறமாகும்.

தன்மை. இது சிறு தேயத்தில் அமுரிதியும், பெருந்தேயத்தில் விரேசனியுமாகும்.

உபயோகம். பதாசியசிதசைப்¹² போலவே. அதைப்போல் இது பரமானுவிற் கரையாததலால் அதிலும் இது நயம்.

தேயம். அமுரிதியாக இருபது முதல் நாற்பது கிறேன் வரைக்கும்; விரேசனியாக ஒரு திராய் முதல் நாலுதிராய் வரைக்குங் கொடுக்கலாம்.

சோடசல்வசு. SULPHATE OF SODA.

GLAUBER'S SALT.

சோடசல்வசுக்குச் சின்னம் சோ² கேஅ⁴ 10ஐ² அ. ஐருகுலோறிக்கமிலச்¹³செய்கையில் எஞ்சஞ் சேடத்தைச் சோடகாபனசாற் தடஸ்தித்துத்¹⁴ தண்ணீர் கரைத்து வறட்டச் சோடசல்வசு கிரிஸ்தல்களாக விளையும். லட்ச

1 Chloride of Calcium. 2 Nitrate of silver. 3 Nitric acid. 4 Anhydrous. 5 Carbonate of soda. 6 Acetic acid. 7 Neutral. 8 Chloride of Barium. 9 Nitrate of silver.

10 Subnitrate of Mercury. 11 Perchloride of iron. 12 Acetate of potash.

13 Hydrochloric acid 14 Neutralize.

சுணங்கள். இது உருவொளியான சாய்பிரிசங்களாக¹ இருக்கும்; உவர்ப் பான கைப்புச் சுவைகொண்டது. பரமானுவில் வைக்க மாவாகும். தண்ணீர் கரையும்; சீதிற்² கரையாது. பீங்கான் குகையிலிட்டுக் காய்ச்ச அதி லடங்கிய நூற்றுக்கு 55.9 வீதமான தண்ணீர் அற்றுப்போகும். பதாசிரீரோ³ காய்ச்சினால் அமோன⁴மணம் வீசாது. பிலாடினபிரகுலோறிரஞ்⁵ சேர் க்க அடையல் விழாது. சுவாலைக்கு மஞ்சள் நிறங் கொடுக்கும். சோதனை கள். இதில் ஐம்பது கிறேனைத் திஸ்திலித்த தண்ணீர் கரைத்து, ஐருகு லோறிக்கமிலத்தாற்⁶ புளிப்பாக்கிப் பாரியகுலோறிரஞ்⁷ சேர்க்க ஓர் வெண் ணடையல் விழும். இந்த அடையலைக் கழுவி உலர்த்தும்போது 72.2 கி ரேன் நிறுக்கும்.

தன்மை, உபயோகம். இது விரேசனி, மக்னீச சல்வசுக்கு நிகரானது. தேயம். கிரிஸ்தலான இந்த உப்பில் அரை அன்சு முதல் ஒரு அன்சு வரைக்குத் தண்ணீர் கரைத்துக் கொடுக்கலாம். மாவாயிருக்கும் அவைரு உப்பில் இப் பிரமாணத்திற் பாதி போதும்.

[அயோத்தியிலும் இந்து தேசத்தின் வேறனேக பகுதிகளிலும் சோடசல் வசு நலத்தில் விளைகின்றது. அது மங்கற்கபிலநிறமான கட்டியாய்க் கடை களில் விலைப்படும். அதைப்பற்றிய விபரமும் அதைச் சுத்தமாக்கி மருந் துக்கு எடுக்கும் வகையும் ஸ்பிரை என்பவரார் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சுத்தியாய் எடுப்பதற்கு அதைக் கொதிவெந்நீர் கரைத்துக் காரிக்கம்புடை வையில் வடித்து வறட்ட அது கிரிஸ்தலங்களாக விளையும். இந்துவின் வட மேற்குப் பகுதியிலுள்ள மேட்டுப் பகுதிகள் சிலவற்றில் நிலத்திலே ஓர்வ கை உப்புப் பூர்க்கும். அதிலே இரண்டு வகையை மெதிகற்று பண்டிதர் சோதித்து ஒன்றிலே சோடசல்வசு நூற்றுக்கு 96 பங்கும் சோடதகுலோறி ரம் 4 பங்கும் அடங்கியிருந்ததென்றும் மற்றதிலே 76 பங்கும் 24 பங்குமாய் அவை அடங்கியிருந்ததென்றுங் கண்டார்.]

சோடதாத்தரகம். TARTARATED SODA. ROCHELLE SALT.

இதற்குச்சின்னம் சோ ப கா⁴ ஐ⁴ அ⁶ 4ஐ² அ. பதாசியமிலதாத்தரசைச்⁸ சோடகாபனசாற் தடஸ்திக்கச் சோடதாத்தரகம் பிறக்கும். லட்சுணங்கள். இது நிறமற்ற உருவொளியான பிரிசங்களாக இருக்கும். அல்லது எண்ப க்கப் பிரிசங்களின் பாதிகளாக இருக்கும். கறியுப்பின் சுவைகொண்டது. சோதனைகள். இதைச் சல்வரிக்கமிலத்தோடு⁹ காய்ச்சினால் அது சுவாலிக் கக் கூடிய வாயுக்களையும் காய்ச்சின சர்க்கரையின் மணத்தையும் கக்கிக் க றுக்கும். சுவாலைக்கு மஞ்சள்நிறங் கொடுக்கும். தண்ணீர் சுறுக்குக் க ரையும். வீறூன இதின் கரைவுக்குச் சொற்ப அசுதிக்கமிலமாவது¹⁰ ஐருகு லோறிக்கமிலமாவது கூட்ட ஓர் கிரிஸ்தலடையல் விழும். வாயு கக்குதல் ஒழியுந்தனையும் 141 கிறேனைச் சிவக்கக் காய்ச்சினால் உண்டாகும் அல்க லைச்¹¹ சேடத்தைத் தடஸ்திப்பதற்கு அச்சலிக்கமிலபருமவிலயனம் 1000 கி ரேனளவு வேண்டும்.

தன்மை. இது சிறு தேயத்தில் அமுரிதி¹²; பெருந்தேயத்தில் விரேசனி யாகும்

¹ Prism. ² Spirit. ³ Liquor of potash. ⁴ Ammonia, ⁵ Perchloride of platinum.
⁶ Hydrochloric acid. ⁷ Chloride of Barium. ⁸ Acid Tartarate of potash,
⁹ Sulphuric acid. ¹⁰ Acetic, ¹¹ Alkali. ¹² Oxalic acid. ¹³ Diuretic.

உபயோகம். இது சுக விரேசனியாகையாற் சுரநோய்கன் தாபிதநோய்களுக்கும் பிரசவ ஸ்திரிகளுக்கும் உவந்தது. இது சிறுநீரிலே அல்கலைச் செயல் காட்டுவதால் வாத குவாத¹ நோய்களுக்கும் கல்லடைசலுக்கும் உபயோகமானது.

நேயம். அமுரிதியாக இருபது கிறேன் முதல் நாற்பது கிறேன் வரைக்கும் விரேசனியாக இரண்டு திரும் முதல் ஒரு அன்சு வரைக்குங் கொடுக்கலாம். இதைத் தனிமைய தண்ணீர்கரைத்தாவது இதில் இரண்டுதிரும்மை நாற்பது கிறேன் சோடதுவிகாபனசோடு² கால்நாழி தண்ணீர் கரைத்து முப்பது கிறேன் தாத்தரிக்கமிலமுங்³ கூட்டி நுரைக்கும்போதாவது குடிக்கலாம். இந்த உப்புகள் மருந்துக் கடைகளில் சைதிவிற்பற்பம்⁴ என்னும் பெயராற் தனித்தனிச் சரைகளாக வாடிக்கையாய் விற்கப்படும்.

சோடவலீரியனசு. VALERIANATE OF SODA.

இதற்குச் சின்னம் சோகா⁵ ஐ⁶ அ⁷. சல்வுரிக்கமிலத்தை⁸ப் பதாசுதுவி குரோமசு⁶, புசெல்த்தேலம்⁷ என்பவற்றோடு கூட்டித் திஸ்திலித்துப்⁸ பிறக்கும் வலீரியனிக்கமிலத்தைச்⁹ சோடநீர்பூர்த்திக்க சோடவலீரியனசு உண்டாகும். இது வறண்ட வெண் கட்டிகளாக வரும்; அல்கலைத் தன்மையற்றது; திட்டசீதில்¹⁰ முற்றாய்க் கரையும். கிருச¹¹ சல்வுரிக்கமிலஞ் சேர்க்கவீரூன வலீரியன்¹² மணம் வீசும்.

தன்மை, உபயோகம். இது ஸ்திமுலம்¹³, அந்திஸ்பசி¹⁴; செயலில் வலீரியனை ஓத்தது. அது கொடுக்கப்படும் நோய்களுக்கே இதுவும் உவந்தது.

நேயம். அரைக் கிறேன் முதல் மூன்று கிறேன் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். துத்தவலீரியனசு¹⁵ என்ற மருந்து செய்வதற்கன்றி மற்றும்படி இதை உழங்குவதரிது.

லிதியம். LITHIUM.

சின்னம், லி; அணுப்பாரம், 7.

இது லிதி¹⁶யென்ற அல்கலைக்குத்¹⁷ தாரகமாகிய¹⁸ லோகம். அநிந்திரபதார்த் தங்களில் மாத்திரமே இருக்கும் மினிறல்¹⁹ நீர்கள் அனேகத்தில் இது கூறுகச் சேர்த்திருக்கின்றது. இது வெண்ணிற லோகம், 356 பாகை குட்டி உருகும். விசேஷகிருவீதம்²⁰ 0.59.

லிதிகாபனசு. CARBONATE OF LITHIA.

இதைக் குறிக்குஞ் சின்னம், லி² காஅ³. இது வெண் மாவாக அல்லது நுண்ணிய கரிஸ்தற் பொடிகளாக இருக்கும். அல்கலைத் தன்மை கொண்டது. 100 பங்கு தண்ணீர் கரையும்; அலக்காலிற்²¹ கரையாது. சோதனைகள். இது ஐருகுலோறிக்கமிலத்தில்²² நுரைத்துக்கொண்டு கரையும். இக்கரைவிலே விதயகுலோறிரம்²³ என்ற சேடங் காணும். அச் சேடம் சீது விளக்கின் சுவாலக்குத் துமிரச் சிவப்பு²⁴ நிறங் கொடுக்கும். இச் சேடத்தை மறுபடி தண்ணீர் கரைத்துச் சோடபாஸ்வசைக்²⁵ கூட்டினால் ஓர்

1 Gout, 2 Bicarbonate of soda, 3 Tartaric acid, 4 Seidlitz powders, 5 Sulphuric acid, 6 Bichromate of potash, 7 Fousel oil, 8 Distil, 9 Valerianic acid, 10 Rectified spirit, 11 Dilute, 12 Valerian, 13 Stimulant, 14 Antispasmodic, 15 Valerianate of zinc, 16 Lithia, 17 Alkali, 18 Base, 19 Mineral, 20 Specific gravity, 21 Alcohol, 22 Hydrochloric acid, 23 Chloride of Lithium, 24 Purple red, 25 Phosphate of soda.

அடையல் தோன்றும். இந்த உப்பிற் பத்துக்கிறேனைச் சல்வுரிக்கமிலத்தாற்
தடஸ்தித்துப் பிறகு சிவக்கக்காய்ச்சினால் வறண்ட விதிசல்வசு¹ 14.86 கி
ரேன் மிஞ்சும். அதை மறுபடி திஸ்தலித்த தண்ணீரிற் கரைத்து அமோன
வச்சலசாவது² சுண்ணீராவது கூட்டினால் அடையல் தொன்றாது.

தன்மை. இது அமுரிதி, சிறுநீரை அல்கலையாக்கும் வீறுள்ளது. விதி
க்கமிலக்³ கற்களைச் சுறுக்கிற் கரைக்கும்.

உபயோகம். குவாசத்துக்கும்⁴, விதிக்கமில் பவகத்தைச் சார்ந்ததாயுண்
டாகும் மற்றும் நோய்களுக்கும் இது கொடுத்து நயங்கண்டது.

தேயம். மூன்று கிறேன் முதல் ஆறு கிறேன் வரைக்குத் தண்ணீரிலா
வது குமிழித்த தண்ணீரிலாவது தாராளமாய்க் கலந்து கொடுக்கலாம்.

ரசிதம். லிதினுரைநீர். Effervescing Solution of Lithia. லிதிகா
பனசு⁵ பத்துக் கிறேன்; தண்ணீர் அரைநாழி. தகுந்த இயந்திரத்திற் கலந்
துகொண்டு கிரீதத்தின்⁶ மேற் சல்வுரிக்கமிலத்தை⁷ வார்த்து அதில்நின்று எழும்
புஞ் சுத்த காபனிக்கமில் வாயுவில்⁸ ஏழு பரமானுவின் அழுக்கத்தால் அக்
கலவை நீருக்குட் செலுத்தக் கூடியளவு வாயுவைச் செலுத்தவும். அழுக்
கப்பட்ட வாயுப் பறிந்துபோகாதபடிக்கு அந்த நீரை இறுக்கமாய் அடை
த்த சீசாக்களில் விட்டு வைக்கவும். லட்சணங்கள். சீசாவைத் திறந்தவு
டன் காபனிக்கமில் வாயுப் பறிய, நீர் பெலத்து நுரைக்கும். இந்நீர் தெ
ளிந்தது; குமிழிகொள்ளும்; நல்ல புளிப்புச் சுவைகொண்டது. சோதனை.
இதற் கால்நாழி நீரை முற்றாய் வறட்டினால் வெண்மையான உலர்சேடம்
ஐத்தகிறேன்வரும். அது லிதிகாபனசின் சோதனைகளுக்குச்சரியாய்நிற்கும்.

தேயம். ஐந்து அன்சு முதற் பத்து அன்சு வரைக்குக் குடிக்கலாம்.

லிதிசிதிறசு. CITRATE OF LITHIA.

இதற்குச் சின்னம் லி₃ கா₆ ஐ₅ அ₁₇. லிதிகாபனசைத் தண்ணீரிற் கரை
த்து அத்தோடு சிதிறிக்கமிலத்தைக் கூட்ட லிதிசிதிறசு பிறக்கும். லட்சண
ங்கள். இது வெண்மையான அமாவத்¹⁰ தூள். பரமானுவில் வைக்கக் க
ரையும்; தண்ணீரிற் சேஷமில்லாமற் கரையும். சிவக்கக் காய்ச்சினற் சு
வாலிக்கக் கூடிய வாயுவைக் கக்கிக் சுறுக்கும். சேடத்தை ஐருகுலோறிக்
கமிலத்தால்¹¹ தடஸ்தித்துத்¹² திட்டசீதிற்¹³ கரைத்தால் அக்கரைவு துமிரச்
சிவப்புச் சுவைகொண்டு எரியும். சோதனைகள். இந்த உப்பில் இருபது
கிறேனைப் பரமானுவிலே சொற்ப சிவப்புநிறத்திற்காய்ச்சினால் வெண்மை
யான சேடம் 10.6 கிறேன் மிஞ்சும்.

தன்மை, உபயோகம். லிதிகாபனசைப் போலவே. அதிலும் இதின்
செயவில் அழற்சி குறைவாம்.

தேயம். ஐந்து முதற் பத்துக் கிறேன் வரைக்கு.

கல்சியம். CALCIUM.

சின்னம், க; அணுப்பாரம். 40.

இது பூமியிலுள்ள மண்கற்களின் பங்காகிய அல்கலை¹⁴ச் சுண்ணாம்புக்குத்
தாரகமான¹⁵ லோகம். மஞ்சள்நிறமுள்ளது. இது மினிறல்¹⁶, தாவரம், பிரா

1 Lithia sulphate. 2 Oxalate of Ammonia, 3 Lithic acid. 4 Gout. 5 Carbonate of
Lithia. 6 Chalk. 7 Sulphuric acid. 8 Carbonic acid gas. 9 Citric acid.
10 Amorphous 11 Hydrochloric acid, 12 Neutrallize, 13 Rectified spirit.
14 Alkali. 15 Base 16 Mineral.

ணின் என்ற மூலகைப் பதார்த்தத்திலும் கலந்திருக்கின்றது. இதின் விசேஷகுவிதம்¹ 1.578. செஞ்சூட்டில் உருகும்.

கல்சியகுலோறீரம். CHLORIDE OF CALCIUM.

இதற்குச் சின்னம், க கு. இதைச் செய்வதற்கு ஐருகுலோறிக்கமிலத்தை² சுண்ணகாபனசாற்³ தடஸ்தீத்து வடித்து ஸ்வரமாய் வருந்தனையும் வறட்டி வரும் உப்பை 200 பாகை சூடு வரையில் உலர்த்த வேண்டும். இது காய்ந்து திரண்ட கட்டியாக இருக்கும். பரமானுவிற சுறுக்காய்க் கரையக்கூடியது. ஐருகுலோறிக்கமிலத்தைச் சேர்க்க குலோறினையாவது அதகுலோறசமிலத்தை⁴யாவது கக்குவதில்லை. தண்ணிலும் இருமடங்கு நிறையான தண்ணீரில் முற்றாய்க் கரையும்; அலக்கா⁵லிலுங் கரையும். சோதனைகள், இதின் தண்ணீர்க் கரைவுக்குச் சுண்ணநீர் கூட்டினால் அடையல் உண்டாவதில்லை.

தன்மை. இது ஸ்திமுலம்⁶. விசேஷமாய்ச் சோஷணக்கிரந்தி மண்டலத்திற் சேஷ்டிக்கும். பெருந்தேயத்தில் மயக்கழற்சி நஞ்சாகும்.

உபயோகம். ஸ்துரும⁷நோய்களுக்கும் காட்டப்பட்ட சருமநோய்களுக்கு விசேஷமாய் லூபசு⁸ எக்சீமம்⁹, இம்பெரிசு¹⁰ என்பவைகளுக்கும், சினைப்பை நோய்கள் சிலவற்றுக்கும் இதால் நயங்கண்டது.

தேயம். பத்துக் கிரேன் முதல் இருபது கிரேன் வரைக்குத் தண்ணீர் கரைத்துக் கொடுக்கலாம்.

கல்சி. சுண்ணம். சுண்ணாம்பு.

CALX. LIME. QUICK-LIME.

இதற்குச் சின்னம் கலு. இது சில அசுத்தங்களையும் அடக்கிய அல்கலை¹¹ மண். கிரீதத்தை¹²யாவது சிப்பிகளையாவது எரித்து அதிலுள்ள காபனிக்கமிலத்தை¹³ யகற்றச் சுண்ணாம்பு பிறக்கும். இது முதலில் வெண்மைநிறமானவைரக் கட்டியாயிருக்கும். சுறுக்குத் தண்ணீரை உறிஞ்சும். சம நிறையிலுங் குறைவான தண்ணீரை வார்க்க அது வெடித்து நீரிக் கன சூட்டைக் கக்கி மாவாகும். இப்படி நீற்றின சுண்ணாம்பைச் சுத்த தண்ணீரோடு கலக்கி வடித்தால் தெளிந்த நீராய் வரும். இது அல்கலைத் தன்மையுள்ளது; அமோனவச்சலசைக்¹⁴கூட்ட ஓர்வெண்ணடையல் உண்டாகும். சோதனைகள், நீரின சுண்ணாம்பு கிருசு¹⁵வைருகுலோறிக்கமிலத்திலே சேடம்மெத்த இல்லாமலும் நுரையாமலுங் கரையும். இக் கரைவு நீரை உலர வறட்டிச் சேடத்தை மறுபடி தண்ணீரிற் கரைத்துச் சுண்ணநீர் சேர்த்தால் மெத்தச் சொற்ப அடையல் மாத்திரம் உண்டாகும்.

ரசிதங்கள். புட்பித்த சுண்ணம். Slaked Lime. இது கல்சியைரசு¹⁶ எனப்படும். இதற்குச் சின்னம் கஜு அ. இதைச் செய்யும் முறையாவது, கொள். புதுக்கச் சுட்ட சுண்ணாம்பு இரண்டு இரூத்தல்; தண்ணீர் அரைநாழி. சுண்ணாம்பை ஒரு லோகப் பாத்திரத்திலுட்டு அதின்மேற் தண்ணீரை வார்த்து ஆவிபறிதல் ஒழிந்தபின்பு பாத்திரத்தை அதின் மூடியால்

1 Specific gravity. 2 Hydrochloric acid. 3 Carbonate of Lime. 4 Hypochlorous acid. 5 Alcohol. 6 Stimulant. 7 Struma. 8 Lupus. 9 Eczema. 10 Impetigo. 11 Alkali. 12 Chalk. 13 Carbonic acid. 14 Oxalate of ammonia. 15 Dilute. 16 Calcis Hydras.

மூடி ஆறும்படியாக வைக்கவும். ஆறினபின், புட்டித்த சுண்ணாம்பை இரு ம்புக் கம்பி அரிப்பெட்டியிற் போட்டு மெதுவாய் ஆட்டி மெல்லிய மாவை அரிப்பெட்டிக்கூடே செல்லவிட்டுச் சேடத்தைத் தள்ளிப்போடவும். அரித்த மாவை நன்றாய் அடைத்த சீசாவுக்குட் போட்டுக் கூடியளவு பரமானு படாதபடி வைக்கவும். புட்டித்த சுண்ணாம்பை உடனுக்குடன் செய்து கொள்ள வேண்டும். அது கரைவதற்கு 700 பங்கு தண்ணீர் வேண்டும்.

தன்மை. இது காரம், தகனி¹; காரப்பதாசி²யோடன்றி மற்றும்படி வழங்கப்படுவதரிது. உட்கொண்டால் அழற்று நஞ்சாய் முடியும். ஆசியதே சத்தின் உஷ்டண பகுதியெங்குமுள்ள எவ்வகுப்பான சனங்களும் சுண்ணாம்பை வெற்றிலை பாக்கோடு சப்புதல் வழக்கம். வெருகாலம் சப்பினால் இது வாய்ச் சளிச்சவ்வின் தன்மையை மாற்றி ரோக நிதானத்தை மயக்கத்தக்கதாய் நாவின் தோற்றத்தையுங் கெடுக்கும். சொற்பமாய் வழங்கினால் இது உடம்பைக் கெடுக்கமாட்டாது. மட்டுக்கு மிச்சமாய் வழங்கினால் இரைப்பை குடல் முதலிய உள்ளுறுப்புகள் நோய்ப்பதற்கு ஏதுவாகும். இது காரணமாய் அனேகரில் கொடுப்புப் பீறி தொண்டையடைப்பு என்ற மாறா வியாதிகளுண்டாகும்.

சுண்ணீர். Lime Water. கொள். புட்டித்த சுண்ணாம்பு இரண்டு அன்சு. தண்ணீர் நாலுநாழி. தண்ணீரைக் கண்ணாடிச்சடையுள்ள சீசாவுக்குள்ளே விட்டு அதற்குள்ளே சுண்ணாம்பையும் போட்டு இரண்டு மூன்று மினி நேரமாக நன்றாய்க் குலுக்கவும். மிஞ்சிய சுண்ணாம்பு பன்னிரண்டு மணி நேரத்தின் பின் அடையும். அப்போ தெளிந்த நீரை சைபன்³ வழியாய் கண்ணாடிச் சடையுள்ள பச்சைச் சீசாவுள் விட்டுப் பரமானு பு காமல் நன்றாய் அடைத்து வைக்கவும். சோதனை. இதிலே பத்து அன்சைத் தடஸ்திப்பதற்கு அக்சலிக்கமில⁴ பருமவிலயனத்⁵தில் 200 கிறேனை வாகுதல் வேண்டும்.

தன்மை. அபாமிலி⁶, அல்திறவம்⁷, துவர்.

உபயோகம். இரைப்பை குடல்களின் புளிப்புக்கும்⁸ குண்மத்துக்கு⁹ அதோடுகூடிய கழிச்சலுக்கும் இது பேர்பெற்ற மருந்து. இரைப்பைப்புண்ணிலும் ஸ்துருமம்¹⁰, கசம்¹¹ என்ற நோய்களிலும் பாலோடு கொஞ்சச் சுண்ணீர் சேர்த்து ஆகாரமாகக் கொள்ளுதல் மெத்த நயமாய்க் காணப்பட்டது. சலக் கற்களைக் கரைப்பதற்கு இது முற்காலத்தில் பேர்பெற்றிருந்தது. ஆயினும் விதிய¹² உப்புகளுக்கு இது இழப்பானது. மினிறமிலங்கள்¹³ அக்சலிக்கமிலத்தையும் நஞ்சாகக் குடிப்பார்க்கு இது கெமிஸ்த முறையான மாற்றாகும். பலவகையான புண்கள் சருமநோய்களுக்கு இது தானிக¹⁴ மருந்தாயிடப்படும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் நாலு அன்சு வரைக்கு நாள் இரண்டு மூன்று முறை கொடுக்கலாம். பாலிற் கொடுப்பதே உத்தமம். இதை நெடுநாளாக வழங்கப்படாது.

சுண்ணச் சீனிநீர். Saccharated Solution of Lime. கொள். புட்டித்த சுண்ணாம்பு, ஒரு அன்சு; சுத்த சீனி மாவாக இரண்டு அன்சு; திஸ்திலி

1 Escharotic. 2 Caustic Potash 3 Syphon. 4 Oxalic acid. 5 Volumetric solution. 6 Antacid. 7 Alterative. 8 Acidity. 9 Dyspepsia. 10 Struma. 11 Consumption. 12 Luthia. 13 Mineral acid. 14 Local.

த்தண்ணீர் அரைநாழி. சுண்ணாம்பையும் சீனியையும் குழியம்மியில் இடித்து, அக் கலவையைத் தண்ணீரோடு ஓர் சீசாவுக்குள்ளிட்டு அடைத்து இடைக்கிடை சில நாழிகை வரைக்குக் குலுக்கவும். கடைசியிற் தெளிந்த நீரைச் சைபன்¹ என்னும் வளைகுழலாற் பிரித்து கண்ணாடிச் சடையுள்ள சீசாவில் விட்டு வைக்கவும். சோதனைகள். விசேஷக்ருவிதம்², 1052. இதில் ஒரு அன்னைத் தடஸ்திப்பதற்கு அக்சலிக்கமின பருமவிலயனத்தில் 254 கிறேனைவு வேண்டும். ஒரு அன்சு சுண்ணச் சீனிநீர் 7.11 கிறேன் சுண்ணாம்புக்குச் சரியாகும்.

தன்மை, உபயோகம். சுண்ணநீரைப் போலவே. குவாத³ தேகிகளுக்கும் குண்டாகும் தொல்லையான குண்மத்துக்கும் பிள்ளைகளுக்குண்டாகும் காலிக கழிச்சலுக்கும் இது உவந்ததாம்.

தேயம். பதினைந்து மினிம்⁴ முதல் அறுபது மினிம் வரைக்குத் தண்ணீரில் விட்டு நாள் இரண்டு மூன்று முறை கொடுக்கலாம்.

கண்ண லினிமென். Liniment of Lime. கொள். சுண்ண நீர், இரண்டு அன்சு ; ஒலீவுத்தேஸ் இரண்டு அன்சு. குலுக்கிக் குலுக்கிக் கலக்கவும்.

காறந்தேல்⁵ என்று வழக்கமாய்ச் சொல்லப்படுகிற இந்தஎண்ணெய் வேர்க்காட்டுக் காயங்கள் வழுந்தல்களுக்கு இட நல்ல மருந்து. கொப்பளித்த புண்களைக் சுறுக்கு மாற்றுவதற்கும் சில வகையான சரும நோய்களுக்கும் இது இடப்படும்.

அதிக கண்ணகாபனசு.

PRECIPITATED CARBONATE OF LIME.

சுண்ணகாபனசுக்குச் சின்னம், க, கா அ₃. சோடகாபனசைக்⁶ கல்சியகுலோறிரத்தோடு சேர்க்கச் சுண்ணகாபனசு உண்டாகும். லட்சணங்கள். இது வெண்மையான அமாவத்⁷ தூள். தண்ணீரிற் கரையமாட்டாது. ஐருகுலோறிக்கமில்த்தில் நுரைகொண்டு கரையும். இக் கரைவை அமோனத்தாற்¹⁰ தடஸ்தித்து¹¹ அமோனவக்சலசை¹² அதற்குக்கூட்டக் கள அடையல்விழும் சோதனை. இதைக் கிருசநீதுரிக்கமிலத்திற்¹³ கரைக்கத் தெளிந்த நீராகும். இது பூரண தடஸ்தமாகி, காய்ச்சுவதால் அதிலுள்ள காபனிக்கமில்ம் அகற்றப்பட்டால், சுண்ணச் சீனி நீரை மிஞ்சுவாவது கடிக்கார¹⁴ நீரையாவது கூட்டும்போது, அடையல் தோன்றுது.

தன்மை, உபயோகம். சுண்ண நீரைப் போலவே. பிஸ்முதவில்லையில் இதோர் கூறுகச் சேருகின்றது.

தேயம். பத்து முதல் அறுபது கிறேன் வரைக்குக் கொடுக்கலாம்.

பூத கிரீதம். PREPARED CHALK.

கொருக்கலான சுண்ணகாபனசாகிய சீமைச் சுண்ணாம்பைக் கழுவி பூத கிரீதம் எடுப்பார்கள். இதைப் பெரும்பாலும் கூருள்ள சிறு கட்டிகளாகக் காய வைப்பார்கள். லட்சணங்கள். இது வெண்மையான அமாவத்

1 Syphon. 2 Specific Gravity. 3 Gout. 4 Minim. 5 Carron oil. 6 Carbonate of soda 7 Chloride of Calcium. 8 Amorphous. 9 Hydrochloric acid. 10 Ammonia. 11 Neutralize. 12 Oxalate of Ammonia. 13 Dilute Nitric acid. 14 Nitrate of silver.

தூள் ; அமிலங்கள் கூட்ட, துரைக்கும் ; கிருணவருகுலோறிக்கமிலத்திற்¹ சொற்ப சேஷமாத்திரம் இருக்கக் கரையும். இக் கரைவை அமோன நீரால் அதி பூர்த்தித்து² அமோனவக்சலகை³ அதற்குக் கூட்ட வெண்மையான அடையல் உண்டாகும். சோதனை. பூதக்கிரீதத்தை ஐருகுலோறிக்கமிலத்திற் கரைக்கும்போதுண்டாகும் உப்பை வறட்டி மறுபடி தண்ணீரிற் கரைத்துத் தடஸ்தமாக்கினால் சுண்ணச் சீனிநீர் கூட்டும்போது சொற்ப அடையல் மாத்திரம் விழும்.

தன்மை. அபாமிவி⁴, துவர், அப்சாபென்⁵.

உபயோகம். இரைப்பைக் குடல்களின் புளிப்பைச் சார்ந்த கழிச்சலுக்கும், கன வெயர்வை, கழிச்சல் கூடிய புறங்கீதின்⁶ பிற்பருவங்களுக்கும், இது உபயோகமானது. பின் வரும் கிரீதக் கலவையாகவே இது விசேஷமாய் வழங்கப்படும். கிரீதத்தை மெல்லிய மாவாக்கிக் கெட்ட நீர் பாயும். புண்கள் வேக்காட்டிக் காயங்கள் வழுந்தல்கள், சருமனோய்கள் முதலியவற்றுக்குத் தூவினால் அது நீரை உறிஞ்சி நோய் பரம்பாமற் தடுத்து நயஞ்செய்யும். நோய்த்த பகுதியைச் சாந்தியான புற்கையால் மூடவும வேண்டும்.

தேயம். பத்துக் கிரேன் முதல் அறுபது கிரேன் வரைக்குக் கொடுக்கலாம், கூடவுங் கொடுக்கலாம்.

கிரீதக் கலவை. Chalk Mixture. கொள். பூதக்கிரீதம், கால் அன்சு ; அகசிப் பிசின்⁸ மா, கால் அன்சு ; சிறுபம்⁹ அரை அன்சு. கறுவா நீர் ஏழரை அன்சு. கிரீதத்தையும் பிசினையும் கறுவா நீர் விட்டரைத்துச் சிறுபத்தையுங் கூட்டிக் கலக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு வரைக்குக் கொடுக்கலாம், கிரீத சுகந்த பற்பத்தைக் கூட்டுவதால் இதின் செயல் அதிகப்படும்.

கிரீத சுகந்த பற்பம். Aromatic Chalk Powder. கொள். கறுவாப் பட்டை மா, நாலு அன்சு ; சாதிக்காய் மா, குங்குமப் பூ மா, வகைக்கு மூன்று அன்சு ; கரம்பு மா, ஒன்றரை அன்சு ; ஏலக்கொட்டைமா, ஒரு அன்சு ; சுத்த சீனி மாவாக, இருபத்தைந்து அன்சு ; பூதக்கிரீதம், பதினொரு அன்சு. இவற்றைத் திறமாய்க் கலந்து மெல்லிய அரிப்பெட்டியில் அரித்துக் கடைசியாய்க் குழியம்மியிலிட்டு மெல்ல அரைத்துக் கண்ணாடிச் சடையுள்ள சீசாவிற் போட்டு வைக்கவும்.

தேயம். பத்துத் தொடங்கி அறுபது கிரேன் வரைக்கு. பிள்ளைகளுக்கு ஐந்து முதற் பத்துக் கிரேன் வரைக்குக் கொடுக்கலாம்.

கிரீதவவின்குந்த பற்பம். Aromatic Chalk Powder with Opium. கொள். கிரீதசுகந்த பற்பம் ஒன்பதேழுச்ச்கால் அன்சு ; அவின் மா, கால் அன்சு. திறமாய்க் கலந்து மெல்லிய அரிப்பெட்டியில் அரித்து கண்ணாடிச் சடையுள்ள சீசாவிற் சேமிக்கவும்.

தேயம். ஐந்து முதல் நாற்பது கிரேன் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். கொடுக்கவேண்டிய அவ்வினின் பிரமாணத்தை அறிந்து இதைக் கொடுக்கவேண்டும். இதிலே நற்பது கிரேனுக்கு ஒரு கிரேன் அவின் இருக்கும்.

1 Dilute Hydrochloric acid. 2 Supersaturate. 3 Oxalate of Ammonia. 4 Antacid. 5 Absorbent. 6 Bronchitis 7 Chalk mixture. 8 Gum Acacia. 9 Syrup.

கல்சிகுலோறகம், CHLORINATED LIME.

புட்பித்த சுண்ணாம்பு குலோறவாயுவை உறிஞ்சுந்தனையும் அதை அவ்வாயுவிலே வைக்க, கல்சிகுலோறகம் உண்டாகும். இதற்கு வெளுச்சுந்தன்மையும் கந்தக்கின தன்மையுமுண்டு. இது சொற்ப குலோறின் மணத்தை உடைய மங்கல் வெண்மையான தூளாகவிருக்கும். இதின் சாரமான பங்கு தண்ணீர் கரைநீர் கூடியது. அக் கரைநீருக்கு அச்சலிக்கமில்லங்கூட்ட அது குலோறவாயுவை மிகுதியாய்க் கக்கிச் சுண்ணவக்சலசை அடையவிடும். சோதனைகள். இதில் பத்துக்கிறேனைப் பதாசியவியோதிரத்தில் முப்பது கிறேனோடு கலந்து நாலு அன்சு தண்ணீர் கரைத்து ஐருகுலோறிக்கமில்லத்தில்¹ இரண்டு திரும் விட்டுப் புளிப்பாக்கும்போது சிவந்த நீராகும். அந்த நிறத்தை மாற்றுவதற்குச் சோடவதசல்விசுப்³ பருமவிலயனத்தில் 850 கிறேனளவாகுதல் வேண்டும். அவ்வளவும் ஐருகுலோறிக்கமில்லத்தால் கக்கப்பட்ட நூற்றுக்கு 30 பங்கு குலோற வாயுவுக்குச் சரியாகும்.

தன்மை உபயோகம். இது நல்ல ஸ்திமுலம், அந்திசெப்தி, கந்தக்கினி, சோடகுலோறக நீர், குலோற நீர்கள் வழங்கப்படும் நோய்களுக்கே இதுவும் வழங்கப்படும்.

தேயம். ஒரு கிறேன் தொடங்கி ஐந்து கிறேன் வரைக்குத் தண்ணீர் கரைத்துக் கொடுக்கலாம். வெளிமருந்தாயிடுவதற்கு ஒரு அன்சு லாட்டிக் கு இசுல் இருபது முதல் நாற்பது கிறேன் வரைக்குக் கூட்டி அன்கென் செய்யலாம்; அரைநாழி தண்ணீருக்கு நாற்பது கிறேன் முதல் அரை அன்சு வீதமாய்க் கரைத்து லோஷன் செய்யலாம்; அரைநாழி தண்ணீருக்கு ஒன்றரைத் திரும் முதல் இரண்டுதிரும் வீதமாய்க் கரைத்துக் கார்டில் செய்யலாம். கரைத்த நீர்களை வடிக்கவேண்டும்.

ரகிதங்கள். கல்சிகுலோறகநீர். Solution of Chlorinated Lime. கொள். கல்சிகுலோறகம் ஒரு இரத்தல்; திஸ்திலித்த தண்ணீர் ஒரு கலன். கல்சிகுலோறகத்தையும் தண்ணீரையும் பெரிய குழியம்மியில் இட்டரைத்துச் கலந்து பிற்பாடு கண்ணாடிச்சடையுள்ள சீசாவுக்குள்ளிட்டு மூன்று மணித்தியாலமாக செவ்வையாய்க் குலுக்கவும். அப்பால் அதை ஓர் காரிக்கம்புடையில் வடித்துச் கண்ணாடிச்சடையுள்ள சீசாவில் விட்டு நன்றாய் அடைத்துவைக்கவும். சோதனைகள். விசேஷகிராவிதம் 1.1135. இதல் ஒரு திராமை இருபது கிறேன் பதாசியவியோதிரத்தோடு கலந்து நாலு அன்சு தண்ணீர் கரைத்து இரண்டு திரும் ஐருகுலோறிக்கமில்லம் விட்டுப் புளிப்பாக்கினால் சிவந்த நீராகும். அந்த நிறத்தைக் கெடுப்பதற்குச் சோடவதசல்விசுப்³ பருமவிலயனத்தில் 500 கிறேனளவு வேண்டும்.

தன்மை உபயோகம். சோட குலோறக நீரைப் போலவே.

தேயம். பத்து முதல் முப்பது துளி வரைக்குத் தண்ணீர் தாராளமாய்க் கலந்து கொடுக்கவும்.

குலோறகவசனம். Inhalation of Chlorine. கொள். கல்சிகுலோறகம், இரண்டு அன்சு; தண்ணீர் போதியது. மாணவ எற்ற வோர் எனத்துட் போட்டு அதைத் தண்ணீரால் நனைத்து அதிலிருந்தெழும்பும் ஆவியைச் சுவாசிக்கவும்.

பறக்கிலுள்ள, ஈரல்நோய்களிலும் இச்சுவசனம் வழங்கி நயங்கது.

1 Iodide of Potassium. 2 Hydrochloric acid. 3 Hyposulphite of soda.
4 Solution of Chlorinated soda. 5 Bronchitis.

கல்சிபாஸ்வசு. PHOSPHATE OF LIME.

இதற்குச் சின்னம் $\text{Ca}_3 \text{P}_2 \text{O}_8$. எலும்புநீற்றை¹ ஐருகுலோறிக்கமிலத்தி² கரைத்து அமோனத்தால்³ அடையப்பண்ணி 212 பாகைக்கு அதிகப்படாத சூட்டில் உலர்த்தக் கல்சிபாஸ்வசு வரும். லட்சணங்கள். இது பாரமற்ற வெள்ளையான அமாவத்⁴ துள்; தண்ணீரில் கரையாது; கிருசுரீதுரிக்கமிலத்திலே⁵ துரையாமற் கரையும். இக் கரைவுக்குச் சோடவசுதகை⁶ மிஞ்சக் கூட்டினால் அது தெளிவாய் நிற்கும். அமோனவக்சலசு⁷. அயபிரகுலோறிரம்⁸ என்பவற்றிற் சொற்பமாய்க் கூட்டினாலோ வெள்ளையான அடையல் விழும். சோதனைகள். இதற் பத்துக்கிறன், கிருசுவைருகுலோறிக்கமிலத்தில் துரையாமற் பூரணமாய்க் கரையும். இக் கரைவுக்கு அமோனத்தைக் கூட்டினால் ஓர் வெண்ணடையல் உண்டாகும். அந்த அடையல், கொதிக்கிற பதாசினீரில் கரையாது. அதைக் கழுவித் காயவிட்டால் பத்துக் கிறேன் நிறுக்கும்.

தன்மை. இது அல்திறவம்⁹, அமிலக்கினி¹⁰.

உபயோகம். ஸ்துருமம், ஸ்துரும¹¹ நோய்களுக்கும், ரிக்கிற்சு¹² என்பு மெதுவாதலுக்கும், பொருந்தா முறிவுகளுக்கும், முறைச் சுரங்களுக்கும், காலிகசிவ்விசு¹³ப் புண்களுக்கும் இது வழங்கப்பட்டது நயமோ சந்தேகம்.

தேயம். பத்து முதல் இருபது கிறேன் வரைக்கு. அந்திமினி¹⁴ பற்பத்தில் இடோர்கூருகச் சேருகின்றது.

மக்னீசியம். MAGNESIUM.

சின்னம் Mg . அணுப்பாரம், 21.

மக்னீசியம் என்பது மக்னீசி என்ற மண்ணுக்குத் தாரக¹⁵மாகிய லோகம். இது மினுக்கமும் வெள்ளிபோல் வெண்மைநிறமுமுள்ளது. தகடாய் அடிக்கப்படக் கூடியது; வன்மையுங் கர்பியாக இழுபடக்கூடியதுமானது. விசேஷகிருவிதம் 1.743. பரமானுவிலாவது அசுசிதவாயுவிலாவது பரவையான வெளிச்சமாய் எரிந்து மக்னீசியாக மாறும். சல்வரிக்கமிலத்தோடு சேர்ந்து கடற்றண்ணீரிலும் அனேக மினிறல்¹⁶ நீருற்றுகளிலும் ஓர் கூருகின்றது. சுண்ணாம்புக் கற்களிலும் இது அளிகம் இடங்கும். பிராணிய உரங்கள்¹⁷ நீர்களிலும் விசேஷமாய்ச் சிறுநீரிலும் சொற்பமிருக்கும். தாவரங்களிலும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

மக்னீசி. MAGNESIA.

இதற்குச் சின்னம் MgO . மக்னீசியாபனசு¹⁸ குப்பேதிய சூடேற்றி அதிலடங்கிய காபனிக்கமிலத்தை அகற்ற மக்னீசி வரும். லட்சணங்கள். இது ஓர் வெள்ளை மா. தண்ணீரில் கரையமாட்டாது. அமிலங்களிலோ துரையாமற் சுறுக்குக் கரையும். இதை ஐருகுலோறிக்கமிலத்திற் கரைத்து, அமோனத்தாற் தடஸ்தித்து, அமோனசு குலோறி¹⁸ ரோடுசுலத்து சோடபாஸ்வசு¹⁹ க்கூட்டும்போது கிரிஸ்தலான கன அடையல் உண்டாகும். சோதனை.

1 Bone ash, 2 Hydrochloric acid, 3 Ammonia, 4 Amorphous, 5 Dilute Nitric acid, 6 Acetate of soda, 7 Oxalate of Ammonia, 8 Perchloride of Iron, 9 Alterative, 10 Antacid 11 Struma, 12 Richets, 13 Syphilis, 14 Antimony, 15 Base, 16 Mineral 17 Solids, 18 Chloride of Ammonium, 19 Phosphate of soda,

இதை நீதுநீக்கமிவத்திற்¹கரைத்து, அமோனத்தாற் தடஸ்தித்து, அமோனதரு லோறிர நீரோடு² கலந்து, அமோனவக்சலகாவது³ பாரியகுலோறிரமாவது³ கூட்டுமபோது அடையல் உண்டாகாது.

தன்மை. இது அமிலக்கினி⁴; சுருவிரேசனி;

உபயோகம். சீரண உறுப்புகளின் புளிப்புக்கும், கடியல்⁵, இரைப் பையழற்சிக்கும் இது பயந்தது பிள்ளைகளில் புளிப்போடு கூடி உண்டா கும் கழிச்சலுக்கும், ருவாத தேகிகளுக்குண்டாகும் குண்மத்துக்கும் உப யோகமானது. மினிறலமிவ்⁶ அக்சலக்கமிவ்⁷ நஞ்சுகளை உண்டார்க்கு இது கேமிஸ்த மாற்றம்.

தேயம். அமிலக்கினியாய்ப் பத்து முதல் இருபது கிறேன் வரைக்கும், விரேசனியாய் ஒரு திரும் முதல் மூன்று திரும் வரைக்குங் கொடுக்கலாம். இதை வதுஞ் சுருந்தமான நீரிற் கொடுப்பதே உத்தமம்.

அபாரமக்னீசி. LIGHT MAGNESIA.

இதைக் குறிக்குஞ் சின்னம் மஅ. அபாரமக்னீசிகாபனசிலுள்ள காபனி க்கமிவத்தை அசுற்றப் போதிய குடேற்ற அது அபாரமக்னீசியாய்வரும். இ து பொலிவான வெண்மா. கனக்குறையே இசுற்கும் மக்னீசிக்கும் உள்ள வி த்தியாசம். இரண்டிலும் ஒரே கிறையை எடுத்தால் அவற்றின்பருமை ஒன் றுக்கு மூன்றரைவீதமாயிருக்கும்.

தன்மை, உபயோகம், தேயம். மக்னீசியைப் போலவே. அபார மக்னீசி, வரியாத்துக்கூட்டுச் சூரணத்தில் ஓர் கூறுகச் சேருகின்றது.

மக்னீசிகாபனசு. CARBONATE OF MAGNESIA.

இதற்குச் சின்னம், 3 (மகாஅ₃) மஅ₃ஐ₂அ. இது இயல்பிலேயுள்ள கல் வகைகளில் ஒன்றாய் இருக்கும். மக்னீசி சல்வசைச் சோடகாபனசு⁸ நீரா ற் கூறுபடுத்த அடையவிட்டு மருந்துகரு எடுப்பார்கள். லட்சணங்கள். இது மெதுவானவெள்ளைமா; கிருசுமினிறலமில்லங்களிலே நுரைத்துக்கொ ண்டு கரையும். அக்கரைவகளுக்கு முதல் அமோனத குலோறிரஞ்¹⁰சேர்த் து அமோன நீரை மிஞ்சக் கூட்டினாற் கலங்காது; சோடபாஸ்வசைச்¹¹ கூ ட்டினாலோ கிரிஸ்தலான கன அடையல் உண்டாகும். சோதனைகள். இ னைத மிஞ்சியறுருகுலோறீக்கமிவத்தோடு¹²கலந்தால் தெளிந்த கரைவாகும். அதுபோல பாரியகுலோறிரம் யாதொரு அடையலையும் விழுத்தாது. அக்கரை வில் இன்னொரு பங்கை அமோனத்தால் அது பூர்த்தித்து¹³அக்சலிக்கமிவ் கூட்டினால் அடையல்விழாது. ஐம்பது கிறேனைச் செஞ்சூட்டில் நீற்றி னால் இருபத்திரண்டு கிறேனாகும்.

தன்மை, உபயோகம். மக்னீசியைப் போலவே.

தேயம். அமிலக்கினியாக ஐந்து கிறேன் முதல் இருபது கிறேன் வரை க் 4 ம. இனம்பேதியாக இருபது கிறேன் முதல் அறுபது கிறேன் வரைக்கு வ் கொடுக்கலாம்.

பரிசுதம். மக்னீசிகாபனசு நீர். Solution of Carbonate of Magnesia, Fluid Magnesia. மக்னீசிகாபனசைத் தண்ணீரிற் கரைத்துக் காபனி

1 Nitric acid. 2 Oxalate of Ammonia. 3 Chloride of Barium 4 Antacid, 5 Cardi-
algia. 6 Mineral acid. 7 Oxalic acid. 8 Carbonate of soda. 9 Dilute.
10 Chloride of Ammonium, 11 Phosphate of soda. 12 Hydrochloric acid.
13 Supersaturate.

கமீல வாயு¹ ஊற் பூர்த்ததுவே இந்நீர். இது கைப்புச் சுவையில்லாத நிறமற்ற தெளிந்த நீர். சோதனை. இதலொரு அன்சை வறட்டினால் வெண்மையான உலர்சேடம் வரும். அதை நீற்றினால் ஐந்து கிறேனுக்குக் குறையாமல் நிறுங்கும். இச்சேடம் தண்ணீரில் கரையாது; மக்னீசீக்குரிய சோதனைகளுக்கு நிற்கும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு வரைக்கு. மக்னீசியை அமிலக்கினியாய்க் கொடுப்பதற்கு இதுவே வசதியானது.

பிஸ்முதவில்லையில் மக்னீசிகாபனசு ஓர் கூறுகச் சேருகின்றது.

அபார மக்னீசிகாபனசு.

LIGHT CARBONATE OF MAGNESIA.

இதற்குச் சின்னம், 3 (மகா₃) மஅ₃ஐ₃அ. லட்சணங்கள். இது மெத்த லேசான மா; குக்குமாட்சியாற் பார்க்கும்போது சற்றே அமாவமாயும்² நுண் பிரிசங்கள்³ கலந்ததாகவுங் காணப்படும், மற்றும் லட்சணங்களும் சோதனைகளும் மக்னீசிகாபனசு போலவே.

தன்மை, உபயோகம், தேயம். மக்னீசிகாபனசைப் போலவே.

மக்னீசீசல்வசு. SULPHATE OF MAGNESIA.

இதற்குச் சின்னம், மகேஅ₄ 7ஐ₂அ, இது கடற்றண்ணீரில் கரைந்திருக்கின்றது. எப்சம் என்ற இடத்திலுள்ள ஊற்றுகள் போன்ற அனேக மினிறல் ஊற்றுகளிலும்⁴ அவைகளைப் போன்ற மினிறல் நீரூற்றுகளிலுமிருக்கும். ஆகையால் இதை எப்சம் உப்பென்று சொல்வது வழக்கம். இது வாடிக்கையான பேதியுப்பே. கறியுப்பெடுத்தபின் சேஷமாயிருக்கும் கடற்றண்ணீரிலிருந்தும், மக்னீசீக்கல்லைப் பொடிபண்ணி அதிற் சல்வுரிக்கமிலம்⁵ விடுவதினாலும், மக்னீசீசல்வசு எடுக்கப்படும். லட்சணங்கள். இது கைப்பான நுண்ணிய நிறமற்ற, உருவொளியான சதுபுசப் பிரிசங்களாக இருக்கும். தண்ணீரில் சுறுக்குக் கரையும். இக் கரைவு பாரியகுலோறிரத்தோடாவது⁶, அமோனம்⁷, அமோனதகுலோறிரம், சோடபாஸ்வசு⁸ மூன்றுங் கரைத்த நீரோடாவது கூடும்போது வெண்மையான கன அடையல் உண்டாகும். சோதனைகள். இதின் நீர்க்கரைவு வாடிக்கையான காகையில் அமோனவக்சலசோடு⁹ கூடும்போது அடையல் விழாது. இந்த உப்பில் நூறு கிறேனைத் தண்ணீரில் கரைத்துக் கொதிக்கக் காய்ச்சி அதோடு சோடகாபனசு சேர்க்கும்போதுண்டாகும் அடையலை நன்றாய்க் தழுவி, உலர்த்திச் சிவக்கக் காய்ச்சினால் அது 16.26 கிறேன் நிறுக்கவேண்டும்.

தன்மை. இது விரேசனி, குளிர்தை, அமுரிதி.

உபயோகம். இது குளிர்த்த சாந்தன விரேசனியாகையால், சுரநோய்கள், தாபிதநோய்களுக்கும், தசிரக்கிளர்ச்சியோடு கூடிய மலவரட்சிக்கும், விசேஷமாய் உரத்த இரத்த நிறைவான ஆட்சுளுக்குண்டாகும் மலவரட்சிக்கும் உவந்தது, ஈயவுப்புகள், பாரித¹⁰ வுப்புகளாகிய நஞ்சுகளுக்கு இது மாற்று.

தேயம். விரேசனியாக இரண்டு திரும் முதல் ஒரு அன்சு வரைக்கும்

¹ Carbonic acid ² Amorphous ³ Prism. ⁴ Mineral spring. ⁵ Sulphuric acid. ⁶ Chloride of Barium, ⁷ Ammonia. ⁸ Phosphate of soda. ⁹ Oxalate. ¹⁰ Baryta.

எதும் சுகந்தீரிலாவது, ரோசை¹கூட்டி ன்வுசத்திலாவது², நிலவாகையின் லுசத்திலாவது கரைத்துக் கொடுக்கவும்.

ரசிதம். மக்னீசல்வசேனீமம். Enema of Sulphate of Magnesia. கொள். மக்னீசல்வசு ஒரு அன்சு. ஒலீவுத்தேல்³ ஒரு அன்சு; கஞ்சித் தெளிவு பதினைந்து அன்சு. மக்னீசல்வசைக் கஞ்சித்தெளிவிற் கரைத்து எண்ணெய்யையுங் கூட்டிச் சுவைக்கவும்.

இது நல்ல விசேசன எனீமம்.

நிலவாகைக் கூட்டுக் கலவையிலும் மக்னீசல்வசு ஓர் கூறாகச் சேருகின்றது.

அலுமினியம். ALUMINIUM.

சின்னம், அலு. அணுப்பாரம்=27 5.

அலுமினியம் என்பது, அலுமினி⁴ என்ற மண்ணுக்குத் தாரகமாகியலோகம். அலுமினியென்பது அலுமினியத்தின் அச்சிரம். அதற்குச்சின்னம் அலு⁵ அ³. அது கிளேய் என்னும் களிமண்ணில் சிலிசியோடு கலந்தும் இன்னும் பல மண் கல்வகையாய் இயற்கையில் ஏராளமாயிருக்கும். மேலும் கருங்கல்லு வெல்ஸ்பா போவிறி என்ற கற்களிலும் வரையில்லாத பழைய கற்பார்களிலும், சீனக்காரஞ் செய்யும் சிலேற்று வகைகளிலும் இது ஓர் கூறாகச் சேர்ந்திருக்கின்றது. அலுமினியம் தகடாய் அடிபடக்கூடிய வெண்மையான லோகம். அதின் விசேஷகிரூவிதம் 2.6.

அமோனவலும். AMMONIA ALUM.

இது அமோனசல்வசு⁶ அலுமினிசல்வசுஞ் சேர்ந்த இரணைச் சல்வசு. இதைக் குறிக்குஞ் சின்னமாவது நீஜ⁴ அலு(கேஅ¹)² 12ஜ²அ. இது அலுமினி சேர்ந்த சேலு⁶ என்ற கல்வகையிலிருந்து பலவிதமாய்ச் செய்யப்படும்க. இது நிறமற்ற உருவொளியான எண்புசக் கிரிஸ்தல்களாக இருக்கும். புளிப்பும் இனிப்பும் துவர்ப்பும் சேர்ந்த சுவை உடையது. இதைத் தண்ணீர் நிற் கரைத்துக் காரப்பதாசியைச்⁷ சேர்க்க, வெண்ணடையல் விழும். காரப்பதாசியை மிச்சமாய்க் கூட்ட அந்த அடையல் கரைந்துபோம். அக் கலவையைக் காய்ச்சினால் அமோனம் பறியும். சோதனை. இதின் தண்ணீர்க் கரைவுக்குப் பாரியகுலோறிரஞ்⁸ சேர்த்தவுடனே அடையல் விழும். இரும்புச் சீனக்காரமாகிய அயவலுமுக்குப் பதாசிபீதபுருகியசு⁹ கூட்ட நீல நிறமடையும். அமோன சீனக்காரமோ அப்படியாகாது. பதாசிச் சீனக்காரத்திலே அமோனத்துக்குப் பதிலாகப் பதாசி சேர்ந்திருக்கும்.

தன்மை. துவர், ஸ்திப்திகு¹⁰, அந்திசெப்தி¹¹.

உபயோகம். விபல¹² இரத்தப்பெருக்கு, அசத்துவ¹³ கழிச்சல், பிள்ளைகளுக்குண்டாகும் வாந்திபேதிக்கும், இரைப்பையின் கதார்¹⁴ நோய்களுக்கும், பித்தோனகோலிக்கு¹⁵, குக்கல், புறங்குறியம்¹⁶, என்னு நோய்களுக்கும் இது உள்ளே கொடுத்து நயந்தது. மேலும் வெளிமருந்தாய் இது கதார்க்கண்

1 Rose. 2 Infusion. 3 Olive oil. 4 Alumina. 5 Sulphate of Ammonia. 6 Shale.

7 Caustic Potash. 8 Chloride of Barium. 9 Yellow Prussiate of Potash.

10 Stryptic. 11 Antiseptic. 12 Passive. 13 Atonic. 14 Catarrh, 15 Colica piconum, 16 Bronchorrhoea.

னோய், சீழ்த்தண்ணோய், நிமைக்கண்ணோய், கன்றல் என்பவற்றுக்குக் கலூறியமாகவும்¹, பலவகையான சைனன்கி², உண்ணாக்குநீட்சி, ஸ்டீகவியிற் காணும் பல்லீற்றுப் புண்ணுக்குக் காங்கிலாகவும்³, லுகறியம்⁴, கனுறியம்⁵, மெனுறியம்⁶, கருப்பை, கடைக்குடல்களின் பிதுக்கங்களுக்குப் புகட்டல்களாகவும், புண்சன், விசேஷமாய், கனமாய் நீர் பாயும் புண்கள், தசை மிஞ்சி அரும்பும் புண்கள், விசிககோதம்⁷ என்பவற்றுக்கு லோஷன்⁸ அல்லது துவ மருந்தாகவும் வழங்கப்படும்.

தேயம். பத்து முதல் இருபது கிரேன் வரைக்கு. இதைச் சுகந்தங்க ளோடு கூடக் கொடுப்பதே உத்தமம். வெளிமருந்தாயிடுவதற்கு, ஒரு அன்சு தண்ணீருக்கு நாலு கிரேன் முதற் பத்துக் கிரேன் வீதமாய்க் கரைத்துக் கொள்ளலாம்.

ரசீதம். வறுத்த சீனக்காரம். Dried Alum. கொள். சீனக்காரம் நாலு அன்சு. பீங்கான் பாத்திரத்திலாவது வேறேதுந் தருந்த ஏனத்திலாவது போட்டு உருகுந்தனையும் வறுத்து அப்பால் நீராவி பறிதலொழிந்து நிறையில் தூற்றுக்கு 47 பங்கு குறையுந்தனையும் வறுக்கவும். சேடத்தை மாலாக அரைத்துக் கண்ணாடிச்சடையுள்ள சீசாவில் பேணி வைக்கவும்.

தன்மை. சீனக்காரத்தைப் போலவே. அதிலும் இது சத்துள்ளது. இது மெல்லிய கார⁹மாகும்.

தேயம். ஐந்து முதற் பதினைந்து கிரேன் வரைக்கு.

இந்துக்கடைகளில் மிகுதியானவைகளில் இந்துஸ்தானிபாஷையில் விற் கார்¹⁰ எனப்படும் பதாசிச்சீனக்காரம்¹¹ சற்றே சுத்தமானதாய் விலைப்படும். அதைத் தண்ணீரிற் கரைத்து, கிரிஸ்தல்க¹² ளுண்டாகத்தக்கதாய் வறட்டினால் மருந்துக்குச் சேர்க்கலாம். கெபாளத்திலுள்ள சீனக்காரமண்ணில் அயபிரவக்சிரங்¹³ கூடியசீனக்காரமே பிரதானகூறு. சீனக்கார மண் சுதேச பதார்த்த சாரத்தில் ஓர் பிரதான சரக்காகும். அது ஓர்வகையான இரும்புச் சீனக்காரமாம். இச் சரக்கையும் அதின் உபயோகத்தையும்பற்றி வாறிங்கு பண்டிதர் எழுதியிருக்கிறார். இன்னொரு வகையான சீனக்கார மண்ணைச் சிந்துவி லிருந்து ஸ்தக்க பண்டிதர் எடுத்துச் சோதித்து அது ஓர்வகையான இரும்புச் சீனக்காரமென்று நிதானித்தார். அந்த இடத்திற்குளே உள்ள இன்னொரு வகையான சீனக்கார மண்ணை எஸ்ஸ் பண்டிதர் சோதித்து அதிலே தூற்றுக்கு 13.16 அலுமினிய¹⁴யென்றும் 17.80 பங்கும் அயபிரவக்சிரம் என்றும் கண்டார். இர்துதேசத்தில் அனேக பகுதிகளில் நிலத்திலே சீனக்காரம் அதிகமாயுண்டு. குச்சு, சிந்து, பஞ்சாப்பு, பாகாரிலும் மற்றுந் தேசங்களிலும் அது வியாபாரத்துக்குச் சுத்தியாக்கப்படும்.

ஆசேனிகம். ARSENICUM.

சின்னம் ஆ; அணுப்பாரம் 75.

ஆசேனிகம் என்பது பாஷாணத்துக்குத் தாரகமான லோகம். இது இயல்பில் கெந்தகத்தோடு சேர்ந்து, அரிதாரம்¹⁵, செவ்வரிதாரம்¹⁶ என்ற உப்புக்

1 Collyrium. 2 Cynanche. 3 Gargle. 4 Leucorrhoea. 5 Gonorrhoea. 6 Menorrhoea. 7 Hospital gangrene. 8 Lotion. 9 Escharotic. 10 Phit kari. 11 Potash alum. 12 Crystal. 13 Peroxide of iron. 14 Alumina. 15 Orpiment. 16 Realgar

ளாவீருக்கும். அக்சிதவாயுவோடு கலந்து ஆசெனோசமிலமாகவும், லோகங்களைக் கலந்து ஆசெனிரங்கனாகவும் இருக்கும். வியாபாரத்தில் வரும் பாஷாணமாகிய ஆசெனோசமிலமானது ஆசெனிரங்கள் என்ற கல் வகைகளை மடக்குலையிற் காய்ச்சப் பிறக்கும். ஆசெனோசமிலத்திலுள்ள அக்சிதத்தை அகற்றுவதால் ஆசெனிகத்தை ஸேசாய் எடுக்கலாம். ஆசெனிகம் கருகரை நிறமுள்ளது. 365 பாகை குட்டில் உருகாமல் ஆவியாகும். இதின் விசேஷகிரகவிதம்⁴ 5.85.

ஆசெனோசமிலம். ARSENIOS ACID.

இதற்குச் சின்னம் As^3 அ³. இது ஓர் அமைரு⁵ அமிலம். ஆசெனிகத்தை அடக்கிய ஆசெனிகளைச் சுட்டுப் புடமிட்டுச் சுத்தியாக்கி இது எடுக்கப்படும். இது பாரமுள்ள வெள்ளை மாவாக அல்லது கட்டிகளாக இருக்கும். கட்டியிற் பல படைகளிருப்பதால் அது பெரும்பாலும் வரிகளுள்ளதாய் தோன்றும். அப்படலங்கள் தோற்றத்தில் ஒன்றுக்கொன்று வித்தியாசமாகும். கண்ணாடிக் குழுவிலே தாமதமாய்ப் புடமிட்டால் இது துண்ணிய பிரவையான உருவொளியுள்ள, எண்புசக் கிரிஸ்தல்களாக வரும். இது தண்ணீர்ச் சொற்பமாய்க் கரையும். அக்கரைவுக்கு வெள்ளி அமோன நீதுரசைக்⁶ கூட்டினால், தண்ணீர்ச் கரையமாட்டாதது⁷, அமோனம், நீதுரிக் கமிலங்களிற்⁸ சுறுக்காய்க் கரையக்கூடியதுமான வெண்மஞ்சள் நிற அடையல் விழும். சிவந்த குடுள்ள கரியிற் தெளித்தால் உள்ளி மணம் வீசும். கோதனைகள். 400 பாகைக்கு மேற்படாத குட்டில் முற்றாய் ஆவியாகும். நாலு கிறேனைக் கொதிவெந்நீர்க்கரைத்து அத்தோடு சோடதுவிகாபனசில்⁹ எட்டுக்கிறேன் கூட்டினால் இயோத¹⁰பருமவிலயனத்தில்¹⁰ 808 கிறேனைவின நிறத்தைக் கெடுக்கும்.

தன்மை. இது அல்திறவம்¹¹, தொணிகம்¹², அந்திபிராடி¹², பெருந்தேயத்தி ல் வீருன கஞ்சு.

உபயோகம். வெள்ளைப் பாஷாணம் கொடுத்து அதி சித்திபெற்ற நோய்கள், இடைவிட்டு வருகிற குலப்பண்காய்ச்சல் தறல்¹⁴ முதலிய நோய்களும் பாட்டம் பாட்டமாய் வருகிற முக தறல்¹⁵, ஒருத்தலுவலி, கொரியம்¹⁵, எபிலெப்சி¹⁶, குச்சல், ஸ்பசுசனை¹⁷, குஷ்டம் நாட்பட்ட சருமநோய்கள், கண்பவைகளுமே. மேலும் காலிகவாதம், கன்சர்¹⁸ கருப்பைக் கஞ்செஸ்தம்¹⁹, மெனுறியம்²⁰, பாம்புகடி, காலிக கதார்²¹ நோய்கள், தலைக்கனம், திறுதியோடு கூடிய பிசெதுறம்²² என்பவற்றுக்குத் கொடுத்து பயந்தது. கன்சர்ப்புண் மற்றும் உக்கிரப் புண்களுக்குத் தானிகமாயிடப்படுமாயினும் இந்த நஞ்சு உடம்பிற் சுவறுமாகையால் அப்படியிடல் புத்தியல்ல.

தேயம். அல்திறவமாகக் கிறேனில் இருபதிலொருபங்கு முதற் பன்னிரண்டிலொருபங்கு வரைக்கும், அந்திபிராடியாகக் கிறேனில் பன்னிரண்டிலொரு பங்கு முதல் எட்டிலொரு பங்கு வரைக்குங் கொடுக்கலாம். எப்போதுஞ் சிறு தேயத்திற் தொடங்கிக் காரியங் கண்டு பேணமாய்க் கூட்டி

1 Oxygen. 2 Arsenious acid. 3 Arsenide. 4 Specific gravity. 5 Anhydrous. 6 Ammonio nitrate of silver. 7 Nitric acid. 8 Bicarbonate of soda. 9 Iodum. 10 Volumetric solution. 11 Alterative. 12 Tonic. 13 Antiperiodic. 14 Neuralgia. 15 Chorea. 16 Epilepsy. 17 Spasmodic Asthma. 18 Cancer. 19 Congestion. 20 Menorrhoea. 21 Catarrh. 22 Plethora.

க்கொடுப்பதே புத்தி. இம் மருந்தைப் பெரும்பாலும் பின்வரு நீர்க்கொடுப்பதே உத்தமம்.

ரசிதங்கள். ஆசெனிக நீர். Arsenical solution. கொள். ஆசெனோசமிலம், என்பது கிறேன்; பதாசிகாபனசு¹, என்பதுகிறேன், லவந்தர்க்குட்டி² ரஞ்சம்³, ஐந்துதிரும்; திஸ்திலித்த⁴ தண்ணீர் போதியது. ஆசெனோசமிலத்தையும் பதாசிகாபனசையும் பத்து அன்சு தண்ணீரோடு ஓர் குடுக்கையிவிட்டு, தெளிந்த நீர் வருந்தனையுஞ் சூடேற்றவும். ஆறினபின் லவந்தர்க்குட்டி⁵ ரஞ்சத்தையும் அரைநாழிக்குப் போதிய தண்ணீரையுங் கூட்டவும். லட்சணங்கள். இது செந்நிறமான நீர்; சோதனைத்தானுக்கு அல்கலையாய் நிற்கும்; லவந்தர் மணங்கொண்டது. சோதனைகள். விசேஷகிருவிதம்⁶ 1.009. இதை ஐருகுலோறிக்கமிலத்தால்⁷ புளிப்பாக்கி ஐருசல்வுரிக்கமிலத்தைச்⁸ சேர்த்தால். மஞ்சள் நிற அடையல் விழும். ஆசெனிக நீரை முன்னமே தண்ணீரோடு கலந்தால், இந்த அடையலின் நிறங் கதித்திருக்கும். ஆசெனிக நீரில் நிறைப்படி 441.5 கிறேனை அதாவது ஒரு அன்சைச் சோடதுவிகாபனசிறு⁹ பத்துக் கிறேனோடு ஐந்துமினி¹⁰ நேரமாகக் காய்ச்சி, ஆறினபின், சொற்ப அளவான அமைல முசிலாசு¹¹ சேர்த்த ஆறு அன்சு தண்ணீரோடு கலந்தால் இயோதபருமவிலயனத்தில்¹² 808 கிறேன் கூட்டுந்தனையும் நிலையான நீல நிறம் தோன்றாது. ஒரு அன்சு ஆசெனிகநீரில் நாலு கிறேன் ஆசெனோசமிலம் அடங்கியிருக்கும் என்று இதால் விளங்குகிறது.

தன்மை, உபயோகம். ஆசெனோசமிலத்தைப் போலவே.

தேயம். ஐந்து துளியைத் தண்ணீர்¹³ கலந்து நான் மூன்றுமுறை தினோடாவது தின்றவுடனாவது கொடுக்கலாம். பாஷாணத்தைக் கொடுப்பதற்கு இதுவே பெரும்பாலும் உத்தம முறை. ஆசெனிகநீர் ஒவ்வொரு திரையில் அரைக்கிறேன் ஆசெனோசமிலம் அடங்கியிருக்கும்.

ஆசெனிக வைரு குலோறிக நீர். Hydrochloric solution of Arsenic. கொள். ஆசெனோசமிலம், மாவாக என்பது கிறேன்; ஐருகுலோறிக்கமிலம், இரண்டு திரும்; திஸ்திலித்த தண்ணீர் போதியது. ஆசெனோசமிலத்தை ஐருகுலோறிக்கமிலத்தோடும் நாலு அன்சு தண்ணீரோடு¹⁴ கரையுந்தனையும் கொதிக்கக் காய்ச்சி அப்பால் அரைநாழிக்குப் போதிய திஸ்திலித்த தண்ணீர் சேர்க்கவும். லட்சணங்கள். இது அமிலத்தன்மையுள்ள நிறமற்ற நீர். சோதனைகள். விசேஷகிருவிதம் 1.009. ஐருசல்வுரிக்கமிலத்தைக் கூட்டினவுடன் நல்ல மஞ்சள்நிற அடையல் விழும். இந்த நீரிலே நிறைப்படி 441.5 கிறேனை அதாவது ஒரு அன்சைச் சோடதுவிகாபனசில் இருபது கிறேனோடு ஐந்துமினி¹⁵ நேரமாகக் கொதிப்பித்துப் பிற்பாடு சொற்ப அளவான அமைலமுசிலாசு சேர்த்த ஆறு அன்சு திஸ்திலித்த தண்ணீரோடு கலந்தால் இயோதபருமவிலயனத்தில் 808 கிறேனளவைக் கூட்டுந்தனையும் நிலையான நீலநிறம் தோன்றாது. ஆகவே இந்த நீரில் ஒரு அன்சு ஆசெனோசமிலத்தில் நாலு கிறேனுக்குச் சரியென்று காண்கிறது.

தன்மை, உபயோகம். ஆசெனோசமிலத்தைப் போலவே.

தேயம். இரண்டு மினிம் முதல் எட்டு மினிம் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். சோடவாசெனசு. Arseniate of soda, சோடம் பார்.

1 Carbonate of potash. 2 Compound Tincture of Lavender. 3 Distilled. 4 Alkali
5 Specific gravity. 6 Hydrochloric acid. 7 Hydrosulphuric acid. 8 Bicarbonate
of soda. 9 Mucilage of Amylum. 10 Volumetric solution
of soda. 11 Minute.

அயவாசேனது. Arseniate of Iron. அயம்,பார்.

[வெள்ளைப் பாஷாணம், பொன்னரிதாரம் (76.) செவ்வரிதாரம் என்று மூன்று வகையான பாஷாணம் இந்துக்கடைகளில் இருக்கும். பாஷாணத்தை இந்துக்கள் குஷ்டம், முறைச்சரம் முதலிய நோய்களுக்குக் கொடுத்தல் பண்டிதொட்ட வழக்கமாயிருந்தது. மேலும் அடாத நோக்கங்களுக்கு இடலும் பெரு வழக்கம். செவர் பண்டிதர் வங்காள வைத்திய வியவகாரநூலில் இதைப்பற்றி எழுதியிருக்கிற கருத்துள்ள விபரத்தைப் பார்க்கவும். கற்சுத்தாவுக்கு வரும் வெள்ளைப் பாஷாணத்தில் மிகுதியான பங்கு பார்க்கிக்குடாக்கடலிலிருந்தும் சொற்பபங்கு மாத்திரம் யுரோபத்திலிருந்தும் வரும், பொன்னரிதாரத்தில் உத்தம வகை அயோத்தியிலிருந்தும் குறைந்தவகை இறங்குனிலிருந்தும், செவ்வரிதாரம் அயோத்தியிலிருந்தும் வரும். இவ் வியாபாரத்தைச் சுதேசிகளே முற்றாய் நடத்துவார்கள். 1850 ம், 1855 ம் ஆண்டுகளுக்கிடையான ஐந்து வருஷங்களிற் கற்குத்தாத் துறைமுகத்தால் வந்த பாஷாணம் 7860 இறத்தலாம்.

அந்திமனி. ANTIMONY.

சின்னம், அந்; துணுப்பாரம். 122.

இது நொருக்கலும் நீல வெண்மையும் மினுக்கமுமான ஓர் லோகம். விசேஷகிராவிதம் 6.715. இது 842.0 பாகை சூட்டில் உருகும். லோகக் கலவைகள் செய்வதில் அதிகமாய் வழங்கப்படும். இது கெந்தகத்தோடாவது அக்சிதத்தோடாவது கலந்ததாய்ப் பூமியின் அனேக பகுதிகளில் இருக்கும். கெந்தகத்தோடு கலந்த சல்விரமாகப் பிரதானமாய் காணுவல், அங்கேரியின் சில பகுதிகள், பிரான்சு, போணியு என்ற இடங்களில் இருக்கும். அக்சிதக் கலவையாகிய அந்திமனியக்சிரம் பொகீமி, சக்சனியில் இருக்கும்.

காரந்திமனி. BLACK ANTIMONY.

காரந்திமனியென்பது அந்திமனிசல்விரமே. இதைக் குறிக்குஞ் சின்னம் அந்; கே3, இது சிலிசியிலிருந்து பிரிக்கப்பட உருக்கப்பட்டிப் பின்பு மாவாக்கப்படும். அப்போ அது நரைக்கறுப்பான கிரிஸ்தல் மாவாக வரும்த். அது கொதிக்கிற ஐருகுலோறிக்கமிலத்தில் ஏறக்குறைய முற்றாய்க் கரைந்து அந் கு என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்படுகிற அந்திமனிகுலோறிரமாகி, ஐருசல்விரிக்கமிலத்தைக் கக்கும்.

அந்திமனிசல்வுகம், அந்திமனிகுலோறிர நீர் என்ற மருந்துகள் செய்வதற்கு மாத்திரம் காரந்திமனி வழங்கப்படும்.

அந்திமனியக்சிரம். OXIDE OF ANTIMONY.

இதற்குச் சின்னம் அந்; அ3.

அந்திமனிகுலோறிரநீருக்குத் தண்ணீர் சேர்த்து வரும் அடையலுக்குச் சோடகாபனசைக், கூட்ட அந்திமனியக்சிரம் பிரியும். லட்சணங்கள். இது வெண் நரைநிறமான மா. சொற்ப சூட்டில் உருகும்; தண்ணீரிற் கரையாது; ஐருகுலோறிக்கமிலத்திற் சுறுக்குக் கரையும். சோதனைகள்.

1 Silica. 2 Hydrochloric acid. 3 Chloride of Antimony 4 Sulphuret of Antimony.
5 Carbonate of soda.

இதின் விலயனத்துக்கு ஐருசல்வுரிக்கமிலத்தைக்¹ கூட்ட அது செம்மஞ்சள் நிறம் அடையும்; திஸ்திலித்த தண்ணீருக்குள்ளே அதைத் துளிதுளியாக விட்டால் வெண்ணடையல் விழும். தாதுதரிக்கமிலத்திலே² முற்றாய்க் கரையும்.

தன்மை. இது வமனி, இளம் விரேசனி, சுவேதனி, எக்ஸ்பெக்துறம்.

உபயோகம். சுர நோய்கள், தாபித³ நோய்கள். கதார⁴ நோய்களுக்கும், காலிகமான சருமநோய்களுக்கும் இது நயந்த மருந்து.

தேயம். ஒரு கிறேன் முதல் நாலு கிறேன் வரைக்குக் கொடுக்கலாம்.

பரிதம். அந்திமனிபற்பம். Antimonial Powder. கொள். அந்திமனியக்சிரம், ஒரு அன்சு; சுண்ணபாஸ்வசு⁵ இரண்டு அன்சு. திறமாய்க் கலக்கவும்.

தன்மை, உபயோகம். அந்திமனியக்சிரம் போலவே.

தேயம். மூன்று கிறேன் முதற் பத்துக் கிறேன் வரைக்குக் கொடுக்கலாம்.

அந்திமனிதாத்தரகம் செய்வதற்கும் அந்திமனியக்சிரம் வழங்கப்படும்.

அந்திமனிசல்வுகம்.

SULPHURATED ANTIMONY.

இது அஞ்சனக் கல்லென்றுஞ் சொல்லப்படும். இதிலே அந்² கே³ என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்படுவதாகிய அந்திமனிசல்விரத்தோடு⁷ அந்² அ³ என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்படுகிற அந்திமனியக்சிரம் விகற்ப அளவாய்ச் சேர்ந்திருக்கும் லட்சணங்கள். இது செம்மஞ்சள் நிறமான தூள். பதாசிகீர்⁸ சோட நீர்களில்⁹ சுறுக்குக் கரையும். ஐரு குலோறிக்கமிலத்திலுங்¹⁰ கரைந்து ஐருசல்வுரிக்கமிலவாயுவைக்கக்கிச் சொற்ப கெந்தகத்தைப் பிரித்துவிடும். பதாசியமிலதாத்தரகோடு¹¹ தண்ணீரிற் போட்டுக் கொதிப்பித்தாற் பிறக்கு நீருக்கு ஐருசல்வுரிக்கமில வாயுவைக் கூட்டச் செம்மஞ்சள் நிற அடையல்விழும். சோதனைகள். இம் மருந்தில் அறுபது கிறேனை ஐருகுலோறிக்கமிலத்திற் கரைத்துத் தண்ணீருக்குள் விட்டால் வெண்ணடையல் உண்டாகும். அதைக் கழுவி உலர்த்தினால் ஏறக்குறைய 33 கிறேன் நிறுக்கும்.

தன்மை. இது அல்திறவம்¹², சுவேதனி, வமனி.

உபயோகம். காலி⁵ சருமநோய்கள், கோளவீக்கங்கள், உபசிவ்விசு¹³ காலிகவாதங்களுக்கு இது அல்திறவமாகவும், சுவேதனியாகவும் கொடுக்கப்படுமாயினும் சித்தியோ சந்தேகம்.

தேயம். அல்திறவமாக ஒரு கிறேன் முதல் ஐந்து கிறேன் வரைக்கும். வமனியாகப் பத்து முதல் இருபது கிறேன் வரைக்குங் கொடுக்கலாம்.

கலமற்கூட்டுக்குளிகையில் அந்திமனிசல்வுகம் ஓர்குருகச்சேருகின்றது.

[இச் சரக்கு இந்துக் கடைகளில் அஞ்சனக் கல்லென்று விலைப்படும். பூர்வகாலம் போலவே இக்காலமும் கீழைத் தேசப் பெண்கள் தங்கள் கண்ணிமைகள் கண்மடல்களுக்கு இதால் மைதீட்டுவார்கள். அது உன்னே கொடுக்கப்படுவதுமில்லை, நஞ்சாக ஊட்டப்படுவதுமில்லை. ரோயில் பண்டி

1 Hydro sulphuric acid. 2 Tartaric acid. 3 Inflammation. 4 Catarrh. 5 Oxide.

6 Phosphate of lime. 7 Sulphide. 8 Liquor potash. 9 Caustic soda.

10 Hydrochloric acid. 11 Acid tartarate of potash. 12 Alterative,

பரிணமி. 13 Secondary Syphilis.

தர் ஓர்வகை ஈயச்சல்விரம், சூர்மி¹யென்றுபேர்ப்படுமென்று எண்ணுகிறார். இப்பெயர்ப்பட்ட ஓர் சரக்கை தென்கு பண்டிதர் ஆராய்ந்து ஸ்திராந்தி²சல்வக என்று கண்டார். லேசும் மெதுவுமான இன்னொன்றைச் சோதித்தவிடத்து அது கார்ஜிப்சம்³ எனக் காணப்பட்டது.

அந்திமனி திரிகுலோறிரீர்.

SOLUTION OF TERCHLORIDE OF ANTIMONY.

இது காரந்திமனியை ஐருகுலோறிக்கமில்லத்திற் கரைத்த நீரேயாகும். லட்சணங்கள். இது மஞ்சட் சிவப்புநிறமுள்ள கனத்த நீர். இதில் சொற்பத்தைத் தண்ணீருக்குள்ளே விட்டால் ஓர் வெண்ணடையல் விழும். அது அந்திமனியக்கிரகலோறிரீர்⁵. முன்னே இது அல்கரதுபற்பம்⁶என்று பேர்ப்பட்டது. இதிலே ஐருசல்வரிக்கமில்லவாயுவைச் செல்லவிட்டால் செம்மஞ்சள் நிறமடையும். சோதனைகள். விசேஷகிராவிதம்⁸ 1.47. கால் அன்கு தாத்தரிக்கமில்லத்தை⁹ காலு அன்கு தண்ணீரில் கரைத்துக் கொண்டு, இந்த அந்திமனிதிரிகுலோறிரீர்⁵ கீசில் ஒரு திராமைச் கூட்டினால் தெளிந்த நீராகும். இதிலே ஐருசல்வரிக்கமில்ல வாயுவைச் செல்லவிட்டாற் செம்மஞ்சள்நிற அடையல் விழும். இந்த அடையலைக் கழுவி 212 பாகை சூட்டில் உலர்த்தினால் 22 கிரேன்வாகுதல் நிறுக்கும்.

தன்மை. இது வீரான காரம், தகனி, உள்ளே கொடுக்கப்படுவதில்லை. அந்திமனியக்கிரக¹⁰செய்வதற்கு இது வழங்கப்படும்.

அந்திமனிதாத்தரகம்.

TARTARATED ANTIMONY.

இது அந்திமனிதாத்தரசம்¹¹ பதாசி¹²தாத்தரசஞ் சேர்ந்த இணைப்பு. இதற்குச் சின்னம் பஅந்கா¹³ஐ¹⁴அ¹⁵ஐ¹⁶அ. அந்திமனியக்கிரதத்தையும் பதாசியமிலதாத்தரசமும்¹³ தண்ணீரில் கரைத்துக் கொதிப்பிக்க இது பிறக்கும். லட்சணங்கள். இது முக்கோண முகப்பைக் காட்டுகிற நிறமற்ற உருவொளியான கிரிஸ்தல்களாக இருக்கும். தண்ணீரில் கரையும். புரூவுசீதிற்¹⁴ குறைவாய்க் கரையும். சூடு காட்டப் படபென்று வெடித்துக் கறுக்கும். தண்ணீரில் கரைத்து ஐருகுலோறிக்கமில்லத்தைக் கூட்டினால் ஓர் வெண்ணடையல் உண்டாகும். தாத்தரிக்கமில்லத்தை முன்னமே கூட்டினால் அடையல் உண்டாகாது. சோதனைகள். இதில் இருபது கிரேன், 60 பாகை சூடுள்ள திஸ்திலித்த தண்ணீர் ஒரு அன்சிலே சேஷமில்லாமற் கரையும். அக்கரைவோடு ஐருசல்வரிக்கமில்லங்கூட்டினால் செம்மஞ்சள்நிற அடையலுண்டாகும். அதைக் கழுவி 212 பாகை சூட்டில் உலர்த்த 9.91 கிரேன் நிறுக்கும்.

தன்மை. இது வமனி, சுவேதனி, எக்ஸ்பெக்துறம்; சிறுதேயத்தில் அல்திறம்¹⁵. பெருந்தேயத்திலாவது நெடுகவாவது கொடுத்தால் நஞ்சு. தானிமாயிட்டால் ஏதிரழற்சி.

உபயோகம். சுரோய்கள், தாபிதநோய்களில்¹⁶ தசிரக் கிளர்ச்சியைக்

1 Surmi. 2 Strontia. 3 Fibrous Gypsum. 4 Hydrochloric acid. 5 Oxichloride of Antimony. 6 Powder of Algaroth. 7 Hydrosulphuric acid.

8 Specific Gravity. 9 Tartaric acid. 10 Oxide of antimony. 11 Tartrate of Antimony. 12 Potash. 13 Acid Tartrate of potash.

14 Proof spirit. 15 Alterative, பரிமாமி. 16 Inflammation.

குறைப்பதற்கு இது உத்தம மருந்து. சுவாசப்பைகள், நெஞ்சுறுப்புகளின் தாபிதங்களுக்கும், குறுப்பு¹, லறிஞ்சீது², குச்சலின் தொடக்கம், கதார்கன்³, இன்வுலென்சி⁴, எப்தீது⁵, தீவிரஐருகெவலம்⁶ தீவிரவாதம், ஐராதுரோசி⁷, திலீரியந்திரிமன்சு⁸, எபிலெப்சி⁹ என்னும் நோய்களுக்கும், பிளெதறத்¹⁰ தைச்சார்ந்த மற்ற நோய்களுக்கும் சீழ்க்கண்ணோய்க்கும் தாபிதம்பற்றிய மற்றும் கண்வியாதிகளுக்கும் இது மெத்த உவந்த மருந்து. மேலும் இரைப்பை நிறைந்திருக்கையிற் சத்திக்கப்பண்ணுவதற்கும் இது வாய்ப்பானது.

தேயம். அல்திறவமாகப் பதினாறிலொரு பங்கு முதல் எட்டிலொருபங்கு கிறேன் வரைக்கும், சுவேதனி எக்ஸ்பெக்துறமாக எட்டிலொருபங்கு முதற் காற்கிறேன் வரைக்கும், வமனியாக, ஒரு கிறேன் முதல் நாலுகிறேன் வரைக்குங் கரைத்துக் கொடுக்கலாம்.

ரசிதங்கள். அந்திமனி வைன், Antimonial wine. கொள். அந்திமனி தாத்தரகம், நாற்பது கிறேன்; செரிவைன், அரைநாழி. கரைக்கவும்.

தேயம். சுவேதனி, எக்ஸ்பெக்துறமாகப் பத்து முதல் முப்பது துளி வரைக்கும்; உவட்டிப்பதற்கு ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திரும் வரைக்கும், வமனியாக அரை அன்சு தேயமாவது இரண்டு திரும் தேயமாய் வார்திக்குந் தனையும் பத்துமினிக் கொருமுறையாவது கொடுக்கலாம். பிள்ளைகளுக்கு வமனியாக முப்பது துளி முதல் அறுபது துளி வரைக்குக் கொடுக்கலாம். ஆயினும் பெரும்பாலும் குழந்தைகளுக்கு இபிகாக்குக் கொடுப்பது உத்தமம். இதிலொரு அன்சிலே அந்திமனி தாத்தரகம் இரண்டு கிறேன் இருக்கும்.

அந்திமனி தாத்தரகவன்சென். Ointment of Tartarated Antimony. கொள். அந்திமனி தாத்தரகம், மாவாக, கால் அன்சு; தியியன்சென்¹¹ ஒரு அன்சு. திறமாய்ச் சேர்க்கவும்.

இது நயந்த எதிரழற்சி; சிலதரம் பூசினபின், பூசின இடத்திற் பருக்கள் தோன்றும். காலிகபுறங்கீது¹², ஈனோ, கசம், மற்றும் சுவாசநோய்கள், தீவிர மெனிஞ்சீது¹³, ஐராதுரோசி, பொருத்திலுண்டாகும் மற்றங் காலிகநோய்கள், முகதுறல்சி¹⁴, மற்றும் வகையான துறல்சி, என்ற நோய்களுக்கு இது பூச்சும ருந்தாகும். சிலவகைச் சோர்வ, குக்கலின் பின்பருவங்களில் இது பெரும்பாலும் முள்ளெலும்பிற் பூசப்படும். இது தோலிற் கடுமையாய்ப் பிடிக்குமாகையாலும் உடம்பிலுறிஞ்சப்பட்டு மோசத்துக்கு ஏதாவாகுமாயினாலும் இதைப் பூசும்போதெல்லாம் மெத்த விழிப்பாயிருக்கவேண்டும்.

பிஸ்முதம். BISMUTH.

சின்னம், பி; அணுப்பாரம் 210.

பிஸ்முதம் பெரும்பாலும் சுத்த லோகமாயிருக்கும்; கெந்தகம் அக்சிதங்க¹⁵ னோடு கலந்திருக்கும். இது பூமியின் பல பகுதிகளில் விசேஷமாய் காணுவல், சச்சனி, பொகீமி, ஐக்கமரிகத்தின் சில பகுதிகளில் உண்டு.

பூதபிஸ்முதம். PURIFIED BISMUTH.

இது கிரிஸ்தலான செவ்வெள்ளிற லோகம். வெடியுப்போடு சேர்த்து ருக்கிச் சுத்தமாயெடுக்கப்படும். 507 பாகை சூட்டில் ஒருகிப் பெரிய

1 Croup. 2 Laryngitis. 3 Catarrh. 4 Influenza. 5 Hepatitis. 6 Hydrocephalus. 7 Hyarthrosis. 8 Delirium tremens. 9 Epilepsy. 10 Plethora. 11 Simple ointment. 12 Bronchitis. 13 Meningitis. 14 Neuralgia. 15 Oxygen.

குழாயான கனவடிவக் கிரிஸ்தல்களாகும்¹. சோதனைகள். நீதுரிக்கமிலத்த² யும், திஸ்திலித்த³ தண்ணீரையும் சம பங்காய்க் கலந்து இந்தக் கலவையிற் கரைத்தால் பிஸ்முத நீதுரசு⁴நீராகும். அந்த நீரை வறட்ட நிறமற்ற கிரிஸ்தல்கள் உண்டாகும். தண்ணீர் சேர்க்க அக் கிரிஸ்தல்கள் கரைந்து வெண்ணடையலாகும். கிரிஸ்தல்களை விட்டுத் தாய்நீரை வேறாயெடுத்து அதற்கு அமோனகாபனசு⁵நீரைக் கூட்டினால், உண்டாகுமடையல் நிறமற்றதாய்வுவ்வு நிறங் குறைவாய் வரும்.

பிஸ்முதம் பின்வரும் ரசிதங்களுக்கு அடியாவதால் மாத்திரம் வாகடத்துக்குரியது.

பிஸ்முதவதநீதுரசு. SUBNITRATE OF BISMUTH.

இதற்குச் சின்னம், பி நீ அ¹ ஐ² அ. பிஸ்முதநீதுரசைத் தண்ணீரில் கரைக்கப் பிஸ்முதவதநீதுரசு பிறக்கும். லட்சணங்கள். இது பாரமான வெள்ளைமா. நுண்ணிய கிரிஸ்தல்கள் போன்ற செதில்களாலானது. ஐருசல்வுரிக்கமிலம்³படக் கறுக்கும். சோதனைகள். இது தண்ணீரில் கரையாது. அரைப்பங்கு திஸ்திலித்த தண்ணீரோடு கலந்த நீதுரிக்கமிலத்திலோ கரையும்; இக்கரைவைத் தண்ணீருக்குள்ளே வார்த்தால் ஓர் வெண்ணடையல் உண்டாகும். இச் சரக்குத் தாத்தரிக்கமிலத்திற்⁷ கரையாது. ஐருசல்வுரிக்கமிலத்தக்குக் கறுக்கும். சல்வுரிக்கமிலத்திற் கரைத்து சம அளவான தண்ணீருஞ் சேர்த்து அந்தநீருக்கு அயசல்வகைக் கூட்டி அது கபிலமாகும். தன்மை. துவர், செரதீவம்⁹, அல்திறவம்¹⁰.

உபயோகம். அசத்துவகுண்மம்¹¹, கஸ்திறல்¹², கஸ்திறடைன்¹³, பைரோசி¹⁴, இரைப்பைப் புண், அசத்துவக் கழிச்சல் என்ற நோய்களுக்கும், திசுந் தேரி¹⁵யின் முற்றிய பாசத்துக்கும் இது பெரும்பாலும் உவந்த மருந்து. மேலும் வெளிமருந்தாய் இது காட்பட்ட சருமநோய்களுக்கும், அபானம், முலைக்காம்பு, உதடு முதலிய பகுதிகளிற் காணும் வெடிப்புக்கும், தாவப்படுவதன்றி, லுசரீயம்¹⁶ கிலீற்று¹⁷களுக்கும் வழங்கப்படும்.

தேயம். ஐந்து கிரேன் முதல் இருபது கிரேன் வரைக்கு நாள் இரண்டு மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம்.

ரசிதங்கள். பிஸ்முதவில்லை. Bismuth Lozenges. கொள். பிஸ்முதவதநீதுரசு, ஆயிரத்துநானூற்று காற்பது கிரேன்; மக்னீசிகாபனசு¹⁸, காலு அன்சு; அதகசுண்ணகாபனசு¹⁹ ஆறு அன்சு; சுத்தசர்க்கரை இருபத்தொன்பது அன்சு; அகசிப்பிசின்மா²⁰, ஒரு அன்சு; அகசிப்பிசின் முசிலாகு²¹, இரண்டு அன்சு; ரோசை நீர் போதீயது. உலர்சரக்குகளெல்லாவற்றையுங் கலந்து, அப்பால் முசிலாகைக் கூட்டி. ரோசைநீரிலுஞ் சேர்த்து முழுவதையுந் தருந்தபதமாய் அரைத்து 720 வில்லைகளாகத் தட்டி மட்டான குடுள்ள காற்றையிலு உலர்த்தவும்.

வில்லை ஒவ்வொன்றிற், பிஸ்முதவதநீதுரசு இரண்டு கிரேன் இருக்கும்.

தேயம். நாளொன்றுக்கு மூன்று முதற் பத்து வில்லை கொடுக்கலாம்.

1 Crystal. 2 Nitric acid. 3 Distilled. 4 Nitrate of Bismuth. 5 Carbonate of Ammonia. 6 Hydrosulphuric acid. 7 Tartaric acid. 8 Sulphuric acid.

9 Sedative 10 Alterative. 11 Atonic Dyspepsia, 12 Gastralgia.

13 Gastrodyné, 14 Pyrosis. 15 Dysentery 16 Leucorrhoea 17 Gleet.

18 Carbonate of Magnesia. 19 Precipitated carbonate of Lime,

20 Gum acacia 21 Mucilage.

பிஸ்முதவதநீதுரசன்கேன். Ointment of Subnitrate of Bismuth. கொள். பிஸ்முதவதநீதுரசு, இரண்டு திரும்; தமியன்கென்¹, ஒரு அன்சு. திறமாய்க் கலக்கவும்.

பிஸ்முதவதநீதுரசு மாவை வெளிமருந்தாக வழங்கும் நோய்களுக்கு இதுவும் நன்றாய் உதவும்.

பிஸ்முதகாபனசு.

CARBONATE OF BISMUTH.

இதற்குச் சின்னம் 2(பி₂காஅ²)ஐ³அ. பூத பிஸ்முதத்தை நீதுரிக்கமிலத்தி⁴ற் கரைத்து அதோடு அமோனகாபனசைக்⁵ கலக்க, பிஸ்முதகாபனசு பிறக்கும். லட்சணங்கள். இது வெள்ளை மா; ஐருசல்வுரிக்கமிலம்⁶ படக் கறுக்கும்; தண்ணீரிற் கரையாது; நீதுரிக்கமிலத்திலோ நுரைத்துக்கொண்டுகரையும். சோதனைகள். இந்துசுசல்வசால்⁷ நிறத்த சல்வுரிக்கமிலத்துக்கு⁸ இதைக் கூட்டினால் அந்த நிறம் மாறாது. அரைப்பங்கு திஸ்திலித்த தண்ணீர் கலந்த நீதுரிக்கமிலத்துக்குப் பிஸ்முதகாபனசை கரையத்தக்க அளவாய்க் கூட்டி இக் கரைவில் ஒருபங்கை இருபதுபங்கு தண்ணீருக்குள்ளேவார்த்தால், ஓர் வெண்ணடையல் உண்டாகும். பிஸ்முதகாபனசை நீதுரிக்கமிலத்திற் கரைத்துக் கிருசசல்வுரிக்கமிலமாவது வெள்ளிநீதுரசு⁹நீராவது கூட்டினால் அடையல் உண்டாகாது.

தன்மை உபயோகங்கள். பிஸ்முதவதநீதுரசைப் போலவே.

தேயம். ஐந்து முதல் இருபது கிரேன் வரைக்கு.

பிஸ்முதவமோனசிதிறசு நீர்.

SOLUTION OF CITRATE OF BISMUTH AND AMMONIA.

கொள். பூதபிஸ்முதம் நானூற்று மூப்பது கிரேன்; நீதுரிக்கமிலம், இரண்டு அன்சு; சிதிறிக்கமிலம்¹⁰, இரண்டு அன்சு; அமோனீர்¹¹, திஸ்திலித்த நீர்¹² வகைக்குப் போதியது. நீதுரிக்கமிலத்தை ஒரு அன்சு திஸ்திலித்தண்ணீரோடு கலந்து, பிஸ்முதத்தைப் படிப்படியாய்க் கூட்டவும். நுரை ஒழிந்தபின் பொங்குஞ் சூட்டுக்குச் சொற்பங் குறைந்த சூட்டைப் பத்துமினி நேரமாக ஏற்றி அப்பால் அந்த நீரைத் தெளித்து அதில் ஏதுங் கரையாப் பதார்த்தமிருந்தாற் பிரிக்கவும். தெளித்த நீர் இரண்டு அன்சாய் வற்றுந்தனையும் அதை வறட்டி, சிதிறிக்கமிலத்தை முன்னமே நாலு அன்சு திஸ்திலித்த நீரிற் கரைத்து அதற்குச் சேர்த்து, அப்பால் உண்டான அடையல் மறுபடி கரைந்து அந்தநீர் சோதனைத்தாளுக்குத்¹³ தடஸ்தமாய்¹⁴ அல்லது சொற்ப அல்கலையாய்¹⁵ வருந்தனையும் அமோனீரைக் கொஞ்சங் கொஞ்சமாய்க் கூட்டவும். அப்பால் அரைநாழிக்குப் போதிய திஸ்திலித்த தண்ணீர் கூட்டவும். லட்சணங்கள். இது உவர்ப்புஞ் சற்றே லோகச்சுவையுங்கொண்ட நிறமற்ற நீர். விசேஷகிராவிதம், 1.122. சோதனைத்தாளுக்குத் தடஸ்தமாய் அல்லது சற்றே அல்கலையாய் நிற்கும். தண்ணீரோடு மாறுதலின்றிக் கலக்கும். பதாசி¹⁶நீரோடுகாய்ச்சினால் அமோனத்தைக்¹⁵ கக்கி ஓர் வெண்ணடையல் விழுத்தும். சோதனைகள். இதற்கு ஐருகுலோறிக்கமிலத்¹⁶தைக்

1 Simple ointment. 2 Nitric acid. 3 Ammonia carbonate. 4 Hydrosulphuric acid.

5 Sulphate of Indigo. 6 Sulphuric acid. 7 Nitrate of silver. 8 Citric acid.

9 Liquor ammonia. 10 Distilled water. 11 Test paper. 12 Neutral.

13 Alkaline. 14 Potash. 15 Ammonia. 16 Hydrochloric acid.

கூட்டினால் ஓர் வெண்ணடையலுண்டாகும். அமிலத்தை இன்னுங் கூட்ட அந்த அடையல் கரையும். இந்த நீரில் மூன்று திரும்பை ஒரு அன்சு தி ஸ்திலித்த தண்ணீரோடு கலந்து அதற்கு ஐருசல்வரிக்கமிலத்தை¹ மிஞ்சச் சேர்த்தால், ஓர் கறுப்படையலுண்டாகும். அந்த அடையலைச் சேர்த்துக் கழுவி உலாத்தினால் 9.92 கிறேன் நிறுக்கும்.

தேயம். முப்பது மினிம் முதல் ஒரு திரும்ப வரைக்குக் கொடுக்கவும். ஒருதிரும்பிற் பிஸ்முதவக்சிரம்² மூன்று கிறேன் இருக்கும்.

துத்தம். சிங்கு. ZINC.

சின்னம், து; அணுப்பாரம், 65. துத்தம் வன்மையும் நீல வெள்ளையு மான லோகம். இது மினிறல்³களுட் பலவகையாய்க் கலந்திருக்கும். பிர தானமாய்க் கெந்தகத்தோடு கலந்து பிளென்று⁴எனப்படும் துத்தசல்விர⁵மாக வும், காபனிக்கமிலத்தோடு கலந்து கலமின்⁶ என்ற துத்தத்தின் அசுத்த காப னசாகவுமிருக்கும். இது விசேஷமாய்ப் பிறித்தனில் மென்றிபுமலை⁷ அல் ஸ்தன்மூர்⁸ என்ற பகுதிகளிலும், பெல்சியம்⁹, சிலீசியம்¹⁰ என்ற தேசங்களிலு ம் எடுக்கப்படும். மேலும் இந்து சீனங்களிலுமுண்டு. இந்தலோகம் 773 பாகை சூட்டில் உருகும். மிகுதியான அமிலங்களிற் கரையும். இதின் விசேஷகிராவிதம் 6.8 முதல் 7 வரைக்கு இருக்கும்.

கிறணுலதுத்தம்.

GRANULATED ZINC.

வியாபாரத்தில் வரும் துத்தத்தை உருக்கி அதைத் தண்ணீருக்குள்ளே சிறு த்தாரையாக வார்க்க பரும் பொடியான துத்தம் வரும். இது கிறணுலதுத்த ம் எனப்படும். துத்த குலோறிம்¹¹, துத்தசல்வசு¹²செய்வதில் இது வழங்கப் படும்.

துத்தவக்சிரம். OXIDE OF ZINC.

துத்தவக்சிரம், துஅ, என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்படும். துத்தகாப னசிலுள்ள¹³ காபனிக்கமிலம்¹⁴ முழுவதும் பறியுந்தனையும் அதைச் சிவக் கக் காய்ச்சத் துத்தவக்சிரமாகும். லட்சணங்கள். இது சுவை மணமற்ற மெதுவான வெள்ளை மா. சூட்டால் வெண் மஞ்சள் நிறமாகும். கிருசசல் வரிக்கமிலத்தில்¹⁵ இதைக் கரைத்தால் அக்கரைவு ஐருசல்வரிக்கமிலத்துக்கு அடையல் விழுத்தாமல் அமோனத சல்விரத்துக்கோ¹⁶, வெண்ணடையலை விழுத்தும். சோதனைகள். இது கிருசநீதுரிக்கமிலத்திலே¹⁷ நுரையாமற் க ரையும். இக் கரைவு நீர் பாரிதகுலோறிரத்துக்¹⁸காவது வெள்ளிநீதுரசுக்கா வது மாறுதலடையாமல் அமோனகாபனசுக்கு¹⁹ வெண்ணடையலை விழுத் தம். அமோனகாபனசை இன்னும் மிஞ்சக் கூட்டவோ இவ்வடையல் நிறங்காட்டாமற் கரையும்.

1 Hydrosulphuric acid 2 Oxide of Bismuth. 3 Mineral. 4 Blende. 5 Sulphuret of Zinc. 6 Calamine. 7 Mendip Hills. 8 Alston Moor. 9 Belgium, 10 Silesia. 11 Chloride. 13 Sulphate. 13 Carbonate. 14 Carbonic acid. 15 Dilute sulphuric acid. 16 Sulphide of Ammonium. 17 Dilute nitric acid. 18 Chloride of Barium. 19 Carbonate of Ammonia.

தன்மை. இது தொணிகம்¹,செரதீவம்², அந்திஸ்பசி³. பெருந்தேயத்தில் வமனி, வீரேசனி. தானிகமாயிட்டாற் துவர்.

உபயோகம். துத்தசல்வசைப்⁴ போல. வெறிப்பைத்தியத்திற் காணும் சிராகுணங்களைத்⁵ தணிப்பதற்கு இது உத்தமமாம்.

தேயம். இரண்டு கிறேன் முதல் நாலு கிறேன் வரைக்கு. படிப்படியாய்க் கூட்டிப் பத்துக் கிறேன் வரைக்கும், இன்னுங் கூடவுங் கொடுக்கலாம்.

ரசீதம். துத்தவன்கென். Ointment of zinc. கொள். துத்தவக்சிரம் மாவாக, எண்பது கிறேன்; தமியன்கென்⁶, ஒரு அன்சு. தமியன்கெனை முதலே மென்கூட்டில் உருக்கி, துத்தவக்சிரத்தைப் படிப்படியாய்க் கூட்டி ஆறுந்தனையும் ஓயாமற் கலக்கவும்.

நாட்பட்ட சருமனோய்கள், கிடைப்புண்கள், வழந்தல்கள், கண்ணோய், ஸ்துருமசலதோஷம், பீனசம் முதலியவற்றுக்குப் பூச இது நல்ல மருந்து.

துத்தகாபனசு.

CARBONATE OF ZINC.

துத்தகாபனசு து கா அ³ 2(து அ) ிஐ³ அ. என்ற சின்னத்தாற் குறிக் கப்படும். துத்தசல்வசு என்னும் வெண்டுத்தத்தைச் சோடகாபனசாற்⁷கூறு படுத்தித் துத்தகாபனசு எடுக்கப்படும். லட்சணங்கள். இது வெண்மை யானது; சுவை மணமற்றது; தண்ணீரிற் கரையமாட்டாது; கிருசநீதுரிக்க மிலத்தில்⁸ நுரைத்துச் சேடமில்லாமற் கரையும். இக்கரைவுக்கு அமோனத சல்விரத்தைக்⁹ கூட்ட வெண்ணடையல் உண்டாகும். சோதனைகள். இதைக் கிருசநீதுரிக்கமிலத்திற் கரைத்தால் அக்கரைவு பாரியகுலோறிரத்துக்¹⁰ காவது வெள்ளிரீதுரசு¹¹க்காவது அடையல் காட்டாது. அமோனகாபனசு¹² க்கோ, வெண்ணடையல் காட்டும். அந்த அமிலத்தை மிச்சமாய்க் கூட்ட அடையல் நிறமில்லாமல் முற்றாய்க் கரையும்.

தன்மை உபயோகம். துத்தவக்சிரத்தைப்போலிருக்கும். இது மாவா யேனும் அன்கெனையேனும் வெளிமருந்தாகவே பிரதானமாய் வழங்கப்படும்.

தேயம், இரண்டு கிறேன் முதல் எட்டுக் கிறேன் வரைக்கும்.

ரசீதம். துத்தகாபனசன்கென். Ointment of Carbonate of Zinc. கொள். துத்தகாபனசு, இரண்டுதிரும்; தமியன்கென், பத்துத்திரும். திற மாய்க் கலக்கவும்.

இது லண்டன் வாமகுபீயத்திற்¹³ கலமின்சேர்வைக்குப்¹⁴ பதிலாகச் செய் யப்பட்டது. வேக்காட்டுக் காயங்கள், அவியல்கள், வழந்தல்கள், ஆழம ற்ற புண்களுக்கு இது நல்ல அணைவு.

துத்தவக்சிரமும்¹⁵ துத்த வசுதசுஞ்¹⁶செய்வதற்குத் துத்தகாபனசு வழங்கப் படும்.

1 Tonic. 2 Sedative. 3 Antispasmodic. 4 Sulphate of zinc. 5 Nervous Symptom. 6 Simple ointment. 7 Carbonate of soda. 8 Dilute nitric acid.

9 Sulphide of ammonium. 10 Chloride of barium. 11 Nitrate of silver.

12 Carbonate of Ammonia. 13 Pharmacopoea. 14 Calamine cerate.

15 Oxide, 16 Acetate.

துத்தவசிதசு. ACETATE OF ZINC.

துத்தவசிதசைக் குறிக்குஞ் சின்னம், து² (கா² ஐ³ அ²) ²ஐ² அ. துத்தவசிதசில் அசிதிக்கமிலத்தன் செயலால் துத்தவசிதசு பிறக்கும். லட்சணங்கள். இது மெல்லிய, உருவொளியுள்ள, நிறமற்ற, கிரிஸ்தற் தகடுகளாய் முத்துப்போல் மினுக்கமாயிருக்கும்; கார்ப்பான கெட்ட சுவைகொண்டது; தண்ணீரில் கரையும்; ஐருசல்வுரிக்கமிலவாயு பட்டால், வெண்ணடையுண்டாகும். சல்வுரிக்கமிலத்தாற்⁴ கூறுபடுத்தும்போது அசிதிக்கமிலத்தை⁵ கக்கும். சோதனைகள். இதைக் கன தண்ணீரில் கரைத்துப் பாரியகுலோறிரமாவது⁶, வெள்ளீநீதுரசாவது⁷ கூட்ட யாதொரு மாறுதலுமுண்டாகாது. அதை ஐருகுலோறிக்கமிலத்தாற் சற்றே புளிப்பாக்கினால், ஐருசல்வுரிக்கமிலத்துக்கு அடையல் தோன்றாது. இதைச் சொற்ப நீதுரிக்கமிலத் தோடுசில மினி ரோமாகக் கொதிப்பித்தால் அமோனத்தைக்⁸ கூட்ட வெண்ணடையல் தோன்றும் அமோனத்தை மிஞ்சக் கூட்டினால் இவ்வடையல் நிறமில்லாமல் முற்றாய்க் கரையும்.

தன்மை உபயோகம். சுத்த சல்வசைப் போலவே. விசேஷமாய் ஒரு அன்சு தண்ணீருக்கு இரண்டு கிரேன் முதல் நாலு கிரேன் வீதமாய்க் கரைத்துக் கணுநீயம்⁹, கிலீற்று¹⁰, லுகுநீயம்¹¹ நோய்களுக்குப் புகட்டலாகவும்¹², எக்ஸிமத்துக்கும்¹³ நாட்பட்ட மற்றும் சருமநோய்களுக்கும் லோஷனாகவும்¹⁴, கண்ணோய்க்கு விசேஷமாய் குழந்தைகள் பிள்ளைகளுக்குண்டாகும் கண்ணோய்க்குக் கலூறியமாகவும்¹⁵ வழங்கப்படும்.

தேயம். தொணிகம்¹⁶, அந்திஸ்பசியாக¹⁷ ஒருகிரேன் முதல் இரண்டு கிரேன் வரைக்குப் படிப்படியாய்க் கூட்டிக் கொடுக்கலாம். வமனியாகப் பத்துக் கிரேன் முதல் இருபது கிரேன் வரைக்குக் கொடுக்கலாம்.

துத்தவலீரியனசு.

VALERIANATE OF ZINC.

இதற்குச் சின்னம், து² (கா² ஐ³ அ²). துத்தசல்வசைச்¹⁸ சோடவலீரியனசாற்¹⁹ கூறுபடுத்தத் துத்தவலீரியனசு பிறக்கும். லட்சணங்கள். இது பளபளப்பான முத்துப்போன்ற வெண் தகட்டுக் கிரிஸ்தல்களாக இருக்கும். சொற்ப வலீரியனிக்கமிலம்²⁰ மணமும், லோகச்சுவையுங்கொண்டது. தண்ணீரிலாவது ஈதரிலாவது²¹ கரைவதரிது. வெந்நீரிலும் அலக்காலிலும்²² கரையும். திறந்த குகையிலே சிவக்கக் காய்ச்சினால் சேஷமிருக்கும். அச்சேஷத்தைக் கிருசு²³ சல்வுரிக்கமிலத்திற் கரைத்து, அமோனத்தைக் கூட்டினால் ஓர் அடையல் காணும். அந்த அமிலத்தை மிச்சமாய்க் கூட்ட அடையல் முழுதங் கரையும். இக்கரைவுக்கு அமோனதசல்விரத்தைக்²⁴ கூட்ட ஓர் வெண்ணடையல் உண்டாகும். சோதனைகள். இதின் வெந்நீர்க்கரைவு பாரியகுலோறிரத்துக்கு அடையாது. இதைக் கிருசுசல்வுரிக்கமிலத் தோடு காய்ச்சி ஆவியாக்கி அடர்த்தியெடுக்கும் நீரைச் செம்பசிதசு²⁵ நீரோடு

1 Hydrosulphuric acid. 2 Sulphuric acid. 3 Acetic acid. 4 Chloride of barium. 5 Nitrate of silver. 6 Hydrochloric acid. 7 Nitric acid. 8 Ammonia. 9 Gonorrhoea. 10 Gleet. 11 Leucorrhoea. 12 Injection. 13 Eczema. 14 Lotion. 15 Collyrium. 16 Tonic. 17 Antispasmodic. 18 Sulphate of zinc. 19 Valerianate of soda. 20 Valerianic acid. 21 Ether. 22 Alcohol. 23 Dilute. 24 Sulphide of ammonium. 25 Acetate of copper.

கலந்தால் அநீரின் உருவொளித்தன்மை உடனே கெடாமலிருக்கச் சற்றே வேளையால் நெய்த்துளிகளுண்டாகிப் படிப்படியாய் நீல வெண்மையான கிரிஸ்தலகையலாகும்.

தன்மை. இது சிராதொணிகம்¹. அந்திஸ்பசி².

உபயோகம். எபிலெப்சி³, கொரீயம்⁴, இஸ்தேரி⁵, துறல்சி⁶யென்ற நோய்களுக்கு இது பிரதானமாய்க் கொடுக்கப்படும்.

தேயம். அரைக் கிறேன் தொடங்கி ஒரு கிறேன் வரைக்கும்; படிப்படியாய்க் கூட்டி மூன்று கிறேன் வரைக்கும், நாள் இரண்டு மூன்று முறை கொடுக்கலாம்.

துத்த குலோற்றம்.

CHLORIDE OF ZINC.

இதற்குச் சின்னம் துது². கிறனுல⁷துத்தத்தில் ஐருகுலோறிக்கமிலத்தை விட்டு குலோறின்⁸ கரைத்த நீரையும் துத்தகாபனசு¹⁰ கரைத்த நீரையுஞ் சேர்த்து அக்கரைவைச் சுத்தமாக்கி வறட்ட துத்தகுலோற்றம் உரப்பொருளாக வரும். லட்சணங்கள். இது நிறமற்ற மங்கற் தோல்களாயாவது தகடுகளாயாவது இருக்கும். சுறுக்காய் நீரை உறிஞ்சி உருகக்கூடியது, காரமானது; தண்ணீரிலும் அலக்காலிலும்¹¹ ஈதரிலும்¹² ஏறக்குறைய முற்றாய்க் கரையும்; இதின் தண்ணீர்க் கரைவுக்கு அமோனதசல்விர்ம்¹³ அல்லது வெள்ளிநீதரசைக்¹⁴ கூட்ட வெண்ணடையலுண்டாகும். ஆயினும் முதலே ஐருகுலோறிக்கமிலத்தாற் புளிப்பாக்கினால் ஐருசல்வுரிக்கமிலத்துக்கு¹⁵ மாறுதலடையாது. சோதனைகள். இதின் தண்ணீர்க்கரைவு பாரியகுலோற்றித்துக்காவது¹⁶, அமோனவக்சலசுக்காவது¹⁷ மாறுதலடையாது. பதாசிபீதபுருயசுக்காவது¹⁸, பதாசிசெம்புருசியசுக்காவது¹⁹ நீலமாகாது. அமோனம் இதிலொரு வெண்ணடையலை விழுத்தும். அமோனத்தை மிஞ்சக் கூட்ட முற்றாய்க் கரையும்.

தன்மை. இது வீரன தகனி. சிறு தேயமாய்க் கன தண்ணீர்த் கரைத்து உள்ளே கொடுத்தால் நரம்புத்தொணிகமாகுமென்று எண்ணப்பட்டாலும் கொடுப்பதரிது. சுத்தமான துத்தகுலோற்றம் அரிநஞ்சு²⁰. கந்தக்கினி²¹ யாக இதின் தன்மை மெத்த.

உபயோகம். கன்சர்²² முதலிய உக்கிரப்²³ புண்சளுக்கு இது காரமாயிடப்படும். ஆயினும் இவ் வகுப்பைச் சேர்ந்த மற்றங் காரங்களிடுவதாலுண்டாகும் நயத்தைப் பார்க்க இதை இடுவதால் விசேஷமில்லை. கனுறீயத்துக்கும்²⁴ கனுறீயக் கண்ணோய்க்கும்²⁵ இது காரமில்லாமல் ஒரு அன்சு தண்ணீருக்கு ஒரு கிறேன் வீதமாய்க் கரைத்துத் தானிகமாயிடப்படும்.

தேயம். அரைக் கிறேன் முதல் ஒரு கிறேன் வரைக்கும் இன்னுங் கூடவுங் கன தண்ணீர்த் கரைத்துக்கொடுக்கவும்.

ரகீதம். துத்தகுலோற்ற நீர். Solution of Chloride of Zinc கொள் கிறனுலதுத்தம், ஒரு இரூத்தல்; ஐருகுலோறிக்கமிலம் நாற்பத்துநாலு அன்சு;

1 Nervine tonic. 2 Antipasmodic. 3 Epilepsy. 4 Chorea. 5 Hysteria. 6 Neuralgia. 7 Granulated. 8 Hydrochloric acid. 9 Chlorine. 10 Carbonate of zinc. 11 Alcohol. 12 Ether. 13 Sulphide of ammonium. 14 Nitrate of silver. 15 Hydrosulphuric acid. 16 Chloride of barium. 17 Oxalate of ammonia. 18 Yellow prussiate of potash. 19 Red prussiate of potash. 20 Deodorizer. 21 Corrosive. 22 Cancer. 23 Malignant. 24 Gonorrhoea. 25 Ophthalmia.

குலோறநீர்¹ போதியது; துத்தகாபனசு² அரைஅன்சு, அல்லது போதியது; திஸ்திலித்த தண்ணீர்³ அரைநாழி. ஐருகுலோறிக்கமிலத்தையும் தண்ணீரையும் பீங்கான் பாத்திரத்தற் கலந்து, துத்தத்தைக் கூட்டி வாயு கக்குதல்ஒழி யுந்தனையும் செயல் அதிகரிப்பதற்கு மென்குடேற்றவும். ஆவியாய்ப் பறிந்த தண்ணீருக்குப் போதிய தண்ணீர் சேர்த்து அரைமணி நேரமாகக் கொதிப்பித்து ஆறவிடவும். அப்பாற் சீசாவக்குள்ளே வடித்துவிட்டு அது குலோறி⁴ மணத்தை நிலைபரமாய் அடையுந்தனையும் குலோறநீரைப் படிப் படியாய்க் குலுக்கிக் குலுக்கிக் கூட்டவும். நீரை ஓர் பீங்கான் பாத்திரத் தில் வடித்து அது ஒரு நாழியளவாகுந்தனையும் வறட்டவும்.

பேணுந்திசுவெத்து நீர்⁵ என்று வாடிக்கையாய்ச்சொல்லப்படுகிற இந்த நீர் எல்ல கந்தக்கினி⁶. தண்ணீர் கலவாமற் குடித்தால் வீரூன அரி⁷ நஞ்சு அழற்று நஞ்சாய் முடியும்.

துத்தசல்வசு. வெண்டுத்தம்.

SULPHATE OF ZINC.

வெண்டுத்தமாகிய துத்தசல்வசு துகேஅ¹ 7ஐ²அ என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்படும். லட்சணங்கள். இது நிறமற்ற உருவொளியான பிரிசக்³ கிரிஸ்தல்களாக⁴ இருக்கும். வீரூன லோகத்துவர்ச் சுவை கொண்டது. இதைத் தண்ணீரிற் கரைத்துப் பாரியகுலோறி⁵ரமாவது⁶ அமோனதசல்விரமாவது⁷ சேர்க்க, வெண்ணடையலுண்டாகும். சோதனைகள். இதின் நீர்க்கரைவு மாசக்காயிரஞ்சத்தால்⁸ தூமிர⁹ நிறமடையாது. சல்வுரிக்கமிலத்தால்¹⁰ லாவது ஐருகுலோறிக்கமிலத்தாலாவது¹¹ புளிப்பாசுகினால் அது ஐருசல்வுரிக்கமிலத்துக்கு¹² அடையலைக்காட்டாது. அமோனம்¹³ அமோனகாபனசு¹⁴ கருக்கு ஓர் வெண்ணடையலைக் காட்டும். அமோனத்தையாவது அமோனகாபனசையாவது மிச்சமாய்க் கூட்ட அந்த அடையல் நிறமில்லாமல் முற்றாய்க் கரையும்.

தன்மை. தொணிகம்¹⁵, துவர், அந்திஸ்பசி¹⁶, நயர்தவமனி; பெருந்தேயததில் நஞ்சு. தானிகமாயிட்டால், துவரும், ஸ்திமுலமும்¹⁷; காய்வான அவைரு¹⁸ நிலைமையிற் காரமாகும்.

உபயோகம். கொரியம்¹⁹, எபிலெப்சி²⁰, ஸ்பசன்களைக் கருக்கும்²¹, குக்கலின் பிற்பாதம். அஞ்சினைபெத்துசு²². முறைச்சுரம், பெலவீனத்தோடுகூடிய இஸ்தேரி²³, காலிகதிசந்தெரி²⁴, தியறீயம்²⁵, அசத்துவமெனூறீயங்கருக்கும்²⁶, இது கொடுத்துநயந்தது. வெளிமருந்தாக இதைத் தண்ணீரிற் கரைத்துக் கனூறீயம்²⁷ லுகறீயங்க²⁸ளுக்குப் புகட்டலாம். பலவகையான கண்ணோய்க்குக் சலூறியமாகவும்²⁹, புண்களுக்கும் காலிக சருமநோய்கள்சிலவற்றுக்கும் லோஷ³⁰ னாகவும் இடலாம். மேலும் அக்கரத்துக்கும் வாய் தொண்டைகளிலுண்டாகும் மற்றும் புண்களுக்கும் லேகியமாய் வழங்கப்படும்.

- 1 Solution of chlorine. 2 Carbonate of zinc, 3 Distilled water. 4 Chlorine. 5 Burnet disinfectant fluid. 6 Deodorizer. 7 Corrosive. 8 Prism. 9 Crystal. 10 Chloride of barium. 11 Sulphide of Ammonium. 12 Tincture of galls. 13 Purple. 14 Sulphuric acid. 15 Hydrochloric acid. 16 Hydrosulphuric acid. 17 Ammonium. 18 Carbonate. 19 Tonic. 20 Antispasmodic. 21 Stimulant, 22 Anhydrous, 23 Chorea. 24 Epilepsy. 25 Spasmodic asthma. 26 Angina pectoris. 27 Hysteria. 28 Chronic dysentery. 29 Diarrhoea. 30 Menorrhoea. 31 Gonorrhoea. 32 Leucorrhoea. 33 Collyrium. 34 Lotion.

தேயம். ஒருகிறேன் இரண்டு கிறேனிற் துவங்கிப் படிப்படியாய் ஐந்து கிறேன் வரைக்குங் கூட்டித் தொணிகம், அந்திஸ்பசியாய்க் கொடுக்கலாம். வமனியாகப் பத்துக் கிறேன் முதல் முப்பது கிறேன் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். இது ஆளைப் பெலவீனப்படுத்தாமற் சுறுக்கிற் சேஷ்டிக்கு மாகையால் நஞ்சுண்டார்க்கு உவந்த வமனியாகும்.

[துத்தமும் அதின் சிலஉப்புகளும் ஆசியத்தின் உஷ்டணபகுதியாருக்குள் அறியப்பட்டிருந்ததாயினும் மருந்தாய் மெத்த வழங்கப்படவில்லை. வியாபாரத்தில் வழங்கும் சீனத் துத்தத்துக்குத் துத்தநா⁴மென்று சொல்வார்கள். அச் சொல் தமிழிலும் சீனத்திலும் வழங்கும். துத்தமென்ற சொல் இந்துவிலும் பார்சியத்திலும் வழங்கும். இது பார்சியத்துலிருந்து வரும் துத்தவாகரிக்குப் பெயர். துத்தத்திலிருந்து துத்தநாகபஸ்மம் என்ற ஓர் உப்பைச் சுதேசிகள் செய்வார்கள். செய்யும் முறையைப்பற்றி ஜனர் என்பவர் கூறுகிறார். அந்தப் பஸ்மத்தைக் கனுறீயம், ஸ்பமதறீயம்¹, லுசுறீயம், அரிசம்², என்ற நோய்களுக்கு மெத்த நம்பிக்கையோடு கொடுப்பார்கள். அதின்தேயம் ஒரு கிறேன் முதல் நாலு கிறேன் வரைக்குப் போலும். இதை வலீரிய³னோடு கலந்து கடுமையான எபிலெப்சிக்குத்⁴ தாம் கொடுத்து மெத்த நயங்கண்டதென்று ஜனர் என்பவர் சொல்லியிருக்கிறார். அது அசுத்த துத்தவக் கிர⁵மாயிருக்கவேண்டும்.

கட்மியம். CADMIUM.

சின்னம், கட்; அணுப்பாரம் 112.

இது இயற்கையிற் கட்மிய சல்விர்மாகத்⁶ துத்தவாகரிகள் மிகுதியானவைகளில் இருக்கும். துத்தத்தை நீக்கியெடுத்தால் இது வெள்ளைலோகம். தகடாய் அடிக்கவும் கம்பியாய் நீட்டவுங் கூடியது. 4+2 பாகையில் உருகும். 8.7 என்ற விசேஷ கிறுவிதத்தை உடையது.

கட்மியவியோதிரம்.

IODIDE OF CADMIUM.

இது கட் இ₂ என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்படும். இயோதத்தையும்⁷ கட்மியத்தையும் தண்ணீர் விட்டுக் கலக்க இக் கலவை உண்டாகும். லட்சணங்கள். இது தட்டையான அப்பிரகம்⁸ போன்ற கிரிஸ்தல்களாக⁹ இருக்கும். வெள்ளையும் முத்துப்போல் மினுக்கமுமானது. 600 பாகை குடுவரைக்கு ஏற்ற, உருகி அட்பர்¹⁰நிறமான நீராகும். மங்கற் சிவப்பான குட்டுக்கு வரச் செந்நீலநிறமான ஆவியைக் கக்கும். இது அவைநுவானது. பரயாணுவில் நீரை உறிஞ்சிக் கரையாது. தண்ணீரிலுந் திட்ட சீதிலுந்¹¹ தாராளமாய்க் கரையும். இக் கரைவுநீர் லிற்மஸ்தானைச்¹² சிவப்பாக்கும். சோதனைகள். இதின் தண்ணீர்க் கரைவிலே ஐருசல்வுரிக்கமிலமாவது¹³ அமோனதசல்விர்மாவது¹⁴ பட ஓர் மஞ்சளடையலுண்டாகும். அவ்வடையல் அமோனதசல்விர்மத்தை அதிகஞ் சேர்த்தாலும் கரையாது. மேலும் இதின் தண்ணீர்க்கரைவுக்குப் பதாசிரீரை¹⁵மிச்சமாய்க் கூட்ட வெண்மையான செலதின்¹⁶ போன்ற அடையலுண்டாகும். அந்த அடையலை வடித்துப் பிரித்து

1 Spermatorrhoea 2 Piles. 3 Valerian, 4 Epilepsy, 5 Oxide, 6 Sulphide.

7 Iodine or Iodum. 8 Mica, 9 Crystal. 10 Amber. 11 Rectified spirit.

12 Litmus paper. 13 Hydrosulphuric acid. 14 Sulphide of ammonium,

15 Solution of potash, 16 Gelatine.

வடிநீருக்கு அமோனதசல்விரஞ் சேர்த்தால் அது யாதொரு மாறுதலுமடையாது. பத்துக் கிரேனைத் தண்ணீரில் கரைத்து அதற்கு வெள்ளிநீரைச் சேர்த்துக் கூட்டும்போதுண்டாகும் அடையலைத் தண்ணீரில் கழுவிப் பிறகு அரைஅரை அமோனநீரில் கழுவி உலர்த்தினால் அது 12.5 கிரேன் கிறக்கும்.

தன்மை உபயோகம். இது உள்ளே கொடுக்கப்படுவதில்லை. வெளி யிலிட்டால் ஸ்திமூலமாய்ச் சேஷ்டிக்கும். வங்கவியோதிரம்² வழங்குநோ ய்களுக்கு இதை வழங்கலாம். அதைப்போல் இது தோலை மஞ்சணிக்கப் பண்ணமாட்டாது.

ரகிதம். கட்மியவியோதிரவன்கென். Ointment of Iodide of Cad-
mium. கொள். கட்மியவியோதிரம் மாவாக, அறுபத்திரண்டு கிரேன்;
தமியன்கென்³, ஒரு அன்சு. திறமாய்க் கலக்கவும்.

ஸ்துரும⁴கோள வீக்கங்களுக்கும் தொல்லையான சருமநோய்கள் சிலவற் றிற்கும் இது பயந்த பூச்சு மருந்து.

ஈயம். LEAD.

சின்னம். ஈ; அணுப்பாரம் 207.

ஈயம் பலவகையாய் ஆகரிகளில் கலந்திருக்கும். பிரதானமாய் ஈயச்ச ல்விரமாகக் கெந்தாத்தோடு கலந்து கலீனம்⁵ என்ற கல்லாயிருக்கும். ஈயம் நீல வெண்மையான லோகம்; மெதுவானது; தகடாய் அடிபடக் கூடியது. 617 பாகை சூட்டில் உருகும். இதின் விசேஷகிராவிதம் 11.36. நீதுரிக் கமில்மே இதைக் கரைப்பவைகளுள் விசேஷம்.

ஈயவக்சிரம். OXIDE OF LEAD.

ஈயவக்சிரத்துக்குச் சின்னம் ஈஅ. உருக்கிய ஈயத்திலே சூடாக்கிய பர மாணு நெடுகப்பட்டு வீசவிடுவதால் ஈயவக்சிரம் உண்டாகும். லட்சணங் கள். இது வெளிறின செங்கல்நிறமான கனத்த செதில்களாக இருக்கும். கிருசநீதுரிக்கமில்ம்⁶ அசுதிக்கமில்ங்களிற்⁷ கரையும். இக்கரைவிலேதென் றாலும் தடன்⁸மாயிருக்கையிற் பதாசியவியோதிரத்தைக்⁹ கூட்டினால் மஞ்ச ன்நிற அடையல் கனமாயுண்டாகும். சோதனைகள். இது கிருசநீதுரிக்க மில்த்தில் நுரையாமற் கரையும். அக் கரைவை அமோனத்தால்¹⁰ அதி பூர்த் தித்து, வடித்துத் தெளிவாயெடுத்தால் நீல நிறங் காட்டாது.

தன்மை. இதின் தன்மை திறமாயறியப்படவில்லை. அழற்றியானதெ ன்பதே எண்ணம். இதின் ஆவியை ஓயாமற் சுவாசித்தால் நஞ்சாய் முடி யும். இது ஈயப்பற்றுக வெளிமருந்தாக மாத்திரம் வழங்கப்படும்.

ரகிதம். ஈயப்பற்று. Lead Plaster. கொள். ஈயவக்சிரம், மாவாக நாலு இரத்தல்; ஒலீவதேல்¹¹ நாலுநாழி; தண்ணீர் ஒன்றேழுக்கால்நாழி. எல்லாவற்றையும் ஸதீம்மத்திகத்தின்¹² சூட்டில் மெதுவாய்க் கொதிப்பித்து, பற்றுக்குத் தருந்த பதமாய் வருந்தினையும் நெடுகக் கலக்கிக் கலக்கி மென் சூடேற்றவும். கொதிப்பிக்கும்போது தண்ணீர் தேவையானாற் கூட்டிக் கொள்ளலாம்.

1 Nitrate of silver. 2 Iodide of Lead. 3 Simple ointment. 4 Struma. 5 Galena.
6 Dilute nitric acid. 7 Acetic acid. 8 Neutral 9 Iodide of Potassium.
10 Ammonia. 11 Olive oil. 12 Steam bath.

காயங்களின் ஓரங்களைச் சந்துசெய்வதற்காகவும் வேறு நோக்கங்களுக்காகவும் இப்பற்று இரணவைத்தியத்தில் வாடிக்கையாய் வழங்கப்படும்.

இது இராஸப்பிலாஸ்தர்¹, சபுபிலாஸ்தர்², அயபிலாஸ்தர், கல்பனப்³பிலாஸ்தர், இரசபிலாஸ்தர் என்னும் பற்றுக்களில் ஓர் கூறுகச் சேருகின்றது.

ஈயகாபனசு. CARBONATE OF LEAD.

இது மெதுவான கனத்த வெள்ளை மா; ஐருசல்வுரிக்கமில்⁴ பட்டால் ஈறுக்கும், தண்ணீரிற் கரையாது, கிருசு அசிதிக்கமில்⁵ துரைத்துக் கரையும், அக் கரைவுக்குப் பதாசியவியோதிரம்⁶ கூட்ட மஞ்சளடையல் உண்டாகும், சல்வுரிக்கமில்⁷ கூட்ட வெண்ணடையலுண்டாகும். சோதனைகள். இது சேஷமில்லாமல் அசிதிக்கமில்⁸ துரையும்; அக்கரைவுக்கு ஐருசல்வுரிக்கமில்⁹ தை மிச்சமாய்க் கூட்டிக் கொதிப்பித்து வடித்தால் அமோனவக்சலசு⁸ கூட்ட அடையல் தோன்றாது.

தன்மை, உபயோகம். வழுந்தல்சுள், ஆழமற்ற புண்கள், மற்றும் சரும ரோகங்களுக்கு மாவாயென்கிலும் அன்கெனெயென்கிலும் தானிகமாயிட் டால் இது துவராகும். உள்ளே கொடுப்பதில்லை.

ரசிதம். ஈயகாபனசுள்கென். Ointment of Carbonate of Lead. கொள். ஈயகாபனசு, மாவாக அறுபத்திரண்டு கிறேன்; தமிழன்கென்⁹ ஒரு அன்சு. திறமாய்க் கலக்கவும்.

ஈயவசிதசு. ACETATE OF LEAD.

ஈயவசிதசு ஈ 2 (கா² ஐ³ அ²) 3ஐ²அ என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்படும். ஈயவக்சிரத்தை¹⁰ அசிதிக்கமில்¹¹ துரத்து வறட்ட, ஈயவசிதசு கிரிஸ்தற் கட்டிகளாக விளையும். லட்சணங்கள். இது வெள்ளையான கிரிஸ்தற் கட்டிகளாக இருக்கும். பரமானுவில் வைக்கச் சற்றே பூக்கும். காடி மணமும் இனிப்பான துவர்ச்சுவையுங் கொண்டது. இதின் தண்ணீர்க்கரைவு விறம்ஸ்தானைச்¹² சற்றே சிவப்பாக்கும். அதற்குப் பதாசியவியோதிரத்தைக் கூட்ட மஞ்சள்நிற அடையலுண்டாகும். சல்வுரிக்கமில்¹³ துக்கு வெண்ணடையலுண்டாக அசிதிக்கமில் விடப்படும். சோதனைகள். இதைத் திஸ்திலித்த நீரிற் கரைத்தால் அக் கரைவு தெளிந்ததாயிருக்கும் அல்லது சற்றே பால்போல் மங்கலாகும், அசிதிக்கமில்¹⁴ தைக் கூட்ட மங்கல் மாறும். முப்பத்தெட்டுக் கிறேனைத் தண்ணீரிற் கரைத்தால் அதைப் பூரணமாய் அடையப்பண்ணுவதற்கு அக்சலிக்கமில்¹³ பருமவிலயனத்தில்¹⁴ 200 கிறேனளவு வேண்டும்.

தன்மை. துவர், செரதீவம்¹⁵. பெருந்தேயத்தில் நஞ்சாகும்.

உபயோகம். இரத்தஇருமல்¹⁶, இரத்தவாந்தி¹⁷, இரத்தாழுரி¹⁸, மெனுறியங்களுக்கும்¹⁹ மற்றும் உள்ளிரத்தப் பெருக்குக்கும் இது மெத்தச் சத்துள்ள மருந்து. மேலும் பலவகையான தியறியம்²⁰, விசேஷமாய் வாந்திபேதி போன்

1 Resin Plaster. 2 Soap plaster. 3 Galbanum. 4 Hydrosulphuric acid.

5 Dilute acetic acid. 6 Iodide of potassium. 7 Sulphuric acid. 8 Oxalate of Ammonia. 9 Simple ointment. 10 Oxide of lead. 11 Acetic acid.

12 Litmus paper. 13 Oxalic acid. 14 Volumetric solution.

15 Sedative. 16 Haemoptysis, எமத்தசி. 17 Haematemesis.

18 Haematuria. 19 Menorrhoea. 20 Diarrhoea.

றவை, திசந்தெரி¹யின் பிற்கால்கள். இரைப்பைப்புண், புறங்குறீயம்² என்ற நோய்களுக்கும் உவந்தது. மேலும் கண்டரைஅனுரிசம்³, இதயநிபோஷம்⁴, எபிலெப்சி⁵, இறுதியவளி⁶ நோய்களுக்கும் இது வழங்கப்படும். வெளிமருந்தாகத் தண்ணீரிற் கரைத்திட்டால் தாபிதங்கொண்ட அல்லது வழந்தின இடங்களுக்கும், சருமநோய்களுக்கும் சிலவகையான கண்ணோவுக்கும் சாந்தன துவராகும். கனுறீயம்⁷, கிலீற்று⁸, லுகறீயங்களுக்கு⁹ இது அந்த நோக்கமாய்ப் புதட்டப்படும்.

தேயம். ஒரு கிறேன் முதல் ஐந்து கிறேன் வரைக்கும், இன்னுங் கூடவுங் குளிகையாக்கிக் கொடுக்கலாம்.

ராசிதம். ஈயவவின் துளிகை. Pill of Lead and Opium. கொள். ஈயவசிதசு, மாவாக, முப்பத்தாறு கிறேன்; அவின் மாவாக, ஆறு கிறேன்; ரோசைலேசியம்¹⁰ ஆறு கிறேன். திறமாய் அரைத்துச் சேர்க்கவும்.

தேயம். நாலு கிறேன் முதல் எட்டுக் கிறேன் வரைக்கு. இதில் எட்டுக் கிறேனில் ஒரு கிறேன் அவின் இருக்கும்.

ஈயக்கூட்டுச்சப்பாசிதுறி. Compound Lead Suppositories. கொள். ஈயவசிதசு, முப்பத்தாறு கிறேன்; அவின் மா, பன்னிரண்டு கிறேன்; பெஞ்சோயஸ்லாடி¹¹ நாற்பத்திரண்டு கிறேன்; வெண்மெழுகு, பத்துக் கிறேன்; தியுபுரோமசேல்¹², எண்பது கிறேன். மெழுகையும் தியுபுரோம தேலையும் மெண் சூட்டில் உருக்கி, மற்றுஞ் சரக்குகளை முன்னமே குழியம்மியிலிட்டு அரைத்து இவற்றோடு கூட்டித் திறமாய்க் கலந்து அக்கலவை நீராயிருக்கையில், பதினைந்து கிறேன் கொள்ளத்தக்க தகுந்த குகைகளில் வார்க்கவும்; அல்லது அக்கலவையை ஆறவிட்டுப் பன்னிரண்டு சமபங்குகளாகப் பிரித்து, ஒவ்வொருபங்கையும் சப்பாசிதுறிக்கு வசதியானசாங்கமாக்கிக்கொள்ளவும்.

ஒவ்வொரு சப்பாசிதுறியில் ஒரு கிறேன் அவின் இருக்கும். திசந்தெரிக்கும் துவர்களும் அவின்னும் வேண்டிய மற்றும் அடி வயிற்று நோய்களுக்கு இது நல்ல மருந்து.

ஈயவசிதசுன்கேன். Ointment of Acetate of Lead. கொள். ஈயவசிதசு, மாவாக, பன்னிரண்டு கிறேன்; பெஞ்சோயஸ் லாடி அல்லது தமீயன்கென்¹³, ஒரு அன்சு. திறமாய்ச் சேர்க்கவும்.

அழற்சிகொண்ட சருமநோய்களுக்கு இது நல்ல பூச்சு மருந்து.

ஈயவதவசிதசு நீர்.

SOLUTION OF SUBACETATE OF LEAD.

இது ஈயவதவசிதசைத் தண்ணீரிற் கரைத்த நீர். ஈயவதவசிதசுக்குச் சின்னம் ஈ கா² ஐ³ அ². லட்சணங்கள். இது தடித்த தெளிந்த நிறமற்ற நீர், அல்கலைத்¹⁴ தன்மையும் இனிய துவர்ச் சுவையுங்கொண்டது. பரமானு பட்டாற் கலங்கலாகும், அகசி முசிலாகு¹⁵ கூட்ட மங்கலான வெள்ளைநிறக் களி¹⁶யாகும், சல்வுரிக்கமிலத்தை¹⁷ மிச்சமாய்க் கூட்டினால், அசிதிக்கமிலம்¹⁸ விடுதலையாக ஓர் வெண்ணடையலுண்டாகும். சோதனைகள்.

1 Dysentery. 2 Bronchorrhea. 3 Aneurism of Aorta. 4 Hypertrophy of heart.

5 Epilepsy. 6 Strangulated Hernia. 7 Gonorrhoea 8 Gleet. 9 Leucorrhoea.

10 Confection of rose. 11 Benzoated Lard. 12 Oil of theobroma.

13 Simple ointment. 14 Alkali. 15 Mucilage of Acacia. 16 Jetly.

17 Sulphuric acid, 18 Acetic acid

இதின் விசேஷகிருவிதம் 1.26. இதில் நிறைப்படி 413.3 கிறேனை அதாவது அளவின்படி ஆறுதிறுமைப் பூரணமாய் அடையப்பண்ணுவதற்கு அச்சலிக் கமில¹ பருமவிலயனத்தில்² 813 கிறேனைவு வேண்டும்.

தன்மை. இது செரதிவம்³, துவர். உள்ளே கொடுக்கப்படுவதில்லை.

உபயோகம். பின்னே வரும் கிருச நயவதவசிதசு நீர், தாபிதம்⁴ உதர்த் தங்கொண்ட தோற்பகுதிகளுக்கும் தாபித்த கோளங்கள், நோக்கொண்ட நசிவுகள் சுளுக்குகளுக்கும் தாபிதங்கொண்ட அரிசமுளைகள்⁵ அல்குற்றின வகளுக்கும் தசிரக் கிளர்ச்சியோடு கூடிய மற்றும் வெளிநோய்களுக்கும் நல் ல இமெருந்தாகும்.

ரசிதங்கள். கிருச நயவதவசிதசு நீர். Dilute solution of subacetate of Lead. கொள். நயவதவசிதசு நீர், இரண்டு திரும்; திட்டசீது⁷ இரண்டு திரும்; திஸ்திலித்த⁸ தண்ணீர் பத்தொன்பதரை அன்சு. இவைகளைக் கலந் து கடுதாசியில் வடிக்கவும். வடித்த தெளிவான நீரைச் சீசாவில் அடைத் துவைக்கவும்.

நயவதவசிதசன்கென். Ointment of subacetate of Lead. கொள். நயவதவசிதசு நீர், ஆறு அன்சு; பூரம் அறுபது கிறேன்; வெண்மெழுகு எட் டிஅன்சு; ஒலீவுதேல்⁹ அரைநாழி. மெழுகைப் பதினாறு அன்சு எண்ணெ ய்யோடு நீர்மத்திகச்¹⁰ சூட்டிலுருக்கிப் பாத்திரத்தைச் சூட்டைவிட்டெடுத்து அக் கலவை தடிக்கத் தொடங்கினவுடன் நயவத வசிதசு நீரைப் படிப்படி யாய்க் கூட்டி அக்கலவை ஆறுந்தனையும் ஓயாமற் கலக்கி பூரத்தைச் சேஷ மான எண்ணெயிற் கரைத்துக் கூட்டித் திறமாய்க் கலக்கவும்.

மேலே சொன்ன நோய்களுக்குப் பூச இது நல்ல குளிர்ச்சியான அணைவு.

நயநீதுரசு.

NITRATE OF LEAD.

இது ஈ2 (நீ அ3) என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்படும். நயவக்சிரத்தின்¹¹ மேல் நீதுரிக்கமிலத்தை¹² வார்க்க நயநீதுரசு உண்டாகும். இது நிறமற்ற ஏ றக்குறைய மங்கலான எண்புசச் கிரிஸ்தல்களாக¹³ இருக்கும். பரமானு வில் மாறாமல் நிலையாயிருக்கும். இனிப்பான துவர்ச்சுவை கொண்டது. தண்ணீரிலும் அலக்காலிலும்¹⁴ கரையும். சோதனை. இதின் தண்ணீர்க் க ரைவுக்கு ஐருசல்வரிக்கமிலஞ்¹⁵ சேர்க்க கருமடையலுண்டாகும், கிருச சல்வரிக்கமிலஞ்¹⁶ சேர்க்க வெண்ணடையலுண்டாகும், பதாசியவியோதிர ஞ்¹⁷ சேர்க்க மஞ்சள்நிற அடையலுண்டாகும். இந்திகு சல்வசில்¹⁸ விட அதின் நிறத்தைப் போக்கும்.

தன்மை, உபயோகம். இது உள்ளே கொடுக்கப்படுவதில்லை. இதை ஒரு அன்சு தண்ணீருக்குப் பத்துக்கிறேன் முதல் நாற்பது கிறேன் வரைக்கு வீதமாகக் கரைத்தால் முலைக்கார்ப்பு புண்கள் வெடிப்புகள் வழந்தல்களுக் கும் மற்றஞ்சருமனோய்களுக்கும் உவந்த துவர் லோஷ¹⁹னாகும். இதை ஒரு

1 Oxalic acid. 2 Volumetric solution. 3 Sedative, ஸத்தனி. 4 Inflammation. 5 Erysipelas. 6 Piles. 7 Rectified spirit. 8 Distilled water. 9 Olive oil. 10 Water-bath. 11 Oxide of lead. 12 Nitric acid. 13 Crystal. 14 Alcohol. 15 Hydrosulphuric acid. 16 Dilute sulphuric acid. 17 Iodide of potassium. 18 Sulphate of Indigo. 19 Lotion.

அன்சு தண்ணீருக்கு ஒருதிரும் வீதமாகக் கரைத்தால் லீடோயர் திசின் வெத்து நீராகும்¹. அது கந்தக்கினியாகச் சற்று வீறுள்ளது. ஈயவியோதிரஞ் செய்வதற்கு ஈய நீதரசு வழங்கப்படும்.

ஈயவியோதிரம்.

IODIDE OF LEAD.

இது ஈ இ² என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்படும்.

ஈய நீதரசைப்³ பதாசிய வியோதிரத்தாற்⁴ கூறுபடுத்த ஈயவியோதிரம் எடுக்கப்படும். இது செம்பொன்னிறத் தூளாகவாவது பளபளப்பான மஞ்சள் நிறச் செதில்களாயாவது இருக்கும், மணஞ்சுவையற்றது; தண்ணீரில் மெத்தச் சொற்பமாய்க் கரையும், வெண்ணீர் சுறுக்குக்கரையும், அசிதிக் கமிலத்திலும்⁵ அலக்காலிலும்⁶ கரையும். சோதனை. சூடேற்றினால் இது முதல் மஞ்சள் நிற ஆவியையும் பிறகு செந்நீல ஆவியையுங் கக்கி ஓர் சேஷத்தை விடும். அச் சேஷத்தை நீதுரிக்கமிலத்திற் கரைத்த நீர், ஈய நீரின் லட்சணங்கள் எல்லாவற்றையும் உடையதாகும்.

தன்மை. இது அல்திறவம்⁷; வெளியிட்டால் ஸ்திமுலம்⁸.

உபயோகம். ஸ்துரும⁹ நோய்கள், பிளிகை¹⁰ வீக்கம், மற்றும் பிளிகை நோய்களுக்கும் இது கொடுத்து நயந்தது; ஆயினும் இது உள்ளே கொடுக்கப்படுவதரிது. கோளக்கழலைகள், சருமநோய்களுக்கு இடுவதே இதின் பிரதான உபயோகம். இது வெளித்தோலை மஞ்சள் நிறமாக்கும்.

ரசிதங்கள். ஈயவியோதிரப் பிலாஸ்தர். Iodide of Lead Plaster. கொள். ஈய வியோதிரம், ஒரு அன்சு; சப்புலாஸ்தா¹¹, ராளப்பிலாஸ்தர்¹², வகைக்கு நாலு அன்சு. பிலாஸ்தர்களை முன்னமே உருக்கிக் கொண்டு, ஈயவியோதிரத்தை மாவாக்கிக் கூட்டித் திறமாய்க் கலக்கவும்.

ஈயவியோதிரவன்கென். Ointment of Iodide of Lead. கொள். ஈய வியோதிரம், மாவாக, அறுபத்திரண்டு கிறேன்; தமிழன்கென், ஒரு அன்சு. திறமாய்க் கலக்கவும்.

இரும்பு. அயம். IRON.

சின்னம் இரு அணுப்பாரம், 56. இரும்பு இந்திர அரிந்திர பதார்த்தங்களிற் செறிந்ததாய் இயற்கையில் மெத்தவுண்டு. இது மிருதியானபடி அளிந்திரகணத்திலுள்ளது. பிரதானமாய் அக்சிதத்தோடு¹³ கலந்து, எமதீற்று¹⁴ காந்தக்கல் முதலியனவாகவும் கெந்தகத்தோடு கலந்து அயபுலிங்கி¹⁵யாகவும், அயபுரகாபனசாகவும்¹⁶ இருக்கும்.

வியுத்தவயம்.

REDUCED IRON.

இது விகற்ப அளவான அயகாந்த வக்சிரத்தோடு¹⁷ கூடிய இரும்பே. சிவக்கக்காய்ச்சிய துப்பாக்கிக் குழலுக்குள்ளே போட்ட அயவக்சிரத்துக்

1 L. edoyen's disinfectant fluid. 2 Deodoriser. 3 Nitrate of lead, 4 Iodide of potassium. 5 Acetic acid. 6 Alcohol. 7 Alterative. 8 Stimulant. 9 Struma. 10 Spleen. 11 Soap plaster. 12 Resin plaster. 13 Oxygen. 14 Haematite. 15 Iron pyrites. 16 Protocarbonate, 17 Magnetic oxide of Iron.

கூடே ஐருதவாயுவைச்¹ செல்லவிட்டு இதையெடுப்பார்கள். லட்சணங்
கள். இது நுண்ணிய நரைக்கறுப்பான தூள். காந்தம் இதைப் பெலனாய்
இழுக்கும். இதைக் குழி அம்மியில் இட்டு அழுக்கி அரைத்தால் லோகவரி
கள் தோன்றும். ஐருகுலோறிக்கமிலத்திற்² போட்டால் இது ஐருதவாயுவை
சுக்கிக்கொண்டு கரையும். அக்கரைவுக்குப் பதாசிபீதபுருசியசைக்³கூட்ட
வெண்ணீல நிறமான அடையலுண்டாகும். சோதனை. இயோதத்தில்⁴
ஐம்பது கிறேனையும், பதாசிய வியோதிரத்தில்⁵ ஐம்பது கிறேனையுந் தண்ணீ
ரில் கரைத்து அதற்கு வியுத்தவயத்திற் பத்துக்கிறேனைக் கூட்டிச் சின்னக்
குடுக்கையில் இட்டு மென் சூட்டிற் காய்ச்சினால் கரையாமல் இருக்கும் சே
ஷம் ஐந்து கிறேனுக்கு மிஞ்சாது. இச்சேஷம் ஐருகுலோறிக்கமிலத்திலே
முற்றாய்க்கரையவேண்டியது.

நன்மை. இது உத்தம தொணிகம்⁶. மற்றும் அயமருந்துகளைப்போலவே
இதுவும் விசேஷமாய் இரத்தத்திற் பிடிக்கும். இதைச் சாப்பிடும்போது
இரத்தத்திலுள்ள எமதின்⁷, கிளபுலின்⁸ என்ற கூறுகளின் வீதம் சதிக்கும்.
மேலும் இது எம்மெனகக்கு⁹மாகும்.

உபயோகம். அனீமி¹⁰, குலொரோசி¹¹, அமெனூறியம்¹², கொரியம்¹³, பி
ளிகை வீக்கங்களுக்கும் அனீமியைச்சார்ந்த மற்றநோய்களுக்கும் இது உச்
சித மருந்து.

தேயம். ஒரு கிறேன் முதல் ஐந்து கிறேன் வரைக்கு, நாள் இரண்டு
மூன்று முறை, தீனோடாவது தின்றவுடனாவது கொடுக்கவும்.

ரசிதம். வியுத்தவயவில்லை. Reduced Iron Lozenges. கொள்,
வியுத்தவயம், எழுதூற்றிருபது கிறேன்; சுத்த சர்க்கரை மாவாக இருபத்
தைந்து அன்சு; அகசிப்பிசின்மா¹⁴ ஒரு அன்சு; அகசிப்பிசின் முசிலாகு¹⁵,
இரண்டு அன்சு; திஸ்திலித்ததண்ணீர்¹⁶ ஒரு அன்சு அல்லது போதியது.
அயம், சர்க்கரை, பிசின்மா மூன்றையுங் கலந்து தகுந்தபதமாய் வரப் போ
திய முசிலாகையும் தண்ணீரையுங் கூட்டி 720 வில்லைகளாகத் தட்டி மட்
டான சூடுள்ள அறையில் உலர்த்தவும்.

ஒவ்வொரு வில்லையிலும் வியுத்தவயம் ஒரு கிறேன் இருக்கும்.

அயகாந்தவக்சிரம்.

MAGNETIC OXIDE OF IRON.

அயகாந்தவக்சிரம் இரு³ அ⁴என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்படும். இது ஏறக்
குறைய தூற்றுக்கு இருபதுபங்கு ஐரசு தண்ணீரோடு¹⁷கலந்ததாய்ச் சொற்ப
அயபிரவக்சிரத்தை¹⁸ அடக்கியிருக்கும். லட்சணங்கள். கபிலக்கறுப்பு நிற
மானது; சுவையற்றது; காந்தத்தாற் பெலனாய் இழுக்கப்படும். அரைப்பங்கு
தண்ணீரோடு கலந்த ஐருகுலோறிக்கமிலத்திலே இது நுரைக்காமற் கரையும்.
இக்கரைவுக்குப் பதாசிபீதபுருசியசையாவது பதாசிசெம்புருசியசை¹⁹யாவது
கூட்ட நீலநிற அடையலுண்டாகும். அயகாந்தவக்சிரத்திற் சொற்பத்தைக்
காய்ந்த சோதனைக்குழலிவிட்டு வினக்குச் சுவாலையிற் காய்ச்சும்போது, அக்
குழலின் குளிரான பங்கிலே ஈரம் பிடிக்கும். சோதனைகள். இருபது

¹ Hydrogen gas. ² Hydrochloric acid. ³ Yellow prussiate of potash. ⁴ Iodum.
⁵ Iodide of potassium. ⁶ Tonic. ⁷ Haematin. ⁸ Globulin. ⁹ Emmena-
gogue. ¹⁰ Anaemia. ¹¹ Chlorosis. ¹² Amenorrhoea. ¹³ Chorea.
¹⁴ Gum acacia. ¹⁵ Mucilage. ¹⁶ Distilled water. ¹⁷ Water of
hydration. ¹⁸ Peroxide of Iron. ¹⁹ Red prussiate of potash.

கிறேனை ஐருகுலோறிக்கமில்த்திற் கரைத்துத் பதாசிசெம்புருசியசைக் கூட்டினால் பதாசிதவிகுரேமசு¹ப்பருமவிலயனத்தில்² என்பத்துமுன்று கிறேனைக் கூட்டுத்தனையும் ஒர் நீலநிற அடையல் உண்டாகிக்கொண்டிருக்கும். தன்மை, உபயோகம். வியுத்தவயத்தைப் போலவே. நேயம். ஐத்துகிறேன்முதற் பத்துக்கிறேன் வரைக்கு.

அயவைரசுப்பிரவக்சிரம்.

HYDRATED PEROXIDE OF IRON.

இது இரு² அ³ ஐ² அ என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்படும். ஈரமான அய பிரவக்சிரத்தைப் பாரங்குறையுந்தனையும் 212 பாகைக்கு மேற்படாத சூடேற்றி மாவாக அரைத்து இது எடுக்கப்படும். லட்சணங்கள். இது செங்கபில நிறமான தூள்; சுவையற்றது; காந்தத்தால் இழுக்கப்படாது. சோதனைகள். அரைப்பங்கு தண்ணீர் கலந்த ஐருகுலோறிக்கமில்த்தில் இதைப் போட்டுச் சூட்டிற் பிடிச்சு, தாமதமாயும் பூரணமாயுங் கரையும். இக்கரைவுக்குப் பதாசிபீதபுருசியசைக் கூட்ட கன அடையல் உண்டாகும்; பதாசிசெம்புருசியசுச்சோ அடையல் உண்டாகாது, சோதனைக்குழுவிலிட்டுச் சற்றே சிவக்கக் காய்ச்சினால் ஈரிப்பைக் கக்கும்.

தன்மை. இது தொணிகம்³, எம்மெனகக்கு⁴, அந்தெல்மிந்தி⁵.

உபயோகம். அனீமிக்கு⁶ இது உவந்த மருந்து. மேலும் பெலவீனம், துறல்சி⁷, கொரியம்⁸, குக்கலின்பிற்பாதம், லறிஞ்சிஸ்மஸ்திருலசு⁹, ஸ்பசுஈ¹⁰, இரசநடுக்கம், அமெனூறியங்களுக்கும்¹¹ இது நயந்தது.

நேயம். ஐத்துகிறேன் முதல் முப்பதுகிறேன் வரைக்குங் கூடவுங் கொடுக்கலாம்.

ரசிதம். அயபிலாஸ்தர். Chalybeate Plaster. கொள், அயவைரசுப்பிரவக்சிரம், மாவாக, ஒரு அன்சு; பெர்கன்றிராளம்¹², இரண்டு அன்சு; ஈயப்பிலாஸ்தர்¹³, எட்டு அன்சு. பெர்கன்றிராளத்தையும் ஈயபிலாஸ்தரையும் முதலே ஒன்றாக உருக்கி, அயபிரவக்சிரத்தைக் கூட்டி அக்கலவை ஆறி இறுகுந்தனையும் ஓயாமற் கலக்கவும்.

இதை மெல்லிய தோலிற் பரவியிட்டால் இட்டபகுதிக்கு நல்ல தாபர முங் காவலுமாகும்.

அயவீரபிரவக்சிரம். MOIST PEROXIDE OF IRON.

அயவீரபிரவக்சிரம் என்பது, தூற்றுக்கு ஏறக்குறைய 86 பங்கு தண்ணீரை அடக்கிய அயவைரசுப்பிரவக்சிரமே. லட்சணங்கள். இது மெதுவும் ஈரமும் பசையுமான செங்கபிலநிறத்திரளை, கிருசுவைருகுலோறிக்கமில் திலே¹⁴ சூடின்றிச் சுறுக்குக் கரையும். அக்கரைவுக்குப் பதாசிசெம்புருசியசைக்¹⁵ கூட்ட அடையலுண்டாகாது. பதாசி பீதபுருசியசைக் கூட்ட வோ நீலநிறமான கன அடையல் உண்டாகும். சோதனை. இதற் சொற்பத்தைப் பாரங் குறையுந்தனையும் 212 பாகை சூட்டிற் காய்ச்சிச் சோதனைக் குழுவில் இட்டுச் சற்றே சிவக்கக் காய்ச்சினால் ஈரம் பிறக்கும்.

¹ Bichromate of potash. ² Volumetric solution. ³ Tonic. ⁴ Emmenagogue.

⁵ Anthelmintic. ⁶ Anæmia. ⁷ Neuralgia. ⁸ Chorea. ⁹ Laryngismus stridulus. ¹⁰ Spasmodic asthma. ¹¹ Amenorrhoea. ¹² Burgundy pitch. ¹³ Lead plaster. ¹⁴ Dilute Hydrochloric acid.

¹⁵ Red prussiate of potash.

தன்மை, உபயோகம். பாஷாண நஞ்சு தின்றவர்களுக்கு இது மாற்றாகக் கொடுபடும்.

தேயம். ஐந்து மினி பத்து மினிக்கு ஒருமுறை ஒரு பருஞ்சிப்பி நிறையக் கொடுக்கலாம். பாஷாணநஞ்சில் ஒருபங்குக்கு இதிற் பன்னிரண்டு பங்கு கொடுக்கவேண்டும்.

அயகாபனசுச் சர்க்கரை.

SACCHARATED CARBONATE OF IRON.

இது அயபிரவச்சிரமும் சர்க்கரையும் கலந்த இரு கா அ₃ என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்படுகிற அயகாபனசு. இக்கலப்பிலே அயகாபனசு நூற்றுக்கு ஐம்பத்தேழு பங்கு வீதமாயிருக்கும். அயசல்வசை¹ அமோனகாபனசாற்² கூறுபடுத்தி வரும் அடையலைக்கழுவி அதற்குச் சர்க்கரை கூட்டி உலர்த்தி இதை எடுப்பார்கள். லட்சணங்கள். நரைநிறமும் இனிப்பும் சொற்ப இரும்புச் சுவையுமுடைய சிறுத் திரள்களாக இருக்கும். அடைப்பங்கு தண்ணீர் கலந்த இளஞ் சூடுள்ள ஐருகுலோறிக்கமிலத்திலே³ இது நுரைத்துக்கொண்டு கரையும். அக்கரைவுக்குப் பாரியகுலோறிரத்தைக்⁴ கூட்ட மெத்தச் சொற்ப அடையலுண்டாகும். சோதனைகள். தண்ணீர் கலந்த மிஞ்சிய ஐருகுலோறிக்கமிலத்திலே இதில் இருபது கிறேனைக் கரைத்துப் பதாசிசெம்புருசியசைக்⁵ கூட்டினாற் பதாசி துவிசுரோமசுப்⁶ பருமவ்லயனத்தில்⁷ 330 கிறேனளவையாகுதல் கூட்டுத்தனையும் ஓர் நீலநிற அடையலுண்டாகிக்கொண்டிருக்கும்.

தன்மை. உவந்த அயதொணிகம்⁸; துவர்த்தன்மையில்லாதது.

உபயோகம். அயபிரவச்சிரம் போலவே.

தேயம். ஐந்து கிறேன் முதல் இருபது கிறேன் வரைக்குங் கூடவுங் கொடுக்கலாம்.

ரசிதம். அயகாபனசுக் குளிகை. Pill of Carbonate of Iron. கொள். அயகாபனசுச் சர்க்கரை, ஒரு அன்சு, ரோசை லேகியம்⁹, கால் அன்சு. நன்றாய் அரைக்கவும்.

தேயம். ஐந்து கிறேன் முதற் பத்துக் கிறேன் வரைக்கு நாள் இரண்டு முறை கொடுக்கவும்.

அயபாஸ்வசு. PHOSPHATE OF IRON.

அயபாஸ்வசு இரு³ பா₂ அ₃ என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்படும். அயசல்வசைச் சோடபாஸ்வசாற்¹⁰ கூறுபடுத்த அயபாஸ்வசுபிறக்கும். லட்சணங்கள். இது கருநீலநிறமான அமாவத்¹¹ தூள். தண்ணீரின் கரையாது. ஐருகுலோறிக்கமிலத்தின் கரையும். இக் கரைவுக்குப் பதாசிபீதபுருயசு¹², பதாசிசெம்புருசியசு எதைச்சேர்த்தாலும் அடையலுண்டாகும். செம்புருசியசுக்கே கன அடையலுண்டாகும். தாத்தரிக்கமிலத்தையும்¹³ மிஞ்சிய அமோனத்தையும்¹⁴ கூட்டிய பின் மக்னீசியமோனசல்வசு¹⁵ நீரைக் கூட்டினால் ஓர் கிரிஸ்சலடையல் உண்டாகும். சோதனைகள். சுத்தமான வோர்

1 Sulphate of iron. 2 Carbonate of Ammonia. 3 Hydrochloric acid. 4 Chloride of barium. 5 Red Prussiate of Potash. 6 Bichromate of potash. 7 Volumetric solution. 8 Tonic. 9 Confection of rose, 10 Phosphate of soda. 11 Amorphous. 12 Yellow prussiate of potash. 13 Tartaric acid. 14 Ammonia. 15 Ammonio-sulphate of magnesia.

செம்புத் தகட்டி¹ மீட்டு வவத்தால் அந்த லோகத் துண்டின்மேல் கருமையான அடையலுண்டாகாது. இந்த உப்பில் இருபது கிரேனை ஐருகுலோறிக்க மிலத்திற் கரைத்துப் பதாசி² செம்புருசியசைக்³ கூட்டி னுற் பதாசிதுவிருரோ மசுப⁴ பருமலிலயனத்தில்⁵ 250 கிரேனனவைக் கூட்டுந்தனையும் நீலநிற அடையலுண்டாகிக்கொண்டிருக்கும்.

தன்மை. அயசொணிகம்.

உபயோகம். அனீமி, பொதுவான பெலவீனங்களுக்கு இதைக் கொடுப்பதன்றி, ரிகெட்⁶, சர்க்கராழரி⁷, ஸ்டீனமெதுவாதல், கன்சர்⁸ என்ற நோய்களுக்கும் இது நயமென்ற கொடுக்கப்படும்.

தேயம். ஐந்து கிரேன் முதற் பத்துக் கிரேன் வரைக்கு. இதைச் சிறு பமாய்க் கொடுப்பதே உத்தமம்.

சீதம். அயபாஸ்வசுச் சிறுபம். Syrup of Phosphate of iron. கொள். கிறனுல அயசல்வசு⁹, இருதூற்றிருபத்துநாலு கிரேன்; சோடபாஸ்வசு¹⁰ இருதூறு கிரேன்; சோடவசுதசு¹¹, எழுபத்துநாலுகிரேன்; கிருச பாஸ்வரிக்கமில்¹², ஐந்தரை அன்சு; சுத்த சர்க்கரை எட்டுஅன்சு; திஸ்திவித் தண்ணீர்¹³ ஐட்டு அன்சு. அயசல்வசை நாலு அன்சு தண்ணீரில் கரைத்து, இரண்டு கலவையையும் ஒன்றாக்கித் திறமாய்க் குலுக்கிக் காரிக்கம் புடைவையில் வடித்து அடையலைத் திஸ்திவித்த தண்ணீராற் கழுவி அது பாரிய குலோறிரத்தால்¹⁴ யாதொரு மாறுதலடையாமலிருக்குந்தனையும் கழுவி அப்பால் அந்த அடையலை ஊறுதாளின் இரண்டு மடிப்புகளுக்கிடையில் வைத்து அமுக்கி அதற்குக் கிருசபாஸ்வரிக்கமில்த்தைக் கூட்டவும். அடையல் கரைந்தவுடன் அக் கரைவை வடித்துச் சர்க்கரையைக் கூட்டிச் சூடில்லாமற் கரைக்கவும். வரும் பாணி சரியாய்ப் பன்னிரண்டு அன்சு நிறுக்க வேண்டும்.

தேயம். ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திரும் வரைக்குங் கூடவுங் கொடுக்கலாம். ஒவ்வொரு திராயில் ஒரு கிரேன் அயபாஸ்வசு இருக்கும்.

அயசல்வசு. அன்னபேதி. SULPHATE OF IRON.

அயசல்வசு இருகேஅ¹ 7ஐ² அ என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்படும். இரும்புக் கம்பியைச் கிருசசல்வரிக்கமில்த்திற்¹⁵ கரையப்போட்டு அக்கரைவைக் காய்ச்சி ஆவியாக்கிக் கிரிஸ்தலித்த¹⁶ அயசல்வசு எடுக்கப்படும். லட்சணங்கள். இது வெளிறின, பச்சைநீலநிறமுள்ள, சாய்ந்த, ரம்ப¹⁷, பிரிசங்க¹⁸ ளாக விருக்கும். துவர்ச்சுவை உள்ளது; திட்ட சீதிற்¹⁹ கரையாது; தண்ணீரில் கரையும். தண்ணீர்க் கரைவு தெளிந்தது. அதற்குப் பாரிய குலோறிரஞ் சேர்க்க வெண்ணடையலுண்டாகும். பதாசி செம்புருசியசைக் கூட்ட நீலநிற அடையலும், பதாசி பீத்புருசியசைக்²⁰ கூட்ட வெள்ளை அல்லது வெண்ணீல நிற அடையலுமுண்டாகும். சோதனை. இதின் தண்ணீர்க்கரைவு

1 Hydrochloric acid. 2 Potash. 3 Red prussiate. 4 Bichromate. 5 Volumetric solution. 6 Rickets. 7 Diabetes. 8 Cancer. 9 Granulated Sulphate of iron. 10 Phosphate of soda. 11 Acetate of soda. 12 Dilute phosphoric acid.

13 Distilled water. 14 Chloride of Barium. 15 Dilute sulphuric acid.

16 Crystallize. 17 Rhombic. 18 Prism. 19 Rectified spirit.

20 Yellow prussiate of potash.

க்கு முன்னமே கொஞ்சம் சல்வுரிக்கமில்த்தைக் கூட்டினால் ஐருசல்வுரிக் கமில¹ வாயுவுக்கு யாதொரு அடையலுமுண்டாகாது.

தன்மை. வீரூன அயதொணிகம்², துவர், எம்மெனகக்கு³, அந்திபிராடி⁴, கிருமிகொல்வி⁵. பெருந்தேயத்தில் நஞ்சு. தானிகமாயிட்டாற் துவர், ஸ்த் முலம்⁶.

உபயோகம். அனீமி⁷, அனீமிக்கோலம், குலொரோசி⁸, அமெனுறீயம்⁹, லுகறீயம்¹⁰ இரைப்பைப்புண், பிளிஸ்கவீக்கம், முறைச்சுரங்கள், தடவைத் தலைவலி¹¹, ஐபுகன்றாயசி¹², குக்கவின் பிற்பாதம், தீனியம்¹³, என்றநோய்க ளுக்கே இம் மருந்து விசேஷமாய் உள்ளே கொடுக்கப்படும். மேலும் எரி சிப்பிலசு¹⁴, ரதிப்புண், சிந்துமூலமுளைகள், அபானப்பிதுககம், கருப்பைக் கன்சர்¹⁵ முதலிய நோய்களுக்கு இது வெளிமருந்தாய் இடப்படும்.

தேயம். ஒரு கிறேன் முதல் ஐந்து வரைக்குங் கூடவும் நான் இரண்டு மூன்று முறை கொடுக்கலாம்.

ரசிதம். வறுத்த அயசல்வசு. Dried Sulphate of Iron. கொள். அயசல்வசு, நாலு அன்சு; பீங்கான் அல்லது இரும்புப் பாத்திரத்தில் மட் டான சூட்டில் வறுத்துச் சூட்டை 400 பாகை வரைக்கு ஏற்றி, நீராவி பறி ந்து தீருந்தனையும் வறுக்கவும். சேஷத்தை மாவாக அரைத்துக் கண்ணாடிச் சடையால் அடைத்த சீசாவிற் பேணவும்.

தேயம். அரைக்கிறேன் முதல் இரண்டு கிறேன் வரைக்குக் குளிகை யாக்கிக் கொடுக்கலாம். இதில் மூன்று கிறேன், கிரிஸ்தலான அயசல்வசில் 4⁹/₁₀ கிறேனுக்குச் சரி.

அயகூட்டுமீஸ்தூர். Compound Iron mixture. கொள். அயசல்வசு, இருபத்தைந்து கிறேன்; பதாசிகாபனசு முப்பது கிறேன்; சசம், சுத்தசர்க் கரை, வகைக்கு அறுபது கிறேன்; சிடச்சீது¹⁶, நாலு திரும்; ரோசைநீர், ஒ ன்பதரை அன்சு. சசத்தை மாவாக்கிப் பதாசிகாபனசையும் சர்க்கரையை யும் கூட்டி, ரோசை நீரிலே சொற்பமாய்ச் சேர்த்து மெல்லிய பசையாக அரைத்துப் பின்னும் ரோசைநீரையும் சிடச்சீதையும் படிப்படியாய்ச் சேர் த்துப் பின்னும் அரைத்துப் பால் போன்ற நீர் எட்டு அன்சு வருந்தனையும் ரோசை நீரைப் பின்னுஞ் சேர்த்து அப்பால் எஞ்சிய ரேரசை நீரிலே அயச ல்வசைக் கரைத்துக் கூட்டித் திறமாய்க் கலந்து அக்கலவையைக் கூடிய அளவுங் காற்றுப்படாமற் பேணிவைக்கவும்.

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு வரைக்கு நான் இரண்டுமூ ன்று முறை கொடுக்கலாம். அனீமி, அமெனுறீயம், குலொரோசி என்ற நோய்களுக்கு இது உத்தம தொணிகம்.

கீறனுல அயசல்வசு. GRANULATED SULPHATE OF IRON.

செய்யும் விதத்தில் மாத்திரமே இந்த உப்புக்கும் வாடிக்கையான அயசல் வசுக்கும் வித்தியாசமுண்டு. இது வெளிறின பச்சை நீல நிறமான, சிறிய, பருபருக்கையான கிரிஸ்தல்களாக இருக்கும். இதின் தன்மை, உபயோ கம், தேயங்கள் அயசல்வசின் தன்மை முதலியவற்றைப்போலிருக்கும்.

1 Hydrosulphuric acid. 2 Tonic. 3 Emmenagogue. 4 Antiperiodic. 5 An-
thelmintic. 6 Stimulant. 7 Anaemia 8 Chlorosis. 9 Amenorrhoea.
10 Leucorrhoea. 11 Periodic headache. 12 Hypochondriasis. 13 Taenia.
14 Erysipelas. 15 Cancer. 16 Spirit of nutmeg.

அயபிரசல்வசு நீர்.

SOLUTION OF PERSULPHATE OF IRON.

கொள், அயசல்வசு, எட்டு அன்சு; சல்வுரிக்கமிலம்¹, நீதுரிக்கமிலம்², கைகத்ர ஆறு திரும்; திஸ்திலித்த³ தண்ணீர், பண்ணிரண்டு அன்சு அல்லது போதியது. சல்வுரிக்கமிலத்தைத் தண்ணீரில் பத்து அன்சோடு கூட்டி அச் சலவையிலே அயசல்வசைச் சூட்டிவிட்டுக் கரைக்கவும். நீதுரிக்கமிலத்தை மிச்சமான இரண்டு அன்சு தண்ணீரோடு கலந்து அக்கிருசு அமிலத்தை அயசல்வசு கரைத்த நீரோடு கலக்கவும். சிவப்பு நிறமான ஆவி சடிதியிற் பறிந்து நீர் கருமை கெட்டுச் சிவப்படையுந்தனையும் அதைக் காய்ச்சிச் சாரதிக்கவும்⁴. அப்பால் இந்த நீரில் ஒரு துளியைப் பதாசிசெம்புருசியைச் சேர்த்துக் கொண்டு சோதித்து நீலநிற அடையலுண்டானால் நீதுரிக்கமிலத்திலே பின்னுஞ் சில துளியைக் கூட்டி அதிலுள்ள அயசல்வசு முழுவதும் அயபிரசல்வசாய் மாறத்தக்கதாய்த் திரும்பவுங் காய்ச்சவும். நீர் ஆறினபின் வேண்டுமாகிற் திஸ்திலித்த தண்ணீரைக் கூட்டி அளவைப் பதினொரு அன்சாக்கிக் கொள்ளவும். லட்சணங்கள். இது கருஞ்சிவப்பு நிறமான கனத்த நீர். மணமற்றது; மெத்தத் துவர்கொண்டது; அலக்கால்⁵, தண்ணீர் களோடு எந்த வீதத்திலுங் கலக்கும். பத்துமடங்கு தண்ணீரோடு கலந்தால் பாரியகுலோறிரத்துக்கு⁷ வெண்ணடையல் உண்டாகும்; பதாசிபீத்புருசியசுக்கு⁸ நீலநிற அடையல் உண்டாகும்; பதாசிசெம்புருசியசுக்கோ அடையல் தோன்றாது. சோதனை. விசேஷகிருவிதம் 1.441. இதிலொரு திரும்மைத் திஸ்திலித்த தண்ணீரில் இரண்டு அன்சோடு கலந்து, அமோன நீரை⁹ மிச்சமாய்க் கூட்டி, உண்டாகுமடையலை நன்றாய்க்கழுவி பஸ்மமாக்கினால் 11.44 கிரேன் நிறுக்கும்.

தன்மை உபயோகம். இது வீருன துவர், உள்ளே கொடுக்கப்படுவதில்லை. அயவமோனசிதிறசு¹⁰, அயகினியசிதிறசு¹¹, அயகார்தவக்சிரம்¹², அயவீர பிரவக்சிரம்¹³, அயதாத்தரகம்¹⁴, அயவசிதசிரஞ்சம்¹⁵ என்ற மருந்துகள் செய்வதற்கு இது வழங்கப்படும்.

ரசிதம். அயவசிதசிரஞ்சம். Tincture of Acetate of Iron. கொள். அயபிரசல்வசு நீர், இரண்டரை அன்சு; பதாசியசிதசு¹⁶, இரண்டு அன்சு; திட்டசீது¹⁷ போதியது. பதாசியசிதசைப் பத்து அன்சு திட்டசீதிற் கரைத்து, அயபிரசல்வசு நீரைச் சீதில் எட்டு அன்சோடு கூட்டி இரண்டு நீர்களையும் ஒருநாழி கொள்ளத்தக்க ஓர் சீசாவிற் கலந்து திறமாய்க் குலுக்கி ஒருமணி ரேவரையிற் பலமுறை குலுக்கவும். இப்படி உண்டான ரஞ்சத்தையும் அடையலையும் ஓர் வடியில் வார்த்து, நீர் ஒழுதித்தீர்ந்தபின் அது அரைநாழி யாகப் போதிய திட்டசீதை வடியின்மேல் வார்த்தவும்.

தேயம். ஐந்து மினிம் முதல் முப்பது மினிம் வரைக்கு.

1 Sulphuric acid. 2 Nitric acid. 3 Distilled water. 4 Concentrate. 5 Red prussiate of potash. 6 Alcohol. 7 Chloride of barium. 8 Yellow prussiate of potash. 9 Solution of ammonia. 10 Ammonio-citrate of iron. 11 Citrate of iron and quinine. 12 Magnetic oxide of iron. 13 Moist peroxide of iron. 14 Tartarated iron. 15 Acetated tincture of iron. 16 Acetate of potash. 17 Rectified spirit.

அயிரகுலோற்றகரநீர்.

STRONG SOLUTION OF PERCHLORIDE OF IRON.

இது இரும்புக்கம்பியை ஐருகுலோற்றக்கமிலத்திற்¹ கரையவிட்டு வரும் அயிரகுலோற்றத்தைத்² தண்ணீரோடு கலந்த நீர். லட்சணங்கள். இது வீரன துவர்ச்சுவையை உடைய மஞ்சட்கபில நீர். தண்ணீர், அவக்கால்³ களில் எந்த வீதங்களிலும் கலக்கும். தண்ணீரில் கலந்தால் வெள்ளிநீதர சுக்கு⁴ வெண்ணடையல் உண்டாகும்; பதாசிபீதபுருசியசுக்கு⁵ நீலநிற அடையல் உண்டாகும்; பதாசிசெம்புருசியசுக்கோ அடையல் உண்டாகாது. சோதனைகள். விசேஷகிராவிதம் 1.338. இதில் ஒரு திராமை இரண்டு அன்சு தண்ணீரோடு கலந்து அமோனீரை மிச்சமாய்க் கூட்டி உண்டாகுஞ் செங்கபிலநிற அடையலை நன்றாய்க் கழுவிப் பஸ்மமாக்கினால் அது 15.62 கிரேன் நிறுக்கும்.

தன்மை. வீரனதுவர், ஸ்திப்திசு.

உபயோகம். அனூரிசம்⁶, நாளவிவாரம், நீவசு⁷, முதலியவற்றுக்கு இந்த நீரைப் புகட்ட அவை சுகமானதுண்டு. இப்பரிகாரம் மோசமற்றதல்ல. மேலும் விசிககோதம்⁸, வங்கசு⁹ உழலிகள், கருப்பைப்பீடம், அரிசம்¹⁰, சீழ்க் கண்ணோ, ககச்சற்றுக்களுக்கும், இரத்தப்பெருச்சைத் தடுப்பதற்கும் இதை இடுதல் நயம். உள்ளேகொடுப்பதற்குத் தண்ணீர் கலந்தநீர் அல்லது ரஞ்சம் திறம்.

தேயம். இரண்டு துளி முதல் ஆறு துளிவரைக்குச் சிறுபத்திலாவது தண்ணீரிலாவது விட்டுக்கொடுக்கவம்.

ரசிதங்கள். அயிரகுலோற்றநீர். Solution of Perchloride of Iron. கொள், அயிரகுலோற்றகரநீர், ஐந்து அன்சு; திஸ்திலித்த தண்ணீர் பதினைந்து அன்சு கல.

தேயம். பத்து முதல் முப்பது மினிம் வரைக்கு.

அயிரகுலோற்றரஞ்சம். Tincture of Perchloride of Iron. கொள். அயிரகுலோற்ற நீர் ஐந்து அன்சு; திட்டசீதே¹¹ பதினைந்து அன்சு. கலந்து சீசாவில் விட்டு நன்றாய் அடைத்துவைக்கவம். சோதனை. விசேஷகிராவிதம் 0.992. தபுளின் சிசிச்சவாகடத்திற் சொல்விய அயிரகுலோற்ற ரஞ்சத்தைப் பார்க்க இது கால்வாசி பெலன் உவ்ளது.

தன்மை. அயிரகுலோற்ற நீரைப்போலவே. உள்ளே கொடுத்தால் இது உத்தம தொணிகமும்¹², அமூரிதி¹³யுமாகும்.

உபயோகம். அசத்துவ¹⁴ இரத்தப்பெருக்கு, நாட்டபட நின்று பெலவீனப் படுத்துங் கழிச்சல்கள், சர்க்கராழுரி¹⁵, சலவொழுக்கு, சலத்துவரத்தின் ஸ்பசு¹⁶ ஓடுக்கினால் உண்டாகுஞ் சல அடைப்பு, அல்பமினூரி¹⁷ திவ்தீரி¹⁸, எரிசிப்பிலசு¹⁹, எமறெச்சுப்பெபூறம்²⁰ கசத்திற்²¹ காணும் அதிவெயர்வை இவற்றிற்குக்கொடுத்து இது நயந்தது. அட்டைகடி முதலியவற்றிற் காணும் இரத்தப்பெருக்கைத் தடுப்பதற்கும் கெட்டபுண்களை அருட்டுவதற்கும் இது இடப்படும்.

1 Hydrochloric acid. 2 Perchloride of iron. 3 Alcohol. 4 Nitrate of silver.

5 Yellow prussiate of potash. 6 Aneurism. 7 Naevus. 8 Hospital gangrene. 9 Fungus. 10 Piles. 11 Rectified spirit. 12 Tonic.

13 Diuretic. 14 Atonic. 15 Diabetes. 16 Spasmodic.

17 Albuminuria. 18 Diphtheria. 19 Erysipelas.

20 Purpura Haemorrhagica. 21 Phthisis.

தேயம். பத்து மினிம், முதல் முப்பது மினிம் வரைக்குங் கூடவுங் கொடுக்கலாம்.

[அயபிரகுலோறி¹ரஞ்சத்தைச் செய்வதற்குப் பிறித்தனிவாமகுபீயத்திற்² சொன்ன முறை மேலே குறிக்கப்பட்டதுவே. ஆய்னும் இந்த ரஞ்சத்தில் எப்போதும் ஓர் கபிலநிற அடையல் உண்டாகும் ஆதலால் இது உதவாதென்று சென்னப்பட்டினத்திலுள்ள மருந்துச்சாலைக்கு அதிபதி அறிவித்திருக்கிறார். லண்டன் வாமகுபீயத்திற் சொன்னமுறையாய்ச் செய்த ரஞ்சமோ உஷ்டண தேசங்களிற் பழுதாக்காமல் இருக்கும் ஆகையால் அதுவே உத்தம மானது. அதைச் செய்யமுறையாவது; கொள், அயவைரசுபிரவக்ஸிரம்³, ஆறு அன்சு; ஐருகுலோறிக்கமிலம்⁴, அரைநாழி; திட்டசீது⁵ ஒன்றரைநாழி. அயவைரசுப்பிரவக்ஸிரத்தை ஐருகுலோறிக்கமிலத்திற் போட்டு அடிக்கடி குலுக்கி மணல்மத்திகத்தில்⁶ வைத்து மெல்லெனக்காய்ச்சிக் கரைத்துக்கூடை சிலில் கலவைநீர் ஆறினபின்பு சீதையுங்கூட்டிச் சீலையில் கடிக்கவும். இதின் தேயம் பிறித்தனிவாமகுபீயத்திற் சொன்ன இப்பெயர்ப்பட்ட ரஞ்சம் போலவே.]

அயலியோதிரம். IODIDE OF IRON.

அயலியோதிரத்துக்குச் சின்னம் இடுஇ². இதிலே கிரிஸ்தல் நீர் ஏறக்குறைய நூற்றுக்கு 18 பங்கும், சொற்ப அயவக்ஸிரமும் சேர்ந்திருக்குப. லட்சணங்கள். இது கபிலநிறஞ் சாடிய பச்சைநிறக் கிரிஸ்தல்களாக இருக்கும்; மணமற்றது; பரமானுவில் உருகி நீராகும்; தண்ணீரிற் கரைந்து சொற்ப பச்சைநிறமுள்ள நீராகும். அதிலே ஓர் கறைநிற அடையல் படிப்படியாய் உண்டாக, அது சிவப்புநிறங்கொள்ளும். சோதனை. இதோடு பதாசிசெம்புருசியைசக்⁷ கூட்ட நீலநிற அடையல் உண்டாகும். அமைல முசிலாகைக்⁸ கூட்டிச் சொற்ப அளவான குலோறத்தைச்⁹ சோர்த்தாலும் அப்படி அடையல் உண்டாகும்.

தன்மை. இது உத்தம அல்திறவ தொணிகம்¹⁰, எம்மெனகக்கு¹¹.

உபயோகம். பொதுவாய் ஸ்த்ரூம¹² நோய்சுள், துபேகுல¹³ நோய்சுளுக்கும், விசேஷமாய் அவை அனீமி¹⁴யோடு கூடிநிற்கும்போது இது உவந்தமருந்து. மேலும் அமெனுறீயம்¹⁵, சிஸ்மெனுறீயம்¹⁶, லுசுறீயம்¹⁷, குலொரோசி¹⁸, சர்க்கராமுரி¹⁹, உபசிவ்லிசு²⁰ நோய்சுளுக்கும் இது நயந்தது.

தேயம். இரண்டு கிறேன் முதல் ஐந்துகிறேன் வரைக்குங் கூடவுங் கொடுக்கலாம்.

ரசிதம். அயலியோதிராசிரூபம். Syrup of Iodide of Iron. கொள், மெல்லிய இரும்புக்கம்பி ஒரு அன்சு; இயோதம்²¹, இரண்டு அன்சு; சுத்தசர்க்கரை இருபத்தெட்டு அன்சு; திஸ்திலித்த தண்ணீர், பதின்மூன்று அன்சு. சர்க்கரையைப் பத்து அன்சு தண்ணீரிலே சூடுசாட்டிக் கரைத்துப் பாணியாக்கிக்கொண்டு இயோதத்தையும் இரும்புக்கம்பியையும் ஓர் குடுக்கைக்

1 Vinim. 2 British pharmacopoeia. 3 Hydrated peroxide of iron. 4 Hydrochloric acid. 5 Rectified spirit. 6 Sand bath. 7 Red prussiate of potash. 8 Mucilage of starch. 9 Chlorum. 10 Alterative tonic. 11 Emmenagogue. 12 Struma. 13 Tubercular. 14 Anaemia. 15 Amenorrhoea. 16 Dysmenorrhoea. 17 Leucorrhoea. 18 Chlorosis. 19 Diabetes. 20 Secondary syphilis. 21 Iodum.

ருள்ளே சேஷமான மூன்று அன்சு தண்ணீரோடுபோட்டு எழும்பும் துரை வெண்மையாகுந்தனையும் மென்கூட்டிற் கரைத்து அந்த நீர் சூடாயிருக்கையில் அதைச் சர்க்கரைப்பாணி¹ருள்ளே வடித்து விட்டுக் கலக்கவும். கலந்த பாணி இரண்டு இரூத்தல் பதினொரு அன்சு நிறுக்கவேண்டும். அதற்கு விசேஷகிருவிதம் 1.385 இருக்கவேண்டும்.

தேயம். அரைத்திரும் முதல் ஒருசுளும் வரைக்கு. ஒருதிரும்மிலே அயவியோதிரம் நாலரைக்கிறேன் இருக்கும்.

அயவிபோதிரக்துனிகை. Pill of Iodide of Iron. கொள். இரும்புக்கம்பி, நாற்பது கிறேன்; இயோதம்¹, எண்பதுகிறேன்; சுத்தசர்க்கரை, மாவாக. எழுபதுகிறேன்; அதிமதுரவோர்த்தூள், நூற்றுநாற்பது கிறேன்; சிஸ்திலித்த தண்ணீர், ஐம்பதுமினிம் இரும்புக் கம்பி, இயோதம், தண்ணீர் மூன்றையும் பெலனாயடைத்த அன்சுக்குப்பி யொன்றுக்குள்ளே இட்டு துரைவெண்மையாகுந்தனையும் குலுக்கவும். சர்க்கரையைக் கல்லுரலில் போட்டு அதின்மேலே நீரை விட்டுக் கெதியாய் அரைத்து அதிமதுரத் தூளைப்படிப்படியாய்ச் சேர்க்கவும்.

தேயம். மூன்றுகிறேன் முதற் பத்துக்கிறேன் வரைக்குங் கூடவங் கொடுக்கலாம். இதில் மூன்றுகிறேனில் அயவியோதிரம் ஒரு கிறேன் இருக்கும்.

அயபிரதீதுரகநீர்.

SOLUTION OF PERNITRATE OF IRON.

இரும்புக்கம்பியை நீதுரிக்கமில்த்திற்³ கரைத்துத் சிஸ்திலித்ததண்ணீருங் கலந்து அயபிரதீதுரகநீர் செய்யப்படும். லட்சணங்கள். இது செங்கபிலநிற மானதெளிந்தநீர்;சற்றேபுளிப்பும் துவர்ப்புமான சுவைஉடையது. பதாசிபீத புருசியைச்⁵ இதோடு சேர்க்க நீலநிற அடையலுண்டாகும். இந்நீரில் சொற் பத்தை ஓர் சோதனைக்குழுலுள் விட்டு அதோடு அசிலும் அரைப்பவகு சுத்த சல்வரிக்கமில்த்தைக்⁶ கூட்டி அயசல்வசு நீரிலே கொஞ்சத்தை அதற்குள் வார்த்தால் முழுவதங் கருங்கபில நிறமடையும். சோதனை. விசேஷ கிருவிதம். 1. 107. இந் நீரில் ஒருதிராமோடு அமோன⁷ நீரை மிஞ்சக்கூட் டும்போதுண்டாகும் அடையலுக்கழுவி உலர்த்திப் பன்மமாக்கினால் அது 2. 6 கிறேன் நிறுக்கும். இதோடு பதாசி செம்புருசியைச் சேர்த்தால் அடையலுண்டாகாது.

நன்மை. உபயோகம். அயபிரதீதுரகநீர் நீரைப்போலவே. விசேஷ மாய்ச் கழிச்சலுக்கு இது உவந்த துவர்.

தேயம். பத்து முதல் நாற்பது மினிமை⁸த் தண்ணீரில் தாராளமாய்க் கலந்து கொடுக்கவும்.

அயவாசேனசு,

ARSENIATE OF IRON.

அயவாசேனசு 3 இரு அ, ஆ, அ⁵, என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்படும். இது கொஞ்ச அளவுக்கு பிரவச்சிரிக்கப்⁹பட்டிருக்கிறது. அயசல்வசைச்¹⁰

1 Iodide of iron. 2 Iodum. 3 Nitric acid. 4 Distilled water. 5 Yellow prussiate of potash. 6 Sulphuric acid. 7 Ammonia. 8 Minim. 9 Peroxidized.

10 Sulphate of iron.

சோடவாசெனசாற்¹ கூறுபடுத்த அயவாசெனசு பிறக்கும். லட்சணங்கள் இது பச்சைநிறமான சுவையற்ற அமாவத்²தான். தண்ணீரில் கரையாது. ஐருகுலோறிக்கமிலத்திற்³ சுறுக்குக் கரையும். இக் கரைவுக்குப் பதாசிபீத புருசியசைக்⁴ கூட்ட வெண்ணீல நிறமான அடையல் கனக்க உண்டாகும். பதாசிசெம்புருசியசைக்⁵ கூட்ட, அதிலும் அளவுநிறங் கதித்த அடையலுண்டாகும். இஃதிலே சொற்பத்தைமிஞ்சிய காரச்சோடத்⁶தோடுகாய்ச்சி வடித்து நீதரிக்கமிலத்தால் சரிபாய்த் தடஸ்தித்து⁷ வெள்ளிநீதரசு⁸ நீரரச்சேர்க்க செங்கற் சிவப்பு நிறமான அடையலுண்டாகும். சோதனை. இதை ஐரு குலோறிக்கமிலத்திற் கரைத்து, தண்ணீர் கலந்து, பாரிய குலோறித்தைக்⁹ கூட்டினால் அடையலுண்டாகாது. இருபது கிறேனை மிஞ்சிய ஐருகுலோ றிக்கமிலத்திற் கரைத்துத் தண்ணீர்கலந்து, பதாசி செம்புருசியசைக் கூட்டி னால் பதாசிதுவி குரோமசுப்¹⁰ பருமவிலயனத்திற் பதினேழு அளவையாகு தல் கூட்டுத்தனையும் ஓர்நீல நிறமான அடையலுண்டாகிக்கொண்டிருக்கும் தன்மை. இது அலதிறவதொணிகம்¹¹. இரும்பு ஆசெனிகம் இரண்டின் தன்மையும் இதில் கூடி இருக்குமாம்.

உபயோகம். காலிகமான சருமரோகங்களுக்கு விசேஷமாய் எர்பிக்¹² வகை செதில்வகைக்கு இது சத்துள்ள மருந்து. மேலும் எலிபர்தீபசி¹³, குஷ்டம், கன்சர்¹⁴ லூபசு¹⁵ என்ற நோய்களுக்கும் இது வழங்கப்படும்.

தேயம். பதினாறிலொருபங்கு கிறேன் முதல் அரைக்கிறேன் வரைக்குக் குளிகையாக்கிக் கொடுக்கலாம். மேலும் ஒரு அங்கு லாடன்கெனுக்கு இருபதுகிறேன் வீதமாகச் சேர்த்துத் தைலமாக்கிப் பூச்சுமருந்தாகக் கொள்ளலாம்.

அயவமோனசிதிறக.

CITRATE OF IRON AND AMMONIA.

இது அயபிரவக்சிரமும்¹⁶, அமோனமும்¹⁷ சிதிறிக்கமிலமும்¹⁸ கூடிய கலப்பு. லட்சணங்கள். இது கருஞ்சிவப்பு நிறமான மெல்லிய உருவொளியுள்ள செதில்களாக இருக்கும். சற்றே இனிய துவர்ச்சுவை கொண்டது. விற மசுத்தானோச்¹⁹ சொற்பமாய்ச் சிவப்பாக்கும். தண்ணீரில் கரையக்கூடியது. திட்டசீதிற்²⁰ கரவதரிது. பதாசி²¹ நீரோடு இதைக்காய்ச்ச, அமோனம்கக்கும், அயபிரவக்சிரம் அடையும். அல்கலைக்கரைவினின்று அயத்தைப் பிரித்தெடுத்தபின் அதை அசிதிக்கமிலத்தாற்²² சற்றே அதிபூர்த்தித்தால் யாதொரு கிரி ஸ்தலையலுண்டாகாது. சோதனை. பரமாணுவில் வைத்துப் பஸ்மமா க்கினால் அயபிரவக்சிரம தூற்றுக்கு இருபத்தேழு பங்குக்குக் குறையாமல மிஞ்சும்.

தன்மை. இது சாந்தமான உத்தம அயத்தொணிகம்²³.

உபயோகம். இது சாந்தமான அழற்று மருந்தாதலால் கடுமையான நோய்களின் பின் காணும் பெலவீனத்துக்கும் பிள்ளைகளுக்குண்டாம் அனீமி க்கும்²⁴ மதியாந்திரகசம்²⁵, பொதுவாய் துபேகுல²⁶ நோய்களுக்கும் உவந்தது.

1 Arseniate of soda, 2 Amorphous. 3 Hydrochloric acid, 4 Yellow prussiate of potash. 5 Red prussiate of potash 6 Caustic soda. 7 Neutralize. 8 Nitrate of silver. 9 Chloride of barium. 10 Bichromate of potash. 11 Alterative ionic. 12 Herpes. 13 Elephantiasis. 14 Cancer. 15 Lupus. 16 Peroxide of iron. 17 Ammonia. 18 Citric acid, 19 Litmus paper. 20 Recti- fied spirit. 21 Potash. 22 Acetic acid. 23 Tonic. 24 Anaemia, 25 Tabes mesenterica, 26 Tubercular.

தேயம். ஐந்துகிறேன் முதற் பத்துக்கிறேன் வரைக்கு நாளிரண்டு மூன்று முறை கொடுக்கலாம்.

ரசிதம். அயசிதிறசுவைன். Wine of Citrate of Iron. கொள். அயவமோனசிதிறசு, தூற்றறுபது கிறேன்; செரிவைன் அல்லது தோடம் வைன் அரைநாழி. கரைத்து அடைத்த பாத்திரத்தில் விட்டு இடைக்கிடை குலுச்சி மூன்று நாள் வைத்திருந்து பிறகு வடிக்கவும்.

தேயம். ஒரு திரும் முதல் நாலு திரும் வரைக்கு.

அயகினியசிதிறசு.

CITRATE OF IRON AND QUINIA.

இது சிதிறிக்கமில்மும்² அயபிரவச்சிரம்³, அயபுரவச்சிரங்களும்⁴ கினிய முஞ்சேர்ந்த கலப்பு. லட்சணங்கள். இது பச்சைதாவிய பொன்மஞ்சள் நிறமான மெல்லிய செதல்களாக இருக்கும். பரமானுவிற சற்றே உருகும். தண்ணீரில் முற்றாய்க்கரையும். இக் கரைவு சொற்ப புளிப்பாயிருக்கும், சோடீ⁶நீர் அதிலே செங்கபில அடையலவிழுத்தும், அமோனீ⁷நீர் வெண்ணடையலை விழுத்தும்; பதாசி⁸, செம்புருசியசும்⁹. பதாசி¹⁰புருசியசும் நீலநிற அடையலை விழுத்தும்; தனிக்கமில்¹¹ நரைக்கருமையான அடையலை விழுத்தும். கைப்பான அயச்சுவைகொண்டது. சோதனைகள். இதைக்காற்றுப்பட எரித்து உண்டாகும் சேஷத்தைத் தண்ணீரால் நனைத்தால் அது சோதனைத்தாளுக்கு அல்கலை¹²யாயிராது. ஐம்பதுகிறேனை ஒரு அன்சுதண்ணீரில் கரைத்து அமோனத்தைச் சற்றே மிஞ்சக்கூட்டி உண்டாகும் வெண்ணடையலை ஓர்வடியின்மேற் சேர்த்து வறட்டினால் அது எட்டுக்கிறேன் நிறுக்கும். இந்த அடையல் சுத்த ஈதரில்¹³ ஏறக்குறைய முற்றாய்க்கரையும். அதை எரித்தால் சொற்ப சேஷம் மாத்திரம் இருக்கும்.

தன்மை உபயோகம். அயவமோன சிதிறசைப் போலவே. ஆயினும் இது அதிலும் வீரான தொணிகம், அந்திபிராடி¹⁴; பிளிகை¹⁵ வீக்கங்களுக்கு உவந்தது.

தேயம். ஐந்துகிறேன் முதல் பத்துக்கிறேன் வரைக்கு நாள் இரண்டு முறை கொடுக்கலாம். இன்னும் நெருக்கியுங் கொடுக்கலாம்,

அயதாத்தரகம்.

TARTARATED IRON.

இது அயபிரவச்சிரமும் பதாசியும் தாத்தரிக்கமில்முஞ்சேர்ந்த கூட்டு. லட்சணங்கள். இது கருஞ்சிவப்பான மெல்லிய உருவொளியுள்ள செதில்களாக இருக்கும், சற்றே இனிய துவர்ச்சுவை கொண்டது. தண்ணீரில் கரையக்கூடியது. சீதிலே¹⁶ சொற்பமாய்க்கரையும். தண்ணீர்க் கரைவை ஐருளுலோறிக்கமில்த்தாற்¹⁷புளிப்பாக்கிப் பதாசி¹⁰புருசியசைக் கூட்டினால் நீல நிற அடையல் கனமாய் உண்டாகும்; பதாசி⁸செம்புருசியசுக் கோ அடையல் தோன்றாது. இந்த உப்பைச் சோடீ⁶நீரோடு காய்ச்ச, அய

1 Sherry. 2 Citric acid. 3 Peroxide of iron. 4 Protoxide. 5 Quinia. 6 Soda. 7 Ammonia. 8 Potash. 9 Red prussiate. 10 Yellow. 11 Tannic acid. 12 Alkali. 13 Ether. 14 Antiperiodic, சாமபீகாரி. 15 Spleen. 16 Spirit. 17 Hydrochloric acid.

பிரவக்சிரம் பிரியும், அமோனம் கக்காது. அந்த நீரை வடித்து அசிதிக் கமிலத்தூர்¹ சற்றேபுளிப்பாக்கினால், அது ஆறும்போது கிரிஸ்தலான அடையலுண்டாகும். சோதனைகள். ஐப்பது கிறேனைச் செஞ்சூட்டிற் பஸ்ம மாக்கிச் சேவதத்தைத் திஸ்திலித்த தண்ணீரற் கழுவி மறுபடியும் பஸ்ம மாக்கினால் 15 கிறேன் நிறையுள்ள அயபிரவக்சிரம் எஞ்சும்.

தன்மை, உபயோகம். அயவமோன சிதிறசைப்போலவே. இது கிருமி கொல்லியுமாகும்.

தேயம். ஐந்து கிறேன் முதற் பத்துக்கிறேன் வரைக்குத் தண்ணீர் கரைத்துக் கொடுக்கலாம்.

அயசுகந்தமீஸ்தூர்.

AROMATIC MIXTURE OF IRON.

கொள் வெண்சின்கனப்பட்டை², மாவாக்கி ஒரு அன்சு; கரும்புக்கிழங்கு³, பருக்கை தூளாக அரை அன்சு; இடித்தகராம்பு, கால் அன்சு; மெல்லிய இரும்புக்கம்பி, அரை அன்சு; ஏலக்கூட்டிரஞ்சம்⁴ மூன்று அன்சு; தோடந் தோல் ரஞ்சம், அரை அன்சு; பெப்பமிந்து நீர்⁵, போதியது. சின்கனப் பட்டைத்தூள், கரும்புத்தூள், கராம்புத்தூள், இரும்பு நாலையும் அடைத்த பாத்திரத்தில் பன்னிரண்டு அன்சு பெப்பமிந்துநீரில் மூன்றுநாள்க்கு ஊறப் போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கி அப்பால் வடித்து வடிந்த நீர் பன்னிரண் டரை அன்சு அளக்க போதிய பெப்பமிந்து நீரை விட்டு ரஞ்சங்களையுங் கூட்டி கலவையை நன்றாயடைத்த சீசாவிற்பேணவும்.

தேயம். சாந்தமான அயதொணிகமாய் இதை ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு வரைக்கும் நாள் இரண்டு மூன்று முறை கொடுக்கவும்.

அயவைன். WINE OF IRON.

கொள், மெல்லிய இரும்புக்கம்பி, ஒரு அன்சு; செரிவையின், அரை நாழி. அடைத்த பாத்திரத்தில் இரும்புக்கம்பியை வைனில் முற்றாய்த்தாழாமல் நிற்கத்தக்கதாய் இட்டு முப்பது நாளுறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கித் திறந்து விட்டு அப்பால் வடிக்கவும்,

தேயம். ஒரு திரும் முதல் நாலுதிரும் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். இது பிள்ளைகள் பெண்களுக்கு மெத்தச்சாந்தமான அயதொணிகமாகும்.

[இந்துவிலுள்ள சனங்கள் இரும்பைப் பலமுறையாய் மருந்தாக்குவார்கள். அவைகளில் இரண்டு வகையை ஜனர் பண்டிதர் குறித்திருக்கிறார். அவைகளிலொன்றுங் கவனிக்கப்படத்தகுந்ததல்ல. இரண்டு முறையாய்ச் செய்தமருந்தும் அசுத்த அக்சிர்மாய்த் தோற்றுகின்றது. அவற்றின் சத்து நன்றாய் அறியப்பட்டிருக்கும். அன்னபேதி யென்ற அசுத்தமான அயசல் வசு⁷ ஏக்கடைகளிலுக் விலைப்படும். அதைச் சல்புரிக்கமிலஞ்⁶ சொற்ப மாய்க்கலந்த தண்ணீர்கரைத்து வடித்துக் கிரிஸ்தலாக்கினால் மருந்துக்கு உதவும்.]

1 Acetic acid, 2 Pale cinchona bark, 3 Calumba root, 4 Compound tincture of cardamoms, 5 Peppermint water, 6 Oxide, 7 Sulphate of iron, 8 Sulphuric acid.

சேம்பு, கூப்டம். COPPER, CUPRUM.

சின்னம், கூ. கூ.=63.5.

சேம்பு ஆகரிக்கணத்தில் பல இடங்களில் மிகுதியாய் உண்டு. இது சிலவேளை சுத்த லோகமாக விளையும். பெரும்பாலுமோ செம்புப்புலிங்கி¹ செம்புக்கிளாஞ்சு² என்ற கற்களாக கெந்தகத்துடனும் செவ்வக்கிரம்³ காரக் கிரம்⁴ என்ற கற்களாக அக்கிதத்துடனும் கூடியிருக்கும். அரிதாய்க்காணும் திதனியத்தை⁵விட இது மாத்திரமே லோகங்களுள் சிவப்பானது. இது கம்பியாய் நீட்டப்படவுந் தகடாய் அடிக்கப்படவுந் கூடியது. இதின் விசேஷகிராவிதம் 8.9; 1996 பாகை சூட்டில் உருகும். நீதுரிக்கமில்மே⁶ விசேஷமாய் இதைக்கரைப்பது. சுத்தமான செம்புப்பத்திரம் பாஷாணம், வெள்ளி நீதுரசு⁷, இரசங்களுக்குச் சோதனையாக வழங்கப்படும்.

சேம்புசல்வசு, துருசி.—SULPHATE OF COPPER.

சேம்புசல்வசு, கூ. கே அ. 5 ஐ.அ. என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்படும். செம்பைச் சல்வுரிக்கமில்த்தோடு⁸ சேர்த்துக் காய்ச்சி வரும் பதார்த்தத்தை வெந்நீர்க்கரைத்து அந்தநீரை வரட்ட, அது ஆறும்போது, செம்புசல்வசு, கிரிஸ்தல்களாக விளையும். லட்சணங்கள். இது சாய்ந்த, ரம்ப பிரிசங்க⁹ ளான நீலநிறக் கிரிஸ்தலுப்பு¹⁰; தண்ணீரிற் கரைந்து வெளிறின நீலநீராகும். இந்த நீர் விறமஸ்தானை¹¹ அதிகமாய்ச் சிவக்கப்பண்ணும். இக்கரைவுக்குப் பாரியகுலோறிரஞ்¹²சேர்க்க ஐருகுலோறிக்கமில்த்திற்¹³கரையமாட்டாத வெண்ணடையல் உண்டாகும்; பதாசிபீதபுருசியசைச்¹⁴சேர்க்கக் கருஞ்சிவப்பு நிற அடையல் உண்டாகும். சோதனை. இந்த உப்பைத் தண்ணீரிற் கரைத்து இருமடங்கு குலோறநீருங்¹⁵கலந்து அமோனநீரைக்¹⁶கூட்டினால், அமோனநீரை முதற் கூட்டும்போது உண்டாகும் அடையலானது அந்த நீரை இன்னும் போதிய அளவாய்க் கூட்டுவதாற் கரைய, யாதொரு அடையலும் இல்லாத செந்நீலநிறமான நீருண்டாகும்.

தன்மை. இது தொணிகம்¹⁷, துவர், வமனி; பருந்தேயத்தில் அழற்று நஞ்சு. தோலுரிந்த, அல்லது தசை அரும்புகிற இடத்துக்குக் கட்டியாய் இட்டால், மெல்லிய காரமும் துவருமாகும். கரைத்து இட்டால் ஸ்திமுல¹⁸மாகும்.

உபயோகம். காலிக திசந்தெரி¹⁹, தியறீயங்²⁰களுக்கு இது உத்தமமருந்து. கொரியம்²¹, எபிலெப்சி²², கடுமையான இஸ்தேரி²³களுக்கும் இது நல்லது. தானிகமாய்க் கனுறீயம்²⁴, லுகறீயம்²⁵சீழ்க்கண்ணேய், காலிகசருமநோய்களுக்கும் மந்தமான அபல அழல் விரணங்களுக்கும் வெளியான இரத்தப்பெருக்குக்கும் முசுகாதனி²⁶, அக்கரப்புண்சள் மிஞ்சிய தசை வளர் புண், கிறனுலக் கண்ணேய்²⁷களுக்கும் இது கட்டியாக இடப்படும்.

1 Copper pyrites, 2 Copper glance, 3 Red oxide. 4 Black oxide. 5 Titanium.
6 Nitric acid. 7 Nitrate of silver. 8 Sulphuric acid. 9 Rhombic prism,
10 Crystal. 11 Litmus paper. 12 Chloride of barium. 13 Hydrochloric acid, 14 Yellow prussiate of potash, 15 Chlorine. 16 Ammonia.
17 Tonic. 18 Stimulant. 19 Chronic dysentery. 20 Diarrhoea,
21 Chorea, 22 Epilepsy. 23 Hysteria. 24 Gonorrhoea,
25 Leucorrhoea, 26 Cancrum oris, 27 Granular ophthalmia.

தேயம். தொணிகம் துவராகக் காற்கிறேன் முதல் இரண்டு கிறேன் வரைக்கும், வமனியாக, நாலு கிறேன் முதற் பன்னிரண்டு கிறேன் வரைக்குங் கொடுக்கலாம். கலூறியம்¹ அல்லது புகட்டலாக² வழங்குவதற்கு ஒரு அன்சு தண்ணீரில் இரண்டு கிறேன் முதற் பத்துக்கிறேன் வரைக்குங் கரைத்துக்கொள்ளலாம்.

[இந்து வைத்தியர் பருமட்டாய்ச் செய்த செம்புப்புகள் சிலவற்றில் மெத்த நம்பிக்கை வைப்பார்கள். செம்புக்குப் பழப்புளி, எலுமிச்சம்புளி முதலிய தாவர புளிகள் இட்டு இந்த உப்புகள் செய்யப்படும். இவைகள் ஒன்றுங் கவனிக்கப்படத் தகுந்தவைகளல்ல. மிகுதியான கடைகளிலிருக்குந் துருசி பெரும்பாலும் நல்லது. அதை இன்னுஞ் சுத்தமாக்கவேண்டுமாயில் தண்ணீர் கரைத்துக் கடுதாசியில் வடித்து வறட்டிக் கிரிஸ்தலாக்கி யெடுக்கலாம்.]

இரசம். MERCURY.

சின்னம், r ; $\text{r}=200$.

இரசம் இயல்பிலே சுத்தமாயிருக்கும். ஆயினும் பவளமனோசிலை³ என்னும் பிரசல்விரமாக இருக்கும். வாடிக்கையான காங்கையில் நீராயிருக்கிற லோகம் இது மாத்திரமே. பளபளப்பானது; இலகுவிற் சிறுச்சிறு உண்டைகளாகப் பிரியும். 662 பாகை சூட்டிற் கொதிக்கும். தோற்றக்கூடிய செஞ்சூட்டுக்குக் குறைந்த சூட்டிற் சேஷமில்லாமல் ஆவியாய்ப் போகும். விசேஷகிரூவிதம் 13.59. பிரதானமாய் நீதுரிக்கமில்ம் சல்வரிக்கமில்ங்கள் இதைக் கரைக்கும்.

தன்மை. இரசத்தை லோகமாய் விழுங்கினாற் பெரும்பாலும் யாதொரு செயலுந் தோன்றாது. ஆயினும் சிலவேளை சூடல் நீர்கள் அதிற் கலக்க, வீரன செயல்களுள்ள கலப்புகளுண்டாகும். இரச ஆவி ஆட்களில் நெடுங்காலமாக அதிகமாய்ப்பட்டால் அவர்களுக்கு ஓர்வகையான சிராநோய் சுருண்டாகிச் சிலவேளை சீவமோசமாய் முடியும். மேனித் தோலுட் தேய்த்துச் செலுத்திவிட்டால் அல்லது நுண் கூறுக்கித் தின்றால் இது உடம்பிற் பெலனாப் பிடிக்கும். அதால் எப்போதும் முரசு⁴ வீங்கிப் புண்பட அத்தோடு உமிழ்நீரும் பெருக்கெடுத்து, மூச்சும் ஓர்வகையாய் நாளும். இக்குணங்கள் கடுமையானால் இரசவாயவிதல் எனப்படும். இரசத்தைப் பொதுவாய், அல்திறவம்⁵, பித்தக்கினி, விரேசனி, உமிழ்நீர்ப்பெருக்கி எனலாம். ஆயினும் இத்தன்மைகள் உபயோகங்களைப்பற்றி அந்தந்த இரசரசிதத்துடன் சொல்லப்படும்.

ரசிதங்கள். இரசதுளிகை. Mercurial pill. கொள். இரசம், இரண்டு அன்சு; ரோசை லேகியம்,⁷ முன்று அன்சு; அதிமதுர வேர்த்தூன், ஒரு அன்சு. இரசத்தை ரோசை லேகியத்தோடு சேர்த்து நுண்ணுண்டைகள் அற்றுப்போகுந்தனையும் அரைத்து அப்பால் அதிமதுரத்தூளைச் சேர்த்து முழுவதையும் நன்றாய்க் கலக்கவும்.

தன்மை. நல்ல அல்திறவம், பித்தக்கினி, விரேசனி.

உபயோகம். சிவ்வி⁸சுக்கும் அதைப்பற்றிய நோய்களுக்கும் சீக்கிரத்தில்

1 Collyrium. 2 Injection. 3 Cinnabar. 4 Nervous. 5 Gum. 6 Alterative.
7 Confection of Rose. 8 Syphilis,

வீறுகொள்ளாமல் இரசங் கொடுக்கவேண்டிய நோய்களுக்கும் இது உவந்தது. ஈரற் பிசகோடு கூடிய குன்மத்துக்கு, மற்றும் பித்தக்கினிகள் விரேசனிகளோடு கொடுக்க இது நல்ல அனுமருந்து.

தேயம். அல்திறவமாக இரண்டு மூன்று கிறேன், நாள் இரண்டு மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம். விரேசனியாக ஐந்து முதல் எட்டுக்கிறேன் கொடுக்கலாம். மூன்று கிறேன் குளிகையில் ஒரு கிறேன் இரசம் இருக்கும்.

இரசகிரீதம். Murcury with chalk. கொள். இரசம் நிறைப்படி ஒரு அன்சு; பூசகிரீதம்¹, இரண்டு அன்சு. இரசத்தையும் கிரீதத்தையும் பீங்கான் உரலிவிட்டு இரச உண்டைகள் கண்ணுத்துத் தெரியாமற்போய்க் கலவை எகத்துக்கொரேமாதிரியான நரைநிறத் தூளாக வருந்தனையும் அரைத்துக்கொள்ளவும். லட்சணங்கள். இது வெண்நரைநிறமான தூள். மணற் சுணையற்றது. தண்ணீரில் கரையாது. ஐருகுலோறிக்கமில்² கிரீதத்தை நுரைப்போடு கரைக்க இரசம் நுண்ணிய மாவாக எஞ்சும். சோதனைகள். ஐருகுலோறிக்கமில்³ கரைவு தகர குலோறிரஞ்சேர்க்க அடையாது.

தன்மை, உபயோகம். இரச குளிகையைப்போலிருக்குமாயினும் இது சாந்தமானது. குழந்தைகளுக்கு இரசங் கொடுக்கவேண்டிய நோய்களுக்கு இது உவந்தது.

தேயம். வளர்ந்தோருக்கு ஐந்து கிறேன் முதற் பதினைந்து கிறேன் வரைக்கும், குழந்தைகளுக்கு இரண்டு கிறேன் முதல் நாலு கிறேன் வரைக்குங் கொடுக்கலாம். பெரும்பாலும் மற்றும் மருந்துகளோடு கூடக் கொடுக்கப்படும். மூன்று கிறேனில் ஒருகிறேன் இரசமிருக்கும்.

இரசவன்கென். Mercurial ointment. கொள். இரசம், ஒரு இரூத்தல்; பூதலாடு⁴ ஒரு இரூத்தல்; பூதச் சீபம்⁵ ஒரு அன்சு. ஒன்றாய்ச் சேர்த்து இரச நுண்ணுண்டைகள் தோன்றாமற் போருந்தனையும் அரைக்கவும்.

தன்மை, உபயோகம். தேக மருந்தாக இதின் செயல் இரச குளிகையைப் போலவே. செலுத்துமுறை அதைப்போலவல்ல. மேனியில் விசாலமாயாவது தோலுரிந்த இடத்திலாவது கெடுநேரமாய்ப் பூசினால் வாயவியும். ஆகையாற் சுறுக்கிலே வாயிற் கேட்கப்பண்ணுவதற்கென்று உள்ளே கொடுக்கப்படும் மற்றும் மிருசு மருந்துகளுக்கு இது துணையாகப் பூசப்படும். இரசம் பிரயோகிக்க வேண்டியதாயிருந்தும் இரைப்பையில் அழற்சி முதலிய காரணங்களால் அதை உள்ளே கொடுக்கக்கூடாதிருக்கும்போது இத்தலைத்தைத் தோலுட் தேய்த்துவிடலாம். தானிக மருந்தாக இது சிவ்லிசு⁶ ப் புண்கள், பொருத்து வீக்கங்களுக்கும், பல வகையான கழலைகளுக்கும், சோஷணிகளை⁷ அருட்டி அவற்றை வற்றப்பண்ணும் நோக்கமாகப் பூசப்படும்.

இரசலினிமென், இரச சப்பாசிதுறி⁸, இரசகூட்டன்கென் என்ற மருந்துகளில் இதோர் கூறுகச் சேருகின்றது.

இரசகூட்டன்கென். Compound ointment of mercury. கொள். இ

¹ Prepared chalk. ² Hydrochloric acid. ³ Chloride of tin. ⁴ Prepared lard.
⁵ Prepared suet. ⁶ Syphilis. ⁷ Absorbent. ⁸ Suppository.

388 இரசபிலாஸ்தர், இரசசப்பாசிதுறி, இரசசேவ்வக்சிரம்.

ரசவன்கென், ஆறு அன்சு; செம்மெழுகு, ஒலீவுதேலம்¹, வகைக்கு மூன்று அன்சு; பூரம் ஒன்றரை அன்சு. மெழுகை மென்குட்டில் உருக்கித் தேலைக் கூட்டி அக்கலவை ஏறக்குறைய ஆறினபின் பூரத்தை மாவாக்கிக் கூட்டி இரசவன்கெனையும் சேர்த்து முழுவதையுந் திறமாய்க் கலந்துகொள்ளவும்.

இரசலினிமென். Mercurial Liniment. கொள். இரசவன்கென், ஒரு அன்சு; அமோன நீர்² ஒரு அன்சு; பூரலினிமென், ஒரு அன்சு. இரசவன்கெனைப் பூரலினிமெனில் இட்டு மென்குட்டிலுருக்கி நீராக்கி, அப்பால் அமோனநீரைப் படிப்படியாய்க் கூட்டிக் கலக்கவும்.

தன்மை, உபயோகம். இரசவன்கெனைப் போலவே. ஆயினும் இது அதிக ஸ்திமுலமானது.

இரசபிலாஸ்தர். Mercurial plaster. கொள். இரசம் மூன்று அன்சு; ஒலீவுதேல் ஒரு திரும்; உச்சிககந்தி³ எட்டுக் கிரேன்; ஈயப்பிலாஸ்தர்⁴ ஆறு அன்சு. தேலத்தைக் காய்ச்சி அதற்குக் கந்தியைப் படிப்படியாய்க் கூட்டி அவை ஒன்றாய்ச் சேருந்தனையும் கலக்கி அக்கலவையோடு இரசத்தைக் கூட்டி நுண்ணுண்டைகள் அற்றுப்போகுந்தனையும் அரைத்து அப்பால் ஈயப்பிலாஸ்தரை முன்னமே உருக்கிச் சேர்த்து முழுவதையுந் தீர்ப்பாய்க் கலக்கவும்.

பொருத்தநீர்க்கோவை, அரையாப்பு, கழலைகள், சிவ்விசு வாதங்களுக்கு இது நல்ல பற்று.

இரசவழனியகபிலாஸ்தர். Plaster of Ammoniacum with Mercury. அமுனியகம் பார்.

இரச சப்பாசிதுறி. Mercurial Suppositories. கொள். இரச அன்கென், அறுபது கிரேன்; பெஞ்சோயஸ்லாடு⁵, வெண்மெழுகு, வகைக்கு இருபது கிரேன்; தியுபுரோம⁶தேல் எண்பது கிரேன். பெஞ்சோயஸ்லாடையும் மெழுகையும் தியுபுரோமதேலையும் மென்குட்டில் உருக்கி, இரசவன்கெனைக் கூட்டி எல்லாவற்றையும் சூடின்றித் திறமாய்க் கலந்தபின் அக் கலவை உறையமுன் பதினைந்து கிரேன் கொள்ளத்தக்க ஏற்ற குகைகளில் வார்க்கவும். அல்லது அக் கலவை நீரை ஆறவிட்டுப் பன்னிரண்டு சமபங்குகளாகப் பிரித்து ஒவ்வொன்றையும் கோன்⁷வடிவமாயாவது வசதியான வேறேதும் சாங்கமாயாவது செய்துகொள்ளவும்.

ஒவ்வொரு சப்பாசிதுறியிலும், ஐந்து கிரேன் இரசவன்கென் இருக்கும். என்ன நியாயத்தினாலாவது இரசத்தை வாயாலே கொடுக்கக் கூடாதிருந்தால் அல்லது வாயாற் கொடுப்பதுடன் சுறுக்கிலே உடம்பிற் கேட்கப்பண்ணவேண்டுமாயில் அதை இப்படியே உடம்புட் செலுத்தலாம்.

இரச சேவ்வக்சிரம்.

RED OXIDE OF MERCURY.

இது 114 என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்படும். இரசநீதரசைச் சூட்டாற் கூறுபடுத்தி இது எடுக்கப்படும். லட்சணங்கள். இது வெண் சிவப்பு நி

1 Olive oil. 2 Solution of ammonia. 3 Sublimed sulphur. 4 Lead plaster. 5 Benzoyated lard. 6 Oil of Thebroma. 7 Cone. 8 Nitrate.

றமான தூள். ஐருகுலோறிக்கமிலத்திலே¹ சுறுக்குக் கரையும். அக்கரைவுக்குக் காரப்பதாசியை² மிச்சமாய்க் கூட்ட வோர் மஞ்சள்நிற அடையல் உண்டாகும். அமோன நீரைக்³ கூட்ட வெண்ணடையலுண்டாகும். சோதனை. செஞ்சூட்டுக்குக் குறைந்த சூடு காட்ட முற்றாய் ஆவியாகி இரசமும் அக்சிதமுமாய்ப்⁴ பிரியும். இதைச் சோதனைக் குழலிற் செய்தால் வெண் சிவப்புநிற ஆவி தோன்றாது.

தன்மை. அடிற்றி, தகனி, உள்ளே கொடுப்பதில்லை.

ரசிதம். இரச செவ்வக்கிரவன்கென். Ointment of Red oxide of Mercury. கெர்ள். இரசசெவ்வக்கிரம், மாவாக, அறுபத்திரண்டு கிறேன்; செம்மெழுகு, கால் அன்சு ; வாதுமைத் தேல்⁵, முக்கால் அன்சு, மெழுகை மென்கூட்டிலுருக்கி அதோடு தேலைச் சேர்த்து அக் கலவை ஏறக்குறைய ஆறியிருக்க இரச வக்கிரத்தைக் கூட்டி முழுவதையுந் திறமாய்க் கலந்துகொள்ளவும்.

மந்தமான சிவ்விசு⁶ப் புண்கள், ரூபியைப்⁷ புண்களுக்கும் தொல்லையான சருமனோய்கள் சிலவற்றுக்கும் கண் மடற் தாபிதம்⁸ காலிககஞ்சந்திவீது⁹ என்ற கண்ணோய்வகைக்கும் பூச இது நல்ல தைலம்.

இரச சல்வசு. SULPHATE OF MERCURY.

இது 11கேஅ⁴ என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்படும். இரசத்தில் சல்வுரிக்க மிலத்தின்¹⁰ செயலால் இது உண்டாகும். இது வெண்மையும் பாரமுமான கிரிஸ்தலான¹¹ தூள். தண்ணீரை இதின்மேற் தெளிக்க மஞ்சள் நிறமாகும். சூட்டுக்கு முற்றாய் ஆவியாகும்.

தன்மை. தகனி; கலமல்¹² சவ்வீரம்¹³ என்பன செய்வதற்கு மாத்திரம் இது வழங்கப்படும்.

இரசவதகுலோறிர்ம். கலமல்.

SUBCHLORIDE OF MERCURY. CALOMEL.

இது 12கு² என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்படும். இரசசல்வசு, இரசம், சோடதகுலோறிர்ம்¹⁴ மூன்றையும் கலந்து புடஞ்செய்து இது எடுக்கப்படும். லட்சணங்கள். இது மங்கல் வெண்மையான கனத்த ஏறக்குறையச் சுவையற்ற தூள்; கல்லுரவில் இட்டு அரைக்கச் சற்று மஞ்சளாகும். தண்ணீரிலாவது சீதிலாவது¹⁵ ஈதரிலாவது¹⁶ கரையாது. இதைப் பதாசினீரிற்¹⁷ கரைத்து மென் சூடுகாட்டக் கறுப்பாகும். தெளிந்த அக்கரைவு நீரை நீதுரிக்கமிலத்தாற்¹⁸ புளிப்பாக்கி வெள்ளிநீதுரசைச்¹⁹ சேர்க்க வெண்மையான கன அடையலுண்டாகும். சோதனைகள். போதிய சூடேற்ற முற்றாய் ஆவியாகும். மென்கூடான ஈதரைஇதோடு ஓர் சீசாவில் விட்டுக் குலுக்கி வரட்டி னுற் சேஷமிராது.

தன்மை. தாபக்கினி²⁰, விரேசனி, பித்தக்கினி²¹. சிறு தேயத்தில் அல்திறவம்²², உமிழ்நீர் கக்கி, கிருமிகொல்லி.

1 Hydrochloric acid. 2 Caustic potash. 3 Solution of ammonia. 4 Oxygen. 5 Oil of Almond. 6 Syphilis. 7 Rupia. 8 Ophthalmia tarsi. 9 Chronic conjunctivitis. 10 Sulphuric acid. 11 Crystal. 12 Calomel. 13 Corrosive sublimate. 14 Chloride of sodium, கரியம். 15 Spirit 16 Ether. 17 Potash. 18 Nitric acid. 19 Nitrate of silver. 20 Anti-phlogistic. 21 Cholagogue. 22 Alterative.

உபயோகம். பொதுவாய்த் தீவிர¹, சத்துவ², தாபித³, சுர நோய்களுக்குத் தாபத்தினியாய் இது பெரும்பாலும் வழங்கப்படும். இத்தன்மையையிட்டு முன்னையிலும் நம்பிக்கை குறைவென்றாலும் இவ்வருப்பான நோய்களின் முன் பருவங்களில் விரேசனத்தன்மையினிமித்தம் இது மெத்த மதிக்கப்படும். மற்ற நோய்களுள் வார்திபெதி, செங்கண்மாரி, பித்தக்குழப்பங்கள், திசந்தெரி⁴, நீர்க்கோவைகள், துறல்சி⁵, ஏர்ப்பு, ஐருகெவலம்⁶, அபுபிலெக்சி⁷, தலையிடி, சில வகையான செவிடு, தொல்லையான சருமநோய்கள், பரியஸ் தியதபம்⁸, சிவ்விசைப்பற்றிய அனேக நோய்களுக்குக் கொடுக்கப்படும்.

தேயம். அல்திறவமாய் ஒரு கிறேன் இரண்டுகிறேனை அடிக்கடி கொடுக்கலாம். விரேசனியாய் இரண்டு கிறேன் முதல் ஆறு கிறேன் வரைக்குங் கூடவும் பெரும்பாலும் வேறு விரேசனிகளோடு சேர்த்துக் கொடுக்கப்படும். இது புகை காட்டப்படுவதுண்டு. புகைகாட்ட இருபது கிறேன் முதல் முப்பது கிறேன் வரைக்கு ஏற்ற அணியத்தில் வழங்கலாம்.

ரசிதங்கள். இரசவத குலோற்றகூட்டுக்குளிகை. Compound Pill of Subchloride of Mercury. கொள். இரசவதகுலோற்றம், அந்திமனிசல்வுகம்⁹, வகைக்கு ஒருஅன்சு; குவயகராளம்¹⁰ மாவாக இரண்டு அன்சு; ஆமணக்கெண்ணெய் ஒரு அன்சு அல்லது பேரதியது. இரசவத குலோற்றத்தை அந்திமனிசல்வுகத்தோடு அரைத்து அப்பாற் குவயசராளத்தையும் ஆமணக்கெண்ணெயையுங் கூட்டி முழுவதையும் நன்றாயரைத்துக்கொள்ளவும். சிவ்விசு நோய் ஈரல்நோய் முதலியவற்றுக்கு நாடோறும் ஐந்துகிறேன் முதற் பத்துக் கிறேன் தேயமாகக்கொடுக்க இது உத்தமமான அல்திறவம். பிளமர் மாத்திரை என்று இது வெகுசாலம் பேர்பெற்றது.

இரசவதகுலோற்றவன்கேன். Ointment of subchloride of mercury. கொள். இரசவதகுலோற்றம், எண்பதுகிறேன்; பூதலாடு¹¹ ஒரு அன்சு. திறமாய்ச் கலக்கவும்.

சருமநோய்கள் பலவற்றுக்கு விசேஷமாய்ச் சிவ்விசுநோயைப்பற்றியுண்டானவைகளுக்குப் பூச இது நல்லது.

இரசகருலோஷன். Black mercurial lotion. கொள். இரசவதகுலோற்றம் முப்பது கிறேன்; சுண்ண நீர்¹² பத்து அன்சு. கல.

ரதிப்புண்களுக்கும்¹³ மற்றுஞ் சிவ்விசுப் புண்களுக்கும் இது பெரும்பாலும் இடப்படும்.

இரசபிரகுலோற்றம். சவ்வீரம்.

PERCHLORIDE OF MERCURY. CORROSIVE SUBLIMATE.

இதற்குச் சின்னம், ரகு². இரசசல்வசு¹⁴, சோடதகுலோற்றம்¹⁵, மங்கனீசிகாரக்சிரம்¹⁶ என்ற மூன்றையுங் கலந்து திஸ்திலிக்க¹⁷ இரசபிரகுலோற்றம்

Acute. 2 Sthenie. 3 Inflammation. 4 Dysentery. 5 Neuralgia. 6 Hydrocephalus. 7 Apoplexy. 8 Periostitis. 9 Sulphurated antimony. 10 Gnaiaum resin. 11 Prepared lard. 12 Solution of lime. 13 Chancre. 14 Sulphate of mercury. 15 Chloride of sodium. 16 Black oxide of manganese. 17 Distil.

பிறக்கும். லட்சணங்கள். இது கனமுள்ள நிறமற்ற பிரிசக்¹ கிரிஸ்தற்² கட்டிகளாக இருக்கும். அதிக காரமான லோகச் சுவை உடையது. தண்ணீரைப் பார்க்க அலங்காலில்³ அதிகமாய்க் கரையும். ஈதரில்⁴ இன்னும் அதிகமாய்க் கரையும். தண்ணீர்க் கரைவுக்குக் காரப்பதாசியைக்⁵ கூட்ட மஞ்சள் அடையல் உண்டாகும். அமோனஞ்சேர்க்க வெண்ணடையலுண்டாகும். வெள்ளரிநீதுரசைக்⁷ கூட்டத் திரண்ட வெண்ணடையலுண்டாகும். சோதனை. சூடேற்ற இது கூறுகளாகப் பிரியாமலும் சேஷம்விடாமலும் ஆவியாயெழும்பிக் கிட்டமாகும்.

தன்மை. இதைச் சிறுதேயமாக நெடுகக்கொடுத்தால் சிறுநீர் வெயர்வை உமிழ்நீர்களை அருட்டி உத்தம அல்திறவ⁸மாகும். பெருந்தேயத்தில் இது கொடிய அழற்றுநஞ்சு. கட்டியை ஓர் இடத்திற் பூசினுற் சொற்ப காரமாகும்; கரைத்துப் பூசினால் ஸ்திமுல⁹மாகும்.

உபயோகம். சிவ்விசு¹⁰ நோய், கரப்பன்கள், எபிலெப்சி¹¹, கண்ணோய், சைனன்கி¹², வாதம் அதைச்சார்ந்த மற்ற நோய்களுக்கு இது கெட்டியான மருந்து. மற்றநோய்களுள் ஐருகேவலம்¹³ நீர்க்கோவைகள் கோள வீக்கங்கள் எழலோபியம்¹⁴ ஈரல் வியாதிகளுக்கு இது வழங்கப்பட்டது. தண்ணீரிற் கரைத்து கனுறியம்¹⁵ கிலீற்று¹⁶ லுகறியங்களுக்குப்¹⁷ புகட்டலாகவும் பலவகையான கண்ணோய்க்குக் கலூறியமாகவும்¹⁸ தொல்லையான சருமநோய்கள் பலவற்றுக்கு லோஷனாகவும்¹⁹ வழங்கப்படும். பேன் முதலியவற்றை இது கெடுக்கும். வீசாலத்தில் இதையிட்டால் இரசம் சோஷிக்கப்பட்டு மோசமாய் முடியக்கூடுமாய்கையால் அப்படி இடல் புத்தியல்ல.

தேயம். கிறேனிற் பதினாறிலொரு பங்கு முதல் எட்டிலொருபங்கு வரைக்குக் கரைத்து நாள் முன்றுமுறை கொடுக்கலாம். வெளிமருந்தாய் இவ்வெதற்கு ஒரு அன்சு திஸ்திலித்த தண்ணீருக்கு அரைக் கிறேன் முதல் இரண்டு முன்று கிறேன் வரைக்குக் கரைத்துக்கொள்ளலாம்.

[இந்துக்கள் இரசமருந்துகள் சிலவற்றை அறிந்து அவற்றை நோய்களுக்கு அதிகமாய் வழங்குகிறார்கள். அவர்கள் வழங்குஞ் சரக்குகள் அவர்கள் பரும்படியாய்ச் செய்துகொண்ட அசுத்த குலோறிரங்களே. அவைகளுள் இரசபஸ்பம் சவ்வீரம் என்ற இரண்டை ஒஷானசி பண்டிதர் சோதித்து அவைகளுள் இரசபஸ்பத்தை அதகுலோறிரம்²⁰ என்றும் சவ்வீரத்தைப் பிரகுலோறிரம்²¹ என்றுங் கண்டார். அவை மோசமானவைகள். மெத்த அழற்றியானவைகளென்று ஆராய்வால் விளங்குகின்றது. அவற்றை நோய்க்கு கொடுக்கப்படாது. இந்துக்களுக்குள் வழங்கும் இரச மருந்துகளைப்பற்றி ஏன்ஸ்லி பதார்த்தசாரம் என்ற நூலிற் காணலாம்.

ரசிதங்கள். இரசபிரகுலோறிர நீர். Solution of Perchloride of Mercury. கொள். இரசபிரகுலோறிரம், அமோனதகுலோறிரம்²², வகைக்குப் பத்துக் கிறேன்; திஸ்திலித்ததண்ணீர்²³ அரைநாழி. கரைக்கவும்.

தேயம். முப்பது மினிம் முதல் ஒரு திரும் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். இதிலொரு அன்சிலே இரசபிரகுலோறிரம் அரைக்கிறேன் இருக்கும்.

¹ Prism, ² Crystal. ³ Alcohol. ⁴ Ether. ⁵ Caustic potash. ⁶ Ammonia.

⁷ Nitrate of silver. ⁸ Alterative. ⁹ Stimulant. ¹⁰ Syphilis. ¹¹ Epilepsy.

¹² Cynanche, ¹³ Hydrocephalus, கபால நீர்க்கோவை. ¹⁴ Hemeralopia,

¹⁵ Gonorrhoea. ¹⁶ Gleet. ¹⁷ Leucorrhoea. ¹⁸ Collyrium.

¹⁹ Lotion. ²⁰ Subchloride. ²¹ Perchloride. ²² Chloride of Ammonium. ²³ Distilled water.

இரசபீதலோஷன். Yellow Mercurial Lotion. கொள். இரசபிர
குலோதிரம், பதினெட்டுக் கிரேன்; சுண்ணாம்பு¹ பத்து அன்சு. கல.
சிவ்லு² நோய்கள் பலவற்றுக்கு இது நல்ல இடுமருந்து.

இரசவமோனகம்.

AMMONIATED MERCURY.

இது நீ ஐ³ ரு என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்படும். சவ்வீரத்தைக்³ கரை
த்து அத்லே அமோனத்தை⁴ விட இரசவமோனகம் உண்டாகும். லட்சண
ங்கள். இது மங்கலான வெள்ளைத்தான். தண்ணீராவது, அலக்கால்⁵, ஈதர்⁶
களாவது இதிற் சேஷ்டிக்கமாட்டா. சோதனைகள். காரப்பதாசி⁷ நீரில் இ
தைக் கரைத்து மென்குடுகாட்ட, அமோனத்தைக் கக்கி வெண்மஞ்சள்நிற
மடையும். அந்த நீரை வடித்து நீதுரிக்கமிலத்தாற்⁸ புளிப்பாக்கி வெள்ளி
நீதுரசைக்⁹ கடட்ட வோர்வெண்ணடையலுண்டாகும். தகரகுலோதிர¹⁰ நீரோ
டு இதைக் காய்ச்சினால், இரசமணிகள் குலைந்துபோவதால் நரைநிறமாகு
ம். செஞ்சூட்டுக்குக் குறைந்த சூட்டில் முற்றாய் ஆவியாகும்.

தன்மை, உபயோகம். இது ஸ்திமுலம்¹¹. இது அன்கெனாய்ப் பூச்சுக்கு
மாத்திரம் வழங்கும். பெருந்தேயத்தில் நஞ்சாகும்.

ரூபம். இரசவமோனகவன்கென். Ointment of Ammoniated
Mercury. கொள். இரசவமோனகம் அறுபத்திரண்டு கிரேன்; தமிழன்
கென்¹², ஒரு அன்சு. திறமாய்ச் சேர்க்கவும்.

நாட்பட்ட சருமநோய்கள் கண்மடற் தாபிதம்¹³ காலிககஞ்சந்திவீது¹⁴ என்
ற கண்ணோய் முதலியவற்றுக்கு இடுவதற்கு நல்லது. பேன் முதலியவற்
றைக் கொல்லவும் உதவும்.

இரசபச்சையியோதிரம்.

GREEN IODIDE OF MERCURY.

இதற்குச் சின்னம் ஈ¹⁵ இ¹⁶. இரசம் இயோதம் இரண்டையும் கல்லுரவி
விட்டுத் திட்டசீது¹⁷ கடட்டி இரசமணிகள் தோன்றாமற் கலவை பச்சைநிற
மாகுந்தனையும் அரைக்க இரசபச்சையியோதிர முண்டாகும். இதை வடி
தாளிற் பரவி இருட்டறையிலே பரமானுவில் உலர்த்தி மங்கலான சீசாவி
ற் பேணவும். லட்சணங்கள். இது மங்கற் பச்சை நிறமான தூள்; தண்
ணீரிற் கரையாது; வெளிச்சப்பட்டால் நிறம் கதிக்கும். சோதனைகள்.
ஓர் சோதனைக் குழலிலிட்டுப் படிப்படியாய்ச் சூடேற்றினால் அதிலோர்ப் ப
கு ஆவியாயெழும்பி மஞ்சட் தூளாகப் பிடிக்கும். இதை உரைஞ்சச் சி
வப்பாகும். இரசமணிகள் சோதனைக்குழலின் அடியில் அடையும். செ
ஞ்சூட்டுக்குக் குறைந்த சூட்டில் முற்றாய் ஆவியாகும். ஈதரோடு குழல்
விட்டுக் குலுக்கினால் ஒன்றுங் கரையாது.

தன்மை. அல்திறவம்¹⁶, ஸ்திமுலம்; பெருந்தேயத்தில் அழற்று நஞ்சு.

உபயோகம். ஸ்துரும¹⁷ தேகிகளுக்கெண்டாகும் ஆதிம¹⁸ உப¹⁹ சிவ்லுசுக்கு
இது உத்தமமருந்து. மேலும் குஷ்டம்²⁰, சொரியசி²¹, மற்றுக் தொல்லையான

1 Lime water. 2 Syphilis. 3 Corrosive sublimate. 4 Ammonia. 5 Alcohol.

6 Ether. 7 Caustic potash. 8 Nitric acid. 9 Nitrate of silver. 10 Chloride

of tin. 11 Stimulant. 12 Simple ointment. 13 Ophthalmia tarsi.

14 Chronic conjunctivitis. 15 Rectified spirit. 16 Alterative.

17 Struma. 18 Primary. 19 Secondary. 20 Lepra. 21 Psoriasis.

சரும நோய்களுக்கும் துறல்சி¹, ஈரலின் காலிக நோய்களுக்கும் இது கொடுத்து நயந்தது.

தேயநீ. ஒரு கிறேன் முதல் மூன்று கிறேன் வரைக்குக் குளிகையாக்கிக் கொடுக்கவும். அன்கெனுக்கு, ஒரு அன்சு தமிழன்கெனுக்குப் பதினைந்து கிறேன் முதல் இருபது கிறேன் வீதமாய்ச் சேர்க்கலாம்.

இரசசெவ்வியோதிர்.

RED IODIDE OF MERCURY.

இதற்குச் சின்னம் RI_2 . சவ்வீரத்தைப் பதாசியவியோதிரத்தாற்³ கூறு படுத்தி இது எடுக்கப்படும். லட்சணங்கள். இது சாதிலிங்க நிறமான கிரிஸ்தல் மா. இதைக் கடுதாசித்தாளில் இட்டு விளக்கின்மேற் பிடித்து மென்குடுகாட்ட மஞ்சள்நிறமாகும். தண்ணீரில் அரிதாய்க் கரையும். அலக்காலிற்³ சொற்பமாய்க் கரையும். ஈதரிலும்⁴ பதாசியவியோதிரங் கரைத்தநீரிலும் தாராளமாய்க் கரையும். சோதனைகள். சோட்⁵நீரோடு இதை மென்குட்டிற் காய்ச்ச, செங்கபிலநிறமடையும். அந்த நீரைக் கடுதாசியில் வடித்துத் தெளித்து அமைல⁶நீரோடு கலந்து, நீதுரிக்கமிலத்தை⁷ கூட்டிப் புளிப்பாக்க, ஓர் நீலநிறமான அடையலுண்டாகும். செஞ்சூட்டுக்குக் குறைந்த சூட்டில் முற்றாய் ஆவியாகும், ஈதரில் முற்றாய்க் கரையும்.

தன்மை, உபயோகம். இரச பச்சை இயோதிரத்தைப் போலவே. ஆயினும் அதைப்பார்க்க இது வீரானது. சவ்வீரத்தைக் கிட்டினது. வெளிமருந்தாயிட்டால் புறங்குசில்⁸, பிளிகைவீக்கம், எலிபந்தியசி⁹வீக்கங்களை வற்றப்பண்ணுவதற்கு உவந்தது.

தேயநீ. கிறேனிற் பதினாறிலொருபங்கிற்றொடங்கிப் படிப்படியாய்க் கூட்டிக் காற்கிறேன் வரைக்கும் குளிகையாக்கியாவது, அலக்காலிற் கரைத்தாவது கொடுக்கலாம்.

ரசிதம். இரசசெவ்வியோதிரவன்கென். Ointment of Red Iodide of Mercury. கொள். இரசசெவ்வியோதிர், மாவாக, பதினாறு கிறேன்; தமிழன்கென்¹⁰ ஒரு அன்சு. திறமாய்க் கல.

கோளவீக்கங்கள், கழலைகள், புறங்குசில், காலிக சரும நோய்களுக்கு இது நல்ல ஸ்திமுல¹¹ தைலம்.

இரசநீதுரசமிலநீர்.

ACID SOLUTION OF NITRATE OF MERCURY.

இது, இரசம் நீதுரிக்கமிலத்திற் கரைந்துண்டாகும் நீர். லட்சணங்கள். கிறமற்றது; மெத்தப் புளிப்புள்ளது; அமிலத்தைத் தடஸ்திப்பதற்கு அதிகமாய்ப் பதாசிரீரை¹² இதற்குக் கூட்ட மஞ்சள்நிற அடையலுண்டாகும். ஒரு துண்டு அன்னபேதியை இதற்குள்ளே போட்டாற் கொஞ்சநேரத்தாவ் அந்த உப்பும் அதினருகிலுள்ள நீருங் கருமையாகும். சோதனைகள்.

¹ Neuralgia. ² Iodide of potassium. ³ Alcohol. ⁴ Ether. ⁵ Soda. ⁶ Amylum

⁷ Nitric acid. ⁸ Bronchocele, வீண்பம். ⁹ Elephantiasis. ¹⁰ Simple ointment.

¹¹ Stimulant. ¹² Liquor potash.

விசேஷகிருவிதம் 2.246. இருமடங்கு தண்ணீர் கலந்த ஐருகுலோறிக்கமி லத்துச்1குள்ளே இதிற் சொற்பத்தை விட்டால் யர்தொரு அடையலுமுண்டாகாது.

தன்மை. இது வீரன காரம், தகனி. உள்ளே யொருபோதங் கொடுப்பதில்லை.

உபயோகம். கன்சர்ப் புண்கள், உக்கிர புண்களுக்கும் தொல்லையான சருமநோய்கள் சிலவற்றுக்கும் இது இட்டு நயந்தது. என்றாலும் வழக்கமான நோய்களுக்கு இது மெத்த வீரனது.

ரசிதம். இரசநீதுரசன்கென். Ointment of Nitrate of Mercury. கொள். இரசம் நிறைப்படி ஓலு அன்சு; நீதுரிக்கமில்ம், பன்னிரண்டு அன்சு; பூதலாடு பதினைந்து அன்சு; ஒலீவுதேல்³, முப்பத்திரண்டு அன்சு. இரசத்தை நீதுரிக்கமில்த்தில் மென்குட்டில் உருக்கி, லாட்டை எண்ணெய்யோடு ஆறு மடங்கு கொள்ளத்தக்க பீங்கான் பாத்திரத்திலிட்டு நீர்மத்தியிலாவது ஸ்தீம்மத்தியிலாவது உருக்கி அக்ஷலவை சூடாயிருக்கையில் இரசக்கலவையைச் சூடாய்க் கூட்டித் திறமாய்க் கலக்கவும். கலவை நுரைத்துப் பொங்காவிட்டால் பொங்குந்தனையும் சூடேற்றவும். ஆறியிறகுந்தனையும் அதைக் கலக்கவேண்டும்.

தாபிதம் முதலிய நாட்பட்ட சரும நோய்களுக்கும் கெட்ட மந்தமான அழுகற் புண்களுக்கும் கண்மடலிலுண்டாகும் நோய்களுக்கும் இது மெத்த நயந்த ஸ்திமுலமாகும். பிள்ளைகளுக்கும் நொய்ய தோலுடையவர்களுக்கும் பின் வரும் தன்மையான அன்கென் பெரும்பாலும் உத்தமம்.

இரசநீதுரசத்தண்ணன்கென். Milder ointment of Nitrate of Mercury. கொள். இரசநீதுரசன்கென், ஒரு அன்சு; லாடு ஏழு அன்சு. திறமாய்க் கலக்கவும். வேண்டிய வேளைகளிற் புதிதாய்ச் செய்துகொள்ளவேண்டும்.

வெள்ளி. SILVER.

சின்னம், வெ. அணுப்பாரம் 108.

வெள்ளி ஆகரிகணத்தில் அனேகவிடங்களிலுள்ளது. இது சுயமாயாவது வெள்ளிக்கிளாஞ்சு⁴ என்ற கல்லாய்க் கெந்தகத்தோடு சேர்ந்தாவது குலோறம் முதலியவற்றோடு சேர்ந்தாவது பலவகையாகவே இருக்கும். தனி வெள்ளி தேகத்தில் செயலற்றதுபோலும். இது மினுக்கமான வெள்ளை லோகம். 10.53 என்ற விசேஷகிருவிதம் உடையது. 1873 பாகை சூட்டில் உருகும. இதைக் கரைப்பதற்கு நீதுரிக்கமில்மே பிரதானம்.

பூதவெள்ளி. REFINED SILVER.

இது புடமிட்ட சுத்த வெள்ளியே. சோதனை. இதை நீதுரிக்கமில்த்திற் கரைத்து அமோனத்தை⁵ மிச்சமாய்க் கூட்டினாற் பிறக்கு நீர் கிறமாவது, கலங்கலாவது காட்டாது.

1 Hydrochloric acid. 2 Nitric acid. 3 Olive oil.
4 Silver glance. 5 Ammonia.

வேள்ளிநீதுரசு. காடிக்காரம்.

NITRATE OF SILVER.

இதற் குச் சின்னம், வெந்அ³. பூதவெள்ளியை நீதுரிக்கமிலத்திற் கரைத்து வெள்ளிநீதுரசை எடுப்பார்கள். லட்சணங்கள். இது நிறமற்ற தகடானசரிகோண பிரிசங்க¹ளாகவாவது வெண்மையான திரண்ட கம்பிகளாயாவது இருக்கும். திஸ்திலித்த²தண்ணீரிலும் திட்டசீதிலுங்³ கரையும். இதின் கரைவுக்கு ஐருகுலோறிக்கமிலத்தைக்⁴ கூட்டத் தயிர்போன்ற வெண்ணடையலுண்டாகும். அதிலே வெளிச்சம்பட அது கறுக்கும். அமோனீரிலே⁵அது கரையும். ஒரு சிறுத் துண்டைக் கரியின்மேல் வைத்து ஊதுருழலால் ஊதிக் காய்ச்ச அது உருகிப் படபடென்று வெடித்து மங்கல் வெண்மையான வெள்ளி ஆடையை மாத்திரம் விடும், சோதனைகள். பத்துக் கிறேனை இரண்டு திரும் திஸ்திலித்த தண்ணீர் கரைத்து ஐருகுலோறிக்கமிலத்தைக் கூட்டி உண்டாகும் அடையலைக் கழுவித் திறமாய் உலர்த்தினால் அது 8.44 கிறேன் நிறுக்கும். வடித்த நீரை நீர்மத்திகத்தில் வறட்டினால் சேஷமிராத.

தன்மை. இது தொணிகம்⁶, அந்திஸ்பசி⁷,செரதீவம்⁸, பெருந்தேயத்தில் அழற்றுநஞ்சு. கட்டியாய் மேனியிற் பூசினால் காரமும் தகனியுமாகும். கரைத்துப் பூசினால் ஸ்திமுலமாகும்⁹.

உபயோகம். இம் மருந்தை உள்ளே கொடுத்து நயங்கண்ட வியாதிகளுள், முற்றிய திசந்தெரி¹⁰,தியறீயம்¹¹,குத்துப்புளியேப்பத்தோடு கூடிய குன்மம், வாந்திபேதி, இரைப்பைப் புண், கொரியம்¹²,எபிலெப்சி¹³,குக்கலின் பிற்பாதம்¹⁴, ஸ்பச ஈளை, இஸ்தேரியைப்¹⁵பற்றிய தலையிடி,இரசச் சோர்வு என்பவைகளே பிரதானமானவைகள். வெளிமருந்தாய்ப் பொருத்துநீர்க்கோவை,நாட்பட்ட பொருத்து வீக்கம்,எரிசிப்பிலசு¹⁶,ரதிப்புண்க¹⁷ளுக்கும்,கெட்ட நாற்றமான அழுகுபுண்களுக்கும் இது உத்தம பூச்சு. மேலும், கனுறீயம்¹⁸, கிலீற்று¹⁹,லுகறீயம்²⁰,சலப்பைக் கதார்களுக்கு²¹இது கரைத்துப் புகட்டப்படும். குறுப்பு²², திவ்தீரி²³, அலோனீ²⁴, அக்கரம், உதிரசைனன்கி²⁵, தொல்லையான சருமனோய்களுக்குக் கரைத்துப் பூசப்படும். சலவாசியிலுண்டாகும் ஒடுக்குக்கும் விந்துக்கழிவுக்கும் வைசுரியிற் தழும்புண்டாகாமற் காப்பதற்கும் இது கட்டியாக இடப்படும். பலவகையான கண்ணோய்க்கு இதைத் தண்ணீர் கரைத்து இடுவது நயம். மேலும் விசேதன காயங்கள்²⁶, விஷப்பாம்புகடி, விசர்மிருகக் கடி முதலிய விஷக்காயங்களைக் காடிக்காரக் கட்டியாற் தீர்ப்பாய்க் கருக்கினால் அது மோசம் வராமற் காக்கும்.

தேயம். கிறேனில் ஆறினொரு பங்கு முதல் மூன்றினொரு பங்கு வரைக்கு மெல்லிய மாவாக்கிக் குளிகையாயரைத்துக் கொடுக்கலாம். வெளிமருந்தாய்க் கரைத்து இடுவதற்கு ஒரு அன்சு திஸ்திலித்த தண்ணீருக்கு இரண்டு கிறேன் முதற் பத்துக் கிறேன் வரைக்கும் இன்னுங் கூடவுங் கரைத்துக் கொள்ளலாம்.

1 Prism. 2 Distilled water. 3 Rectified spirit. 4 Hydrochloric acid. 5 Ammonia.
6 Tonic. 7 Antispasmodic. 8 Sedative. 9 Stimulant. 10 Dysentery.
11 Diarrhoea. 12 Chorea. 13 Epilepsy. 14 Spasmodic. 15 Hysteria.
16 Erysipelas. 17 Chancre. 18 Gonorrhoea. 19 Gleet. 20 Leucorrhoea.
21 Catarrh. 22 Croup. 23 Diphtheria. 24 Aphonia.
25 Cynanche. 26 Dissection wound.

வேள்ளியக்சிரம்.

OXIDE OF SILVER.

இதற்குச் சின்னம் Ag_2O . வெள்ளிநீதரசைச் சுண்ணநீராற் கூறுபடுத்த வெள்ளியக்சிரம் பிறக்கும். லட்சணங்கள். இது கபிலநிறமான தூள்; குறைந்த செஞ்சூட்டுக்கு இது அக்சித¹வாயுவைக் கக்கி வெள்ளியாகும். நீதரிக்கமில்த்திலே² இது யாதொரு வாயுவைக் கக்காமற் பூரணமாய்க் கரைந்து வெள்ளிநீதரசின் தன்மையை உடைய நீராகும். சோதனை. 29 கி. தேனைச் சிவக்கக் காய்ச்ச 27 கி. தேன் வெள்ளி மிஞ்சும்.

தன்மை. வெள்ளிநீதரசைப் போலவும்; அதைப்பார்க்க இது செயலிற் தன்மையானது. தோல் நீலம்பாரியாமல் அதிலும் இதை நெடுநாளேக்குக் கொடுக்கலாம். மேலும் இது அந்தெல்மிந்தி.

உபயோகம். குன்மம், கஸ்திறல்³, கஸ்திறுடைன்⁴, பைரோசி⁵. இரைப்பைப் புண், இரத்த வாந்திகளுக்கு இது உபயோகமானது. அசத்துவ⁶ இரத்தப்பெருக்கு, மெனுறியங்களுக்கு⁷ இது கொடுத்து நயந்தது. தானிகமாய்ச் சிவ்விசுப்⁸ புண்கள் மற்றுந் தொல்லையான புண்களுக்கும், சிருங்கைப், புண்பாட்டுக்கும் கண்ணோய் முதலியவற்றுக்கும் இடப்படும்.

தேயம். அரைக்கிதேன் முதல் இரண்டு கிதேன் வரைக்குக் குளிகையாக்கி நாள் இரண்டுமுன்றுமுறை கொடுக்கலாம். வெளிப்பிரயோகத்துக்கு அன்கென்களை ஒரு அன்சு தமிழன்கெனுக்கு இதில் முப்பதுகிதேன் முதல் நூற்பது கிதேன் வரைக்கு வீதமாக்கிச் செய்துகொள்ளலாம்.

1 Oxygen. 2 Nitric acid, 3 Gastralgia. 4 Gastrodyne. 5 Pyrosis. 6 Atonic.
7 Menorrhoea. 8 Syphilis, 9 Cornea.

கெமிஸ்த சோதனையில் வழங்கும் பதார்த்தங்களும் நீர்களும்.

ARTICLES AND SOLUTIONS EMPLOYED IN CHEMICAL TESTING.

அலக்கால்—Alcohol. தமிழ் அலக்கால் 276 ம் பக்கங் காண.

பெஞ்சோல்—Benzol, கா: ஐ: இது சுற்கரித்தாரினின்று எடுக்கப்படுகிற, நிறமற்ற, அத்திரநீர். 0.85 என்ற விசேஷகிராவிதமுடையது.

போறசீக்கமிலம்—Boracic acid, ஐபோஅ: ஐ: அ. சோதனைகள். அலக்காலிற் கரையக்கூடியது. அக்கரைவு பச்சைச் சுவாலெகொண்டு எரியும்.

பாரியதலோறாம்—Chloride of Barium, பாது: 2ஐ: அ.

செம்புப்பத்திரம்—Copper Foil. சுத்த செம்புலோகத்தின் மெல்லிய பிரவையான தகடுகள்.

தங்கம்—Pure gold. லோக அசுத்தங்களில்லாத சுத்தப் பொன்.

சோடவதசல்விசு—Hyposulphite of Soda, சோ: ஐ: கே: அ: 4ஐ: அ. சோதனை. இதில் 24.8 கிரேன், இயோதபருமவிலயனத்தில் 100 கிரேன் எவின் நிறத்தைக் கெடுக்கும்.

இந்திது—Indigo, கா: ஐ: நீ: அ. அவுரிஎன்ற பூண்டினங்களினின்று எடுக்கும் ஓர் நீல வருணம்.

ஐசிங்கிளாசு—Isinglass. 292 ம் பக்கங்காண.

லிற்மஸ்—Litmus. 272 ம் பக்கம் காண.

சுத்த அக்சலிக்கமிலம்—Purified Oxalic acid, ஐ: கா: அ: 4, 2ஐ: அ. கொள். வியாபார அக்சலிக்கமிலம் ஒரு இரூத்தல்; திஸ்திலித்த கொதிவெந்நீர், முப்பது அன்சு. கரைத்துக் கடுதாசியில்வடித்துக் கிரிஸ்த¹லுண்டாகும்படி வைக்கவும். அப்பால் நீரைத் தெளித்தாற்றிக் கிரிஸ்தல்களைக் கண்ணையான செங்கல்லின்மேல் வைத்த வடிதாளிற் பரவிப் பரமானுவில் உலர்த்தவும். சோதனை. 320 பாகைக்கு மேற்பட்ட சூட்டில் முற்றாய்க் கூறுபட்டு ஆவியாகும்.

அமோனவக்சலசு—Oxalate of Ammonia. (நீ: அ: 4): கா: அ: 4: ஐ: அ. கொள். சுத்தமான அக்சலிக்கமிலம், ஒரு அன்சு; திஸ்திலித்த கொதிவெந்நீர், எட்டு அன்சு; அமோனகாபனசு, போதியது. அக்சலிக்கமிலத்தை வெந்நீரிற் கரைத்து, அக் கரைவைக் கொதிசூட்டிற் தடஸ்தித்து அது சூடாயிருக்கையிற் கடுதாசியில் வடித்து ஆறும்போது கிரிஸ்தல்கள் விளையத்தக்கதாய் வைக்கவும்.

ஜிப்சம்—Gypsum. இது சூட்டினாற் தண்ணீர் அகற்றப்பட்ட விளைகண்ணசல்வசு². சின்னம் க: கே: அ: 4 2ஐ: அ.

பிலாடினக் கறுப்பு—Platinum Black. பிலாடினபிரசுலோறிரத்³தைத் தண்ணீரிற் கரைத்து அதற்குச் சோடகாபனசை மிச்சமாயும், சர்க்கரையைச்

¹ Crystal. ² Sulphate of Lime. ³ Perchloride of Platinum.

சொற்பொயுஞ் சேர்த்தக் கருமடையலுண்டாகுந்தனையுங் காய்ச்சி, அந்த அடையலைக் கழுவி உலர்த்திக்கொள்ளவும். இதுவே நுண்ணிய மாவாகிய பிலாடினக் கறுப்பு.

பதாச்சேம்புநுசியசு—Red Prussiate of Potash, ப₆ இரு₂ கா₁₂ நீ₁₂. சோதனை. இதின் நீர்க்கரைவு அயபிரசல்வசுக்கு¹ அடையல்காட்டாது.

நீர்ற்ற சேம்புசல்வசு—Anhydrous Sulphate of Copper. கூகேஅ₄. இது 400 பாகை சூட்டினால் நீரகற்றப்பட்ட துரிசி. லட்சணங்கள். இது மஞ்சள் வெண்மையான தூள்; தண்ணீரால் நனைக்க நீலமாகும்.

அயசல்விரம்—Sulphide of Iron. இருகே. கொல்லனுலையில் வெண்மைகொள்ளும்படி காய்ச்சின இரும்புக்கம்பியின் தலைப்பைக் கெந்தகத் தடியிற் தொட்டு உண்டாகும் அயசல்விரத்தைத் தண்ணீர்ப் பாத்திரத்துட் பாயவிடலாம். அல்லது மூடிய ஓர் குகையிலே 56 பங்கு அரபொடியை 32 பங்கு கெந்தகத்தோடு காய்ச்சி அதை எடுக்கலாம்.

ஐருசல்விரிக்கமில்ம்—Sulphuretted Hydrogen. ஐ₂கே. கொள். அயசல்விரம், அரை அன்சு; தண்ணீர் நாலு அன்சு; சல்விரிக்கமில்ம் போதியது. அயசல்விரத்தையும் தண்ணீரையும் ஓர் வாயுச் சீசாவில் விட்டு அதை இருதுவாரமுள்ள சடையால் அடைத்து அத்துவாரங்களுள் ஒன்றின்வழியாய், வாயுப்புகமாட்டாத போதிய நீளமுள்ள வோர் புனலைத் தண்ணீருள் தொடும்படி செலுத்தி மற்றதின் வழியாய் வாயு வெளிப்படுவதற்கு ஓர் குழலைச் செலுத்தவும். வேண்டியபடி ஐருசல்விரிக்கமில்முண்டாவதற்குச்சல்விரிக்கமில்த்தைப் புனல்வழியாய் அடிக்கடி கொஞ்சங் கொஞ்சமாய் விடவும்.

கிறனுலத்தகரம்—Granulated Tin. தகரத்தை உருக்கித் தண்ணீருக்குள்ளே வார்க்க அது சிறத்துண்டுகளாகிய மணிகளாய் வரும். இதுவே கிறனுலத்தகரம்.

மஞ்சள்—Turmeric. 243 ம் பக்கங் காண.

பதாச்சீதபுநுசியசு—Yellow Prussiate of Potash. ப₄இருகா₆நீ₃ஐ₃அ₄. சோதனைகள். இதின் நீர்க்கரைவுக்கு அயபிரசல்வசைக் கூட்டக் கருநீல அடையலுண்டாகும்; அதற்குச் செம்புசல்வசைக் கூட்ட, செங்கற்சிவப்பு நிற அடையலுண்டாகும்; ஈயவசுதசைக் கூட்ட வெண்ணடையலுண்டாகும்.

சோதனைகீர்கள். TEST SOLUTIONS.

சேம்பசிதகநீர்—Solution of Acetate of Copper. கொள். வியாபாரச் செம்பதவசிதசு, மாவாக, அரை அன்சு; அசிதிக்கமில்ம் ஒரு அன்சு; திஸ்திலித்த தண்ணீர் போதியது. அமிலத்துக்கு தண்ணீரில் அரை அன்சைக் கூட்டி யக்கலவைநீரைக் காய்ச்சி 212 பாகைக்கு மேற்படாத சூட்டிலே செம்பதவசிதசைக் கரைத்து இடைக்கிடை கலக்கி, உலர்சேஷமுண்டாகுந்தனையுங் காய்ச்சவும். இச்சேஷத்தை நாலுமடங்கு திஸ்திலித்த கொதிவெந்நீரில் கரைத்து, வெந்நீரிலே இன்னுங் கூட்டி, அந்த நீரை ஐந்து அன்சாக் கிச் கடுதாசியில் வடித்துக்கொள்ளவும்.

பதாசியசிதகநீர்—Solution of Acetate of Potash. கொள். பதாசி

¹ Persulphate of Iron.

யசிடசு, அரை அன்சு; திஸ்திலித்ததண்ணீர் ஐந்து அன்சு. கரைத்துக் கடுதாசியில் வடிக்கவும்.

சோடவசிடசுநீர்—Solution of Acetate of Soda, கொள். சோடவசிடசு, அரை அன்சு; திஸ்திலித்த தண்ணீர், ஐந்து அன்சு. கரைத்துக் கடுதாசியில் வடிக்கவும்.

அல்புமின்நீர். Solution of Albumen. 294 ம் பக்கங் காண.

வெள்ளியமோனநீதுரசுநீர்—Solution of Ammonio-nitrate of Silver. கொள். வெள்ளிநீதுரசு¹, கிரிஸ்தல்களாக, கால் அன்சு; அமோனநீர்² அரை அன்சு அல்லது போதியது; திஸ்திலித்த தண்ணீர்³, போதியது. வெள்ளிநீதுரசை எட்டு அன்சு தண்ணீரிற் கரைத்து, அகிலே முதலுண்டாகுமடையல் ஏறக்குறைய முற்றாய்க் கரையுந்தனையும் அமோனநீரைக் கூட்டிச் கடுதாசியில் வடிக்கவும். அப்பால் திஸ்திலித்த தண்ணீரைக் கூட்டி அளவைப் பத்து அன்சாக்கிக் கொள்ளவும்.

செம்பமோனசல்வசுநீர்—Solution of Ammonio-sulphate of Copper. கொள். செம்புசல்வசு⁴, கிரிஸ்தல்களாக, அரை அன்சு; அமோனநீர் போதியது; திஸ்திலித்ததண்ணீர் போதியது. செம்புசல்வசை எட்டு அன்சு தண்ணீரிற் கரைத்து, அகிலே முதலுண்டாகு மடையல் ஏறக்குறையக் கரையுந்தனையும் அதற்கு அமோனநீரைக் கூட்டிக் கடுதாசியில் வடித்து, திஸ்திலித்த நீரைக் கூட்டி அளவைப் பத்து அன்சாக்கிக் கொள்ளவும்.

மக்னீசியமோனசல்வசுநீர்—Solution of Ammonio-Sulphate of Magnesia. கொள். மக்னீசியசல்வசு⁵, ஒரு அன்சு; அமோனதகுலோறிரம்⁶, அரை அன்சு; அமோனநீர் அரை அன்சு; திஸ்திலித்த தண்ணீர் போதியது. மக்னீசியசல்வசையும் அமோனதகுலோறிரத்தையும் எட்டு அன்சு தண்ணீரிற் கரைத்து, நீரினான பத்து அன்சாய் வரத்தக்கதாய் அமோனநீரையும் போதிய திஸ்திலித்த தண்ணீரையுங் கூட்டித் தேவையாகிற் கடுதாசியில் வடித்துக் கொள்ளவும்.

போறசிக்கமிலநீர்—Solution of Boracic acid. கொள். போறசிக்கமிலம், ஐம்பதுகிறேன்; திட்டசீது ஒரு அன்சு. கரைத்துக் கடுதாசியில் வடிக்கவும்.

புரோமநீர்—Solution of Bromine. கொள். புரோமம், பத்தமினிர்; திஸ்திலித்ததண்ணீர். ஐந்து அன்சு. சரியான அடைப்புள்ளவோர் சீசாவக் குள்ளே புரோமத்தை விட்டு, அதன்மேற் தண்ணீரை வார்த்துப் பலமுறை குலுக்கவும். வெளிச்சம் படாதபடி வைக்கவும்.

அமோனகாபனசுநீர்—Solution of Carbonate of Ammonia. கொள். அமோனகாபனசு. சிறத்துண்டுகளாக, அரை அன்சு; திஸ்திலித்த தண்ணீர் பத்து அன்சு. கரைத்துக் கடுதாசியில் வடிக்கவும்.

அமோனதகுலோறிரநீர்—Solution of Chloride of Ammonium. கொள். அமோனதகுலோறிரம், ஒரு அன்சு; திஸ்திலித்த தண்ணீர், பத்து அன்சு. கரைத்துக் கடுதாசியில் வடிக்கவும்.

பாரியதகுலோறிரநீர்—Solution of Chloride of Barium. கொள். பாரியதகுலோறிரம், கிரிஸ்தல்களாக, ஒரு அன்சு; திஸ்திலித்த தண்ணீர் பத்து அன்சு. கரைத்துக் கடுதாசியில் வடிக்கவும்.

1 Nitrate of silver. 2 Solution of ammonia. 3 Distilled water 4 Sulphate of copper. 5 Sulphate of magnesia. 6 Chloride of ammonium.

கல்சீதுலோறிரநீர்—Solution of Chloride of Calcium. கொள். கல்சீதுலோறிரம், ஒரு அன்சு; திஸ்திலித்த தண்ணீர் பத்து அன்சு. கரைத்துக் கடுதாசியில் வடிக்கவும்.

கல்சீதுலோறிரபூர்த்தநீர்—Saturated Solution of Chloride of Calcium. கொள். கல்சீதுலோறிரம், நாலு அன்சு; திஸ்திலித்த தண்ணீர், ஐந்து அன்சு. கரைத்துக் கடுதாசியில் வடிக்கவும்.

பொற்பிரதலோறிரநீர்—Solution of Per chloride of Gold. கொள். மெல்லிய சுத்தப்பொற்பத்திரம், அறுபதுகிறேன்; நீதுரிக்கமில்¹, ஒன்றரை அன்சு; ஐருகுலோறிக்கமில்², ஏழு அன்சு; திஸ்திலித்ததண்ணீர், போதியது; நீதுரிக்கமில்லத்தையும் ஐருகுலோறிக்கமில்லத்தில் ஆறு அன்சையும் நாலு அன்சு தண்ணீரோடு கலந்து ஓர் குடுக்கைக்குளிட்டு அதிலே பொற் பத்திரத்தைப் போட்டுக் கரையவிடவும். அக்கரைவுக்குச் சேஷமான ஒரு அன்சு ஐருகுலோறிக்கமில்லத்தையுங் கூட்டி, அமிலஆவிபறிவதொழியுந்தனையும் 212 பாகைக்கு மேற்படாத சூட்டில் உலர்த்தி வரும்பொற்குலோறிரத்தை ஐந்து அன்சு திஸ்திலித்த தண்ணீரில் கரைக்கவும். இந்த நீரை நன்றாயடைத்த சீசாவில் பேணவேண்டும்.

தகரபுரதலோறிரநீர்—Solution of Protochloride of Tin. கொள். தகரம், தூளாக ஒரு அன்சு; ஐருகுலோறிக்கமில், மூன்று அன்சு; திஸ்திலித்த தண்ணீர் போதியது. அமிலத்தை ஒரு அன்சு தண்ணீரோடு ஒரு குடுக்கைக்குள் விட்டு அதோடு தகரத்தைச் சேர்த்து, ஆவி கக்குதலொழியுந்தனையும் மென்குடேற்றவும். அளவை ஐந்து அன்சாக்கப் போதிய தண்ணீரை அத்தோடு கூட்டி அந்த நீரையுங் கரையாத தகரத்தையும் இறுக்கமான அடைப்புள்ள சீசாவில் வார்த்துவைக்கவும்.

ஜெலதீன்நீர்—Solution of Gelatine. கொள். ஐசிங்கிளாசு³, செதில் களாக ஐம்பதுகிறேன்; திஸ்திலித்த கொதிநீர், ஐந்து அன்சு. கலந்து நீர்மத் திகத்தில் வைத்து அடிக்கடி கலக்கி அரைமணிநேரமாகக் கரைத்து திஸ்திலித்ததண்ணீரால் நனைத்த சுத்தமான சணற்பஞ்சில் வடிக்கவும்.

பதாசியோதசுநீர்—Solution of Iodate of Potash. கொள். இயோதம், ஐம்பதுகிறேன்; பதாசிகுரோசு, ஐம்பதுகிறேன்; நீதுரிக்கமில் எண்பது மினிம்; திஸ்திலித்ததண்ணீர் பத்தரை அன்சு. இயோதத்தையும் பதாசிகுலோறசையும் மாவாக அரைத்து, அக்கலவையை யோர் குடுக்கைக்குள்ளே போட்டு அதின்மேலே நீதுரிக்கமில்லத்தாற் புளிப்பாக்கப்படாத அரை அன்சு தண்ணீரை வார்த்து, இயோதத்தின் நிறமற்றுப்போருந்தனையும் மென்குட்டிற் கரைக்கவும். அதை ஒருமினி வரைக்குக் கொதிப்பித்து ஓர் குடையில் வார்த்து 212 பாகை சூட்டிற் பூரணமாயுலர்த்தவும். கடைசியாய்ச் சேஷத்தைப் பத்த அன்சு திஸ்திலித்த தண்ணீரில் கரைத்துக் கடுதாசியில் வடித்து சீசாவில்விட்டு நன்றாயடைத்துப் பேணவும்.

பதாசியவியோதிரநீர்—Solution of Iodide of Potassium. கொள். பதாசியவியோதிரம், ஒரு அன்சு; திஸ்திலித்த தண்ணீர் பத்து அன்சு. கரைத்துக் கடுதாசியில் வடிக்கவும்.

அமோனவக்சலசுநீர்—Solution of Oxalate of Ammonia. கொள். அமோனவக்சலசு, அரை அன்சு; திஸ்திலித்த வெந்நீர், அரைநாழி. கலந்து கடுதாசியில் வடிக்கவும்.

1 Nitric acid, 2 Hydrochloric acid. 3 Isinglass. 4 Water bath.

புலாடினபிரதலோறிரநீர்—Solution of Perchloride of Platinum. கொள். மெல்லிய பிலாடினத்தகடு கால் அன்சு; நீத ரிக்கமிலம்¹, போதியது; ஐருகுலோறிக்கமிலம்², போதியது; திஸ்திலித்த தண்ணீர், ஏழுஅன்சு. ஒரு அன்சு நீதாரிக்கமிலத்தை நாலுஅன்சு ஐருகுலோறிக்கமிலத்தோடும் இரண்டு அன்சு தண்ணீரோடுங் கலந்து அக்கலவையைப் பிலாடினத்தோடு ஓர் சிறுக் குடுக்கைக்குள்ளிட்டு மெனசூட்டிற் கரைத்து, தேவையாகில் அமிலங்களை மேற்படி வீதமாகக் கலந்து பிலாடினங் கரையுந்தனையும் விட்டு அப்பால் அக்கரைவை ஓர் பீங்கான் பாத்தரத்தில் விட்டு அசற்கு ஐருகுலோறிக்கமிலத்தில் ஒரு திராமைக் கூட்டி, அமிலவாவிபறிதலொழியுந்தனையும் நீர்த்திகத்தில் வறட்டவும். வறும்சேஷத்தை மிச்சமான ஐந்துஅன்சு திஸ்திலித்த தண்ணீரிற் கரைத்துக் கடுதாசியில்வடித்துச் சீசாவிலடைத்துவைக்கவும்.

சோடபாஸ்வசுநீர்—Solution of Phosphate of soda. கொள். சோடபாஸ்வசு கிரிஸ்தல்களாக, ஒருஅன்சு; திஸ்திலித்த தண்ணீர் பத்துஅன்சு. கரைத்துக் கடுதாசியில் வடிக்கவும்.

பதாசீசெம்புருசியசுநீர்—Solution of Red Prussiate of Potash. கொள். பதாசீசெம்புருசியசு, கிரிஸ்தல்களாக கால் அன்சு; திஸ்திலித்த தண்ணீர், ஐந்து அன்சு. கரைத்துக் கடுதாசியில் வடிக்கவும்.

இந்திசுல்வசுநீர்—Solution of Sulphate of Indigo. கொள். காய்ந்த இந்திசு, மாவாக, ஐந்துகிறேன்; சல்வுரிக் கமிலம்³, பத்துஅன்சு. இந்திசு மாவைச் சல்வுரிக் கமிலத்தில் ஒருதிராமோடு ஓர் சிறிய சோதனைக் குழலிற் கலந்து, நீர்மத்திகத்தின்⁴ சூட்டை ஒருமணிநேரமாக ஏற்றி, அந்த நீலநிற நீரை மிச்சமான அமிலத்துக்குள்ளே வார்த்துக் குலுக்கி, கரையாத இந்திசு அடைந்தபின் தெளிந்த நீரை இறுத்துச் சீசாவிலடைத்துவைக்கவும்.

அயசல்வசுநீர்—Solution of Sulphate of Iron. கொள். கிறனுல அயசல்வசு, பத்துக் கிறேன்; திஸ்திலித்த கொதிநீர் ஒரு அன்சு. கரைத்துக் கடுதாசியில் வடிக்கவும். இந்த நீரை வேண்டிய வேளைகளிற் புதிதாய்ச் செய்யுகொள்ளவேண்டும்.

சுண்ணசல்வசுநீர்—Solution of Sulphate of Lime. கொள். சுண்ணசல்வசு, கால் அன்சு; திஸ்திலித்த தண்ணீர், அரைநாழி. சுண்ணசல்வசைப் பீங்கானுரவிலே இரண்டு அன்சு தண்ணீரோடு இட்டுச் சில மினி நேரமாக அரைத்து அக் கலவையை மிச்சமான தண்ணீரோடு, அரைநாழி கொள்ளத்தக்கவோர் சீசாவுக்குள் விட்டு பலமுறை திறமாய்க் குலுக்கிக் கரையாத சுண்ணசல்வசு அடையத்தக்கதாய் வைக்கவும். அடைந்தபின் கடுதாசியில் வடிக்கவும்.

அமோனதசல்விநீர்—Solution of Sulphide of Ammonium. கொள். அமோனநீர்⁵, ஐந்து அன்சு. அமோன நீரில் மூன்றுஅன்சை யொர் சீசாவுக்குள்ளிட்டு அதற்குள்ளே ஐருசல்வுரிக் கமில வாயுவை⁶ அது உறிஞ்சப்படுந்தனையுந் தாரை தாரையாய்ச் செல்லவிட்டு அப்பால் மிச்சமான அமோன நீரைக் கூட்டி அந்த நீர் முழுவதையும் இறுக்கமான அடைப்புள்ள சீசாவில் விட்டு வைக்கவும்.

தாத்தரிக்கமிலநீர்—Solution of Tartaric acid. கொள். தாத்தரிக்

1 Nitric acid. 2 Hydrochloric acid. 3 Sulphuric acid. 4 Water bath.

5 Solution of ammonia. 6 Hydro sulphuric acid gas.

கமிலம், கிரிஸ்தல்களாக ஒரு அன்சு; திஸ்திலித்த தண்ணீர் எட்டு அன்சு; திட்டிதூ1 இரண்டு அன்சு. தாத்தரிக்கமிலத்தைத் தண்ணீரிற் கரைத்துத் திட்டிதைக் கூட்டி அந்நீரை நன்றாயடைத்த சீசாவில் விட்டுவைக்கவும்.

பதாசிபீதபுருசியசுநீர்—Solution of Yellow Prussiate of Potash. கொள். பதாசிபீதபுருசியசு, கிரிஸ்தல்களாக, கால்அன்சு. திஸ்திலித்த தண்ணீர் ஐந்து அன்சு. கரைத்துக் கடுதாசியில் வடிக்கவும்.

பருமமதிப்புக்குச் சோதனைநீர்கள்.

TEST SOLUTIONS FOR VOLUMETRIC ESTIMATIONS.

பிறித்தனி நிறைகள் அளவைகளைக்கொண்டாவது மெற்று²நிறைகள் அளவைகளைக்கொண்டாவது பரும மதிப்புகளை அறியலாம். விலயனங்களாகிய நீர்கள் ஒரே பெலனாயிருக்கத்தக்கதாகவும் எந்த நிறை அளவுகளை வழங்கினாலும் சோதிக்கப்படும் பதார்த்தங்களின் பிரமாணங்களைக் குறிக்குமில்லக்கங்களையாவது சோதனைக்கு வேண்டிய நீர்களைக்குறிக்குமில்லக்கங்களையாவது மாற்றவேண்டியதாய் வராதபடிக்கும் அந்த நீர்கள் ஒழுங்குபண்ணப்பட்டிருக்கின்றன.

பிறித்தனி வகையாய்ச் சோதிக்கப்படும் பதார்த்தங்களின் பிரமாணங்கள் கிறேன் என்ற படியாற் குறிக்கப்படும். சோதனைக்கு வழங்குநீர்களின் பிரமாணமோ கிறேனாவாற் குறிக்கப்படும். கிறேனாவென்பது திஸ்திலித்த தண்ணீரில் ஒருகிறேனதை பருமையேயாகும்.

மெற்றுவகையின்படி சோதிக்கப்படும் பதார்த்தங்களின் பிரமாணங்கள் கிறும்³ என்றபடியாற் குறிக்கப்படும். சோதனையில் வழங்கு நீர்களின் பிரமாணமோ, கனசெந்திமெற்று⁴ என்ற அளவாற் குறிக்கப்படும். கனசெந்திமெற்று என்பது திஸ்திலித்த தண்ணீரில் ஒருகிறுமது பருமையேயாகும்.

கிறேனாவக்கும் கிறேனுக்குமுள்ள சேர்மானமே கனசெந்திமெற்றுக்கும் கிறுமுக்குமிருப்பதால் ஒரு நிறையளவு வகைக்குப் பதிலாக மற்றதை வழங்கலாம். பிறித்தனிநிறையிலுள்ள கிறேனைப்பார்க்க கிறும் ஏறக்குறையப் பதினைந்தரை மடங்கு அதிகமானதாயிருப்பது மாத்திரமே வித்தியாசம்.

பிறித்தனி நிறையளவுக்குப் பதிலாக மெற்றுகிறையளவுகளை வழங்குவதில், தசமபுள்ளிகளை அரக்கி இலக்கங்களின் விலையைப் பத்திலொன்றாக்கிக் கொள்வது வசதியென்று பரீட்சையிற் காணப்படும்.

சோதனைநீர்களைச் செய்து வழங்குவதற்குப் பின்வருமணியங்கள்தேவை.

பிறித்தனிநிறையளவுகளுக்கு வேண்டியவை.

1. கழுந்திலோர்வரிமட்டுக்கு நிரப்பினால் 60 பாகை சூடான திஸ்திலித்த தண்ணீரிற் சரியாய் 10,000 கிறேன் கொள்ளத்தக்கவோர் குடுக்கை⁵. ஆசையால் இக்குடுக்கையின் கொள்ளளவு 10,000 கிறேனாவாகும்.

2. பாகையிட்ட திரண்ட சாடி. அதை 0 என்ற வரிமட்டும் திஸ்திலித்த தண்ணீரால் நிரப்பினால் 10,000 கிறேன்கொள்ளும். அது 100 சமபங்குகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும்.

3. பாகையிட்ட கண்ணாடிக்குழல். அதை 0 என்ற வரிமட்டும் திஸ்திலித்த தண்ணீரால் நிரப்பினால் அது 1,000 கிறேனைக்கொள்ளும். அது

Rectified spirit 2 Metre. 3 Gramme. 4 Cubic centimetre. 5 Flask.

100 சமபங்குகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். ஒவ்வொருபங்கும் 10 கிறேனளவுக்குச் சரியாகும்.

மெற்றுநிறையளவுகளுக்கு வேண்டியவை.

1. கழுந்திலோர்வரிமட்டுக்கு நிரப்பினால் 1000 கனசெந்திமெற்று, கொள்ளத்தக்கவோர் கண்ணாடிக்குக்கை.

2. பாகையிட்ட திரண்ட சாடி. அதை 0 என்ற மட்டத்துக்கு நிரப்பினால் 1000 கனசெந்திமெற்றுக் கொள்ளும். அது 100 சமபங்குகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும்.

3. பாகையிட்ட குழல். அதை 1 என்ற மட்டத்துக்கு நிரப்பினால் 100 கனசெந்திமெற்றுக் கொள்ளும். 100 சமபங்குகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும்.

(ஒரு கனசெந்திமெற்று, என்பது பாரனைப்படி 60 பாகையான திஸ்திலித்த தண்ணீரில் ஒரு கிராம் பருமையேயாகும். 1000 கனசெந்திமெற்று என்பது முக்காலே அரைக்கால் நாழிக்குச்சரி.)

பருமவிலயனங்களை வழங்கமுன் அவை வகத்துக்கொரேசரியான பெலனியிருக்கத்தக்கதாய் அவைகளைக் குலுக்கிக்கொள்ளவேண்டும். அவைகளை நன்றாயடைத்த சீசாக்களிற் பேணவேண்டும். அளவுகளையெல்லாம் 60 பாகையில் அளக்கவேண்டும்.

பதாசிதுவிசுரேமசுப் பருமவிலயனம்—Volumetric Solution of Bichromate of Potash. (பதாசிதுவிசுரேமசு, ப₂ துரே₂ அ₇=295) கொள். பதாசிதுவிசுரேமசு, 147.5 கிறேன்; திஸ்திலித்த தண்ணீர் போதியது. பதாசிதுவிசுரேமசை 10,000 கிறேன் கொள்ளுங் குகிக்கைக்குள்ளே போட்டு, அக்குகிக்கையின் அரைவாசியைத் தண்ணீரால்நிரப்பி அத் உப்பைக் கரையவிட்டு அப்பால் அது சரியாய் 10,000 கிறேனளவு பருமையாகுந்தனையும் தண்ணீரைக் கூட்டவும். இந்த விலயனத்தில் 10,000 கிறேனளவில் பதாசிதுவிசுரேமசு 14.75 கிறேன் இருக்கும்.

சோடவதசல்விசுப்பருமவிலயனம்—Volumetric Solution Hyposulphite of Soda. (சோடவதசல்விசுக்கிரிஸ்தல், சோ₂ ஐ₂ கே₂ அ₄ 4ஐ₂ அ₁=248) கொள். சோடவதசல்விசு, கிரிஸ்தல்களாக, 250 கிறேன், திஸ்திலித்த தண்ணீர் போதியது. சோடவதசல்விசை 10,000 கிறேனளவு தண்ணீரிற் கரைத்துப் பாகையிட்டவோர் குழலே இக் கரைவால் நிரப்பி இயோதபருமவிலயனத்தில் 1000 கிறேனளவின கபிலநிறுங்கெடுத்தனையும் அதற்குள்ளே இக்கரைவைக் கவனமாய் ஒழுக்கிவிடவும். இம் மாறுதலுண்டாவதற்கு வேண்டியதாயிருந்த கிறேனளவின் இலக்கத்தை n என்று குறித்துக் கொள்ளவும். அப்பால் இந்த விலயனத்தில் 8000 கிறேனைப் பாகையிட்ட

வோர் சாடிக்குள்ளே விட்டு இந்த அளவு $\frac{8000 \times 1000}{n}$ என்ற கிறேனள

வாய்வருந்தனையும் அதற்குத் திஸ்திலித்ததண்ணீரைக் கூட்டவும். உதாரணமாய், n என்றது 950 க்குச்சரியானால் 8000 கிறேனளவு $\frac{8000 \times 1000}{950} = 8421$ கிறேனளவாகுந்தனையும் அதற்குத் தண்ணீர் கூட்டவேண்டும்.

இந்த விலயனத்தில் 1000 கிறேனில சோடவதசல்விசு 24.8 கிறேன் இருக்கும். அது 12.7 கிறேன் இயோதத்தைச் சரிக்கடும்.

இயோதபநுமவிலயனம்—Volumetric Solution of Iodine. (இயோதம், $I=127$.) கொள். இயோதம் 127 கிரேன்; பதாசியவியோதிரம் 180 கிரேன்; திஸ்திலித்ததண்ணீர் போதியது பதாசியவியோதிரத்தையும் இயோதத்தையும் 10000 கிரேன்கொள்ளுங் குடுக்கைக்குள்ளிட்டு அக் குடுக்கையில் மூன்றத்கிருபங்கு வரைக்குத் திஸ்திலித்த தண்ணீரால்நிரப்பி சுற்றாய்க் கரையுந்தனையும் மெதுவாய்க் குலுச்சி, அச் கரைவுநீர் சரியாய் 10,000 கிரேனளவாகுந்தனையும் அதற்குத் திஸ்திலித்த தண்ணீரைக் கூட்டவும். இவ்விலயனத்தல் 1000 கிரேனில் 127 கிரேன் இயோதம் இருக்கும்.

வெள்ளீநீதுரசுப்பநுமவிலயனம்—Volumetric Solution of Nitrate of Silver. (வெள்ளீநீதுரசு, வெநீஅ₃=170). கொள். வெள்ளீநீதுரசு 170 கிரேன்; திஸ்திலித்த தண்ணீர் போதியது; வெள்ளீநீதுரசை 10,000 கிரேனளவுகொள்ளுங் குடுக்கைக்குள்ளிட்டு அக் குடுக்கையை அரைவாசிவரைக்குத் தண்ணீரால் நிரப்பி உப்பைச் கரையும்படி விடவும் அப்பால் அந்த நீர் சரியாய் 10 000 கிரேனளவாய் வருந்தனையும் திஸ்திலித்த தண்ணீரைக் கூட்டவும். இந்த விலயனத்தை நன்றாயடைத்த மங்கற்சீசாவில் விட்டு வைக்கவேண்டும். இதில் 10,000 கிரேனளவிலே வெள்ளீநீதுரசு 170 கிரேன் இருக்கும்.

அச்சலிக்கமீலபநுமவிலயனம்—Volumetric Solution of Oxalic acid. (கிரஸ்தலான அச்சலிக்கமிலம், ஐ₂ கா₂ அ₄, 2ஐ₂அ=126.) கொள். தூளாகாமல் கல்லாய்க் காய்ந்த சுத்த அச்சலிக்கமில் கிரிஸ்தல்கள் 630 கிரேன்; திஸ்திலித்த தண்ணீர் போதியது. அச்சலிக்கமில்த்தை 10 000 கிரேன்கொள்ளுங் குடுக்கைக்குட் போட்டு அக் குடுக்கையை மூன்றிலிருபங்கு வரைக்குத் தண்ணீரால் நிரப்பி அமிலத்தைக் கரையவிட்டு நீர் சரியாய் 10,000 கிரேனளவு பருமையாய் வருந்தனையும் அதற்குத் தண்ணீரைக் கூட்டவும். இந்த விலயனம் 1000 கிரேனில் 63 கிரேன் அச்சலிக்கமிலம் இருக்கும்.

சோடபநுமவிலயனம்—Volumetric Solution of Soda. (சோடவைரசு¹, சோஐஅ=40) கொள். சோடநீர் போதியது; திஸ்திலித்த தண்ணீர் போதியது. பாகையிட்ட குழலைச் சோடநீரால் நிரப்பி² கொண்டு சுத்த அச்சலிக்கமில்த்தல் 63 கிரேனை இரண்டு அஞ்சு தண்ணீரிற் கரைத்து அந்த அமிலம் விற்பசுத்² தாளின்படி பூரணமார்த் தடஸ்சிக்குந்தனையும் சோடநீரை அதற்குள்ளே கவனமாய் ஒழுக்கிவிடவும். இப்படிவிட்ட சோடநீரின் கிரேனளவை (n) இலக்கத்தாற் குறித்துக்கொண்டு சோடநீரில் 9000 கிரேனளவைப் பாகையிட்ட சாடிக்குள்ளே விட்டு அது
$$\frac{9000 \times 1000}{n}$$
 கிரே

னளவாய் வருந்தனையும் அதற்குத் தண்ணீரைக் கூட்டவும். உதாரணமாக n என்பது 930 ஐக் குறிக்குமானால் 9000 கிரேனளவு $\frac{9000 \times 1000}{930} = 9677$ கிரேனளவாய் வருந்தனையும் அதற்குத் தண்ணீர் கூட்டவேண்டும்.

இந்த விலயனம் 1000 கிரேனிற் சோடவைரசு 40 கிரேன் இருக்கும்.

¹ Hydrate of soda. ² Litmus.

அனுபந்தம்.

(1), 9 ம் பக்கம். அனீதக்கிழங்கு. *Aconitum Napellus* (சேர்க்குங்காலர்)

அகனீதக் கிழங்கைச் சேர்க்குங் காலத்தைக் குறிப்பது முக்கியமென்பது கெறபதர் நடத்தின சோதனையை அனதுபாரமாய்க்கொண்ட பின்னால் வருங் குறிப்பினால் விளங்கும். மரம் புட்பித்தபின் சேர்த்த பச்சைக்கிழங்கிலே எடுத்த அகனீதசத்தின் எகசகட்டளவு இரத்தலுக்கு 8.55 கிறேன். அக்கிழங்கு காய்ந்தபின் அசில் எடுத்தது 35.72 கிறேன். புட்பிக்கமுன் சேர்த்த கிழங்கிலே எடுத்த அகனீதசம் பச்சைக்கிழங்கிலே இரத்தலுக்கு 3.5 கிறேன்; காய்ந்ததில் 12.13 கிறேன். இதைப்பற்றி வைற் பண்டிதர் சொல்லுகிற தாவது : அகனீதக்கிழங்கு இரண்டு வருஷத்துக்கொருமுறை உண்டாவது; அதாவது இவ்வருஷத்துக்கிழங்கிலிருந்து, மேலேநிற்கும் பூடு உண்டாய்ருப்பது மாத்தாமல்ல பூண்டோடு தாயக்கிழங்கு செத்தபின் அதின் வேலையை மற்றவருஷஞ் செய்வதற்கு அகனின்று இரண்டொருகிளைக் கிழங்கு இறங்கும். கோடைகாலமுடிவிலே கிண்டியெடுத்தால் அதிலே இரண்டுபகுதியிருக்கும்; ஒன்று உரத்துக் கறுத்துச் சற்றே சுருக்கிவிழுந்ததாகிய தாய்க்கிழங்கு; மற்றது வெளுநின சதைத்த, சாறுள்ள கிளைகள். இக் கிளைகள் ஒவ்வொன்றும் ஒடுங்கின கழுந்தாற் தாய்க்கிழங்கோடு தொடுத்திருக்க, மேந்தலைப்போ. மற்ற வருஷப் புது முளை கிளம்புவதற்கிடமாய் அகன்றிருக்கும். இக்காரியங்களைக்கொண்டு இதை முதற் கவனித்த கிரிஸ்திசன் பண்டிதர் எண்ணினபடி. தாய்க்கிழங்கே சத்தை அடக்கியிருக்கிறபகுதியென்றும், கிளைகளிலே மற்ற வருஷப் புது முளைக்கு வேண்டிய போஷணை அடங்கியிருக்கிறதென்றும், அனுமானிக்கலாம். கெறபதர் மேலே சொல்லியிருப்பதை இது விளங்கப்படுத்துகின்றது. தாய்க்கிழங்கிலும் கிளைக் கிழங்கிலுமுள்ள அகனீதசத்தின் வீதத்தை அறிவதற்கு அகனி இரண்டையும் வெவ்வேறாய்ச் சோதிக்கவேண்டும். கோடைகாலத்தல் நிலத்திலே தளிர் அருர்புர்போது பழங்கிழங்கு அற்றப்போம். அப்பருவத்தில் முளை அரும்பமுன் கிழங்கைக் கிண்டிச் சோதித்தால் அங்கிலே அகனீதசம் இராது.

(2), 11 ம் பக்கம். நாவி. *Bikh*. (பயன்).

நாவியென்பது கொடிய நஞ்சு. இந்தப் பூண்டின் கிழங்குக்கும் நாவி யென்ற பெயர் வசங்கும்.

(3), 11 ம் பக்கம் வீறகனீதம். *Aconitum ferox*. (இரண்டினங்களின்வீழ்)

மெதுவான வெண்கிழங்கிலுள்ள அகனீதசத்தை உரத்தகிழங்கிலுள்ளதோடு ஒத்துப்பார்த்து வீதம் 5 க்கு 3 என்று செடலன்று பண்டிதர் கண்டார்.

(4), 11 ம் பக்கம். வீறகனீதம். *Aconitum ferox*. (தன்மைஉபயோகம்.)

இதின் தன்மைகளைப் பற்றிப் பரைரர் வைத்தியர் ஆராய்வசெய்து விபரமாய்முதியிருக்கிறார். இதின் உபயோகங்களைப்பற்றி ஒஷானசிபண்டிதர்

எழுதியிருக்கிறார். சுதேச வைத்தியர் இதை உபயோகப்படுத்தும் வகையை பபற்றித் தலீவுசெறீவு வாசடமும் விபரமாய்க் கூறுகின்றது.

(5), 12 ம் பக்கம். அதிவிடயம். *Aconitum hetrophylum*. (தன்மைகள்)

அதிவிடயம் ஓர் அந்திபிரூடி¹ என்பதற்கான அத்தாட்சி வங்காளத்தில் வைத்தியபணிவிடையாயிருந்த கெமிங் என்பவரார் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. பலவகையான முறைச்சுரக்காரர் 400 பேருக்கு அதைக் கொடுத்துக் கண்ட அனுபவத்தைக்கொண்டே அவர் சொல்லியிருக்கிறார். அது ஓர் உத்தமமான சுதேச அந்திபிரூடியென்று உவற்சன் பண்டிதர் எண்ணுகிறார். வாடிக்கையான முறைச்சுரங்களுக்கு அதை இருபது கிறேன் தேயத்திற்காலமேயாவது சுரம் விட்டிருக்கும் நேரத்திலாவது கொடுப்பது உத்தமமென்று திமக்கு வைத்தியர் சொல்லியிருக்கிறார். பல்லூர் வைத்தியர் இரண்டு வருஷக்காலமாகத் தாம் அதிவிடயத்தை ஓயாமற் கொடுத்ததென்றும் அதை அரைத்திரும் தேடத்திற் சொற்பதண்ணீரோடு சேர்த்து வேர்வைப்பாதத்திற் தொடங்கி காலு ஆய மணித்தயாலத்துக்கொருமுறை முறைச்சுரம் விட்டிருக்கிற நேரங்களிற் கொடுத்தால் மெத்த நயந்த சுரக்கினி³யென்றும் சொல்லியிருக்கிறார் அவர் பரிசுரித்த முறைச்சுரக்காரர் 66 பேருள் 37 பேரில் அது முழுதுஞ் சித்திபெற்றது. 18 பேரில் சொற்ப நயஞ்செய்தது. 11 பேரில் வாய்க்கவில்லை. கடைகளில் விற்கும் அதிவிடயம் மெத்தப் பழுதாயிருப்பதால் நல்ல சுரக்கைத் தேடித் தெரிந்து வழங்குவதவசியமென்று அவர் சொல்லுகிறார். ஒவ்வொரு கிழங்கையுங் குறுக்கே முறித்துப்பார்த்துச் சுத்தவெண்மையாயிராமல் குறுகப் பசையாய் முறிவதெல்லாவற்றையும் தள்ளிப் போடவேண்டுமென்கிறார். மேலும் அவர் சொல்வது, மூன்று மாசங்க ளாகச் சுரத்துக்கு ஒரு கிறேன் கினிய⁴மாவது கொடாமல் எல்லாச் சுரக்காறருக்கும் காகுதினுய்⁵ அதிவிடயமுமே விசேஷமாய்க் கொடுத்தேன் ஆகையால் இவைகள் மேன்மையான மருந்துகளென்று விளங்கும். இவற்றை முறையாய்க் கலந்து புத்தியாய்க் கொடுக்கவேண்டும்.

மேலும் அதிவிடயமும் இந்துபாபெரியும் நச்சுக்காய்ச்சல்களுக்கு நல்ல கடைமருந்துகளென்று மூர் வைத்தியர் சொல்லியிருக்கிறார். மேலும் அதிவிடயம் செயலில் சிந்தனத்துக் குச் சரிவந்த அந்திபிரூடியென்று ரைத்துப் பண்டிதரும் அடோய்சண்டதரும் எண்ணுகிறார்கள். இது செயலில் நிச்சயமற்றமருந்தாகக் கண்டோமென்றும், தொந்தித்தநோய்களில் இதை நம்பிக் கொடுக்கக்கூடாதென்றும் பலஞ்சைபோசர் சொல்லுகிறார். இவர் சொல்வது வந்த மருந்துக்குஞ் சரியே.

(6) 12 ம் பக்கம். கப்தீஸ்பூடு. *Coptis teeta* (தன்மை)

இச்சுரக்கையும் இதின் தொணிகத்தன்மையையும் பற்றி ஓஷானசி முதலிய சிலர் எழுதியிருக்கிறார்கள் பஹரர் வைத்தியர் இதை Mahmirah என்று எண்ணினார் இதைப் பீளேசாறியென்று முன் சொல்லியிருப்பதற்கு கியாயமுண்டு. பின்னடத்திய சோதனைகள் பஹரர் வைத்தியரது எண்ணத்தை உறுதிப்படுத்தின. இதன் வேருக்கு Racine de Chynlen என்று பெயர்கொடுத்துக் கூடேபட்டர் விபரித்திருக்கிறார்

1 Taleef shereef. 2 Antiperiodic 3 Febrifuge. 4 Quinine. 5 Narcotine.

(7), 17 ம் பக்கம். சீந்தில். Gulancha. (தன்மை)

இந் தூலைப் பிரசுரஞ்செய்த வாறிங்கு பண்டிதர் பிரமதேசத்திலே வாடிக்கையான நாலாஞ் சுரக்காரர் இருபதுபேருக்குச் சீந்தில்கொடுத்து வந்தார். ஒவ்வொருவரிலும் அது குலைப்பன் அதிகப்படாமற் றடுத்தது. என்றாலும் காய்ச்சல் திரும்ப வராமற் றடுக்கவில்லை. இவ் வகுப்பைச் சேர்ந்த எந்தமருந்தைக் கொடுத்தபோதும் இந்த விசேஷத்தைக் காணவில்லை. சீந்தில் அந்நிபிராடியாயல்ல, கயர்த்தொணிசமாய் அதிக பிரயோசனமுள்ளது. சுதேசவத்தியத்தில் இதின் உபயோகத்தைப் பற்றித் துவான்ரங்கமால் விபரமாய்ச் சொல்லியிருக்கிறார்.

(8), 20 ம் பக்கம். இந்துபாபெரி. Indian Barberry. (தன்மை)

இந்துபாபெரியின் தன்மைஉபயோகங்கள் முதலியவற்றைப்பற்றி, ஸ்தைவன் வைத்தியர் முதலியோர் விபரமாயெழுதியிருக்கிறார்கள்.

(9), 20 ம் பக்கம். இந்துபாபெரி. Indian Barberry. (அந்நிபிராடியாக)

முறைச் சுரங்களுக்கும் தடவை தடவையாய் வரும் மற்றுஞ் சுரங்களுக்கும் ஸ்தைவன் வைத்தியர் இந்த மருந்தைக் கொடுத்து வெகு சித்தியாய்ப் பரிகரிக்கு முறையாவது: ஒரு விரேசனங்கொடுத்துப் பேதிசெய்தபின் குலைப்பன் தொடங்கும்போது இந்துபாபெரி ரஞ்சத்தில் நாலு திரும் முதல் ஆறு திரும் வரைக்குக் கொடுத்து நோயாளியைக் கம்பளியால் நன்றாய்ப் போர்த்து வைத்திருக்கவும். உடனே மருந்தின் செயலால் அவதியுங் கடுமையான தண்ணீர்த்தாகமும் சுத்த காற்றில் விருப்பும் உண்டாகும். நோயாளி விரும்பினதைக் கொடுத்தால் பரிகரிப்பு வாயாது. அல்லாவிட்டால் ஒரு மணித்தியாலம் வரையில் உடம்பிற் குடுகொண்டு தோல் கசியத்தொடங்கி, கடைசியில் கடுமையாய் வெயர்க்கும். இந்தச் சீர் படிப்படியாய்க் குறைந்து உடம்பு குளிர்ந்து வருத்தமெல்லாம் மாற, மெத்தப் பெலவீனம்மாத்திரந் தோற்றும். அதற்குச் சவ்வரிசிக் கஞ்சியாவது கூவாக் கஞ்சியாவது கொஞ்சமாய்க் கொடுத்தால் நோயாளி உறங்கிச் சுகமாயெழும்புவான். காய்ச்சல் திரும்ப வருவதில்லை. பிறகு சொற்ப விரேசனஞ் சேர்த்த நிலவேம்புக் கஷாயங்கொடுப்பதே பெரும்பாலும் செய்யவேண்டிய பிரயோகம்.

(10), 20 ம் பக்கம். Rasot. (கண் வியாதிகளுக்கு)

இந்துபாபெரியின் இனங்களிற் செய்யப்படும் நீரெசுரத்தாகிய Rasot கண்வியாதிகளுக்கு பழைய காலந் தொடங்கி இடப்படும். முன்னோர் வழங்கின Lycinum Indium இதுதானென்று முதன்முதற் கண்டுபிடித்தவரைல் பண்டிதரே. இஃவ இரண்டும் ஒன்றென்பதைச் சந்தேகிப்பதற்குப் பின்செய்த ஆராய்வுகள் இடங்கொடாது. முன்னோரும் இந்துவினுள்ள தற்காலவைத்தியரும் கண்வியாதிகளின் பரிகரிப்பில் இதைப் பேர்பெற்றமருந்தாகக் கொண்டார்கள். கற்குத்தா நயன வைத்தியசாலையிலிருந்த வைஸ் வைத்தியரும் எடின்புரு வைத்தியசாலையிலிருந்த உவாக்கர் வைத்தியரும்

இதைப் பரிசோதினைசெய்து தத்தம் சோதனையிற் கண்ட பெறுபெற்றைச் சிம்சன் பண்டிதருக்கு அறிவிக்க இவர் அதைத் தமது பிரசுரத்திற் சேர்த்து ருக்கிறார். உவாசகர் வைத்தியர் இதைப் பிரயோகித்து மெத்தச் சித்திகண்டது மூவகைக் கண்ணெய்களிலுமே. கொஞ்ச அளவாய்ச் சித்திகண்ட நோய்கள், வாதக்கண்ணெய், கதார்க்கண்ணெய்களும் நிமைக்கண்ணெயுமே இரண்டொருபேரில் புதிதாயுண்டான யோகினிக்கண்ணெய், இயமருந்தால் சுறுசுறுயம் சுத்தமாயும் மாறினதைச் சிம்சன் பண்டிதர் தமது சொந்தப் பரிட்சையிற் கண்டார். இரு கருமத்திலும் மருந்தை இடும் முறை ஒன்றே. வங்காளத்தில் வழங்கின அம்முறை வைஸ் வைத்தியரால் வெளியாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது பாபெரிநீரெசுருத்தாகிய Rasotஐயும் வறுதத சீனக்காரத்தைச் சமசுறையாயும் அவினை அவற்றில் பாதிநிறையாயும் எடுத்து எலுமிச்சஞ் சாற்றில் கிரீம்பதமாய் வருந்தினையும் அகரத்து நோய்த்தகண்ணின் மடல்களையும் இமையையும் சுற்றி நாள் இரண்டுமுறை இடவும். மருந்து கண்ணில் வருத்தமான எரிவை உண்டாக்கும். இந்நூலைப் பிரசுரஞ்செய்தவர் இந்துதேசத்திலிருந்த காலத்தில் யோகினிக்கண்ணெயிருந்த பலருக்குச் சீனக்காரத்தைத் தனிய எலுமிச்சஞ்சாற்றில் குளைத்து முன்சொன்னமுறையாயிட, அந்நோய் மாறினதானகையால் அந்தக் கூட்டு மருந்தின் நயம் எவ்வளவுக்கு Rasot ஐப் பற்றியிருந்ததென்பது சந்தேகம். பின்சொன்னமருந்தே சென்னைத்தேசத்தாருக்குள் அதிகம் வாடிக்கையானது. அது நயமற்றதல்ல.

(11), 23 ம் பக்கம். இமயமலை அவின். Hill Opium.

கீழ்நாடுகளிற் செய்யப்படும் அவினைப்பார்க்க இமயமலையிற் செய்யப்படுவது உத்தமமென்று மக்கிறீகர் வைத்தியர் சொல்லியிருக்கிறார். வாடிக்கையான அவினின் நற்செயல்களெல்லாவற்றையும் இது உண்டாக்குமென்று ம் அதாற் பெரும்பாலுமுண்டாகிற தலையிடிமுதலிய அவக்குணங்களை இது உண்டாக்காதென்றும் அவர் எண்ணுகிறார். இதின் தேயம் மூன்றுமுதல் ஆறுகிறேன். வாங்க்பேதி முதலிய சில தறுவாயில் இன்னுங் கூட்டிக்கொடுத்தாலும் மோசமில்லை. மோயாற்று வைத்தியர் இதைச் சோதித்துப்பார்த்து இது மென்மையுங் கருங் கபில நிறமும் எகத்துக்கொரேதன்மையு முள்ளதென்றும், வாடிக்கையான அவினின் மணம் கசப்பு இசற்கு மெத்த இல்லை யென்றும் எழுதியிருக்கிறார். இதிலே உள்ள மாவியத்தின் வீதம் நூற்றுக்கு மூன்று என்று பருமட்டான சோதனையாற் கண்டிருக்கிறது. உச்சிதமான தருக்கை அவினைப்பார்க்க கலப்பற்ற இமயமலை அவினிலே அதிக மாவியமிருக்கிறதென்றும், காசி, பர்னா தோட்டங்களினின்று ராசாங்கத்தார் வாங்கும் அவினைப்பார்க்க இதிலே இருமடங்கு மாவியமிருக்கிறதென்றும் மக்தியர் வைத்தியர் சோதித்துக் கண்டிருக்கிறார். ஆயினும் சரியான வீதமெவ்வளவென்று சொல்லப்படவில்லை. இந்த அவினைப்பற்றி இன்னும் ஆராய்வது நல்லது.

(12), 23 ம் பக்கம். அவின். Opium. (கலப்பு)

அவினின் கள்ளக் கலப்பைக் கண்டுபிடிப்பது மெத்த முக்கியமும் வில்லங்கமுமான காரியம். இதைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு நம்பிக்கையும் லகுவு

மான வழியொன்றஞ் சொல்லப்படவில்லை. அதிலுள்ள மாவியத்தின் அளவைக் கண்டுபிடிப்பது மாத்திரமே நிச்சயமான சோதனை. ஆயினும் இது சங்கடமான துட்ப சோதனை. மணம், சுவை, இறுக்கம், இளக்கம் முதலிய வெளித்தோற்றங்களையும் யாந்திரிக கலப்பற்றிருப்பதையும் கொண்டே பழக்கமுள்ள சுதேச வைத்தியர் தீர்ப்பார்கள். நெடும் பரீட்சையுள்ளவர்கள் இவைகளைக்கொண்டு நிதானிக்கக் கூடுமாயினும் பழக்கமில்லாதிருந்தால் இச்சோதனைகள் வாயாது. இந்துதேசத்திலே அவினுக்குச் செய்யுங் கள்ளக்கலப்பைக்குறித்து ஈற்றுவல்பண்டிதர் சொல்லியிருக்கிற குறிப்பை இவ்விடந்தரல் தகுதி. அவினைச் செய்வோர் செய்யுங் கலப்புகள் பலவகை. அதின் நிறையைக் கூட்டுவதற்குக் களிமண், மணல், கரித்தூள், ஒட்டடை, சாணகம், இடித்த கசகசா இலை, இடித்த பலவகையான கொட்டைகள் முதலிய பருக்களுள் அசுத்தங்களைக் கலப்பார்கள். சரக்கைத் தண்ணீர் கரைத்துக் கரையக்கூடிய லேசான பங்குகளைத் தெளித்து வேறுக்கி மண்டியை ஆராய்வதால் இந்த அசுத்தங்கள் எல்லாவற்றையும் லகுவிற் கண்டுபிடிக்கலாம். இப்படிச் செய்வதால் இவ்வகையான அசுத்தங்களெல்லாம் பெரும்பாலும் தோற்றக்கூடியதாய் வரும். மாவும் இக்கலப்புகளுள் அதி வாடிக்கையானது. அதை லகுவிற் கண்டுபிடிக்கலாம். மாக் கலந்த அவின் சுறுக்குப் புளிப்புக்கொள்ளும். அதை முறித்தாற் சின்னபின்னமாய்க் குறுக முறியும். அந்தச் சரக்கைத் தண்ணீர் போட்டெடுத்துப் பிளிந்தால் மா வெளிப்பக்கத்தாற் பிளியும். மேலும் இயோத சோதனையை இட அமைலம் இருப்பது நிச்சயமாய் விளங்கும். அவித்த புடேதுக்கிழங்கு, வெண்ணெய், பனங்கட்டி முதலியவற்றையும் அவின்செய்கைக்காரர் அத்தோடு கலப்பார்கள். மணத்தினாலும் இறுக்கத்தினாலும் இவற்றை மட்டிடலாம். இவைகளைத் தவிர நாகதாழிப் பழச்சாறு, புகையிலை, ஊமத்தை, கஞ்சா இவற்றின் இறுகிய சாறு முதலிய தாவரங்களின் சாறுகள், எசுராத்துக்கள், பாணிகள், நிறப்பதார்த்தங்களையும் அவினுடன் கள்ளமாய்க் கலப்பார்கள். சில தாவரங்களினின்று வடியுந் பிசினையுங் கலப்பார்கள். பழப்புளி வில்வங்கனி முதலியவங் கலக்கப்படும். சரக்குக்கு நிறங்கொடுப்பதற்கு, காசுக்கட்டி, மஞ்சள், இடித்த இலுப்பைப்பூ முதலியன செர்க்கப்படும். அவினின் சுத்தத்தை நிதானிப்பதற்கு மாவியத்தின் வீதத்தை அறிவதைத் தவிர்த்த மற்றஞ் சோதனைகள் யாவும் நிச்சயமல்லவென்று ஈற்றுவல் பண்டிதர் சொன்னபின் மேலும் சொல்வது: தண்ணீரில் இது சுறுக்குக் கரைந்து பயற்றஞ்சாறு நிறமான கலங்கற்பாணியாகும். இது படிப்படியாயடைய மேலே தெளியும் நீர் கருமஞ்சள்நிறமாகும். இச்சரக்கைத் தண்ணீருக்குள்ளே பிடித்து விரலால் முறித்தால் அது முதலில் விரலோடு சற்றே ஒட்டினாலும் சுறுக்குக் கரைந்துபோகும். அவினோடு பிசின் கலந்திருந்தால் அப்பிசின் விரலோடு பெலனாய் ஒட்டிக்கொண்டு வில்லங்கமாய்க் சமூலம். மேலும் குருவிப்பிசின்¹போன்ற பொருள்களையுந் தாம் கண்டுபிடித்தோமென்கிறார். ஒருவேளை அது ஆலம்பாலாயிருக்கலாம். அப்படிப்பட்ட அவினிற் சொற்பத்தைத் தண்ணீர் கரைத்து அதற்கு ஈயவசுதக²நீர் சிலதுளியைக் கூட்டினால் பிசங்கல் நரைநிறமான ஓர் அடையல் கனமாயுண்டாகும். அது அந்நீரளவு பருமையாயிருக்கும். அது ஈயமிகனிரம்³. அமோன⁴மும் இதைப்போன்ற

1 Bird's lime. 2 Solution of Acetate of lead. 3 Meconate of Lead 4 Ammonia.

இவ்வளவு அடையலை விழுத்தும். அகிலே ராள¹மும் ஓர் அல்கலைவ²மும் அடங்கியிருக்கும். அந்த அல்கலைவத்தைப் பரமானுவில்வைக்க அது சுறுக்குக் கருமையாகும். இயோதரஞ்சஞ்³ செங்கல்நிறமான அடையலை விழுத்தும். அயரஞ்சம்⁴ அதிலுங் கருமையான அதைப்போன்ற அடையலை விழுத்தும். இச் சோதனைகளைச் சில நொடிநேரத்துக்குள்ளே செய்துபார்த்து உண்டாகும் அடைபல்களை ஒத்துப்பார்ப்பதால் சரக்கிலிருக்கிற அவினின் வீதத்தைப் பருமட்டாய் மதிக்கலாம். கனமாய்க் கள்ளங் கலந்த சரக்கிலே இச்சோதனைகள் காட்டும் அத்தாட்சி போதியதாயிருக்கும். இவற்றைத் தவிரத் தனிக்கமில்லத்தைக்⁵ கண்டுபிடிப்பதற்குச் செலதநீரும்⁶ பிசினே அடைவிப்பதற்கு வீரூன அலக்காலும்⁷ இன்னும் தேவையான கெமிஸ்த பொருள்.

(13) 29 ம் பக்கம். நாகுதின். Narcotine. (அந்திபிராடி⁸யாக)

நாகுதினுக்கு அந்திபிராடித்தன்மை உண்டென்று ஒஷானசி பண்டிதரால் முதன்முறை காட்டப்பட்டது. அவர் தமது சொந்தச் சாட்சியுடன் இந்துவிவிரந்த ஸ்துவாட்டு, சப்மன், குடவி முதலிய பேர்பெற்ற வைத்தியர் பலரது அனுபவசாட்சியையுங் கூறுகிறார். ருற்சு வைத்தியர் இதை இங்கிலாந்திலே சோதித்துப்பார்த்து சித்திகாணமையால் பிற்பாடு அது அதிகமாய் வழங்கப்படவில்லை. இதற்கு நியாயம் வங்காள வாகடமுறைப்படி அதைச் சரியாய்ச் செய்துகொள்ளாததுதான் என்று ஒஷானசி சொல்லுகிறார். பல்வூர் வைத்தியர் இதை ரொகில்கந்து, நங்கூன், தெல்லியிற் பரம்பின காய்ச்சலுக்கு அதிகமாய்க் கொடுத்து 1838 ம் ஆண்டு அதைப்பற்றி மெத்த நயப்பாய் அறிவித்திருக்கிறார். அவர் அதை இருபது கிறேன் தேயமாக வேர்வைப்பாதத்திற்கொடுத்து பிறகு காய்ச்சல் வருந் தடவைக்குத் தக்கதாய் ஆறுமுதற் பன்னிரண்டு மணி வேளையின்பின் திரும்பவும் அவ்வளவு கொடுப்பார். மூன்றாம் முறைக்காய்ச்சலில், கடைசித்தேயம் அடுத்த காய்ச்சல்முறைக்கு இரண்டு மூன்று மணிக்கு முன் வரத்தக்கதாக ஒழுங்குபண்ணி அதின் இடையாற்றிவேளையில் மூன்று தேயங் கொடுப்பார். நாகுதினைப்பெருத்தேயத்திற்கொடுப்பதால் கினியத்தைப் போல யாதொரு வருத்தமுமுண்டாகாமற் சொற்ப நடுக்கமும் விறைப்பும் தூக்கமும் உண்டாகுமென்றும் இக்குணங்களால் யாதொரு மோசம் நேரிடாதென்றும் பல்வூர் தமது பரீட்சையிற் கண்டார். சிலவேளை உவட்டும் வாந்தியும் உண்டாவதைக் கண்டார். இதினது அந்திபிராடித் தன்மையைப்பற்றி அகி பூரணமான புதிய அத்தாட்சி காடின வைத்தியரார் கூறப்பட்டது. காசப்பூரில் 1859 ம், 60 ம் ஆண்டுகளிற் பரம்பின கடுமையான காய்ச்சலில் அவர் 684 பேருக்கு அதைக் கொடுத்து 194 பேரில் அதாற்கண்டபெறுபேற்றைப்பற்றியதுட்பமானகுறிப்புகளை எழுத்தில் வைத்திருந்தார். இது கினியத்துக்குச் சரிவந்ததல்லவென்றாலும் அந்திபிராடியென்ற மருந்துவகுப்பில் இது இரண்டாவதாய் நிற்கும் என்பதும் சொற்ப மருந்துச் செலவுடன் பெரும்பாலும் யாதொரு கெட்ட குணங்களைத் தோற்றுவிக்காமல் அவ்வளவு கெதியாயும் நிச்சயமாயும் சுரத்தை மாற்றக்கூடிய மருந்து கினியத்தைத் தவிர்த்தால் இதைப்போலவேறொன்றாயில்லையென்பதுமே அவர் கண்ட முடிப்பு. காடினர் பரிகரித்த 684 கோயானருள் மரித்தவர்கள் 9 பேர். குறிப்பு எழுதிவைத்த 194 பேரில்

1 Resin. 2 Alkaloid. 3 Tincture of Iodine. 4 Tincture of Iron. 5 Tannic acid. 6 Gelatin. 7 Alcohol. 8 Antiperiodic. 9 Quinea.

ஊற்றுக்கு 3.6 பேரில் இம்மருந்தாற் சுசுமுண்டாகவில்லை. சுரத்தை நிறுத்துவதற்கு வேண்டியிருந்த மருந்தின் அளவு 22.7 கிரேன்; காய்ச்சல் விட்டபின் 16.3 கிரேன். ஆக 39 கிரேன். வாடிக்கையான தேயம் ஒன்றைக்கிரேன் முதல் மூன்றுகிரேன். அரிதாய் ஆறுகிரேனுங் கொடுபடும். பெருந்தேயத்தாற் சிலவேளை உவட்டிப்பு, வாந்தி, தலைக்கிறுதி உண்டாகும். நாகுதின் கொடுக்கமுன் ஓர் விரேசனங் கொடுப்பது வழக்கம்.

இந்துதேசத்தில் முன்னறப் பரிசோதித்துச் சித்திகண்ட நாகுதின், வங்காளபார்மகுபீய¹த்திற் சொல்லியிருக்கிறபடி பின்வருமுறையே செய்யப்படும். கொள். உத்தமமான வங்காள அவின் இரண்டு இரூத்தல்; சுத்த அலக்கால்²இரண்டு கலன். மூன்றிலொருபங்கு அலக்காலில் அவினைக் கையாற் கரைத்துக் களியானபின் மற்றொருபங்கு அலக்காலையுஞ் சேர்த்துச் சீலையில் வடித்து நன்றாய் நசுக்கிச் சக்கையோடு சேஷமாயிருக்கும் மூன்றத் தொருபங்கு அலக்காலைக் கூட்டி நன்றாய்ப் பிசைந்து முன்போல வடித்து நசுக்கி, வடித்த நீர்களை யொன்றாக்கவும். அந்தக் கலவைநீர் சிவத்த விற மஸ்தானை³நீலநிறமாய் மாற்றப் போதிய அளவாய் அதற்கு லீரூன அமோன⁴ நீர் சேர்த்து அதிலே அடங்கிய அலக்காலில் மூன்றத்திருபங்கும் வற்றுந்தனையும் அதைத் திஸ்திலிக்கவும்⁵. அப்பால் அதை நெருப்பைவிட்டிறக்கி தெளிந்தநீரை அழுத்தமான பாத்திரத்துக்குள்ளே இறுக்கவும். அப்பால் அதை அரைநாள் வரைக்குநிற்கவிட்டு, உண்டாயிருக்கிற கிரிஸ்தல்களைச் சேர்த்துச் சீலையில் அடக்கி, மழைத்தண்ணீரால் நன்றாய்க் கழுவவும். கழுவின் நீரை ஊற்றிவிட்டுக் கிரிஸ்தந்திரளையை இரண்டுநாழி தண்ணீரிற் போட்டு அதற்கு ஐருகுலோறிக்கமிலத்தில் ஒரு அன்சைப் படிப்படியாய்க் கூட்டவும். நீரை ஊற்றிவிட்டு முன்போலவே திரும்பவுஞ்செய்து நீர்களைக் கலந்து அப்பால் சுத்த அமோனநீரைச் சற்றே மிஞ்சத்தக்க அளவாய்க் கூட்டவும். அப்போ வரும் அடையலைக் காரிக்கம்புடைவையில் இட்டு அதை இரண்டு மூன்றுமுறை மெல்லிய தண்ணீராற் கழுவி உண்டைகளாகத் திரட்டி அடுப்பில் இட்டு நிறையிற் குறைதலொழியுந்தனையும் 130 பாகை ரூட்டில் உலர்த்தவும். நாகுதின் தண்ணீரிற் கரையாததலால் மாலியம்⁶ செய்யும்போது தண்ணீரிற் கரையாதிருக்கும் அவினின் சேஷபங்கிலிருந்து அதை எடுப்பது உத்தமம். அச்சேடத்தை அசிதிக்கமிலத்தில்⁷ ஊறப்போட்டு வடித்து அமோனத்தை மிச்சமாய்க் கூட்டவேண்டும். நாகுதினை ஏதும் இந்திரபதார்த்தத்த¹⁰தோடு கலந்து நிறப்படுத்தினால் அடையும். அதை அலக்காலிற் கரைத்துப் பிராணியக்கரியாற் சுத்திகரிக்கவேண்டும்.

(14), 29 ம் பக்கம். பிரமதண்டு. Argemone Mexicana. (தன்மைகள்.)

இந்துதேசத்திலிருந்து பனவியர் அனுப்பின நிப்போட்டோடு தொடுத்த தாய், வங்காள வைத்திய உத்தியோகஸ்தர் ஏழுபேருடைய எண்ணங்கள் உண்டு. அவர்களுள் ஒருவரைத்தவிர மற்றெல்லாரும் பிரமதண்டெண்ணெய் நல்லவிரேசனி¹¹யென்றும் பிரதானமாய் வயிற்றுவலி¹²க்குக்கொடுக்கஉவந்த விரேசனியென்றும் சொல்லியிருக்கிறார்கள். இதின் தன்மைகள் உபயோ

1 Pharmacopoeia. 2 Alcohol. 3 Litmus paper. 4 Ammonia. 5 Distil.
6 Crystal. 7 Hydrochloric acid. 8 Morphia. 9 Acetic acid. 10 Organic matters. 11 Aperient. 12 Colic.

கங்களைப்பற்றிப் பேரம், லூனன் என்பவர்களும் விபரமாயெழுதியிருக்கிறார்கள். அவர்கள் எழுத்துகளில் இது நாகதிக¹ தன்மை உடையதென்று சொல்லியிருப்பது, இதின் காய்களோடு சமதோற்றமுடைய ஊமத்தங்காய்களைக் கலப்பதினாலிருக்கவேண்டும். இதின் சாற்றிலே ஆர்கிமோனின்² என்ற மஞ்சள் நிறச் சத்தைக் கண்டுபிடித்தேனென்று ஒஷானசி பண்டிதர் சொல்லுகிறார். இதைப்பற்றி இன்னும் அறிவது நல்லது.

(15), 33 ம் பக்கம். சால்முக்கிரம். Chaulmugra.

சால்முக்கிரதேல் குஷ்டரோகத்துக்கு³உள்ளே குடிக்கவும் வெளிக்குப்பூசவும் உவந்த மருந்தென்று போசர் வைத்தியர் எழுதியிருக்கிறார். இதை அரைத்திராயிற் ரோடங்கி ஒரு திரும் வரைக்கும் யாதொரு நஷ்டமூயில்லாமற் கொடுக்கலாமென்று சொல்லியிருக்கிறது.

(16), 37 ம் பக்கம். சியாம் மக்கிமரம், Gamboge tree of Siam.

இதிலிருந்து பிசின் ராஸ⁴மாகிய நல்ல கம்போச்சு வடியும். அதை லகு வீற் சேர்க்கலாம்.

(17), 38 ம் பக்கம். இந்தாமக்கிமரம். Indian Gamboge.

இதின் அவுஷத தன்மைகளைப் பற்றி வைத்தியர் ஆராய்வுசெய்திருக்கிறார்கள். இது சியாம்மக்கியளவு வீறுள்ளதல்லாதிருந்தும், நல்ல நீரடிக்கும் விரேசனியென்பதே அவர்கள் முடிப்பு. இதின் விபரத்தைப்பற்றியும் கூறுகளைப்பற்றியும் கிரிஸ்திசன் பண்டிதர் எழுதியிருக்கிறார். அவர் சோதித்த அளவில் இதின் செயல் வாடிக்கையான மக்கியைப் போலவே இருக்கக் கண்டார். நீர்க்கொவை கோய்களுக்கு இது நலமென்று சென்னபட்டினத்திலிருந்த சொமரீன் வைத்தியர் எழுதியிருக்கிறார்.

(18), 39 ம் பக்கம். கோகமரம். Kokum Butter tree.

கோகநெய்யின் தன்மைகள், உபயோகம், செய்முறைகளைப்பற்றி வங்காள வைத்திய பத்திரிகையிலும பரைரர் வைத்தியர் வாகடத்திலுங் காணலாம்.

(19) 40 ம் பக்கம். கர்ச்சுமரம். Gurjun tree. (தன்மை, உபயோகம்)

கனுறிய⁵நோயின் பரிகரிப்பில், கபேவபல்சத்துக்குப்⁷ பதிலாகக் கர்ச்சுபல்சத்தைக் கொடுக்கலாமென்று ஒஷானசி பண்டிதர் 1838 ம் ஆண்டு காட்டினார். அதை வாரிங்கு பண்டிதர் 1852 ம் ஆண்டு சிலரிற் சோதித்து அதின் சித்தியைப்பற்றித் திருத்திபெற்றார். இதை என்றேசன்பண்டிதர் உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார். கபேவபல்சத்தைப் பூரணமாய்ச் சோதித்து நயங்காணாத நோயானருக்குத் தாம் இதைக் கொடுத்து எப்போதுங் சித்திபெற்றேமென்றும் இதினால் யாதொரு குணக்கேடு முண்டாகவில்லையென்றும் அவர் சொல்லுகிறார். அவர் இதை ஒருதிரும்⁸ தேயமாக நான் இரண்டு

1 Narcotic. 2 Argemonene. 3 Leprosy 4 Gum resin. 5 Hydragogue Cathartic.
6 Gonorrhoea. 7 Balsam Copaiva. 8 Drachm.

முன்றுமுறைதனியே கொடுத்து அதிக பரீட்சையடைந்தபின்பு, கனுநீயநோயின் தீவிர¹குணங்கள் தணிந்தபின் இதைக் கொடுப்பது கபேவபல்சத்தைக் கொடுப்பதற்குச் சரியாயிருக்குமென்கிறார். கிலீற்றுகு² கபேவபல்சத்தைப் பார்க்க இது வீறுள்ளதென்று கனலல்லி குறிக்கிறார். மேலும் மந்தமான புண்களை³ அரு - டுவதற்கு இது இடப்படுகிறதென்றும் அவர் சொல்லுகிறார். கபேவத்தைப் பூசினால் உண்டாவது போன்ற பருக்கள் இதைப் பூசுவதாலுண்டாகக்கூடுமென்றும் தாம் அதைக் கண்டோமென்றும் மங்கமாரி வைத்தியர் சொல்லுகிறார். சாரதித்த⁴ கர்ச்சதேலம்⁵ வங்காள பார்மகுபீயதீ⁶யில் வருகின்றது. ஆயினும் அதாலுண்டாகக்கூடிய நயங்கனெல்லாம் சுத்தமாகப் படாத இப் பல்சத்தாலுண்டாகக்கூடும். இந்தப் பல்சத்தின் தன்மையைக் கபேவபல்சத்தோடு ஒப்பிட்டுப்பார்த்து, லௌ முதலிய பண்டிதர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள்.

(20), 54 ம் பக்கம். வில்வம்பழம். Bael Fruit. (கூறுபாடு)

இதைப்பற்றி மகனமார, பல்லக்கு பண்டிதர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள்.

(21), 54 ம் பக்கம். வில்வம்பழம். (தன்மை, உபயோகம்.)

குடல்நோய்களுக்கு வில்வம்பழம் உவந்ததென்பதை நீடி, பெர்மன் முதலிய பழய ஆசிரியோர் கவனித்திருந்தாலும், 1853 ம் ஆண்டு மாடின்பண்டிதர் அதைக்குறித்துக் காட்டுந்தனையும் அது மெத்தக் கவனிக்கப்படவில்லை. சாற்று, நூற்றன் என்ற வைத்தியர்கள் தாமே அதைச் சோதித்துப்பார்த்துத் திசந்தெரிக்கு⁷ அது உத்தமமான மருந்தென்று மெத்த விதந்துசொல்லுகிறார்கள். கனிந்த ஒரு பழத்தின் களியைக் காலமேதோறுஞ் சாப்பிட்டால், கடிய மலவரட்சி வாயுப்பொருமலோடுகூடி யுரோபருக்குண்டாகுங்குண்மத்துக்கு⁸ நயமாகுமென்று கிறீன் வைத்தியர் சொல்லுகிறார். மேலும் வில்வங்காயை ஆறுமணி நேரமாக அவித்தால் வீரூன துவராகுமென்றும், அதைத் திசந்தெரிக்குச் சுதேசிகள் கொடுக்கிறார்களென்றும் அவர் சொல்லுகிறார். மேலும் வாந்திபேதிநோய் கொள்ளையாய்ப் பரம்புகிற காலத்தில் வில்வம்பழத்தை நாடோறும் சாப்பிட்டுவந்தால் அந்நோய்க்குப் பாதுகாப்பாகுமென்று, போஸ் வைத்தியர் நிறுத்திப் பேசுகிறார். அப்படியான காலங்களில் மலச்சிக்காவது கழிச்சலாவது உண்டாகாமல் கடலைச் சுத்திசெய்துகொள்வதற்கு இது உபயோகமானதென்பதற்குச் சந்தேகமில்லை. இதைப்பொலொத்ததாகிய விழாம்பழத்தை ஆசுபத்திரிகளில் இதற்காகக் கொடுக்கிறார்களென்றும், அது இதைப்போல நயந்ததல்லவாதலால் இதையும் அநேகர் அசட்டைபண்ணுவதற்கேதுவாயிற்றென்றும் பிதிவைத்தியர் சொல்லுகிறார். இதின் தன்மை உபயோகங்களைப் பற்றிக் கிறுன்று வைத்தியர் விபரமாயெழுதியிருக்கிறார்கள். வேறுஞ் சிலர் நயந்து எழுதியிருக்கிறார்கள்.

(22), 55 ம் பக்கம். மிளகரணை. Toddalia.

மிளகரணைவேரின் உபயோகத்தைப்பற்றிப் பெலத்த சாட்சி பிதி பண்டிதராக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அவர் தாம் அதைச் சுரக்கினியாய்⁹வழங்கா

1 Acute. 2 Gleet, 3 Indolent ulcer. 4 Essential. 5 Guggun oil. 6 Pharmacopoeia. 7 Dysentery. 8 Dyspepsia. 9 Febrifuge.

திருந்தாலும் அது ஸ்திமுலம்¹ தொணிகமாக² உத்தமமானதென்று தாம் சொல்லக்கூடுமென்கிறார். இப்பூண்டின் எப்பகுதியிலுங் காரமான கைச்சற்குவையும் நல்ல சுகந்த மணமும் இருந்தாலும் வேரிலேயே இத் தன்மைகள் மிகுதி. காய்ந்த வேர்ப்பட்டை மஞ்சட்கபில நிறமுள்ளதாய் வெகுநாளேக்கு காரசாரத்தை அடக்கியிருக்கும். முழுப் பூண்டுக்கும் வீரூன ஸ்திமுல, வாயுச்சினி³, தொணிகத்தன்மைகளுண்டு. மேலும் இம் மூன்று தன்மைகளும் இப்படிச் சலந்திருக்கிறதான இன்னொரு பூண்டைத் தாமறியோமென்கிறார். இது கழிச்சலுக்கு நல்ல மருந்தென்று யுரோபத்திலே பேர்பெற்ற லோபெஸ்⁴வேரென்று கீபேட்டென்பவர் கினைக்கிறபடியாலும் இது வியப்புற்றது. சுன்புரியென்பவர் இவ் வேரின் நயந்த மாதிரியைச் சோதித்துக் கீபேட்டரின் எண்ணத்தை உறுதிப்படுத்துகிறார். லோபெஸ் வேரின் தன்மை உபயோகங்களைப் பற்றி மறையென்பவர் விபரமாயெழுதியிருக்கிறார்.

(23), 60 ம் பக்கம். குந்துருக்கம். Olibanum. (உபயோகம்.)

குந்துருக்கத்தின் உபயோகத்தைப் பற்றித் தெலுபண்டிதர் இக்காலத்திலே கவனித்து இச்சாக்கு அசட்டையாய் விடப்பட்டதென்றும் தொலுபல்சம்⁵ பெருபல்சங்க⁶ளின் தன்மைகளுக்குச் சரியான நயந்த தன்மைகளை இது உடையது என்றும் இது மலிந்த சரக்கானபடியாலும் இரைப்பைக்கு அதிக இணக்கமானதாலும் வைத்தியசாலைகளிலே இதை அவற்றுக்காக வழங்கலாமென்றும் சொல்லுகிறார். இதை ஏறக்குறையப் பரிசீலனைந்து கிறேன் தேயத்தில் குளிகையாயாவது இமல்சாமாயாவது கொடுக்கலாமாம். காலிக⁷வகையான புறங்கீது⁸, லறிஞ்சீது⁹களுக்கு குந்துருக்கராளத்தை நெருப்புத்தழலிற் போட்டுண்டாகும் புகையைக் காட்டுவது நலமென்கிறார். அப்புகை கபத்தை வெட்டி இருமலையும் மூச்சுமுட்டையுந் தணிக்கக்கண்டார். மேலும் பிளவைக்குக் குந்துருக்கத்தைப் பூசுவது உத்தமமென்று ரோமர் வைத்தியர் சொல்லியிருக்கிறார். இவர் சொல்லியிருப்பதை கெவாசி, தெஸ்மாடி¹⁰ன்ஸ் முதலியோரும் உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். இந்துதேசத்தில் இது கற்சரக்காய் மலிவாய்ச் சம்பாதிக்கலாமாகையால் அங்கேயும் இதைச் சோதித்துப்பார்ப்பார்கள். இந்துதேசத்தின் பல பகுதிகளிலுண்டாகும் சிலந்திக் கட்டுகளுக்கு இதை அருட்டிப் பூச்சாய் வழங்கினதாக நூற்றன் பண்டிதர் எழுதியிருக்கிறார். கட்டு முகங்கொள்ளப்பண்ணுவதற்கு இது மற்றெப்பூச்சைப்பார்க்கிலும் உத்தமமான பூச்சென்று அவர் எண்ணுகிறார். மேலும் கனுறிய¹¹ நோய்க்கு இதைப் பத்துக்கிறேன் தேயமாகக் கொடுக்கிறார்களாம்.

(24), 62 ம் பக்கம். வேம்பு. Margosa. (கூறுபாடு)

காணிஷ்பண்டிதர் கூறுபடுத்திக்கண்டபடி வேப்பம்பட்டையிலே ஓர் அத்திர¹²எண்ணெய்யும். கைப்பான ராளம்¹³, பிசின், அமைலம்¹⁴, இனிப்பு, கயர் என்ற பதார்த்தங்களும் மாருசின்¹⁵ என்ற கைப்பான கிரிஸ்தம்¹⁶ பதார்த்தமும் அடக்கியிருக்கும். இவரால் மாருசின் என்ற பெயரிடப்பட்ட பதார்த்தம்

1 Stimulant. 2 Tonic. 3 Carminative, காயிணி. 4 Lopez root. 5 Balsam Tolu. 6 Balsam. Peru. 7 Emulsion. 8 Chronic 9 Bronchitis. 10 Laryngitis. 11 Gonorrhoea. 12 Volatile, 13 Restin. 14 Amylum. 15 Margosine. 16 Crystal.

முன்னே பிடிவற்றன் என்பவரால் எடுக்கப்பட்ட அசிடெரின் சல்ஃசு¹ என்ற பதார்த்தத்துக்குச் சரியாயிருக்கவேண்டும். இது உட்பட்டையிலேயே மிகுதியாயிருக்கும். வெளிப்பட்டையிலே சுயர் மிகுதியாயிருக்கும். வேப்பங் கொட்டையிற் பிழிந்த எண்ணெய்யையும் காணிஷ் பண்டிதர் சோதித்து, அதலே ஓர் அல்கலைவ²மும் அமிலத்தினை தன்மைகளையுடைய ஓர் கைச்சுற் பதார்த்தமும் இருக்கக்கண்டு அந்தக் கைச்சுற் பதார்த்தத்துக்கு மாகுசிக்கமில்ம்³ என்று பெயரிட்டார்.

(25), 62 ம் பக்கம். வேம்பு. Margosa. (தன்மை, உபயோகம்)

முறைச்சுரங்களின் பரிகரிப்பில், வேப்பம்பட்டையின் உபயோகத்தைப் பற்றி பர்தலோமேயு, சொனறற் முதலிய பூர்வீக ஆங்கியோர் எழுதியிருக்கிறார்கள். ஆயினும் முதன்முதல் 1813 ம் ஆண்டு இதை வெளியரங்கப் படுத்தினவர் வைற்பண்டிதரே. சின்கன⁴ பட்டை கொடுக்கும்போதுண்டாகும் சுகத்துக்குச் சரியான பூரணசுகம் இதைக் கொடுப்பதாலுண்டானதை அவர் தாமே கண்டோமென்கிறார். இது ஓர் அந்திபிராடி⁵யென்று சொல்லப்படத்தகுமோ என்பதைக் காணிஷ், விண்டு என்ற பண்டிகர்கள் கூட்டியாய் ஆராய்ந்து வேப்பம்பட்டை முறைச்சுரங்களின் பரிகரிப்புக்குப் பூர்வீகமான சின்கனம் பாஷாணம் என்பவற்றைப் போல நயமானதென்று முடிப்புக்கட்டினார்கள். வெளலிஸ் பண்டிதரும் இப்படி முடிப்புக்கட்டினார். அவர் வேப்பம்பட்டை மாவைத் திரும்⁶தேயமாய் மூன்று நாலுமணித்தியாலத்துக்கொருமுறை கொடுத்தார். பட்டையிலிருந்தெடுக்குமோர் எசுரத்து⁷ நயந்ததென்று ஜடபசுந்தர் குறித்திருக்கிறார். இலேசான முறைச்சுரங்களுக்கு இது அந்திபிராடியாய்ப் பெரும்பாலும் சித்தியுள்ளதென்பதும் சுரநோய்கள் தாபித⁸நோய்களினின்று சுகப்படுபவர்களுக்கு இதுதொணிக⁹மாக மெத்த உவந்ததென்பதுமே இர்துவிலிருந்து வரும் எழுத்துக்களின் அடக்கம். காய்ந்த வேப்பமிலைகளின் எசுரத்தைக் குஷ்டரோகத்துக்குக் கொடுக்கலாம் என்று மக்னமார வைத்தியர் சொல்லுகிறார். இம்மரத்தின் அந்தந்தப் பகுதிகளின் தன்மை உபயோகத்தைப்பற்றி இன்னும் காணிஷ் பண்டிதருடைய எழுத்திலும் வாரிங்கு பண்டிதருடைய எழுத்திலும் காணலாம். சுதேச வைத்தியத்தில் இதின் உபயோகத்தைப்பற்றித் தலீவு செறீவு வாகடத்தில் விபரமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

(26), 62 ம் பக்கம். வேப்பிலைப் பாப்பை. Nim poultice.

சீர்கெட்ட அழுகற்புண்களுக்கு வேப்பிலைப்பாப்பை உச்சிதமானதென்று கிறுன்று, டன்பார் வைத்தியர்கள் விதந்துபேசுகிறார்கள். இதின் நயத்தைப்பற்றித் தமது எண்ணத்தை இந்நூலைப் பிரசுரஞ்செய்தவர் இன்னொரு பகுதியிற் குறித்திருக்கிறார்.

(27), 63 ம் பக்கம். சேம்மரம். Soymida Febrifuga. (கூறுபாடு)

சேம்பட்டையை ஒவர்பீக்கென்பவர் கூறுபடுத்தியிருக்கிறார். அவர் அதிலே கிரிஸ்தலிக்கக்¹⁰கூடிய ஏதும் பதார்த்தத்தைக் கண்டுபிடிக்கவில்லை.

1 Sulphate of Azederine. 2 Alkaloid. 3 Margosic acid. 4 Cinchona. 5 Antipeirodic. 6 Drachm. 7 Extract. 8 Inflammation. 9 Tonic, 10 Crystallize.

மேலும் தாம் அசிலே கண்டுபிடித்த கைப்பான அமாவப்புதார்த்தம் இப் பட்டைக்குரிய சத்தோ எப்பதைப்பற்றியும் சந்தேகப்படுகிறார். இப் பட்டையிலிருந்தெடுத்த கைப்பான ஓர் கிசினதற்பதார்த்தத்தைப் பற்றிப் பிடிங்தன் பண்டிதர் விபரிக்கிறார். என்றாலுங் கடைகளிற் சேம்பட்டையென்ற விற்கிற காஞ்சிரம்பட்டையிலேயே அவர் சோதனைசெய்தாரென்றும் அவர் எண்ணியிருந்த ரோகுனசல்வசு² காஞ்சிரத்தின் ஓர் உப்பென்றுங் காணப்பட்டது.

(28), 63ம் பக்கம். சேம்பட்டை. *Soymida Febrifuga*. (தன்மை, உபயோகம்)

சேம்பட்டையின் தன்மை உபயோகங்களைப் பற்றியும் விசேஷமாய் அது ஓர் அந்திபிராடி³ யாகுமோவென்பதைப்பற்றியும், ரச்ஸ்பேகர், டன்கன், பிரேதன், ஸ்பில்ஸ்பெரி, என்பவர்கள் ஆராய்ந்திருக்கிறார்கள். பெருந்தேயமாய்த்தின்றால் கினிய⁴ த்தைப்போல இது தலைக்கிறுதியை உண்டாக்கும் என்று ஸ்பில்ஸ்பெரி கண்டார். இது சென்னை நிப்போட்டிற் சொல்லியிருப்பதை யொத்திருக்கின்றது. அகலே ஒருநாளேக்கு ஐந்து ஆறு திரமுக்கு அதிகமாய் உட்கொண்டால் தலைக்கிறுதியும் தலைப்பிசகுமுண்டாகுமென்று சொல்லப்பட்டது. இதின் அந்திபிராடித் தன்மையைப்பற்றி ஓஷானசி பண்டிதர் அற்பமாய்ப் பேசுகிறார். ஆயினும் இதைச் சோதித்துப்பார்த்துச் சொல்லாமல் தமது எண்ணத்தை மாத்திரமே வெளிவிட்டார். சேம்பட்டையிற் செய்யும் ஓர் எசிருத்தை⁵ பிரேதன் என்பவர் கடுமையான தியநீயத்துக்குப்⁶ பலமுறையுங் கொடுத்து அதைப்பற்றி நயந்துபேசுகிறார்.

(29), 71 ம் பக்கம். காசுக்கட்டி. *Catechu*. (உபயோகம்)

தினின்ஸ் வைத்தியர் முறைச்சுரக்காரர் 175 பேருக்குக் காசுக்கட்டியைக் கொடுத்தார். அவர் அதைப் பத்துப் பன்னிரண்டு கிறேன் தேயத்தில் நிலவேம்புச் கஷாயத்தோடு கலந்து கொடுத்தார். மேலுங் காணிஷ் பண்டிதரும் இதைக் கொடுத்துப்பார்த்து முன்சொன்னவருடைய எண்ணத்தைப் பெலப்பித்தார். கடைகளில் விற்கப்படுங் காசுக்கட்டி உதவாததாகையால் கொடுக்குங் காசுக்கட்டியின் தன்மையை அறிவதவசியமென்கிறார். அந்திபிராடியாக இது கடுக்காய்க்குச் சமமாகும். ரோசு வைத்தியர் இதைஸ்கேவிக்ரப்⁷ பலமுறையுங் கொடுத்துப்பார்த்து முரசை மாத்திரமல்ல உடம்பையும் பொதுவாய் நயப்படுத்துகிறதென்கிறார். ஒரு அன்சு⁸ தனித் தைலத்துக்கு⁹ ஒரு திரும்¹⁰ காசுக்கட்டி வீதமாய்ச் சேர்த்துச் செய்த தைலம் பலவகையான புண்களை மாற்றுவதற்கு உத்தமமானதென்று முடிவெடுத்தவர் சொல்லுகிறார். இசற்கு மாறுதிருந்தால் ஒரு அன்சு தைலத்துக்குப் பதினாறு கிறேன் துருசி¹¹ சேர்ப்பார். மற்று மருந்துகளுக்கு மாறாத சிவ்விசுப்புண்¹², குஷ்டம்¹³, வரைமான புண்களையும் மற்றும் வகையான புண்களையும் இத் தைலங்களைக்கொண்டு அவர் மாற்றியிருக்கிறாராம்.

1 Amorphous. 2 Sulphate of Rohuna. 3 Antiperiodic. 4 Quinea. 5 Extract, 6 Diarrhoea. 7 Scurvy. 8 Ounce. 9 Simple Ointment. 10 Drachm, 11 Sulphate of Copper. 12 Syphilis, 13 Lepa,

(30), 73 ம் பக்கம். புளியங்கோட்டை. Tamarind seed.

ஒடுநீக்கிய புளியங்கோட்டை குடல்நோய்களுக்கு நல்ல துவர்மருந்தென்று சுதேசிகள் மதிப்பார்கள். இது கடுமையான தியநீயம், திசந்தெரிநோய்களுக்கு உவந்த மருந்தென்று சாற்று வைத்தியர் கொடுத்துப்பார்த்து சித்திபெற்றார். புளியமிலைக் கஷாயங் கண்ணோய்க்கு மெத்த வாடிக்கையான இடுமருந்து.

(31), 77 ம் பக்கம். களஞ்சி. Bonduc. (கூறுபாடு)

களற்சிக்கோட்டையைப் பிடிவற்றன் பண்டிதர் கூறுபாடுசெய்து எழுதியிருக்கிறார். இன்னும் பூரணமான சோதனை வேண்டும்.

(32), 77 ம் பக்கம். களஞ்சி. (தன்மை உபயோகம்.)

களற்சிக்கோட்டை தொணிக²மும் அந்திபிராடி³யுமாகுமென்பதற்கு அநேகசாட்சிகளுண்டு. இந்நூலைப் பிரசுரஞ்செய்த வாறிங்கு பண்டிதர் இம்மருந்தைச் சோதித்துப்பார்த்தவிடத்து அது நயப்படவில்லை. இதின் செயல் சந்தேகமென்று கொர்கபதிரிகென்பவருங் கண்டார். சிலரில் முறைக்காய்ச்சலை இம்மருந்து கினியத்தை⁴ப்போற் சீக்கரமாய் மாற்றினாலுஞ் சிலரிலோ செயலில்லாமற்போகின்றது. இம் மருந்து தொணிக அந்திபிராடித்தன்மைகளை உடையதென்பதே இந்துவிவ்ருந்து வரும் எழுத்துக்களின் அடக்கம். களற்சிக்கிழங்கு பத்துக்கிறேன் தேயத்தில் கொட்டையைப் பார்க்க உத்தமமான தொணிகம் அந்திபிராடியென்பதே கொர்கபதிரிசு பண்டிதர் கருத்து. இடித்த கொட்டையைப் பீச தாபிதத்துக்கு⁵ கட்டலாமென்று அவர் எழுதியிருந்தாலும் அதின் நயத்தை ஒருத்தருங் கண்டதாக விளங்கவில்லை. இம் மருந்தைப் பற்றிய குறிப்புகளை இந்நூலைப் பிரசுரஞ்செய்தவர் வேறொரு கடதாசியில் எழுதியிருக்கிறார்.

(33), 82 ம் பக்கம். முருக்கு. Butea Frondosa. (பிசின்)

முருக்கம்பிசினைப்பற்றி ஒஷானசி, பரைரர், ரைல், கிரிஸ்திசன் முதலியோர் விபரமாயெழுதியிருக்கிறார்கள்.

(34), 82 ம் பக்கம். குன்றிமணி. Abrus precatorius. (தன்மை)

குன்றிமணி வேரின் தன்மைகளைப்பற்றியும் விசேஷமாய் அதிமதுரவேருக்குப் பதிலாக அதை வழங்குவதைப்பற்றியும் விளேமிங்கு, ஒஷானசி, தால்சன், கிப்சன் முதலிய பண்டிதர்கள் சுருக்கமாயெழுதியிருக்கிறார்கள். குன்றிமணி வேரினதும் மற்றும் பகுதிகளினதும் திமல்சு⁶த்தன்மைகளைப்பற்றி வாறிங்குபண்டிதர் வேறொரு பகுதியிற் குறித்திருக்கிறார்.

(35), 82 ம் பக்கம். வேர்க்கடலைத்தேல். Ground nut oil.

தெக்கணத்திலே அரசாட்சியார் தோட்டத்தில் எத்தனப்படுத்தப்பட்ட

1 Dysentery. 2 Tonic. 3 Antiperiodic. 4 Quinia. 5 Orchitis. 6 Demulcent.

வேர்க்கடலைத் தேலைப்பற்றி வின்செஸ்தர் வைத்தியரால் எழுதியிருக்கிற குறிப்பாவது. இந்த எண்ணெய் மேற்கு இந்துதேசம் முழுவதிலும் ஒலீவெண்ணெய்க்குப் பதிலாக வழங்கப்படுகின்றது. இது வெண்சிவப்பு நிறமானது; மணமற்றது; சுத்த சுவையுள்ளதால் அதிலே பொரித்தமீன், நெய்யிலாவது, தேனிலாவது, பொரித்தமீன்போல உருசியாயிருக்கும். அலக்காலையும் நாதரையுங்கொண்டு இதைச் சோத்திப்பார்த்தவிடத்து ஏதுங் கலப்பற்றதாயிருந்தது. வருஷாந்தம் அந்த இடத்திலிருந்து 1000 இரூத்தல் முதல் 3000 இரூத்தல் எண்ணெய் ஏற்றுமதிபண்ணப்படுகின்றது. அது நீர்ப் பாரசத்தி¹ னாற் செய்யப்பட்டு ஒலீவெண்ணெய்க்கு நல்ல பதிலெண்ணெய் என்று வைத்தியரால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

(36), 103 ம் பக்கம். மாதனை. *Punica granatum*. (பழக்கோது.)

மாதனம்பழத் தோல் நல்ல தொணிக²மும் துவருமென்றும் அதைக் கராம் போடு அவித்துக்கொடுத்தால் இந்துதேசத்தின் வறிய சனங்களுக்குப் பெரும்பாலு முண்டாகும் காலிகத்சந்தெரி³க்கு உத்தமமருந்தாடு மென்றும் கொர்க பதிரிசு பண்டிதர் சொல்லுகிறார். அது நல்ல துவரென்பது வெகு காலமாக அறிந்த காரியம். அதை அனேகர் வழங்கி நயங்கண்டார்கள்.

(37), 104 ம்பக்கம். கலுசிந்துக்கூட்டெசிறுந்து. Compound Extract of Colocynth.

இம்மருந்து இந்துதேசத்திலே வெகு சித்தியாய்ச் செய்யப்படுகின்றது. வம்பாயிலுள்ள மருந்துச்சாலைக்கு இது அரசாட்சியாரால் வருஷாந்தம் 150 இரூத்தல் தொடக்கம் 200 இரூத்தல் வரைக்குக் கொடுக்கப்பட்டது. வம்பாயிலுள்ள மருந்துச்சாலைக்குப் பொறுப்பாளியாயிருந்த வின்செஸ்தர் சொல்வதாவது: மெற்கிந்துதேசச் சமவெளிகளிற் கலுசிந்து⁴ என்ற பேய்க்கொம் மட்டி எவ்வளவு அதிகமாய் வளருகிறதென்பதை அறிந்தவர்கள், இம்மருந்து பட்டாளத்தில் வழங்கப்படுவதற்கு மாத்திரமல்ல பிறதேசங்களுக்கும் ஏற்றப்படுவதற்குப் போதிய அளவாய் அங்கே செய்யப்படவேண்டும் என்பதைக் காத்திருப்பார்கள். மருந்துச்சாலைக்கு அனுப்பப்பட்டது உத்தமமாயிருந்தது. மருந்துக்காரன் ஸ்கமுனி⁵யைக் கடையில் வாங்கியும் சவுக்காரா⁶ த்தைச் சீமையால் எடுப்பித்தும் உத்தமமாய்க் கொடுத்ததுபோலவே நாட்டிற்செய்த கலுசிந்துக்கூட்டெசிறுத்தும் சீமையால் வந்ததற்கு மெத்தச் சரியாயிருந்தது.

(38), 109 ம் பக்கம். ஒமம். *Ommum*.

ஏறக்குறைய நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னே ஒமக்கொட்டை மருந்தாடு மென்று பேர்சிவல் பண்டிதரால் இங்கிலாந்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. ஆயினும் அது அதிகமாய் வழங்கப்படவில்லை. இது உத்தமமான வாயுக்கினி யென்பதற்குச் சந்தேகமில்லை. பிதிவைத்தியர் இதைப்பற்றிச் சொல்வது: சொற்பபிரமாணமாக இது உமிழ்நீரை ஊறப்பண்ணும். குக்கிரீருறுவதை

1 Olive oil. 2 Alcohol. 3 Ether. 4 Hydraulic pressure. 5 Tonic. 6 Astringent. 7 Chronic Dysentery. 8 Colocynth. 9 Scammony. 10 Soap.

அதிகப்படுத்துதல்; ஸ்திமுலம்¹, வாயுக்கினி², தொணிக³மாகச் சேஷ்டிக்கும். தொண்டை புண்பட்டு இளகியிருப்பதற்கு இதை மற்றந் துவர் மருந்துகளோடு சேர்த்து இடுவது நயமாகும். கெட்ட சுவையுள்ள மருந்துகளின் சுவையை மறைத்து அவைகளாலுண்டாகும் உவட்டிப்பு வயிற்றுமுறுக்கு முதலியவற்றை மாற்றுவதற்கு இசற்குச் சரிவந்த மருந்து இல்லை. இவ்வகையான சாட்சி வுட்டென்பவராலுங் கொடுக்கப்படுகின்றது. மினகாய் அல்லது கடுகின் தீவனதன்மையோடு நிலவேம்புக்குரிய கைப்பும், பெருங்காயத்துக்குரிய அந்திஸ்பச⁴தன்மையும் இதிற் கலந்திருக்கிறதென்று அவர் எண்ணுகிறார். ஒம எண்ணெய்யைச் சபுலினிமெ⁵னோடாவது காரமற்ற வேறேதுமெண்ணெய்யோடாவது கலந்து காலிகவாதத்துக்குப் பூசுவது உத்தமமென்று சொல்லப்பட்டது. ஒமநீரைத் திஸ்திலித்தெடுப்பதற்குப் போடும் ஒமக்கொட்டையின் வீதம் மிகச் சொற்பமென்பது வுட்டரது எண்ணம். அவர் மூன்று இரூத்தல் ஒமக்கொட்டையை இடித்து 6 நாழி தண்ணீருக்குள்ளிட்டு அதில் நாலுநாழியைத் திஸ்திலித்தெடுக்கச் சொல்லுகிறார்.

(39), 117 ம் பக்கம். வல்லாரை. *Hydrocotyle Asiatica*. (தன்மை.)

இப்பூண்டு குஷ்டரோகத்துக்கு மருந்தாகப் பயிலுபண்டிதராற் கொடுக்கப்பட்டதைப்பற்றிப் போதர் என்பவர் விபரமாயெழுதியிருக்கிறார். மேலும் சுந்தர் என்பவரும் தாம் இப்பூண்டைச் சென்னைபட்டினக் குஷ்டரோக சாலையில் அந்நோய்க்கு மருந்தாக வழங்கினதைப்பற்றியும் அதின் கூறுபாடு உற்பத்தி முதலியவற்றைப்பற்றியும் எழுதியிருக்கிறார். சாற்று வைத்தியரும் குஷ்டரோக நோய்களுக்கு இது உச்சிதமான அல்திறவ⁷ தொணிக மருந்தென்று விதந்து கூறுகிறார். இந்நூலாக்கியோனும் இதைப் பரிசோதித்தெழுதியிருக்கிறார்.

(40) 120 ம் பக்கம். சின்கனம். *Cinchona*.

(இது இந்துதேசத்துக்கு வந்தவகை)

கினியந்தரும் சின்கனமரத்தை இந்துவுக்குக் கொண்டுவந்து வளர்க்கவேண்டுமென்று ரோயில் என்பவர் 1835 ம் ஆண்டுவரையில் காரிய கர்த்தாக்களுக்கு அறிவித்துச் சமயம் கிடைக்கும்போதெல்லாம் அதைக்குறித்து விடாமுயற்சியாய் நினைப்பூட்டினார். டற்சுத் தாவரசாஸ்திரிகளும் யாவதேசத்தில் இம்மரங்களை உண்டாக்கவேண்டுமென்று தங்கள் அரசாட்சியாரைத் தூண்டியும் 1852 ம் ஆண்டு வரைக்கும் யாதொரு சித்தியும் பெறாமலிருந்தும் அவ்வாண்டிற்குளே கஸ்காள் என்பவர் சில மரங்களைக் கொண்டுவரும்படியாக தென் அமரிக தேசத்துக்கு அனுப்பப்பட்டார். அவர் போய்ப் பலவகையான சின்கனமரங்களை அங்கிருந்து யாவத்துக்குக் கொண்டுவந்தார். அவைகளில் மிகுதியானவைகள் கீழ்த்தரமான மரங்களாம்.

1852 ம் ஆண்டிலும் அதின்பின் பலமுறைகளிலும் இந்து அரசாட்சியார் கினியத்தின் விலை கடுமையென்றும் அதினுற் கினியந்தரு மரத்தைத் தாங்களே இங்கே வளர்த்துக்கொள்வது நலமென்றும் மேன்கையாருக்குக் காட்டினார்கள்.

1854 ம் ஆண்டு கியு என்னுமிடத்திலுள்ள தோட்டத்திலும் தோட்டவே

1 Simulant, 2 Carminative. 3 Tonic. 4 Antispasmodic. 5 Soap liniment, 6 Leprosy. 7 Alterative.

லைச் சங்கத்தாரிடத்திலும் வாங்கின ஆறு சின்னகைக் கன்றுகளை ரோயில்பண்டிதர் இந்துவுக்கு அனுப்பினார். இக்கன்றுகள் பேர்பெற்ற பிராஞ்சிய தாவரசாஸ்திரியும் பிரயாணியும் சின்னகைத்தின் இனங்களை நமக்கறிவித்தவருமாகிய வெடெல் என்பவர் 1847 ம் ஆண்டு சம்பாதித்த விதைகளின் கன்றுகளையாம். இக்கன்றுகள் கல் சத்தாவுக்குக் கொண்டுபோய் நடப்பட்டும் முதல்மாரியின்பின் அவை பட்டுப்போயின.

முதல் முயற்சி பிரதிகூலமாய்ப் போனாலும் ரோயில் பண்டிதர் இன்னுஞ் சித்திபெறலாமென்ற விடாமுயற்சியால் சின்னகைநாடுகளுக்குக் கெட்டிக்காரனான ஒருவரை அனுப்புவது அவசியமென்று எவ்வினார். அப்போ இந்து அரசாட்சியார் சின்னகைபட்டைக்கும் கினியத்துக்குமாக வருஷாந்தம் 7000 பவுன் செலவிட்டுவந்தார்கள். சுறுக்கு அச்செலவு 12000 பவுனுக்கு ஏறிவிட்டது. 1857 ம் ஆண்டு யுரோப பட்டாளம் கதிக்க, அச்செலவும் அதற்குத்தக்கதாய்க் கூடினது.

கடைசியில் இச்சாரியம் இந்துவிலும் இங்கிலாந்திலுமுள்ள அதிகாரிகள் பார்வையில் விசேஷமென்று தோன்றினது. 1859 ம் ஆண்டு அப்போ இந்துதேசக் காரியங்களுக்கு லிகிதராயிருந்த ஸ்தன்லி பிரபு சின்னகை நாடுகளுக்குச் சிலரை அனுப்பவேண்டுமென்று தீர்மானித்தார். அதற்கு அத் தேசத்தை முன்னமே அறிந்திருந்த மார்கம் என்பவரையே தகுந்தவரென்று தெரிவு செய்தார். மார்கம் என்பவர் பொலீவிய தேசத்திலுள்ள கவிசாயநாடுகளுக்குத் தாமே போகத் தீர்மானித்து, அப்போ கியு என்னுந் தோட்டங்களுக்கு விசாரணைக்கர்த்தாவாயிருந்து இக்காரியத்தில் அதி விருப்பங்கொண்டிருந்த கூக்கர் பண்டிதரோடு யோசனையுஞ்செய்து, அப்போ மேல் அமசோன் தேசங்களை ஆராய்வுசெய்துகொண்டிருந்த ஸ்புருஸ் என்பவரை ஈகுவடோர்தேசத்திலுள்ள செஞ்சின்னகைக்காடுகளுக்கு அனுப்பினார். மேலும் பிரிச்செற் என்பவர் பெருதேசத்திலுள்ள நரைச்சின்னகை நாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டார். கன்றுகளையும் விதைகளையும் பதிப்பதற்கு மேடைகள் கியுதோட்டங்களில் ஆயத்தம்பண்ணப்பட்டன.

மார்கம் என்பவர் 1859 ம் ஆண்டு மார்கழிமாசத்தில் இங்கிலாந்தை விட்டுப் புறப்பட்டுப் போய் உயிருள்ள சின்னகைக் கன்றுகளைச் சேர்த்துக்கொண்டு பனமா வழியாய்த் திரும்பினார். உடனே அவர் வம்பாய்க்குப் போய் அங்கிருந்து 1860 ம் ஆண்டு கோடையில் நீலகிரியைச் சேர்ந்தார். ஸ்புருஸ், பிரிச்சாற்றென்பவர்களாற் சேர்க்கப்பட்ட தொகையான கன்றுகளும் விதைகளும் 1861 ம் ஆண்டு முகனையில் அங்கே வந்து சேர்ந்தன. இவைகளை நாட்டி வளர்ப்பதற்கான இடங்களை மார்கம் என்பவர் மாகீவர் என்பவரது உதவியோடு தெரிந்து செய்கையை அவர் பொறுப்பிற்றானே விட்டார். மேலும் சூதானத்துக்காகப் பூண்டுகளிலும் விதைகளிலும் சிலவற்றைக் கியு என்ற இடத்தில் இட்டார்கள். அங்கே அவைகள் நன்றாய் முளைத்துச் செவ்வையாய் வளர்ந்தன. போதிய கன்றுகள் விதைகள் சம்பாதிக்கப்பட்டவுடன், இப்பரிசோதனையை இந்துதேசத்தின் மற்றும் பகுதிகளிலும் நடத்தினார்கள். இலங்கைத் தாவரதோட்டத்துக்கதிகாரியாகிய, துவேற்ஸ் என்பவரிடத்துக்கும் கற்குத்தாத் தாவரதோட்ட விசாரணைக்காரனாகிய அன்றேசன் என்பவரிடத்துக்கும், கன்றுகள் விதைகள் அனுப்பப்பட்டன. மேலும் டற்குக்காரருடைய செய்கையைப்பற்றி ஆராய்வுசெய்யும்படியாக அன்றேசன் என்பவர் ஜாவதிவுக்கு அனுப்பப்பட்டார். துவேற்ஸ் என்பவர்

இலங்கையின் மத்தியமாகாணத்தின் மலைச்சாரல்களில் கன்றுகளை உண்டாக்கினார். அன்றேசன் சிக்கீமின் பல இடங்களை இச்செய்கைக்கென்று தெரிந்துகொண்டார். செய்கை எங்கும் வாய்த்தது. விதைகளிலும் கிளைகளிலுமிருந்து தொகையான கன்றுகள் உண்டாக்கப்பட்டன. அக் கன்றுகள் பெரிய மரங்களாக வளர்ந்து பூர்த்துக் காய்த்தன. அவைகளிலிருந்து எடுக்கும் கினியத்தின் வீதம் அவைகளின் செனனதேசத்தில் எடுக்கப்படுமளவைப் பார்க்கக் கதித்தது. முக்கியமான இப்பரிசோதனை சந்தேகமின்றி வாய்த்தது.

தற்காலத்திலே இந்துதேசத்தின் சின்னச்செய்கையிருக்குஞ் சீரைப்பற்றிப் பின்வருங் காரியங்களை மார்கம் என்பவர் எழுதியிருக்கிறார்.

ஆகப் பிந்திய அறிவிப்பின்படி 1867 ம் ஆண்டில் நீலகிரி மலையிலே ராசாங்கத்தார் செய்கையிலே 17,85,303 சின்னக்கன்றுகள் நின்றன. இவைகளில் 4,01,211 கன்றுகளும் வளர்ந்து மரங்களாய்விட்டன. இச் செய்கைக்குள்ளடங்கிய நிலம் 673 ஏக்கர். 125,747 கன்றுகள் சனங்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்டன.

ஊர்ச்சனங்களும் நீலகிரி மலைகளிலேயும் சூன்ற மலைகளிலேயும் வைத்து கூர்க் என்ற இடங்களிலேயும் சின்ன மரங்களை நட்புருக்கிறார்கள். திரவங்கூர் இராசாவும் பியர்மீதிலே ஓர் சிறிய சின்னத் தோட்டத்தை உண்டாக்குவித்திருக்கிறார்.

1862 ம் ஆண்டு பங்குனிமாதம் சின்ன கன்றுகள் தார்சிலின் என்ற இடத்துக்கு அனுப்பப்பட்டு அடுத்த ஆடிமாதத்திலே பரிசோதனைக்காக 211 கன்றுகள் நாட்டப்பட்டன. அடுத்த இடங்கள் சிலவற்றிலும் நாட்டப்பட்டன. 1867 ம் ஆண்டு தைமாதத்தில் அங்கே 6,25,408 கன்றுகள் நின்றன. 67,280 கன்றுகள் நிலைபரமாய் நடப்பட்டு மரங்களாய் வளர்ந்துவிட்டன. பஞ்சாப்பு தேசத்திலே கங்கிரா என்ற இடத்தில் லீஸ் தளகர்த்தர் ஓர் சின்ன தோட்டத்தை உண்டாக்கி அவ்விடத்துக்கு புதுச்சிறீரே என்று பெயரிட்டார். மேலும் வம்பாய் இராசாங்கத்தார் பரிசோதனைக்காக விங்முல்லம் என்ற இடத்திலே யோர் தோட்டத்தையுண்டாக்கினார்கள்.

தென்னமரிகத்திலுள்ள பிரயோசனமான சின்ன மரவகைகள் எல்லாவற்றையும் இந்துதேசத்துக்குக் கொண்டுபோகவேண்டுமென்று நினைத்தார்கள். 1867 ம் ஆண்டு வரைக்கும் அவர்கள் செய்த செய்கையின் பெறுபேறுவது.

I கலிசாயசின்கனம். *Cinchona Calisaya*. (பீதச்சின்கனம்) சென்ற வருஷம் வரைக்கும் இந்தவகையிலே செடிமாத்திரம் கிடைத்தது. 1866 ம் ஆண்டிலோ நல்ல மரத்தின் கொட்டைகள் கனமாய் வாங்கி நன்றாய் முளைப்பிக்கப்பட்டது. 1867 ம் ஆண்டு தைமாசத்தில் நீலகிரித் தோட்டத்திலே கலிசாயசின்கனக்கன்றுகள் 40,000 நின்றன. இவைகளினால் மெத்தப் பலனுண்டாகும். அது சில வருஷத்துக்குள்ளே விளங்கும்.

II செஞ்சின்கனம். *C. Succirubra*. இந்த இனத்தைச் சேர்ந்த மரங்கள் இப்போ மெத்தப் பரிதாகி ஒன்றுக்கொன்று எட்டுமுழு தூரத்தில் நின்றாலும் பின்னுகின்றன. இவைகள் கடல்மட்டத்துக்கு மேலே 4,000 அடி முதல் 6,000 அடி உயரத்துக்கு வளருகின்றன. மெக்கீவர் என்பவர் மரத்தைப் போர்வையிட்டதால் பட்டை தடிப்பாய் வளர்ந்தது. ஆவாடென்பவர் அப் பட்டையைக் கூறுபடுத்தினபோது அதிலே சுரக்கின்¹ அல்கலைவர்கள் இரட்டத்தனை பிறந்தன. போர்வைக்குள்ளே வளர்ந்து மூன்றாம்

1 Febrifuge. 2 Alkaloids.

முறையாய் வெட்டப்பட்ட பட்டையிலே கினியமும்¹ மற்றும் அல்கலைவங்
களும் பின்னாற் காட்டப்படும் வீதமாய்ப் பிறந்தன.

கிரிஸ்தலித்த சல்வசுகள் ²	-	-	-	நூற்றுக்கு,	8.45
ஈதரிற் ³ கரையக்கூடிய அல்கலைவங்களாகிய					
கினியமும் சின்குனிரமும் ⁴	-	-	-	"	1.14
சின்குனிசின் ⁵	-	-	-	"	0.20
				"	<u>9.79</u>

போர்வையிடாத பட்டையில் நூற்றுக்கு 6.95 வீதமாய் அல்கலைவங்கள் பி
றந்தன. 6 மாசமாகப் போர்வையிட்ட பட்டையிலோ நூற்றுக்கு 9.26 வீ
தமாய்ப் பிறந்தன. மாதிரிக்கெடுத்த இப்பட்டை நீலகிரிமரத்துக்குரியது.
இரண்டுவயதுள்ளதாய் தார்சிலிங்கென்ற இடத்திலிருந்தெடுத்த பட்டையி
லே நூற்றுக்கு 3½ வீதமிருந்தது.

III சுநந்தசின்கனம். C. Officinalis. இந்த இனத்தைச் சேர்ந்த மரங்
கள் சுகிர்த்தத்தில் செஞ்சின்கன மரத்துக்கு இரண்டாவதானவைகள்; அதிலு
ம் இவை வன்மையானவைகள். காட்டுநிலத்தில் வளருவதைப்போல் மணல்
நிலத்திலும் வளரும். காற்றுக்கு ஒதுக்குக்கட்டினால் நீலகிரிமலையின் உய
ர்ந்த சாரல்களிலும் வளரும். நீலகிரி மலையில் வளர்ந்த வெண்சின்கனமர
மொன்றிலே போர்வையிட்டு இரண்டாம் முறையாய் வெட்டியெடுத்த பட்
டையிலிருந்தெடுத்த பதார்த்தங்களின் வீதங்களாவன.

கிரிஸ்தலித்த சல்வசுகள்	-	-	-	நூற்றுக்கு	6.52
ஈதரிற் கரையக்கூடிய அல்கலைவங்களாகிய					
கினியமும் சின்குனிரமும்	-	-	-	"	1.35
சின்குனிசின்	-	-	-	"	0.15
				"	<u>8.02</u>

சுகந்த சின்கன மரத்தின் முதற்பட்டை 9 மாசமாகப் போர்வையிடப்பட்
டிருந்தபின் நூற்றுக்கு 7.37 வீதமாக அல்கலைவங்களை ஈந்தது. அதிலே சி
றிய குழற்பட்டை நூற்றுக்கு 4.73 வீதமாய் ஈந்தது.

IV நரைச்சின்கனம். C. Micrantha, C. Nitida, C. Peruviana இந்
த இனங்கள் செஞ்சின்கன இனங்களைப்போலச் செளிப்பாய் வளரும். இ
வைகளைச் செய்கையிட்டதால் விசேஷமான நயங்கண்டது. இவைகள்
சொந்தத் தேசமாகிய தென்னமரிகத்தில். சின்கனின் என்ற உதவாத அல்க
லைவத்தைத் தவிர வேறென்றையும் ஈயவில்லை. நீலகிரியில் வளர்த்த இந்த
இனத்துப் பட்டையைக் கூறுபடுத்தினபோதோ சின்கனின் அகிலே ஏறக்
குறைய முற்றமில்லாமற்போயிற்று, நல்ல அல்கலையாகிய கினிதின்⁶ அதி
கவீதமாயிருந்தது.

V வெண்சின்கனம். C. Lancifolia. இந்த இனத்தைச் சேர்ந்த மரங்க
ள் 304 வரையில் நீலகிரி மலையிலே நிற்கின்றன. இவை யாவத்திலிருந்து
கொண்டுவந்து வைத்த கன்றுகள். அக்கன்றுகள் பஸ்து என்ற இடத்துக்கு
க் கிட்டக் காஸ்தன் பண்டிதராற் சேர்க்கப்பட்ட விதைகளின் கன்றுகள்.
ஆயினும் இந்த இனத்தில் உத்தமமானவைகள் இவைகளல்ல. ஆதலால் இ
ந்திய காரியங்களுக்கதிகாரியாகிய லிகிதர் Secretary of state for India.

1 Quinine. 2 Crystallized sulphates. 3 Ether. 4 Cinchonidine, 5 Cinchonicine.
6 Quinidine.

பப்பியன், பிதேயு என்னும் இடங்களுக்குக் கிட்ட வளருகிற உச்சிதமான கன்றுகள் அல்லது விதைகளைச் சம்பாதிக்கும்படியாக இன்னுமொருமுறை ஒருவரை அனுப்பத் தீர்மானித்திருக்கிறார்.

VI பகுதியனசீன்கனம். C. Pahudiana. இது யாவத்தைச்சேர்ந்த உதவாத இனம். இதிலே 425 மரங்கள் நீலகிரியில் நிற்கின்றன. ஆகிலும் இவை பரப்பப்படவில்லை. ஒன்பது மாசமாகப் போர்வையிட்டிருந்த பட்டையைக் கூறுபடுத்தினபோது அதிலே அல்கலைவங்கள் நூற்றுக்கு 0.761 வீதமாய் மாத்தரம் இருந்தன. நீலகிரி மலையிலே வளருஞ் சின்ன மரங்களைச் சோதித்துக் கூறுபடுத்திப் பார்க்கும்படியாக 1856 ம் ஆண்டு இந்திய காரிய லீகிதர், சாதனையுள்ள கெமிஸ்திராகிய பிறவுதனரை நியமித்தார். இவர் எழுதிய முதல் அறிவித்தலிலிருந்து விசேஷமான காரியங்கள் சிலவற்றை இவ்விடம் திருப்பித்தருகிறோம்.

பிறவுதனர் 1867 ம் ஆண்டு சித்திரை மாதம் 12 ம் திகதியைக்கொண்டு எழுதின அறிவித்தலின் சுருக்கம்.

செஞ்சின்கனவைச் சோதிப்பதற்கே விசேஷமான கவனஞ் செலுத்தப்பட்டது. இந்துவிலுண்டாக்கப்பட்ட எல்லா இனங்களுக்குள்ளேயும் இந்த இனமே அதிகமாய்ச் செளித்தோங்கி வளருகின்றது. தொகையிலும் இது முக்கியமானது. மேலும் உபயோகமாய் முதற் செலவழியக்கூடியதும் இதுவே.

வளர்ந்த மரங்களைப் பார்த்தால், செஞ்சின்கன மரங்கள் தோற்றம் முதலியவற்றில் வித்தியாசங் காட்டுகின்றன. இந்த வித்தியாசத்தை மார்கம் என்பவர் கவனித்து எடுக்கும் அல்கலைவங்களின் அளவு வித்தியாசத்துக்குத் தக்கதாய் இவ்விதப்பங்கல் இருக்குமென்கிறார். இந்த எண்ணஞ் சரியென்பது நாலுமரங்களின் சாய்ந்த பட்டையைக் கூறுபடுத்தி அவைகளிலிருந்து எடுக்கும் பதார்த்தங்களின் நூற்றுவிதத்தை பின்வரும் அட்டவணைப்படி கவனிப்பதால் விளங்கும்.

	I	II	III	IV
ஐரசித்த ³ அல்கலைவங்களின் தொகை -	4.85	7.00	6.40	6.4
ஈதரிற் ⁴ கரையக்கூடிய அல்கலைவமாகிய கினியம் ⁵	3.25	4.25	4.75	1.7
சின்குனிரினும் ⁶ சின்குனினும் ⁷ - - -	1.60	2.75	1.67	4.7
கிரிஸ்தலாக ⁸ எடுத்த கினியசல்வசு ⁹ - - -	3.00	4.00	4.55	1.7

மேலே கண்ட அட்டவணையிலும் அதற்குப் பின்வந்தவைகளிலும் கினியசல்வசு கூடியளவு சுத்தமாயெடுக்கப்பட்டது.

I ம் இலக்கப்பட்டடை. கிடைத்த இனங்களுக்குள்ளே இளந்தென்றாலும் இருவடர் தேசத்து உத்தமப்பட்டைக்குச் சரியான அல்கலைவங்களை ஈந்தது. II. III. IV. என்ற இலக்கங்களாற் குறிக்கப்பட்ட பட்டைகள் அதிகம் கொழுப்பானவைகள். போர்வையிடப்படாத அவற்றின் பட்டையிலிருந்தெடுத்த அல்கலைவங்கள் நூற்றுக்கு ஏழு வீதமாயிருந்தது. இந்த வீதம் எனக்கு மெத்த அதிகமென்று தோன்றினபடியால் வேறுவகையாய் அவற்றைத் திரும்பத் திரும்ப நான் கூறுபடுத்திப் பார்த்தாலும் முந்தின அளவே ஒத்துவந்தது. இப்பட்டைகளின் அல்கலைவங்கள் கொழுப்பாயிருப்

1 Chemist, 2 Alkaloid, 3 Hydrated, 4 Ether, 5 Quinine, 6 Cinchonidine, 7 Cinchonine, 8 Crystal, 9 Sulphate.

பதைப்பற்றி இந்துப்பட்டைகளுக்குள்ளே இவை முதற்றரமென்று சொல்லக்கூடியதாயிருந்தாலும் செய்கைபண்ணுவதற்கு இவைதான் நயந்தவைகென்று எடுக்கக்கூடாது. அல்கலைவத்தைச் சுத்தமாயுங் கிரிஸ்தலாயுமென்க்கும் இலகுவைப்பற்றியும் அவற்றின் நயமிருக்கும். இதுகாரியத்திற் போர்வையிடாத செஞ்சின்கன பட்டையிலிருந்து அல்கலைவத்தைச் சுத்தமாயெடுப்பது அதிகம் வருத்தமாகையால் அது வசதியானதல்ல.

மேலே கண்ட சோதின்கள் அடிமரத்திற் பட்டையிற் செய்யப்பட்டன. அடிமரத்தப்பட்டை கொம்புப் பட்டையைப் பார்க்கக் கொழுப்பானது. கொம்புப் பட்டையிலே அல்கலைவங்கள் கொம்புப்பட்டை. நூற்றுக்கு மூன்று வீதமாய் வரும். அதிலே கிரிஸ்தலான சல்வசுகள் நூற்றுக்கு 1.4 வீதமாய் வரும்.

செஞ்சின்கன மரத்தின் வேர்ப்பட்டையைச் சோதித்தபோது அதிலே அல்கலைவங்கள் அதிவீதமாயிருக்கிறதென்று திவேற்சு பண்டிதர் சொன்னது மெய்ப்பட்டது. அதாவது அதிலே கினியம்¹ 2.15; வேர்ப்பட்டை. சின்குனிரி²னும் சின்குனி³னும் 3.85. ஆகநூற்றுக்கு 6.0. வேர்ப்பட்டை மெல்லிதாகையாலும் அதிலே நூற்றுக்கு 7.4 வீதமாய்த் தண்ணீர் இருப்பதாலும் கூறுபடுத்துவது அரிதாகையாலும் அதிலே அல்கலைவங்களை நயமாய் எடுக்கக்கூடாது.

காலு இருத்தல் நிறையுள்ள இலையினின்று 3.1 கிறேன் அல்கலைவங்கள் எடுக்கப்பட்டது. அதில் ஒருகிறேனும் ஈதரிற்⁴கெரயச்சூடியது. இலைகள். அதைக் குலோற்⁵நீரும் அமோனமுங்⁶ கொண்டு சோதித்தவிடத்து சொற்ப கினியத்தைக் காட்டினது. கிரிஸ்தலான உப்பு ஒன்றும் அதில் எடுக்கக்கூடாது. இலையிலே கினுவின்⁷ நிரம்பவுண்டு.

சசிருபுர சின்கனத்துக்கு அடுத்தாப்போற் தற்காலத்தில் இந்துவிலிருக்கிற சின்கனம் சுகந்த சின்கனமே. இதின் இனங்களி சுகந்தசின்கனம். னின்றே முடிப்பட்டை⁸எடுக்கப்படும். அவ்வினங்களுள் பன்பிளன்றியன் சின்கனம் என்பதே முதற்றரமானது. அந்த இனத்தைச் சார்ந்த வேர் மரத்தின் அடிப்பட்டையிலே நூற்றுக்கு 3.6 வீதமாய் அல்கலைவங்கள் எடுக்கப்பட்டன. அதிலே கினியம் 2.8; சின்குனிரினும் சின்குனி³னும் 0.8. இன்னொரு மரத்தின் பட்டையிலே 3.8 வீதமாய் வந்தது. அதிற் கினியம் 3.0. சின்குனின் 0.8. இந்த இன மரத்தின் வளர்ச்சித் தாமதம், அல்கலைவக் குறைவு என்பவற்றைச் சரிக்கட்டத் தக்க சில நயங்கள் செஞ்சின்கனவைப்பார்க்க இதின் செய்கையிலுண்டு. முடிப்பட்டையிலே ராளமும், நிறப்பதார்த்தமுஞ் சொற்பமாய்ச் சேர்த்திருக்கிறபடியால் அது தன் அல்கலைவங்களை லகுவில் ஈகின்றது. இந்த இனத்துப் பட்டையோ பொலிவியத்துச் சுத்த கலிசாயப்பட்டைக்கு ஏறக்குறையச் சரியான உத்தமபட்டையே.

காலரை வருஷ வளர்ச்சியை உடைய நரைச்சின்கன மரத்தின் அடிப்பட்டையைக் கூறுபடுத்தினவிடத்து அல்கலைவம் நூற்று நரைச்சின்கனம். ஂகு 7.1 வீதமாய் வந்தது. இதிலே கினியம் 0.3. சொச்சமான 68 பங்கும் சின்குனின். இதை அலக்காலிற் கரைக்க, லகுவிற் சுத்தமான கிரிஸ்தலாகி 0.18 இஞ்சு நீளமான சிறந்த

1 Quinine. 2 Cinchonidine. 3 Cinchonine. 4 Ether. 5 Chlorum. 6 Ammonia.

7 Quinovin. 8 Crown bark. 9 Resin.

கிரிஸ்தல்களாய்வந்தது. குவன்குப் பட்டையிலே வழக்கமாய் நூற்றுக்கு 2.0 பங்கு அல்கலைவங்கள் அடங்கியிருக்கும். சின்கனம் சுரக்கினியாக வழக்கத்தில் வருமாகில் நரைச்சின்கன பட்டையிலிருந்து அதை மெத்த லகுவாயுந் தாராளமாயுமெடுக்கலாம்.

மெக்கீவர் சொன்ன முறைப்படி போர்வையிடுவதாலுண்டாகும் நயத் தைப்பற்றி ஆவாடென்பவர் சொன்னதும் ஒத்திருக்கின்றது. இப்படிச் செய்வதால் அல்கலைவங்கள் அதிகப்படுகின்றன. உயிருள்ள பட்டையில வெயில்படுவதால் அல்கலைவங்கள் குறைகின்றதென்று அனுபவத்தாற் தோற்றுகின்றது. ஆகையாற்றான் போர்வையிடல் நயமாய் முடிகின்றது.

(41) 121 ம் பக்கம். சின்கனஇலை. Cinchona Leaves. (உபயோகம்)

இந்துவில் வளர்ந்த சகிருபுரசின்கனத்தின் இலையை ஆவாடர் சோதித்து அதில்நின்று முதலாவதாய் நூற்றுக்கு 0 11 வீதமான அல்கலைவம் எடுத்தார். இதிலொருபங்கு ஈதரிற் கரைந்தது; சொச்சம் வைன்சுரையிற் கரைந்தது. பிற்பாடு துவர்ப்பதார்த்தத்தோடு கலந்திருந்த வோர் அடையலை நூற்றுக்கு 0.19 வீதமாய் எடுத்தார். இந்த இலையிலிருந்து கினியம் எடுக்கக்கூடாதெ ன்றாலும் அதைப் பச்சையிலையாய், அல்லது வெந்நீரிலாவது தண்ணீரிலாவ து ஊறப்போட்டு, அத்தேசத்துக் காய்ச்சலை மாற்றுவதற்குக் கொடுக்கலாமெ ன்று இச்சோதனையினின்று விளங்குகின்றதென்று ஆவாடர் சொல்லுகிறார். இசற்கு அவ்விலையில் நிறைவாயுள்ள கினுவிக்கமில¹மும் உதவும். சிப்பலீ ல் முதலானோரும் இலையைச் சோதித்து நயமென்று கண்டார்கள். தொந் ந்தமில்லாத இலகுவான காய்ச்சலுக்கும் மற்றுந் துவர்த் தொணிகங்களைப் போல இதுவும் உபயோகமாகு மென்றாலும் கினியத்துக்கு இது நிகரானத ல்ல. சிப்பலீல் வைத்தியர் மூன்று முறைப்படி இலையை வழங்கினார். (1) சின்கன இலை, அன்சு 1½; கிருசசல்வுரிக்கமிலம்² திரும் 2; தண்ணீர் அன்சு 20. (2) சின்கன இலை, அன்சு 1½; கிருசசல்வுரிக்கமிலம் திரும், 2; வெந்நீர் அன்சு, 20; பத்துமினி வேளை அவித்து வடிக்கவும். (3) சின் கன இலை அன்சு, 1; தண்ணீர் அன்சு, 6; பத்து மினி வேளைக்கு அவித் து வடிக்கவும். தேயம், ஒவ்வொன்றும், மூன்று நாலு அன்சு, நாள் மூன்றுமு றை. சின்கன இலை எந்த இனத்தைச் சேர்ந்ததென்றாலும் சரியே.

(41^a) 125 ம் பக்கம் சின்கனத்தின் அல்கலைவங்கள்.
Cinchona Alkaloids.

சின்குனின்³, சின்குனிரின்⁴, கினிதின்⁵ என்ற இந்த அல்கலைவங்களின் அந்திபிராடி⁶த் தன்மையைப் பரிசோதிக்கும்படியாகச் சென்னைத்துரைத்தன த்திலே 1866 ம் ஆண்டு கமிஷனர்⁷ நியமிக்கப்பட, இப் பதார்த்தங்கள் அவ ர்கள் கையிற் கொடுக்கப்பட்டன. அவர்கள் அவற்றைக் காய்ச்சலுள்ள கி ராமங்களிலே பலவகையான முறைக்காய்ச்சற்காரரில் 1145 பேருக்குக் கொடுத்தார்கள். 410 பேருக்குச் சின்குனியசல்வசம்⁸, 359 பேருக்குச் சி ன்குனிரியசல்வசம், 376 பேருக்கு கினிதியசல்வசங் கொடுக்கப்பட்டது. இப்படிப் பரிகரிக்கப்பட்ட 1145 பேருள் 4 பேர் மரணித்தார்கள். கூட

1 Kinovic acid. 2 Diluted sulphuric acid. 3 Cinchonine. 4 Cinchonodine.
5 Quinidine. 6 Antiperidic. 7 Commission. 8 Sulphate.

லூரிலே காய்ச்சலோடு கழிச்சல், துமோனி¹ கூடிநின்ற நாலுபேர் மரித்து விட 27 பேரில் மருந்து வாய்க்கவில்லை. இது நூற்றுக்கு 2 வீதமேயாகும். ஆகையால் மருந்தின் சித்தி மெத்தத் திருப்தியாயிருந்தது. அவர்களது எழுத்திலிருந்து தரும் பின்வருஞ் சுருக்கம் காரியத்தை மிகத் தெளிவாய்க் காட்டும். பிரயோகித்த வகையும் தேயமும் மெத்த விகற்பமாயிருந்தது. சில வைத்தியர் 15 கிறேன் 20 கிறேன் வரைக்குப் பெருந்தேயமாய்க் கொடுத்தார்கள். சிலர் எட்டுப் பத்துக் கிறேன் வரைக்கு மட்டாய்க் கொடுத்தார்கள். சிலர் இரண்டுமுதல் ஐந்துகிறேன் வரைக்குச் சிறுதேயமாய்க் கொடுத்தார்கள். பொதுவாய் நரோசியான தேயமாய் நாளொருமுறை கொடுத்தவர்களுக்கு வாய்த்தது. அப்படிப்பட்டவர்கள் அதிகமாக அல்லது குறைவாகச் சாப்பிட்டவர்களைப்பார்க்கச் சீக்கரத்திற் சுகமடைந்தார்கள். இம்மருந்தின் பெருந்தேயங்கள் கினியத்தாலுண்டாவதைப்போன்ற அவக்குணங்களைப் பிறப்பித்தன. அவற்றுட் தலையிற் கிண்ணிடல், காதில் இரைச்சல், செவிடு, தலைச்சிறுதியே அதிதோற்றமான குணங்கள். சத்தி, உவட்டு, கழிச்சலும் சிலரிற் கண்டது. மட்டான தேயங்களுக்கு இக்குணங்களொன்றும் உண்டாகவில்லை. அவற்றாற் பசியுஞ் சீரணமும் திருந்தின. காய்ச்சற்கட்டியும் வற்றினது. ஆயினும் ஒருமருந்து மற்றதைப்பார்க்கத் திறமென்று விளங்கவில்லை. ஒவ்வொன்றினதும் ஏகசகட்டுத் தேயம் பத்துக்கிறேன்; ஒருவேளை கினியசல்வசின் நயத்தைப்பற்றி மாத்திரமே எண்ணங்கள் மெத்த வித்தியாசப்படவில்லை. மூன்றுக்கும் அந்திபிராடித்தன்மையுண்டு; அவை முறைச்சுரத்தை மாற்றக்கூடும். சின்கனியசல்வசை அதிதேயமாய்க் கொடுத்தால் மற்றவைகளைப் பார்க்க அதிகமான கெட்ட குணங்கள் உண்டாகின்றது போலும். ஆயினும் இதைப்பற்றி இன்னும் அத்தாட்சி தேவை. சிலருக்குச் காய்ச்சலை மாற்றப் போதியதற்கு அதிக அளவான மருந்து கொடுக்கப்பட்டது. இதுவரையில் உபயோகமடையாத இந்த அல்கலைவங்கள் அவுஷதமாகக் கினியத்துக்குச் சற்றாவது கீழ்த்தரமானவைகளல்லவென்பதே கமிஷனர் கண்டடைந்த முடிபு.

(42) 126 ம் பக்கம். திசந்தெரிக்கு இபிகாக்கு. Ipecac in Dysentery.

தீவிரவகையான திசந்தெரிக்கு இபிகாக்கைப் பெருந்தேயமாகக் கொடுக்கத்தொடங்கினவர் தக்கர் என்பவர். இவ்வியாதிப் பரிகரிப்பைப்பற்றி அதி காத்நிரமான குறிப்புகளைக் காணிஷ் பண்டிதர் சென்னைப் பட்டாளத்தைச் சேர்ந்த வைத்தியரிடத்திலிருந்து பெற்று எழுதியிருக்கிறார். ஈவாற் பண்டிதரும் இக்காரியத்தைப்பற்றி விபரமாய் எழுதியிருக்கிறார். பெரும்பாலும் கண்ட பேறு மெத்தத் திருத்தியாயிருந்தது.

(43) 134 ம் பக்கம். தாக்கசகவேசுற்த்து. Extract of Taraxacum.

தெக்கணத்திலே கீறா என்ற இடத்திலுள்ள ராசாங்கத்தார் தோட்டத்தில் வளர்த்த தாக்கசகப் பூண்டிலிருந்து செய்த எசிறுத்து நயந்ததென்று வம்பாயில் மருந்துச்சாலைக்கு அதிகாரியாயிருந்த வின்செஸ்தர் பண்டிதர் எழுதியிருக்கிறார். அது வெயிலிற் காய்ந்த மாவாகச் செய்யப்பட்டுக் காற்றுப் புகமாட்டாத இறுக்கமான பெட்டிகளில் அடைத்து வருஷந்தோறும் நாற்பது ஐம்பது இரத்தல் வரைக்கு அனுப்பப்படுகிறதென்று அவர் அறிவித்திருக்கிறார்.

1 Pneumonia. 2 Antiperiodic.

(44) 142 ம் பக்கம். தும்பிலியேசிற்த்து. Extract of Diospyros.

இந்த எசுரூத்துத் துவராம் உபயோகமுள்ளதென்பதற்குப் பிரதானமான சாட்சி ஒவ்வானசி பண்டிதரே. உபசத்திரீகனாகிய அடோய்சண்டெராலும் இது விதந்து பேசப்பட்டது. தும்பிலிப் பழத்தின் துவரான சாற்றைச் சுதேசிகள் நசிவுகள் சுருக்குகளுக்குப் பூசுகிறார்களென்றும் அவற்றிற்காணும் வீக்கத்தை அது வற்றப்பண்ணுகிறதென்றும், சாற்றுவைத்தியர் சொல்லுகிறார். வீரன துவர்த்தன்மை இதற்குண்டென்பதற்குச் சந்தேகமில்லை. துவர் என்ற சுதேச மருந்துகளுள் இதுவும் விசேஷமானது.

(45) 148 ம் பக்கம். ஏழிலைப்பாலை. Alstonia scholaris.

இதைப்பற்றிக் கிப்சன் பண்டிதர் சுருக்கமாயும் விளக்கமாயுமெழுதியிருக்கிறார்கள். நிம்மு என்பவர் 1839 ம் ஆண்டு இதை வீரன துவரென்று காட்டி அந்திபிராடியாக இதை வழங்கலாமென்றார். இது மெத்த உபயோகமாகக்கூடிய வோர்மருந்து. இதைப்பற்றிப் பின்னால் வரும் சரக்கிலுங் காணலாம்.

(46) 149 ம் பக்கம். வெட்பாலை. கசப்பு வெட்பாலை. ஏழிலைப்பாலை. Wrightia, Holarrhena, Alstonia.

இவற்றுள் முதலிரண்டு பூண்டுகளினதும் விதையும் மூன்றாவதின் பட்டையும் மருந்துக்கு வழங்கப்படும். இம் மூன்று பதார்த்தங்களையும் பற்றி விளக்கங்கள் மெத்த வித்தியாசப்படுகின்றது. விதைகள் இரண்டும் ஒன்று தானென்று சுதேச வைத்தியர் சிலர் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அது சரியல்ல. ஒன்று சுவையற்றது; மற்றது கசப்பு. ரைற் வைத்தியர் இவற்றின் விகற்பத்தை விபரமாய்க் காட்டி எழுதியிருக்கிறார். அவர் எழுதியவற்றினின்று பின்னால் வரும் பொழிப்பைத் தருகிறோம். இவை மூன்றும் மரம் போன்றவை. ஒவ்வொன்றினதும் பட்டை பாலுள்ளது. ஆகையாற்றான் பாலையென்றபெயர் இவற்றிற்கு வந்தது. மூன்றினதும் பூ வெண்மை; குலக்கானது; மூன்றினதுங் காய் நீண்டது; மெல்லிது. எல்லாவற்றினதும் விதை மெல்லிய பட்டுதூல்போன்ற சுணைக்கற்றைகளை உடையது. முதலிரண்டினதும் இலை அரசம் இலைபோல் அடியில் அகன்று வட்டித்து துனியில் ஒடுங்கிக் கூராயிருக்கும். மூன்றாவதின் இலையோ துனியில் அகன்று அடியில் ஒடுங்கியிருக்கும். மேல் விபரத்திலிருந்து மூன்றும் பொதுவான தோற்றத்தில் ஒத்திருக்கின்றதென்றும் விகற்பப்படுங் காரியங்கள் மிக நுண்ணியவைகளென்றாலும் மெத்த யதார்த்தமென்றும், அவற்றைப் பகுத்தறிவதற்கு மெத்தக் கவனம் வேண்டுமென்றும் விளங்கும்.

அதி நிச்சயமான வித்தியாசம் விதைகளிற்றோன்றும்.

கசப்பு வெட்பாலை¹ விதையிற் காம்புக்குக் கிட்டினைபகுதியாகிய கீழந்தலையில் நுண்ணிய வெண் சுணைக்கற்றை இருக்கும்.

வெட்பாலை² விதையில் காம்புக்குத் தூரமானபகுதியாகியமேலந்தலையில் சுணைக்கற்றை இருக்கும்.

ஏழிலைப்பாலை³ விதை தட்டையானது. அதின் இருதலைப்பிலுஞ் சுணை இருக்கும். நடுப்பகுதி காம்பிற் பிடிக்கும்.

1 Holarrhena. 2 Wrightia. 3 Alstonia.

கரூலம்¹ எனப்படும் உள்ளிதழ் அளவில், ஒன்றுக்கொன்று அதிகம் மயங்கக் கூடியவைகளாகிய கசப்பு வெட்பாலைக்கும் வெட்பாலைக்குமுள்ள விகற்பம் அவ்வளவு நுட்பமாயும் அதிகம் தெளிவாயுமிருக்கும்.

கசப்புவேட்பாலைப்புஷ்பத்தினது உள்ளிதட்டுழல்கள், கலிசு² எனப்படும் புறவிதழைப்பார்க்க இருமடங்கு நீளமானவைகள். அதினிதழ் ஐந்து மடல்களுள்ளது. மடல்கள் விரியமுன் வலதுபக்கத்துக்குத் திரிகியிருக்கும். ஸ்தமன்கள்³ என்ற கூந்தல்கள் கரூலத்தின் வாயிலுட் பிடித்திருக்கும். அந்தெர்கன்⁴ அம்புவடிவாய்த் தழும்புகளின் சுற்றிற் பிடித்திருந்து அத்துவாரத்தினின்று முளைபோற் துன்னிநிற்கும். இவைகளைச் சூழ்ந்ததாய்க் கூந்தலான முடியிருக்கும். இதின் குஞ்சங்கள் மடல்களிற் பாதி நீளமானவைகள். இதிலே முளைபோற் துன்னிநிற்கிற அந்தெர்களும் கூந்தலான முடியைக் கொண்ட கரூலக்குழற்றுவாரமுமே இவ்வினத்தின் புஷ்பங்களைப் பகுத்தறியத்தக்க தோற்றமான அறிகுறிகளாகும்.

வேட்பாலைப் புஷ்பத்தின் குழல் மெல்லிது; அது புறவிதழைப்பார்க்க மூன்றுநாலுமடங்கு நீளமாய் அடியில் விசாலித்து மேலே ஒடுங்கியிருக்கும். இதழ் ஐந்து மடல்களுள்ளது. மடல்கள் விரியமுன் இடது பக்கத்துக்குத் திருகியிருக்கும். குழற்றுவாரம் கூந்தலில்லாமல் வெறுமையானது. ஸ்தமன்கள் சூழலினடியில் அதின் விரிந்த பகுதியிற் பிடித்திருக்கும். இதிலே குழற்றுவாரத்திற் கூந்தல்கள் இல்லாதிருப்பதையும் ஸ்தமன்கள் சூழலின் அடிப்பகுதியில் மறைந்திருப்பதையுங்கொண்டு இதைக் கசப்புவெட்பாலையல்லவென்று மெத்த லகுயில் அறியலாம்.

ஏழிலைப்பாலையை இலையைக்கொண்டு மற்ற இரண்டினத்தினின்று லேசிற்பகுத்தறியலாம். இதின் இலைகள் அகலமானவைகள். கிளைகளைச்சுற்றி வளையம் வளையமாயிருக்கும். அடி விசாலமும் நுனி ஒடுக்கமுமானவை. கரூலத்தின் குழல் குறுத்தது. உட்பக்கத்திற் சுணையுள்ளது. இதழ் ஐந்து மடல்களுள்ளது. மடல்கள் வலதுபக்கத்துக்குத் திருகியிருக்கும். ஸ்தமன்கள் நடுப்பகுதியிற் பிடித்தத் துன்னொமலிருக்கும். இதின் குதுவம் நீண்டு தூங்கும். அது கயிற்றுச் சவுக்குப்போன்றது.

(47) 151 ம் பக்கம். எம்டெஸ்மின். Hemidesmine.

இக் கிறிஸ்தற்பதார்த்தம் முதன்முதல் காடினென்பவராலும் பிறகு ஸ்கற் றென்பவராலும் விபரிக்கப்பட்டது. இதுவோர் ஸ்தியரப்தினை⁵ என்பதே கிறிஸ்திசன் பண்டிதரது எண்ணம் அவர் நன்னூரிவேரை வெந்நீரிற் போட்டுத் திஸ்தலித்து இதை எடுத்தோமென்கிறார். இதைப்பற்றி இன்னு மாராய்வது நல்லது.

(48) 151 ம் பக்கம். எருக்கு. Mudar.

இது வந்த எருக்கு என்பதைப்பற்றி வெகு வித்தியாசமான எண்ணங்க ளுண்டு. இதை வைற்பண்டிதர் கவனமாயாராய்ந்து செவ்வெருக்கென்று தான் அவர் உத்தேசித்தாலும் அதை மிகவுந் ஒத்ததான வெள்ளெருக்கு வம னி⁶ சுவேதனி⁷ யாக அதிகம் வீறுள்ளதென்பதற்குச் சந்தேகமில்லை.

1 Corolla. 2 Calyx. 3 Stamens. 4 Anther. 5 Stearopten. 6 Emetic. 7 Diaphortie.

(49) 152 ம் பக்கம். மூடாரின். Mudarine.

இப்பதார்த்தமானது காய்ந்த எருக்கம்வேர்ப்பட்டையிலிருந்து டன்கன் என்பவரால் முதன்முதல் எடுக்கப்பட்டது. இது வமனியாய்ச் சேஷடித்த தென்று அவர் கண்டு அவ்வேரின் சத்தப்பதார்த்தம் இதுதானென்றெண்ணினார் இதைத் தண்ணீரில் கரைத்தால் அந்த நீர் சூட்டுக்கு உறைந்து அது குளிரும்போது மறுபடி நீராகுந்தன்மை உள்ளது. டன்கன் என்பவர் எருக்கைப் பற்றிய தமது எழுத்தில் அதின் கூறுபாட்டைப்பற்றியும் தன்மைகளைப்பற்றியும் அதிகம் பிரயோசனமான குறிப்புகள் சொல்லியிருக்கிறார். வன்சமறின் பண்டிதர் தமது எழுத்திலே எருக்கிலிருந்து எடுத்தவோர் அல்கலைவத்தை¹ வமனிபாகத் தாம் வழங்கி வெகு சித்திகண்டதென்று குறித்திருப்பது இப் பதார்த்தமாய்த்தானிருக்கவேண்டும்.

(50) 152 ம் பக்கம். எருக்கு. Mudar. (உபயோகம்.)

இது குஷ்ட²ரோகத்துக்கு உபயோகமானதென்பதைப் பற்றிச் சிலர் சாட்சியிட்டிருக்கிறார்கள். சிலர் கையில் இது சித்திபெறவில்லை. மேலும் சிவ்லிசு³ நோய்களுக்கும் தொல்லையான விரண்சங்க⁴ளுக்கும் நல்லதென்றும் சிலர் எழுதியிருக்கிறார்கள். நாட்டு வைத்தியர் இதை அதிகமாய் வழங்குவார்கள். சுதேசிகளுக்குண்டாம் திசந்தெரிக்கு⁵ இது உவந்த மருந்தென்று துறந்தர் மெய்ச்சுகிறார். இந்நோயில் இபிகாக்குக்கு⁶ இது உத்தம பதிலாகுமென்பது அவரது எண்ணம். வளர்ந்தோர்க்கு அதிபிரமாணத்திற் துவங்கிச் கொடுப்பார். இருபது கிறேனுக்குக் குறையாமற் கொடுக்கத் துவங்கி ஒருதிராழுக்கு மிஞ்சாமற் கொடுப்பார். வழக்கமாய்ச் சிறுபிரமாணம் கொடுப்பதே வாசி. பிள்ளைகளுக்கு ஒருவயசுக்கு இரண்டொருகிறேனாக நாள் மூன்று நாலுமுறை கொடுப்பார் இதின் தன்மை இபிகாக்குக்குச் சரியானதாயிருக்கக் கண்டார். அதைப்போல இதையும் காரியத்துக்குத்தக்கதாய்ப் பலவகையாய்க்கலந்துகொடுக்கலாம். யுரோபருக்கு⁷ இம்மருந்தை அவர் கொடுத்தறியவில்லை.

(51) 153 ம் பக்கம். குறிஞ்சா. Indian Ipecac.

இதைப்பற்றிக் கொர்கபதிரிகு பண்டிதரதுகுறிப்புகள் தீர்க்கமானவைகள். வேர்ச்சூரணத்தையும் சாற்றையும் மைசூர்ச்சனங்கள் வமனியாக வழங்குகிறார்களென்று அவர் சொன்னபின்பு, தாம் இம் மருந்தை ஆயிரம்பேருக்குக் குறையாமற் கொடுத்து, மெத்த உவந்ததாகக் கண்டோமென்கிறார். திசந்தெரிக்கும் வமனியாகவும் இது இபிகாக்குக்குச் சரிவந்ததாம். தேயம் இருபதுதொடங்கி மூப்பதுகிறேன்; கடுமையாய் வாந்திக்கவேண்டுமாகில் இத்துடன் அரைக்கிறேன் ஒருகிறேன் தாத்தரந்திமனியுஞ்⁸ சேர்க்கலாம். திசந்தெரி முறைச்சுரத்தோடு கூடி உண்டானதாகில் அத்துடன் கினியமுங் கூட்டி⁹ கொடுக்கலாம். காய்ந்த இலைமாவையே தாங் கொடுக்கிறதாம். வேரை வழங்கினால் இக்கொடி சுறுக்க அற்றுப்போம். மேலும் இலையைப் போல வேர் நயப்பானதாயிருக்கவில்லையாம். சாறு எடுப்பது தொல்லை. நாடபட்ட கதார்⁹ இருமல்களுக்கு அது உவந்தது. வமனியாகமாத்கிரமல்ல

1. Alkaloid, 2 Leprosy, 3 Syphilis, 4 Ulcerations, 5 Dysentery, 6 Ipecac.
7 Europeans, 8 Tartarate of Antimony, 9 Catarrh.

திசெந்தரி. ஈளை, கதார் நோய்களுக்கு மருந்தாகவும் இது சத்துள்ளதென்பதை முடிவென செநீவர் முதலியோர் உறுதிப்படுத்துகிறார்கள். இவர் சொல்லுகிறபடி பாம்புகடிக்கு முதற் குறிஞ்சாச் சாற்றைக் கொடுத்து வாந்திசெய்தபின்பு செறியும் ஸ்திமுலங்கள்¹ கொடுப்பதே உத்தம பரிசுரிப்பு. இந்த எண்ணங்களைப் பிதி வைத்தயரும் உறுதிப்படுத்துகிறார். இபிகாக்கு, அந்திமனிதாத்தரகம் என்பவற்றைப் போல இது சோஷிக்கப்பட்டு உரோதர நரம்பிற்² பிடிப்பதால் வாந்திசெய்கிறதென்பது இவர் எண்ணம்.

(52) 159 ம் பக்கம். சிரட்துச்சி. Chiretta.

தென்னிந்துவின் வைத்தியசாலைகளில் வழங்கும் சிரட்குச்சியின் இனங்களைப்பற்றிக் கிளெகோண வைத்தியர் எழுதியிருக்கிறார். அதிலே மூன்று இனங்களுண்டாம்.

(53) 166 ம் பக்கம். ஜிரிக்விரா. Kaladana.

இதைப்பற்றி ஒஷானசி பண்டிதர் முதலானோர் எழுதியிருக்கிறார்கள். பிதி வைத்தியர் இதின் விரேசனத்தன்மையைப்பற்றிச் சாட்சியிட்டு இதிலிருந்து தாம் எடுத்த ராளமாகிய வாபீதீசின்³ என்ற பதார்த்தத்திற் கொஞ்சத்தை மாதிரிக்காக வாறிங்குபண்டிதருக்கு அனுப்பியிருக்கிறார். இச் சாட்சிகளிலிருந்து மற்றும் வைத்தியரது எழுத்துக்களிலிருந்தும் இது பதனமான இளம் விரேசனியென்றே விளங்குகின்றது. ஆயினும் வளர்ந்த ஒராளுக்கு ஒரு விரையைக் கொடுத்ததினால் கடுமையாய்ப் பேதிபண்ணினதைப்பற்றி வம்பாயிலுள்ள திமக்கு பண்டிதர் எழுதியிருக்கிறார். இதை யோர் விதிவிலக்கான காரியமென்று எடுக்கவேண்டும்.

(54) 172 ம் பக்கம். நிலவேம்பு. Kariyat.

இப் பூண்டின் தன்மை உபயோகங்களைப் பற்றி விளெமிங், என்ஸ்லி முதலானோர் எழுதியிருக்கிறார்கள். இதின் தாவர தன்மைகளைப் பற்றி விபரமாயெழுதியிருக்கிற ரக்ஸ்பேகர், மகா கசப்பு என்று கருத்துப்பட்ட இந்து ஸ்தானிப் பெயரை இதற்கு இட்டு இது சாரமுள்ள மெத்தப் பெயர்பெற்ற மருந்தென்றுஞ் சொல்லுகிறார்.

(55) 177 ம் பக்கம். பிரசவகாத்துக்குப் பெப்பர்மிந்துத்தேல்.

Oil of Peppermint in Puerperal Fever.

தோவு என்பவர் இதைப்பற்றி எழுதியிருக்கிறார். அவர் பிரசவசுரங்களில் அருவருப்பான தர்ப்பந்தின்⁴ தேலுக்குப் பதிலாக இந்த எண்ணெய்கைக் கொடுக்கலாமென்கிறார். இதைக் கொடுக்கமுன் தீவனமானவோர் விரேசனங்கொடுத்து அகன்பின் இருபத்துநாலு மணி வேளைக்குள்ளே மூப்பதுநாற்பது துளி வரைக்குக் கொஞ்சங் கொஞ்சமாய்க் கொடுக்கலாமென்கிறார். இப்பிரயோகம் பெரும்பாலும் வாய்த்தது. மற்றெந்த அத்திரதேலு⁵ தர்ப்பந்தினைப் போலவே சேஷடிக்குமென்பது அவர் கருத்து.

1 Diffusible Stimulant. 2 Pneumogastric nerve. 3 Pharbitisin. 4 Turpentine. 5 Volatile oil.

(56) 187 ம் பக்கம். ஊமத்தை. *Datura*. (நஞ்சு).

இந்துதேசத்திலே ஊமத்தையை நஞ்சாக ஊட்டி ஆட்களைக் கொல்லுகிற ஓர்வகுப்பான ஆட்களுண்டு. இதைப்பற்றி டோர்மன் வைத்தியர் வங்காள வைத்திய போதனியில் விபரமாயெழுதியிருக்கிறார். பால்மர், ஏர்வீங், பண்டிதர்களும் இதைப்பற்றி எழுதியிருக்கிறார்கள்.

(57) 189 ம் பக்கம். அயசீயமசேசிற்சுத்து.

Extract of *Hyoscyamus*.

அயசீயமஸ் பூடு இந்துதேசத்திற் கொண்டுவரப்பட்டுச் சமமான தரைகளிலே செளிப்பாய் வளர்க்கப்படுகின்றது. தெக்கணத்திலே கூறா என்ற ராசாங்கத் தோட்டத்திலே செய்யப்பட்டு, வம்பாய்ப் பட்டாளத்திலே வழங்குவதற்கு வருஷாந்தம், 150 தொடங்கி 200 இரூத்தல்வரைக்கு அனுப்பப்படுகிற எசுரூத்தைப்பற்றி, வின்செஸ்தர் பண்டிதர் வெருவாய் விதந்துபேசுகிறார். மேலும் மைசூரிலே கில்போஸ் என்பவராலே அதிக அளவான எசுரூத்துச் செய்யப்படுகின்றது. இது சென்னைச் சிவில் ஆசுபத்திரியிலே சோதிக்கப்பட்டு யுரோப சரக்கைப் போலத் திறமானதென்று தீர்மானிக்கப்பட்டது. இதையும் மற்றுஞ் சரக்குகளையும் இந்துவிலே செய்பவர்களைத் தைரியப்படுத்தவேணுமென்பது மிக முக்கியம்.

(58) 190 ம் பக்கம். ஈர்ப்புகிப்புக்கையிலே.

Tobacco in Tetanus.

ஈர்ப்பு வியாதியிலே புகையிலைப்பாப்பையை முள்ளந்தண்டுக்கு இடுவது நல்லதென்று திமக்கு வைத்தியர் சொல்லுகிறார். இப்பிரயோகத்தை லீத்துப் பண்டிதரே வம்பாய் ஆசுபத்திரியிற் செய்தவர். இதால் மெத்த நயங்கண்டதென்று திமக்கர் சொல்லுகிறார். இதைச் சோதித்துப் பார்ப்பது நலம்.

(58) 207 ம் பக்கம். காட்டுக்கறுவா. *Cinnamomum iners*.

(லவங்கப்பட்டைக்குத் தாய்.)

இந்த மரம் வடக்குக் கன்னடத்திலுள்ள பாலக்காட்டு வனங்களிலே மிகுதியாய் நிற்கிறதென்றும் ஒருமுறை பிறதேசங்களுக்கு அதிகமாய் ஏற்றப்பட்ட லவங்கப்பட்டை அந்தஇடத்திலிருந்து சேர்க்கப்பட்டதென்றும் ரோசு வைத்தியர் சொல்லுகிறார். சிறுக் கொப்புகளின் பட்டையைச் செவ்வையாய் எடுத்தால் கறுவாப்பட்டைக்குச் சரியாகும். வம்பாய் ராசாங்கத்தார் தமது புத்தியின்படி இம்மரங்களை வளர்க்கிறார்களென்றும் அதிலால் வருமானமதிகப்படுகிறதென்றும் ரோசர் சொல்லுகிறார். இதைக் கறுவாப்பட்டைக்குப் பதிலாய் வழங்கலாமென்றும் அதற்கு இது குறைந்த தல்லவென்றும் அவரே சொல்லுகிறார். இதற்குக் கன்னடக் கூட்டு லவங்கம் என்று பெயர்.

(59) 209 ம் பச்சம். சந்தனக்கட்டை. *Santalum album*.

சந்தனக் கட்டையையும் அதிலிருந்து அத்திரதேல்¹ எடுக்கும் முறையையும் பற்றிப் பிதிவைத்தியர் எழுதியிருக்கிற குறிப்பு அவர் தாமே செய்த ஆராய்வுகளின் பேராய்வுப்பதால் மெத்த உபயோகமானது. அதை இவ்விடந்தருகிறோம். 'சந்தனமரம் பதினைந்து பதினாறு முழ உயரத்துக்கு மேற்படாத ஓர்சிறிய மரம். இது எங்குங் கிடையாது. மைசூரிலே இது மிகுதி. அங்கே மேற்குக் காற்றாடி மலைகளின் கிழக்குச்சாரலில் மழை நாடுகளுக்கு அப்பால் வளருகின்றது. இதை ராசாங்கத்தார் கவனமாய்க் காத்துப் பதினெட்டு வருஷம் முதல் இருபத்தைந்து வருஷம் வரைக்கு வளர்ந்து முற்றினபின்பே தறிப்பார்கள். வருஷமுடிவிலே தறித்துப் பட்டையை உரித்தபின் அந்தந்தக் கடைகளுக்குக் கொண்டுபோய்க் கட்டைகளாக வெட்டிக் கட்டையின் சாதிக்குத் தச்சதாய் வகைவகையாய் வைப்பார்கள். இதுவே வியாபாரத்தில் வரும் சந்தனக்கட்டை. இது வருஷந்தோறும் ஏலத்திலே இருத்தற்கணக்காக விற்கப்படும். கொள்ளுவதற்கு வியாபாரிகள் இந்துதேசத்தின் எப்பகுதியிலுமிருந்து வந்து கூடுவார்கள். வாசனையைக் கொடுக்கிற சந்தன எண்ணெய், மரத்தின் வைரமான கருமைகொண்ட நடுப்பகுதியிலே பிரதானமாயிருப்பதால் நேரான உள் வைரக் கட்டைகளே அதிகம் விலைபோகும். மைசூர் இராசாங்கத்தார் சந்தன எண்ணெய்யைச் செய்வதற்கும் வெகுசாலமாக முஸ்தீதுகள் பண்ணியிருந்தார்கள். எண்ணெய் கட்டைகளைப் போலவே வருஷந்தோறும் ஏலத்தில் விற்கப்படும். விசேஷமாய்ச் சீனம் அரபி தேசங்களுக்கு ஏற்றுவதற்கே இதை வாங்குவார்கள். கட்டையைத் திஸ்திலித்து எண்ணெய் எடுப்பார்கள். வேரிவிருந்து உத்தமமான எண்ணெய் அதிக அளவாய் எடுக்கலாம். திஸ்திலிக்கும் ஏனம் வட்டிப்பான வாயிலே உடைய பருத்த வோர் மட்பாண்டமே. அது 2½ அடி ஆழமாயும் 6½ அடி சுற்றளவுள்ளதாயுமிருக்கும். இதற்குள்ளே சாமான்களைப் போட்டு வாயிலே ஓர் சட்டியால் மூடி அச் சட்டியின் மையத்திலோர் துவாரம் விட்டு அதற்குடே ஆவி புறப்படுவதற்கு ஏறக்குறைய 5½ அடி நீளமான வோர் செப்புக்குழலை இடுவார்கள். இக் குழலின் வெளித்தலைப்பை ஓர் செம்பேனத்திலிட்டு இதைத் தண்ணீருள்ள இன்னொரு பாத்திரத்துக்குள்ளே வைப்பார்கள். திஸ்திலிப்பதற்குச் சந்தனமரத்தின் வெண்மையான வெளிப்பகுதியை எடாமல் தள்ளிவிட்டு வைரமான உட்பகுதியைச் சீவல் சீவலாக வெட்டி அதிலே 50 இருத்தலை மட்பாண்டத்துட் போட்டுச் சிராயை மூடத்தக்கதாய்த் தண்ணீரும் விட்டுப் பத்துநாள் இராப்பகலாகத் திஸ்திலித்து எண்ணெய் முழுவதையும் எடுப்பார்கள். தண்ணீர் குறையக்குறைய மென்மேலும் வார்ப்பார்கள். நல்ல சாதியான சந்தனக்கட்டையிலிருந்து 50 இருத்தலுக்கு 20 அன்சு வீதமாய் அதாவது நூற்றுக்கு 2½ வீதமாய் எண்ணெய் பிறக்கும். சந்தன எண்ணெய் உருவொளியும் வெண்மஞ்சளநிறமுமானது. ராசச்சுவை உடையது. நல்ல வாசனை உள்ளது. சில துளியைக் கையிலே விட்டுச் சாதித்சம்போது வாசனையைத் திறமாய்க் கமழும். இதின் விசேஷகிராவிதம் 0.980. சந்தனக்கட்டையைச் சுதேசிகள் பலவகையாய் வழங்குவார்கள். சுகந்தமாகவும் மருந்தாகவும் வழங்கப்படும். இது குளிர்மையுள்ளதென்று எண்ணுகிறார்கள். இதில் எண்ணெய் இருப்பதால் ஸ்திமுல² தன்மையும் இதற்கிருக்கவேண்டும்.

1 Volatile oil, 2 Stimulant.

(60), 210 ம் பக்கம். பாம்பு கடிக்கு ஈசுரழல்.

Aristolochia Indica for snake bites.

பாம்புகடிக்கு மருந்தை அறிவது முக்கியமென்பதை இவ்வீடையூறினால் சீவமோசம் வழக்கமாய் நடக்கிற ஊர்களிலிருப்பவர்கள் மாத்திரம் அறியக் கூடும். இந்து தேசத்திலே சில ஊர்களிற் பாம்புகடியாற் சீவமோசம் வாடிக்கையாயுண்டாகின்றது. உதாரணமாக சிக்கப்பூர் என்ற ஒரு ஊரிலே மாத்திரம் ஒரு காலத்திலே பாம்பினால் கடியுண்டவர்கள் 306 பேர் என்றும், அவர்களுள் 63 பேர் அதாவது நூற்றுக்கு 20.53 வீதமாய் மரணித்தார்களென்றும் அங்கிருந்த சிவில் சத்திரீகன் இம்லாக்கென்பவர் அறிவித்தார். மற்றும் பகுதிகளைப் பற்றியும் இவர் அறிவித்திருக்கிறார். ஒரு மாகாணத்தில் ஒரு காலத்திலே இக் காரணத்தாலுண்டான மரணம் 300 ஃகுக் குறையாதென்று ம் இவரது எழுத்திலிருந்து விளங்குகின்றது. இன்னொரு உதாரணத்தை மன்றோ என்பவரது எழுத்திலிருந்து தருகிறோம். மிதுனபுரம் என்ற ஒரு சில்லாவில் மாத்திரம் ஒரு காலத்திலே இருபத்தொரு மாசத்துக்குள்ளே 402 மரணம் பாம்புகடியாலுண்டானதென்று றிப்பொடுத்துகள் காட்டுகின்றன. இதற்கு மாற்றுமருந்து தாவரவகைகளில் எதிலாவது இருக்குமாகில் அது அரிஸ்தலோகியம்¹ என்ற வகுப்பில் இருக்கவேண்டுமென்பதற்கு நியாயம் இந்நூலில் பின்னொரு பகுதியிற் காட்டப்பட்டது. இதுவரையில் அறிந்த மட்டில் அமோனரீருக்கு²மேற்பட்ட மருந்தில்லை.

(61), 212 ம் பக்கம். நேர்வாளக் கோட்டை. Croton Seeds.

நசுக்கின நேர்வாளக்கோட்டை யொருதிருமைத்³ திட்டஸ்பிறிது⁴ அன்சு நாலிற் போட்டு ஊறவிட்டு வடித்த வாளரஞ்சு⁵மானது எக்சீமம்⁶, லெகன்⁷, இத்தையோசி⁸, எரிதீமம்⁹ முதலிய சருமநோய்களுக்குத் தீவன பூச்சாகுமென்று வில்சன் பண்டிதர் விதத்துபெசுகிறார். அவர் அதை வீறு குறைத்து வாளரஞ்சம் திரும் 1; ரோஸ்மரிஸ்பிறிது¹⁰ அன்சு 1; ரோசைரீர் அன்சு 3. இந்த வீதமாய்க் கலந்து வழங்கினார். இந்துதேசத்திலே லேசிற சம்பாதிக்கக் கூடிய இப்படி யொருமருந்தை அத்தேசத்தாருக்குள்ளே வாடிக்கையாயிருக்கிற தொல்லையான சருமநோய்களுக்குச் சோதிப்பது தகுதி.

(62), 213 ம் பக்கம். ஆமணக்கு. Ricinus Communis.

இந்துதேசத்திலே இரண்டுவகையான ஆமணக்கு உண்டு. ஒன்று பெரிது. ஒன்று சிறிது. சிற்றாமணக்கே திறமென்பது பொதுவான எண்ணமாயினும், விரேசனத்தன்மையில் இரண்டுஞ் சரியெனக் கண்டொமென்று பிதிபண்டிதர் கூறுகிறார். இந்துதேசத்தின் மிகுதியான கடைகளிலிருக்கும் ஆமணக் கெண்ணெய் தடித்தது; கபிலநிறமானது. கோட்டையை வெய்யிலிற் காயவைத்து இடித்து அவித்து நசுக்கி அதை வடிப்பார்கள். இராசாங்கத்தாரது குதங்களில் வாங்கும் ஆமணக்கெண்ணெய்யைப்பார்க்க அது செயலில் மெத்த வீரானது. வாளச்செடி ஆமணக்கஞ்செடியோடு வளர்ந்து வாளக்

1 Aristolochiaceae. 2 Liquor Ammonia. 3 Drachm. 4 Rectified spirit.

5 Tincture of croton. 6 Eczema. 7 Lichen. 8 Ichthyosis.

9 Erythema. 10 Spirit of rosemary.

கொட்டை ஆமணக்கங்கொட்டையோடு தெரியாமற் சலந்துகொள்ளுகிறபடியால் இப்படியிருக்கிறதென்று வின்செஸ்தர் பண்டிதர் சொல்லுகிறார். முத்தற்றமான ஆமணக்கெண்ணெய் இர்துதேசத்தின் பல குதங்களிலும் நசுகி வடிக்கப்படுகின்றது.

(63), 214 ம் பக்கம். கமாலம். Kamala. (கிருமிகொல்லி)

இதைப்பற்றி வெளியரங்கப்படுத்தினவர் மக்கினன். அவரும் இன்னும் சிலரும் எழுதியிருக்கிறார்கள். அன்றசன் பண்டிதர் இச் சரக்கின் முழு விபரமுங் கூறுகிறார். வினக்கியர் புதுவகையானவோர் கமாலத்தைப்பற்றி அறிவித்திருக்கிறார். குக்குமாட்சியாற் சோதிக்கும்போது இவைஇரண்டுக்கும் வித்தியாசமாயிருப்பதன்றிப் புதுக்கமாலம் பழையதைப்பார்க்கக் கருமை கொண்டது; அதிகம் பருக்கிறது; அசுத்தக் கலப்புடன் அற்றது. இது இன்னொரு இனத்தின் மாவாயிருக்கவேணும்.

(64), 222 ம் பக்கம். மாசக்காய். Galls.

முறைச்சுரத்துக்கு மாசக்காய் கொடுப்பது பண்டுதொட்ட வழக்கமாயினும் அதைப் பத்துக்கிறேன் பன்னிரண்டு கிறேன் தேயத்தில் நிலவேம்பின் பூசத்தோடு கொடுத்தால் மெத்த உபயோகமாகுமென்று காட்டி இர்துதேசத்து வைத்தியருக்கு இதை வழங்கவேணுமென்று தற்காலத்தில் கவனப்படுத்தினவர் திமின்ஸ் பண்டிதரே. கார்னிஷ் என்பவரும் இதைச் சோதித்துப் பார்த்து அவர் எண்ணத்தை உறுதிப்படுத்தினார். தம்முடைய நோயாளர் 101 பேரில் அரைவாசிப்பேருக்கு அதை மாவாக்கி இருபது முப்பது கிறேன் தேயத்தில் நாள் மூன்று நாலு முறை கொடுத்தார். மற்றும் பேருக்கு அரைநாழி தண்ணீருக்கு அரை அன்சு வீதமாய்ச் செய்த இன்பூசத்தில் ஒன்றரை அன்சு முதல் மூன்று அன்சு வரைக்குக் கொடுத்தார். ஆயினும் இவரது கலவையை வங்காள விசிகத்தில் அதிகமாய்க் கொடுத்துச் சோதித்து நயப்படவில்லை.மென்றும் இம் மருந்து மற்றுஞ் சுதேச மருந்துகளுக்குச் சரிவந்ததல்லவென்ற கருத்துப்பட மக்வேசன் பண்டிதர் சொல்லுகிறார். ஒரு பேதி மருந்தோடுஞ் சொற்பதுவரோடுஞ் சிலநாள் வைத்தியத்திலிருந்து சுகப்பட்டக்கூடிய லேசான சுரங்களுக்கே இது உவந்ததுபோற் தோற்றுகின்றது.

(65), 228 ம் பக்கம். கஞ்சா. Cannabis Indica. (தன்மை.)

கஞ்சாவின் உபயோகத்தைப் பற்றிக் கிரிஸ்திசன் பண்டிதர், தாம் இச்சாக்கைப் பரீட்சித்தனவிற பின்வருங் குறிப்புகளை எழுதியிருக்கிறார். அவர் சொல்வது “ கற்குத்தாவிலிருந்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னே எனக்கு அனுப்பப்பட்டவோர் அலக்காஸெசுரத்தைச்¹ சில வருஷங்கள்நான் வழங்கிவந்தேன். அது இன்னும் வீறன்னதாயிருக்கின்றது. மாலியம்² இணங்காமல் அதை வேண்டாமென்று சொன்னவர்களுக்குத்தானும் இது வருத்தத்தைத் தணித்து நித்திரையை வருவித்து ஸ்பசத்தை³ மாற்றினது. இதை அதிகமாய் வழங்கிப்பார்த்த அனுபவத்தைக்கொண்டு இதைப் போதிய பிரமாணமாய்க் கொடுத்தால் அதற்கு இது உத்தமமான பதிலாகுமென்று பூரண

1 Alcoholic Extract. 2 Morphia, 3 Spasm,

திருப்தி கண்டேன். எசுரூத்தின் தன்மையைப் பற்றியாவது அதைச் செய்ய வழங்குங் கஞ்சாவின் தன்மையைப்பற்றியாவது செயல் பேதப்படுவது நிச்சயம். அந்த அலக்காலெசுரூத்திலே இரண்டு கிறேனை ரஞ்ச¹மாக்கிக் கொடுக்க, பித்ததாரையிற் றடங்கிநின்ற பித்தக் கல்லா²லுண்டான கடுமூபாதி பூரணமாய் மாறினதாகக் கண்டேன். இது பெலனான அனுடைன்³ என்பதற்கு இதைவிடச் சோதனை வேண்டியதில்லை. பெலன் நிச்சயம். வசதியெல்லாவற்றிலும் கஞ்சாவானது அவினுக்கும் அதின் சேர்வைகளுக்கும் அடுத்ததான, ஆம் அதற்குச் சரிவந்த அனுடைன், கிராகி⁴, அந்திஸ்பசி⁵, என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன். கொடுப்பதற்கு அலக்காலெசுரூத்தே எவ்வகையிலும் உத்தமமென்பதும் அதைப் பழங்கஞ்சாவிலல்ல சரியான இடத்திற் பருவகாலத்தில் சேர்த்த நல்ல கஞ்சாவிற் செய்யவேண்டுமென்பதுமே அவர் எண்ணம். வாடிக்கையான லேகியம் பெரும்பாலும் அசுத்தமானது; நம்பப்படக் கூடாதது. கஞ்சாவின் செயலைப்பற்றிய பூரணமான விபரம் இச்சரக்கை முதல்முதல் வெளியரங்கப்படுத்தின ஓஷானசி பண்டிதரால் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. இதின் கிராகித் தன்மையைப்பற்றி விற்முலர் எழுதியிருக்கிறார். பிரசவ நோக்காட்டைக் கிளப்புமென்று கிம்சன்பண்டிதர் முதலியோர் எழுதினார்கள். சுதேச பட்டாளத்திலே கஞ்சாக்குடி எவ்வளவாய்ப் பரம்பியிருக்கிறதென்றும் அதின் கேடுகளைப் பற்றியும் லாறென்ஸ் எழுதியிருக்கிறார்.

(66), 241 ம் பக்கம். சுகீது. Ginger. (கண்ணெய்களுக்கு இட.)

கண்ணிலுண்டாம் நோய்களுக்குச் சுக்கு இடப்படுவதைப் பற்றித் தேன்புல் என்பவர் எழுதியிருக்கிறார். இந்நோய்களில் சுக்கு ஏதும் அருட்டுந்தன்மையுள்ளதோவென்பது சந்தேகம்.

(67), 268 ம் பக்கம். புற்றேல்கள். Grass oils.

பலவகையான லேமன்⁶தேல்களை ஈகின்ற புல்வகையைப்பற்றி ஆராய்வு செய்கின்ற மன்றோ என்பவர் அதைப்பற்றிய உபயோகமான சில குறிப்புகள் எழுதியிருக்கிறார்.

(68), 268 ம் பக்கம். காமாட்சிப்புல். Lemon grass.

இந்நூலைப் பிரசுரஞ்செய்தவர் இதின் எண்ணெய்யைச் சோதித்துப்பார்த்தவரையில் வாதம் முதலிய வருத்தமான நோய்களுக்கு அது நல்ல பூச்சாயிருப்பது மாத்திரமல்லாமல் உள்ளே கொடுத்தால் தீவனியும்⁷ சுவேதனியுமாகுமென்று விதந்து பேச நியாயமுண்டு. தென்னிந்தியில் வசிக்கிற சுதேசிகளுக்குள்ளேயும் இந்து பிறித்தனருக்குள்ளேயும் இது வார்திபேதிக்குப் பேர்பெற்ற மருந்தாயிருக்கின்றது. இது நிச்சயமாய் வார்தியைத் தணித்துத் தேகக்களையை மாற்றினதை அவர் கண்டார். அவ் வியாதியின் முகனையில் இதை இன்னுங் கொடுத்துப்பார்ப்பது நல்லது. இப் புல்லில் ந⁸லு அன்னைசு அரைநாழி வெந்நீரில் ஊறப்போட்டுச்செய்த இளஞ்சூடான இச் சூசம்⁹, நய

1 Tincture. 2 Biliary calculus. 3 Anodyne 4 Narcotic. 5 Antispasmodic. 6 Lemon. 7 Stimulant. 8 Diaphoretic. 9 Infusion

மென்று ரோக பண்டிதர் சொல்லுகிறார். காய்ச்சற்காரருக்கு விசேஷமாய்ப் பெலவீனருக்கு அல்லது சுரம்சன்னிவச்சு¹மாயிருந்தால் இதைச் சுவேதனியாகக் கொடுத்துச் சித்திகண்டோபென்று அவர் சொல்லுகிறார். விஷக்காய்ச்சலுள்ள ஊர்களில் நெடுங்காலக் காய்ச்சலின்பின்னுண்டாகும் நீர்க்கோவை வியாதிகளுக்கும் இவர் சொல்லுகிறபடி இது அதிகமாய் வழங்கப்பட்டு மெத்த உபயோகப்படுகின்றது.

(69), 269 ம் பக்கம். ருசுகாதேல். Rusakatel.

இந்த எண்ணெய்யைப்பற்றி மச்சவல் பண்டிதரே 1825 ம் ஆண்டு அறிவித்தார். சென்னைப்பட்டினத்தில் இது சிலரால் பரிசோதிக்கப்பட்டவரையில் இதை வாதத்துக்குப் பூசினால் முகனையில் இதாற் சகாயமுண்டாகும். கடுமையான நாட்பட்ட வாதத்துக்கோ இதால் காணும் நயம் சொற்பம். நிமக்கு முதலியோரும் இதை விதந்து பேசுகிறார்கள். சொதித்துப் பார்த்தவரையில் இதிலே யோர் சுத்தமான அத்திரஎண்ணெய்யும்² நீரான ராளமும்³ கலந்திருக்கின்றன. எண்ணெய்யில் அக்சிதம்⁴ சேர்ந்ததால் ராளமுண்டானது போலும்.

(70), 273 ம் பக்கம். இலங்கைக் கடற்பாசி. Ceylon Moss.

இதை ஓஷானசி முதலானோர் கூறுபடுத்தியிருக்கிறார்கள். பரைரர் அதைச் சேர்த்துத் தன்மை உபயோகங்களையும்பற்றி விபரமாயெழுதியிருக்கிறார்.

(71), 286 ம் பக்கம். அட்டை குடிக்கும் இரத்தத்தின் அளவு. Leeches.

இந்துஅட்டையின் இரத்தம்வாங்குந் தன்மையைப்பற்றி லீத்துப் பண்டிதர் கவனமாய்ப் பரிசோதனைபண்ணியிருக்கிறார். அட்டைகள் பொதுவாய்த் தம் நிறைக்கு நாலு ஐந்து மடங்கான இரத்தத்தைக் குடிக்குமென்று அவர் நிதானித்தார். வத்தியாசம் அட்டைகளின் தன்மைக்கும் நோயாளியின் தோலில் ஓடும் இரத்தத்துக்குந் தக்கதாயிருக்கும். நாலு ஐந்து அன்சு இரத்தம் வாங்கவேணுமாயில் நிறுத்து ஒருஅன்சு அட்டை வீடுப்படி சொல்வார்; பத்துப் பன்னிரண்டு அன்சு இரத்தம் எடுக்கவேணுமாயில் இரண்டரை அன்சு அட்டையும் இந்த வீதமாகவே விடச்சொல்வார் கெட்டிக்காரனானவைத்தியன் இப்படியே கொம்புவைத்தலுக்குச் சரியானநிதானத்தோடு அட்டை வீட்டும் இரத்தம் வாங்கலாமென்று அவர் சொல்லுகிறார். இது கொம்பு வைத்தலிலுர் மிக வாசியானது. வாங்கும் இரத்தத்தின் அளவுக்கு அட்டையின் பருமை எவ்வளவாயுமிருக்கலாமாயினும் அட்டைக் கடியின் தொகையைக் குறைப்பதால் நோயாளிக்கு அதாலுண்டாகும் வருத்தத்தையும் பிறகு சித்திக்கொண்டிருக்கும் இரத்தத்தையும் குறைக்கலாமாகையால் பருத்த அட்டைகளை வீடுவதே நல்லது. வம்பாயிலுள்ள அட்டைகள் மிகச் சிறியவைகளென்றும் அவைகளில் துற்றெண்பது கூடி மூன்றுஅன்சு நிறுத்ததென்றும் முதலே அட்டைக்காரனோடு ஒழுங்குபண்ணியிராவிட்டால் பன்னிரண்டு பதினெட்டு அட்டைகள் கூடி ஒரு அன்சு நிறுக்கத்தக்க பருமம்

1 Typhoid fever 2 Volatile oil. 3 Resin. 4 Oxygen.

அட்டைகளை வாங்குவது பிரயாசமென்றும் லீத்துச் சொல்லுகிறார். அட்டைக்காரனுக்கு மாசாந்தஞ் சம்பளங்கொடுக்கிற ஆசுபத்திரிகளிலோ திரும்பத்திரும்ப வழங்குவதால் அட்டைகள் பருக்கிறபடியால் அங்கே பரும் அட்டைகளை வாங்குவது லகு. அட்டைக்காரனுக்குக் கண்டிதமாகவும். முன் விட்ட அட்டைகள் இரத்தங் குடித்துப் பிழியப்பட்ட களை தேற மூன்று வாரஞ் செல்லும், அதற்குமுன் அவைகளை விடாமற்றப்பதற்குமாக இரத்தங் குடிக்க விடுவதற்கு முன்னும் பின்னும் அவைகளை லீத்தர் நிறுப்பித்தறிவது வழக்கம். இந்துவட்டைகளைப்பற்றி லீத்தர் எழுதிய படிப்பனையுள்ள இக் குறிப்புகளுக்கு வியாக்கியானமாக, யுரோப அட்டைகளைப்பற்றி மொகிந்தாண்டர் கண்ட முடிப்புகளையும் இவ்விடங் கூட்டித் தருவது நல்லது. சிறு அட்டைகள் தம்மிலும் இரண்டரை மடங்கு நிறையான இரத்தங் குடிக்கும். நடுராசியான சிறு அட்டைகள் நாலு மடங்கும், நடுராசியான பரும் அட்டைகள் ஐந்தரை மடங்குங்குடிக்கும். பெரிய அட்டைகள் ஐந்து மடங்கும் பதினொன்றிலொருபங்குங் கூடக் குடிக்கும். இவற்றின் வகைகட்டு லீத்தரது கணக்கை உறுதிப்படுத்துகின்றது.

(72), 286 ம் பக்கம். அட்டை வளர்க்குமுறை.

Hirudiniculture in India.

இந்ததேசத்தார் அட்டையை வளர்க்கும் முறையைப் பற்றிக் கிப்சன் பண்டிதர் முதலானோர் திறமாயெழுதியிருக்கிறார்கள். ஆயினும் வேசன் என்பவர் வழங்கியதும் அவருக்குப் பின் வேசனீர் என்று அழைக்கப்பட்டதுமான அணியமே திறமானது. அதை எவ்விடத்திலும் வழங்கலாம். அது வோர் மட்குடமே. அதின் அடிப்பகுதி அட்டை புசமாட்டாத சிறிய கண்ணாறாள் உள்ளது. அதற்குள்ளே மண்ணும் தண்ணீரும் விட்டுச் சேருக்கி அட்டைகளை விட அவைகள் அச் சேற்றுக்குள்ளே புகுந்து கிடக்கும். குடத்தின் வாயிலே இரட்டுப் புடைவையால் மூடிக் கட்டுவார்கள். அட்டைகளைத் தூரமான இடத்துக்கு அனுப்பவேண்டுமாகில் மண்ணை இன்னும் அதிக குழையலாக்கிக் குடத்தை யோர் பிரப்பம்பெட்டியில் வைத்து அனுப்பலாம். அட்டைகளைப் பேணுவைக்கவேண்டுமாகில் அக்குடத்தை நாலு இஞ்சு வரைக்குத் தாளத் தக்கதாய்த் தண்ணீரில் வைத்துவிடலாம். தண்ணீர் குடத்துக்குள்ளே சுவறுவதால் மண்ணின் கீழ்ப்பங்கு குழைவாகும். மேற்பங்கோ காய்வாயிருக்கும். அட்டைகள் தங்களுக்குப் பிரியமான இடத்திலிருந்து வளர்ந்து பெருகும். அட்டைகளைப் பேணவும் அனுப்பவும் பெருக்கவும் இவ்வணியமே உவந்தது.

(73), 287 ம் பக்கம். மேற்கிந்துவின் வைத்திய அட்டை.

Medicinal Leech of Western India.

மேற்கிந்துவிலுள்ள வைத்தியத்தில் வழங்கும் அட்டையைப்பற்றி காட்டர் பண்டிதர் பின்னாலவரும் விபரம் சொல்லுகிறார். இரத்தம் குடித்து இளைப்பாறினபின் இது இரண்டு மூன்று இஞ்சு நீளமாயிருக்கும். அதற்குமுன் குறைவாயிருக்கும். மேனி அடங்கலும் முள்ளு அடர்ந்திருக்கும்.

1 Vayson, 2 Vaysonier.

முதுகு பச்சைநிறமாயும் வயிறு அதிலும் வெண்மையாயுமிருக்கும். முதுகில் எழு வரிகள் ஒழுங்காய் ஒடியிருக்கும். அவைகளுள் மையவரி மற்றவைகளிலும் அதிகம் தொடர்பாயிருக்கும். வயிற்றிற் புள்ளி இல்லை. முதுகு வயிறு இரண்டுக்குமிடையிற் பக்கத்திலே ஒவ்வொரு மஞ்சள்வரி எல்லையாயிருக்கும். தலைவிற்பன்னிரண்டு கண்கள் பின்வருமொழுங்கின்படியிருக்கும். இரண்டு கண்கள் முதற்பிரிவுக்கு முன்னே நடுவரியில் ஒன்றுக்கொன்று கிட்டிக் குறுக்காயிருக்கும். நாலு முதலாம் பிரிவிலிருக்கும். இந்த நாலில் இரண்டும் முதற்சோட்டுக்குப் பின்னே அத்தோடு ஒரேநேரிலிருக்கும். அக்கம்பக்கத்தில் இரண்டு இருக்கும். நாலாம் பிரிவில் இரண்டு இருக்கும். மற்ற இரண்டும் ஏழாம்பிரிவில் இருக்கும். உதட்டின் விளிம்பு ஒப்பமற்றதாய் நடுவிற்புறம் சற்றே கவர்த்திருக்கும். மேலே கண்ட விபரம் இன்னுஞ் சிலருடைய விபரத்துக்கு ஒத்துப்போகின்றது.

(74), 290 ம் பக்கம். கோப்புளவண்டு, கந்தாரிகுக்குப் பதில்.

Mylabris cichori substitute for *Cantharides*.

இயல், வாக்கர், ஓஷானசி முதலியோர் இதைப்பற்றி எழுதியிருக்கிறார்கள். காடுக்கென்பவரே இதைப்பற்றி முதல் 1809 ம் ஆண்டு அறிவித்தவர். அதின்பின் அந்தர் முதலானோர் இதைப்பற்றி மெத்த விசந்தெழுதியிருக்கிறார்கள். வண்டுகளை அந்திசுந்தி சேர்த்துக் கொடுவென்றீர் ஆவியிலே அவைகளைக்கொண்டு அப்பால் அவற்றை வெய்யில் நன்றாய்க்காயவைத்து இறுக்கமாயடைத்த சோக்களிற் பேணிவைக்கும்படி வினையிங்கு பண்டிதர் சொல்லுகிறார். புரட்டாசி மாசமே இவைகளைச் சேர்ப்பதற்குத் தகுந்தகாலமென்று பிதிபண்டிதர் சொல்லுகிறார்.

(75), 292 ம் பக்கம். அப்பிரகம். Indian Isinglass.

இந்தவின் பல பகுதிகளிலேயும் அப்பிரகம் செய்யப்படுகின்றது. ஆயினும் அது நயப்பானதல்ல. வங்காளத்திலிருந்து வருவதைச் சொல்லியென்பவர் கூறுபடுத்தி அதிலே செலதின்¹ நூற்றுக்கு 86 முதல் 92 வீதமாயிருக்கக் கண்டார். இது *Polynemus teria* என்ற மீனில் எடுக்கப்பட்டதென்பதே துணிவு. ஆயினும் இந்த இனத்துக்குச் சலப்பை இல்லையென்றும் ஆதலால் அதிலிருந்து அப்பிரகம் வராதென்றும் டே பண்டிதர் சொல்லுகிறார். மேற்குக் கரையிலிருந்து வருவது பலவகையான மீனில் எடுக்கப்படும்.

(76) 356 ம் பக்கம். பொன்னரிதாரம். Orpiment.

கூட இந்தவின் சில பகுதிகளிலே அந்திபிராடியாக அதிகம் பெயர்பெற்ற பொன்னரிதாரம் என்றவோர் வெள்ளைத் தூளை வங்காள வைத்திய உத்தியோகத்திலிருந்த கிளாக்கென்பவர் கண்டுபிடித்தார். அதைக் கூறுபடுத்திப் பார்த்தபோது அதிலே பாஷாணம் இல்லை. செலினீதுப்பற்பமாய்க் காணப்பட்டது. சுதேசிகள் சமபங்கான செலினீதையும் சுற்றாழைச் சாற்றையும் ஒன்றுயிணைத்த சிறிய மட்டுகைகள் இரண்டிற் போட்டுப் பன்னிரண்டு மணிநேரமாக நெருப்பில் வைத்துப் பஸ்மமாக்கி இதைச் செய்வார்கள். இப்

1 Gelatine. 2 Selenite.

பஸ்பத்தைக் கிளாக் வைத்தியர் ஐந்துகிறேன் பத்துக் கிறேன் தேயமாக வள
 ர்ந்தோருக்கும் ஒன்று முதல் மூன்று கிறேன் தேயமாகப் பிள்ளைகளுக்கும்
 முறைச்சுரத்திலும் தொணிக மருந்து வேண்டிய மற்றுஞ் சீரிலங் கொடுத்
 தார். இது தனித்தும் மற்றும் மருந்துகளோடு கலந்தும் கனிபத்தக்கு உத்த
 மபதிலாகுமென்று அவர் சொல்லுகிறார். பாஷாணஞ் சேர்ந்த சில மருந்து
 களின் பெயரை இதற்குச் சிலர் கொடுத்திருப்பதால் நஞ்சான பாஷாணமரு
 ந்துகளுள் ஈதையாவது இசென்று மோசமாய் வழங்காதபடிச் சூ உரும்கெ
 த்தச் சாவதானமாயிருக்கவேண்டும்.

I Quinia.



இந்துப்பதார்த்தசாரமருந்துப்பகுப்பு.

CLASSIFIED CATALOGUE OF INDIAN MEDICINAL PRODUCTS.

பிறித்தனி வாகட பதார்த்தங்களுக்கு ஏறக்குறையச் சரியானவைகளாய் அவற்றிற்குப் பதிலாக வழங்கப்படக்கூடிய இந்திர பதார்த்தங்கள் இதில் வரும்.

* பிறித்தனிபார்மருபீயத்திலடங்கிய இந்துப்பதார்த்தங்களைக் காட்டும்.

† அவாகட இடாப்பில் அதிக முக்கியமானவைகளைக் குறிக்கும்.

=சமதன்மையுள்ள பதார்த்தங்களைக் குறிக்கும்.

அல்திறவங்கள், அல்திறவ தோணிகங்கள். ALTERATIVES AND ALTERATIVE TONICS.

இந்துப்பதார்த்தங்கள்.	பிறித்தனி வாகடபதார்த்தங்கள்.
வாகட சரகீதுகள்.	
எருக்கு } வேர்ப்பட்டை } 151 ம் பக்கம். சால்முக்கிரம் (விதை) 33 ம் பக்கம். * நன்னூரி(வேர்) 151 ம் பக்கம். வல்லாரை 117 ம் பக்கம்.	{ துல்சமாரம் 191 ம் பக்கம். { சார்சவேர் 239 ம் பக்கம்.
அவாகடசரகீதுகள்.	
ஆனைக்கற்றூளை(வேர்) 247 ம் பக்கம். † ஆகாசகருடன் (வேர்) 106 ம் பக்கம். † நிபால்சசுவிரஸ்பட்டை 208 ம் பக். † பாடுதெனச்சிலக்கறுவா 208 ம் பக். சிறுதேக்குவேர் 175 ம் பக்கம்.	{ சசுவிரஸ்வேர் 204 ம் பக்கம்.
† எகியம் 169 ம் பக்கம்.	{ சார்சவேர் 239 ம் பக்கம். { பரைரவேர் 15 ம் பக்கம்.
† கரிசலாங்கண்ணி(வேர்) 138 ம் பக்கம்.	= தரக்சகவேர்.
† எட்டியச்செடி (வேர்) 168 ம் பக்கம்.	= உல்மஸ் பட்டை 225 ம் பக்.
சதுரக்கள்ளி (பால்) 216 ம் பக்கம்.	
† நீரடிமுத்து (எண்ணெய்) 34 ம் பக்கம்.	
பால்வள்ளி 149 ம் பக்கம்.	= சார்சவேர் 239 ம் பக்கம்.

இந்துப்பதார்த்தங்கள்.	பிறித்தனிவாகடபதார்த்தங்கள்.
நேபாளஜின்செங்கிழங்கு 118 ம் பக்கம் † அழுத்தஸ்மைலச்சப்பூடு, (கிழங்கு) † ஒடுக்கிலைஸ்மைலச்சப்பூடு } 240 ம் ப. } † மலைத்தாமரை,	சார்சுவேர் 239 ம் பக்கம்.

கிரும்கொல்லிகள். Anthelmintics.

வாகடசரக்துகள்.	
இந்துமக்கிமரம், மூக்கிமரம் (பிசினிரா னம்) 38 ம் பக்கம்.	= சியாம்மக்கி 37 ம் பக்கம்.
* கமாலம், (மா) 214 ம் பக்கம்.	= { குசோ 91 ம் பக்கம். ஆண்வீ விஸ்பூடு 270 ம் பக்கம்.
பூனைக்காலி, (மயிர்) 81 ம் பக்கம்.	
* மாதனே, (வேர்ப்பட்டை) 102 ம் பக்கம்.	= ஆண்வீவிஸ்பூடு 270 ம் பக்கம்.
அவாகடசரக்துகள்.	
ஏழிலைப்பாலை, (பட்டை) 147 ம் பக்கம்.	
பாக்கு, 261 ம் பக்கம்.	
† ஆடுதின்னாப்பாலை, (பால்) 211 ம் பக்.	= குவசி 58 ம் பக்கம்,
அஸ்கிலீபிக்குறசாவிசப்பூடு, (இலைச்சாறு) 153 ம் பக்கம்.	
† வேப்பெண்ணெய் 62 ம் பக்கம்.	
† முருக்கு, (விதை) 81 ம் பக்கம்.	
† பப்பளிச்செடி (பழச்சாறு) 107 ம் பக்கம்.	= சந்துனின் 132 ம் பக்கம்.
கைப்புக்கிலுறடென், 175 ம் பக்கம்.	
பூசணி, (கொட்டை) 106 ம் பக்கம்.	
கும்பை 128 ம் பக்கம்.	
† மணற்கீரை, 195 ம் பக்கம்.	
கசப்பு வெட்பாலை, (விதை) 148 ம், 149 ம் கண்ணாக்குளப்பாலை, } பக்கம்.	
† மாங்கொட்டை, 68 ம் பக்கம்.	= சந்துனின் 132 ம் பக்கம்.
† பிரமதேசக்கறுப்பு வாணிஷ்மரம், 69 ம் பக்.	
மலைவேம்பு, (வேர்ப்பட்டை) 63 ம் பக்கம்.	
பாம்புச்சைலம், (வேர்) 150 ம் பக்கம்.	
சீமையழுவணை, (விதை) 56 ம் பக்கம்.	
† புருக்கொல் பிரமாம்பி, 270 ம் பக்கம்.	
ரங்குன்மல்லி 99 ம் பக்கம்.	
† காட்டுச்சீரகம், (விதை) 136 ம் பக்கம்.	= சந்துனின் 132 ம் பக்கம்.

இந்துபதார்த்தங்கள்.

பிறித்தனிவாகட பதார்த்தங்கள்.

பாம்புகடி முதலியவற்றிற்கு மாற்றுகள்.

Antidotes to snake bites &c.

அவாகடசாகீதுகள்.

நாயுருவி, (பூந்தளிர்) 196 ம் பக்கம்.
 † ஈசுரமூலி, (இலை) 210 ம் பக்கம்.
 பிறுகந்திவலிச்சிச்செடி, (சமூலம்) 211 ம் ப.
 உத்தமாகாணி, (சமூலம்) 153 ம் பக்கம்.
 அயப்பனை, (சமூலம்) 137 ம் பக்கம்.
 இலைக்கள்ளி, (வேர்) 216 ம் பக்கம்.
 சிறுகுறிஞ்சா, (சமூலம்) 154 ம் பக்கம்.
 சொறிலுக்கப்பூடு, (சமூலம்) 180 ம் பக்கம்.
 செண்டுநொதோனி, (தாளின்சாறு) 137 ம் ப.
 † கீரிபுரண்டான், (சமூலம்) 129 ம் பக்கம்.
 பாம்புச்சைலம், 150 ம் பக்கம்.
 களர்வா, (சனி) 182 ம் பக்கம்.
 பாம்பெட்டிச்செடி, (சிராய்) 156 ம் பக்கம்.
 இந்துத்திரிகுடெஸ்மப்பூடு, 168 ம் பக்கம்.

[குறிப்பு — இவ் வகுப்பைச்
 சேர்ந்த பதார்த்தங்களுக்கு பிறி
 த்தனிபார்மகுபீயத்தில் சரியான
 பதில்இல்லை. ஈசுரமூலிஎன்ற ஒ
 ன்றைத் தவிர மற்றவைகள் வி
 சேஷமானவைகளல்ல. அவை
 யெல்லாம் செயலில் அமோன
 நீருக்கும் அலக்கால் ஸ்திமுலங்
 களுக்கும் குறைந்தவைகள்.]

அந்திபிறுமிகள். சுரக்கினிகள்.

Antiperiodics and Feprifuges.

வாகடசாகீதுகள்.

அதிவிடயம், (வேர்) 11 ம் பக்கம்.
 ஏழிலைப்பாலை, (பட்டை) 147 ம் பக்கம்.
 வேம்பு, (பட்டை) 61 ம் பக்கம்.
 இந்துபாபெரி, (வேர்ப்பட்டை) 19 ம் பக்.
 களற்சி, (கொட்டை) 76 ம் பக்கம்.
 கசகசா, (கிரிஸ்தற்சத்தாகிய காகுதின) 21 ம்
 பக்கம்.
 * மிளகு, 218 ம் பக்கம்.
 சேம்மரம், (பட்டை) 63 ம் பக்கம்.
 காஞ்சிரம், (கொட்டையும் அதின் அல்கலை
 வமாகிய ஸ்திரிக்கினியும்) 154 ம் பக்கம்.
 மிளகரணை, (வேர்ப்பட்டை) 55 ம் பக்கம்.

அவாகடசாகீதுகள்.

வசம்பு, (வேர்த்தண்டு) 261 ம் பக்கம்.

இப்பதார்த்தங்கள் பத்தும் சி
 ன்கனப் பட்டைக்கும் அதின்
 அல்கலைவங்களுக்கும் பதிலாக
 வழங்கப்படும். இவைகளிலொ
 ன்றும் அவைகளைப்போலச் சத்
 துள்ளதல்லதாயினும் மிகுதியா
 னவைகள் நச்சுக்காற்றுக்காரண
 மாயுண்டாகும் தடவையான சு
 ரங்களைக் குறைக்கவாவது போ
 க்கடிக்கவாவதுகூடும்.

இந்துபதார்த்தங்கள்.	பிறித்தனிவாகட.பதார்த்தங்கள்.
* கஞ்சா, (பூக்குங்கிளை) 227 ம் பக்கம்.	
ஓமம் (கனியும்அத்திரதேலும்) 109ம் பக். =	{ லவந்தர்தேல், பெப்பமிந்து தேல், அணீதத்தேல், கழி வித்தேல் முதலியன.
வெள்ளுமத்தை கருவூமத்தை (இலையு) ம் விதையும்) 187 ம் பக்கம். } =	{ ஸ்திராமுனி 135 ம் பக்கம். பெலடனம் 182 ம் பக்கம்.
* இங்குப்பூடு(பிசினிரானம்) 112 ம் பக். (பெருங்காயம்*)	
* தபாக்கப்பூடு(இலை) 190 ம் பக்கம்.	
* கசகசா (இறுகினசாறு) 21 ம் பக்கம். =	{ சிமிர்ணஅலின், துருக்கைஅ வின் 22 ம் பக்கம்.
அவாகடசாக்குகள்,	
மாசிபத்திரி (சமூலம்) 136 ம் பக்கம்.	
பிளமீயபல்சப்பூடு (சமூலம்) 138 ம் பக்.	
பலவிதைத்திரககந்திப்பூடு (சமூலம்) 262 ம் பக்கம்.	
† இலைக்கள்ளி (இலைச்சாறு) 216 ம் பக். =	லொபீலி 138 ம் பக்கம்.
† கும்பை (ரானம்) 128 ம் பக்கம்.	
வேளை (சமூலம்) 32 ம் பக்கம்.	
† மலைஅயசீயமஸ்பூடு (சமூலம்) 192 ம் பக்.	
† ஆடாதோடை (இறுகினசாறு) 173ம் ப.	
லொபீலிநிசுதிப்பூடு (சமூலம்) 140 ம் ப.	
† ஜடாமாசி (வேர்) 130 ம் பக்கம் }	{ வலீரியன் 129 ம் பக்கம்.
இமயவலீரியன்பூடு (வேர்) 130 ம் பக். } =	{ சம்புற்கிழங்கு 116ம் பக்கம்.
காவிப்பூனை (புனுகு) 299 ம் பக்கம். =	கஸ்தர் 293 ம் பக்கம்.

துவர்கள். Astringents.

வாகடசாக்குகள்.	
வொதலை 71 ம் பக்கம். =	செந்தாசுக்கட்டி 127ம் பக்.
* வில்வம் (பழம்) 54 ம் பக்கம்.	
முருக்கமரம் (இறுகினசாறு) 81 ம் பக்க. =	கீனு 78 ம் பக்கம்.
தம்பிலிக்காய் (இறுகினசாறு) 142 ம் ப. =	காசுக்கட்டி 71 ம் பக்கம்.
* வேங்கைமரம் (இறுகினசாறு) 78 ம் ப.	
மாதளை (பழத்தோல்) 102 ம் பக்கம். =	குவேகஸ்பட்டை 221 ம் பக்.
அவாகடசாக்குகள்.	
† கருவேலும் அதின் இனமும் (பட்) டை) 35 ம் பக்கம். } =	குவேகஸ்பட்டை 221 ம் பக்.

* பெருங்காயத்தை இந்தச்சரக்கென்று சந்தேகமாய் வருத்திருந்தாலும் பயத்தபெருங்காயம் இதுதேசமடங்க லும் கடைகளில்உண்டு.

இந்துப்பதார்த்தங்கள்.	பிறித்தனிவாகடபதார்த்தங்கள்.
† கமுகு 261 ம் பக்கம். (கொட்டையி னிறுகிய சாறு.)	= காசக்கட்டி 127 ம் பக்கம்.
† குமக்கு (நெற்று) 87 ம் பக்கம்.	
† வத்தேக்கு (சிராய்) 87 ம் பக்கம்.	= எமதக்கிலசிராய் 76 ம் பக்கம்.
சவுக்குமரம் (பட்டை) 58 ம் பக்கம்.	
† ஆவிரை (பட்டை) 86 ம் பக்கம்.	= குவேகஸ்பட்டை 221 ம் பக்க.
தெக்கிலைநறுவிலி (பட்டை) 168 ம் பக்.	
† செம்பிசின்மரம் (பிசின்) 78 ம் பக்கம்.	= கீனு 78 ம் பக்கம்.
வினாத்தி (காய்) 56 ம் பக்கம்.	= வில்வம்பழம் 54 ம் பக்கம்.
† மங்குஸ்தீன் மரம் (பழத்தோல்) 39 ம் ப.	
† கசப்புவெட்பாலை } (பட்டையும் கொட்டையு † கணைக்குளப்பாலை } ம், 149 ம் ப.	
மருதோன்றி (இலை) 95 ம் பக்கம்.	
மாமரம் (கொட்டை) 68 ம் பக்கம்.	
மூச்செரசு (பிசின்) 43 ம் பக்கம்.	
தூதி (பட்டை) 69 ம் பக்கம்.	
செல்லி (சனியின்வற்றல்) 216 ம் பக்கம்.	= ஒக்மாசக்காய்.
செல்லி (சிராயின் எசுரூத்து) 216 ம் பக்.	= காசக்கட்டி.
கிஞ்சக்பிஸ்தகி மரம் (அதின் மாசக் காய்) 67 ம் பக்கம்.	= ஒக்மாசக்காய்
வெள்ளைக்கொய்யா, சிவப்புக்கொய்யா (பட்டை) 102 ம் பக்கம்.	
சர்க்கடகசிங்கி 67 ம் பக்கம்.	= ஒக்மாசக்காய்
காகம் (பட்டை) 102 ம் பக்கம்.	
புளியமரம் (கொட்டை) அனுபந்தம் No. 29.	
சிறுசவுக்குமரம், சிவப்பாற்றுச் சவுக் குமரம் (மாசக்காய்) 37 ம் பக்கம்.	= ஒக்மாசக்காய்,
கடுமரம் (பழமும்மாசக்காயும்) 98 ம் ப.	
கறுப்புமருதமரம் (பட்டை) 99 ம் பக்க.	

காயினதிகள், ஸ்தோமாகிகள். Carminatives and stomachics.

வாகடசர்க்குகள்.	
காமாகுழிப்புல்லும் அதின் இனங்களும் (அத்திரதேல்) 268 ம் பக்கம்.	= கயபுட்டேல் 100 ம் பக்கம்.
சதகுப்பி, சோயிக்கீரை (பழம்) 111 ம் பக்கம்.	= அணீதம் 111 ம் பக்கம்.

இந்துப்பதார்த்தங்கள்.

பிறித்தனிவாகடபதார்த்தங்கள்.

ஓமம் 109 ம் பக்கம்.

* இலவங்கமரம், (பூவரும்பாகிய கரா
ம்பு) 100 ம் பக்கம்.

* மலையாள ஏலம் (கனி) 242 ம் பக்கம்.
பெருஞ்சீரகம் 110 ம் பக்கம்.

* சிடமரம் (சாதிக்காய்என்னுங்கொட்டை)
201 ம் பக்கம்.

* மிளகுக்கொடி (சாய்) 218 ம் பக்கம்.

* இஞ்சிப்பூடு (வேர்த்தண்டு) 241 ம் பக்.

அவாகடசரக்குகள்.

† வசம்புப்பூடு (வேர்த்தண்டு) 261 ம் பக்.
அசைவல்பீனியப்பூடும் அதின் வேறின
ங்களும் (வேர்த்தண்டு) 244 ம் பக்கம்.

வங்காள ஏலம் (காய்) 245 ம் பக்கம்.

மலாயு ஏலம் (காய்) 245 ம் பக்கம்.

† பேய்மருட்டி (இலை) 179 ம் பக்கம்.

† அனிசுமெலிசொவாதப்பூடு (சமூலமாவது
அத்திரதேலமாவது) 179 ம் பக்கம்.

மாசிபத்திரி (சமூலம்) 136 ம் பக்கம்.

பீளுமீயபல்சப்பூடு 138 ம் பக்கம்.

அசமதாகம் (பழம்) 118 ம் பக்கம்.

வெற்றிலைக்கொடி (இலைச்சாறு) 220 ம்
பக்கம்.

சாப்புச்செடி (பழம்) 221 ம் பக்கம்.

திப்பிலி (பழம்) 220 ம் பக்கம்.

சாமந்திப்பூடு (பூ) 138 ம் பக்கம்.

காட்டுக்கறுவாமரம் { உட்பட்டை

இலங்கைக்கறுவாமரம் { 207 ம் பக்கம்.

தமாலக்கறுவாமரம், யுகலிப்துக்கறுவா
மரம் என்னும் தாளிசம் (இலை) 207 ம்
பக்கம்.

சுந்தகொலீயஸ்பூடு (சாறு) 179 ம் பக்.

வில்வம் (இலை) 54 ம் பக்கம்.

{ கறுவி 108 ம் பக்கம். மல்லி
111 ம் பக்கம். அணீசு, அ
ணீதர் முதலியன ஓமத்தி
ன் அத்திரதேலம், பெப்பயி
ந்து முதலிய அத்திரதேல்
களுக்கு நல்ல பதிலாகும்.

= பிமெந்தம். 101 ம் பக்கம்.

= பெருஞ்சீரகம் 110 ம் பக்கம்.

= மலையாள ஏலம்.

= கறுவி 103 ம் பக்கம்.

= மிளகு 218 ம் பக்கம்.

= அந்திமிஸ்பூ 131 ம் பக்கம்.

= கறுவாப்பட்டை 206 ம் பக்.

இந்து ப்பதார்த்தங்கள்.	பிறித்தனிவாகட ப்பதார்த்தங்கள்.
யாவிஞ்சி கஸ்தூரிமஞ்சள் } வேர்த்தண்டு 244 ம் கிச்சிலிக்கிழங்கு } பக்கம், சீரகம் 118 ம் பக்கம். முத்தகாச } (கிழங்கு) 263 ம் பக்கம். கோரை } அயப்பனை (சமூலம்) 137 ம் பக்கம். வினாத்தி (இலை) 56 ம் பக்கம். இமயமலைக்கிச்சிலிப்பூடு (வேர்) 245 ம் பக்கம். கச்சோலப்பூடு } (கிழங்கு) 215 ம் பக். கெம்வேரியப்பூடு } † இந்துப்பெப்பமிந்துப்பூடு (சமூலம்) } 179 ம் பக்கம். } = பெப்பமிந்து கருவேம்பு (இலையும் பட்டையும) 57 ம் பக்கம். கருஞ்சீரகப்பூடு (பழம்) 13 ம் பக்கம். கண்டங்கத்தரி (சமூலம்) 192 ம் பக்கம். காட்டுச்சீரகப்பூடு(கொட்டை) 136 ம் ப. புனீர்ச்செடி (பழவற்றல்) 193 ம் பக்கம் அழுக்கிராச்செடி (கிழங்கு) 193 ம் பக். சந்தச்சைலவலாதமரம் } (பழம்) 56 ம் சந்தச்சைலகஸ்திலிமரம் } பக்கம். சந்தச்சைலபுடுங்கமரம் } கசமுனாவிஞ்சி } (வேர்த்தண்டு) } = இஞ்சி 241 ம் பக்கம். செரும்பெற்றிஞ்சி } 242ம் பக்கம். }	= { மல்லி 111 ம் பக்கம். அணி தம் 111 ம் பக்கம்.

திமல்சங்கள். இமாலியங்கள்.
Demulcents and Emollients.

வாகடசரக்துகள்.	
குன்றிமணி (வேர்) 82 ம் பக்கம். இலங்கைக்கடற்பாசி 273 ம் பக்கம். வண்டுக்காய் 42ம் பக்கம். நெற்பயிர் (அரிசி) 267 ம் பக்கம். நெற்பயிர் (அரிசிமா) 267 ம் பக்கம். இஸ்பகற்பூடு (விரை) 194 ம் பக்கம்.	= அதிமதுரவேர், = வாற்கோதுமையரிசி 266 ம் ப. = கோதுமைமா 266 ம் பக்கம்.
அவாகடச் சரக்துகள்.	
முட்கீரை (இலை) 195 ம் பக்கம்.	

இந்துப்பதார்த்தங்கள்.	பிறித்தனிவாகட பதார்த்தங்கள்.
எலெமிமரம் (பருப்பு) 59 ம் பக்கம்.	= தேன்வாதுமை 91 ம் பக்கம்.
காக்கணங்கொடி (வேர்ப்பட்டை) 88 ம் ப.	
சிறுநறுவிலி } (பழவற்றல்) 168 ம் }	= புருணம் 94 ம் பக்கம்.
பெரிய நறுவிலி } பக்கம்.	
நிலப்பனை (கிழங்கு) 247 ம் பக்கம்.	
நிலக்குமிழ் (இலை) 175 ம் பக்கம்.	
மயிர்த்துளசி } (விதை) 179 ம் பக்.	
எலுமிச்சந்துளசி }	
† பெருநெருஞ்சி (பூமும்விதையும்) 162 ம் ப.	
குவிஞ்சு (விதை) 94 ம் பக்கம்.	
சவீர்மூஸ்லிக்கிழங்கு 247 ம் பக்கம்.	
எள்ளு (இலை) 161 ம் பக்கம்.	
† இந்துவாதுமை (பருப்பு) 98 ம் பக்கம்.	= தேன்வாதுமை 91 ம் பக்கம்.
தேட்கொடுக்கி (இலை) 169 ம் பக்கம்.	
இந்துத்திரிகுடெஸ்மம் (சமூலம்) 168 ம் ப.	

திரஎண்ணெய்கள். Fixed oils.

வாகடசரக்குகள்.	
வேர்க்கடலை (பருப்பின்தேலம்) 82 ம் ப.	= ஒலீவதேலம் 144 ம் பக்கம்.
கோகமரம் (கொட்டைநெய்) 38 ம் பக்.	= தியுபுரோமதேல் 44 ம் பக்கம்.
அவாகடசரக்குகள்.	
† நாட்டக்ரோடுக்கொட்டை (தேலம்) } 215 ம் பக்கம்.	= லீனத்தேலம் 45 ம் பக்கம்.
காட்டுமுந்திரி (கொட்டையின் தேலம்) 68 ம் பக்கம்.	
† புல்வமரம் (கொட்டையின்நெய்) } 141 ம் பக்கம்.	= தியுபுரோமதேல் 44 ம் பக்கம்.
காட்டிருப்பை (பருப்பின்நெய்) } 141 ம் ப.	
இலுப்பை (பருப்பின்நெய்) }	
புன்னை (பருப்பின்தேலம்) 39 ம் பக்கம்.	
எலெமிமரம் (பருப்பின்தேலம்) 59 ம் ப.	= வாதுமைத்தேல் 92 ம் பக்கம்;
தென்னமரம் (விதையின்தேலம்) 259 ம் ப.	
முருங்கைமரம் (விதையின்தேலம்) 69 ம் ப.	
† எள்ளுப்பூடு (விதையின்தேலம்) 161 ப.	= ஒலீவுதேல் 144 ம் பக்கம்.
† இந்துவாதுமைமரம் (பருப்பின்தேலம்) 98 ம் பக்கம்.	= வாதுமைத்தேல் 92 ம் பக்கம்.

இந்துப்பதார்த்தங்கள்.	பிறித்தனிவாகட பதார்த்தங்கள்.
பிசின்கள், Gums.	
அவாகடசரக்துகள். கருவேல் (பிசின்) 85 ம் பக்கம். பிய்வேல் (பிசின்) 85 ம் பக்கம். லெபக்ககசிமரம் (பிசின்) 85 ம் பக்கம். காட்டுமுந்திரி (பிசின்) 68 ம் பக்கம். தனகுமரம் (பிசின்) 34 ம் பக்கம். வினாத்தி (பிசின்) 56 ம் பக்கம். ஒதியமரம் (பிசின்) 69 ம் பக்கம்.	= திரககந்துப்பிசின் 83 ம் பக்கம். = அகசிப்பிசின் 70 ம் பக்கம்.

தியவுநீசிகள். சுடரீவிகள். Diaphoretics and Sudorifics.

வாகடசரக்துகள். காமாக்ஷிப்புல்லும் அதின் இனங்களும் } (அத்திரதேல்) 268 ம் பக்கம். = கயபுட்டேல் 100 ம் பக்கம். இந்துபாபெரியும் அதின்இனங்களும் (வேர்ப்பட்டை) 19 ம் பக்கம். பேரெருக்கு } (வேர்ப்பட்டை) 161 ம் ப. = இபிகாக்கு 125 ம் பக்கம். சிற்றெருக்கு } விஷமூங்கில் (கிழங்கு) 246 ம் பக்கம். * நன்னூரி (வேர்) 151 ம் பக்கம். * கசகசா (இறுகினசாறு) 21 ம் பக்கம். = சிமிர்ண, துருக்கி அவின் 22 ம் ப. குறிஞ்சா (இலை) 152 ம் பக்கம். = இபிகாக்கு 125 ம் பக்கம். * இஞ்சிப்பூடு (வேர்த்தண்டு) 241 ம் பக்.	
அவாகடசரக்துகள். உசம்புப்பூடு (வேர்த்தண்டு) 261 ம் பக்க. இலாமிச்சம்புல் (வேர்) 259 ம் பக்கம். † கர்ப்பூரவன்ளி (முழுப்பூடும்) 180 ம் ப. † பேய்மருட்டி } (இலை) † அனிசுமேலிசோவாதப்பூடு } 179 ம் ப. பிளூமியபல்சப்பூடு (சமுலம்) 138 ம் ப. † வாலுளுவைச்செடி (விதையிந்தேலம்) 64 ம் பக்கம். முத்தகாச } (கிழங்கு) 263 ம் பக்கம். கோரை } அயப்பனை (முழுப்பூடும்) 137 ம் பக்கம். கருநொச்சி (முழுப்பூடும்) 173 ம் பக்க. ஸ்திரோபிவ்மெரியாண்டப்பூடு (இலை) 180 ம் பக்கம்,	

இந்துப்பதார்த்தங்கள்.	பிறித்தனிவாகட பதார்த்தங்கள்.
முருங்கை (வேர்) 69 ம் பக்கம்.	= அமுருசி 30 ம் பக்கம்.
திருநீற்றுப்பச்சை } (இலை) 178 ம் பக்.	
துளசி	
† சித்திரமூலம் (வேர்) 180 ம் பக்கம்.	
அத்தித்திப்பிவி (பழம்) 262 ம் பக்கம்.	

தியுற்சங்கள். Diuretics.

வாகடசரக்குகள்.	
* பரைரக்கொடி (வேர்) 15 ம் பக்கம்.	
விஷமூங்கில் (கிழங்கு) 246 ம் பக்கம்.	= ஸ்குவில் 252 ம் பக்கம்.
கர்ச்சமரம் (ரானதேலம்) 40 ம் பக்கம்.	= கபேவம். 72 ம் பக்கம்.
* நன்னூரி (வேர்) 151 ம் பக்கம்.	

அவாகடசரக்குகள்.	
† நாயுருவி (இலை) 196 ம் பக்கம்.	
நிலுவிக்கள்ளி (இறுகினபால்) 216 ம் ப.	
நீர்ப்பிரமி (முழுப்பூடும்) 171 ம் பக்கம்.	
வண்டைச்செடி (காய்) 42 ம் பக்கம்.	
† நீர்முள்ளி (சமூலம்) 173 ம் பக்கம்.	
† சிறுநரிவெங்காயம் (கிழங்கு) 254 ம் ப.	= ஸ்குவில் 252 ம் பக்கம்.
பேய்ப்பீர்க்கம் (முழுப்பூடும்) 106 ம் பக்.	
† முருங்கை (வேர்) 69 ம் பக்கம்.	= அமுருசி 30 ம் பக்கம்.
வட்டுக்கற்பாசி 273 ம் பக்கம்.	
† பெருநெருஞ்சி (முழுப்பூடும்) 162 ம் ப.	
கீழ்காய்நெல்லி (முழுப்பூடும்) 217 ம் பக்.	
சிவப்புநெல்லி (முழுப்பூடும்) 217 ம் பக்.	
† சந்தனக்கட்டை (அத்திரஎண்ணெய்) } 208 ம் பக்கம்.	= கபேவம் 72 ம் பக்கம்.
கண்டங்கத்தரி } (முழுப்பூடும்) 192	
கறுப்புமணத்தக்காளி } பக்கம்.	
நெருஞ்சி (பழம்) 47 ம் பக்கம்.	
நரிவெங்காயம் (கிழங்கு) 253 ம் பக்கம்.	= ஸ்குவில் 252 ம் பக்கம்.
அமுக்கிரா (கிழங்கு) 193 ம் பக்கம்.	

வமனிகள். Emetics.

வாகடசரக்குகள்.	
பேரெருக்கு } (வேர்பபட்டை) 151ம்	= இபிகாக்கு 125 ம் பக்கம்.
சிற்றெருக்கு } பக்கம்.	

இந்துப்பதார்த்தங்கள்.	பிறித்தனிவாகட பதார்த்தங்கள்.
விஷமூங்கில் (கிழங்கு) 246 ம் பக்கம்.	= ஸ்குவில், 252 ம் பக்கம்.
இந்துக்கடுகு 32 ம் பக்கம்.	= { வெண்கடுகு, கருங்கடுகு,
குறிஞ்சா (இலை) 152 ம் பக்கம்.	= { 31 ம் பக்கம்.
	= இபிகாக்கு 125 ம் பக்கம்.
அவாகட சாக்துகள்.	
† குப்பைபமேனி (சாறு) 217 ம் பக்கம்.	
காட்டிலுப்பை } (அரைப்பு) 41 ம் பக்.	
இலுப்பை }	
† பேயத்திரம் (பழமும்விதையும்) 228 ம் பக்கம்.	
† சிறியபேயத்தி (பழமும்வெங்காயமும்) 229 ம் பக்கம்.	
† சிறுவெங்காயம் 254 ம் பக்கம்.	= ஸ்குவில் 252 ம் பக்கம்.
மருக்கானஞ்செடி (காய்) 128 ம் பக்கம்.	
செகமோனிச்செடி (சமூலம்) 153 ம் பக்.	
† நெய்வெங்காயம் (கிழங்கு) 253 ம் பக்கம்.	= ஸ்குவில் 252 ம் பக்கம்.
புளிச்செடி (பழம்) 193 ம் பக்கம்.	

எம்மெனாகைக்குகள். Emmenagogues.

அவாகடசாக்துகள்.	
† கற்றாழை } (இறுகினசாறு) 254 }	= சகை, 249 ம் பக்கம்.
† சிறுகற்றாழை } பக்கம்.	
இலாமிச்சம்புல், 269 ம் பக்கம்.	
† ஆதிதின்னாப்பாலை (வேர்) 211 ம் பக்கம்.	
பெருமருந்து (கிழங்கு) 210 ம் பக்கம்.	
ரோமப்பிருகந்திச்செடி, (பூடு) 211 ம் பக்.	
பிளூமியபல்சப்பூடு (சமூலம்) 138 ம் பக்.	
பப்பளிச்செடி (விதை) 107 ம் பக்கம்.	
சீமையழுவணை (விதை) 56 ம் பக்கம்.	
† செங்கொடிவேலி (வேர்) 180 ம் பக்.	
அர்வதா (பூடு) 48 ம் பக்கம்.	= அறுதப்பூடு.
என்ரு (விதை) 161 ம் பக்கம்.	

எக்ஸ்பெக்துறன்கள். Expectorants.

வாகடசாக்துகள்.	
விஷமூங்கில், (கிழங்கு) 246 ம் பக்கம்.	= ஸ்குவில், 252 ம் பக்கம்.
குறிஞ்சா, (இலை) 152 ம் பக்கம்.	= இபிகாக்கு, 125 ம் பக்கம்.

இந்துப்பதார்த்தங்கள்.

பிறித்தனிவாகடபதார்த்தங்கள்.

அவாகடசாகீதுகள்.

† குப்பைபமேனி, (சாறு) 217 ம் பக்கம்.	= செனிகவேர் 35 ம் பக்.
† கர்ப்பூரவள்ளி, (சாறு) 180 ம் பக்கம்.	
† முகில்குக்குலுமரம், } (பிசினிராள்	} = சசம் 59 ம் பக்கம்.
† சுணைக்குக்குலுமரம், } ம்) 61 ம் பக்,	
பிளூமீயபல்சப்பூடு, (சமூலம்) 138 ம் பக்.	
மூக்குரட்டை, (முழுப்பூடும்) 197 ம் பக்கம்.	
உத்தமாகாணி, (முழுப்பூடும்) 153 ம் பக்.	
† பொன்றொரீமச்செடி, (பிசினிராள்	} = அமுனீயகம் 113 ம் பக்கம்.
ம்) 118 ம் பக்கம்.	
† ஆடாதோடை (இறுகினசாறு) 173 ம் ப.	= செனிகவேர் 35 ம் பக்கம்.
சிறுநரிவெங்காயம், (கிழங்கு) 254 ம் பக்.	= ஸ்குவில் 252 ம் பக்கம்.
† நந்தாயுக்குமரம், (பல்சம்) 97 ம் பக்.	= ஸ்தைரக்க. 96 ம் பக்கம்.
குரோதலரிடப்பொலிக்	} = செனிகவேர் 35 ம் பக்கம்.
கலப் பூடு,	
தெவிவியடப்பொலிக்கல	
ப் பூடு,	
திருநீற்றுப்பச்சை, } (முழுப்பூடும்) 178 ம் ப.	
துளசி,	
கண்டங்கத்தரி (முழுப்பூடும்) 192 ம் பக்.	
நரிவெங்காயம், (கிழங்கு) 253 ம் பக்கம்.	= ஸ்குவில் 252 ம் பக்கம்.

இஞ்சேத்துகீருகள், இஞ்சேத்துவூகுகள்.

Insecticides and Insectifuges.

வாகடசாகீதுகள்.

காக்காய்கொல்லி (பழம்) 16 ம் பக்கம்.

அவாகடசாகீதுகள்.

† வசம்புப்பூடு (வேர்த்தண்டு) 261 ம் பக்கம்.
கோஷ்டம் (வேர்) 138 ம் பக்கம்.
வேம்பு (எண்ணெய்) 61 ம் பக்கம்.
காட்டுச்சீரகம் (விரை) 136 ம் பக்கம்.

லத்துவூகிகள். Lactifuges.

அவாகட சாகீதுகள்.

† வெற்றிலைக்கொடி (இலை) 220 ம் பக்.

இந்துப்பதார்த்தங்கள்.	பிறித்தனிவாகடபதார்த்தங்கள்.
† மல்லிகைச்செடி (பூ) 147 ம் பக்கம். ஸ்திரோபில்மெரியாண்டப்பூடு (சமூலம்) 180 ம் பக்கம்.	
லத்துகக்கிகள். Lactagogues.	
அவாகடசாக்த்துகள். † ஆமணக்கு (இலை) 213 ம் பக்கம். காட்டாமணக்கு (இலை) 215 ம் பக்கம்.	
மிடியாதங்கள். Mydriatics.	
வாகடசாக்த்துகள். ஊமத்தை (இறுகினஇலைச்சாறு) 187 ம் பக்கம்.	} = { பெலடனையெசுருத்து 183 ம் பக்கம்.
அவாகடசாக்த்துகள். ஸ்கபோலிப்பூடு (இலை) 192 ம் பக்கம். =	பெலடனை 182 ம் பக்கம்.
நாகதிகங்கள், சேரதீவங்கள், அனுடைன்கள். Narcotics, Sedatives and Anodynes.	
வாகடசாக்த்துகள். வீரகனீதப்பூடும் அதின் இனங்களும் (வேர்) 11 ம் பக்கம். * கஞ்சா (சூக்குங்கினை) 227 ம் பக்கம். ஊமத்தை (இலையுங்கொட்டையும்) 177 ம் பக்கம். * தபாக்கப்பூடு (இலை) 190 ம் பக்கம். கசகசா (இறுகினசாறு) 21 ம் பக்கம்.	} = அகனீதம் 90 ம் பக்கம். } = { ஸ்திரோமுனியும் } 185 ம் பக் { பெலடனமும் } = சிமிர்ண, துருக்கி அவின் 22 ம் ப.
அவாகடசாக்த்துகள். கோஷ்டம் (வேர்) 138 ம் பக்கம். செல்சிப்பூடு (சாறு) 172 ம் பக்கம். † மலைஅயசீயமஸ் (பூடு) 192 ம் பக்கம். கூர்மிசுனாசிப்பூடு } (வேர்) 30 ம் } நிபால்மிசுனாசிப்பூடு } பக்கம். } = வெண்சந்தனமரம் (சிராய்) 208 ம் பக்கம். அழுக்கிரா (கிழங்கு) 193 ம் பக்கம்.	

இந்துப்பதார்த்தங்கள்.

பிறித்தனிவாகடபதார்த்தங்கள்.

போஷணிகள், Nutritives.

வாகடசரக்துகள்.

இலங்கைக்கடற்பாசி 273 ம் பக்கம். = ஐசிலன்பாசி 271 ம் பக்கம்.
பாற்சுறா (ஈரலின்தேலம்) 293ம் பக்கம். = மறுவித்தேல் 292 ம் பக்கம்.

அவாகடசரக்துகள்.

தென்னமரம் (பருப்பு) 259 ம் பக்கம். }
அறுக்கிளாமீன் (ஈரலின்தேலம்) 294ம் பக்கம். } = மறுவித்தேல் 292 ம் பக்கம்.

பாடுறிவாசங்கள். Parturificients.

வாகடசரக்துகள்.

*கஞ்சா (பூக்குங்கிளை) 227 ம் பக்கம். = ஏர்கற்று (பூமணி) 263 ம் பக்.

அவாகடசரக்துகள்.

ஆடுதின்னாப்பாலை (வேர்) 211 ம் பக்கம்.
திப்பிலி (வேர்) 220 ம் பக்கம்.
பாம்புச்சைலம் (வேர்) 150 ம் பக்கம்.
† இரூம், நெல்லு இவைகளின் ஏர்கற்று }
163 ம் பக்கம்.

விரேசனிகள். Purgatives.

வாகடசரக்துகள்.

* நிலவாகைப்பூடு (இலை) 74 ம் பக்கம். = சூரத்துநிலவாகை 74 ம் பக்கம்.
* கொன்றை (பழச்சதை) 73 ம் பக்கம்.
* நேர்வாளமரம் (கொட்டையின் தேலம்) 212 ம் பக்கம். } = எலதீரியம் 104 ம் பக்கம்.
மூக்கிமரம் (பிசினிராளம்) 38 ம் பக்கம். = சியாம்மக்கி 37 ம் பக்கம்.
ஜிரிகிக்கொடி (கொட்டை) 166 ம் பக். = ஜலப்பு 163 ம் பக்கம்.
* ஆமணக்கு (தேலம்) 213 ம் பக்கம்.
* புளியமரம் (பழம்) 73 ம் பக்கம்.

அவாகடசரக்துகள்.

குப்பைமேனி (இலைச்சாறு) 217 ம் பக்கம்.
அசத்தி (இலை) 86 ம் பக்கம்.

இந்துப்பதார்த்தங்கள்.	பிறித்தனிவாகடபதார்த்தங்கள்.
† காட்டக்ரோமெரம் (கொட்டையின் தேலம்) 215 ம் பக்கம்.	= ஆமணக்கெண்ணெய் 213 ம் ப.
அல்காகிமரோரச்செடி (இனிப்பான பாணி) 89 ம் பக்கம்.	= மன்னா 147 ம் பக்கம்.
† கற்றாழை } (இறுதினசாறு) சிறுகற்றாழை } 254 ம் பக்கம்.	= { பபாடுசகை, சொகோத்திரச கை 249 ம் பக்கம்.
† பிரமதண்டுப்பூடு (விரையின்தேலம்) 29 ம் பக்கம்.	= ஆமணக்கெண்ணெய் 213 ம் ப.
பலியாண்டவாளச்செடி (எண்ணெய்) 213 ம் பக்கம்.	= நேர்வாளஎண்ணெய் 212 ம் ப.
கூரிலைப்பேர்திலோசம் (இலை) 136 ம் பக்கம்.	= நிலவாகை 74 ம் பக்கம்.
சீமையகத்தியும் அதின் இனங்களும் (இலை) 85 ம் பக்கம்.	= நிலவாகை 74 ம் பக்கம்.
சீமையகத்தி (இலையின் எசிறுத்து) 85 ம் பக்கம்.	= கலுசிந்தெசிறுத்து 103 ம் பக்.
† காக்கணங்கொடி (விதை) 83 ம் பக்கம்.	
நெட்டிலைவாளம் } (கொட்டைத்தே பவானவாளம் } லம்) 213 ம் பக்.	= வாளதேல் 212 ம் பக்கம்.
† மலைத்துமட்டி } (பழச்சதை)	= கலுசிந்து 103 ம் பக்கம்.
† காட்டுத்துமட்டி } 105 ம் பக்கம்.	
கும்பைப (காய்) 128 ம் பக்கம்.	
இபுமீயசைமோசிக்கொடி } (கொட்டை) }	
இபுமீயசெயியாரிக்கொடி } 168 ம் பக் }	
† சிவதை (வேரும் ராளமும்) 167 ம் பக்கம்	
காட்டாமணக்கு (கொட்டையின்தேலம்) 215 ம் பக்கம்.	
கடுகுரோசணி (வேர்) 171 ம் பக்கம்.	
பத்தரூசு (வேர்) 196 ம் பக்கம்.	
எமோதியவரியாத்து } (கிழங்கு) 199 }	= சீன, துருக்கிவரியாத்து 197 ம் ப.
வெபுவரியாத்து } ம் பக்கம்.	
களர்வா (பழம்) 182 ம் பக்கம்.	
† கடுக்காய் 97 ம் பக்கம்.	
கொம்புப்புடல் (எசிறுத்து) 105 ம் பக்கம்	= எலதீரியம் 104 ம் பக்கம்.

குளிர்ச்சிகள், Refrigerants.

வாகடசங்கீதுகள்.	
எலுமிச்சை (பழச்சாறு) 53 ம் பக்கம்.	= லெமன்சாறு 51 ம் பக்கம்.
* பழப்புளி 73 ம் பக்கம்.	

இந்துப்பதார்த்தங்கள்.	பிறித்தனிவாகடபதார்த்தங்கள்.
அவாகடசரகீதுகள். பப்பரப்புளி, 44 ம் பக்கம். கற்றாழை, } சாற்றைப் பூசல், சிறுகற்றாழை, } 254 ம் பக்கம். †பனை, } கள்ளு 260 ம். பக்கம். = காடி 231 ம் பக்கம். †தென்னை, } †கடலை, (சாறு) 88 ம் பக்கம். சப்பாத்துப்பூ, (இதழ்) 43 ம் பக்கம். சந்தனம், (பூச்சு) 208 ம் பக்கம்.	

சோணதிகளும் எதிரழற்சிகளும்.
Rubefacients and Counter-irritants.

வாகடசரகீதுகள்.	
காவட்டம்புல்லும் அதின் இனங்க ளும், (அத்திரதேல்) 268 ம் பக்கம். } = கயபுட்டேல் 100 ம் பக்கம். *மிளகாய், 191 ம் பக்கம். } *நேர்வாள எண்ணெய், 212 ம் பக். } = { இயிகாக்கு 125 ம் பக்கம். *சாதிக்காய் (பிழிந்தஎண்ணெய்) } { தாத்தரந்திமனி 358 ம் பக்கம். 201 ம் பக்கம். *மிளகு, 218 ம் பக்கம். இந்துக்கடுகு, (தூள்) 32 ம் பக்கம். = சீமைக்கடுகு 31 ம் பக்கம்.	

அவாகடசரகீதுகள்.	
காட்டுமுந்திரி, (காரமான எண்ணெய்) 68 ம் பக்கம். †பேய்மருட்டி, (இலையெண்ணெய்) 179 ம் பக்கம். சமுத்திரப்பச்சை, (இலை) 168 ம் பக்கம். காட்டாமணக்கு (எண்ணெய்) 215 ம் ப. = வாளதேல் 212 ம் பக்கம். †வெற்றிலை, 220 ம் பக்கம். சாப்புமிளகு 221 ம் பக்கம். †திப்பிலி, 220 ம் பக்கம். = மிளகு 218 ம் பக்கம். நெட்டிலைவாளம், } (எண்ணெய்) } பவானவாளம், } 215 ம் பக்கம். } = நேர்வாளதேல். சதுரக்கள்ளி, } (பால்) 216 ம் பக்கம். இலைக்கள்ளி, } †வேளை (இலை) 32 ம் பக்கம். காட்டாமணக்கு (எண்ணெய்) 215 ம் பக். ஊதலை (எண்ணெய்) 216 ம் பக்கம்.	

இந்துப்பதார்த்தங்கள்.	பிறித்தனிவாகடபதார்த்தங்கள்.
முருங்கை, (வேர்) 69 ம் பக்கம்.	= அமுருகிவேர் 30 ம் பக்கம்.
மருதம்பட்டை, 229 ம் பக்கம்.	
†மலையாளச்சிடம், (எண்ணெய்) 202 ம் ப.	= சிடத்தேல்.
†கொடிவேலி, } வேர்ப்பட்டை	} = மெசீரியபட்டை 200 ம் பக்.
சித்திரமூலம், } 180 ம் பக்கம்.	
†கனர்வா, (வேர்ப்பட்டை) 182 ம் ப.	
சேங்கொட்டை, 68 ம் பக்கம்.	
†வெள்ளைக்குன்றிகம், (எண்ணெய்) 41 ம் ப.	

சைலேகாக்குகள். Sialagogues.

அவாகடசாக்குகள்.	
†சாமந்திப்பூ, (வேர்) 131 ம் பக்கம்.	= பைரீதிரவேர் 135 ம் பக்கம்.
†முருங்கை, 69 ம் பக்கம்.	= அமுருகிவேர் 30 ம் பக்கம்.
கொடிவேலி, } வேர் 180 ம் பக்கம்.	
சித்திரமூலம், }	
†கண்டங்கத்தரி, (விதை) 192 ம் பக்கம்.	

ஸ்திமுலங்கள். Stimulants.

வாகடசாக்குகள்.	
காமாகழிப்புல்லும் அதின்இனங்களும், } (அத்திரதேல்) 268 ம் பக்கம்.	} = கயபுட்டேல் 100 ம் பக்கம்.
*கஞ்சா, (பூக்குங்கிளைகள்) 227 ம் பக்கம்.	
அவாகடசாக்குகள்.	
காட்டுமூந்திரி, (பழச்சீது)	} = { வைன், பிரண்டி, புருவுசீது, திட்டசீது 276 ம் பக்கம்.
†காட்டிலுப்பை, } பூச்சீது 141 ம் ப.	
இலுப்பை, }	
†பனை, } கள்ளு 260 ம் பக்.	} = { வைன், பிரண்டி, புருவுசீது, திட்டசீது 276 ம் பக்கம்.
†கூந்தற்பனை, } சாராயம்.	
†தென்னைமரம், }	
வாலுளுவை, (எண்ணெய்) 64 ம் பக்கம்.	
†ஜடாமாசி, (வேர்) 130 ம் பக்கம்.	= வலீரியன்வேர் 129 ம் பக்கம்
சீமையழுவனை, (விதை) 56 ம் பக்கம்.	
மஞ்சிட்டி, (வேர்) 129 ம் பக்கம்.	
கிலாவுமரம், (பூவிற்திஸ்திலித்தரீர்)	
225 ம் பக்கம்.	

இந்துப்பதார்த்தங்கள்.

பிறித்தனிவாகட பதார்த்தங்கள்.

களர்வா, (வேர்) 182 ம் பக்கம்.

+வெண்ணெய்ச்சி, } இலை
+நீர்நொச்சி, } 174 ம் பக்கம்.

காமினதிகள் அந்திஸ்பசிகளையும்பார்.

நயன ரோகங்களுக்கிடும் தீவன மருந்துகள்.

Stimulant applications in affections of the Eye.

பிரமதண்டு, (சாறு) 29 ம் பக்கம்.

+இந்துபாபெரி, (எசுருத்து) 19 ம் பக்கம்.

கருங்காணம், } கொட்டைமா 86 ம் பக்கம்
ஆவிரை, }

சருமரோகங்களுக்கிடும் தீவனிகள். Ditto in skin Diseases.

பிரமதண்டு (கொட்டையெண்ணெய்)

29 ம் பக்கம்.

கூர்சிங்குமரம், (எண்ணெய்) 161 ம் பக்.

+வண்டுகொல்வி,
நாத்தந்தகரை,
பொன்னாவரை,
தகரை, } இலை 86 ம் பக்கம்.

ஆலம்பால், 228 ம் பக்கம்.

மண்டைலம், 234 ம் பக்கம்.

+தேவதாரிப்பைன், (எண்ணெய்) 237 ம் ப.

+புங்கமெண்ணெய், 87 ம் பக்கம்

நாகமல்வி, (கொட்டை) 174 ம் பக்கம்.

சந்தனம், 208 ம் பக்கம்.

பூவரசமரம், (பழச்சாறு) 43 ம் பக்கம்.

தேட்கொடுக்கி, (இலை) 169 ம் பக்கம்.

விரணங்கள் விப்புருதி முதலியவைகளை அருட்டு மருந்துகள்.

To Ulcers, Abscesses, &c.

பிரமதண்டு, (சாறு) 29 ம் பக்கம்.

+வேப்பிலை, 61 ம் பக்கம்.

+பனங்கள்ரு, (பாப்பை) 260 ம் பக்கம். = யீஸ்துப்பாப்பை.

அயப்பனை, (இலை) 137 ம் பக்கம்.

+கும்பை, (பிசின்) 128 ம் பக்கம்.

+வல்லாரை, (இலை) 117 ம் பக்கம்.

பத்தரூசு, (இலை) 196 ம் பக்கம்.

+சாதிக்காய், (தேல்) 201 ம் பக்கம்.

இந்துப்பதார்த்தங்கள்.	பிறித்தனி வாகடபதார்த்தங்கள்.
-----------------------	------------------------------

வெண்ணெய்ச்சி, } (இலை) 174 ம் பக்கம்.
நீர்வெண்ணெய்ச்சி,

வாதத்துக்குப் பூச்சுகள் .ருபிவாஷன்கள் பார்.

In Rheumatism &c, See Rubefacients.

தேறிபிந்த ஸ்திமுலங்கள்.

Terebinthinate stimulants.

வாகடசரக்குகள்.

குந்துருக்கம், (ரானம்) 60 ம் பக்கம்.

*எலெமிமரம், (ரானம்) 59 ம் பக்கம்.

கர்ச்சமரம், (பல்சம்) 40 ம் பக்கம்.

= கபேவம் 72 ம் பக்கம்.

அவாகடசரக்குகள்.

பெருமரம், (பிசினிரானம்) 58 ம் பக்கம்.

†குக்குலு, (பிசினிரானம்) 61 ம் பக்கம்.

= சசம் 59 ம் பக்கம்.

புண்ணை, (ரானம்) 39 ம் பக்கம்.

கறுப்புடாமர், (ரானம்) 61 ம் பக்கம்.

= பெர்கன்றிரானம், 230 ம் பக்.

†பொன்னெருமச்செடி, (பிசினிரானம்) 118 ம் பக்கம்.

= அமுனீயகம் 113 ம் பக்கம்.

†தேவதாரிப்பைன், } திஸ்திலிப்பாற்
கெட்டிலைப்பைன், } பிறப்பவைகள்
237 ம் பக்கம்.

= தார், தர்ப்பந்தின் 231, 233 ம் ப.

கிஞ்சப்பிஸ்தகிமரம், (ரானம்)

கபுல்பிஸ்தகிமரம், } 67 ம் பக்கம்.

= மஸ்திகு 67 ம் பக்கம்.

குங்குலியமரம் (ரானம்) 40 ம் பக்கம்.

வெண்ணைக்குன்றிகம், (ரானம்) 41 ம் ப.

= பைன் ரானம் 231 ம் பக்கம்.

ஸ்திப்திசுகள். Styptics.

அவாகடசரக்குகள்.

†பனை, } பூச 160 ம் பக்கம்.
†தெண்ணை, }

= மதிகவிலை.

†சாமக்கிழங்கு, (சாறு) 262 ம் பக்கம்.

வாசனையொபீயமரம், (ரானம்) 41 ம் பக்.

இந்துப்பதார்த்தங்கள்.	பிறித்தனிவாகட. பதார்த்தங்கள்.
-----------------------	-------------------------------

துவர்த்தோணிகங்கள். Astringent Tonics.

ஏழிலைப்பாலை, (பட்டை) 147 ம் பக்கம்.
வேப்பம்பட்டை, 61 ம் பக்கம்.
சேம்மரப்பட்டை, 63 ம் பக்கம். } = சின்கனபட்டை 120 ம் பக்.

அவாகடசரக்துகள்.

†தூணுமரம், (பட்டை) 64 ம் பக்கம். = சின்கனபட்டை 120 ம் பக்.
கருங்காலி, (பட்டை) 142 ம் பக்கம்.
தாளிசபத்திரி, 34 ம் பக்கம்.
†கசப்பு வெட்பாலை, (பட்டை) 148 ம் ப. = சின்கனபட்டை 120 ம் பக்.
உயர்சின்கனம், (பட்டை) 127 ம் பக்கம். = சின்கனபட்டை 120 ம் பக்.
மொகடம், (பட்டை) 141 ம் பக்கம்.
சுணைக்குளப்பாலை, 149 ம் பக்கம்.
†வட்டவிலைச்சால்மரம், 128 ம் பக்கம்.
கற்கடகசிங்கி, (காய்) 67 ம் பக்கம். = ஒக்மாசக்காய் 222 ம் பக்கம்.
கடுக்காய், 97 ம் பக்கம்.
கடற்றென்னை, (பட்டை) 64 ம் பக்கம்.
துவர்களுங் காண.

கைப்பான சுகந்த தோணிகங்கள்.

Bitter and aromatic Tonics.

அதிவிடயம், (வேர்) 11 ம் பக்கம்.
நிலவேம்பு, (தண்டுமேரூம்) 172 ம் பக். = குவசி 57 ம் பக்கம்.
இந்துபாபெரியும் அதின்இனங்களும்
(வேர்ப்பட்டை) 19 ம் பக்கம்.
களற்சிக்காய், 76 ம் பக்கம்.
*பரைரக்கொடி, (வேர்) 15 ம் பக்கம்.
கப்தீஸ்பூடு, (வேர்) 12 ம் பக்கம்.
நாகுதின், 29 ம் பக்கம்.
*சிரட்டுச்சி, (காய்ந்தபூடு) 159 ம் பக்கம். = ஜென்சன்கிழங்கு, 158 ம் பக்.
*காஞ்சிரங்கொட்டை, 154 ம் பக்கம். = களம்புகிழங்கு, 14 ம் பக்.
சீந்தில், (வேரும் தண்டும்) 17 ம் பக்கம்.
மிளகரணை, (வேர்ப்பட்டை) 55 ம் பக். = கஸ்பாரிப்பட்டை 48 ம் பக்.

அவாகட சரக்துகள்.

வசம்பு, (வேர்த்தண்டு) 261 ம் பக்கம்.
சவுக்கு, (பட்டை) 58 ம் பக்கம்.
†நெட்டாவில், (விதை) 229 ம் பக்கம்.
†பெருமருந்து, (கிழங்கு) 210 ம் பக்கம். சேபந்தாரி வேர்.

இந்துப்பதார்த்தங்கள்.	பிறித்தனிவாகடபதார்த்தங்கள்.
மாசிபத்திரி, (பூடு) 136 ம் பக்கம். †குவசி வேம்பு, (வேர்) 58 ம் பக்கம். †சாமந்திப்பூ, 138 ம் பக்கம். வெள்ளறுகு, (பூடு) 161 ம் பக்கம். கைப்புக்கிலுறுடென், (பூடு) 175 ம் பக். காட்டுக்கொடி, 18 ம் பக்கம். சிறுநறுவிலி (பட்டை) 168 ம் பக்கம். கோவன்கறுடலின் (கிழங்கு) 30 ம் பக்கம் †மரமஞ்சன், 18 ம் பக்கம். வில்வம் இலை, 54 ம் பக்கம். கோரைக்கிழங்கு, } முத்தக்காசுக்கிழங்கு, } 263 ம் பக்கம். எரிதீரப்பூடு, (சமூலம்) 161 ம் பக்கம். அயப்பனை, (பூடு) 137 ம் பக்கம். †துவிவன்னவெச்சகப்பூடு, } (வேர்) †தானெச்சகப்பூடு, } 160 ம் †சதுரெச்சகப்பூடு, } பக்கம். } பேயத்தி, (பட்டை) 228 ம் பக்கம். †இமயஜென்சன்(கிழங்கு) 160 ம் பக்கம். பேபீர்க்கம், (பூடு) 106 ம் பக்கம். நாகசாமரம், (பட்டையும்வேரும்) 39 ம் ப. சம்பகம், (பட்டை) 14 ம் பக்கம். †சிரட்பூடு, (காய்ந்தபூடு) 160 ம் பக்கம். கீரிபுரண்டான், (வேர்) 129 ம் பக்கம். பாம்புச்சைலம், 150 ம் பக்கம். †கைச்சல்தண்டான்பூடு (வேர்) 171 ம் பக். ராசையம், (இலையும் தண்டும்) 150 ம் பக் மலைதாங்கி. (வேர்) 43 ம் பக்கம். தலித்தூரம்வொலியுலோசம், (வேர்) 13 ம் ப. காட்டுக்கொடி. (தண்டு) 18 ம் பக்கம். கடாததிரிக்குசாந்திஸ்கொடி (வேர்) 106 ம் பக்கம். கொம்புப்புடல், (பூடு) 105 ம் பக்கம். கோரட்டை, (பழத்தோல்) 106 ம் பக்கம்.	குவசி 57 ம் பக்கம். அந்திமிள்பூ 131 ம் பக்கம். ஜென்சன் கிழங்கு. களும்புக்கிழங்கு. ஜென்சன் கிழங்கு 158 ம் பக். ஜென்சன்கிழங்கு 158 ம் பக். கஸ்கரில பட்டை. நிலவேம்பு. கந்தாரிசு 287 ம் பக்கம். சீமைக்கடுகு 31 ம் பக்கம்.

வேசிகன்கள். Vesicants.

வாகடசரக்துகள்.	
கொப்புனவண்டு 289 ம் பக்கம். இந்துக்கடுகு, 32 ம் பக்கம்.	கந்தாரிசு 287 ம் பக்கம். சீமைக்கடுகு 31 ம் பக்கம்.

இந்துப்பதார்த்தங்கள்.	பிறித்தனிவாகடபதார்த்தங்கள்.
அவாகடசாகீதுகள்.	
கொப்புளவண்டினங்கள், 290 ம் பக். =	கந்தாரிசு 287 ம் பக்கம்.
கொடிவேலி, } வேர்ப்பட்டை	} = மெசீரியபட்டை 200 ம் பக்க.
சித்திரமூலம், } 180 ம் பக்கம்.	
களர்வா, (வேர்ப்பட்டை) 182 ம் பக்கம்.	

சோணதிகள் எதிரழற்சிகளையும் பார்க்கவும்.

பலவகைப்பதார்த்தங்கள்.

Miscellaneous.

நாயுருவி, (பூண்டு) 196 ம் பக்கம்.	= { இதின்காம்பலிலே பதாசி அ திசுமாயுண்டு.
நாவியும் அதின் இனங்களும், (வேர்) 11 ம் ப. =	{ இதினின்று அகனீதசம் எடு க்கப்படும்.
கமுகமடல், 261 ம் பக்கம்.	} = முறிவுமுதலியவற்றிற்கு கட்ட.
மூங்கில், 269 ம் பக்கம்.	
பெரும்புளையப்பூடு, (பூடு) 138 ம் பக். =	{ இதினின்று கர்ப்பூரம் அதன மாய் எடுக்கலாம்.
எலுமிச்சை, (பழச்சாறு) 53 ம் பக்கம். =	{ இதினின்று சிதறிக்கமில் எடுக்கப்படும்.
காக்கணங்கொடி, (பூச்சிறுபம்) 88 ம் ப. =	நிறப்பதார்த்தம்.
சப்பாத்துப் பூ, 43 ம் பக்கம். =	சோதனியாகலிற்மசுக்குப்பதில் { கொப்பளித்தஇடங்கள் வழு ந்தினஇடங்களுக்கு மூட வும் நீர்சிந்தாமற்காக்கவும் கண்ணோயிற் கண்ணுக்கு மறைவிடவும் இது உவந் தது.
வாழையிலை, 245 ம் பக்கம். =	{ மண்டித்தண்ணீரைத் தெளி யப்பண்ண உவந்தது.
நெல்லி, (மரம்) 216 ம் பக்கம். =	{ கக்கசுக்குப்பதிலாய் நிறப்ப தார்த்தமாகும்.
செஞ்சந்தனச்சிராய், 79 ம் பக்கம். =	{ இவற்றின் சாம்பலிலிருந்து சோடம் கனமாய் எடுபடும்.
உமரியும் அதின் இனங்களும், 195 ம் ப. =	{ இது பன்றிரெய்க்குப் பதி லாகும்.
பாற்சுரா, (ஸ்தியரின்) 293 ம் பக்கம். =	{ இதுமண்டித்தண்ணீரைத் தெ ளியப்பண்ணும்.
தேற்றங்கொட்டை, 157 ம் பக்கம். =	

பொருளட்டவணியும் அருஞ்சொல் அகராதியும்.

The Terms in this Vocabulary have been prepared in accordance with the following

RULES.

Aiming to have each Term brief, euphonious and apposite in derivation ; and accounting as practically Tamil, any word in good general use, seek for the Term first in the

Tamil, thus;

1. Prefer a simple or compound word in common use, or
2. If none, appropriate some apt though abstruse word, or
3. Compound a word, by uniting roots, or a root and a particle.
4. Rarely, some apt radical word may be modified, by giving it an ordinary termination, or
5. Where there are several words of wider though similar meaning, restrict one, to specify the object, or
6. Translate and join the several members of the English Compound word.

Finding no Term in the Tamil, transfer the

English, thus;

1. Write the word as a noun, tersely and smoothly; preserve its accent and the sounds of its radical portion and terminate it in ordinary Tamil form.
2. Modify it when requisite, by the addition of an appropriate particle.

3. In compounds, if there be for any member a good Tamil word, combine it with the English word.

If the word cannot be satisfactorily Tamilized, seek a Term in the

Sanscrit, thus;

1. Prefer a term sanctioned by both an English and Sanscrit, and a Sanscrit and English dictionary.

2. Should no appropriate Term be found, adopt some word expressive of one or more characteristics of the object to be named; or

3. Compound a word, by uniting roots, or a root and a particle; or

4. Adopt a word having the same meaning as the original of the English Derivative; or

5. Where there are several words of wider though similar meaning, restrict one, to specify the object.

6. If there be for any member of the English Compound, a good Tamil word, combine it with the Sanscrit.

The direct introduction of Western Terms into the Tamil is desirable, as affording the readiest communication of the knowledge they embody. The Tamils themselves freely practise it. Though there are some difficulties in the process, these can be met in the case of the English, as well as they have been, in the case of the Sanscrit. It needs but to determine what sounds and forms exist in the English, unlike those in the Tamil and the Sanscrit; and to agree upon a uniform manner of rendering them into Tamil. In devising this method, latitude will be required, proportionate to the dissimilarity of the languages concerned.

As each European language assimilates from the Greek or Latin, the same words differently; so will Indian languages modify words from the Sanscrit or English, each in its own peculiar way.

Hybrid words are not infrequent in Tamil.

The sounds of the letters in Tamil are so constant, that its words can be easily transliterated into English. But in English they are so variable that transliteration is impracticable, and the words can only be spelled into Tamil according to their sound. Tamil words have no silent letters; English words have many.

Several initial and several terminal sounds common in English are either not found in the Tamil language, or are inadmissible in Tamil grammar. To meet this in part, the same alphabet which has already given to Tamil, H, J, S, and Sh, should supply B, D, and G. The sounds of *a* in *an*, *air*, and *all*, so common in English, are absent in Tamil. The sound of *a* in *ale*, is not distinguished from that of *a* in *earth*. These diversities however, can be easily accommodated. Z may be well represented by ஃ.

Many English words Tamilize more neatly from their Latin originals ; e. g. a word ending in *ion*, Tamilized from its Latin ending in *um* gives a word, which dropping ம forms an adjective more like a past relative participle. Pronunciation in modern Greece and Italy, should influence Tamilization.

English adjectives end in a great variety of forms, many of which can be comprised in *அ* by the dropping of ம, which will naturally end many Tamilized English nouns.

The Terminal *us*, *a*, *um*, may for neuter Tamil nouns, be severally rendered by *அம்*.

In some cases, words from the English should, like words from the Sanscrit, yield to that Tamil force which blends diverse consonants into a mere doubling of one. For example, as பகஷம் becomes பக்கம் and சப்தம் becomes சத்தம் so should *Apoplexy* ஆபுபிலெக்சி become ஆபுபிலெச்சி and *Elector* இலெக்தர் become இலெத்தர்.

When a word ending either in க்கு, ஈ or ற்று combines with a word following, க்கு should change to க் ; ஈ to ஸ் ; and ற்று to ற் ; e. g. இபிகாக்கவன், கந்தாரிஸ்பொடி, &c.

Through the more frequent occurrence of vowel sounds, Tamilized words tend to overlengthen. To obviate this, choose of equally near sounds, the one which comes in the fewest characters ; (e. g. மு vs மொ, ரோ vs ரோ.) and sometimes drop the last syllable, (e. g. *Uraemia* யூறீமி vs யூறீமியம், *Cirrhosis* சிரோசி vs சிரோசிசு.)

In conforming a radically related group to one central word, it should be noticed whether C has in most its S or its K sound; S its S or Z sound; and I its இ or ஐ sound; also where in the majority falls the accent.

Foreign Terms herein have been Tamilized as follows :—

1. Each Term has been introduced as a noun; made as brief as possible, consistent with the preservation of its radical sounds and accent and so ended in some ordinary form, that it may easily turn to the adjective or verb.

2. Endeavour has been made to introduce the Terms according to the genius and grammar of the Tamil; in some instances transposing syllables, to favor cadence and termination.

3. Among several Terms designating the same thing, that one has been chosen, which would enter the Tamil most easily.

4. As far as practicable, the Terms have been differentiated from any pre-existing Tamil word.

5. Terms radically related, have been so accommodated to each other that this shall appear.

Many Terms of Anatomy, Chemistry, &c. will occur in these branches, for which the reader may refer to proper Glossaries already published.

அகசி.	அடத்.
அகசிப்பிசின்மரம் 70 Gum Acacia Tree.	அக்சிரித்தல் Oxidation.
அகசிமுசிலாகு 71 Mucilage of Gum acacia.	அங்கராகி Cosmetic கஸ்மெடு.
அகத்தி 86 Agati Grandiflora.	அசமதாகவிரை Ajmud இது ஒமம் போன்றது.
அகந்தாசியங்கள் 172 Acanthaceae.	அசமதாகவோமம் 118 Carum Roxburghianum அசமதாகம்.
அகனிதக்கிழங்கு 9 Aconite Root.	அசனூதம் Abortive.
அகனிதம் 9 Aconitum Napellus.	அசிதசு Acetate.
அகனிதசம் 10 Aconitia.	அசிதிக்கமிலம் 282 Acetic Acid.
அகனிதரஞ்சம் 9 Tincture of Aconite.	அசிதிக்கீதர் Acetic Ether.
அகனிதவிலை 9 Aconite Leaves.	அசு-as,-ate.
அக்கிராக்காரம் 135 Pellitory Root.	அசைவல்பீனியப்பூடு 244 Alpina Nutans.
பைரீதிரவேர்,	அஸ்கிலீபிரின் Asclepedin.
அக்குவத்தி Aquatic நீர்வாழும்.	அஸ்கிலீபிரியங்கள் 151 Asclepiadeae.
அக்குவம் Aqua, Water நீர், தண்ணீர்.	அஸ்கிலீபிக்குறசாவிதப்பூடு 153 Asclepia Curassavica.
அக்குளோட்டு Walnut.	அஸ்பரகசசென்றெஸ்பூடு 255 Asparagus Ascendens, ஏறவரி
அக்சலிக்கமிலம் 397 Oxalic Acid.	அஷ்மன்னா 147 Ash Manna.
அக்சிதம் Oxygen.	அஷ்மரம் 146 Ash tree.
அக்சிமெல் 282 Oxymel காடிதேன்.	அடத்து Adapter இணக்கி.
அக்சிரம் Oxide, Oxidum.	

அடச.	அபா.
அடசப்பிலாஸ்தர் Adhesive Plaster ஒட்டுப்பற்று.	அநீர Anhydrous அவைரு.
அடசம் Adhesion ஒட்டு, பற்று.	அநீரதுருசி Anhydrous Sulphate of Copper.
அடைகெந்தகம் 304 Precipitated sulphur.	அந்திசெப்தி Antiseptic பூதிக்கினம்.
அடைப்பம் Plug.	அந்திஸ்பசி Antispasmodic கருசக் கினம்.
அட்டை 286 Leech.	அந்திபிராடி Antiperiodic.
அணீதக்கொட்டை 111 Dill Fruit சதருப்பி, சோயிக்கீரை.	அந்திமணி 356 Antimony.
அண்ணாசுப்பூ 13 Star Anise.	அந்திமணிகுலோறிரம் Chloride of Antimony.
அதககந்தி 304 Precipitated Sulphur.	அந்திமணிசல்வுகம் 357 Sulphurated Antimony அஞ்சனக்கல்.
அதகசண்ணகாபனசு 346 Precipitated Carbonate of lime.	அந்திமணிசார்த்தகுலோறிரம் Sesquichloride of Antimony.
அதகம் Precipitate அடையல்.	அந்திமணிதாத்தரகம் 358 Tartarated Antimony.
அதகுலோரோசமிலம் Hypochlorous Acid.	அந்திமணிதாத்தரக வன்கென் 359 Ointment of Tartarated Antimony.
அதபாஸ்விசுகள் Hypophosphites.	அந்திமணிதிரிசல்விரம் Tersulphuret of Antimony.
அதவசிதச Subacetate.	அந்திமணிதிரிகுலோறிரநீர் 358 Solution of Terchloride of Antimony.
அதிபரிச்சம் 64 Celastrus Paniculata வாலுளுவை.	அந்திமணிபற்பம் 357 Antimonial Powder.
அதிமதுரப்பூடு 82 Liquorice Plant.	அந்திமணியக்கிரம் 356 Oxide of Antimony.
அதிமதுரப்பாணி 83 Liquorice Extract அதிமதுரம்பால்.	அந்திமணியைவன் 359 Antimonial Wine.
அதிவிடயம் 11 Atis.	அந்திமிஸ்பூ 131 Chamomile Flowers சீமைச்சாமந்திப்பூ.
அதெப்சு Adeps, Lard லாடு, கிடயம், பன்றிறெய்.	அந்திமிஸ்பூடு Anthemis Nobilis சாமந்திப்பூடு.
அத்தி 229 Ficus Racemosa, Fig சீமையத்தி, தேனத்தி.	அந்திவிலோசிஸ்த Antiphlogistic தாபக்கினி.
அத்திக்கள்ளா 229 Fig toddy.	அந்தெல்மிந்தி Anthelmintic கிருமி கொல்லி.
அத்தித்திப்பிலி 262 Scindapsus officinalis.	அபகி Corrective கரெக்திவு.
அத்திர Volatile.	அபகை Deposit அடையல்.
அத்திரதேலம் Essential Oil, Volatile Oil.	அபசஞ்சாரி Disinfectant.
அத்திரத்துவம் Volatility அத்திரமை	அபருத்து Apparatus அணியம்.
அத்திரோபபெலடனப்பூடு 182 Atropa Belladonna.	அபாசனியங்கள் 147 Apocynae.
அத்திரோபியசல்வசு 185 Sulphate of Atropia.	அபாதிகன் Apothecary சிகிச்சன்
அத்திரோபியசல்வசுநீர் 185 Solution of Sulphate of Atropia.	அபாமிலி Antacid.
அத்திரோபியநீர் 185 Solution of Atropia.	அபார Levis, Light லகு.
அத்திரோபியம் 184 Atropia.	

அபா.	அய.
அபாரமக்னிசிகாபனசு 351 Light Carbonate of Magnesia.	அமோனசல்வுசையனசு Sulphocya- nate of Ammonia.
அபாரமக்னிசி 350 Light Magnesia	அமோனசார்த்தகாபனசு S e s q u i Carbonate of Ammonia.
அபினி Opium அவின், கசகசாப்பால், ஒபியம்.	அமோனசித்திரசு Citrate of Ammo- nia
அபீரியம் Aperient இளம்பேதி.	அமோனசுகந்தஸ்பிறிது 316 Aro- matic spirit of Ammonia.
அப்சாபென் Absorbent Medicine, அமிலக்கிணம்.	அமோனதகுலோறிரம் 318 Chloride of Ammonium. நவச்சாரம்.
அப்பிரகம் Mica மீகம், மீகக்கல்.	அமோனதசல்விரம் Sulphide of Ammonium.
அப்பில் Apple.	அமோனதசல்வுசையனசு Sulpho- cyanate of Ammonia.
அப்பிறிகட்டு Apricot.	அமோனதபுரோமிரம் 310 Bromide of Ammonium.
அமரந்தாசியங்கள் 195 Amaranta- ceae.	அமோனதம் Ammonium.
அமரிவிடாசியங்கள் 246 Amarylli- daceae.	அமோனதவியோதிரம் Iodide of Ammonium.
அமரு Amadou காளான்பஞ்சு.	அமோனநீர் 314 Solution of Am- monia.
அமல்கம் Amalgam இரசகலவை.	அமோனபாஸ்வசு 317 Phosphate of Ammonia.
அமாவ Amorphous அருப, மாவான.	அமோனபெஞ்சோவசு 317 Benzo- ate of Ammonia.
அமிலமை Acidity அமிலத் தன்மை, புளிப்பு.	அமோனம் 313 Ammonia.
அமிலம் Acid,	அமோனவக்சலசு 397 Oxalate of Ammonia.
அமிலித்த Acidified புளித்த.	அமோனவசிதசுநீர் 316 Solution of Acetate of Ammonia.
அமுக்கிரா 193 Winter Cherry அசு வகந்தி.	அமோனவலும் 352 Ammonia Alum அமோனசினக்காரம்
அமுரிதம் Diuretic தியுநீசம்.	அம்பர் Amber கர்ப்பூரமணி.
அமுருசிப் பூடு 30 Horseradish, Armoracia.	அம்பெலிடியங்கள் 65 Ampelideae.
அமுனீயகம் 113 Ammoniacum கம நாயகம்.	அயகாந்தவக்சிரம் 373 Magnetic Oxide of Iron.
அமுனீயகப்பூடு 113 Dorema am- moniacum.	அயகாபனசுச்சர்க்கரை 375 Saccha- rated Carbonate of Iron.
அமைதிப்பொடி Quieting Powder.	அயகாபனசுக் குளிகை 375 Pill of Carbonate of Iron.
அமைலமுசிலாகு 267 Mucilage of Amylum.	அயகினியசித்திரசு 383 Citrate of Iron and Quinia.
அமைலம் 266 Starch ஸ்தாட்சு.	அயகூட்டுமிஸ்தூர் 377 Compound Mixture of Iron.
அமைலிக்கலக்கால் Amylic Alcohol.	
அமைல் Amyl.	
அமைலைரம் Hydride of anyl.	
அமோனகரநீர் 314 Strong Solution of Ammonia.	
அமோனகாபனசு 315 Carbonate of Ammonia.	
அமோனகாபனஸ் நீர் Spirit of Hartshorn.	

அய.	அல்.
அயசல்வசு 376 Sulphate of Iron அன்னபேதி.	அயவலும் Iron alum.
அயசல்விரம் 398 Sulphide of Iron.	அயவாசெனசு 381 Arseniate of Iron.
அயசிதிறசு Citrate of Iron.	அயவியோதிரக்குளிகை 381 Pill of Iodide of Iron.
அயசிதிறசு வைன் 383 Wine of citrate of Iron.	அயவியோதிரம் 380 Iodide of Iron.
அயசீயமசுப்பூடு 189 Hyoscyamus.	அயவியோதிரசிறுபம் 380 Syrup of Iodide of Iron.
அயசீயமஸ் விரை 190 Henbarr. Seeds குராசானியோமம்.	அயவீரபிரவக்கிரம் 374 Moist Peroxide of Iron.
அயசீயமின் 189 Hyoscyamin.	அயவைரசுபிரவக்கிரம் 374 Hydrated Peroxide of Iron.
அயசுகந்தமிஸ்தூர் 384 Aromatic Mixture of Iron.	அயவைன் 384 Wine of Iron.
அயதனசு Tannate of Iron.	அரத்தை 244 Galangal.
அயதாத்தரகம் 383 Tartarated Iron.	அரலியாசியங்கள் 118 Araliaceæ.
அயபாஸ்வசு 375 Phosphate of Iron.	அரிசி 267 Rice.
அயபாஸ்வசுச்சிறுபம் 376 Syrup of Phosphate of Iron.	அரிஸ்துலோகியசியங்கள் 209 Aristolochiaceæ.
அயபிரகுலோதிரகரநீர் 379 Strong Solution of Perchloride of Iron.	அரிதாரம் 356 Orpiment, Yellow Sulphuret of Arsenic, Tersulphide of Arsenic தாரம், பொன்னரிதாரம், தாளகம்.
அயபிரகுலோதிரகிருசநீர் Diluted Solution of Perchloride of Iron.	அர்மேனிக்காவி Armenian Bole.
அயபிரகுலோதிரம் Perchloride of Iron.	அர்வதா 48 Indian Rue.
அயபிரகுலோதிரரஞ்சம் 379 Tincture of Perchloride of Iron.	அலக்காலெசிறுத்து Alcoholic Extract.
அயபிரசல்வசு Persulphate of Iron.	அலக்கால் 276 Alcohol.
அயபிரசல்வசுநீர் 378 Solution of Persulphate of Iron.	அலக்கால் வீச்சு விளக்கு Alcohol Blast Lamp.
அயபிரநீதுரசு Pernitrate of Iron.	அலரி Oleander, Sweet Scented Oleander.
அயபிரநீதுரசுநீர் 381 Solution of Pernitrate of Iron.	அலுமினியம் 352 Aluminium.
அயபிரவக்கிரம் Peroxide of Iron.	அலும் 352 Alum சீனக்காரம், பழகாரம்.
அயபிலாஸ்தர் 374 Chalybeate plaster.	அலுவின் Aloine.
அயபுரவக்கிரம் Protoxide of Iron.	அலோய் Alloy கலவைலோகம்.
அயப்பனை 137 Eupatorium Ayanapana.	அல்கங்கள் 273 Algæ.
அயம் 372 Iron இரும்பு.	அல்கலை Alkali சருச்சி.
அயவசிதசு Acetate of Iron.	அல்காகிமரோரசெடி 89 Albagi Maurorum.
அயவசிதசிரஞ்சம் 378 Tincture of Acetate of Iron.	அல்தீயப்பூடு Marshmallow, Althæa Officinalis.
அயவமோனசிறுசு 382 Citrate of Iron and Ammonia.	அல்புமின்நீர் 294 Solution of Albumen.

அல்ப.

அல்பம் 211 Alpam.
 அல்லி *Nymphaea Edulis* அல்லிதாமரை, ஆம்பல்.
 அவாகட *Unofficinal* வாகடமுறையற்ற.
 அவி Butter வெண்ணெய்.
 அவிகம் Cream பாலாடை, கீர்ம்.
 அவினிரஞ்சம் 25 Tincture Opium, Laudanum லாடனம்.
 அவின் 22 Opium.
 அவுடுபாரிதை Avoirdupois Weight.
 அவுரி *Indigofera Tinctoria* நீலமரம்.
 அஞ்சம் Affusion நிசேகம், சொரிதல்.
 அவைரு Anhydrous அநீர.
 அழகுச்சிரட்டூடு 160 Ophelia Elegans.
 அழகுரோயிற்பூடு 180 Roylea Elegans.
 அழிஞ்சிமரம் *Alangium Decapetalum*.
 அழுத்தஸ்மைலச்சுப்பூடு 240 Smilax Glabra.
 அறுக்கிளாமீன் 294 Sier fish.
 அறுதம் 47 Rue ரூப்பூடு.
 அறுவிடியங்கள் Aroideæ.
 அனகாடியாசியங்கள் 67 Anacardiaceæ.
 அனாசப்பழம் Pine Apple அன்னதாழை.
 அனாலிசர் Analyst விபேதனி.
 அனாலிசு Analysis விபேதனம்.
 அனிசமெலிசோவாதப்பூடு 179 Anisomeles Ovata.
 அனிலின் Aniline.
 அனீசு 110 Anise.
 அனீசெசென் 110 Essence of Anise.
 அனுபானம் Vehicle.
 அனுபந்தம் 405 Appendix.
 அனுவல் Annual Plant ஆட்டைப்பூடு.
 அனெஸ்தீசி Anaesthetic விசஞ்ஞதி.
 அனெலிடங்கள் 286 Annelida
 அன்கென் Unguent, Ointment லேபம்,

ஆசுதி.

அன்கென்கள் Ointments, அகனீதசு
 10 Aconitia; அத்திரோபிய 135 Atropia; அந்திமனிதாத்தரக 359 Tartarated Antimony; இயோத 310 Iodine; இரச 387 Mercurial; இரசசெவ்வியோதிர 393 Red Iodide of Mercury; இரசநீதரசு 394 Nitrate of Mercury, இரசநீதரசுத்தண் 394 Mild of Nitrate of Mercury; இரசவதகுலோதிர 390 Subchloride of Mercury; இரசவமோனக 392 Ammoniate of Mercury; ஈயவசிதசு 370 Acetate of Lead; ஈயவதவசிதசு 371 Subacetate of Lead; எலெமி 60 Elemi; கந்தாரிஸ் 259 Cantharides; காக்காய்கொல்லி 17 Coccus Indicus; கிறீயசற்று 235 Creasote; குந்துருக்கம் 61 Olibanum; கெந்தகம் 304 Sulphur; கந்தியியோதிர 305 Iodide of Sulphur; சபீன் 237 Sabine; சால்முக்கிர 34 Chaulmugra; தனி 291 Simple; திமிநெய் 295 Spermaceti; தார் 234 Tar; பதாசியவியோதிர 320 Iodide of Potassium; பெலடன 184 Belladonna; மாசக்காய் 223 Galls; மாசவவின் 223 Galls with opium; ராச 233 Resin; விருத்தி 258 Veratria.
 அன்கு Ounce, Uncia.
 ஆகரி Metallic Ore, Mineral மினிற்.
 ஆகரிநஞ்சு Mineral Poison.
 ஆகரியமிலம் Mineral Acid.
 ஆகாசகருடன் 106 Bryonia Epigoea.
 ஆசமனீயம் Gargle கார்கில்.
 ஆசனதோயம் Hip Bath.
 ஆசச் சிகிச்சம் Extemporaneous Pharmacy அவாகடபார்மசி.
 ஆசுதி Distilled திஸ்திலித்த.

ஆசு.	இபி.
ஆசுதித்தநீர் Distilled Water ஆசுதிநீர், திஸ்திலித்தநீர்.	ஆவரை 86 Cassia Auriculata ஆவரை.
ஆசெனிககாரப் பொடி Arsenical Caustic Powder.	ஆவ்மனனுடைஞ்சீது Hoffman's Anodyne Spirit.
ஆசெனிககுலோறிரநீர் Solution of Chloride of Arsenic.	ஆளிவிரை Lepidium Sativum.
ஆசெனிககுலோறிரம் Chloride of Arsenic.	ஆற்றுப்பாலை 225 Salix Tetrasperma.
ஆசெனிகசல்விரம் Sulphuret of Arsenic.	ஆனைக்கற்றாழை 217 Agave Americana.
ஆசெனிகதிரிகுலோறிரம் Terchloride of Arsenic.	ஆனைச்சுண்டை 193 Solanum Ferox.
ஆசெனிகதுவிசல்விரம் Bisulphuret of Arsenic.	ஆனைத்திப்பிலி 262 Scindapsus Officinalis அத்தித்திப்பிலி.
ஆசெனிகநீர் 355 Arsenical Solution.	ஆனைநெருஞ்சி 162 Pedalium Murex பெருநெருஞ்சி.
ஆசெனிகபசை Arsenical Paste.	இக்-ic,-icum.
ஆசெனிகம் 353 Arsenic, பாஷாணம்	இங்கமோனஸ்பிறிது 316 Fetid Spirit of Ammonia.
ஆசெனிகவியோதிரம் Iodide of Arsenic.	இங்கிதம் Indication.
ஆசெனிகவைருகுலோறிக நீர் 355 Hydrochloric Solution of Arsenic.	இங்கு 112 Assafoetida பெருங்காயம்.
ஆசெனிக Arsenite.	இங்குக்கனி Anjudan.
ஆசெனோசமிலம் 354 Arsenious Acid.	இங்குப்பூடு 112 Ferula Assafoetida.
ஆடாதோடை 173 Justicia Adhatoda.	இசு Issue சியன்னி. இசு-is-ipe.
ஆடிவம் Vitriol வித்திரல்.	இஞ்சி 241 Ginger.
ஆடு 295 Sheep.	இஸ்பகூல்செடி 194 Ispaghul.
ஆடுதின்னாப்பாலை 211 Aristolochia Bracteata, Kira-mar.	இந்திசு 397 Indigo நீலம்.
ஆட்டைப்பூடு Annual Plant அனுவல்.	இந்திசுசல்வசு Sulphate of Indigo.
ஆணிகப்பூடு 133 Arnica Montana.	இந்திர Organic ஓர்கன.
ஆணிகவேர் 133 Arnica Root.	இந்து India இந்துதேசம்.
ஆண்வீலிஸ்பூடு 270 Male Fern.	இந்துக்கடுகு 32 Indian Mustard.
ஆதாரம் Basis or Base ஆதாரகம், அடி.	இந்துத்திரிகுடெஸ்மம் 168 Trichodesma Indica.
ஆதின Patent திறந்த.	இந்துபாபெரி 19 Indian Barberry.
ஆமணக்கு 213 Castor Plant.	இந்துவாதுமைக்கொட்டை 93 Indian Almond.
ஆமணக்கெண்ணெய் 213 Castor oil.	இந்துப்பெப்பமிந்துப்பூடு 179 Micromeria Capitellata.
ஆம்பல் Nymphaea Edulis அல்லி, அல்லிதாமரை.	இபிகாக்கு 125 Ipecac.
ஆர்கன்திரி Argand Burner.	இபிகாக்கூட்டுச்சூரணம் Compound Powder of Ipecacuanha.
ஆல் 228 Banyan Tree.	இபிகாச்சூடு 125 Cephaelis Ipecacuanha.

இ.பி.	இ.ர.ச.
இபிகாக்கைவன் 126 Wine of Ipecacuanha.	இரசசையனிரம் Cyanide of Mercury.
இமயஜென்சன் 160 Gentian Kurro.	இரசதுவிசல்விரம் Bisulphuret of Mercury சாதிவிங்கம்.
இமயவரியாத்து 199 Himalayan Rhubarb.	இரசநீதுரசமிலநீர் 393 Acid Solution of Nitrate of Mercury.
இமயவலீரியன் 130 Valeriana Hardwickii.	இரசநீதுரசன்கென் 394 Ointment of Nitrate of Mercury.
இமல்சம் Emulsion பயசியம்.	இரசநீதுரசுத்தண்ணன்கென் 393 Mild ointment of.
இமாலியம் Emollient சாந்தனி.	இரசநீதுரசு Nitrate of Mercury.
இம்பீரல்கலன் Imperial Gallon.	இரசபச்சையியோதிரம் 392 Green Iodide of Mercury.
இம்புராவேர் Oldenlandia Umbellata சிறுவேர், இம்பூறல்.	இரசபிரகுலோநிரம் 390 Perchloride of Mercury சவ்வீரம், வீரம்.
இயோதம் 309 Iodine.	இரசபிரகுலோநிரநீர் 381 Solution of Perchloride of Mercury.
இயோதநீர் 310 Solution of Iodine.	இரசபிலாஸ்தர் 388 Mercurial Plaster.
இயோதரஞ்சம் 310 Tincture of Iodine.	இரசபீதசல்வசு Yellow Sulphate of Mercury.
இயோதலினிமென் 310 Liniment of Iodine.	இரசபீதலோஷன் 392 Yellow Mercurial Lotion.
இயோதவன்கென் 310 Ointment of Iodine.	இரசபீதவக்சிரம் Yellow Oxide of Mercury.
இயோதவரம் Iodoform.	இரசமேறல் Mercurialization.
இயோதவினலாசம் 310 Inhalation of Iodine.	இரசம் 386 Mercury இதரம், ஐராச் சிறம்.
இரங்குன்மல்லி 99 Rangoon Creeper, Quisqualis Indica.	இரசலினிமென் 388 Mercurial Liniment.
இரசகருலோஷன் 390 Black Mercurial Lotion.	இரசவதகுலோநிரவன்கென் 390 Ointment of Subchloride of Mercury.
இரசகிரீதம் 397 Mercury with Chalk.	இரசவதகுலோநிரம் 389 Subchloride of Mercury கலமல், இரசகர்ப்பூரம்.
இரசகுளிகை 386 Mercurial Pill.	இரசவதசல்வசு Subsulphate of Mercury.
இரசகூட்டன்கென் 387 Compound Ointment of Mercury.	இரசவமோனகம் 392 Ammoniated Mercury.
இரசசப்பாசிதுறி 388 Mercurial Suppository.	இரசவமோனகவன்கென் 392 Ointment Ammoniated Mercury.
இரசசல்வசு 388 Sulphate of Mercury.	இரசவன்கென் 387 Mercurial Ointment.
இரசசெவ்வக்சிரம் 388 Red Oxide of Mercury.	இரசவாதி Alchemist.
இரசசெவ்வக்சிரவன்கென் 389 Ointment of Red Oxide of Mercury.	
இரசசெவ்வியோதிரம் 393 Red Iodide of Mercury.	
இரசசெவ்வியோதிரவன்கென் 393 Ointment of Red Iodide of Mercury.	

இரச.	ஈய.
இரசவியோதிரம் Iodide of Mercury.	இன்ஜெக்சன் Injection புகட்டல், நி
இரத்தை 244 Lesser Galangal.	ட்சேபம், எனீமம்.
இரம்-ide-idum.	இன்ஜூசமக்கு Infusion Mug கஷா
இராளப்பிலாஸ்தர் 233 Resin Plaster.	யவேனம்.
இராளவன்கென் 233 Resin Oint-	இன்ஜூசம் Infusion கஷாயம்.
ment.	இன்ஜூசங்கள் Infusions; இந்தபா
இரிடியங்கள் 245 Irideae.	பெரி 20 Indian Barberry; ஏர்
இருண Negative.	கற்று 264 Ergot; ஏழிலைப்பாளை
இருப்பை 141 Mahwa Tree, இலுப்	148 Alstonia; கஸ்கரில் 212 Cas-
பை.	carilla; கஸ்பாரி 43 Cusparia;
இரும்பு 372 Iron.	கராம்பு 100 Cloves; காசுக்கட்டி
இரேவற்சின்னி Rhubarb, வரியாத்	72 Catechu; காஞ்சிர 154 Nux
து, மஞ்சட் சீனக்கிழங்கு.	Vomica; கிரமேரி 36 Krameria;
இலங்கைஏலம் 243 Ceylon Carda-	குசோ 91 Koussou; குவசி 57
moms.	Quassia; சாமந்தி 131 Chamomile;
இலங்கைக்கடற்பாசி 273 Ceylon	சிரட்டுச்சி 159 Chiretta; சீந்தில்
Moss.	17 Gulancha; சுக்கு 242 Ginger;
இலந்தை Zizyphus Jujuba.	செனிக 35 Senega; சேபந்தாரி
இலவங்கப்பூ 100 Cassia Buds கறு	210 Serpentry; ஜென்சன்கூட்
வாப்பூ, கராம்பு.	டு 158 Compound Gentian; திச்
இலவங்கமரம் 100 Clove Tree கரா	சிதாலிஸ் 170 Digitalis; துல்ச
ம்புமரம்.	மார 191 Dulcamara; தோடந்
இலவமரம் Eriodendron Anfrac-	தோல் 50 Orange; தோடந்தோ
tuosum.	ற்கூட்டு 50 Compound Orange;
இலாமிச்சை 269 Cuscus Grass வெ	நன்னூரி 151 Indian Sarsaparil-
ட்டிவேர், உயிறு, வீரணம், விழல்	la; நிலவாகை Senna; நிலவேம்
வேர்.	புக் கூட்டு 172 Compound Kari-
இலெக்திறுசம் Electricity மின்சார	yat; பூக்கு 49 Buchu; மதிக 320
ம், ஆம்பரீயம்.	Matico; மிளகரணை 55 Toddalia;
இலைக்கள்ளி 216 Euphorbia Nerii-	யூவலூர்சி 140 Uva Ursi; ரோ
folia.	சையமில் 89 Acid of Rose; லுப்பு
இவபுருதம் Evaporation ஆவியாய்	லஸ் 225 Lupulus; வரியாத்து 198
வற்றல், உற்கமம்.	Rhubarb; வலீரியன் 130 Valerian.
இவபுருதவணியம் Evaporation Ap-	ஈசுரமூலி 210 Aristolochia Indica.
paratus உற்கமோபகரணம்.	ஈதப்சாகரி Ethiop's Mineral.
இறம் Rum ஓர்வகைச் சாராயம்.	ஈதர் 277 Ether.
இறும் 263 Rye இறும்பத்தானியம்.	ஈதர்ச்சீது 278 Spirit of Ether.
இறிடின் Iridin.	ஈயகாபனசு 369 Carbonate of Lead.
இனக்குலாசம் Inoculation நிவேசம்.	ஈயகாபனசன்கென் 369 Ointment
இனலாசம் Inhalation சுவசனம்.	of Carbonate of Lead.
இனியப்படலப் பாசி 274 Gillur	ஈயகார்சல்விரம் Black Sulphuret
ka putta.	of Lead.
இன்சாலுபில் Insoluble கரையாத.	ஈயக்கூட்டுச்சப்பாசிதுரி 370 Com-
இன்செத்துகள் 287 Insects.	pound Lead Suppository.

சய.	எசி.
சயகுரோமசு Chromate of Lead.	உல்மஸ் மரம் 225 Ulmus, Broad
சயச்சிவப்பு Minium, Red Oxide of Lead சயசெவ்வக்கிரம்.	Leaved Elm.
சயநீதரசு 371 Nitrate of Lead.	உல்மாசியங்கள் 225 Ulmaceae.
சயப்பற்று 386 Lead Plaster.	உவேய் Whey ததிரீர்.
சயமெகனசு Meconate of Lead.	உள்ளி Garlic வெள்ளுள்ளி, வெள்ளை
சயம் 368 Lead.	பூண்டு.
சயவவின்ஞளிகை 370 Pill of Lead and Opium.	உறிஞ்சு Inhalation of Powder.
சயவக்சலசு Oxalate of Lead.	உறிஞ்சுப்பு Smelling salt.
சயவக்சிரம் 368 Oxide of Lead.	உற்கமம் Evaporation ஆவியாய் வற்
சயவசிதசன்கென் 370 Ointment of Acetate of Lead.	றல், இவுபுருதம்.
சயவசிதசு 369 Acetate of Lead.	உற்கமவெசுருத்து Evaporated Ex-
சயவதவசிதசு Subacetate of Lead.	tract.
சயவதவசிதசன்கென் 371 Ointment of Subacetate of Lead.	உற்பித Saline லாவண, சலீன்.
சயவதவசிதசுநீர் 370 Solution of Subacetate of Lead.	ஊசித்தகரை 86 Cassia Tora தகரை.
சயவியோதிரப்பிலாஸ்தர் 372 Iodide of Lead Plaster.	ஊதனை 216 Jatropha Glandiflora.
சயவியோதிரம் 372 Iodide of Lead.	ஊமத்தை 187 Dhatura.
சயவியோதிரவன்கென் 372 Ointment of Iodide of Lead.	ஊரை Cycas Circinalis காமமரம்
சுராட்டைப்பூடு Biennial Plant.	எகியப்பூடு 169 Echium.
சுறயில் Gum Lancet முரசுவெட்டி.	எக்னொக்கு Egnog.
சுறிஸ்கிழங்கு Orris Root.	எசுருத்து Extract; அகனீத 10
உச்சிககெந்தகம் 303 Sublimed Sulphur.	Aconite; அதிமதுர 82 Liquorice;
உச்சிகம் Sublimate சப்லிமம், புடி.	அயசீயமஸ் 189 Hyoscyamus;
உச்சிகரணம் Sublimation சப்லிமித்தல்.	அவின் 24 Opium; இந்துபாபெரி
உஷ்மதம் Fomentation வமன்றசம்.	20 Indian Barberry; ஊமத்தை
உத்தமாகாணி 153 Daemia Extensa, வேலிப்பருத்தி.	187 Dhatura; எமதக்கில 76
உப Auxiliary துணை.	Haematoxylon; கசகசா 21 Pop-
உபபேறு By Product.	pies; கஞ்சா 223 Indian Hemp;
உமரி 195 Salicornia.	கலுசிந்துக்கூட்டு 104 Compound
உம்பெலீவிரங்கள் 108 Umbelliferae.	Colocynth; களும்பு 15 Calumba;
உயர்சின்கனம் 127 Hymenodictyon Excelsum.	காஞ்சிர 155 Nuxvomica; கிரமேரி
உயிறு Cuscus Grass வெட்டிவேர்.	36 Krameria; குவசி 58 Quassia;
இலாபிச்சை, வீரணம், விழல்வேர்.	கொல்சிக 256 Colchicum; கொல்
	சிக அசிதிக 255 Acetic of Colchi-
	cum; கோனிய 115 Conium; சா
	மந்தி 132 Chamomile; சீந்தில்
	17 Gulancha; சொகோத்திரசகை
	249 Socotrine Aloes; ஸ்திரூமு
	னி 186 Stramonium; ஜலப்பு 164
	Talap; ஜிரிகி 166 Kaladana;
	ஜென்சன் 158 Gentian; தரக்கச
	134 Taraxacum; தும்பிலி 142
	Diospyros; பபாடுசகை 251 Bar-
	badoes Aloes; பரைர 16 Pariera;

எசி.	ஐரு.
எசுருத்து (தொடர்ச்சி) பெலடன	எள்ளு 161 Sesamum Indicum.
183 Belladonna; மெசீரியவீதர்	எறிங்குமீன் Herring.
200 Etherial of Mezerium; லக்	எறீன் Errhine, Errhinum நசியம்,
தூக 135 Lactuca; வரியாத்து	நையம், நைசியம் நைசிகம்.
198 Rhubarb; வில்வ 54 Bael;	எற்று et-elled, better-ide.-idum.
வைசுத்கம் 80 Calabar bean.	எனீமம் Enema பாயுரியம்; அவின்
எசென் Essence.	26 Opium; இங்கு 163 Assafoe-
எச்சிபியென் Expient யானம்.	tida; சகை 251 Aloes; தர்ப்பந்தி
எச்சுதங்கள் Exogens.	ன் 232 Turpentine; புகையிலை
எஸ்கருட்டி Escharotic தாகனம்.	191 Tobacco.
எஸ்பெக்துறன் 452 Expectorant	ஏககதிலீதங்கள் 239 Monocoty-
நிசேட்வனி, கபங்கக்கி.	ledons.
எட்டியச்செடி 168 Ehretia Buxi-	ஏணக்கரி 301 Animal Charcoal எ
folia.	ன்புக்கரி.
எதிரழற்சி 457 Counter Irritant.	ஏணப்பற்பம் Bone Ash எலும்புநீறு.
எபெனாசியங்கள் 142 Ebenaceae.	ஏயல் Ale.
எமதக்கில சிராய் 76 Logwood.	ஏர்கற்றீதிரஞ்சம் Ethereal Tinc-
எமீதியம் Emetia.	ture of Ergot.
எமோதியவரியாத்து 199 Rheum	ஏர்கற்று 263 Ergot.
Emodi.	ஏர்திசியங்கள் 226 Urticeae.
எம்புறுகாசன் Embrocation, Lini-	ஏலம் 242 Malabar Cardamom.
ment பூச்சுமருந்து.	ஏலிபர் Black Hellebore காரேலிபர்.
எம்பைறுமம் Empyreuma பிலுட்டம்	ஏழிலைப்பாலை 147 Alstonia Schola-
எம்மெனகக்கு 452 Emmenagogue	ris.
ருதுபிரேசி.	ஏறவரி 255 Asparagus Ascendans.
எரிகாசியங்கள் 140 Ericaceae.	ஐசிங்கிளாசு 292 Isinglass மீன்வச்
எரிதிரப்பூடு 161 Erythraea Rox-	சிரம்.
burghii.	ஐசிலன்பாசி 271 Iceland Moss.
எருக்கந்தூள் 152 Powder of Mu-	ஐராசு Hydrate.
dar.	ஐராஸ்தின் Hydrastin.
எருக்கு 151 Mudar எருக்கம்.	ஐராச்சிறம் Mercury இரசம், இதரம்
எலதிரிக்காய் Squirting Cucumber	ஐருகுலோறிக்கமில்ம் 308 Hydro-
Fruit.	chloric Acid, உப்புத்திராவகம்.
எலதிரிக்கொடி 101 Ecbalium Offi-	ஐருகுலோரோசமில்ம் Hydrochlo-
cinarum, Squirting Cucumber.	rous Acid.
எலதீரியம் 104 Elaterium.	ஐருசல்வரிச்சமில்ம் 398 Hydrosul-
எலதீரின் 105 Elaterin.	phuric Acid.
எலிவாலரம் Rat tail file.	ஐருசையனிக்கமில்ம் 93 Hydro-
எலுமிச்சந்துளசி 179 Ocimum Gra-	cyanic Acid.
tissimum.	ஐருதம் Hydrogen ஐருதவாயு.
எலுமிச்சை 53 Lime Tree.	ஐருதவந்திமனெற்று Antimonetted
எலெமி 59 Elemi Tree.	Hydrogen.
எலெமிப்பருப்பு 60 Java Almonds.	
எவுலேசம் Efflorescence எவுலேசித்	
தல், பூர்த்தல்.	

ஐரு.	கட்.
ஐருதவாசெனெற்று Hydrogen. ஐலம் Hilum.	கஸ்கரில பட்டை 211 Cascarilla Bark. கஸ்தர் 298 Castor சுண்ணு, நீர்நாய் விரை.
ஒடுக்கிசைச்சிரட்பூடு 160 Ophelia Angustifolia.	கஸ்தூரி 295 Musk.
ஒடுக்கிசை ஸ்மைலச்சப் பூடு 240 Smilax Lancaefolia.	கஸ்தூரிமஞ்சள் 244 Curcurma Aromatica.
ஒடுக்கிசைநறுவில் 168 Cordia angus- tifolia.	கஸ்தூரிமான் 295 Moschus Moschi- ferus.
ஒதி 69 Odina Wodier ஒதியமரம். ஒதியம்பிசின் 69 Jingam ki gond. ஒபுடெல்லு Opodeldoc.	கஸ்தூரி வெண்டைக்காய்விரை Abel- moschus Moschatus.
ஒமியப்பதம் Homoeopathy சகுண கம்.	கஸ்பாரி 48 Cusparia.
ஒலிபானம் Olibanum குந்துருக்கம்.	கஸ்மேடு Cosmetic அங்கராதி.
ஒலியாசியங்கள் 144 Oleaceae.	கஞ்சா 227 Gunjah, Indian Hemp.
ஒலீயின் Olein.	கஞ்சாங்கோரை Ocimum Album, White Basil நாய்த்துளசி.
ஒலீவதேலம் 144 Olive Oil ஜைன னெண்ணெய்.	கஞ்சாச்செடி 227 Indian Hemp கோர்க்கர் மூலி.
ஒறந்தாசியங்கள் 50 Aurantiaceae.	கஞ்சாராளம் 228 Churrus.
ஒகர் Ochre காலிமண்.	கஞ்சாலேகியம் 228 Majoon.
ஒசதி Tonic தொணிகம் பெலந்தரு மருந்து.	கஞ்சி 267 Decoction of Rice.
ஒச osum-os.	கடலை 88 Bengal Gram.
ஒபியம் Opium அவின்.	கடற்பாலை 168 Argyreia Speciosa சமுத்திரப்பச்சை.
ஒபியனின் 23 Opianine.	கடற்றென்னை 64 Zyllocarpus Gran- atum.
ஒமக்கொட்டை 109 Ajwain Fruit ஒமவிரை.	கடற்றேங்காய் Lodoicea Sechella- rum.
ஒமம் 109 Omam, Ptychotis Ajo- wan, P. Coptica.	கடாததிரிக்குசாந்திஸ் கொடி 106 Trichosanthes Cordata.
ஒரிசைத்தாமரை Viola Suffruticosa.	கடுகு 31 Mustard.
ஒற்ச Oats ஒற்றந்தானியம்.	கடுகுப்பற்று 31 Sinapism.
ககால்கிசைனிப் பூடு 137 Cacalia Kleinia.	கடுகுரோகணி 171 Picrorrhiza root.
கக்கச 291 Coccus கிரிமிஞ்சிப்புழு.	கடுக்காய் 97 Ink Nut வரிக்காய்.
கக்கரி Cucumber பிப்பினி, முள்வெ ள்ளரி.	கடுக்காய்ப்பூ 98 Chebulic Myroba- lans Galls.
கசகசா 21 Poppy.	கடுமரம் 97 Chebulic Myrobalans Tree.
கசப்புவெட்பாலை 148 Holarrhena Antidysenterica.	கடெனிகமிவி 128 Gardenia Gum- mifera ஓர்வகைக்கும்பை.
கசமுஞ்ஞ்சி 242 Zingiber Cas- sumunar.	கடெனிலுசிர 128 G. Lucida.
	கடெனிகம்பனூலி 128 G. Campanu- lata ஓர்வகைக்கும்பை.
	கடம்பியம் 367 Cadmium.

சட்.	கரே.
கட்மியவியோதிரம் 367 Iodide of Cadmium.	கம்பீர்ச்செடி 127 Gambir Plant.
கட்மியவியோதிரவன்கென் 368 Ointment of Iodide of Cadmium.	கம்பெச்சன் Confection கன்பெக்சன், லேகியம்.
கட்மீரற்றேலம் 292 Cod Liver Oil மறுவித்தேலம்.	கம்பேவம் Conferve சமுஷ்ணி.
கட்மீன் 292 Gadus Morrhua, Cod fish.	கம்போச்சு 37 Gamboge மக்கி, இரேவல்சினிப்பால்.
கண்டங்கத்திரி 192 Solanum Jacquini.	கயபுட்சீது 101 Spirit of Cajuput.
கண்டுபாரங்கி 175 Clerodendron Serratum சிறுதேக்கு.	கயபுட்டேல் 100 Cajuput Oil கையாப்புடைதேலம்.
கதலிவாழை Musa Sapientum.	கயபுட்மரம் 99 Cajuput Tree.
கதாடி Cathartic பேதி, விரேசனம்.	கயப்பங்கொட்டை Saint Ignatius Bean.
கதாலிசு Catalysis சம்பேதனம்.	கர Fortior, Stronger.
கதிசின் 78 Catechin.	கரணைக்கிழங்கு 262 Typhonium Orixense கார்கரணைக்கிழங்கு.
கதேரூப்பிசின் Indian Tragacanth.	கரன்றுச்செடி Currant.
கத்தகாம்பு Catechu காசுக்கட்டி.	கரரம்பு 100 Cloves.
கந்தக்கினி Deodorizer தியோடறிசர்.	கரரம்புமரம் 100 Clove Tree.
கந்தாரிசு 287 Cantharides.	கரிசலாங்கண்ணி 138 Eclipta Prostrata.
கந்தாரிஸ்ரீர் 288 Blistering Liquid கொப்புளநீர்.	கரித்தேலம் Coal Oil.
கந்தாரிஸ்காடி 288 Vinegar of Cantharides.	கரி 300 காபன் Charcoal.
கந்தாரிஸ் வண்டு 287 Cantharis Vesicatoria கொப்புளவண்டு.	கரிப்பாப்பை 201 Charcoal poultice.
கந்தி 301 Sulphur கெந்தகம், சல்வு.	கருங்காலி 142 Ebony.
கந்தியியோதிரம் 304 Iodide of Sulphur.	கருங்காணம் 86 Cassia Absus.
கபுல்பிஸ்தகிமரம் 67 Pistacea Cambulica.	கருஞ்சீரகம் 13 Nigella Sativa.
கபேவமரம் 72 Copaifera Multijuga.	கருடன் 106 Bryonia Callosa.
கபேவம் 72 Copaiva.	கருட்டம் Maximum மக்சிமம்.
கப்சிசின் 191 Capsicin.	கருநொச்சி 173 Justicia Gendarussa கறுப்புநொச்சி.
கப்சல் Capsule, a saucer.	கருந்துளி Black Drop, Vinegar of Opium.
கப்பரிடியங்கள் 32 Capparideae.	கருப்பூரமரம் 202 Cinnamomum Camphora.
கப்ரிவோலியாசியங்கள் 119 Caprifoliaceae.	கரும்பு 265 Sugar cane.
கமமெலிடியங்கள் 96 Hamamelideae.	கரும்பூஷம் Morus Nigra, Black Mulberry.
கமாலம் 214 Kamala கமாலமாவு.	கருவூமத்தை Purple Flowered Dhatura.
கமு Gum பிசின்.	கருவேப்பிலை 57 Curry Leaf கறிவேப்பிலை, கிறியபிலை.
கமுகு 261 Areca Palm.	கருவேம்பு 57 Murraya Konigii கருவேப்பிலை.
கம்பசிதங்கள் 131 Compositae.	கருவேல்மரம் 85 Babool Tree.
	கரேக்திவு Corrective.

கர்.	கற்.
கர்ச்சமரம் 40 Gurjun Tree.	கல்வனிப்பத்துரி Galvanic Battery.
கர்ப்பூரவள்ளி 180 Anisochilus Carnosus, 'Thick-leaved Lavender, Lavandula Carnosa.	கல்வனியம் Galvanism.
கர்ப்பூரம் 202 Camphor.	கவுரம் Yelkof Egg செங்கரு.
கலமல் 389 Subchloride of Mercury இரசவதகுலோதிரம், இரசகர்ப்பூரம்.	கவுன்றர் Counter கந்தோர்.
கலமல்கூட்டுக்குளிகை 390 Compound Pill of Subchloride of Mercury.	கழுதைப்பால் Ass' Milk.
கலமின் Calamine.	களற்சிக்காய் 76 Bonduc Nut கெச்சக்காய், களற்சி.
கலனத்தாள் Filtering Paper வடிதாள்.	களர்வா 182 Pilu.
கலனம் Filtration வடித்தல்.	களும்புக்கிழங்கு 14 Calumba Root கலம்பாவேர்.
கலனி Filter.	களள்ளி 216 Milk-hedge Plant கள்ளிகொம்பு.
கலனியம் Filtrate.	கற்கென் Corrigent நியந்தை.
கலன் Gallon நாலுகொத்து.	கறியுப்பு 337 Common salt.
கலிக்கமில் 224 Gallic Acid.	கறுப்பழிஞ்சிமரம் Alangium Hexapetalum.
கலிசாயசின்கனம் 120 Cinchona Calisaya.	கறுப்புச் சித்திரமூலம் Plumbago Capensis கருங்கொடிவேர்.
கலிசாயப்பட்டை 120 Calisaya (Cinchona) Bark.	கறுப்புடாமர் 61 Black Dammar, Vatica Tumbugaia.
கலிபட்டு Gallipot.	கறுப்புமணத்தக்காளி 192 Solanum Nigrum மணத்தக்காளி.
கலுசிந்து 103 Colocynth பேய்க்கொம்மட்டி. வரித்துமட்டி.	கறுப்புமருதமரம் 99 Terminalia Tomentosa.
கலூறியம் Collyrium கண்ணீரம்.	கறுப்புவாணிசு 69 Black Varnish.
கலைப்பைக்கிழங்கு 254 Gloriosa Superba.	கறுவாக்கூட்டுச்சூரணம் 207 Compound Powder of Cinnamon.
கலோடியம் 42 Collodion.	கறுவாப்பட்டை 206 Cinnamon Bark.
கல்துலசு Calculus கல்.	கறுவாமரம் 206 Ceylon Cinnamon Tree.
கல்சி Lime.	கறுவாநீர் 206 Cinnamon Water.
கல்சிகுலோதிகநீர் 348 Solution of Chlorinated Lime.	கறுவிக் கொட்டை 108 Caraway Fruit
கல்சிகுலோதிகம் 348 Chlorinated Lime.	கறுவித்தேல் 108 Oil of Caraway.
கல்சிபாஸ்வசு 349 Phosphate of Lime.	கறுவிப்பூடு 108 Caraway Plant.
கல்சியகுலோதிரம் 344 Chloride of Calcium.	கறுவிநீர் 109 Caraway Water.
கல்சியரசு 344 Slaked Lime புட்டித்த சுண்ணம்.	கரோசம் Corrosion அரித்தல், காதனம்.
கல்பனம் 114 Galbanum.	கற்கரித்தார் Coal Tar.
கல்லுருவி 96 Ammannia Vesicatoria நீருமேல்நெருப்பு.	கற்கரிவாயு Coal Gas கரிவாயு.
	கற்கின் Catkin.
	கற்பிதம் Prescription.
	கற்றேபேட்சம் Gutta Percha.

கற்.	காவ.
கற்றாழை 254 Small Aloe, Aloe Indica சோற்றுக்கற்றாழை, குமரி.	காட்டுச்சீரகம் 136 Vernonia Anthelmintica.
கற்றீவிரங்கள் 37 Guttiferæ.	காட்டுத்தும்பட்டி 105 Cucumis Tri-gonus.
கனடபல்சமரம் 230 Balm of Gilead Fir.	காட்டுப்பைன் 234 Pinus Sylves-tris, Wild Pine, Scotch Fir.
கனடபல்சம் 230 Canada Balsam.	காட்டுமுந்திரி 68 Cashew Nut.
கனஸ்தைராக்சு Solid Storax.	காட்டுமுள்ளாங்கி Blumea Arita, நாரக்கரந்தை.
கனம் Solid.	காட்டுவாகை Acacia Speciosa.
கனீகரணி Condenser கன்றென்சர்.	காட்டேலக்காய் Larger Cardamom பெரியவேலக்காய்.
கனெலாசியங்கள் 33 Canellaceae.	காட்விரஸ்காடல் Godfrey's Cordial.
கன்பெக்சன் Confection லேகியம், கம்பெச்சன்.	காந்தசாரம் Magnetism.
கன்வல்வுலாசியங்கள் 163 Convol-vulaceæ.	காந்தக்கல் Load Stone.
கன்றென்சர் Condenser கனீகரணி.	காந்தம் Magnet.
காக்கடசிங்கி 67 Rhus Succedanea கற்கடகசிங்கி.	காபசோதிக்கமில் Carbazotic Acid
காக்கணங்கொடி 88 Clitorea Ter-natea காக்கட்டான்.	காபலிக்கமில் 283 Carbolie Acid.
காக்காய்கொல்லி 16 Cocculus In-dicus பேன்கொட்டை.	காபன் 300 Carbon, Charcoal, கரி.
காசினிவிரை Endive. [chu.	காபன்சதுகுலோறிரம் Tetrachlo-ride of Carbon.
காசுக்கட்டி 71, 127 Kassu, Cate-காசுக்கட்டியின்ஞ்சம் 72 Infusion of Catechu.	காபாய் Carboy.
காசுக்கட்டியிரஞ்சம் 72 Tincture of Catechu.	காமமரம் Cycas Circinalis ஊரை.
காசுக்கட்டிக்கூட்டுச் சூரணம் 72 Compound Powder of Catechu.	காமாஷிப்புல் 268 Lemon Grass, வாசனைப்புல், காவட்டம்புல்.
காசுக்கட்டிவில்லை 127 Catechu Lo-zenges.	காமினதி 446 Carminative, வாயுக் கினி.
காஞ்சனி Turmeric மஞ்சள்.	காரச்சுண்ணம் Unslaked Lime புட்
காஞ்சிரம் 154 Nux Vomica காஞ்சிரங்கொட்டை, எட்டிக்கொட்டை.	பியாதசுண்ணம், உடன் சுட்ட
காடமம் Cardamoms ஏலம், ஏலக் காய்.	சுண்ணம்.
காடி 28 Acetum, Vinegar.	காரச்சோடம் 332 Caustic Soda.
காட்டலரி 150 Cerbera Odollam.	காரந்திமனி Black Antimony.
காட்டாமணக்கு 215 Jatropha cur-cas English Physic Nut.	காரப்பதாசி 320 Caustic Potash.
காட்டிருப்பை 141 Bassia Lati-folia காட்டிலுப்பை.	காரேலிபர் Black Hellebore ஏலிபர், ஏலிபர்பூடு.
காட்டுக்கொடி 18 Cocculus Villosus.	கார்வல் Gargle ஆசமனீயம்.
	கார்க்கு Cork சடை.
	கார்க்குத்தமரி Cork Borer.
	கார்த்திகைக்கிழங்கு 254 Gloriosa Superba கலைப்பைக்கிழங்கு.
	கார்ப்போகரிசி Psoralea Corylifolia, கார்புவாவரிசி.
	காலுவிலின் Caulophyllin.
	காவட்டந்தேலம் 268 Oil of Lem-on Grass.

காவி.	கீற.
காவி Indian Red, Armenian Bole காவிக்கல்லு.	கிருசுவைரு குலோறிக் கமில்ம் 308 Diluted Hydrochloric Acid.
காறட்கிழங்கு Carrot மஞ்சள்முள் ளாங்கி.	கிருசுவைருசையனிக்கமில்ம் 93 Di- luted Hydrocyanic Acid.
காறபுமரம் Carob or Locust Bean.	கிருத்திம Artificial செயற்கையான.
காறன்தேலம் Carron Oil, Lime Liniment.	கிருத்தியம் Process முறை.
கிசாரிப்பூண்டு 88 Lathyrus Sativus	கிருமிகொல்லி 442 Worm Killer.
கிச்சிலிக்கிழங்கு 244 Curcuma Ze- doaria.	கிருமிச்சிப்புழு 291 Cochineal சப் பாத்திப்புழு.
கிஞ்சக்பிஸ்தகிமரம் 67 Pistacea Khinjuk.	கிருமிஞ்சியோமம் Conidium Diffu- sum.
கிடி Sus Scrofa, Hog பன்றி.	கிரேக்குரிச்சூரணம் 199 Gregory's Powder வரியாத்துக்கூட்டுச்சூர ணம்.
கிடயம் 297 Lard லாடு, பன்றிறெய், அதெப்சு.	கிரோதநஞ்சு Irritant Poison அழல் நஞ்சு.
கிட்டம் Slag. [dra.	கிரோதி Irritant அழற்சி.
கிரமேரிச்செடி 35 Krameria Trian-	கிலாசியல் Glaciale.
கிராகசம் Narcosi, Narcotism.	கிலீபம் Impotence.
கிராகி Narcotic மஸ்து, நாகதிகம்.	கிலைசரது Glycerate of.
கிரிஸ்தல் Crystal படிகம்.	கிலைசரின் 145 Glycerine; அமைல 267 of Amylum; கலிக்கமில் 225
கிரீதக்கலவை 347 Chalk mixture.	Gallic Acid; காபலிக்கமில் 284
கிரீதசுகந்தபற்பம் 347 Aromatic Chalk Powder.	Carbolic Acid; தனிக்கமில் 224 Tannic Acid.
கிரீதம் 346 Chalk மென்சுண்ணம், சோக்கு, சீமைச்சுண்ணாம்பு.	கிழக்கன்மீன் Indian Whiting.
கிரீதவவின் சுகந்தபற்பம் 347 Aro- matic Powder of Chalk and Opi- um.	கிளவரி 255 Asparagus Sarmen- tosus தண்ணீர்விட்டான்கிழங்கு.
கிரீம் Cream பாலாடை, அவிசம்.	கிளவரிக்கிழங்கு 255 Utees.
கிருசு Diluted, Mitius, Mild தண், மென்.	கிளாசு Glass ஆடி, கண்ணாடி.
கிருசுநயவசிதசுநீர் 371 Dilute solu- tion of Subacetate of Lead.	கிளாரிவித்தல் Clarification தெளி வாக்கல்.
கிரிசசல்வரிக்கமில்ம் 305 Diluted Sulphuric Acid.	கிணு Glue வச்சிரப்பசை.
கிருசநீதுரிக்கமில்ம் 312 Diluted Nitric Acid.	கிளெய் Clay களிமண்.
கிருசநீதுருவைருகுலோறிக்கமில்ம் 313 Diluted Nitrohydrochloric Acid.	கிறமீனியங்கள் 263 Gramineae.
கிருசபாஸ்வரிக்கமில்ம் 302 Diluted Phosphoric acid.	கிறவுஸ்பட்சி Grouse.
கிருசவசிதிக்கமில்ம் 282 Diluted Acetic Acid.	கிறனாசியங்கள் 102 Granateae.
	கிறனுலசெய்வுகள் Granular Prepa- rations.
	கிறனுலசோட்சிதுறுதாத்தரசு Gra- nular Citro-tartrate of Soda.
	கிறனுலதகரம் 398 Granular Tin.
	கிறனுலதுத்தம் 362 Granulated Zinc.

கிற.	குவ.
கிறனுலவன்னபேதி Granular Sulphate of Iron.	குந்துருப்பைன் 232 Frankincense.
கிறுடித்தல் Graduate, Grade பாகையிடல்.	குபுலிவிரங்கள் 221 Cupuliferae.
கிறுடித்தவியற்று Graduated Vessel பாகையிட்டபாத்திரம்.	குப்பைமேனி 217 Acalypha Indica, Indian Acalyphc.
கிறியசற்று 235 Creasote.	கும்ரி Aloe Indica கற்றாழை, சோற்றுக்கற்றாழை.
கிறியசற்றுக்கலவை 235 Creasote Mixture.	கும்பை 128 Gardenia Gummiifera, G. Lucida டிகாமல்லி.
கிறேன் Grain மணி, தானியம்.	கும்பைப்பிசின் 128 Gardenia Gum.
கினிதின் 125 Quinidine.	குராசானியோமம் 190 Khorasani Ajwain.
கினியசல்வசு 121 Sulphate of Quinia.	குரிந்தை Hiptage Madablata சிறு குறிஞ்சா.
கினியம் Quinia கினியசல்வசு.	குருக்கஞ்செடி 29 Argemone Mexicana, பிரமதண்டு,
கினியவைன் 122 Wine Quinia.	குருசிபல் Crucible குகை.
கிரிபுரண்டான் 129 Ophiorhiza Munghos கிரிப்பூடு.	குருசிவிரங்கள் 30 Cruciferae.
கீழ்காய்நெல்லி 217 Phyllanthus Niruri கீழாநெல்லி,	குலாப்பு Cabbage Rose Petals.
கீன 78 Kino சீமைக்காண்டாமிருக இரத்தம்.	குலோறகம் Chloratus-a-um, Chlorinated.
கீனக்கூட்டுச்சூரணம் 79 Compound Powder of Kino.	குலோற சுவசனம் 141 Inhalation of Chlorine.
குகேபிதாசியங்கள் 103 Cucurbitaceae.	குலோறநீர் 307 Solution of Chlorine.
குகையுறை Crucible Jacket.	குலோறந் சிறுபம் 281 Syrup of Chloral.
குக்கிரேசி Stomach Pump.	குலோறப் புற்கை 339 Chlorine poultice.
குக்குலு 61 Bdellium. மைசாகூதி.	குலோறல் 280 Chloral.
குங்கிலியமரம் 40 Shorea Robusta.	குலோறம் 307 Chlorine, Chlorum,
குங்குமப்பூ 248 Saffron குங்கும்பூ.	குலோறிரம் Chloride.
குசம்பாவிரை Carthamus Tinctorius.	குலோறுவாம் 278 Chloroform.
குசோ 91 Kousso.	குலோறுவாம்சீது 279 Spirit of Chloroform.
குடுக்கைதாங்கி Retort Stand.	குவசிமரம் 57 Quassia Tree, Quassia Excelsa,
குத்திரசடை Sweet Basil திருநீற்றுப்பச்சை, திருநீற்றுப் பத்திரி, சப்ஜா.	குவசிவேம்பின் பட்டை 51 Bharingi.
குத்திரம் Cotyledon. கொதுலீரன்.	குவசிவேம்பு 58 Nima Quassioides.
குந்துரு 60 Frankincense.	குவயகமரம் 46 Quaiacum.
குந்துருக்கம் 60 Indian Frankincense, Olibanum ஒலிபானம்.	குவயகமிஸ்தூர் 46 Quaiacum Mixture.
குந்துருக்கமரம் 60 Olibanum tree.	

கு.வ.	கை.
குவயகராளம் 46 Quaiacum Resin.	குன்றிமணி 82 Indian or Wild
குவயகவமோனரஞ்சம் 47 Ammo- niated Tincture of Quaiacum.	Liquorice குண்டுமணி.
குவா Arrow Root அரோட்டுக் கிழங்கு.	கூச்சு Caoutchouc, India Rubber கூச்சப்பிசின், விசைப்பிசின்.
குவிஞ்சு 94 Quince சீமைமாதளை.	கூட்டுக்கலவை Compound mix- ture.
குவேகஸ்மரம் 221 Oak ஒக்கு, ஒக்கு மரம் Quercus.	கூட்டுச்சூரணம் Compound pow- der.
குழியம்மி Grinding Mortar அரை யுரல்.	கூஸ்பெரிபழம் Gooseberry.
குளப்பானைவிரை 149 Anderjow, Holarrhena Antidysenterica	கூந்தற்பனை 260 Bastard Sago Tree.
கசப்புவெட்பாலரிசி.	கூர்சிங்குமரம் 161 Bignonia Xy- locarpa, Kursing tree.
குளிகை Pill; இங்குக்கூட்டு 113 Com- pound of Assafoetida; இபிகாக்	கூர்மிகனாசிப்பூடு 30 Meconopsis Aculeata.
ஸ்குவில் 126 Ipecac with Squill.	கூரிலைபெர்துலோசம் 136 Bertheo- lotia lanceolata.
இரசவதகுலோறிர கூட்டு 390	கூற்றம் 385 Cuprum செம்பு.
Subchloride of Mercury; ஈயவ	கெந்தகம் 303 Sulphur.
வின் 370 Lead and Opium; கம்	கெந்தகலேகியம் 304 Confection of Sulphur.
போச்சுக்கூட்டு 38 Compound	கெந்தகவன்கென் 304 Ointment of Sulphur.
Gamboge; கலுசிந்தயசீயமசு	கெந்தகவுப்பு Black Salt சறுப்புப்பு.
104 Colocynth and Hyos- cyamus; கலுசிந்துக்கூட்டு 104	கெமிப்திரங்கள் 291 Hemiptera.
Compound Colocynth; கினிய	கெமிஸ்தம் Chemistry. பவுதிகம்.
122 Quinia; கோனியக்கூட்டு 161	கெமிஸ்தர் Chemist பவுதிகர்.
Compound of Conium; சகை	கெமிஸ்தவுணவு Chemical Food.
சச 249 Aloes and Myrrh: ச	கெனுபொடி Chenopodium கெனு பொடியம்.
கையய 251 Aloes and Iron;	
சகையிங்கு 250 Aloes and Assa- foetida; சோகோத்திரசகை 249	
Socotrine Aloes; ஸ்குவில் கூட்டு	
250 Compound Squill; வரியா	
த்துக்கூட்டு 199 Compound Rhu- barb.	கேக்குப்பூண்டு Caraway Plant க றுவிப்பூடு, சீமைச்சீரகம்.
குளிகைப்பலகம் Pill Tile.	கேதுரு Cedar ஏரஸ்மரம்.
குளிகையந்திரம் Pill Machine.	கேம் Game வேட்டமாமிசம்.
குறூரி Curare.	கேவல Absolute, Simple தனி, சுத்த.
குறூரின் Curarin.	
குறிஞ்சா 152 Indian Ipecac.	கைச்சல்தண்டான்பூடு 171 Picrorr- hiza kurua.
குறெட்டு Currette நொண்டி.	கைபக்கிடியங்கள் 247 Hypoxideac.
குறேதலரியடுப்பொலிக்கலம் 36	கைப்பற்றசுரத்துளி Tasteless Ague Drop
Polygala Crotalariodes.	கைப்புக்கிலுறுடன் 175 Cleroden- dron infortunatum.
குறேமியம் Chromium.	
குறேம் Chrome.	

கைப்	சகை.
கைப்புவாதுமை 91 Bitter Almond.	கொள்ளுக்காய்வேளை Tephrosia
கைமெனாப்திரங்கள் 290 Hymenoptera.	Purpurea.
கொச்சித்தமர்த்தை Bilimbi Tree,	கொனிவ்விரங்கள் 230 Coniferae.
புளிச்சக்காய்.	கொன்றைமரம் 73 Purging Cassia.
கொச்சிலித்திப்புல்லு Xyris Indica.	கோகமரம் 38 Kokum Butter tree.
கொச்சைப்பால் Goat's milk.	கோகநோய் 38 Garcinia Purpureae Oleum, Kokum Butter.
கொச்சைரோசனை Goat Bezoar,	கோக்கரி Coke.
கொடிபலாசம் 82 Butea Superba.	கோஷ்டம் 138 Aplotaxis Auriculata, Costus Arabicus, விரணரி.
கொடிமுருக்கம்.	கோஷ்டவேர் 138 Koot Root.
கொடிமுருக்கம் 82 Butea Superba	கோட்சவுக்கு 37 Tamarix Gallica
கொடிபலாசம்.	சிறுசவுக்குமரம், ஆற்றுச்சவுக்கு
கொடிவேலி 180 Leadwort சித்திர	மரம்.
மூலம்.	கோடைக்கிழங்கு 253 Indian Squill,
கொட்டக்கரந்தை Sphaeranthus	நரிவெங்காயம்.
Hirtus.	கோதியின் 23 Codeia, Codeine.
கொட்டைமுந்திரி 68 Cashew Nut	கோது Capsule, to swallow.
காட்டுமுந்திரி.	கோதுமை 266 Wheat கோதி.
கொணின் Cornin.	கோதுமைமா 266 Wheaten Flour
கொதிலீரன் Cotyledon குத்திரம்.	கோதிமா. [oides.
கொத்தமல்லி 111 Coriander.	கோபுரந்தாங்கி Andrographis Echi-
கொப்புளத்தாள் 288 Blistering Pa-	கோப்பி Coffee காபிக்கொட்டை.
per.	கோரட்டை 106 Trichosanthes
கொப்புளநீர் 288 Blistering Liquid.	Palmata.
கொமட்டிவிரை Bryonia Callosa	கோரைக்கிழங்கு 263 Cyperus
சுக்கங்காய்விரை.	Pertenuis முத்தகாசு.
கொம்பிரிதாசியங்கள் 97 Combretaceae.	கொரோசனை Biliary Calculus of
கொம்புப்புடல் 105 Trichosanthes	Ox.
Nervifolia.	கோர்க்கர்மூலி Indian Hemp கஞ்சா.
கொய்யா 102 Guava.	கோலி Jujube.
கொரட்டை 106 Trichosanthes	கோலியப்திறங்கள் 287 Coleoptera.
Palmata சவரிப்பளம்.	கோவன்கறிடலிஸ்கிழங்கு 30 Cory-
கொல்சிகப்பூடு 255 Colchicum	dalis Govaniana.
Autumrale.	கோவை Coccinia Indica.
கொல்சிகவைன் 256 Colchicum	கோழி 294 Cock and Her.
Wine.	கோனியகனி 115 Hemlock Fruit.
கொல்சிகின் 255 Colchicin.	கோனியபூடு 115 Spotted Hemlock.
கொல்லன் கோவைக் கிழங்கு 106	கோனியம் 115 Conium, Hemlock.
Bryonia Epigaea ஆகாசகருடன்.	சகரீன் Shagreen சுருத்தோல்.
கொழுஞ்சிப்பழம் Orange கிச்சிலிப்	சகிரூபுரசின்கனம் Cinchona Succirubra செஞ்சின்கனமரம்.
பழம், தோடை.	சகை 249 Aloes கரியபோளம், இரத்
கொள்ளு Gram டாணம்.	தபோளம்.

சகை.	சல்.
சகைச்சக்குளிகை 249 Pill of Aloes and Myrrh.	சபதிமம் 257 Cevadilla, Sabadilla.
சகையப்பக்குளிகை 251 Pill of Aloes and Iron.	சபீனசெடி 236 Juniperus Sabina.
சகையிங்குக் குளிகை 250 Pill of Aloes and Assafoetida.	சபீனம் 236 Savin.
சகையெனீமம் 251 Enema of Aloes.	சபு 145 Soap சவுக்காரம்.
சகைவென் 250 Wine of Aloes.	சபுகிருதுப்பிலாஸ்தர் 145 Soap Cerate Plaster.
சக்கம் Juice சாறு.	சபுதாசியங்கள் 141 Sapotaceae.
சக்கை Marc.	சபுபிலாஸ்தர் 145 Soap Plaster.
சக்கிரானியம் Succedaneum பதற் சரக்கு.	சபுலினிமென் 145 Soap Liniment.
சங்கால்பச்சை Subacetate of Copper of Commerce களிம்பு.	சபுனீற்று Soap Stone, Saponite.
சங்குனூரின் Sanguinarin.	சப்ஜா Sweet Basil.
சசமரம் 59 Balsam odendron Myrrha, Myrrh Tree.	சப்பாசிதுறி Suppository தலஸ்தம்;
சசம் 59 Myrrh வெள்ளைப்போளம்.	ஈயக்கூட்டு 370 Compound Lead;
சசுவிரஸ்மரம் 204 Sassafras Officialis.	தனிக்கமில் 223 Tannic acid.
சஞ்சீவி Cordia.	சப்பாத்துப்பூ 43 Hibiscus Rosa Sinensis.
சடைவாங்கி Cork Screw காச்சிறு.	சப்லிமம் Sublimate உச்சிகம், படி.
சடைச்சிரட்டி 160 Ophelia Densifolia.	சப்லிமித்தல் Sublimation உச்சிகரணம்
சதகுப்பி 111 Dill Fruit. அணீதம்.	சமுத்திரப்பச்சை 168 Argyreia Speciosa கடற்பாலை.
சதாவரி 255 Asparagus Racemosus, தண்ணீர்முட்டான்கிழங்கு.	சம்பகம் 14 Michella Champaca செண்பகம், சம்பங்கி.
சதுரக்கள்ளி 216 Euphorbia Antiquorum.	சம்பங்கிப்புஷ்பம் 14 Michelia Champaca
சதுரெச்சகப்பூடு 160 Exacum Tetragonum.	சம்பந்தேல் 51 Lemon Oil.
சதுவன்னவெச்சகப்பூடு 160 Exacum Bicolor.	சம்பம் 51 Lemon லெமன், பேரெலுமிச்சை, பெரியவெலுமிச்சை.
சதுவற்பைன் 231 Pinus Palustris, Swamp Pine.	சம்புற்கிழங்கு 116 Sumbul Root.
சத்து Active Principle.	சம்புற்பூண்டு 116 Sumbul Plant.
சத்துமமருந்து Quack Medicine.	சம்பூகச்செடி 119 Elder Bush, Sambucus Nigra.
சத்துவவனுவிக Qualitative Analysis.	சம்பூகநீர் 119 Sambucus Water.
சந்தலாசியங்கள் 208 Santalaceae.	சம்பேதனம் Catalysis கதாலிசு.
சந்தலின் 80 Santalin.	சம்யோகம் Synthesis சிந்திசு.
சந்தனக்கட்டை 203 Sandal Wood.	சரை Powder, packet of.
சந்துனின்னூடு 132 Santonica.	சரைக்கருவி Powder Folder,
சந்துனின் 132 Santonin.	சர்க்கரை 265 Sugar சீனி.
	சலவெசிறுத்து Aqueous Extract.
	சலிசைன் Salicinum, Salicin.
	சலீன் Saline லாவண, உற்பித.
	சல்லாசியங்கள் 195 Salsolaceae.
	சல்லாத்துவிரை Lactuca Sativa.
	சல்வசு Sulphate.

சல்.	சிலி.
சல்வடுருசியங்கள் 182 Salvadoraceae	சார்த்த Sesqui.
சல்விச Sulphite.	சார்பி Charpie, Lint லிந்து.
சல்வியம் Sage, Salvia சல்வியப்பூடு.	சால்முக்கிரம் 33 Chaulmugra.
சல்விரம் Sulphide.	சாறு Juice; சம்பம் 51 Lemon; கோனிய 116 of Conium; தரக்கக 134 Taraxacum; விஷமுங்கில் 246 Crinum.
சல்வு Sulphur கெந்தகம், கந்தி.	சிகிச்சன் Apothecary, அபாதிசன், Dispenser, திஸ்பென்சர்.
சல்வுசையனிக்கமில்ம் Sulphocyanic Acid.	சிகிச்சாநிறை Apothecarys Weight.
சல்வுரிக்கமில்ம் 305 Sulphuric Acid கெந்தகத்திராவகம்	சிகிச்சாபீடம் Dispensing Counter, திஸ்பென்சமேசை, திஸ்பென்சக் கவுந்தர்.
சல்வுரோசமில்ம் 306 Sulphurous Acid.	சிகிச்சை Dispensary திஸ்பென்சறை, Shop கடை.
சவட்கலோடியம் 42 Flexible Colloidion.	சிடத்தேல் 201 Adeps Myristicae, Expressed Oil of Nutmeg,
சவுக்குமரம் 58 Tamarisk Tree.	சிடமரம் 201 Nutmeg Tree.
சறெல்பூடு Sorrel சறெல்.	சிடம் 201 Nutmeg சாதிக்காய்.
சாசிமித்தி 195 Sajimith.	சிடனும் லாடனம் Sydenham's Laudanum.
சாதனம் Principle.	சிதிறச Citrate.
சாதிக்காய் 201 Nutmegs.	சிதிறிக்கமில்ம் 52 Citric Acid.
சாதிபத்திரி 202 Mace.	சித்திரமூலம் 180 Leadwort கொடிவேலி Plumbago Zeylanica and P-Rosea.
சாந்தனி 448 Emollient, Sedative இமாலியம்.	சிந்திச Synthesis சம்யோகம்.
சாப்புச்செடி 221 Shavia Officin-arum.	சிப்பிரிப்பீரின் Cypripedin.
சாமகம் 448 Demulcent திமல்சம்.	சிமரூபியங்கள் 57 Simarubea.
சாமக்கிழங்கு 262 Colocasia Anti-quorum.	சிமிசிலுகப்பூடு Cimicifuga, Black Snake Root.
சாமந்திப்பூ 131 Chrysanthemum Roxburghii.	சிமிசிலுகின் Cimicifugin.
சாமந்திப்பூடு 131 Chamomile.	சிம்விதப்பூடு Symphytum. [ம்.
சாமந்தித் தேல் 131 Oil of Chamomile.	சியந்தனம் Percolation பெர்குலாசியான்னி Issue இசு.
சாமந்தியின்னூசம் 131 Infusion of Chamomile.	சியாம்மக்கிமரம் 37 Gamboge Tree of Siam.
சாமந்தியெசுருத்து 132 Extract of Chamomile.	சியானம் Mucilage முசிலாகு.
சாமியம் Equivalent.	சிரட்குச்சி 159 Chiretta.
சாம்பிராணிமரம் 143 Benzoin Tree.	சிராகம் Nervine நேவின்.
சாயவேர் Chay Root.	சிலிசி Silica.
சாய்தளம் Inclined Plane.	சிலிசியச Silicate.
சாரத Concentrated சாரதித்த.	சிலிசியம் Silicium.
சார்சவேர் 239 Jamaica Sarsaparilla, சீமைநன்னூரி.	சிலிசியுள்ள Siliceous.

சிவ.	சீன.
சிவதை 167 Turbith Root சிவதை வேர்.	சிறுமணக்கு Small Seeded Cas- tor Oil Plant.
சிவதைவேர் 167 Indian Jalap, Turbith Root.	சிறுமரி 195 Salicornia Brachiata. சிறுநெருக்கு 151 Calotropis Pro- cera.
சிவப்புகாசருக்கிரை Roselle சீமை காசருக்கிரை.	சினபிசம் Sinapism கடுகுப்பிலாஸ்தர்.
சிவப்புச்சித்திரமூலம் 180 Plumba- go Rosea கொடிமூலி.	சின்கனம் 120 Cinchona.
சிவப்புச்சிறுசவுக்குமரம் 37 Tama- rix Orientalis.	சின்குனிரின் 125 Cinchonidine.
சிவப்புநெல்லி 217 Phyllanthus Urinaria.	சின்குனின் 125 Cinchonine.
சிவப்புபோஸ்தகாவிதழ் Red Poppy Petals செங்கசகசாவிதழ்.	சின்னம் Symbol.
சிவப்புமணத்தக்காளி Solanum Ru- brum மணத்தக்காளி.	சீகைக்காய் Acacia Concinna, சீய க்காய், சீகா.
சிவ்வு Sieve அரிப்பெட்டி, சல்லடை. சிறுது Cerate.	சீது Spirit, Spirituous Liquor, Spiritus ஸ்பிறிது, ஸ்பிறிதம்.
சிறியபேயத்த 229 Ficus Ploycarpa.	சீதுகள், குலோறுவாம் 279 Chloro- form; சிட 291 Nutmeg; சூனிப 236 Juniper; திட்ட 276 Rectified;
சிறியநறுவிலி 168 Cordia Lati- folia, Small Sebestens.	நீதுரோசீதர் 279 Nitrous Ether;
சிறுகளர்வா 182 Salvadora Persica சிறுப்பிலா.	புருவு 276 Proof; பூர 203 Cam- phor; பெப்பமிந்து 177 Pepper- mint; ரோஸ்மரி 178 Rosemary;
சிறுகற்றாழை 251 Aloe Litoralis.	லவந்தர் 176 of Lavender.
சிறுகுறிஞ்சா 154 Gymnema Syl- vestre.	சீதுவிளக்கு Spirit Lamp;
சிறுதேக்கு 175 Clerodendron Ser- ratum கண்டுபாரங்கி.	சீத்தனாசி Seton Needle, திரியூசி. சீத்தன் Seton வேசிதம்.
சிறுநரிவெங்காயம் 254 Ledebouria hyacinthoides சிறுகாட்டு வெங் காயம்.	சீந்திலெசிறுத்து 17 Palo, Impure Extract of Gulancha.
சிறுபம் 266 Syrup பாணி, சீனிகம்; அயலியோதிர 380 Iodide of Iron; குலோறல் 281 Chloral; சம்பம் 52 Lemon; சக்கு 242 Ginger; தொலு 78 of Tolu; தோ டம்பூ 51 Orange flower; தோட ந்தோல் 50 of Orange peel; நன் னாரி 511 Sarasaparilla; பூஷ 227 Mulberry; ரம்னஸ் 65 Rhamnus; வரியாத்து 193 Rhubarb; விஷ மூங்கில் 247 of Crinum.	சீந்தில் 17 Gulancha.
சிறுமீனியங்கள் 241 Scitamineae.	சீபம் Suet ஆட்டுகொழுப்பு.
சிறுமரத்தை 244 Lesser Galangal.	சீமையகத்தி 85 Cassia Alataவண்டு கொல்லி.
	சீமைச்சீரகம் 109 Carum Nigrum.
	சீமையழுவனை 56 Peganum Harm- ala,
	சீமையெள்ளிலை Benne Leaves. [nea.
	சீமைவெள்வேல் 85 Acacia Ferrugi- சீரகம் 115 Cumin.
	சீரமானி Lactometer.
	சீரம் Milk பால்.
	சீரியவக்சலசு Oxalate of Cerium.
	சீரை Inner Bark மரவுரி.
	சீலர்பச்சை Scheele's Green.
	சீனக்கறுவாமரம் 207 Cinnamo- mum Aromaticum.

சீன.	செங்.
சீனக்காரம் 352 Alum.	சுரக்கினி 443 Febrifuge.
சீனக்கிழங்கு 240 China Root பறங்கிக்கிழங்கு.	சுரிஞ்சான் 258 Hermodaetyl.
சீனக்கிழங்குப்பூடு Smilax China.	சுவசனம் Inhalation; ஐருசையனிக் கமில் 94 Hydrocyanic acid; கிறீ யசற்று 235 Creasote; கோனிய 116 of Conium.
சீனிகம் Syrup பாணி, சிறுபம்.	சுவேதனி Sudorific.
சுகந்த Aromatic.	சுரு Shark.
சுகந்தகொலியஸ்பூடு 179 Coleus Aromaticus.	சுன்னூரிப்புல் Citronelle காமாக்கிப் புல், மாந்தப்புல், காவட்டம்புல்.
சுகந்தசல்வரிக்கமில்ம் 306 Aromatic Sulphuric Acid.	சூசிவ Acicular.
சுக்கங்காய்விரை Bryonia Callosa கொமட்டிவிரை.	சூடன் Camphor கர்ப்பூரம், பூரம், கருப்பூரம்.
சுக்காங்கீரை Rumex Vesicarius.	சூமக்கு 87 Sumach சூமக்கெடி.
சுக்கு 241 Dry Ginger.	சூரத்துநிலாவரை Alexandrian Senna, சீமைநிலாவரை, அலுக்காந் திர நிலவாகை.
சுக்குக்கராஞ்சம் 241 Strong Tincture of Ginger.	சூரணம் Vegetable Powder; இபிகா க்கூட்டு 126 Compound Ipecae; களற்சி 77 of Bonduc; சீனுக்கூட் டு 79 Compound Kino; ஸ்கமுனி க்கூட்டு 165 Compound Scammony; ஜலப்புக்கூட்டு 163 Compound Jalap; ஜிரிகிக்கூட்டு 167 Compound Kaladana; வரியாத் தூக்கூட்டு 199 Compound Rhubarb.
சுணைக்குக்குலு 61 Balsamodendron Pubescens.	சூரியகாந்திவிரை Helianthus Annuus.
சுணைக்குளப்பாலை 149 Holarrhena Pubescens.	சூனிபதேல் 236 Juniper oil.
சுண்ணகுலோறிரம் Chloride of Lime.	சூனிபச்செடி 235 Common Juniper.
சுண்ணசல்வசு Gypsum சிப்சம்.	செகமோனிச்செடி 153 Secamone Emetica.
சுண்ணச்சீனிநீர் 345 Saccharated Solution of Lime.	செகலீனம் 264 Secalina.
சுண்ணநீர் 345 Lime Solution.	செங்கங்குப்பி Clerodendron Inerme பீனசெங்கங்குப்பி.
சுண்ணப்பதாசி Potash with Lime.	செங்கசகசா 21 Red Poppy.
சுண்ணம் 344 Lime சுண்ணாம்பு.	செங்கந்தி Red Sulphur சிவப்புக் கெந்தகம்.
சுண்ணலிமென் 346 Liniment of Lime.	செங்காசுக்கட்டி 127 Pale Catechu.
சுண்ணவதசல்விசு Hyposulphite of Lime.	செங்கிலாவிசெப்பு 263 Claviceps purpurea.
சுண்ணவதபாஸ்விசு Hypophosphite of Lime.	
சுண்ணவைரசு 344 Hydrate of Lime.	
சுண்ணு Castor நீர்நாய்விரை, கஸ்தர்.	
சுத்த அக்கலிக்கமில்ம் 397 Purified Oxalic acid.	
சுத்தகோபித்தம் 296 Purified ox bile.	
சுத்தஸ்கமுனி Virgin Scammony.	
சுப்தினி Hypnotic.	
சுயவசனுதம் Specific abortive.	

செங்.	சோட.
செங்கீறு 79 Red Gum யுகவிப்தஸ் செம்பிசின்.	செல்சிபென்சனார் Chelsea Pensioner.
செங்குமிழ் 175 Gmelina Asiatica.	செவ்வலரி 150 Sweet scented oleander.
செங்கொடிவேலி 180 Plumbago rosea.	செவ்வுரோசை 89 Red Rose.
செசாமியங்கள் 161 Sesameae.	செவ்வெல்லி Indian Madder மஞ்சிட்டி.
செஞ்சந்தனமரம் 79 Red Sandalwood tree.	செறுமெல் 291 Ceromel மெழுகு தேன்.
செஞ்சின்கனபட்டை 124 Red Cinchona Bark.	செனும்பெற்றிஞ்சி 242 Zinziber Zerumbet.
செண்டுரோதோனி 137 Notonia corymtosa.	செனிகம் 35 Senega.
செதசீயங்கள் 295 Cetacea.	செனிகியோனின் Senecionin.
செதின் 295 Cetine.	செஞ்சொட்டை 68 Marking Nut
செந்திகிரும் Centigramme.	சேராங்கொட்டை.
செம்பசிதசு Acetate of Copper.	சேபந்தாரி 209 Aristolochia Serpentaria.
செம்பதவக்கிரம் Suboxide of Copper.	சேபந்தாரிவேர் 209 Serpentary Root.
செம்பமோனகம் Ammoniated Copper.	சேமக்குழல் Safety-tube.
செம்பாஸ்வரம் Red Phosphorus.	சேமயாரி Safety-valve.
செம்பிசின் 79 Red gum.	சேம்மரம் 63 Rohun Tree.
செம்பு 335 Copper கூப்தம் Cuprum.	சேரங்கொட்டை Marking Nut.
செம்புகாரக்கிரம் 385 Black Oxide of Copper.	சேவமரம் Sandoricum Indicum.
செம்புப்பத்திரம் 397 Copper foil.	சைகுலீலியங்கள் 46 Zygophylleae.
செம்புசல்வசு 385 Sulphate of Copper.	சைதிலிப்பற்பம் Seidlitz Powder.
செம்பை Sesbania Aegyptiaca.	சைபராசியங்கள் 263 Cyperaceae.
செம்மரம் Red Wood.	சைபன் Siphon.
செம்விரை 167 Laldana, probably a species of Pharbitis.	சைலுமிதின் Xyloidin.
செய்வு Preparation ரசிதம், பிரெப்பரேஷன்.	சொகோத்திரசகை 249 Socotrine Aloes.
செரதீவம் Sedative.	சொலனாசங்கள் 182 Solanaceae.
செரிமரம் Sherry Tree.	சொலானப்பூடு 192 Solanum.
செரிவைன் 275 Sherry Wine.	சொலானம் 192 Solanum.
செலஸ்திரீனியங்கள் 64 Selastriaceae.	சொலுதம் Solution விலயனம், நீர், நீரம்.
செலதின் Gelatine.	சொநிலுகஸ்பூடு 180 Leucas aspera.
செலிரிப்பூடு Celery.	சோக்கு Chalk கிரீதம், மென்சுண்ணம், சீமைச்சுண்ணாம்பு.
செலுப்பைமரம் Clerodendron Roxburghii.	சோடகாபனசு 333 Carbonate of Soda, சச்சிகாரம்,

சோட.	ஸ்தி.
சோடகுலோறகநீர் 338 Solution of Chlorinated Soda.	சோளம் Sorghum Vulgare.
சோடகுலோறகம் Chlorinated Soda.	ஸ்கபோலிப்பூடு 192 Scopolia lurida.
சோடசல்வசு 340 Sulphate of Soda.	ஸ்கமுனி 164 Scammony Plant சகமுனியா, மாமூதா.
சோடசிதிருதாத்தரசு 335 Citrotartrate of Soda.	ஸ்கமுனிக்கொடி 164 Convolvulus Scammonia.
சோடதகுலோறிரம் 337 Chloride of Sodium கறியுப்பு.	ஸ்கமுனிராளம் 165 Scammony Resin.
சோடதம் 331 Sodium.	ஸ்கிறவுலரியாசியங்கள் 169 Scrophulariaceae.
சோடதாத்தரகம் 341 Tartrated Soda.	ஸ்குதெலாரின் Scutellarin.
சோடதுவிகாபனசு 334 Bicarbonate of Soda.	ஸ்குருபல் Scruple.
சோடதுவிகாபனசு வில்லை 335 Bicarbonate of Soda Lozenges.	ஸ்குவாலின் Squalin.
சோடதுவிபோறசு 335 Biborate of Soda.	ஸ்குவிலக்சிமெல் 253 Oxy-mel of Squill.
சோடத்திராவம் Soda Flux.	ஸ்குவில் 252 Squill சீமைநரிவெங்காயம்.
சோடநீதுரசு Nitrate of Soda இந்துப்பு.	ஸ்குவிற்காடி 252 Vinegar of Squill.
சோடநீர் 332 Solution of Soda.	ஸ்குவற்பூடு 252 Official Squill.
சோடநுரைநீர் 334 Effervescing Solution of Soda.	ஸ்கேல் Scales தராசு, ஸ்கேல்கள்.
சோடபாஸ்வசு 336 Phosphate of Soda.	ஸ்கொபாரி Broom, Scoparia.
சோடம் Soda.	ஸ்தம்பனகலோடி Styptic Colloid.
சோடவக்சலசு Oxalate of Soda,	ஸ்தம்பனி Styptic ஸ்திப்திசு, தம்பனி
சோடவசிதசு 340 Acetate of Soda.	ஸ்தவிசாகரிப்பூடு Staphysagria.
சோடவதசல்விசு 397 Hypo-sulphite of Soda.	ஸ்தாட்சு Starch அமைலம்.
சோடவலீரியனசு 342 Valerianate of Soda.	ஸ்தாட்சு முசிலாகு Mucilage of Starch அமைலமுசிலாகு.
சோடவாசெனசு 339 Arseniate of Soda.	ஸ்திக்மம் Stigma குசினி.
சோடவாசெனசு நீர் 340 Solution of Arseniate of Soda.	ஸ்திப்திசு 460 Styptic ஸ்தம்பனி, தம்பனி.
சோடவாசெனிக Arsenite of Soda.	ஸ்திமுலம் 458 Stimulant.
சோணதி Rubefacient ருபிவாஷன்.	ஸ்திரதேலம் Fixed Oil திரதேலம்.
சோதகம் Detergent சுசியாக்கோன்.	ஸ்திரிக்னிக்கமிலம் Strychnic Acid.
சோதக்கினி Discutient.	ஸ்திரிக்னி 155 Strychnia.
சோதனை Test.	ஸ்திரிக்னீர் 156 Solution of Strychnia.
சோம்பு Anise அனிசு.	ஸ்திரோனர் Strainer வடி.
சோயிக்கீரை 111 Anethum Sowa.	ஸ்திலிஞ்சி Stillingia.
	ஸ்தில் Still.
	ஸ்திரமுனிப்பூடு 185 Stramonium.
	ஸ்திரமுனியிலை 185 Stramonium Leaves.
	ஸ்திரமுனிவிரை 185 Stramonium Seeds.

ஸ்தி,	தமா.
ஸ்திரோபிலிமெரியாண்டப்பூடு 180	ஜின்செங்கு Ginseng.
Meriandra Strobilifera.	ஜிப்சம் 397 Gypsum சுண்ணாசல்வசு.
ஸ்திரோபுடெல்லு Steer's Opodel-	ஜிரிகுவிரை 166 Kaladana கொழுகா
doc.	க்கடாம் விரை,
ஸ்தியரின் Stearine.	ஜிரிகராளம் 167 Resin of Kaladana.
ஸ்தில் Steel உருக்கு.	ஜிருனின் Geranin.
ஸ்தோர்குலியாசியங்கள் 44 Sterculia-	ஜெரிமிஸ்லாடனம் Jeremie's Lau-
ceae.	danum.
ஸ்தோர்ச்சன் மீன் 292 Sturgeon.	ஜெல்சிமின் Gelsemin.
ஸ்தைரகாசியங்கள் 143 Styracaceae.	ஜெனப்பவிரை Sun Hemp.
ஸ்தைரகஸ்பல்சமரம் 96 Liquidam-	ஜென்சன்வேர் 158 Gentian Root.
bar Orientale, Styra x Balsam	ஜென்சியனாசியங்கள் 158 Gentiana-
tree.	ceae.
ஸ்தைரகஸ்பல்சம் 96 Storax.	ஜேம்ஸ்பற்பம் James' Fever Powder.
ஸ்தொமாகி 446 Stomachic.	டாமர் 40 Dammar.
ஸ்பஞ்சு Sponge.	த -gen.
ஸ்பத்துலை Spatula துடுப்பு, முளை.	தகம் Actual Cautery.
ஸ்பிறிதம் Spiritus சீது.	தகர்ப்ரகுலோதிரம் Protochloride
ஸ்பிறிது Spirit ஸ்பிறிதம், சீது.	of Tin.
ஸ்பீஷசாடி Specia Jar தொப்பிச்	தகரம் Tin வெள்ளீயம்.
சாடி.	தகையாக்கல் Qualify.
ஸ்பீர்மிந்துதேலம் 177 Spearmint	தங்கம் 397 Pure gold.
Oil.	தசம Decimal,
ஸ்பீர்மிந்துப்பூடு 177 Spearmint.	தஞ்சிப்பூடு Tansy.
ஸ்பீர்மிந்துநீர் 178 Spearmint water	தடஸ்த Neutral.
ஸ்புருசபீஸ் மரம் Spruce Fir பெர்	தண்ணீர் 300 Water.
கன்றிராளமரம்.	தண்ணீர்முட்டான்கிழங்கு 255 As-
ஸ்பெசீவம் Specific Medicine சுயம	paragus Racemosus சதாவரி.
ருந்து.	தண்ணீர்விட்டான்கிழங்கு 255 As-
ஸ்பேந்திமிங்கலம் 295 Sperm Whale.	paragus Sarmentosus கிளவரி.
ஸ்பைசு Spice கறிச்சரக்கு, வாசனை	ததி Curd தயிர்.
ச்சரக்கு.	தபாக்கப்பூடு 190 Nicotiana Taba-
ஸ்பைஸ்மில் Spice Mill.	cum.
ஸமைலாசியங்கள் 239 Smilaceae.	தபாக்கம் 190 Tobacco புகையிலை.
ஜஸ்மினியங்கள் 147 Jasminae.	தபாக்கவிலை 190 Tobacco Leaf ப
ஜடாமாசி 130 Indian Spikenard.	கையிலை.
ஜலப்பு 163 Jalap பேதிக்கிழங்கு.	தமர்த்தை Averrhoa Carambola
ஜலப்புக்கூட்டுச் சூரணம் 163 Com-	தமர்த்தங்காய்.
pound Powder of Jalap.	தமாலக்கறுவாமரம் 208 Cinnamo-
ஜலப்பின் Jalapine.	mum Tamala.
ஜாதிபத்திரி 202 Mace.	தமால்செடி Xanthochymus Picto-
ஜாப்பம் 221 Piper Shaba சாப்பு.	rius சீகடிமரம்.
ஜின் Gin.	

தரக்.	தீஸ்.
தரக்கப்பூடு 134 Taraxacum Dens Leonis.	தான்றிமரம் 97 Belleric Myrobalans Tree.
தரக்கவேர் 134 Dandelion Root.	திகாகத்தம் Decoction; இஸ்பகூல் 194
தர்ப்பந்தின் 231 Oil of Turpentine.	Ispaghul; இலங்கைக் கடற்பாசி
தலஸ்தம் Suppository சப்பாசிதுறி.	274 Ceylon Moss; உல்மஸ் 225
தலிக்குரம்வொலியுலோசம் 13 Thalictrum Foliosum.	Ulmus; எமதக்கில 76 Logwood;
தவ்னீயம் 200 Daphnea.	ஐசிலன்பாசி 272 Iceland Moss;
தளம் Plane.	கசகசா 21 Poppies; குவேகஸ்
தற்பூறியம் 186 Daturia.	221 Quercus; சகைக்கூட்டு 250
தன Positive.	Compound of Aloes; சார்ச 239
தனகு 34 Yellow Flowered Cotton Tree.	Sarsaparilla; சார்சகூட்டு 239
தனிக்கமில்சப்பாசிதுறி 223 Tannic Acid Suppository.	Compound of Sarsaparilla; சே
தனிக்கமில்ம் 223 Tannic Acid.	ம்பட்டை 63 Rohun; ஸ்கோபாரி
தனிக்கமில்வில்லை 224 Tannic Acid Lozenges.	84 Broom; தரக்க 134 Taraxacum;
தனுவர்நீர் Donovan's Solution ஆ	சென்னை 267 of Rice; ப
செனிகரசவியோதிரநீர்.	ரைர 16 Pareira; பீதச்சின்கன
தாகமவகராளம் Tacamahaka.	123 of Yellow Cinchona; மாசக்
தாத்தரகம் Tartarated.	காய் 222 Galls; மாதளங்கோது
தாத்தரிக்கமில்ம் 66 Tartaric Acid.	103 of Pomegranate rind; மாத
தாபக்கினி Antiphlogistic அந்திவி	னாவேர் of P. Root; வண்டுக்காய்
லோசிஸ்த.	43 Okra; வாற்கோதுமை 266
தாபமானி Thermometer.	Barley; வேப்பம்பட்டை 62 Nim
தாமரிஸ்சினியங்கள் 37 Tamariscineae.	Bark.
தாம்புரீல் Reel for String.	திசின்வெக்சம் Disinfection அபசஞ்
தாரெண்ணெய் Liquid Tar.	சாரம்.
தார் 233 Tar கீல்.	திசின்வெக்து Disinfectant அபசஞ்
தார்நீர் Tar Water.	சாரி.
தாவரபதார்த்தசாரம் 9 Vegetable Materia Medica.	திசுத்தாள் Tissue Paper மெல்லிய
தாவரம் Vegetable உற்பீசம்.	தாள்.
தாழை Pandanus Odoratissimus.	திசெஸ்தம் Digestion பசனித்தல்.
தாளிசபத்திரி 34 Flacourtia Cataphracta.	திசெஸ்துவி Digestive சீரண, பூயதி.
தாளிப்பனை Talipot Palm தளப்பம்,	திசைனவு 240 Tseinapho.
கொட்டைப்பனை.	திச்சிதாலிஸ்பூடு 169 Digitalis Purpurea, Foxglove;
தாளெச்சகப்பூடு 161 Exacum Pedunculatum.	திச்சிதாலின் 171 Digitalin திச்சிதா
தானு Tan துவர்ப்பட்டைப்பொடி.	லிசம்.
தானுதோயம் Tan Bath.	திஸ்திலித்தல் Distillation.
	திஸ்பிலேசக்கருவி Displacement
	Apparatus.
	திஸ்பிலேசவடத்து Adapter for Dis
	placement.
	திஸ்பென்சதுறி Dispensatory சிகிச்
	சவாகடம்.
	திஸ்பென்சர் Dispenser சிகிச்சன்.

திஸ்.	தேக்.
திஸ்பென்சறை Dispensary சிகிச்சை.	துத்தகாபனசு 363 Carbonate of Zinc.
திஞ்சர் Tincture ரஞ்சம், திந்தூறம்.	துத்தகுலோநிரம் 365 Chloride of Zinc.
திட்டஸ்பிறிது 276 Rectified Spirit திட்டசீது.	துத்தசல்வசு 360 Sulphate of Zinc வெள்ளைத்துத்தம்.
திபிலதுறி Depilatory உரோமக்கினி.	துத்தம் 362 Zinc சிங்கு, துத்தநாகம்.
திபிறசன் Depressant அவசாதனி.	துத்தவசிதசு 364 Acetate of Zinc.
திப்தெருகார்பியங்கள் 40 Diptero-carpeae.	துத்தவக்கிரம் 362 Oxide of Zinc.
திப்பி Dregs சக்கு.	துத்தவலீரியனசு 364 Valerianate of Zinc.
திப்பிலி 220 Long Pepper பிப்பலி.	துத்தவன்கென் 363 Ointment of Zinc.
திமல்சம் 448 Demulcent சாமகம்.	துத்தி Abutilon Indicum.
திமி 295 Whale திமிங்கலம்.	தும்பிலிக்காய் 142 Gab, Diospyros Embryopteris.
திமிநெய் 295 Spermaceti மீன்கொழுப்பு.	துரா Fumaria Officinalis.
தியஸ்தாசு Diastase.	துரிசி 385 Sulphate of Copper செம்புசல்வசு.
தியவுறீசி 450 Diaphoretic.	துல்சமாரக்கொடி 191 Solanum Dulcamara.
தியாஸ்மியங்கள் 49 Diosmeae.	துல்சமாரம் 191 Dulcamara.
தியாஸ்மின் 49 Diosmin.	துவரை Cajanus Indicus.
தியுபுரோம நெய் 44 Oil of Theobroma.	துவர் 445 Astringent கயர்.
தியுபுரோமம் 44 Theobroma.	துவி Bi, Deut.
தியுறீசம் 451 Diuretic அமுரிதம்.	துவிகதிலீதங்கள் 9 Dicotyledons.
தியோடறிசர் Deodorizer கந்தக்கினி.	துளசி 178 Holy Basil, Ocimum Sanctum.
திராககந்து 83 Tragacanth பாதம்பிசின்.	துணுமரம் 64 Cedrela Toona.
திரஎண்ணெய்கள் 449 Fixed Oils.	துதுளை 193 Solanum Trilobatum.
திராவம் Flux, Reducing Agent.	தெக்ஸ்திரின் Dextrin தக்கணசம்.
திராட்சக்கொடி 65 Grape Vine.	தெலிகெசித்தல் Deliquescence.
திரிகள்ளி 216 Euphorbia Tiricalli.	தெலிவியடுப்பொலிக்கலம் 36 Polygala Telephioides.
திரிப்பலிக்கல் Rotten-stone, Tripoli.	தெவ்லகிருசவுப்பு Deflagrating Salt பொடுபொடுக்குமுப்பு.
திருநீற்றுப்பச்சை 178 Sweet Basil, Ocimum Basilicum திருநீற்றுப்பத்திரி, குத்திரசடை, சப்சா.	தெறிபிந்தம் 231 Common Frankincense.
திறக்கு Drug கற்கம்.	தெறியகம் Treacle, Theriaca இக்குப்பாணி.
திறத்திரிகை Drug Mill திறக்கில்.	தென்னை 259 Cocoa Tree.
திருபியகரி Therapeutic Agent, ரோககரி.	தேக்கமரம் 175 Teak Tree.
திரும் Drachm.	
திருவு Draught பாணம்.	
திருய்நிறை Troy Weight.	
தீபனம் Stimulant, ஸ்திமுலம்.	
துத்தகாபனசன்கென் 363 Ointment of Carbonate of Zinc.	

தேங்.	நாய்.
தேங்காய் 259 Cocoa Nut.	தோலி Lac Gum, அரக்கு.
தேசாவரம் Piper Dichotomum.	தோவர்கூரணம் Dover's Powder.
தேட்கொடுக்கி 189 Tiaridium Indicum.	இபிகாக்கூட்டுச் சூரணம்.
தேய Posological.	நச்சுருப்பான் Indian Ipecac குறிஞ்சா, நஞ்சுமுரிச்சான், நாய்ப்பாலை, பேய்ப்பாலை.
தேயம் Dose தோசு.	நஞ்சுணடான் Balanites Aegyptiaca.
தேயிலை Tea.	நரிவெங்காயம் 253 Indian Squill.
தேலம் Oil, எண்ணெய், தேல், தெல்.	நவந்தம் Naphtha.
தேலங்கள் Oils; அறுத 48 Rue; ஆமணக்கு 213 Castor; ஒலீவ 144 Olive; ஓம 109 Omum; கடுகு 32 Mustard; கரம்பு 100 Clove; கறுவா 206 Cinnamon; கறுவி 103 Caraway; சசுவிரஸ் 205 Sassafras; சபீன 286 Sabina; சம்பம் 51 Lemon; சாமந்தி 131 Chamomile; சிடம் 201 Nutmeg; தெறிபிந்த 231 Turpentine; பிமெந்த 101 Pimento; பெப்பமிந்து 177 Peppermint; லீன 45 Linseed; வலீரியன் 129 Valerian; வாதுமை 92 Almond; வால்மிளகு 219 Cubebs; வாள் 223 Croton.	நறுக்கி Cutting Knife, Chopper.
தேவதாரிப்பைன் 237 Pinus Deodara	நறுவிலிப்பழம் 168 Sebastens.
தேற்றாங்கொட்டை 157 Clearing Nut	நன்தாயுக்குமரம் 97 Liquidambar
தேனிவாதுமை Sweet Almond.	Altingia.
தேன் 290 Honey.	நன்னூரி 151 Indian Sarsaparilla.
தேனீ 290 Honey Bee.	நன்னூரி வேர் 151 Hemidesmus Root.
தேன்வாதுமை 91 Sweet Almond.	நாகசாப்பூ 39 Nagesa Flowers,
தைமெலாசியங்கள் 200 Thymelaeaceae.	நாகதாளி Cactus Indicus, Opuntia Dillenii.
தொடர்திஸ்பிலேசித்தல் Continuous Displacement.	நாகதுகம் Narcotic மஸ்து, கிராகி.
தொணிகம் Tonic ஓசதி.	நாவற்பழம் 102 Syzgium Jambolanum.
தொலுச்சிறுபம் Syrup of Tolu.	நாகமல்லி 174 Rhinacanthus Communis.
தொலுபல்சம் 77 Tolu Balsam.	நாகின் 23 Narcein.
தொலுபல்சமரம் 77 Tolu Balsam Tree.	நாகுதின் 29 Narcotine.
தோசு Dose தேயம்.	நாசுடம் Nostrum கட்டுமருந்து.
தோடம்பூ Orange Flower.	நாட்டக்ரோடு 215 Aleurites triloba.
தோடை 50 Orange Tree.	நாட்டிரேவற்சின்னி Indian Rhubarb நாட்டுமஞ்சடீனக்கிழங்கு.
தோயம் Bath, Ablution.	நாத்தந்தகரை 86 Cassia Occidentalis.
	நாயுருவி 196 Achyranthus Aspera.
	நாயுரோசை 90 Dog Rose.
	நாய்க்கடுகு Icosandra (Cleome) நாய்வேளை, பெருவேளை, காட்டுக்கடுகு.
	நாய்த்துளசி Ocimum Album கஞ்சாங்கோரை.
	நாய்வேளை Polanisia Icosandra (Cleome) பெருவேளை, நாய்க்கடுகு காட்டுக்கடுகு.

நா.ர.	நே.ட.
நார்க்கரந்தை <i>Blumea Arita</i> காட் டுமுள்ளாங்கி, நாரத்தை <i>Citron</i> . நாவி 11 <i>Bikh</i> வசநாவி. நாவிப்புனுகு 299 <i>Civet</i> . நாவிப்பூனை 299 <i>Viverra Zibetha</i> , <i>Zibeth</i> , <i>Civet Cat</i> . நாழி <i>Quart</i> . நாளலம் <i>Bleeding</i> , <i>Venesection</i> இரத்தமெடுத்தல்.	நீதுரிக்கமில்ம் 311 <i>Nitric Acid</i> பொட்டிலுப்புத்திராவகம். நீதுரிசு <i>Nitrite</i> . நீதுருச்சாதனம் <i>Nitrogenous Element</i> . நீதுருசம் 311 <i>Nitrogen</i> , <i>Azote</i> . நீதுருவைருகுலோறிக்கம்லம் 313 <i>Nitrohydrochloric Acid</i> . நீதுரோசீதர் <i>Nitrous Ether</i> . நீதுரோசீதர்ச்சீது 278 <i>Spirit of Nitrous Ether</i> . நீரடிமுத்துமரம் 34 <i>Hydrocarpus Inebrians</i> . நீரம் <i>Solution</i> நீர், விலயனம், சொ லுதம். நீராவி <i>Aqueous Vapor</i> . நீருமரி 195 <i>Suaeda nudiflora</i> . நீரெசுருத்து <i>Liquid Extract</i> ; அவின் 25 <i>Opium</i> ; ஏர்கற்று 255 <i>Ergot</i> ; சார்ச 240 <i>Sarsa</i> ; பரைர 16 <i>Pareira</i> ; பீதச்சின்கன 123; <i>Yellow Cinchona</i> ; வில்வ 55 <i>Bael</i> ; வீலிஸ்நீர் 270 <i>Male fern</i> . நீர்நாய் 298 <i>Beaver</i> . நீர்நொச்சி 174 <i>Lagondi</i> சிறுநொச் சி <i>Vitex Trifolia</i> . நீர்ப்பிரமி 171 <i>Herpestis Monniera</i> . நீர்முள்ளி 173 <i>Hygrophila Spinosa</i> . நீலகிரிக்காஞ்சிரபுல்லுருவி <i>Nilakiri</i> <i>Nux Vomica Loranthus</i> நீலகிரி க்காஞ்சிரபுல்லூரி. நீலத்துத்தம் <i>Nil tutiya</i> , <i>Salphate of Copper</i> . நுரைசோடசிதுதாத்தரசு 335 <i>Effervescent Citro-Tartrate of Soda</i> . நூக்குகட்டை <i>Dalbergia Sissoo</i> , நெகத்தண்டமரம் 205 <i>Nectandra Rodeaei</i> . நெட்டாவில்மரம் 229 <i>Antiaris Saccidora</i> . நெட்டிலைக்கலிசாக்கியம் 39 <i>Caly-saccion Longifolium</i> .
நிகுதியானின் 190 <i>Nicotianin</i> . நிகுதின் 190 <i>Nicotin</i> . நிகத்தச்சினுசியங்கள் 196 <i>Nyctagin-aceae</i> . நிணம் <i>Fat</i> கொழுப்பு. நிபாதிதவருணம் <i>Prismatic Color</i> . தனசியநிறம். நிபால்மிகனாசிப்பூடு 30 <i>Meconop-sis Nepalensis</i> . நிபால்சகவிரஸ்பட்டை 208 <i>Nepal Sassafras</i> . நிபெந்தி <i>Nepenthe</i> , நியந்தை <i>Corrigent</i> கறிகென். நிர்வியூடி <i>Disorganization</i> திசொர் கனதம். நிர்லோக <i>Non-metallic</i> . நிலக்கடலை 82 <i>Pistachis-Nut</i> , <i>Ground Nut</i> , வேர்க்கடலை. நிலக்குமிழ் 175 <i>Gmelina Parvifolia</i> . நிலச்செனியுஸ்போறப்பூடு 180 <i>Ge-niosporum Prostratum</i> . நிலப்பனைக்கிழங்கு 247 <i>Carculigo Orchioides</i> , <i>Murdannia Scapi-flora</i> . நிலவிளாம் <i>Small Wood Apple</i> குட்டிவிளாம். நிலவேம்பு 472 <i>Kariyat</i> , <i>Kreat</i> , <i>Creat</i> . நிலாவரை 74 <i>Senna</i> நிலவாகை, <i>Tin-nevelly Senna</i> . நிலூலியக்கள்ளி 216 <i>Euphorbia Nivulia</i> , நீதுரசு <i>Nitrate</i> .	

நெட்.	பதா.
நெட்டிலை உறுகோமமரம் Eurycoma Longifolia.	பதாசிகாபனசு 321 Carbonate of Potash மரவுப்பு, சாம்பலுப்பு.
நெட்டிலைப்பைன்மரம் 237 Pinus Longifolia சீமைத்தேவதாரி.	பதாசிகுலோறசு 324 Chlorate of Potash.
நெட்டிலைவாளம் 213 Croton Ob-longifolius.	பதாசிகுலோறசுவில்லை 325 Chlorate of Potash Lozenges. [ash.
நெரியரிசிப்பால் Liquid Storax.	பதாசிசல்வசு 324 Sulphate of Potash.
நெருஞ்சி 47 Tribulus Lanuginosus.	பதாசிசல்வகம் 323 Sulphurated Potash.
நெல்லி 216 Phyllanthus Emblica.	பதாசிசித்திரசு 328 Citrate of Potash.
நெல்லு 267 Rice.	பதாசிசெம்புருசியசு 398 Red Prussiate of Potash.
நெறுலித்தேலம் Neroli Oil.	பதாசிதாத்தரசு 327 Tartrate of Potash.
நேபாளஜின்செங்கிழங்கு 118 Pan-ax Pseudo Ginseng.	பதாசிதுவிகாபனசு 322 Bicarbonate of Potash. [Potash.
நேர்வாளச்செடி 212 Croton Tig-lum.	பதாசிதுவிசுரோமசு Bichromate of Potash.
நேர்வாளம் 212 Purgine Croton.	பதாசிநீதுரசு 325 Nitrate of Potash, வெடியுப்பு, பொட்டிலுப்பு.
நேவின் Nervine சிராகம்.	பதாசிநுரைநீர் 322 Effervescing Solution of Potash.
நைசியம் Errhine, Errhinum எரீன், நசியம், நையம், நைசிகம்.	பதாசிநீர் 320 Liquor Potash.
நொதிப்புத் திஸ்திலிப்புகளாற் பிறக் கும்பதார்த்தங்கள் 275 Products of Fermentation and Distillation.	பதாசிபிரமங்கனசு 326 Permanganate of Potash.
பகிடேமங்கள் 297 Pachydermata.	பதாசிபிரமங்கனசுநீர் 327 Solution of Permanganate of Potash.
பங்கின் Pumpkin பூசணி.	பதாசிபீதபுருசியசு 398 Yellow-Prussiate of Potash.
பசனித்தல் Digestion in Pharmacy.	பதாசிபோறுதாத்தரசு Borotartrate of Potash.
பசும்பூக்கோயம் 153 Hoya Viridiflora.	பதாசியசல்வசையனிரம் Sulphocyanide of Potassium. [ash.
பச்சுலித்துளிர் 180 Patchouli.	பதாசியசிதசு 329 Acetate of Potassium.
பச்சுலிப்பூடு 180 Pogostemon Patchouli.	பதாசியசையனிரம் Cyanide of Potassium.
பச்சைக்கடுரோணிப்பூடு 257 Green Hellebore. [லாக்கல்.	பதாசியபுரோமிரம் 331 Bromide of Potassium.
பஸ்மீகரித்தல் Incineration சாம்ப	பதாசியமிலதாத்தரசு 328 Acid Tartrate of Potash.
படிகம் Crystal கிரிஸ்தல்.	பதாசியம் 319 Potassium.
படிகவமிலம் Crystalline Acid கிரிஸ்தலமிலம்.	பதாசியவியோதிரம் 329 Iodide of Potassium.
பண்ணிமோந்தான்கிழங்கு Trapa Bispinosa பன்றிமொத்தை.	பதாசியவியோதிர வன்கென் 330 Ointment of Iodide of Potassium.
பதாசி Potassa.	

பதா.	பாரி.
பதாசியவியோதிரசுபுலினிமென் 330 Liniment of Iodide of Potassium and Soap.	பதசர் கெமிஸ்தவுணவு Parish's Chemical Food.
பதாசியயோதசு Iodate of Potash.	பறைச்சிவ்வு Drum Sieve.
பதார்த்தசாரம் 9 Materia Medica.	பற்பம் Mineral Powder பஸ்மம்.
பத்தருசு 198 Mirabilis Jalapa.	பற்று Plaster; அவின் 26 Opium;
பபயாசியங்கள் 107 Papayaceae.	இரசவமுனீயக 114 Ammonia-
பபாடுசகை 251 Barbadoes Aloes.	cum with Mercury; ஊமத்தம்
பபாவிரின் 23 Papaverin கசகசாசம்.	188 Dhatura; கந்தாரிசு 289
பபாவிரூசியங்கள் 21 Papaveraceae.	Cantharides; கல்பன 114 Gal-
பப்பரப்புளி 44 Adansonia Digitata	barum; பெலடன 184 Bella-
ஆனைப்புளி.	donna; ராள் 233 Resin; வெம்
பப்பரமுள்ளி Solanum Indicum,	289 Warm,
முள்ளி. [ப்பாயி.	பனசீயம் Panacea சர்வாவுஷதம்.
பப்பனிச்செடி 107 Papaw Tree, ப	பனிசு Panis, Bread அப்பம்.
பமிஸ்கல் Pumice Stone.	பனை 260 Palmyra.
பரமாவியம் 23 Paramorphia.	பன்றி 297 Hog.
பரவின் Paraffin.	பன்றிறெய் 277 Lard, லாடு.
பரில்லம் 195 Barilla.	பாகற்கொடி Kerula, Momordica
பரீட்சக Empirical.	Charantia.
பரீன Farinaceous, மாவுள்ள.	பாக்கு 261 Betel Nut கொட்டைப்
பரீனம் Farina, Flour, மா.	பாக்கு.
பரு Crude அசுத்த.	பாஸ்வரம் 301 Phosphorus.
பருத்திச்செடி 41 Cotton Plant.	பாஸ்வரிக்கமிலம் 302 Phosphoric
பருமரீர் Volumetric Solution பரு	Acid.
மசொலுதம்.	பாஸ்வின் Phosphene.
பருமம் Volume.	பாப்பை Poultice புற்கை, களி; ஊம
பரைரக்கொடி 15 Pareira Brava.	த்தம் 188 Dhatura; கோனிய 115
பர்ப்படாகம் Mollugo Cerviana பற்	of Conium; நெல்லரிசி 267 Rice;
படாகம்	லீன 45 Linseed; வல்லாரை 116
பலகைத்தகரம் Block Tin.	Hydrocotyle; வேப்பிலை 62 Nim
பலகவ Tabular.	leaves.
பலவிலைத்திரகந்திப்பூடு 262 Dracon-	பாம்புக்கல் Snake Stone.
tium Polyphyllum.	பாம்புச்சைலம் 150 Ophioxylon
பலாசம் Bengal Kino Tree புரைசு,	Serpentinum.
புரசு, முருக்கன்மரம்.	பாம்புரோசனை Snake Bezoar.
பலியாண்டவாளச்செடி 213 Croton	பாம்பெட்டிச்செடி 156 Strychnos
Polyandrum, C. Roxburgii.	Colubrina.
பல்சம் Balsam.	பாரனைத்தாபமானி Fahrenheit's
பல்பு Pulp சதை, களி, பல்பம்.	Thermometer.
பல்மாசியங்கள் 259 Palmaceae.	பாரிதம் Baryta.
பல்விசு Pulvis, Powder பொடி, சூர	பாரியகுலோதிரம் 397 Chloride of
ணம், பற்பம்.	Barium.
பவானவாளம் 213 Croton Pavana.	பாரியம் Barium.

பாரி.	பிளி.
பார்தெனச்சிலக்கறுவாமரம் 208 Cinnamomum Parthenoxylon.	பிப்பலிமூலம் 220 Peepla mool. பிப்பினி Cucumber.
பார்மகுபீயம் Pharmacopoeia சிகிச்சாவாகடம்.	பிமெந்தம் 101 Pimento.
பார்மசி Pharmacy சிகிச்சம்.	பியூட்டர் Pewter வெள்ளியம்.
பாலபினி Dudhi Opium.	பிய்வேல் 85 Acacia Farnesiana.
பாலிம்மி Milk Globuleபாற்குலிகம்.	பிர Per.
பால் 296 Milk.	பிரண்டி 275 Brandy; Spirit of French Wine. [ture.
பால்வள்ளி 149 Ichnocarpus frutescens.	பிரண்டிக்கலவை 276 Brandy Mix
பாவிதம் Ingredient வகை, கூறு.	பிரண்டை Vitis Quadrangularis.
பாளிமுத்து Pearl Barley.	பிரநீதுரசு Pernitrate.
பாளியரிசி Barley வாற்கோதுமை.	பிரமதண்டு 29 Yellow Thistle, Argemone Mexicana குருக்கஞ்செடி.
பாறிச்சு Porridge கூழ், குழம்பு.	பிரவக்கிரம் Peroxide.
பாற்சினி 296 Sugar of Milk.	பிரவுப்பு Persalt.
பாற்சுரு 293 White Shark.	பிராணியபதார்த்தசாரம் 286 Animal Materia Medica.
பிக்குருதாக்கின் 16 Picrotoxin.	பிரிசபடிகம் Prismatic Crystal பரிசுகிரிஸ்தல்.
பிக்குலித்தல் Pickle.	பிரிசம் Prism நிபாபிதி.
பிக்குல் Pickle ஊறுகாய், அடைகாய்.	பிரெப்பருதம் Preparatiom செய்வு, ரசிதம்.
பிக்கினியங்கள் 33 Bixineae.	பிலாஸ்தரியந்திரம் Plaster Machine.
பிக்குறுதக்கிக்கமில்ம் Picrotoxic Acid.	பிலாஸ்தர் Plaster பற்று.
பிக்னோனியாசியங்கள் 161 Bigno-niaceae.	பிலாடினக்கறுப்பு 397 Platinum Black.
பிசின்கள் 450 Gums.	பிலாடினபத்திரம் Platinum Foil.
பிஸ்தன் Piston தாம்பியம்.	பிலாடினபிரகுலோறிரம் Perchlori-de of Platinum.
பிஸ்முதசிதிரசு Citrate of Bismuth.	பிலாடினம் Platinum.
பிஸ்முதம் 359 Bismuth.	பிலுட்டம் Emphyreuma எம்பைறுமம்.
பிஸ்முதவதநீதுரசு 360 Subnitrate of Bismuth.	பில் Pill குளிகை.
பிஸ்முதகாபனசு 361 Carbonate of Bismuth.	பிளஸ்மம் Plasma வர்ப்பசம்.
பிஸ்முதவமோனசிதிரசு நீர் 361 Solution of Citrate of Bismuth and Ammonia.	பிளந்தச்சினியங்கள் Plantagineae.
பிஸ்முதவில்லை 360 Bismuth Lozen-ges.	பிளமாஞ்சு Blanc Manger.
பிடாரம் Medical Dictionary.	பிளம்பச்சினியங்கள் 180 Plumb-agineae.
பிதுமம் Bitumen சைலம்.	பிளம்பசின் 131 Plumbazin.
பிபேரிப்பட்டை 205 Beberia Bark நெக்தண்டபட்டை.	பிளம்பம் Lead, ஈயம், வங்கம்.
பிபேரியசல்வசு 205 Sulphate of Beberia.	பிளம்மரம் Plum Tree.
பிப்பலி 220 Long Pepper திப்பிலி.	பிளாஸ்கு Flask ஓர்வகைச்சீசா.
	பிளிஸ்தீ Telini Fly கொப்புளவண்டு

பிளூ.	பூனை.
பிளூமியபல்சப்பூடு 138 <i>Blumea Balsamifera</i> .	புறுவித்தல் <i>Brewing</i> யவசீதுனம்.
பிறசிபிதாத <i>Precipitated</i> அதக.	புறேவிலாக்சம் <i>Prophylaxis</i> ரோக நிவாரம், உற்பாலனம்.
பிறசீல்கிராய் <i>Brazil Wood</i> .	புரோபி <i>Probe</i> சலாகை, சோதனி.
பிறுகந்திவலிச்சிச் செடி 211 <i>Bragantia Wallichii</i> .	புரோமம் 311 <i>Bromine</i> .
பிறுயர்பல்சம் 143 <i>Friar's Balsam</i> .	புற்கை <i>Boultice</i> பாப்பை.
பிறெசு <i>Press</i> பாரசி, அமுக்கு,	புனர்காரி <i>Reagent</i> பிரதிகாரி,
பிற்சு <i>Pitch</i> .	புனலை <i>Soap Nut</i> பொன்னாங்கொட்டை, பூவந்தி.
பிற்சுப்பிலாஸ்தர் 231 <i>Pitch Plaster</i>	புனீர் 193 <i>Punir</i> or <i>Punirbad</i> ,
பிற்றென் <i>Bittern</i> கறியுப்பெடுத்தபி	<i>Puneeria Coagulans</i> .
ன் எஞ்சும் கசப்புநீர்.	புனீரேலம் 193 <i>Punir Cardamoms</i> .
பீத <i>Yellow</i> .	புன்னை 39 <i>Calophyllum Inophyllum</i> புன்னைமரம், புன்னாகம்.
பீதவதகம் <i>Yellow Precipitate</i> .	பூக்காவி <i>Red Armenian Bole</i> .
பீர் <i>Beer</i> .	பூக்கு 49 <i>Buchu</i> .
பீர்யீஸ்து 275 <i>Beer Yeast</i> நொதி, மண்டம்.	பூசணி 106 <i>Cucurbita Popo</i> பூசினி க்காய், பங்கின்.
பீவர் <i>Beaver</i> நீர்நாய்.	பூஷச்சாறு 227 <i>Mulberry Juice</i> .
பீவ்குடிநீர் <i>Beef Tea</i> .	பூஷம் 227 <i>Mulberry</i> மல்பெரி.
பீற்சுபழம் <i>Peach</i> .	பூத <i>Prepared</i> , <i>Purified</i> , <i>Purus</i> ,
புகையிலை 190 <i>Tobacco</i> .	<i>Pure</i> சுத்த.
புங்கமரம் 87 <i>Pongamia Glabra</i> பு	பூதசீபம் 296 <i>Prepared Suet</i> .
ன்கு, புங்கன்.	பூதகிரீதம் 346 <i>Prepared Chalk</i> .
புணல் <i>Funnel</i> .	பூதஸ்தைராக்சு <i>Prepared Storax</i> .
புதிஞா <i>Indian Peppermint</i> ஈவெச்சக்கீரை.	பூதநிணம் 296 <i>Prepared Suet</i> சுத்தஞ்ஞெற்று.
புமிகாசம் <i>Fumigation</i> துமீகரணம், புகைகாட்டல.	பூரக்கூட்டிரஞ்சம் 203 <i>Compound Tincture of Camphor</i> , கர்ப்பூரக்கூட்டிரஞ்சம்.
புரசமரம் <i>Butea Frondosa</i> (Rottler)	பூரநீர் 203 <i>Camphor water</i> .
புருணமரம் 94 <i>Prunus</i> or <i>Plum Tree</i> .	பூரச்சீது 203 <i>Spirit of Camphor</i> .
புருவிஸ்பிறிது 276 <i>Proof Spirit</i> கிருசஸ்பிறிது, புருவுசீது.	பூவரசமரம் 43 <i>Thespesia Populnea</i> .
புலீச்சிமிந்துப்பூடு <i>Penny Royal</i> , <i>Pulegium</i> .	பூரிமரம் <i>Adansonia Digitata</i> பப்பரப்புளி, ஆனைப்புளி.
புல்லுருவி 119 <i>Viscum monoicum</i> புல்லுரி.	பூர்த்தம் <i>Saturation</i> ,
புல்வநெய் 141 <i>Fulwa Butter</i> .	பூர்த்தல் <i>Efflorescence</i> .
புல்வமரம் 141 <i>Fulwa Tree</i> .	பூர்த்தவிலயனம் <i>Saturated Solution</i> .
புழுக்கொல்பிரமாம்பி 270 <i>Polyporus Anthelminticus</i> .	பூர்த்தித்தல் <i>Saturate</i> .
புளியமரம் 73 <i>Tamarind Tree</i> .	பூலாங்கிழங்கு <i>Long Zedoary</i> .
புளி 73 <i>Tamarind</i> புளியங்கனி.	பூவஷ்மரம் 146 <i>Flowering Ash</i> .
புறுஞ்சிப்பச்சை <i>Brunswick Green</i> .	பூவாசனை <i>Portia Tree</i> .
	பூனைக்காலி 81 <i>Cowhage</i> .

பெக்.	பேய்.
பெக்துரல் Pectoral நெஞ்சுக்குரிய.	பெருபல்சமரம் 77 Peru Balsam tree.
பெசரி Pessary.	பெருபல்சம் 77 Peru Balsam.
பெசில் Pestle உலக்கை.	பெர்கன்றிராளமரம் 230 Spruce Fir.
பெஞ்சோயஸ்லாடு 143,293 Benzoinated Lard.	பெர்கன்றிராளம் 230 Burgundy Pitch,
பெஞ்சோமிக்கமிலம் 144 Benzoic Acid சாம்பிராணிப்பூ. [ண்	பெர்குலாசம் Percolation சியந்தனம்.
பெஞ்சோயினம் Benzoin சாம்பிரா	பெலடனப்பற்று 184 Belladonna plaster.
பெஞ்சோல் 397 Benzoin.	பெலடனரஞ்சம் 183 Tincture of Belladonna.
பெதல் Petal அல்லி.	பெலடனவெசிறுத்து 183 Extract of Belladonna.
பெப்சினபோர்சி Pepsina Porci.	பெலடனவன்கென் 184 Ointment of Belladonna.
பெப்சின் Pepsin பசனம்.	பெலடனலினிமென் 184 Liniment of Belladonna.
பெப்பமிந்துதேலம் 177 Peppermint Oil.	பெலடனவிலை 182 Belladonna Leaves.
பெப்பமிந்துப்பூடு 177 Peppermint.	பெற்றோலியம் 264 Petroleum, Rock Oil மண்டைலம், மண்ணெண்ணெய்.
பெரட்டிக்கீரை Corchorus Clitorius.	பெற்றோலியவீதர் Petroleum Ether.
பெரி Berry.	பெகுன் Bacon பன்றியிறைச்சிவற்றல்.
பெரிகாறிக்கு 203 Paregoric Elixir பூரக்கூட்டிரஞ்சம்.	பேஸ்து Paste பசை.
பெரியநறுவிவி 168 Cordia Myxa Large Sebestens.	பேணற்றீர் 366 Burnett's Liquid.
பெரியகரணைக்கிழங்கு Tacca Pinnatifida.	பேணிதூர் Furniture பணிமுட்டு.
பெரியவாகாசத்தாமரை Villarsia Indica.	பேனெசு Furnace உலை.
பெரினூவியம் Pediluvium பத்தோயம்.	பேதிக்கினி Antilax.
பெரிவிங்கல் Periwinkle.	பேபெரிடியங்கள் 18 Berberideae.
பெருகளர்வா 182 Salvadora Indica கார்கொள்மரம், பெருபிலூ.	பேயத்திப்பழம் 228 Ficus Oppositifolia.
பெருங்காயம் 112 Assafoetida plant.	பேய்க்கொம்மட்டி 103 Colocynth கலுசிந்து, வரித்துமட்டி.
பெருங்கிழங்குக்கொலு காசிப்பூடு 262 Colocasia Macrorhiza.	பேய்ப்பாலை 152 Indian Ipecac குறிஞ்சா, நஞ்சுருப்பான், நஞ்சு முரிச்சான், நாய்ப்பாலை.
பெருஞ்சீரகம் 110 Fennel. [rex.	பேய்ப்பீர்க்கம் 106 Luffa Amara.
பெருநெருஞ்சி 162 Pedalium Mu-	பேய்ப்புடல் Trichosanthes Cucumerina.
பெரும்பிளூமியப்பூடு 138 Blumea Grandis.	பேய்மருட்டி 179 Malabar Catmint பேய்வெருட்டி, இரட்டைப் பேய்மருட்டி.
பெரும்பூநொதோனி 137 Notonia Grandiflora..	
பெருமரம் 53 Ailanthus Malabaricus பீநாறி.	
பெருமருந்து 210 Aristolochia Indica,	

பேர.	மட்.
பேரரத்தை 244 Greater Galangal.	போஸ்தகா White Poppy, கசகசா.
பேரீஞ்சு Date.	போட்டர் Porter.
பேருமரி 195 Salicornia Indica.	போட்டிசு Poultice புற்கை, பாப்பை
பேரெருக்கு 151 Calotropis Gigan- tea.	போட்வைன் Port Wine.
பேர்சிரூசியங்கள் 59 Burseraceae.	போஷண Nutritive போஷணையு ள்ள.
பேர்குலாசம Percolation சியந்த னம்.	போறசகிலைசரின் 336 Glycerine of Borax.
பேர்ப்பூசணி 106 Cucurbita maxi- ma..	போறசதேன் Borax Honey வெ ண்காரதேன்.
பேளஷ் Pearlash.	போறசிக்கமில்ம் 397 Boracic Acid.
பேள்பாளி Pearl Barley.	
பேறு Product	மக்சம் Moxa.
	மக்சிமம் Maximum கருட்டம்.
பைபராசியங்கள் 218 Piperaceae.	மக்னீசி 349 Magnesia.
பைப்கிளெய் Pipe-clay வெண்களிம ண், வெண்கிளெய்.	மக்னீசிகாபனசு 350 Carbonate of Magnesia.
பைரீதிரப்பூடு 135 Pellitory of Spain	மக்னீசிகாபனசுநீர் 350 Solution of Carbonate of Magnesia.
அக்கிராக்காரம்.	மக்னீசல்வசு 351 Sulphate of Magnesia.
பைறக்சைலின் 41 Gum Cotton வெ டிப்பஞ்சு. [Acid.	மக்னீசல்வசெனீமம் 352 Enema of Sulphate of Magnesia.
பைறுலிக்னசமில்ம் Pyroligneous	மக்னீசியமோனசல்வசு Ammonio- Sulphate of Magnesia.
பைன் 231 Pine பைன்மரம்.	மக்னீசியம் 349 Magnesium.
பைன்று Pint அரைநாழி.	மக்னோலியாசியங்கள் 12 Magnoli- aceae.
பொடுதலை Zapavia Nodiflora	மங்கனீசகாரக்சிரம் Black Oxide of Manganese.
பொற்றலைக்கையாந்தகரை.	மங்குஸ்தீன்மரம் 39 Mangosteen.
பொடுவிலப்பூடு 18 Podophyllum.	மசிரூதம் Maceration ஊறவைத்தல் மசிறித்தல்.
பொடுவிலராளம் 19 Podophyllum Resin.	மஸ்திகுமரம் 67 Mastich tree.
பொடுவிலின் 19 Podophyllin.	மஸ்திகு 67 Mastich இருமிமலைத் தகி, பூணைக்கண்குங்கிலியம்.
பொலிக்கலியங்கள் 33 Polygaleae.	மஷிறுங்காளான் Mushroom.
பொலிக்கனாசியங்கள் 197 Polygon- aceae.	மஞ்சள் 243 Turmeric plant.
பொறதினாசியங்கள் 163 Boragin- aceae.	மஞ்சட்தாள் 244 Turmeric paper.
பொறை Compress கம்பிரெசு, சம் பீடணம்.	மஞ்சிட்டி 129 Indian Madder செ வ்வெல்லி.
பொற்குலோதிரம் 400 Chloride of Gold.	மடர்பூடு Madder.
பொன்னாவிரை 86 Cassia Sophora	மட்டிப்பால் 55 Resinous Juice of Ailanthus Malabaricus.
பெரியதகரை, பேறுவிரை.	
பொன்றொரீமச்செடி 118 Dorema Aureum.	

மண்.	மாவீ.
மணல்மத்திகம் Sand Bath.	மலைவேம்பு 63 Melia Azedarach மலைவேப்பம்.
மணற்கீரை 195 Gisekea Pharnaceoides.	மலையயசீயமஸ்பூடு 192 Hyoseyamus insanus.
மதிகச்செடி 219 Artenthe Elongata, Matico Plant.	மலையாள ஏலம் 242 Malabar Cardamoms.
மதிகவிலை 219 Matico Leaves.	மலையாளச்சிடம் 202 Myristica Malabarica.
மத்திகம் Bath, heating medium.	மல்பெரி Mulberry பூஷம்.
மமலியங்கள் 295 Mammalia.	மல்லி 111 Coriander Fruit கொத்தமல்லி.
மமி Mummy வறுச்சுவம்.	மல்லிகை 147 Jessamine.
மயிர்த்துளசி 179 Ocimum Pilosum.	மல்லிப்பூ 147 Jasminum Sambac மல்லிகைப்பூ.
மயிர்மாணிக்கம் Sida Retusa,	மல்வாசியங்கள் 41 Malvaceae.
மரத்தார் 234 Wood Tar.	மறுவித்தேலம் 292 Cod Liver Oil கடம்மீரற்றேலம்.
மரமஞ்சள் 18 Coscinium Fenestratum.	மறைச்சாளி Guinea Pig.
மரவள்ளிக்கிழங்கு Manihot Utilissima ஆள்வள்ளிக்கிழங்கு.	மனோரஞ்சிதம் Artapotrrys Odoratissima.
மராடிமொக்கு 188 Datura Flower Buds.	மன்னா Manna.
மரிமாஞ்செடி Spondias Mangifera.	மாசக்காயன்கென் 223 Ointment of Galls.
மருக்காளங்காய் 128 Emetic nut.	மாசக்காய் 222 Galls மாசிக்காய்.
மருக்காளஞ்செடி 128 Randia dumetorum.	மாசவவினன்கென் 223 Ointment Galls and Opium.
மருதமரம் 229 Myrica Sapida,	மாசிபத்திரி 136 Artemisia Indica.
மருதம்பட்டை 229 Kaephul.	மாடு 296 The Ox.
மருதோன்றி 95 Lawsonia Alba, Hena Plant.	மாட்டசு Matrass கலசம்.
மருந்துப்பகுப்பு 441 Classified Catalogue.	மாதளைச்செடி 102 Pomegranate.
மருத்துநீர் Medicated Water.	மாத்தியம் Medium.
மலாயுவேலம் 245 Amomum Xanthioides.	மாத்திராவனாலிசு Quantitative Analysis அளவையனாலிசு.
மலிக்கமிலம் Malic Acid.	மாந்தப்புல் 268 Citronelle காமாக்கிப்புல், காவட்டம்புல், சுன்னூரிப்புல்
மலியபிலமை Malleability பலகத்துவம்.	மாபிள் Marble மாபிட்கல்.
மலைச்சுண்டை 193 Solanum Verbascifolium.	மாமரம் 68 Mango Tree பாங்காய்மரம்.
மலைதாங்கி 43 Sida Acuta பொன்முசட்டை, வட்டதிருப்பி.	மால்வப்பூடு Mallow, Malva Sylvestris.
மலையலுகாசிப்பூடு 262 Alocacia Montana.	மாவிஞ்சி 244 Mango Ginger.
மலைத்தாமரை 240 Smilax Ovalifolia.	மாவிபம் 27 Morphia. [phia.
மலைத்துமட்டி 105 Cucumis Hardwickii.	மாவிபவகிதசு 28 Acetate of Mor-

மாலி.	மேர்.
மாவியவசிதசுநீர் 29 Solution of	முஸ்திப்பு Outfit.
Acetate of Morphia.	முடக்கற்றான் Cardiospermum Ha-
மாவியவைருகுலோறசு 27 Hydro-	licacabum.
chlorate of Morphia.	முட்கீரை 195 Amarantus Spinosus
மாவியவைருகுலோறசுநீர் 27 Solu-	முள்ளுக்கீரை.
tion of Hydrochlorate of Mor-	முட்டா Confectionery பலகாரம்,
phia.	சீனிப்பண்டம்.
மாற்று Antidote.	முத்தகாச்சு 263 Cyperus Perte-
	nuis கோரைக்கிழங்கு.
மிசிரம் Compound கூட்டு.	முந்திரிப்பழம் Grape திராட்சப்பழம்.
மிச்செல்லிளக்கு Mitchell's Lamp.	முருங்கை 69 Horseradish Tree,
மிஸ்தூர் Mixture, Compound கூட்டு,	Sohunjuna, Indian Horse-Radish,
மிசிரம், கலவை, விரவு.	Moringa Pterygosperma.
மிஸ்தூர் Mixture; அமுனியக 114	முருங்கைக்கூட்டுக்கஷாயம் 70 Com-
Ammoniacum; குவயக 46 Guai-	compound Decoction of Horse radish.
cum; ஸ்கமுனி 166 Scammony;	முருங்கைக்கூட்டுச்சீது 70 Com-
ஜென்சன் 158 Gentian; வில்வ 54	compound Tincture of Horseradish.
Bael.	முள்முருக்கு Erithrina Indica கலி
மிண்டுப்பிலாஸ்தர் Strengthening	யாணமுருக்கு.
Plaster.	முள்ளி 193 Solanum Indicum.
மிரைசியங்கள் 229 Myriceae.	முள்ளாங்கி Radish.
மிளகாணை 55 Scopolia Acubata,	முள்ளிலவு 43 Red Cotton Tree,
Toddalia.	முள்ளிலவமரம் Bombax Mala-
மிளகாய் 191 Red Pepper.	baricum.
மிளகு 218 Black Pepper.	
மினிமம் Minimum லேசகம்.	முங்கில் 269 Bambu.
மினிம் Minim துளி.	முக்கிமரம் 38 Garcinia Pictoria,
மினிறல் Mineral ஆகரி.	Indian Gamboge Tree.
மினீரம் Graphite தூசிக்கரி.	முக்குரட்டை 197 Spreading Hog-
	wood, Boerhaavia diffusa.
மீகம் Mica அப்பிரகம், மீகக்கல்,	முங்கிலுப்பு 269 Tabashir.
மீன்செயல் Reaction பிரதிகாரம்.	முசுகட்டைச்செடி Indian Mulber-
மீன்மிதப்பு Airbladder of Fish.	ry Plant கம்பளப்பூச்சிச்செடி.
மீன்கள் 292 Fishes.	முஷிகை Retort குடுக்கை.
	மூர்குரோவ்வரியாத்து 199 Rheum
முக்காவேனை Prickly Galega.	Moorcroftianum.
முகில்க்குக்குலு 61 Balsamoden-	மெகனிக்கமிலம் Meconic Acid.
dron Mukul	மெகனின் Meconin.
முசாசியங்கள் 245 Musaceae.	மெசீரியபட்டை 200 Mezereon Bark
முசிலாரு Mucilage சியானம்; அகசி	மெசீரியம் 200 Mezereum.
71 of Acacia; அமைல 267 of	மெசுவவெநீயம் 39 Mesua Ferrea.
Amylum.	மெதல் Metallic லோக.
முசுமுசுக்கை Rough Bryony.	மெதிரம் Methide.
முசைப்பேயொட்டி Tetranthra	மெர்தாசியங்கள் 99 Myrtaceae.
Roxburg'hii.	

மேல. மெலந்தாசியங்கள் 255 Melanthaceae.
மெலியாசியங்கள் 61 Meliaceae.
மெனிஸ்பேமின் Menisperm. மெனிஸ்பேர்மாசியங்கள் 14 Menispermaceae.
மென்சபு 146 Soft Soap களிச்சவுக்காரம்.
மென்ஸ்துறம் Menstruum, Solvent, விலயனி.
மென்னீர் Soft Water நந்நீர்.
மேசு Maize மக்காசோளம்.
மேசர் Measure அளவை.
மைசூர்மக்கி Mysore Gamboge.
மைலாபிரிச்சிகுரிவண்டு 289 Mylabris cichorii.
மைறிஸ்திசியங்கள் 201 Myristiceae.
மைன்சிக்கிவிக்சவித்திரல் M y n-
sicht's Elixir Vitriol.
மொகடம் 141 Mimusops Elengi.
மொக்கிலாமிச்சைப்புல் 268 Andropogon Pachnodes.
மொரிங்கியங்கள் 69 Moringaceae.
யீஸ்து 275 Yeast நொதி.
யீஸ்துப்பாப்பை 275 Yeast poultice.
யுகலிப்தடுக்கறுவாமரம் 208 Cinna-
monum eucalyptoides.
யுவனியின் Euonymin.
யுவார்பியாசியங்கள் 211 Euphorbiaceae.
யூபியன் Eupion.
யூவயூர்சியலை! 40 Bearberry leaves.
யெலு Yellow மஞ்சணிறம், பீதம்.
ரஞ்சம் Tincture திந்தூறம், திஞ்சர்;
அகனீத 9 Aconite; அக்கிராக்கார
135 Pellitory; அவின்மோன; 25
A m m o n i a t e o f o p i u m ;

ரஞ்சம், தொடர்ச்சி; அவின் 25
Opium லாடனம்; ஆணிக 133
Arnica; இங்கு 112 Assafoetida;
இந்துபாபெரி 20 Indian Barberry;
இயோத 310 Iodine; ஊமத்தை
187 Dhatura; ஏர்கற்று 264 Ergot;
ஏலக்கூட்டு 242 Compound Carda-
moms; ஏழிலைப்பாலை 148 Alstonia;
கஞ்சா 228 Indian Hemp; கஸ்கரில்
212 Cascarilla; கஸ்தார் 298 Cas-
tor; கந்தாரிஸ் 288 Cantharides;
கமால 214 Kamala; களும்பு 15
Calumba; கறுவா 206 Cirna-
mon; காசுக்கட்டி 72 Catechu;
காஞ்சிர 115 Nux vomica; கிர
மேரி; 36 Krameria; கிருமிஞ்சி
292 Cochineal; கினிய 122 Qui-
nine; கீனு 79 Kino; குங்குமப்பூ
248 Saffron; குலோறுவார்கூட்டு
280 Compound Chloroform;
குவசி 57 Quassia; கொல்சிகவி
தை; 256 Colchicum seed; கோ
னிய 116 Conium; சச 59 Myrrh;
சகை 250 Aloes; சபீன 237
Sabina; சம்பந்தோல் 51 Lem-
on peel; சம்புல் 117 Sambul;
சாம்பிராணிக் கூட்டு 143 Com-
pound Benzoin, சிரட்டுச்சிக்கூட்
டு 159 Compound chiretta; சின்
கனக்கூட்டு 124 Compound cin-
chona; சீந்தில் 17 Gulancha; ச-
க்கு 241 Ginger; சுக்குக்கர 241
Stong of Ginger; சேபந்தாரி
210 Serpentary; ஸ்திராமுனி 186
Stramonium; ஸ்குவில் 252
Squill; 35 செனிக 35 Senega;
ஜலப்பு Jalap; ஜிரிகி 166 Ka-
ladana; ஜென்சன்கூட்டு 159
Compound Gentian; திச்சிதா
லிஸ் 170 Digitalis; தோடந்
தோல் 60 Orange peel; தொலு
78 Tolu, நிலவாகை 75 Senna;
நிலவேம்புக்கூட்டு 172 Compound
Kariyat; பச்சைக்கடுரோணி 257
Green Hellebore; பூக்கு 49 Buchu;
பீதச்சின்கன 123 Yellow cinchona;

ரஞ்.	ரஞ்.
ரஞ்சம், தொடர்ச்சி; பூரக்கூட்டு 203	ரேசிதம் Depletion திபிளீசம்.
Compound Camphor; பெலடன	ரேசின் Raisins திராட்சப்பழவற்றல்.
183 Belladonna; மஞ்சள் 243	ரோசனி Stomachic.
Turmeric; மாசக்காய் 222 Galls;	ரோசாசியங்கள் 89 Rosaceae.
மிளகரணை 55 Toddalia; மிளகா	ரோசை 89 Rose.
ய் 191 Capsicum; லவந்தர்க்கு	ரோசைத்தேலம் 90 Rose oil.
ட்டு 176. Compound Lavender;	ரோசைநீர் 90 Rose water.
ஹப்புவல் 226 Lupulus; லிற்மஸ்	ரோசைலேகியம் 89 Rose confec-
272 Litmus; லொபீலி 139 Lo-	tion.
belia; லொபீலியீதர் 139 Ethereal	ரோஸ்மரித்தேலைம் 178 Rosemary
Lobelia; வலீரியனமோன; 130	Oil.
Ammoniated Valerian; வலீரிய	ரோஸ்மரிச்செடி 178 Rosemarinus
ன் 130 Valerian; வரியாத்து 198	Officinalis.
Rhubarb; வால்மிளகு 219 Cu-	ரோடென்சிகள் 298 Rodentia.
bebs; வேப்பம்பட்டை 62 Nim	ரோதக்கினி Deobstruent தடைநீக்கி.
bark.	ரோமப்பிராகந்திச்செடி 211 Brygan-
ரம்ப Rhombic சாசிக.	tia tomentosa.
ரம்பம் Rhomb or Rhombus சாசிகம்	லக்தசு Lactate;
ரம்னஸ்சாறு 65 Buckthorn Juice.	லக்தனாகசம் 135 Lactucarium லக்து
ரம்ன்ஸ்செடி 65 Rhamnus Cathar-	கவெசிரூத்து
ticus.	லக்தனாகப்பூடு 134 Lactuca. Virosa.
ரம்னியங்கள் 65 Rhamneae.	லபியாதியங்கள் 176 Labiatae.
ரனன்குலாசியங்கள் 9 Ranuncula-	லபுறதுரி Laboratory பக்குவசாலை,
oeae.	வேலையறை.
ரரசையம் 150 Rhazya Stricta.	லவந்தர்க்கூட்டி ரஞ்சம் 176 Com-
ராஸ்பெரி Raspberry ராஸ்பெரிப்	pound Tincture of Lavender.
பழம்.	லவந்தர்சீது 176 Spirit of Lavender.
ராளம் Resin 233 குங்கிலியம்.	லவந்தர்தேலம் 176 Lavender Oil.
ரீதி Rust கறை.	லவந்தர்பூடு 176 Lavender.
ரீயின் 197 Rheine.	
ருதாசியங்கள் 47 Rutaceae;	லாசெங்கு Lozenge வில்லை, லட்டுகம்.
ருபிவாஷன் Rubefacient சோணதி.	லாடனம் 25 Laudanum அவினிர்
ருமிசின் Rumicin.	ஞ்சம்
ருமினன்சிகள் 295 Ruminantia.	லாடன்கென் 291 Simple ointment.
	லாடு 297 Lard. கிடயம், பன்றிரெய்,
	அதெப்சு.
ருத்தேலம் 48 Rue Oil அறுதமெண்	லாவணசேடம் Saline Residue.
ணைய்.	லாறுசெருசிமரம் 92 Cherry Laurel.
ருபியாசியங்கள் 120 Rubiaceae;	லாறுசெருசி நீர் 93 Laurel water.
ருப்பூடு 47 Rue அறுதம்.	
ரேஸ்தொறதி Restorative.	லிக்னின் Lignin.
ரேக்கு Foil பத்திரம்.	லிதி 342 Lithia.
	லிதிகாபனசு 342 Carbonate of
	Lithia.

லிதி.	லிதி.
லித்திரைசு 343 Citrate of Lithia.	லேபல் Labels பேர்.
லித்திரைசு 343 Effervescing solution of Lithia.	லைகுபொடியம் Lycopodium.
லிதியம் 342 Lithium.	லைகெனிகள் 271 Lichenes.
லிந்து Lint சார்பி.	லைத்ருரியங்கள் 95 Lythrarieae.
லிலியாசியங்கள் 249 Liliaceae.	லைநீர் Lye சாம்பல்நீர்.
லிற்மசிரஞ்சம் Litmus Tincture.	லொகனியாசியங்கள் 154 Loganiaceae.
லிற்மசு 272 Litmus.	லொபீலி 139 Lobelia.
லிற்மஸ்பாசி Litmus; Orchella Weed.	லொபீலிநிகுதிப்பூடு 140 Lobelia Nicotianaefolia.
லினிமென் Liniment லேபனம்.	லொபிலப்பூடு 139 Lobelia Inflata.
லீச்சு Leech அட்டை, சலுகை.	லொபீலியாசியங்கள் 139 Lobeliaceae.
லீபிக்கனீகரணி Liebig's Condenser.	லொறந்தாசியங்கள் 119 Loranthaceae.
லீனக்கோட்டை 45 Linseed அலிசி விரை.	லொறூசியங்கள் 202 Lauraceae.
லீனத்தேலம் 45 Linseed Oil.	லோக Metallic மெதல.
லீனப்பிண்ணாக்கு Cake Meal.	லோகவடி Metallic Base.
லீனம் 45 Flax, Linum Usitatissimum.	லோஷன் Lotion தாவணி.
லீனியங்கள் 45 Lineae.	லோவுச்சீனி Loaf Sugar.
லுப்புலசு 226 Hop.	வ -oid வம், Eng. டி.
லுப்புலஸ்கொடி 226 Hop Plant.	வங்ககூட்டுச்சப்பாசிதுறி Compound lead Suppository.
லுப்புலின் 226 Lupuline.	வங்கஸ்கள் 270 Fungi.
லுப்புலீது 226 Lupulite.	வங்கசு Fungus ஆம்பி.
லெகுமினோசியங்கள் 70 Leguminosae.	வங்கம் Lead ஈயம், பிளம்பம்.
லெபக்ககசி 85 Acacia Lebbek.	வங்காளவேலம் Morung Elachi.
லெப்தண்டின் Leptandrin.	வங்காளமெரியாண்டப்பூடு 180 Meriandra Bengalensis.
லெமென் 51 சம்பம், பேரெலுமிச்சை, பெரியவெலுமிச்சை.	வசம்பு 261 Sweet Flag.
லெனிதிவு Lenitive.	வட்டதிரிப்பி Sida Acuta மலைதாங்கி, பொன்முசட்டை.
லேகியம் Confection; அவின் 26 of Opium; ஸ்கமுனி 165 Scammony;	வட்டலிகையத்தமரம் 146 Round Leaved Ash.
தர்ப்பந்தின் 232 Turpentine; நாயுரோசை 90 of Dog rose; நிலவாகை 75 of Senna; மிளகு 213 Pepper; ரோசை 89 of Rose.	வட்டலிகைச்சால்மரம் 128 Nauclea ovalifolia.
லேசகம் Minimum மினிமம்.	வட்டுக்கற்பாசி 273 Parmelia perlata.
லேபம் Ointment அன்கென்.	வண்டல் Sediment அடையல் மண்டி.

வண்.	கை.
வண்டுகொல்லி Cassia Alata, Ring Worm Shrub சீமையகத்தி.	வாலுளுவை 64 Celastrus Panicu- lata, அதிபரிச்சம்,
வண்டுக்காய் 42 Okra; Hibiscus Esculentus.	வாலுளுவைத்தேலம் 64 Oil of Celas- trus Paniculata
வத்தேக்கு 87 Sappan Wood வத் தாங்கி, வர்தங்கி.	வால்மிளகு 218 Cubebs, வாழை 245 Plantain.
வமனி 451 Emetic வாந்திக்குமரு ந்து.	வாற்கோதுமை 266 Barley, Hor- deum Distichon.
வமன்றூசம் Fomentation உஷ்மதம்.	விசேஷகிருவிதம் Specific Gravity.
வமி Vomit.	விஸ்கி Whiskey.
வம்பு Bastard போலி.	விஷமூங்கில் 246 Crinum Asiati- cum.
வரியாத்து 197 Rhubarb, இரேவற் சின்னி, மஞ்சட்சீனக்கிழங்கு.	விஷ்ணுகிராந்தி Evolvulus Alsi- noides.
வருணக்கினி Decolorizing Agent.	விடுகோல் Guiding Rod.
வலீரியந்தேல் 129 Oil of Valerian.	வித்திரல் Vitriol ஆடிவம்.
வலீரியன்பூடு 129 Valerian.	விபகலனம் Decomposition.
வலீரியானியங்கள் 129 Valerianeae.	வியுத்தகரணம் Reduction process.
வல்கன Volcanic அக்கினிமலைக்குரிய	வியுத்தவயம் 372 Reduced Iron.
வல்கனிற்று Vulcanite வைரக்கூச்சு.	வியுத்தவயவில்லை 373 Reduced Iron Lozenges.
வல்லாரை 117 Asiatic Hydroco- tyle, Indian Pennywort.	விரனூரி Costus Arabicus கோஷ்ட ம்.
வறு Dried வறுத்த.	விரவு Mixture மிஸ்தூர், மிசிரம், கல வை.
வறுத்தசோடகாபனசு 333 Dried Carbonate of Soda.	விருட்சம் Arbor, Tree மரம்.
வன்சபு 145 Hard Soap நட்டிச்சவு க்காரம்.	வினேசனி 455 Purgative பேதி.
வாகட Officinal வாகடமுறையான.	விலயன Soluble திராவிய, கரையக் கூடிய.
வாஷ்பம் Vapor வேப்பர்.	விலயனம் Solution நீர், நீரம், சொ லூதம்.
வாணிசு Varnish.	விலயனி Menstruum, Solvent மெ ன்ஸ்தூறம்.
வாசனையொய்யம் 41 Hopea odora- ta.	விலுயிரம் Fluidum, Fluid.
வாசனையகிரீயமரம் 157 Fagrea Fragrans.	வில்பெட்கொட்டை Filbert.
வாதுமை 91 Almond.	வில்லைகள் Lozenges; அவின் 26 of Opium; இபிகாக்கு 127 Ipecac; கா சுக்கட்டி 127 Catechu; சோடது விகாபனசு 355 Bicarbonate of Soda; தனிக்கமில் 224 Tannic Acid; மாவிய 27 Morphia; மாவி ய இபிகாக்கு 27 Morphia and Ipecac.
வாதுமைக்கலவை 92 Almond mix- ture.	
வாதுமைக்கூட்டுச்சூரணம் 92 Com- pound Powder of Almonds.	
வாபீதிசின் 167 Pharbitisin ஜூகி ராளம்.	
வாயுஸ்தோவு Gas Stove.	
வாயுத்திரி Gas Burner.	
வாயுவடுப்பு Gas Furnace.	

வொ.	குவ.
வில்வமரம் 54 Bael Tree பில்வம்.	வெல்லம் Coarse Sugar பருக்கன் சீ
விளாத்தி 56 Wood Apple Tree.	னி, அசுத்த சர்க்கரை, பனங்கட்டி.
விளாம்பழம் Wood Apple.	வெள்ளலரி 149 Yellow Oleander.
விளாம்பிசின் 56 Wood Apple Gum.	வெள்ளறுகு 161 Cicendia hyssopi-
விருத்தி 258 Veratria.	folia.
விற்காரி 353 Phitkari, பதாசிச் சீன	வெள்ளி 394 Silver.
க்காரம்.	வெள்ளிநீதுரசு 395 Nitrate of Sil-
	ver, காடிக்காரம்.
வீபர் Fibre, Fiber இழை.	வெள்ளியக்கலசு Oxalate of Silver.
வீலிசிகள் 270 Filices.	வெள்ளியக்கிரம் 396 Oxide of Sil-
வீறகனீதம் 11 Aconitum Ferox,	ver.
நாவி.	வெள்ளியந்திமனீரம் Antimonide
	of Silver.
வூச்சி Bougie.	வெள்ளியமோனநீதுரசு Ammonio-
	Nitrate of Silver.
வெங்காயம் Onion.	வெள்ளியாசெனசு Arseniate of
வெசிகன் Vesicant கொப்புளிக்கு ம	Silver.
ருந்து, விஸ்போடி.	வெள்ளைக்குன்றிகநெய் 41 Piney
வெசிகாசன் Vesication கொப்புளி	Tallow.
த்தல்.	வெள்ளைஜிரிகிவிரை Pharbitis Nil
வெச்சுட்பலகம் Wedgewood Tile.	Ruber.
வெடிப்பஞ்சு 41 Gun Cotton.	வெள்ளைடாமர் 41 Piney Dammar,
வெட்பாலரிசி Wrightia Tinctoria	White Dammar.
வெட்பாலவிரை.	வெள்ளைப்பிலாஞ்சி Fluggea Leuco-
வெண்கடுரோணிப்பூடு White Hel-	pyrus.
lebores.	வெள்ளைமருதமரம் Terminalia Gla-
வெண்கனலம் 33 Canella Alba.	bra.
வெண்சின்கனப்பட்டை 123 Pale	வெள்வேல் 85 Acacia Leucophlaea.
Cinchona Bark.	வெற்றிலை 220 Betel Leaf, Piper
வெண்டுத்தம் 366 Sulphate of Zinc.	Betel.
வெண்டைக்காய் Abelmoschus Es-	வெனெல் Fennel Fruit பெருஞ்சீர
culentus.	கம்.
வெண்ணைச்சி 174 Vitex Negundo	வேங்கைமரம் 78 Indian Kino Tree.
நொச்சி.	வேசிதம் Seton சீத்தன்.
வெண்மாபிள் White Marble.	வேண்பூடு Fern.
வெதுநீர் Warm Water.	வேப்பர் Vapor வாஷ்பம்.
வெந்தயம் Fenugreek, Trigonella	வேப்பங்கள்ளு Margosa Toddy.
Foeniculum Graecum.	வேமன்றசும் Fermentation நொதி.
வெபுவரியாத்து 199 Rheum Web-	வேமிவுச்சு Vermifuge இருமிகொல்
bianum.	லி, குணுகினி.
வெம்பற்று 289 Warm Plaster கன	வேம்பு 61 Margosa.
ற்றும் பிலாஸ்தர்.	வேர்க்கடலை 92 Ground Nut நிலக்
வெர்சுசு Verjuice.	கடலை.
வெர்பினாசியங்கள் 174 Verbenaceae.	வேலம்பிசின் 85 Gum Arabic.

வே.	வாத.
வேலிப்பருத்தி 153 Daemia Ex- tensa உத்தாமணி.	வைதுலக்கின் Phytolaccin.
வேவர் Wafer.	வையல் Vial குப்பி.
வேளை 32 Gynandropsis Penta- phylla.	வைன் Wine.
வைசுதிக்மகொடி 80 Physostigma Venenosum.	வைன்கள் Wines; அந்திமணி 359 Antimony; அவின் 25 Opium;
வைசுதிக்ம கொட்டை 80 Calabar Bean.	இபிகாக்கு 126 Ipecac; கினிய 122 Quinine; கொல்சிக 256 Colchi- cum; சகை 250 Aloes; செரி 275 Sherry; வரியாத்து 198 Rhubarb.
வைதுலக்காசியங்கள் 195 Phytolac- caceae.	வொதலை 71 Catechu Acacia வோ தளம்.

INDEX AND VOCABULARY.

—(*)—

ABB

Abbreviation சுருக்கம், குறுக்கம்.
 “ in Formulae :—
 R. *recipe*, take கொள்.
 A. A. *ana*, of each வகைக்கு.
 Ad. or Add. *adde* or *addatur* கூட்டலாம்.
 Ad. Lib. *ad libitum*, at pleasure விரும்பியபடி.
 Altern. Hor. *alternis horis*, every other hour இரண்டு மணித்தி யாலத்துக்கொருமுறை.
 Aq. *aqua*, water தண்ணீர்.
 B. A. *balneum arenae*, a sand-bath மணல் மத்திகை.
 Bals. *balsamum*, balsam. பல்சம்.
 Bib. *bibe*, drink குடி.
 Bis. Ind. *bis indies*, twice daily நாளுக்கு இரண்டுமுறை.
 C. *congius*, a gallon. கலன்.
 Cap. *capiat*, let him take உண்ணலாம்.
 Cochl. *cochleare*, a spoonful ஓர் கரண்டி.
 Comp. *compositus*, compound கூட்டு.
 Crast. *crastinus*, for to-morrow நாளைக்கு.
 D. *dosis*, a dose தேயம்.
 Dep. *depuratus*, purified சுத்தமாக்கிய.
 Dest. *destilla*, distill ஆசுதி.
 Det. *detur*, let it be given. கொடுக்கட்டும்.
 Div. *divide*, divide பகிர்.
 Drach. *drachma*, a drachm திரும்.
 Ejusd. *ejusdem*, of the same அதிநுன்.
 Enem. *enema*, a clyster எனீம்ம்

ABB

Abbreviation in Formulae :—
 F. *fiat*, let it be made செய் யட்டும்.
 Fl. *fluidus*, fluid நீர்.
 Gr. *granum*, a grain கிரேன்.
 Gt. *gutta*, a drop துளி.
 H. S. *hora somni*, at bed time நித்திரைவேளை.
 Lb. and Lib. *libra*, a pound weight இருத்தல்.
 Liq. *liquor* நீரம்.
 M. *misce*, mix கல.
 Min. *minimum*, minim மினிம்.
 O. *octarius*, a pint பைன்று.
 Ol. *oleum*, oil தேலம்.
 Oz. *uncia*, an ounce அன்சு.
 Pil. *pilula*, a pill குளிகை.
 P. R. N. *pro re nata*, as occasion requires தேவைக்குத்தக்க.
 Pulv. *pulvis*, a powder சரை.
 Q. S. *quantum sufficit*, as much as is sufficient வேண்டிய அளவு.
 S. *signa*, write or give directions குறிக்கவும்.
 Sing. *singulorum*, of each ஒவ்வொன்றிலும்.
 Solve. *dissolve* கரை.
 Ss. *semi*, one half அரைவாசி.
 Trit. *tritura*, triturate அரைக்கவும். டைக்காய்.
 Abielmoschus Esculentus, வெண் “ *Moschatus* கஸ்தூரி வெண்டைக்காய் விரை, காட்டுக்கஸ்தூரி.
 Abies-Balsamea, Balm of Gilead fir, “ *Excelsa*, Spruce fir.
 Abieties Resina, Burgundy pitch.
 Abortive அசனாதம்.
 Abri Radix, Indian liquorice root.

ABB	ACT
Abrus 82 குன்றிமணி.	Acid Tartrate of Potash 328 பதா சியமிலதாத்தரசு, திராட்சவு ப்பு.
Abrus Precatorius, Indian li- quorice root.	Acidified அமிலித்த, புளித்த.
Absolute கேவல, தனி, சுத்த.	Acidity அம்லமை, அமிலத்தன்மை, புளிப்பு.
Absorbent medicine அப்சாபென், அமிலக்கினம். [துத்தி.	Acidum, acid.
Abutilon Indicum துத்தி, பெருந்	" Aceticum, Acetic acid.
Acacia Amara 85 கைப்பகசி.	" Arseniosum, Arsenious acid
" Arabica 85 Babool tree.	" Benzoicum, Benzoic acid.
" Catechu, 71 Catechu Acacia.	" Carboicum, Carboic acid.
" Concinna சீயக்காய், சீகைக் காய், சீகா.	" Citricum, Citric acid.
" Farnesiana 85 பிய்வேல்.	" Gallicum, Gallic acid.
" Ferruginea 85 சீமைவெள்வேல்	" Hydrochloricum, Hydro- chloric acid.
" Lebbek, 85 லெபக்ககசி.	" Hydrocyanicum dilutum, Di- luted Hydrocyanic acid.
" Leucophylaea 85 வெள்வேல்.	" Nitricum, Nitric acid.
" Speciosa காட்டுவாகை.	" Nitro-Hydrochloricum dilu- tum, Diluted Nitro-Hydro- chloric acid.
" Vera 70 அகசிப்பிசின்மரம்.	Acidum Phosphoricum dilutum, Diluted Phosphoric acid.
Acaciae Gummi, Gum acacia.	" Prussicum, Prussic acid.
Acalypha Indica 217 குப்பைமேனி.	" Pyroligneum, Pyroligne- ous acid.
Acanthasia, 172 அகந்தாசியங்கள்.	" Sulphuricum, Sulphuric acid
Aceta காடிவகை.	" Sulphurosum, Sulphurous acid.
Acetate அசிதசு.	" Tannicum, Tannic acid.
" of copper செம்பசிதசு.	" Tartaricum, Tartaric acid.
" of iron அயவசிதசு.	Acipensea Huso, Sturgeon.
" of lead 369 ஈயவசிதசு.	Aconite leaves 9 அகனிதவிலை, " root 9 அகனிதக்கிழங்கு.
" of morphia மாவியவசிதசு.	Aconitia 10 அகனிதசம்.
" of potash 329 பதாசியசிதசு.	Aconitum Jadvar.
" of soda 340 சோடவசிதசு.	" Ferox, 11 Bikh.
" of zinc 364 துத்தவசிதசு.	" Heterophyllum, 11 Atis.
Acetic acid 282 அசிதிக்கமிலம்.	" Luridum, Bikh.
" ether அசிதிக்கீதர்.	" Napellus 9 Bikh.
Aceticum, Acetic.	" Palmatum, Bikh.
Aceto arsenite of copper செம்டசி தாசெனிசு.	Acorus Calamus, Sweet flag.
Acetum, Vinegar. •	Acrið கார்ப்பான அமுலான,
" Britannicum சீமைக்காடி.	Actaea Racemosa, Cimicifuga.
" Cantharidis V. of cantharides	Active principle சத்து.
" Scillae, Vinegar of squill.	
Achyranthes Aspera 196 நாயுருவி.	
Acicular குகிவ.	
Acid அமிலம்.	
" reaction அமில பிரதிகாரம்.	
" solution of Nitrate of Mer- cury 393 இரசநீ துரசமிலநீர்,	

ACT

Actual Cautery சுடுகோல், தகம்.
 Adansonia Digitata 44 பப்பரப்பு
 ளி, ஆணைப்புளி, பூரிமரம்.
 Adapter அடத்து, இணக்கு,
 " for Displacement திஸ்பிலேச
 வடத்து.
 Adenema Hyssopifolia 161 வெள்
 ளறுகு.
 Adeps, Lard.
 " Benzoatus, Benzoated Lard.
 " Myristicae, Expressed oil of
 nutmeg, சிட்ரெய்.
 " Praeparatus, Prepared Lard.
 Adhatoda Justicia 173 ஆடாதோ
 டை.
 Adhesion அடசம். ஒட்டு, பற்று.
 Adhesive plaster ஒட்டுப்பற்று, அட
 சப்பிலாஸ்தர்.
 Adjunct அடை.
 Ægle Marmelos, Bael fruit.
 Æther, Ether.
 Æther Sulphuricus, Sulphuric
 Ether. [சம்.
 Affusion நிசேகம், சொரிதல், அலு
 Agati Grandiflora 86 அகத்தி.
 Agave Americana 247 ஆணைக்கற்
 றுளை.
 Agent காரி.
 Ailanthus Excelsa 58 சவுக்குமரம்
 " Malabaricus பெருமரம்.
 " " Resinous.
 Juice of 58 மட்டிப்பால்.
 Air bladder of Fish மீன்மிதப்பு.
 Ajmud 109 அசமதாகவிரை.
 Ajowan, Ajwain.
 Ajwain Fruit 109 ஒமக்கினி, ஒம
 விரை.
 " Plant, Omam.
 Alangium Decapetalum அழிஞ்
 சிமரம்.
 " Hexapetalum கறுப்பழிஞ்சி ம
 ரம்.
 Albus-a-um, White.
 Albumen Ovi, Egg albumen.
 Alchemist இரசவாதி.

ALP

Alcohol 276 அலக்கால்.
 " Amylicum, Amylic Alcohol.
 " Blast Lamp அலக்கால் வீச்
 சுவிலக்கு.
 Alcoholic Extract அலக்காலெக்ட்ர
 த்து.
 Ale ஏய்ல்.
 Aleuritis Triloba, 215 நாட்டக்
 ரோடு. Belgaum Walnut.
 Alexandrian Laurel 39 புன்னைம
 ரம், புன்னாகம்.
 " Senna சூரத்து நிலாவரை, சீ
 மைநிலாவரை, அலுக்காந்திர
 நிலவாகை.
 Algae 273 அல்கங்கள்.
 Alhagi Maurorum 89 அல்காகிம
 ரோரச்செடி இது Turanjbin
 எனப்படும் ஓர்வகை மன்னா
 பொசியும்வடக்கிந்துச்செடி.
 Allium Cepa, Onion.
 " Sativum, Garlic.
 Alloy அலோய் கலவைலோகம்.
 Alkali அல்கலை சருச்சி.
 Allspice, Pimento.
 Almond 91 வாதுமை.
 " Bitter 91 கைப்புவாதுமை.
 " Sweet 91 தேனீவாதுமை.
 Alocasia Montana 262 மலையலுக்கா
 சிப்பூடு.
 Aloe, Aloes.
 " Barbadosis, 251 Barbadoes
 aloes.
 " Indica 254 கற்றாழை, சோற்
 துக்கற்றாழை, குமரி.
 " Litoralis 254 சிறுகற்றாழை.
 " Socotrina, 249 Socotrine
 aloes.
 Aloes 249 கரியபோளம், சகை, இ
 ரத்தப்போளம்.
 Aloine 249 அலுவின்.
 Alpan, Bragartia Wallichii.
 Alpam 211 அல்பம்.
 Alpinia Chinensis, Lesser Galan-
 gal.
 " Galanga, Greater Galangal.

ALP	ANA
Alpinia Nutans 244 அசைவல்பீனியப்பூடு.	Ammonia Phosphas, Phosphate of ammonia.
Alstonia Scholaris 147 ஏழிகைப்பாலை	" Sesquicarbonas, Carbonate of Ammonia.
" Bark 147 ஏழிகைப்பாலைப் பட்டை.	Ammoniated Copper செம்பமோனகம்.
Alstoniae Cortex, Alstonia bark.	" Mercury 392 இரசவமோனகம்.
Alteratives 441 அல்திறவம், பரிணாமி.	" Tincture of Guaiacum 47 குவயகவமோனரஞ்சம்.
Alterative tonics 441 அல்திறவதொணிகம்.	Ammonii Bromidum, Bromide of Ammonium.
Alum 352 சீனக்காரம், அலும், பழகாரம்.	" Chloridum, Chloride of Ammonium.
" earth of Nepal, Salajet.	" Iodidum, Iodide of Ammonium.
Alumen, Alum.	Ammonio-Nitrate of Silver வெள்ளியமோனநீதுரசு.
Aluminium 352 அலுமினியம்.	" Sulphate of Magnesia மக்னீசியமோன சல்வசு.
Alumicium Aluminium.	Ammonium அமோனதம்.
Amadou அமரு, காளான் பஞ்சு.	Ammoniuret of Copper, Ammoniated Copper.
Amalgam இரசகலவை, அமல்கம்.	Amomum, Cardamom.
Amara, Bitter கசப்பு, கைப்பு.	" Aromaticum, Cardamom.
Amarantaceae 195 அமரந்தாசியங்கள்.	" Xanthoides 245 மலாயு ஏலம்.
Amarantus Spinosus 195 முள்ளுக்கீரை, முட்டீரை.	Amorphous அமாவ, அருப, மாவான.
Amaryllidaceae 246 அமரிலிடாசியங்கள்.	Ampelideae 65 அம்பெலிடியங்கள்.
Amber அம்பர், கர்ப்பூரமணி.	Amygdala Amara, Bitter Almond
Anacardic acid. அனகாடிக்கமிலம்.	" Duleis, Sweet Almond.
American Sumach 87 சூமக்கு.	Amyl அமைல்.
Ambaldi, Mango Ginger.	Amylic Alcohol அமைலிக்கலக்கால்.
Amla, Emblic Myrobalans.	Amylum, 266 Starch அமைலம்.
Ammannia Vesicatoria 96 கல்லுருவி, நீருமேல்நெருப்பு.	Anacardiaceae 67 அனகாடியாசியங்கள்.
Ammonia 313 அமோனம்.	Anacardium Occidentale, Cashew nut
Ammoniac, Ammoniacum.	Anacyclus Pyrethrum, Pellitory of Spain.
Ammoniacum 115 அமுனியகம், கமநாயகம்.	Anaesthetic அனெஸ்தீசி, விசஞ்ஞதி
Ammoniae Benzoas, Benzoate of Ammonia.	Analysis விபேதனம், அனாலிசு.
" Carbonas, Carbonate of Ammonia.	Analyst அனாலிசர், விபேதனி.
" Citras, Citrate of Ammonia.	Anamirta Cocculus, Cocculus Indicus,
Ammoniae Hydrochloras, Chloride of Ammonium.	Ananas Sativus, Pine Apple.
" Murias, Chloride of Ammonium.	Anarcotize, Narcotine.

AND	ANT
Anderjow 149 (H) குளப்பானை வி ரை.	Annual Plant ஆட்டைப்பூடு, அனு வல்.
Andrographis Echioides கோபுரந் தாங்கி.	Anodyne அனுடைன், உபசமனி.
“ Paniculata, Kariyat. (not Chiretta.)	Antacid அபாமிலி.
Andropogon Citratus, 268 Lemon Grass.	Anthelmintic 442 அந்தெல்மிந்தி, கிருமிகொல்லி.
“ Martini, 268 Citronelle.	Anthemidis Flores, Chamomile Flowers.
“ Muricatus, Khus-Khus Grass 269.	Anthemis Nobilis அந்திமிஸ்பூடு.
“ Nardus, 268 Citronelle.	Antiaris Saccidora 229 நெட்டாவி ல்மரம்.
“ Paenodes, 268 மொக்கிலாமி ச்சைப்புல்.	Antidote மாற்றுமருந்து.
“ Schoenanthus, 268 Lemon Grass.	Antidotes to Snake bites 443 பா ம்புகடிக்குமாற்றுமருந்துகள்
Anethi Fructus, Dill Fruit.	Antilax பேதிக்கினி.
Anethum Graveolens, Common Dill Plant, சதகுப்பி, சோயி க்கிரை.	Antimonetted Hydrogen ஐருதவ ந்திமனெற்று.
Anethum Sowa, Indian Dill 111 சதகுப்பி.	Antimonial Powder 357 அந்திமனி பற்பம்.
Angustura Bark, Cusparia.	“ Wine 359 அந்திமனிலைவன்.
Anhydrous அநீர, அவைரு.	Antimonide of Silver வெள்ளியந் திமனிரம்.
Anhydrous Sulphate of Copper அநீரதுருசி.	Antimonii Oxidum, Oxide of An- timony.
Animal Charcoal என்புக்கரி, ஏண க்கரி.	“ Chloridum, Chloride of An- timony.
Animal materia medica 286 பிரா ணியபதார்த்தசாரம்.	“ Oxy-sulphuretum, Sulphura- ted Antimony.
Anise 110 அனிசு, அனீசு, சோம்பு.	“ Potassio-Tartras, Tartarated Antimony.
Aniseed, Anise.	“ Sulphuretum Aureum, Sul- phurated Antimony.
Anisochilus Carnosus 180 கர்ப்பூர வள்ளி.	“ S. Praecipitatum, Sulphu- rated Antimony.
Anisodus Luridus, Scopolia Lurida.	Antimonium, Antimony.
Anisomeles Malabarica, Malabar Catmint 179 பேய்மருட்டி.	“ Nigrum, Black Antimony.
“ Ovata, 179 அனிசுமெலிசோ வாதப் பூடு.	“ Sulphuratum, Sulphurated Antimony.
Anisum, Anise.	“ Tartaratum, Tartarated An- timony.
Aniline அனிலின்.	“ Tartarizatum, Tartarated Antimony.
Anjudan, (H) இங்குக்கனி.	Antimony 356 அந்திமனி.
Annelida 286 அனெலிடங்கள்.	Antiperiodics 442 அந்திபிரூடி, சா மயிகாரி.

ANT	ARO
Antiphlogistic அந்திவிலோசிஸ்த, தாபக்கின, தாபக்கினி.	Aqua Sambuci, Elder Flower Water.
Antiscorbutics ஸ்கேவிக்கினி.	Aquatic அக்குவத்தி, நீர்வாழும்.
Antiseptic அந்திசெப்தி, பூதிக்கினம்	Aqueous Extract சலவெசிரூத்து.
Antispasmodics அந்திஸ்பசி, கருஷ்க்கினம்.	“ Vapor நீராவி.
Aperient இளம்பேதி, சுகபேதி, அபீரியம்.	Arachis Hypogaea, Ground Nut.
Aphrodisiac காமகர, வாசீகர.	Araliaceae 118 அரலியாசியங்கள்.
Apis, Honey Bee.	Arbor, Tree. மரம், விருட்சம்.
Apium Involucratum, Carum Roxburghianum.	Arctostaphylos Uva Ursi, Bear Berry.
Aplotaxis Auriculata, 138 கோஷ்டம்.	Areca Catechu, Betel Nut 261 பாக்கு.
Apocynae 147 அபாசனியங்கள்.	“ Palm 261 கமுகு.
Apothecary சிகிச்சன், அபாதிக்கன்.	Argand Burner ஆர்கன்டிரி.
Apparatus உபகரணம், அணியம், அபரூத்து.	Argemone Mexicana 29 பிரமதண்டு, குருக்கஞ்செடி.
Appendix 405 அனுபந்தம்.	Argenti Nitras, Nitrate of Silver.
Apple அப்பில், அப்பில்பழம்.	Argenti Oxidum, Oxide of Silver.
Apricot அப்பிறிகட்டு, அப்பிறிகப்பழம்.	Argentum, Silver.
Aqua, Water அக்குவம்.	“ Purificatum, Refined Silver.
“ Ammoniae Solution of Ammonia.	Argyrea Speciosa 168 சமுத்திரப் பச்சை, கடற்பாலை.
“ Anethi, Dill Water.	Aristolochia Bracteata 211 ஆடுதிண்ணாப்பாலை.
“ Aurantii Floris, Orange-Flower Water.	“ Indica 210 ஈசுரமூலி, பெருமருந்து, பெருங்கிழங்கு.
“ Calcis, Solution of Lime.	“ Serpentaria 209 சேபந்தாரி.
“ Curui, Caraway Water.	Aristolochiaceae 209 அரிஸ்துலோசியசியங்கள்.
“ Destillata, Distilled Water.	Armenian Bole அர்மேனிக்காவி, சீமைக்காவி.
“ Lithiae Effervescens, Effervescing Solution of Lithia.	Armoraciae Radix, Horseradish Root.
“ Menthae Piperitae, Peppermint Water.	Arnica Montana 133 ஆணிகபூடு.
“ Menthae Viridis, Spearmint Water.	Arnica Root 133 ஆணிகவேர்.
“ Naphae, Orange-Flower Water.	Arnicae Radix, Arnica Root.
“ Picis, Tar Water.	Arnicine, ஆணிகின்.
“ Potassae Effervescens, Effervescing Solution of Potash.	Aroideae அறுவிடியங்கள்.
“ Ptychotis, Omam Water.	Aromatic சுகந்த.
“ Regia, Nitro-Hydrochloric Acid.	Aromatic Mixture of Iron 384 அயசுகந்தமிஸ்தூர்.
	Aromatic Powder of Chalk 347 கிரீதச்சுகந்தபற்பம்.
	Aromatic Powder of Chalk and Opium 347 கிரீதவலின்சுகந்தபற்பம்.

ARO	AVO
Aromatic Sulphuric Acid 306 சுகந்த சல்வுரிக்கமிலம்.	Asclepias Curassavica 153 அஸ்கிலீபிக்குறசாவிகப்பூடு. called in the West Indies, Wild Ipecac.
Aromaticus-a-um, Aromatic.	Ash Manna 147 அஷ்மன்னா.
Arrack சாராயம்.	Ash Tree 146 அஷ்மரம்.
Arrow Root குவா, அரோட்டுக்கிழங்கு.	Asiatic Hydrocotyle 117 வல்லாரை
Arseniate of Iron 381 அயவாசெனசு.	Asparagus Ascendens 255 அஸ்பர. கச்சென்றெஸ் பூடு, ஏறவரி.
“ Soda 339 சோடவாசெனசு.	“ Racemosus 255 தண்ணீர்முட்டான்கிழங்கு, சதாவரி.
“ of Silver வெள்ளியாசெனசு.	“ Sarmentosus 255 தண்ணீர்விட்டான்கிழங்கு, கிளவரி.
Arsenic 353 ஆசெனிகம், பாஷாணம்.	Aspidium Filix Mas, Male Shield Fern.
Arsenical Caustic Powder ஆசெனிககாரப்பொடி.	Assafoetida 112 இங்கு, பெருங்காயம் கசாயம்.
Arsenical Paste ஆசெனிகப்பசை.	Ass' Milk கழுதைப்பால்.
Arsenical Solution 355 ஆசெனிகநீர்.	Asteracantha Longifolia நீர்முள்ளி, Same as Hygrophilia Spinosa
Arsenici Iodidum, Iodide of Arsenic.	Astragalus Verus, Tragacanth Shrub.
Arsenicum, Arsenic 353 பாஷாணம்	Astringent 445 கயர், துவர்.
Arsenicum Bisulphuratum, Bisulphuret of Arsenic.	Astringent Tonics 461 துவர்த்தொணிகங்கள்.
“ Tersulphuratum, Yellow Sulphuret of Arsenic.	Ata.-ated க.
Arsenious Acid. 354 ஆசெனோசமிலம், வெள்ளைப்பாஷாணம்.	Atis 11 அதிவிடயம்.
Arsenite ஆசெனிகசு.	Atropa Belladonna 182 அத்திரோபபெலடனப்பூடு.
Arsenite of Soda 339 சோடவாசெனிகசு.	Atropia 184 அத்திரோபியம்.
Arsenitted Hydrogen ஐருதவாசெனெற்று.	Atropiae Sulphas, Sulphate, of Atropia.
Artapotrys Odoratissima மனோஞ்சிதம்.	Atropine, Atropia.
Artanthe Elongata, Matico Plant மதிகபூடு.	Attar of Roses, 90 Oil of Rose.
Artemisia 132 சந்துனின்பூடு. [ரி.	Aucklandia Costus, Aplotaxis Auriculata.
Artemisia Vulgaris அதெம்சிவலகா	Aurantiaceae 50 ஒறந்தியசியங்கள்.
“ Indica 136 மாசிபத்திரி.	Aurantii Cortex, Bitter-Orange Peel.
Artificial செயற்கை, கிருத்திம.	“ Flores, Orange Flowers.
As-ate அசு.	Auxiliary துணை, உப.
Asagraea Officinalis, Cevadilla Plant.	Averrhoa Bilimbi, Bilimbi Tree.
Asclepedin, the Active principle of Pleurisy Root அஸ்கிலீபிரின்.	“ Carambola தமர்த்தை, தமர்த்தங்காய்.
Asclepiadeae 151 அஸ்கிலீபியரிடங்கள்.	Avoirdupois Weight அவுடுபாநிறை.

AXC	BEL
Axungia , Lard.	Baptisin , the Active principle of Wild Indigo பப்திசின்.
Azadirachtae Cortex , Margosa Bark.	Bara mai , Tamarix Gall.
“ Folia , Margosa Leaves.	Barbadoes Aloes , 251 பபாடுசகை.
Azadirachta Indica , Margosa.	Barilla 195 பரில்லம்.
Azote , Nitrogen.	Barium பாரியம்.
	Bark , Cortex பட்டை.
	“ Inner சீரை, மரவுரி.
Babool tree 85 கருவேல்மரம்.	Barley 266 வாற்கோதுமை, பாளியரிசி.
Bacon பேகுன், பன்றியிறைச்சி வற்றல்.	“ Pearl பாளிமுத்து.
Bael 54 வில்வம், பில்வம்.	“ Barosma Betulina , Buchu.
“ Fruit 54 வில்வம்பழம்.	“ Crenulata , Buchu.
Bahurai (B), Sebestens.	“ Serratifolia , Buchu.
Baia Spirit , S. of <i>Bassia Latifolia</i> Flowers.	Borosmae Folia , Buchu Leaves.
Bakas (H) <i>Justicia Adhatoda</i> .	Baryta பாரிதம்.
Balanites Aegyptiaca நஞ்சுண்டான்.	Barytic Test பாரிதச்சோதனை.
Baliospermum Montanum , <i>Croton Roxburghii</i> .	Basis or Base ஆதாரம், தாரகம், அடி.
Balm of Gilead , Canada Balsam, Mecca Balsam.	Bassia Butyracea , Fulwa Tree.
“ of Gilead Fir 230 கனடபல்சமரம்.	“ Latifolia 141 காட்டிலுப்பை, காட்டிருப்பை.
Balneum Alkalinum , Alkaline Bath.	“ Longifolia , Mahwa Tree 141 இலுப்பை.
Balsam பல்சம்.	Bastard வம்பு, போலி.
Balsamodendron Agallocha , <i>Bdelium</i> .	Bastard Sago Tree 260 கூந்தற்பனை
Balsamodendron Mukul 61 முகுலக்குக்குலுமரம்.	Bath , ablution தோயம், heating medium மத்திகம்.
“ Myrrha , Myrrh Tree சசமரம்.	Bdellium 61 குக்குலு, மைசாஷி.
B. Bulscens 61 சுணைக்குக்குலுமரம்.	Bearberry Leaves 140 யூவஜூர்சியினை.
Balsamum , Balsam பல்சம்.	“ Shrub 140 யூவஜூர்சிச்செடி.
“ Peruvianum , Balsam of Peru.	Beaver 298 பீவர், நீர்நாய்.
“ Tolutanum , Balsam of Tolu.	Bebeeru Bark 205 நெத்தண்டபட்டை, பிபேரிப்பட்டை.
Bamboo , Bambu.	Beberiae Sulphaus , Sulphate of Beberia.
Bambu 269 மூங்கில்.	Beberu Bark , Bebeeru Bark.
“ Mushroom , Polyporus Anthelminticus.	Bed-i-musk , (H) <i>Salax Caprea</i> .
Bambusa Arundinacea , Tabashir. 269.	Boe தேனி.
Banana 245 வாழை.	Beef பீவு, மாட்டிறைச்சி.
Bang (H) கஞ்சாவிலையும் காயும்.	“ Tea பீவ்குடிநீர்.
Banyan Tree 228 ஆல்.	Beer 275 பீர்.
	Beer Yeast 275 பீர் யீஸ்து, நொதி, மண்டம்.
	Bela , Bael Tree வில்வமரம்.
	Belae Fructus , Bael Fruit.

BEL	BIT
Belgaum Walnut 215 நாட்டக்ரோடு, Aleurites Triloba.	Bi, Deut துவி,
Belladonna Leaves 182 பெலடனவிலை.	Biborate of Soda 335 சோடதுவிபோரசு,
“ Root 183 பெலடனவேர்.	Bibulous Paper உறிஞ்சுந்தாள்.
“ Folia, Belladonna Leaves.	Bicarbonate of Potash 322 பதாசிதுவிகாபனசு.
“ Radix, Belladonna Root.	“ of Soda 334 சோடதுவிகாபனசு.
Belleric Myrobalans Tree 97 தான்றிமரம்.	Bichromate of Potash பதாசிதுவிசுரோமசு.
Bengal Gram 88 கடலை.	Biennial Plant ஈராட்டைப்பூடு.
“ G. Vinegar 89 கடலைநீர், கடலைப்புளிப்பு.	Bignoniaceae 161 பிக்னோனியாசியங்கள்.
“ Kino Tree 91 முருக்கமரம், பலாசம்.	Bignonia Xylocarpa 161 கூர்சிந்மரம்.
“ Quince, Bael Fruit.	Bikh 11 நாவி, வசநாவி.
Benne Leaves சீமையெள்ளிலை.	Bile பித்தம், பித்தநீர்.
Benzoate of Ammonia 317 அமோனபெஞ்சோவசு.	Biliary calculus of Oxகோரோசனை
Benzoated Lard 143 பெஞ்சோயஸ்லாடு.	Bilimbi Tree கொச்சித்தமர்த்தை, புளிச்சக்காய்.
Benzoic Acid 144 பேஞ்சோயிக்கமிலம், சாம்பிராணிப்பூ.	Bindal, (H) Luffa Amara.
Benzoin 143 சாம்பிராணி, பெஞ்சோயின்.	Birds, Aves 294 பட்சிகள்.
Benzoinum, Benzoin.	Birjee, (H). An exudation of Pinus Longifolia.
Benzoli 397 பெஞ்சோல்.	Bish, Pikh.
Berberideae 18 பேபெரிடியங்கள்.	Bislumbhi, (H). Cucumis Trigonus.
Berberina பெர்பெரினம்.	Bismuth 359 பிஸ்முதம்.
Berberine பெர்பெரின்.	Bismuthi Carbonas, Carbonate of Bismuth 361.
Berberis Aristata, Indian Barberry	“ Nitras, Subnitrate of Bismuth.
“ Asiatica, Indian Barberry.	“ Subnitras, Subnitrate of Bismuth 361.
“ Lycium, Indian Barberry.	Bismuthum, Bismuth 359.
Bergera Konigii, Murraya Konigii Berry பெரி, சிறு காய்கனி.	“ Album, Subnitrate of Bismuth.
Berthelotia Lanceolata 136 கூரிலைப்பெர்துலோசம்.	Bit-Loban, (H). Black Salt.
Betel Leaf 220 வெற்றிலை.	Bisulphuret of Arsenic ஆசெனிகதுவிசல்விரம்.
“ Nut 261 பாக்கு, கொட்டைப்பாக்கு.	“ Mercury இரசதுவிசல்விரம், சாதுலிங்கம்.
Bezoar, animal கோரோசனை.	Bitter Almond 91 கைப்புவாதுமை.
Bharingi 58 குவசிவேம்பின்பட்டை.	“ Orange Peel 91 தோடந்தோல்.
Bhi-dana, (H) Quince Seeds.	Bitter Sweet, Dulcamara.
Bhi-ka-pij, Quince Seeds.	Bittern பிற்றென். கறியுப்பெடுத்தபின் எஞ்சும் கசப்புநீர்.
Bhu Champa, 232 (H) Root of Kaempferia Rotunda.	Bitumen பிதமம், சைலம்.

BIX	BRA
Bixineae 32 பிச்சினியங்கள்.	Blue Litmus Paper 272 நீலவிற்ம ஸ்தாள்.
Black Antimony 356 காரந்திமனி.	" Pill, Mercurial Pill.
Black Drop, Vinegar of Opium கருந்துளி.	" Stone, Sulphate of Copper.
" Catechu, 71 கருங்காசுக்கட்டி.	" Vitriol, Sulphate of Copper.
" Dammar 61 கறுப்பு டாமர்.	Blumea Arita நாரக்கரந்தை, காட்டு முள்ளாங்கி.
" Hellebore காரேலிபர், ஏலிபர்.	Blumea Balsamifera 138 புளுமீய ப்பல்சப்பூடு.
இதகார்ப்பும் கருமையுமான வேரையுடைய ஓர் பூடு. இதைச் சிலர் கடுகுரோகணி என்பார்கள். ஆனாலும் இது பிழை.	" Grandis 204, 938 பெரும்புளு மீயப்பூடு.
" Oil 61 வாலுளுவைத்தைலம்.	Boerhaavia Diffusa 197 மூக்குர ட்டை.
" Oxide of Copper 335 செம்பு காரக்கிரம்.	Boiling Point கொதிநிலையம்.
" O. Manganese மங்கனீசகாரக் கிரம்.	" Water கொதிநீர், கொதிவெந்நீர்
" Mercurial Lotion 390 இரசக ருலோஷன்.	Poke Nut, Lobelia Nicotianaefolia
" Sulphuret of Lead ஈயகார் சல்விரம்.	Bolus வோலசு.
" Pepper 218 மிளகு.	Bolus Armenia Rubra, Red Arme- nian bole.
Black Salt கெந்தகவுப்பு, கறுப்புப்பு இது அயசல்விரம் சொற்பமா ய்ச் சேர்ந்த கறியுப்பு,	Bombax Malabaricum, 43 Red Cotton Tree.
" Varnish 69 கறுப்புவாணிசு.	Bonduc Nut கெச்சக்காய், களற்சி, களச்சிக்காய். [பம்.
" Wash, Black Mercurial Lotion	Bone Ash எலும்புநீறு, ஏணப்பற்
Blanc Manger பிளமாஞ்சு. இது கடற்பாசியின் சாரமும் பா லும் சீனியும் சேர்ந்து உண் டாகும் வெண்களி. இது இ லேசுற் சமிக்கும் பெலப்பா ன உணவு.	Bone Black, animal Charcoal.
Bland மென்.	Bone எலும்பு.
Bleeding, Venesection இரத்தமெடு த்தல், நாளலம்.	Bonplandia Trifoliata, Cusparia.
Blimbi, Bilimbi.	Boracic acid 397 போறசிக்கமிலம்.
Blister கொப்புளம் கொப்புளப்பற்று	Boragenaceae 168 போறகினூசியங் கள்.
Blistering liquid 288 கந்தாரிஸ் நீர், கொப்புள நீர்.	Borassus Flabelliformis, Palmyra Tree.
" Fluid, B. Liquid	Borax 335 போறசம், வெண்காரம்.
Blistering Paper 288 கொப்புளத் தாள்.	" Honey 336 போறசதேன்.
Block Tin பலகைத்தகரம்.	Borotartrate of Potash பதாசிபோ றுதாத்தரசு.
Bloodletting இரத்தம்வாங்கல்.	Bos Taurus எருது, மாடு.
	Boswellia Floribunda, Olibanum.
	" Glabra, Indian Frankincense.
	" Thurifera, Olibanum.
	Botany Bay Kino, Red Gum.
	Bottle சீசா, போத்தில்.
	Bougie வர்த்தி, லூச்சி.
	Bragantia Tomentosa 211 ரோமப் பிறுகந்திச்செடி.

BRA	CAL
Bragantia Wallichii 211 பிருகந்தி வலிச்சிச்செடி.	Butea Frondosa, 81, 87 Bengal Kino Tree முருக்கு.
Brandish's Alkaline Solution, பிறன் றிசரல்கலைநீர்.	" Parviflora 82 ஓர்வகைக் கீனும் பிசினூறும் இந்துவினுள்ள மரம்.
Brandy, 275 Spirit of French Wine பிரண்டி.	" Superba 82 கொடிமுருக்கம், கொடிபலாசம்.
Brandy Mixture 276 பிரண்டிக் கலவை.	Buteae Gummi, Bengal Kino.
Brassica Juncea, Indian Mustard.	Butter வெண்ணெய், அவி.
Brayera Anthelmintica, Kusso.	Butter of Antimony, Chloride of Antimony.
Brazil Wood பிறசில்சிராய். இது சிவப்புநிறமுள்ளது.	Butyrum, Butter.
Brewing புறுவித்தல், யவசேதுனம்.	By Product உபபேறு.
Broad Leaved Elm 225 உல்மஸ்மரம்.	Cabbage. rose Petal நூறிலை ரோசைமிதழ், இராசபூ, குளாப்பூ.
Bromide of Ammonium 319 அமோனதபுரோமிரம்.	Cacalia Kleinia 137 ககாலிக்கிலைனிப் பூடு.
" Potassium 331 பதாசியபுரோமிரம்.	Cacao, Theobroma.
Bromine 311 புரோமம்.	" Butter, Oil of Theobroma.
Bromum, Bromine.	Cactus Indicus நாகதாளி.
Broom ஸ்கொபாரி.	Cadmii Iodidum, Iodide of Cadmium 367.
Broom Tops ஸ்கொபாரித் துளிர்.	Cadmium 367 கட்மியம்.
Brucea Quassioides 58 குவசிவேம்பு.	Caesalpinia Bonducella, Bonduc.
Brucia புருசியம்.	" Coriaria, American Sumach.
Brunswick Green புறுஞ்சிக்பச்சை.	" Sappan, Sappan Wood.
Bryonia Callosa சுக்கங்காய் விரை, கொமட்டி விரை.	Cajanus Indicus துவரை.
" Epigaea 106 கொல்லன்கோவைக்கிழங்கு, ஆகாசகருடன், கருடன்.	Cajuput Tree 99 கயபுட்மரம்.
Euchu 49 பூக்கு.	Cake Meal லீனப்பிண்ணாக்கு.
" Folia, Buchu Leaves.	Calabar Bean 80 வைசுதிக்கம்கொட்டை.
" Leaves, 41 பூக்குவிலை.	Calamine கலமின், இயல்பான துத்தகாபனசு.
Buckhorn கலங்கொம்பு.	Calcaria Hypochlorosa, Chlorinated Lime.
Buckthorn Juice 65 ரம்னஸ்சாறு.	Caleii Chloridum, 344 Chloride of Calcium.
Buds அரும்பு.	Calcined Bone சுட்டவென்பு, நீருக்கியவென்பு.
Bulb or Tuber கிழங்கு, பல்பு.	Calcis Carbonas Praecipitata, Precipitated Carbonate of Lime.
Bun-haldi, Round Zedoary.	" Carbonas, Carbonate of Lime.
Burgundy Pitch 230 பெர்கன்றிராளம்.	" Hydras, Slaked Lime.
Burnett's Liquid 366 பேணற்றீர், இது ஒரு துத்தகுலோறிரீர்.	
Burseraceae 59 பேர்சிருசியங்கள்.	

CAL	CAR
Calcis Hypophosphis, Hypophosphite of Lime.	Cannellae Albae Cortex, 33
“ Phosphas, Phosphate of Lime.	Cannella Alba Bark.
Calcium 343 கல்சியம்.	Cannellaceae 33 கனெலாசியங்கள்.
Calculus கல், கல்குலசு.	Cannabis Indica, Indian Hemp.
Calefaciens, Warming, Warmவெம்.	Cannabis Sativa, Indian Hemp.
Calisaya (Cinchona) Bark 120 கலிசாயப்பட்டை.	Cantharis, Cantharides.
Calomelas, Calomel, Subchoride of Mercury.	Cantharides 287 கந்தாரிசு.
Calophyllum Calaba தெற்கிந்துவி லுள்ள ராளமரம்.	Cantharidin 287, 290 கந்தாரிடின.
“ Inophyllum, Alexandrian Laurel.	Cantharis, Vesicatoria 287 கொப்பு ளவண்டு, கந்தாரிஸ்வண்டு.
Calotropis Cortex, Mudar Bark.	Caoutchouc கூச்சு.
“ Gigantea, Mudar பேரெருக்கு.	Capparideae 32 கப்பரிடியங்கள்.
“ Procera, Mudar சிற்றெருக்கு.	Caprifoliaceae 119 கப்ரிவோலியரசி யங்கள்.
Calumba Root 14 களும்புக்கிழங்கு, கலம்பாவேர்.	Capsici Fructus, Capsicum Fruit.
Calumbae Radix, Calumba Root.	Capsicin 191 கப்சிசின்.
Calx, Lime 344.	Capsicum Annuum 191 மிளகாய்.
“ Chlorata, Chlorinated Lime.	“ Fastigiatum 191 மிளகாய்.
“ Chlorinata, Chlorinated Lime.	“ Fruit மிளகாய்.
Calysaccion Longifolium 39 நெட் டிலைக்கலிசாக்கியன்.	Capsule, a saucer கப்சுல், ஓர் சிறு பீங்கான் வட்டில்.
Cambogia, Gamboge.	Capsule, a pod உண்டைக்கோதான காய்.
“ Indica, Indian Gamboge.	“ to swallow கோது.
“ Mysoriensis, Mysore Gamboge.	Caraway Fruit 108 கறுவிக்கொட் டை, கேக்குவிரை, சீமைச் சோம்பு.
Camel Bezoar ஒட்டைரோசனை.	“ Plant, 108 கறுவிப்பூடு, சீமைச் சீரகம், கேக்குப்பூண்டு.
Camphor 202 கர்ப்பூரம், பூரம், கரு ப்பூரம், சூடன்.	Carbazotic Acid 233 காபசோதிக் கமிலம்.
“ Balls பூரவுண்டைகள்.	Carbo Animalis, Animal Charcoal
“ Leaves 180 Leaves of Meri- andra Bengalensis and M. Strobilifera கர்ப்பூரவிலைகள்.	“ Ligni, Wood Charcoal.
Camphora, Camphor.	Carbolic Acid 233 காபலிக்கமிலம்.
Canada Balsam 230 கனடபல்சம்.	Carbonaceous Residue கரியானசேஷம்.
Canara, Vegetable Butter of, Piney Tallow.	Carbon, 300 Charcoal கரி. காபன்.
Canarium Commune, Elemi Tree.	Carbonate of Ammonia 315 அமோனகாபனசு.
“ Strictum, Black Dammar.	“ Bismuth 361 பிஸ்முதகாபனசு.
Cannella Alba Bark 33 வெண்கனெ லப் பட்டை.	“ Iron அயகாபனசு.
	“ Lead 369 ஈயகாபனசு, ஈயவெ ள்ளை, ஈயவெண்பற்பம்.
	“ Lime 346 சுண்ணகாபனசு.
	“ Lithia 342 லிதிகாபனசு.

CAR	CAT
Carbonate Magnesia மக்னீசிகாபனசு.	Cashew Nut 68 கொட்டைமுந்திரி, காட்டுமுந்திரி.
“ Potash 321 பதாசிகாபனசு, மரவுப்பு, சாம்பலுப்பு.	Cassia Absus 86 கருங்காணம், காட்டுக்கொள், இடிக்கொள், முலைப்பால் விரை.
“ Soda 333 சோடகாபனசு, சச்சிகாரம்.	“ Acutifolia எகிப்திலும் நுபியத்திலுமுள்ள நிலவாகை.
“ Zinc 363 துத்தகாபனசு.	“ Alata 85 சீமையகத்தி, வண்டு கொல்லி.
Carboy காபாய். இது பருத்த உரத்த சீசா.	“ Auriculata 86 ஆவிரை, ஆவாரை.
Cardamoms 242 ஏலம், காடமம், ஏலக்காய்.	“ Bark 207 பெரிய லவங்கப்பட்டை.
“ Malabar தெற்கிந்துவேலம்.	“ Buds 100 கறுவாப்பூ, இலவங்கப்பூ.
“ Seeds ஏலரிசி.	“ Fistula, Purging Cassia.
“ Siam சியாமேலம்.	“ Lanceolata, Indian Senna.
Cardamomum, Cardamoms.	“ Lignea, Cassia Bark.
Cardiospermum Halicacabum முடக்கற்றூன்.	“ Obovata, Indian Senna.
Cardol காடல்.	“ Occidentalis 86 நாத்தந்தகரை
Carminative 446 வாயுக்கினி, காமினதி.	“ Pulp 73 கொன்றைக்களி.
Carica Papaya, Papaw Tree.	“ Sophora 86 பொன்னாவரை, பெரியதகரை, பேரூவிரை.
Carob or Locust Bean காற்புமரம். இதின்கனி இனியதும் வாணியுமுள்ளது.	“ Tora 86 தகரை, ஊசித்தகரை.
Carron Oil, Lime Liniment காறன் தேலம்.	Cassiae Cortex, Cassia Bark.
Carrot மஞ்சள்முள்ளாங்கி, காறட்கிழங்கு.	“ Pulpa, Cassia Pulp.
Carthamus Tinctorius குசம்பாவிரை.	Castile Soap கஸ்தில் சவுக்காரம், கஸ்தில் சபு.
Carui Fructus, Caraway Fruit.	Castor 298 சுண்ணு, நீர்நாய்விரை. கஸ்தார்.
Carum ajowan, 109 Omam.	“ Oil 213 ஆமணக்குத் தேலம், ஆமணக்கெண்ணெய்.
“ Carui, Caraway Plant.	Castor Plant 213 ஆமணக்கு.
“ Nigrum 109 சீமைச்சீரகம், பிள்ப்புச்சீரகம்.	Castorin 298 கஸ்தரின்.
“ Roxburghianum 118 அசமதாகம், அசமதாவோமம்.	Castorum, Castor.
Caryophyllum, Cloves.	Castor fiber, The Beaver.
Caryophyllus aromaticus 100 கரம்புமரம் Clove tree.	Casuarina Muricata 230 சவுக்குமரம்.
Caryota Urens, Bastard Sago tree	Catalysis சம்பேதனம், கதாலிசு.
Cascarilla bark 211 கஸ்கரில்பட்டை.	Cataplasma, Cataplasm, Poullice.
Cascarillae Cortex, Cascarilla Bark.	“ Sinapis, Mustard Poullice.
Cascarilline 212 கஸ்காரிலின்.	“ Sodae Chloratae, Chlorine Poullice.
	Catgut பூனைக்குடல்.
	Catechin 78 கதிசின்.

CAT	CHE
Catechu 71, 127 காசுக்கட்டி, கத்த காம்பு.	Ceylon Cardamoms 243 லங்கை யேலம்.
“ Acacia 71 வொதலை, வொத ளம்.	“ Cinnamon 206 லவங்கப்பட் டை, கறுவாப்பட்டை.
“ Nigrum, Black Catechu.	“ Moss 273 லங்கைக் கடற்பாசி.
“ Pallidum, Pale Catechu	Chaab, (H). Piper Chaba.
Cathartic பேதி, விரேசனம், கதாடி.	Chakoon ke binje, Seeds of Large Sebestens.
Catkin கற்கின்.	Chalk 347 கிரீதம், மென்சுண்ணம், சோக்கு, சீமைச்சுண்ணும்பு.
Caulophyllin, Active Principle of Blue Cohosh காலுவிவின்.	Chalk mixture 347 கிரீதக்கலவை.
Caustic Potash 320 காரப்பதாசி.	Chalybeate, Ferruginous அயவுப் புள்ள.
“ Soda 332 காரச்சோடம்,	Chamomile 131 சீமைச்சாமந்தி.
Cauterization சுடல், தகித்தல், கோ லாற்சுடல்.	Chamomile Flowers 131 அந்திமிஸ் பூ, சீமைச்சாமந்திப்பூ.
Cauterizing Iron சூட்டுக்கோல், சு டுகோல்.	Charcoal 300 கரி.
Cedar ஏரஸ்மரம், கேதுரு.	“ Vapor கரிவாயு.
Cedrela Toona 64 தூணுமரம்.	Charpie, Lint சார்பி.
Celastrineae 64 செஸ்திரீனியங்க ள்.	Charta Curcumae, Turmeric Paper.
Celastrus Paniculata 64 வாலுளு வை, அதிபரிச்சம்.	“ Epispastica, Blistering Paper
Celery செலிரிப்பூடு.	Chaulmugra 33 சால்முக்கிரம்.
Celsia Coromandeliana 172 செல் சிப்பூடு.	Chavica Betel, Betel Leaf.
Centigramme செந்திகிராம்.	“ Officinarum, சாப்பு.
Cephaelis Ipecacuanha 125 இபிகா க்சுப்பூடு.	“ Roxburghii, Piper Longum.
Cera Alba, White Wax.	Chay Root சாயவேர்.
“ Flava, Yellow Wax.	Chebulic Myrobalans, tree 97 கடும ரம்.
Cerate கிரோது.	“ M. Galls 98 கடுக்காய்ப்பூ.
Ceratum, Cerate.	Cheer Sullah, (H) Pinus Longifolia.
Cerbera Manghas, like C. Odol- lam in site and action.	Cheer-ke-goond, (H) Birjee.
Cerbera Odollam 150 காட்டலரி.	Chelsea Pensioner செல்சி பென்ச னர். இது கெந்தகம், கடுகு, சுவயகம், வரியாத்து, வெடி யுப்பு இவைகள்சேர்ந்த சூர ணம். இது நாட்பட்ட வாதத் துக்கு நயம்.
Cerevisiae Fermentum, Beer Yeast	Chemical Food கெமிஸ்தவுணவு.
Cerii Oxalas, Oxalate of Cerium.	Chemist கெமிஸ்தர், பவுதிகர்.
Ceromel 291 செறுமெல், மெழுகு தேன்.	Chemistry கெமிஸ்தம், பவுதிகம்.
Cetacea 295 செதசீயங்கள்.	Chenopodium கெனுபொடியம், கெ னுபொடி.
Cetaceum, Spermaceti.	Cherry-Laurel 92 லாறுசெருசிமரம்
Cetine 295 செதீன், திமிநெய்.	“ L. Leaves 92 லாறுசெருசிமிலை
Cetraria, Iceland Moss.	“ Tree செரிமரம்.
Cevadilla 257 சபதிலம்.	

CHI	CIN
Chicken Broth கோழியிழைச்சியா ணம்.	Chundu-mula, (H). Kaempferia Galanga.
Chicoria Endivia, Endive.	Churrus, (H). 228 கஞ்சாராளம்.
Chillies, Capsicum Fruit.	Cicendia Hyssopifolia, 161 வெள் ளறுகு. (கடலை.
China Root 240 சீனக்கிழங்கு, பற் ங்கிக்கிழங்கு.	Cicer Arietinum, Bengal Gram 88
Chirata, Chiretta.	Cigarette சுருட்டு.
Chiretta 159 சிரட்டுச்சி.	Cimicifuga, Black Snake Root சிமிசிபூகப்பூடு.
Chloral குலோறல் 280; அநீர 280 Anhydrous.	Cimicifugin, The Active Principle of Actaea Racemosa சிமிசி பூகின்.
Chlorate of Potash பதாசிகுலோறசு	Cinchona 120 சின்கனம்.
Chloratus-a-um, Chlorinated கு லோறகம்.	“ Calisaya 120 கலிசாயசின்கன ம், பீதச்சின்கன மரம்.
Chloride குலோறிரம்.	“ Chahuarguera 123 சகுவகு வேரசின்கனம், வெண்சின்க னமரம்.
Chloride of Ammonium 318 அமோ னதகுலோறிரம், நவச்சாரம்	“ Condaminea 223 வெண்சின் கனமரம், கன்றமின்சின்கனம்.
“ Antimony அந்திமனிகுலோறி ரம்.	“ Crispa 123 கிரிஸ்பசின்கனம், வெண்சின்கனமரம்.
“ Arsenic ஆசெனிககுலோறிரம்.	“ Excelsa. 127 Hymenodictyon Excelsum.
“ Barium 397 பாரியகுலோறிரம்	“ Succirubra 124 செஞ்சின்கன மரம், சகிருபுரசின்கனம்.
“ Calcium 344 கல்சியகுலோறி ரம்.	Cinchonae Flavae Cortex, Yellow Cinchona Bark.
“ Gold பொற்குலோறிரம்.	“ Pallidae Cortex, Pale Cincho- na Bark.
“ Lime சுண்ணகுலோறிரம்	“ Rubrae Cortex, Red Cincho- na Bark.
“ Sodium 337 சோடதகுலோறி ரம், கதியுப்பு.	Cinchonidine 125 சின்குனிரின்.
“ Zinc 365 துத்தகுலோறிரம்.	Cinchonine 225 சின்குனின்.
Chlorinated Lime 348 கல்சிகுலோ றகம்.	Cinder கரி, கிட்டம்.
“ Soda சோடகுலோறகம்.	Cinnamic acid சினமிக்கமிலம்.
Chlorine 307 குலோறம்.	Cinnabar, Bisulphuret of Mercury.
“ Poultice 339 குலோறப்புற்கை.	Cinnamomi Cortex, Cinnamon Bark.
Chloroform, 278 குலோறுவாம்.	Cinnamomum Aromaticum, C. Cassia 207 சீனக்கறுவா.
Chlorum, 307 Chlorine.	“ Comphora 202 கருப்பூரமரம்.
Chop-China, China Root.	Cinnamomum Cassia 207 சீனக்கறு வாமரம்,
Cholera Mixture வாந்திபேதி மிஸ் தர்.	
Cholagogue கொலகக்கி, பித்தக்கினி.	
Chota mai, Galls of Tamarix Ori- entalis.	
Chromate of Lead ஈயகுரோமசு.	
Chrome குரோம்.	
Chromium குரோமியம்.	
Chrysanthemum Roxburghii 138 சாமந்திப்பூ.	

CIN	COC
Cinnamomum Eucalyptoides 208 யுதலிப்தடுக்கறுவாமரம், தாளிசம், Flacourtia Cataphracta.	Clarified Honey 291 சுத்ததேன், Clarification தெளிவாக்கல், கிளாரிவித்தல்.
“ Glanduliferum , 208 Nepal Sassafras Tree.	Classification வகுத்தல், பகுப்பு.
“ Iners , Wild Cinnamon.	Claviceps purpurea 263 செங்கிலாவிசெப்பு.
“ Pathenoxylon 208 பாதெனச்சிலக்கறுவா.	Clay கிளெய், களிமண்.
“ Tamala தாளிசம், 208 தமாலக்கறுவா. See Flacourtia Cataphracta.	Clearing Nut 157 தேற்றூங்கொட்டை.
“ Zeylanicum , Ceylon Cinnamon Tree.	Clerodendron Inerme செங்கங்குப்பி, பீஞ்செங்கங்குப்பி.
Cinnamon Bark 206 கறுவாப்பட்டை.	“ Infortunatum 175 கைப்புவினுடென்.
Cissampelos Hernandifolia 18 வங்காளத்திலுள்ள ஓர் தாவரம்.	“ Serratum 175 சிறுதேக்கு, கண்டுபாரங்கி.
“ Pareira , Pareira Brava.	Climbing Plant ஏறுகொடி.
Citrate சிதிறக.	Clitorea Ternatea 88 காக்கணங்கொடி, காக்கட்டான்.
“ of Ammonia அமோனசிதிறக.	Cloves 100 கரம்பு.
“ Bismuth பிஸ்முத சிதிறக.	Cnidium Diffusum கிருமிஞ்சியோமம்.
“ Iron அயத்சிறக.	Coal Gas கரிவாயு, கற்கரிவாயு.
“ of Iron and Ammonia 383 அயவமோனசிதிறக.	“ Oil கரித்தேலம்.
“ I. and Quinia 383 அயகினிய சிதிறக.	“ Tar கற்கரித்தார்.
“ of Lithia 343 லித்சிதிறக.	Coarse Sugar பருக்கன்சீனி, அசுத்தசர்க்கரை, வெல்லம், பனங்கட்டி.
“ of Potash 328 பதாசிசிதிறக.	Coating of Pills குளிகைக்கு ஓட்டல்.
Citric Acid 52 சிதறிக்கமிலம்.	Coecinia Indica கோவை.
Citrine Ointment , Nitrate of Mercury Ointment.	Cocculus Cordifolius , Gulancha.
Citron நாரத்தை.	“ Indicus 16 காக்காய்கொல்லி, பேன்கொட்டை.
Citronello 267 மாந்தப்புல், காவட்டம்புல், சுன்னூரிப்புல்.	“ Palmatus Calumba .
Citrotartrate of Soda 335 சோடசிதிறுதாத்தரசு.	“ Villosus 18 காட்டுக்கொடி. இது சீந்திலிலைபோன்ற கசப்புள்ள கொடி.
Citrullus Colocynthis , Colocynth.	Coccus , 291 Coecus Cacti, Cochineal.
Citrus Curantium , Orange.	Cochineal 291 கிருமிஞ்சிப்புழு, சப்பாத்துப்புழு.
Citrus Bergamia , Lime Tree.	Cochlearia Armoracia , Horseradish.
“ Limonum , Lemon.	Cochlospermum Gossypium , Yellow Flowered Cotton Tree.
“ Medica , Citron.	
Civet 299 நாவிப்புழு, நாவிப்புழுக்கு.	
Clamp அள்ளு, பந்தனம்.	

COC

Cocoa Nut 259 தேங்காய்.
 " N. Tree 259 தென்னை.
 " N. Oil 259 தேங்காயெண்ணெய், தேங்குத்தேலம்.
 Cocos Nucifera, Coconut Tree.
 Cod Liver Oil 292 மறுவித்தேலம், கடமீனீரற்றேலம்.
 Cod fish 292 கடமீன்.
 Codagapala, Bark of Holarrhena Antidysenterica,
 Codeia, Codeine 23 கோதியின்.
 Coffea Arabica, Coffee.
 Coffee காபிக்கொட்டை, கோப்பி.
 Coke கோக்கரி.
 " Vapor கோக்கரிவாயு.
 Colchici Cornus, Colchicum Corm.
 " Semina, Colchicum Seeds.
 Colchicin 255 கொல்சிகின்.
 Colchicum Autumnale 255 கொல்சிகப்பூடு.
 " Corm 255 கொல்சிகக் கிழங்கு.
 " Seeds 255 கொல்சிகவிரை.
 " Wine 256 கொல்சிகவைன்.
 Cold Affusion தண்ணீர் வார்த்தல், தண்ணெழுக்கல்.
 " Cream, Rose Water Ointment.
 " Douche தண்ணொரிவு.
 Coleoptera 287 கோலியப்திறங்கள்
 Coleus Aromaticus 179 சுகந்தகொலியஸ்பூடு.
 Collodion 42 கலோடியம்.
 Collodium, Collodion.
 " Flexile, Flexible Collodion.
 Collyrium கலூறியம்.
 Colocasia Antiquorum 262 சாமக் கிழங்கு.
 " Macrorrhiza 262 பெருங்கிழங்குக் கொலுகாசிப்பூடு.
 Colocynth 103 கலுசிந்து, பேய்க்கொம்மட்டி, வரித்தும்மட்டி.
 " Pulp 103 கலுசிந்துச்சதை.
 Colocynthides Pulpa, Colocynth Pulp.
 Coloring Matter நிறப்பதார்த்தம்.

COM

Combustible Gas சவாலிக்கும் வாயு.
 Combretaceae 97 கொம்பிரிதாசியங்கள்.
 Commercial கடை, விடாபார, செட்டு.
 Common Frankincense 231 தெறிபிர்தம்.
 Common Salt, 337 Chloride of Sodium கறியுப்பு, உப்பு.
 Compositae 131 கம்பசிதங்கள்.
 Composition கூட்டு, கலப்பு.
 Compositus-a-um, Compound.
 Compound கூட்டு, மிசிரம்.
 " Camphor Liniment கர்ப்பூரக் கூட்டு லினிமென்.
 " Decoction of Sarsaparilla சார்சகூட்டுத்திகாத்தம்.
 " Infusion of Kariyat நிலவேம்புக்கூட்டின்னஞ்சம்.
 " Lead Suppositories வங்ககூட்டுச்சப்பாசிதுறி.
 " Mixture of Iron 377 அயகூட்டுமிஸ்தூர்,
 " of Senna 75 நிலவாகைக்கூட்டுமிஸ்தூர்.
 " Ointment of Mercury இரசகூட்டன்கென்.
 " Pill of Subchloride of Mercury 390 இரசவதகுலோறிரகூட்டுக்குளிகை, கலமல்கூட்டுக்குளிகை.
 " Powder of Almonds 92 வாதுமைக்கூட்டுச் சூரணம்.
 " P. of Cinnamon கறுவாக்கூட்டுச்சூரணம்.
 " P. of Ipecacuanha இபிகாக்கூட்டுச் சூரணம்.
 " P. of Kino கினுகூட்டுச்சூரணம்.
 " Tincture of Camphor கர்ப்பூரக்கூட்டிரஞ்சம், பூரக்கூட்டிரஞ்சம்.
 " T. of Lavender லவந்தர்கூட்டிரஞ்சம்.

COM	COR
Compress பொறை, கம்பிரெசு, சம்பீடனம்.	Copaifaea Multijuga 72 கபேவமரம்.
Concentrated சாரத, சாரதித்த.	Copaiva 72 கபேவம்.
Condenser கனீகரணி, கன்றென்சர்.	Copper 385 செம்பு.
Conessi Bark, Bark of Holarrhena Antidysenterica.	“ Foil 397 செம்புப்பத்திரம்.
Confectio, Confection.	“ Test. செம்புச்சோதனை.
“ Amygdalae, Compound Powder of Almonds.	Copperas, Sulphate of Iron அன்னபேது.
“ Aromatica, Aromatic Powder of Chalk.	Coptis Teeta 12 கப்திஸ்பூடு.
“ Opii. Confection of Opium.	Coral Plant, French Physic Nut.
Confection கன்பெச்சன், லேகியம், கம்பெச்சன்.	Corchorus Olitorius பெரட்டிக் கீரை.
Confection of Senna 75 நிலவாகை லேகியம்.	Cordia Angustifolia 168 ஒடுக்கலை நறுவிலி.
“ Rose 89 ரோசை லேகியம்.	“ Latifolia, Small Sebestens.
“ of Dog rose 90 நாயுரோசை லேகியம்.	“ Myxa, Large Sebestens.
“ of Pepper 218 மிளகிலேகியம்.	Cordial சஞ்சீவி.
“ of Scammony 165 ஸ்கமுனி லேகியம்.	Coriander Fruit 111 கொத்தமல்லி, மல்லி.
“ of Turpentine 232 தர்ப்பந்தின் லேகியம்.	Coriandri Fructus, Coriander Fruit.
“ Opium 26 அவினிலேகியம்.	Coriandrum Sativum, Coriander.
Confectionery முட்டா, பலகாரம், சீனிப்பண்டம்.	Cork கார்க்கு, சடை.
Conferva கம்பேவம், சமுஷ்ணி.	“ Borer கார்க்குத்தமரி.
Confervoid கம்பேவடு, சமுஷ்ணவி.	“ Presser கார்க்குநசுக்கி.
Conia 115 கோனியம்.	“ Screw சடைவாங்கி, காச்சிறு.
Conii Folia, Hemlock Leaves.	Cornin, The active principle of Dog wood கொணின்.
“ Fructus, Hemlock Fruit.	Cornu Cervi, Hart's Horn.
Conium, Hemlock 115.	Corrective அபகி, கரெக்திவு
Conium Maculatum, Spotted Hemlock.	Corrigent நியந்தை, கறிகென்.
Coniferae 230 கொனிவ்விரங்கள்.	Corroborant, Restorative.
Conserva Amygdalarum, Compound powder of Almonds.	Corrosion அரித்தல், காதனம், கரோசம்.
Continuous Displacement தொடர் திஸ்பிலேசித்தல்.	Corrosive Sublimate, 399 Perchloride of Mercury.
Convolvulaceae 163 கன்வல்வுலாசியங்கள்.	Corte de Pala, Bark of Holarrhena Antidysenterica.
Convolvulus Scammonia 164 ஸ்கமுனிக் கொடி.	Cortex, Bark, Rind தோல், பட்டை.
Cobaiba, Copaiva.	Corvinus Coitor, Indian Whiting.
	Corydalin, 30 The active principle of Turkey Pea Root கறிடலின்.
	Corydalis Govaniana 30 கோவன் கறிடலிஸ் கிழங்கு.

COR	CUR
Corypha Umbraculifera, Talipot Palm.	Croton Seeds 213 நேர்வாளாக் கொட்டை.
Coscinium Fenestratum 18 மரமஞ்சள்.	Crotonis Oleum, Croton Oil.
Cosmetic கஸ்மெடு, அங்கராசி.	“ Semina, Croton Seeds.
Costus Arabicus 138 கோஷ்டவேர், கஸ்தஸ்அரபிகசு.	Crown Bark, Pale Cinchona Bark.
Cotton Plant 41 பருத்திச்செடி.	Crucible குகை, குருசிபல்.
“ Wool 41 பருத்திப்பஞ்சு.	“ Jacket குகையுறை.
Cotyledon கொதிலீரன், குத்திரம்.	Cruciferae 30 குருசிவிரங்கள்.
Counter கந்தோர், கவுன்றர்.	Crude பரு அசுத்த.
Counter Irritant எதிரழற்சி.	Crumb of Bread மென்கோதுமைய்ப்பம்.
Country, better say Indian நாட்டுஇந்து.	Crystal படிகம், கிரிஸ்தல்.
Cowhage 81 பூனைக்காலி.	Crystalline Acid படிகவமிலம், கிரிஸ்தலமிலம்.
Cowitch, Cowhage.	Cubeba, Cubebs.
Cow's Milk பசுப்பால்.	Cubebs 218 வால்மிளகு.
Crataeva Religiosa, Bael Tree.	Cucumber கக்கரி, பிப்பினி, முள்வெள்ளரி.
Cream பாலாடை, அவிகம், கிரீம்.	Cucumis Hardwickii 105 மலைத்துமட்டி.
Cream of Tartar, Acid Tartrate of Potash.	“ Pseudo-Colocynthis, C. Trigonous.
Creasote 235 கிரீயசற்று.	“ Trigonus 105 காட்டுத்துமட்டி.
Creasotum, Creasote.	“ Utilissimus, Cucumber.
Creeper படர்கொடி.	Cucurbita சுரைக்காய்.
Creta, Chalk.	“ Maxima 105 பேர்ப் பூசணிக் காய்.
Cretaceous கிரீத, சுண்ணாம்புள்ள, சுண்ணாம்புள்ள.	“ Pepo, Pumpkin 106.
Creyat, Kariyat.	Cucurbitaceae 103 குகேபிதாசியங்கள்.
Crini Radix 246 விஷமூங்கிற் கிழங்கு.	Cuminum Cyminum, Cumin.
Crinum Asiaticum 246 விஷமூங்கில்.	Cumin 118 சீரகம்.
Crocus, Saffron.	Cumulation தேங்கல், கூடல்.
“ Sativus, Saffron, Crocus.	Cupping கொம்புவைத்தல், கூபியிடல்.
Crotalaria Juncea, Sun Hemp.	Cupreous Salt செம்புப்பு.
Croton Oil 213 நேர்வாளத்தைலம், வாளதேலம்.	Cupri Subacetate, Subacetate of Copper.
Croton Polyandrum 213 பலியாண்டவாளம்.	Cupri Sulphas, Sulphate of Copper.
“ Roxburghii C. Polyandrum.	Cuprum, Copper.
“ Tiglium 212 நேர்வாளச்செடி.	Cupuliferae 22 குபுலிவிரங்கள்.
“ Eluteria, Cascarilla.	Curare குரூரி, Woorari, Woorali, Urali தென்னமரிகத்திலுண்டாகும் கொடியதாவரஞ்சு.
“ Oblongifolius 213 நெட்டிலைவாளம்.	
“ Pavana 213 பவானவாளம்.	

CUR	DEC
Curarin குரூரின்.	Cytisus Scoparius, Common Broom.
Curculigo Orchioides 247 நிலைப்பனைக்கிழங்கு.	
Curcuma Amada, Mango Ginger.	Daemia Extensa 153 வேலிப்பருத்தி, உத்தாமணி, உத்தமதாளி, உத்தமாகாணி.
“ Angustifolia, Arrowroot.	Dalbergia Sissoo நூக்குக்கட்டை.
Curcuma Aromatica, 244 Round Zedoary.	Dammar 40 டாமர் என்ற ராளம்.
“ Longa, Turmeric.	Dandelion Root 131 தரக்கசுவேர்.
“ Rubescens 244 செங்கர்கூமம்.	Daphne Laureola, Spurge Laurel.
“ Zedoaria, 244 கிச்சிலிக் கிழங்கு. Long Zedoary.	“ Mezereum, Mezereon.
“ Zerumbet, C. Zedoaria.	Daphnia 200 தவ்னீயம்.
Curd தமிழர், ததி.	Darnel தாணெல் என்ற புல். இது ஐரோப்பிலுள்ளது.
Curette நொண்டி, குறெட்டி.	“ Seeds தாணெல்விரை.
Currant கரன்றுச்செடி. இதில் மெத்தச் சாறுள்ள சிறு பழம், குகைகுலையாக உண்டாகும்.	Dasta, (H) Zinc.
Curry Leaf 57 கருவேப்பிலை, கறிவேப்பிலை, கிறியிலை.	Date பேரீஞ்சு.
Cuscus Grass, better Kaskas Grass வெட்டிவேர், இலாமிச்சை, உயிறு, வீரணம், விழல்வேர்.	Datura Alba, Dhatura 187 வெள்ளுமத்தை.
Cusparia Bark 48 கஸ்பாரிப்பட்டை.	“ Fastuosa, 188 Purple Flowered Dhatura கருஞ்ஞமத்தை.
Cuspariae Cortex, Cusparia Bark.	“ Flower Buds மராட்டிய மொக்கு.
Cusso, Kouso.	“ Stramonium, Thorn Apple.
Cutting, Knife, Chopper நறுக்கி.	Daucus Carota, Carrot,
Cyanide of Mercury இரசசையனிரம்.	Daun Selasse, Ocimum Gratissimum.
“ of Potassium பதாசியசையனிரம்.	Dawul, Lobelia Nicotianaefolia.
Cybiun Commersonii, Sier Fish.	Deadly Nightshade, Belladonna.
Cycas Circinalis ஊரை, காமமரம்.	Deal பைன்மரப்பலகை.
Cydonium, Quince Seed.	Decant தெளித்துவார்த்தல்.
Cymbopogon Citratum, Lemon Grass.	Decay உக்கல், அழுகுதல்.
“ Nardus, Citronelle.	Decimal தசம.
Cyperaceae 263 சைபராசியங்கள்.	Decoction திகாக்தம், பாசனம்.
Cyperus Juncifolius 263 கோரைக்கிழங்கு, முத்துக்காசு.	Decoctum, Decoction.
“ Pertenuis 263 முத்தக்காசு.	“ Azadirachtae, Decoction of Nim Bark.
“ Rotundus 263 கோரை.	“ Sarsae Compositum, Compound Decoction of Sarsaparilla.
Cypripedin, The active principle of Ladies' Slipper சிப்பிரிப்பீரின்.	“ Ispaghulae, Decoction of Ispaghul.
	Decolorizing Agent வருணக்கினி.
	Decomposition விபகலனம்.
	Decorticate தோலுரித்தல்.

DEF	DIV
Deflagrating Salt தெவ்லகிருசவுப் பு, பொடுபொடுக்குழுப்பு.	Diluted கிருசு. “ Hydrocyanic Acid 93 கிருசு வைருசையனிக்கமில்ம்.
Dehydration நீர் கழற்றல்.	“ Nitro-Hydrochloric Acid 313 கிருசநீதுருவைருகுலோறிக் கமில்ம்.
Deliquescence தெலிகெசித்தல்.	“ Phosphoric Acid 302 கிருசு பாஸ்வரிக்கமில்ம்.
Demulcent திமல்சம், சாமகம்.	Dilution கிருசம்.
Dentifrice பற்பொடி.	Dilutus-a-um, Diluted.
Deobstruent தடைநீக்கி, ரோதக்கி னி.	Diosmeae 49 தியாஸ்மியங்கள்.
Deodar, Pinus Deodara.	Diospyros Embryopteris, Gab. 142 தும்பிலிக்காய்.
Deodorizer தியோடறிசர், கந்தக் கினி.	“ Melonoxylon, Indian Ebony.
Deonul, Lobelia Nicotianaefolia.	Dipterocarpeae 40 திப்தெருகார்பி யங்கள்.
Depilatory திபிலதுதி, உரோமக் கினி.	Dipterocarpi Balsamum, Gurjun Balsam.
Depletion ரேசிதம், திபிளீசம்.	Dipterocarpus Laevis, Gurjun Tree, Wood Oil Tree.
Deposit அடையல், அபகை.	Discipline நடத்தை, ஒழுக்கம்.
Depressant அவசாதனி, திபிறசன்.	Discutient சோதக்கினி.
Desiccation காய்தல், உலர்தல்.	Disinfectant திசின்வெக்து, அபசஞ் சாரி.
Destillatus-a-um, Distilled.	Disinfection திசின்வெச்சம், அப சஞ்சாரம்.
De Valangin's Solution, Liquor Arsenici Chloridi.	Disorganization நிர்வியூடி, திசொர் கனதம்.
Detergent சுசியாக்கோன், சோதகம்.	Dispensary சிகிச்சை, திஸ்பென்ச றை.
Dextrin தெக்ஸ்திரின், தக்கணசம்.	Dispensatory சிகிச்சைநூல், சிகிச் சாவாகடம், திஸ்பென்சதுதி.
Dhatura 187 ஊமத்தை.	Dispenser சிகிச்சன், திஸ்பென்சர்.
Diastase தியஸ்தாசு.	Dispensing Counter சிகிச்சாபீடம், திஸ்பென்சமேசை, திஸ்பென் சக்கவுந்தர்.
Dicotyledons 9 துவிகதிலீதங்கள்.	Displacement Apparatus திஸ்பிலே சக்கருவி.
Digestion திசெஸ்தம், பசனித்தல், நெடுநேரத்துக்குமென்குடே ற்றி நீரில் ஏதும் மருந்தை ஊ றவைத்தல்.	Distillation திஸ்திலித்தல்.
Digestive சீரண, பூயதி, திசெஸ்துவி.	Distilled திஸ்திலித்த. ஆசுதி.
Digitalin 171 திச்சிதாலிசம், திச்சி தாலின்.	Distilled Water 300 ஆசுதநீர், ஆசு தித்தநீர், திஸ்திலித்தநீர்.
Digitalinum, Digitalin:	Diuretic தியுறீசம், அமுரிதம்.
Digitalis Folia. Digitalis Leaves.	Dividivi, American Sumach.
Digitalis Purpurea 169 திச்சிதாலி ஸ் பூடு.	
“ Leaves 169 திச்சிதாலிசிலை.	
Dikkamali Gum, Gardenia Gum.	
Dill Fruit 111 அணீதக்கொட்டை, சதகுப்பி, சோயிக்கீரை.	
“ Plant 111 சதகுப்பிப்பூடு.	
“ Water 111 அணீதநீர்.	

DOG	ELA
Dog Rose 89 நாயுரோசை.	Dry Heat ஈரமற்றவனல், வறள னல்.
Dolichos Uniflorus, Gram.	Dryobalanop's Camphora சாவகத் தீவிலுள்ள ஓர் கர்ப்பூரமரம்.
Donovan's Solution தனுவார்நீர், ஆசெனிகரசவியோதிரநீர்.	Duck Weed தாராப்பாசி.
Dose தேயம், தோசு.	Dudhi Opium பாலபினி.
Dossil திரளை தக்கை.	Dulcamara 191 துல்சமாரம்.
Dorema Ammoniacum 113 அமு னியகப்பூடு.	Dye Powder சாயப்பொடி.
" Aureum 118 பொன்ஞெரீமச் செடி.	Dyer's Spirit சாயக்காரர்சீது.
Douche சொரிவு, சேகம்.	Dyspepsy அசீரணம்.
Dover's Powder தோவர்கூரணம்	Earths மண்வகை.
Compound Powder of Ipe- cacuanha.	Ebenaceae 142 எபனாசியங்கள்.
Drachm திரும், அறுபது கிறேன் கொண்டநிறை.	Ebony 142 கருங்காலி.
Dracocephalum Royleanum 180 பாம்புத்தலைப்பூடு.	Ecbalii Fructus, Squirting Cucum- ber 'Fruit.
Dracontium Ployphyllum 262 பலவிலைத்திரககந்திப்பூடு.	Ecbalium Officinarum 104 எலதீ ரிக் கொடி.
Dragon's Blood சியாந்தேசத்தில் உள்ள ஓர் சிறு மரத்திலுந் த ஓர் வகை ராளம்.	Echium 169 எகியப்பூடு Source of Gouzaban.
Drastic Purgative கடும்பேதி.	Eclipta Prostrata 138 கரிசலாங் கண்ணி, கைகேசி, கைவிசியிலை.
Draught பானம், திருவு.	" Erecta கையாந்தகரை, கரலாங் காணி.
Dregs சக்கு, திப்பி.	Edible Hibiscus, Okra.
Dressing Forceps பரணகவ்வி, பர ணசாவணம்.	Effervescens, Effervescing.
Dried வறு, வறுத்த.	Effervescent Citro Tartrate of Soda 335 நுரைசோடசிதிறு தாத்தரசு.
Dried Alum 353 வறுத்த சீனக்கா ரம்.	Effervescing நுரை, நுரைக்கும்.
Dried Carbonate of Soda 333 வறு த்த சோடகாபனசு.	Effervescing Solution of Lithia 343 லிதியநுரைநீர்.
Dried Sulphate of Iron 377 வறு த்த அயசல்வசு, வறுத்த அ ன்னபேதி.	" S. of Potash 322 பதாசிநுரை நீர்.
Droque amere. Equivalent to Compound Tincture of Ka- riyat.	Efflorescence எவுலேசம், எவுலேசித் தல், பூர்த்தல்.
Drop Machine துளியந்திரம்.	Egg முட்டை.
" Table துளியட்டவணை.	" Albumen முட்டையல்புமின்.
Drug கற்கம், திறக்கு, மருத்துச்சர க்கு.	Eggnog எக்நொக்கு. இது முட்டை யும் பாலும் சீனியும் சாராய மும் சேர்ந்த பானம்.
" Mill திறக்திரிகை.	Ehretia Buxifolia 168 எட்டியச் செடி.
Dry Cup வறட்கொம்பு.	Elasticity இசிவு, இலாஸ்திகம்.
	Elaterin 105 எலதீரின்

ELA

Elaterium 104 எலதீரியம்.
 Elder Bush 119 சம்பூகச்செடி.
 “ Flowers 119 சம்பூகப்பூ.
 “ F. Water 119 சம்பூகப்பூநீர்.
 Electricity இலெக்த்ரிசம், மின்சாரம், ஆம்பரீயம்.
 Electroplate மின்பூச்சு, வெள்ளிப்பூச்சு.
 Electuary, Confection.
 Elemi 60 எலெமி.
 “ Tree 59 எலெமிமரம்.
 Eleodendron Roxburghii செலுப்பை மரம்.
 Elettaria Cardamomum மலையாளத்திலும் இலங்கையிலுமுண்டாகும் ஓர்வகை ஏலம்.
 Elixir எலீச்சர்.
 “ Paregoric, Compound Ticture of Camphor.
 “ of Vitriol, Aromatic Sulphuric Acid.
 Elm Bark 225 உல்மஸ்பட்டை.
 Embelia Ribes வாயுவிளக்கம்.
 Emblic Myrobalans 216 நெல்லி, தோப்பி,
 Emblica Officinalis, Emblic Myrobalans.
 Embrocation, Liniment எம்புறுகாசன், பூச்சுமருந்து.
 Embryopteris Glutinifera, Gab.
 Emetia எமீதியம்.
 Emetic வமனி, வாந்திக்குமருந்து.
 Emetic Nut 128 மருக்காளங்காய்.
 Emetic Tartar, Tartarated Antimony.
 Emetine, Emetia.
 Emmenagogue எம்மெனகக்கு ருதுபிரேசி.
 Emollient சாந்தனி, இமாலியம்.
 Empirical பரீட்சக.
 Emplastrum, Plaster.
 “ Calefaciens, Warm Plaster.
 “ Roborans, Strengthening Plaster.

ETH

Emplastrum Thuris, Frankincense Plaster.
 Empyreuma எம்பைறுமம், பிலுட்டம்.
 Emulsion இமல்சம், பயசியம்.
 Endogens என்றுதங்கள்.
 Endive காசினிவிரை.
 Enema எனீமம், பாயுரியம்.
 “ Foetidum இங்கெனீமம்.
 “ Turpentine தர்ப்பந்தீனெனீமம்.
 English Physic Nut 215 Jatropha curcas காட்டாமணக்கு.
 Envelops for Powders சரையுறை.
 Epicauta Nipalensis 290 எபிகோத்தநிபலேஞ்சி.
 Epsom Salt, Sulphate of Magnesia.
 Equivalent சாமியம்.
 Ergot 263 ஏர்கற்று.
 “ of Rye 263 இருய்ப்பழம், இருய்ப்தானியத்தில் உண்டாகுஞ் சக்கு, ஏர்கற்று.
 Ergota, Ergot.
 Ericaceae 140 எரிகாசியங்கள்.
 Eriodendron Anfractuosum இலவமரம்.
 Errhine, Errhinum ஏறீன், நசியம் நையம், நைசியம், நைசிகம்.
 Erythraea Roxburghii 161 எரிதிரப்பூடு.
 Erythrina Indica கலியாணமுருக்கு, முள்முருக்கு.
 Escharotic தாகனம், எஸ்கராட்டி.
 Essence, as Tincture எசென்.
 “ as virtue சத்து.
 “ of Anise 110 அனிசெசென், சோம்பெசென்.
 “ of Ginger, Strong Tincture of Ginger.
 Essentia, Essence.
 Essentia Anisi, Essence of Anise.
 Essential oil அத்திரதேலம்.
 Ether 277 ஈதர்.
 Ethereal ஈதர் ஈதருள்ள.

ETH	FEN
Ethereal Tincture of Ergot ஏர்கற் றீதிரஞ்சம்.	Exile Oleander 149 வெள்ளலரி.
" T. of Lobelia லொபீலியீத ரிரஞ்சம்.	Exogonium Purga, Jalap Plant.
Ethiop's Mineral ஈதப் சாகரி Black Sulphide of Mercury.	Expectorant எக்ஸ்பெக்துறம், நிசே ட்வனி.
Et, etted எற்று, better, -ide-idum.	Expressed ஊற்றின.
Eucalyptus Resinifera, Red Gum Tree.	Expressum, Expressed.
Eugenia Acris, Indian Allspice.	Exsiccatus-a-um, Dried வறு, வறு த்த, உலர்.
Eugenia Pimenta, Pimento.	Extemporaneous Pharmacy அவா கடபார்மசி, ஆசச்சிகிச்சம்.
Euonymin, the active principle of Wahoo Bark, யுவனிமின்.	Extract எசிருத்து, அவலேகம்.
Eupatorium Ayapana 137 அயப் பனை.	" of Abrus குன்றிமணியெசிரு த்து.
Euphorbia Antiquorum 216 சது ரக்கள்ளி.	" Hemlock 115 கோனியவெசி ருத்து.
" Ligularia, E. Neriifolia.	" Hyoscyamus 189 அயசீயம் செசிருத்து.
" Nerifolia 216 இலைக்கள்ளி.	" Lettuce 135 லத்துகவெசிரு த்து.
" Navulia 216 நியூலிக்கள்ளி.	Extractive எசிருத்திவு.
" Tirucalli 216 திரிகள்ளி.	Extractum, Extract.
Euphorbiaceae 211 யுவார்பியாசி யங்கள்.	" Conii, Extract of Hemlock.
Eupior. 232 யூபியன்.	" Hyoseyami, Extract of Hy- osciamus.
Eurycoma Longifolia 58 நெட்டிலை யுகோமமரம்.	" Lactucæ, Extract of lettuce.
Evaporated Extract உற்கமவெசி ருத்து.	" Liquidum, Liquid Extract.
Evaporation ஆவியாய் வற்றல், இ வபுருதம், உற்கமம்.	Exudation பொசிவு, ஊறல்.
" Apparatus உற்கமோபகரண ம், இவபுருதவணியம்.	Exutory, Issue.
" Dish உற்கமபாத்திரம்.	Fagraea Fragrans 157 வாசனை வ கிரீய மரம்.
" Process உற்கமமுறை.	Fahrenheit's Thermometer பாரனை த்தாபமானி.
Evolvulus Alsinoïdes விஷ்ணுகிரா ந்தி.	Farina, Flower மா, பரீனம்.
Exacum Bicolor 160 துவிவண்ண வெச்சகப்பூடு.	" Oryzae, Rice Flour.
" Pedunculatum 161 தாளெச் சகப்பூடு.	" Tritici, Wheaten Flour.
" Tetragonum 160 சதுரெச்சக ப்பூடு.	Farinaceous மாவுள்ள, பரீன.
Excipient யானம், எக்சிபியென்.	Fat கொளுப்பு, நிணம்.
Exile Tree, Exile Oleander.	Febriiuges 443 சுரக்கினிகள்.
	Fel Bovinum Purificatum, Puri- fied Ox Bile.
	Fennel Fruit 110 பெருஞ்சீரகம், வெனெல், Water 110 நீர்.
	Fenugreek வெந்தயம்.

FER	FLO
Fermentation நொதி, வேமென்ற சம்.	Ferula Galbaniflua, Galbanum Plant.
Fermentum, Yeast.	“ Assafoetida இங்குப்பூடு.
Fern வேண்டூடு. வேண் என்றவகுப்பில் நீர்வேம்பைப்போன்றவை அடங்கும்.	Fibre, Fiber இழை, வீபர்.
Feronia Elephantum, Wood Apple.	Ficus, Fig.
Ferri Arsenias, Arseniate of iron.	“ Bengalensis, Banyan Tree.
“ Carbonas, Carbonate of Iron.	“ Carrica, Fig.
“ Carbonas Saccharata, Saccharated Carbonate of Iron.	“ Glomerata 229 அத்திப்பழம்.
“ et Ammoniae Citras, Citrate of iron and Ammonia.	“ Indica, Ficus Bengalensis.
“ et Quinae Citras, Citrate of Iron and Quinia.	“ Oppositifolia 228 பேயத்திப்பழம்.
“ Iodidum, Iodide of Iron.	“ Polycarpa 229 சிறியபேயத்தி.
“ Oxidum Magneticum, Magnetic Oxide of Iron.	“ Racemosa 229 அத்தி.
“ O. Nigrum, Magnetic Oxide of Iron.	Fig 227 சீமையத்தி, தேனத்தி.
“ O. Rubrum, Hydrated Peroxide of Iron.	Filbert வில்பெட்கொட்டை.
“ Peroxidum, Hydrated Peroxide of Iron.	File அரம்.
“ Peroxidum Humidum, Moist Peroxide of Iron.	Filices 270 வீலிசிகள்.
“ P. Hydratum, Hydrated Peroxide of Iron.	Filix Mas, 270 Male Fern.
“ Phosphas, Phosphate of Iron.	Filter கலனி.
“ Potassio-Tartras, Tartarated Iron.	“ Support கலனிக்கால்.
“ Sesquioxidum, Hydrated Peroxide of Iron.	Filtering Paper கலனத்தாள், வடித்தாள்.
“ Sulphas, Sulphate of Iron.	Filtrate கலனீயம்.
Ferrocyanide of Potassium, Yellow Prussiate of Potash.	Filtration கலனம், வடித்தல்.
Ferruginous இரும்புப்புள்ள, அயக, அய.	Fine Gold தங்கம்.
Ferrugo, Hydrated Peroxide of Iron.	Fir, Abies அபீஸ் மரம்.
Ferrum, Iron.	Fishes 292 மீன்கள்.
“ Redactum, Reduced Iron.	Fish Bezoar மீனூரசனை.
“ Tartaratum, Tartarated Iron.	Fish Oil மீனெண்ணெய்.
“ Tartarizatum, Tartarated Iron.	Fixed Oil ஸ்திரதேலம், திரதேலம்.
	Flacourtia Cataphracta 34 தாளிச பத்திரி.
	Flacourtia Cataphracta is called தாளிச because resembling Cinnamomum Eucalyptoides and C Tamala.
	Flask பிளாஸ்கு. இது ஓர்வகைச் சீசா.
	Flavus-a-um, Yellow.
	Flax, common 45 லீனம், சணல்.
	Flexible Collodion 42 சவட்கலோடியம்.
	Flour, Farina மா, பரீனம்.
	Flowering Ash 46 பூவஷ்மரம்.
	Flower பூ, புஷ்பம்.

FLU	GAR
Fluggea Leugogyrus வெள்ளைப்பில் லாஞ்சி.	Fumaria Officinalis துரா.
Fluid நீர், நீர்த்த, வினாயிரம்.	“ Parviflora, F. Officinalis.
“ Extract, Liquid Extract.	Fumes தூமிகம்.
“ Magnesia நீர்மக்னிசி.	Fumigatio, Fumigation தூமீகரண ம், புமிகாசம், புகைகாட்டல்.
Flux திராவம்.	Fungus ஆம்பி, வங்கசு.
Foeniculi Fructus, Fennel Fruit.	Funnel புணல்.
Foeniculum Panmorium, F. Vul-	Furnace உலை, பேணெசு.
gare.	Furniture பேணிதூர், பணிமுட்டு.
“ Vulgare, Common Fennel.	Fused உருக்கிய.
Foenum Graecum, Fenugreek.	Fusion உருக்குதல், ஒன்றல்.
Foil பத்திரம், ரேக்கு.	
Folia, Leaves இலை.	Gab 142 தும்பிலிக்காய்.
Fomentation வமன்றாசம், உஷ்மத ம்.	Gadus Morrhua, Codfish கட்மீன்.
Formula விதி, வாழ்மலம்.	Galangal 244 அரத்தை.
Fortior, Stronger கர.	Galbanum 114 கல்பனம்.
Fortio, Strong பெலனுள்ள, வீறுள்ள	Galipea Cusparia, Cusparia.
Fowler's Mineral Solution, Arse-	Galla, Galls.
nical Solution.	Gallic Acid 224 கலிக்கமிலம்.
“ Solution, Arsenical Solution.	Gall, Bile பித்தநீர்.
Foxglove, Digitalis திச்சிதாலிஸ் பூடு.	Gallipot கலிபட்டு. இது ஓர் சிறு பி ங்காளுன கிண்ணம்.
Frankincense 60 குந்துரு.	Gallon கலன், நாலுநாழிகொண்ட நீ ரளவை.
“ Plaster குந்துருப்பிலாஸ்தர்.	Galls 222 மாசுக்காய், மாசிக்காய்.
“ Tree 232 குந்துருப்பைன்மரம்	Gallstone பித்தக்கல்.
Fraxinus Ornus, Flowering Ash.	Gallas Bankiva 294 கோழி.
“ Rotundifolia, Round Leaved	Galvanic Battery கல்வனிப்பத்திரி.
Ash.	Galvanism கல்வனியம்.
French Physic Nut இந்துவில் பூந் தோட்டங்களில் உண்டாக்க ப்படும் கடும்பேதியான தே லம் உள்ள கொட்டையையு டைய பூடு. சீமையாமணக்கு.	Gambir Plant 127 கம்பீர்ச்செடி.
Friar's Balsam 143 பிருயர்பல்சம்.	Gamboge 37 கம்போச்சு, மக்கி, இ ரேவல்சினிப்பால்.
Frog Test தவனைச்சோதனை.	Game கேம், வேட்டமாமிசம்.
Fructus, Fruit.	Gandarusa, Justicia Gendarussa.
Fruit கனி, பழம்.	Gantu Bharangi, Root of Clero-
“ of the Dog Rose 90 நாயுரோ சைக்கனி.	dendron Serratum.
Fucus Vesiculosus ஆகஸ்வெசிகு லோசஸென்ற கடற்பாசி.	Garcinia Mangostana, Mangosteen
Fuller's Earth சாரமண்.	Tree.
Fulwa Butter 141 புல்வநெய்.	“ Morella, 37 Gamboge Tree of
“ Tree 141 புல்வமரம்.	Siam சியாம்மக்கிமரம்.
	“ Pictoria 38 மூக்கிமரம்.
	“ Purpurea, 38 Kokum Butter
	Tree.
	Garcinia Purpurea Oleum, Ko-
	kum Butter 38.

GAR	GOU
GardeniaCampanulataஒர்வகைக்கு ம்பை,கடெனிகம்பனுலமரம்.	Glacial கிலாசியல்.
" Gum கும்பைப்பிசின், டிகாமல் விப்பிசின்.	Glacial Acetic acid 283 கிலாசியல் சிதிக்கமில்.
" Gummifera 128 கும்பை, டிகா மல்லி.	Glaciale, Glacial.
" Lucida 128 கும்பை, டிகாமல்லி.	Glass கிளாசு, ஆடி, கண்ணாடி.
Gargarisma, Gargarism, Gargle.	Glauber's Salt, 340 Sulphate of Soda.
" Myrrhae சசவாசமனீயம்.	Gloriosa Superba 254 கலைப்பைக்கி ழங்கு, கார்த்திகைக்கிழங்கு.
Gargle கார்கில், ஆசமனீயம்.	Glue கிளூ, வச்சிரப்பசை.
Garlic உள்ளி, வெள்ளுள்ளி, வெள் லைப்பூண்டு.	Glycerate of கலைசரது.
Gas,வாயு;illuminating G.திபவாயு.	Glycerine 146 கலைசரின்.
" Furnace வாயுவடுப்பு.	" Cream கலைசரின் கிரீம்.
" Burner வாயுத்திரி.	Glycerine of (better Glycerate of) கலைசரது.
" Stove வாயுஸ்தோவு.	Glycerine of Borax 336 போறசகி லைசரது.
Gaultheria கல்திரிப்பூடு.	" Carbolic Acid காபலிக்கமில் கலைசரது.
Gelatine 292 செலதின்.	Glycerinum, Glycerine.
Gelsemin, the active principle of yellow Jessaminஜெல்சமின்.	Glycerinum Acidi Carbolici, Gly- cerine of Carbolic Acid.
-Gen த, தம்.	Glycion கலைசியன்.
Gendarussa Vulgaris, Justicia Gendarussa.	Glycocol, Glycocin கலைசசின்
Geniosporum Prostratum 180 நில ச்செனியுஸ்போறப்பூடு.	Glycyrrhiza Glabra, Liquorice Plant. [Root.
Gentian Root 158 ஜென்சன்வேர். Tree 153 ஜென்சன்மரம்.	Glycyrrhizae Radix, Liquorice
" Kurroo 160 இமயஜென்சன்.	Gmelina Asiatica 175 செங்குமிழ்.
" Lutea ஐரோப்புஜென்சன்பூடு.	" Parvifolia 175 நிலக்குமிழ்.
Gentianaceae 158 ஜென்சியஞ்சிய ங்கள்.	Goat Bezoar கொச்சைரோசனை.
Gentianae Radix, Gentian Root.	Goat's Milk கொச்சைப்பால்.
Geranin, the active principle of Crane's bill ஜீருனின்.	Godfrey's Cordial காட்விரிஸ்காடல்.
Ghanti-gura, Pedalium Murex.	Gokeroo, (H.) Pedalium Murex.
Gillur ka putta, Laminaria Sac- charina ஓர்கடற்பாசி.	Gold பொன்.
Gin ஜின். ஓர்வெறிபானம்.	" Leaf பொற்பத்திரம்.
Ginger, dry 241 சுக்கு.	Gooseberry கூஸ்பெரிப்பழம்.
" fresh 241 இஞ்சி.	Gossypium, Cotton Wool.
Ginseng ஜின்செங்கு. இது சீனத் தில் பேரான மருந்தாகிய இ னிப்புள்ள கிழங்கு.	" Arboreum, Cotton Plant.
Gisekia Pharnaceoides 195 மணற் கோரை.	" Barbadense, Cotton Plant.
	" Herbaceum, Cotton Plant.
	Goulds Extract, Goulard's Lead Water.
	Goulard's Lead Water, Solution of Subacetate of Lead.

GOU	GUN
Gouzaban (H.) 169 குசபான்.	Green Pigment பச்சைமை.
Gracilaria Confervoides, Ceylon Moss.	" Vitriol, Sulphate of Iron.
" Lichenoides, Ceylon Moss.	Greenheart Tree 205 நெக்தண்ட மரம், பிபேரிப்பட்டைமரம்.
Graduate, Grade கிருடித்தல், பாகையிடல்.	Gregory's Powder கிரேக்குரிச்சூரணம், Compound Powder of Rhubarb.
Graduated Vessel பாகையிட்டபாத்திரம், கிருடித்தவியற்று.	Ground Nut 82 வேர்க்கடலை, நிலக்கடலை.
Grains of Paradise, Elettaria Cardamomum.	" Nut Oil 82 வேர்க்கடலைத்தேலம்.
Grain கிதேன், மணி, தானியம்.	Groundsel ஐரோப்பில் உண்டாகும் கார்ப்பும் கசப்புமுள்ள ஓர்பூடு.
Gram கொள்ளு, காணம்.	Grouse கிறவுஸ்பட்சி.
Gramineae 263 கிறமீனியங்கள்.	Guaiaci Lignum, Guaiacum Wood.
Gramme கிராம்.	Guaiacum 46 குவயகம்.
Granateae 102 கிறனாதினங்கள்.	" Resin 46 குவயகராளம்.
Granati Cortex 102 மாதளம்பழக்கோது.	" Wood 46 குவயகச்சிராய்.
" Radicis Cortex, Pomegranate Root Bark.	" Officinale 46 குவயகமரம்.
Granular or granulated கிறனுல, லவக.	Guava 102 கொய்யா.
" preparations கிறனுலசெய்வுகள்.	Gugul (H.) Bdellium.
" Citro-tartrate of Soda, கிறனுலசோடசிதிறுதாத்தரசு.	Guiding Rod விடுகோல்.
" Sulphate of Iron 377 கிறனுலவன்னபேதி.	Guilandina Bonducella, Bonduc.
" Tin 398 கிறனுலதகரம்.	Guinea Pepper, Capsicum Fruit.
" Zinc 362 கிறனுலதுத்தம்.	" Pig மறைச்சாளி.
Granulatus-a-um, Granulated.	Gujpipul (H.) Scindapsus Officinalis.
Grapes திராட்சப்பழம் முந்திரிப்பழம்.	Gulancha 17 சீந்தில்.
Grape Vine திராட்சக்கொடி, முந்திரிக்கொடி.	Gul-i-pista, Galls of Pistacia Khinjuk.
Graphite மிளீரம், தூசிக்கரி.	Gum பிசின், கழு.
Grass புல், புல்லு.	Gum Acacia 70 அகசிப்பிசின்
Grey Powder, Mercury with Chalk.	" Ammoniac, Ammoniacum.
Grease கொழுப்பு.	" Arabic 85 வேலம்பிசின், கருவேலம்பிசின்.
Greater Galanga 244 பேரரத்தை.	Gum Lancet ஈறயில், முரசுவெட்டி.
Green Hellebore 257 பச்சைக்கடுரோணி.	Gummi Acaciae, Gum Acacia.
Green Iodide of Mercury 392 இரசபச்சை வியோதிரம்.	" Rubrum, Red Gum of Eucalyptus Resinifera.
" Ginger 241 இஞ்சிக்கிழங்கு.	Gun Cotton 41 வெடிப்பஞ்சு, பைறக்கைலின்.
	Gunda Birosa (H) Olibanum.

GUN	HOFF
Gunjah (H) 227 கஞ்சா.	Helianthus Annuus சூரியகாந்தி
Gunti Paringaie (H) Root of Clerodendron Serratum 175 கண்டுபராந்தி.	விரை. Helleborus, Black Hellebore.
Gurjun Balsam 40 கர்ச்சம்பல்சம். " Tree 40 கர்ச்சமரம்.	Hemidesmi Radix, Hemidesmus Root.
Gutea-shuk-china, Root of Smilax Lanceaefolia.	Hemidesmine 151 எமிதெஸ்மின்.
Gutta percha கற்றபேட்சம்.	Hemidesmus Indicus, Indian Sarsaparilla.
Guttiferae 37 கற்றீவிரங்கள்.	" Root 151 நன்னூரிவேர்.
Guzanjabin, Manna of Tamarix Gallica.	Hemiptera 291 கெமிப்திரங்கள்.
Gymnema Sylvestre 154 சிறுகுறிஞ்சா.	Hemlock fruit 115 கோனிய கனி. " Leaves 115 கோனியவிலை.
Gynandropsis Pentaphylla 32 வேளை.	Hemostatic, Styptic.
Gynocardia Odorata, Chaulmugra. Gynocardiae Semina, Chaulmugra Seeds.	Hen 294 கோழி.
Gypsum 397 ஜிப்சம், சுண்ணசல்வசு.	Henbane Seeds 190 குராசானியோமம், அயசீயமஸ்விரை.
Haematoxyli Lignum, Logwood. Haematoxylon Campechianum, Logwood Tree எமதக்சிலமரம்.	Henna Plant 95 மருதோன்றி.
Hair-Dye மயிர்ச்சாயம். " Wash மயிர்த்தாவணி, மயிர்வளர்க்குநீர்.	Hepar Sulphuris, Sulphurated Potash.
Hamamelideae 96 கமமெலிடியங்கள்.	Herb பூடு, பூண்டு.
Hard Soap 145 வன்சபு, கட்டிச்சவுக்காரம். " Water உவாரீர், வன்னீர்.	Herbaceous Plant, Herb.
Harmul, (H.) Seeds of Peganum Harmala.	Hermodactyl 258 சுரிஞ்சான்.
Hartal, (H.) Orpiment; also a white powder of Calcined Selenite.	Hermodactylus, Hermodactyl.
Hartshorn கலைமான்கொம்பு, கலங்கொம்பு.	Herpestis Monniera 171 நீர்ப்பிரமி.
Heat Measurement சூட்டளவை.	Herring எறிங்குமீன்.
Hedychium Spicatum 245 சீமைக்கிச்சிலிப்பூடு, இமயமலைக்கிச்சிலிப்பூடு.	Hibiscus Esculentus, Okra 42 வண்டுக்காய். " Rosa-Sinensis 43 சப்பாத்துப்பூ.
	" Sabdariffa, Roselle.
	Hierapicra, Powder of Aloes and Cannella Bark.
	Hill Colocynth, Cucumis Hardwickii.
	Hilum ஜலம்.
	Himalyan Rhubarb 199 இமயவரியாத்து.
	Hip Bath ஆசனதோயம்.
	Hips, Fruit of the Dog Rose.
	Hiptage Madablata 154 குரிந்தை, சிறுகுறிஞ்சா.
	Hirudo, Leech.
	Hoffman's Anodyne Spirit, Compound Spirit of Ether ஆவ்மன்னுடைஞ்சீது,

HOG	HYD
Hog 297 பன்றி.	Hydrargyri Chloridum, Subchloride of Mercury.
Holarrhena Antidysenterica 148 கசப்பு வெட்பாலை.	" Iodidum, Green Iodide of Mercury. [Mercury.
" Pubescens, A variety of H. Antidysenterica 149 சுணைக் குளப்பாலை.	" I. Rubrum, Red Iodide of Mercury.
Holy Bitter, Hierapiera.	" I. Viride, Green Iodide of Mercury.
" Basil 178 துளசி.	" Nitrico-Oxidum, Red Oxide of Mercury.
Homoeopathy ஒமியப்பதம், சகுணகம்.	" Oxidum Rubrum, Red Oxide of Mercury.
Honey 290 தேன்.	" Perchloridum, Perchloride of Mercury.
" Bee 290 தேனீ.	" Praecipitatum Album, Ammoniated Mercury.
Hop 226 லுப்புலசு.	" Subchloridum, Subchloride of Mercury.
Hop Plant 226 அப்சுக்கொடி, லுப்புலஸ்கொடி.	" Sulphas, Sulphate of Mercury.
Hopea Odorata வாசனை யொபியமரம்.	Hydrargyrum, Mercury.
Hordei Semina, Barley.	" Ammoniatum, Ammoniated Mercury. [Chalk.
Hordeum Decorticatum, Pearl Barley.	" Cum Creta, Mercury with
" Distichon, Long Eared Barley வாற்கோதுமை.	" Corrosivum Sublimatum, Perchloride of Mercury.
Horseradish 30 அமுருசிப்பூடு.	Hydrastin, the active principle of Golden Seal ஐரஸ்தின்.
" Root 30 அமுருசிவேர்.	Hydrate ஐரசு.
" Tree 69 முருங்கை.	" of Lime சுண்ணாவரசு.
Hot Water வென்னீர்.	" of Potassium, Caustic Potash.
Hoya Viridiflora 153 பசும்பூக்கோயம்.	" of Soda, Caustic Soda.
Hub-ul-kakinj. (Ar.) Kakinj.	Hydrated Sesquioxide of Iron, Hydrated Peroxide of Iron.
Humulus Lupulus, Hop Plant.	" Peroxide of Iron 374 அயவைரசு பிரவக்சிரம்.
Hundred leaved Rose, Cabbage Rose.	Hydride of Amyl அமைலைரிம்.
Hurina-shuk-china, Tuber of Smilax Glabra.	Hydrochlorate of Ammonia, Chloride of Ammonium.
Hydnocarpus Inebrians 34 நீரடிமுத்துமரம்.	" of Morphia 27 மாவியவைருகுலோரசு.
Hydrargyri Ammonio-Chloridum, Ammoniated Mercury.	Hydrochloric Acid 308 ஐருகுலோநிக்கமிலம், உப்புத்திராவகம்.
" Bichloridum, Perchloride of Mercury.	" Solution of Arsenic 355 ஆசெனிகவைருகுலோநிகநீர்.
" Biniodidum, Red Iodide of Mercury.	Hydrochlorus Acid ஐருகுலோரோசமிலம்.
" Bisulphuretum, Bisulphuret of Mercury.	

HYD	IND
Hydrocotyle Asiatica, Indian Pennywort 117.	-Ide-idum இரம்
Hydrocyanic Acid 93 ஐருசையனிக் கமிலம்.	Ignatia Amara, Saint Ignatius Bean.
Hydrogen ஐருதம், ஐருதவாயு.	Illicium Anisatum, Star Anise 13 அண்ணாசுப்பூ.
Hydrosulphuric Acid 393 ஐருசல் வுரிக்கமிலம்.	Imperial Gallon இம்பீரல்கலன்.
Hydrosulphate of Ammonia, Sulphide of Ammonium.	Implements பணிமுட்டுக்கள்.
Hydrosulphuret of Ammonia, Hydrosulphate of Ammonia.	Impregnation சாரமேறல்.
Hygrophila Spinosa 173 நீர்முள்ளி.	Incineration சாம்பலாக்கல், பஸ்மீ கரித்தல்.
Hymenodictyon Excelsum 127 உயர்சின்கனம், விலாரி.	India Rubber கூச்சு, கூச்சுப்பிசின், விசைப்பிசின்.
Hymenoptera 290 கைமெனாப்திரங்கள்.	Indian இந்து, இந்துதேச.
Hyoscyami Folia, Hyoscyamus Leaves 189.	" Acalyphie 217 குப்பைமேனி.
Hyoscyamin 189 அயசீயமின்.	" Allspice, Eugenia Acris ஓர் வகைப்பிமெந்தம்.
Hyoscyamus 189 அயசீயமசுப்பூடு.	" Almond 93 இந்துவாதுமைக் கொட்டை.
Hyoscyamus Insarus, Mountain Hemp 192 மலைஅயசீயமஸ்பூடு.	" Barberry 19 இந்துபாபெரி.
" Niger, Henbane.	" Caoutchouc Tree சீமையாலை மரம், better இந்துக்கூச்சு மரம்.
Hyper, Super அதி.	" Corn, Maize.
Hypnotic சுத்தினி.	" Ebony 142 கருங்காலி.
Hypo, Sub அத.	" Frankincense 60 குந்துருக்கம்.
Hypochlorus Acid அதகுலோரோ சமிலம்.	" Gamboge 38 மூக்கிமரம்.
Hypophosphite of Lime சுண்ண வதபாஸ்விசு.	" Gum Arabic 85 கருவேலம் பிசின்.
Hypophosphites அதபாஸ்விசுகள்.	" Hemp 227 கஞ்சாச்செடி கோ ரக்கர்மூலி
Hyposulphite of Lime சுண்ணவத சல்விசு.	" Horse-Radish 69 முருங்கை.
" Soda 397 சோடவதசல்விசு.	" Hydrocotyle, I. Pennywort.
Hypoxideae 247 கைபக்கிடியங்கள்.	" Ipecac 152 குறிஞ்சா, நச்சுருப் பான், நச்சுமுரிச்சான், நாய்ப் பாலை, பேய்ப்பாலை.
-ic, -icum இக்.	" Jalap 167 சிவதைவோர்.
Iceland Moss 271 ஐசிலன்பாசி.	" Kino காண்டாமிருகவிரத்தம்.
Ichnocarpus Frutescens 149 பால் வள்ளி.	" K. Tree 78 வேங்கைமரம்.
Ichthyocolla, Isinglass.	" Liquorice 82 குன்றிமணி, குண் டுமணி.
Icosandra (Cleome) நாய்வேளை, பெருவேளை, நாய்க்கடுகு, கா ட்டுக்கடுகு.	" Mulberry Plant மூசுகட்டைச் செடி, கம்பளப்பூச்சிச்செடி.
	" Madder 129 மஞ்சிட்டி, செவ் வெல்லி.
	" Mustard 31 கடுகு.

IND	IRR
Indian Pennywort 117 வல்லாரை.	Inspissated தமிழ்த்த, இறுகின.
“ Peppermint புதினா, ஈவெச்சக்கீரை.	Instrument கருவி, ஆயுதம்.
“ Red Armenian Bole காவி, காலிக்கல்லு.	Inunction தருப்பு, இனங்குசம், அப்பியங்கம்.
“ Rhubarb நாட்டிரேவற்சின்னி, நாட்டுமஞ்சட் சினக்கிழங்கு.	Iodate of Potash பதாசியியோதசு.
“ Rue 48 அர்வதா	Iodide of Ammonium அமோனதவியோதிரம்.
“ Sarsaparilla 151 நன்னூரி	“ Arsenic ஆசெனிகவியோதிரம்.
“ Senna, Tinnevely Senna.	“ of Cadmium 367 கட்மியவியோதிரம்.
“ Spikenard 130 ஜடாமாசி.	“ Iron 386 அயவியோதிரம்.
“ Squill 253 நரிவெங்காயம்	“ of Lead 372 ஈயவியோதிரம்.
“ Tragacanth கதேரூப்பிசின்.	“ of Mercury இரசவியோதிரம்.
“ Walnut, Belgaum Walnut.	“ of Potasium 329 பதாசியவியோதிரம்.
“ Whiting கிழக்கன்மீன்.	“ of Sulphur கந்தியியோதிரம்.
Indication இங்கிதம்.	Iodine 309 இயோதம்.
Indigenous Drugs சுதேசமருந்துகள்.	Iodism இயோதனம்.
Indigo 397 நீலம் இந்திகு.	Iodoform இயோதவாம்.
Indigofera Tinctoria அவுரி, நீலமரம்.	Iodum, Iodine.
Indurjuo Sherin, Wrightia Tinctoria.	Ipecac 125 இபிகாக்கு.
“ Tulk, Holarrhena Pubescens.	Ipecacuarha, Ipecac.
Indrayan, Cucumis Trigonus.	“ Root 125 இபிகாக்குவோர்.
Infusion இன்ஞ்சம், கஷாயம்.	Ipecacuanhae Radix, Ipecacuanha Root 125.
“ Mug இன்ஞ்சமக்கு, கஷாயவேனம்.	Ipomoea Cymosa 168 இபுமீயசைமோசிக்கொடி,
Infusum, Infusion.	“ Sepiaria 168 இபுமீயசெபியாரிக்கொடி.
Ingredient வகை, கூறு, பாவிதம்.	“ Turpethum, Turbith Root.
Inhalatio, Inhalation.	Irideae 248 இரிடியங்கள்.
Inhalation இனலாசம், சுவசனம்.	Iridin, the active principle of Blue Flag இரிடின.
“ of Powder உறிஞ்சு.	Iron Alum அயவலும்.
“ of Hydrocyanic Acid 94 ஐருசையனிக்கமில்சவசனம்.	Iron 372 இரும்பு, அயம்.
Injection இன்ஜெக்சன், புகட்டல், நிட்சேபம், எனீமம்.	“ Dye இரும்புச்சாயம், அயவுப்புள்ள சாயம்.
Ink Nut 97 கடுக்காய், வரிக்காய்.	“ Lozenges 373 அயவில்லை.
Inoculation இனக்குலாசம், நிவேசம்	“ Rust அயசெந்தூரம், இரும்புக்கிட்டம், இரும்புக்கறை.
Insecticide இஞ்செத்துகீருகள், பூச்சிகொல்லிகள்.	Irritant Poison கிரோதநஞ்சு, அழல்நஞ்சு.
Insectifuges இஞ்செத்துகூருகள், பூச்சியோட்டி.	Irritants அழற்சி, கிரோதி.
Insoluble கரையாத, இன்சாலபில்.	-Is, -ite இசு.

ISH	KHA
Ishwurg, Rhazya Stricta.	Juice சாறு, சக்கம்.
Isinglass 292 ஐசிங்கிளாசு, மீன் வ ச்சிரம்.	Jujube கோலி.
Ispaghul 194 இஸ்பகூல்ச்செடி.	Jungli-haldi, (H.) Round Zedoary.
“ Seeds, Spogel Seeds 194 இஸ் பகூல்விதை.	Juniperus Communis 235 குனிப ச் செடி.
Issue இசு, சியன்னி.	“ Sabina 236 சபீனச்செடி.
Jadvar, (H) ஜட்வார்க்கிழங்கு. A variety of Aconite.	Justicia Adhatoda 173 ஆடாதோ டை.
Jaggery சர்க்கரை.	“ Gendarussa 173 கருநொச்சி, கறுப்புநொச்சி.
Jalap 163 ஜலப்பு, பேதிக்கிழங்கு.	Juzoogry, Antiaris Saccidora.
“ Plant 163 ஜலப்புக்கொடி.	Kaempferia Galanga 245 கச்சோ லக் கிழங்கு.
“ Resin 164 ஜலப்பிராளம்.	“ Rotunda 245 கெம்வேரியக்கிழ ங்கு.
Jalapa, Jalap.	Kaephul, (H.) 229 மருதம்பட்டை.
Jalapae Resina, Jalap Resin.	Kafur ka putta, (H.) Camphor Leaves.
Jalapine ஜலப்பின்.	“ Kachri 245 (H.) கீமைச்சிச்சிவி க்கிழங்கு.
Jame's Fever Powders ஜேம்ஸ்பற் பம்.	Kakinj, (A. P.) Punir Cardamoms.
Jam, (H) Syzigium Jambolanum.	Kaladana 166 ஜிரிகிவிரை, கொடிகா க்கடாம்விரை.
Jamaica Quassia Tree, Quassia Excelsa குவசிமரம்.	Kala Nimuk, (H.) Black Salt.
“ Sarsaparilla 239 சார்சுவேர்.	KaliKutki, (H.) Pierorrhiza Kurroa.
Jars சாடிகள்,	Kamala 214 கமாலம், கமாலமாவு.
Jasmine, Jessamine 147 மல்லிகை.	Kanni ki gond, (H.) Jingam ki gond.
Jasmineae 147 ஜஸ்மினியங்கள்.	Kariyat 172 கிரியாத்து, (Winslow) நிலவேம்பு.
Jasminum Sambac 147 மல்லிகை ப்பூ, மல்லிப்பூ.	Kashim இங்குப்பூண்டினிலையும் வி ரைகளும்.
Jatamansi, Indian Spikenard.	Kassu 71 காசுக்கட்டி.
Jateorrhiza Columba, Calumba.	Kelon, Pinus Deodara.
“ Miersii, Calumba.	Kelon-ka-tel, (H.) Turpentine of Pinus Deodara.
Jatropha Curcas, 215 English Physic Nut காட்டாமணக்கு	Kernel பருப்பு.
“ Glandulifera 216 ஊதனை.	Kerula, (H.) பாகற்கொடி.
“ Multifida, 215 French Physic Nut பலவிரலியத்திரோவப் பூடு.	Khari mun, (h.) இந்துவில் விளையு ம் சோடசல்வசு.
Java Almonds 60 எலெமிப்பருப்பு.	Khari nun (H.) இந்துவில் விளையும் சோடசல்வசு.
Jeremie's Laudanum ஜெரிமிஸ் லாடனம்.	Khar-suji, (H.) 195 கார்சூசி.
Jingam ki gond, (H) 69 ஒதியம்பி சின்.	
Jinjili Oil, Sesamum Oil.	
Juglans, Walnut.	

KHI	LEA
Khilal, (H.) <i>Salix Caprea</i> .	Lactifuges லத்துஆகுகள், பாலோட்டி.
Kholinjan, (H.) Greater and Lesser Galangal.	Lactometer சீரமானி.
Khorasani Ajwain, 190 (H.) குராசானியோமம்.	Lactuca, Lettuce.
Khus-khus Grass, (H.) Cuscus Grass.	“ <i>Sativa</i> சல்லாத்துவிரை.
Khino 78 கீஜ், சீமைக் காண்டாமிருக இரத்தம்.	“ <i>Virosa</i> 134 லக்தாகப்பூடு.
Kira-mar, (H.) 211 ஆடுதின்னாப்பாலை.	Lactucarium 135 லக்தாகசம், லக்தாகவெசிறுத்து.
Kisavi Dal, Seeds of <i>Lathyrus Sativus</i> .	Lagondi, (M.) 174 நீர்நொச்சி, சிறுநொச்சி.
Kohi bung, Mountain Hemp.	Lal-dana, (H.) This means Red Seed, Shapussundo செம்விரை.
Kokum Butter 38 கோகநெய்.	Lamp Oil விளக்கெண்ணெய், காட்டாமணக்கந்தேலம்.
Koot Root 138 கோஷ்டவேர்.	Lancet அயில்.
Kootki, <i>Picrorrhiza Kurroa</i> .	Lapis, Stone கல்.
Koussou 91 குசோ.	“ <i>Calaminaris</i> , Calamine.
Krameria <i>Ixina</i> பிரசில் தேசத்துக் கிரமேரிச்செடி.	“ <i>Divinus</i> , Cuprum Alumina-tum, Aluminated Copper.
“ <i>Triandra</i> 35 கிரமேரிச்செடி.	“ <i>Infernalis</i> , Nitrate of Silver.
“ Root 35 கிரமேரிவேர்.	“ <i>Tutiae</i> , Tutty.
Krameriae Radix, Krameria Root.	Lard 297 லாடு, கிடயம், பன்றிறெய், அதெப்சு.
Kreat, Kariyat or Creat 172 நிலவேம்பு.	Larger Cardamom பெரிய ஏலக்காய், காட்டேலக்காய்.
Kuchila ke molung காஞ்சிரமரத்திலுண்டாகும் ஓர் குருவிச்சி.	Large Sebestens 168 பெரியநறுவிவி.
Kundar, Bitter Mastich.	Lasora, (H.) Sebestens.
Kundarum (P.) Sweet Mastich.	Lathyrus <i>Sativus</i> 88 கிசாரிப்பூண்டு.
Kundar-rumi, Mastich.	Laudanum 25 Tincture of Opium.
Kursing, <i>Bignonia Xylocarpa</i> .	Lauraceae 202 லொரூசியங்கள்.
Kurwut, <i>Antiaris Saccidora</i> .	Laurel. Cherry Laurel.
Kusso, Koussou	Laurocerasi Folia, Cherry-Laurel Leaves.
Kutira Gam, Gum of Yellow Flowered Cotton Tree.	Lavander 476 லவந்தர்பூடு.
Labels லேபல், பேர்.	Lavandula Carnosa 180 கர்ப்பூரவள்ளி,
Labelling லேபலிடுமுறை.	“ <i>Vera</i> , Lavender.
Labiatae, 176 லபியாதிபங்கள்.	Lawsonia Alba 95 Henna Plant.
Laboratory லபுறதுரி, பக்குவசாலை, வேலையறை.	Laxative இளம்பேதி, சுகபேதி.
Lac, Milk.	Lead 368 ஈயம், வங்கம், பிளம்பம்.
“ Gum தோலி, அரக்கு.	Leadwort 180 சித்திரமூலம், கொடிவேலி.
Lacmus, Litmus.	
Lactate லக்தசு.	

LEA	LIG
Leaf Tobacco 190 புகையிலை, தபாக்கி இலை.	Lime Fruit 53 எலுமிச்சம்பழம்.
Ledebouria Hyacinthoides 254 சிறுநரிவெங்காயம், சிறுகாட்டுவெங்காயம்.	" Tree 53 எலுமிச்சை.
Leech 286 அட்டை, சலுகை, லீச்சு.	" Water 345 Solution of Lime.
Lees, Lee, Lye.	Limon, Lemon.
Legume or Pod நெற்று.	Limonis Cortex, Lemon Peel.
Leguminosae 70 லெகுமினோசியங்கள்.	" Succus, Lemon Juice.
Lemon 51 சம்பம், லெமன், பேரெலுமிச்சை, பெரியவெலுமிச்சை.	Limpid தெளிந்த, உருவொளி.
" Juice 51 சம்பச்சாறு.	Linctus, Confection.
" Grass 268 காமாக்கிப்புல், வாசனைப்புல், காவட்டம்புல்.	Lineae 45 லீனியங்கள்.
" Oil 51 சம்பந்தேல்.	Lini Farina, Linseed Meal.
" Peel 51 சம்பந்தோல்.	" Semina, Linseed.
Lenitive லெனிதிவு, அழற்சியைத் தணிக்குமருந்து.	Liniment லினிமென், லேபனம்.
Lepidium Sativum ஆளிவிரை.	" of Turpentine and Acetic Acid தர்ப்பந்தினசிதிக்கமில லினிமென்.
Leptandrin, the active principle of Veronica Virginica லெப்டண்டின். [ஹரந்தை.	Linimentum, Liniment.
Lesser Galangal 244 இரத்தை, சிறு	" Cantharidis, Blistering Liquid.
Lesser Melaleuca, Cajuput Tree.	" Terebinthinae Aceticum, Liniment of Turpentine and Acetic Acid.
Lettuce 134 லக்தூகப்பூடு	Linseed 45 அலிசிவிரை, லீனம், லீனக்கொட்டை.
Leucas Aspera 180 சொறிலுகஸ்பூடு.	Meal 45 லீனமா.
Levis, Light லகு, அபார	" Oil 45 அலிசியெண்ணெய், லீனத்தேலம்.
Lichenes 271 லைகெனிகள்.	Lint லிந்து, லிந்தியம்.
Lichen Rotundatus, Parmelia Perlata.	Linum, Linseed Flax 45.
Liebig's Condenser லீபிக் கனீகரணி.	Linum Usitatissimum, Linseed, 45.
Light Carbonate of Magnesia 351 அபாரமக்னீசிகாபனசு.	Liquid நீர், நீர்த்த.
" Magnesia 350 அபாரமக்னீசி.	" Extract நீரெகிரூத்து, நீர்வலேகம். [ருத்து.
Lignin லிக்னின்.	" E. Ergot 265 ஏர்கற்று நீரெகி
Lignum, Wood, சிராய், தடி, மரம்.	" E. Opium 25 அவினீரெகிரூத்து.
" Colubrinum, Wood of Strychnos Colubrina.	" Storax நெரியரிசிப்பால்.
" Vitae, Guaiacum Wood.	" Tar தாரெண்ணெய்.
Liliaceae 249 லிலியாசியங்கள்.	Liquidambar Altingia 97 நன்தாயக்குமரம்.
Lime 344 கல்சி, சுண்ணம், சுண்ணாம்பு.	" Orientale, Storax Balsam Tree 96 ஸ்தைராக்ஸ்பல்சமரம்.
	Liquidus-a-um, Liquid.
	Liquor, Solution.
	" Ammoniae, Solution of Ammonia.

LIO	LUF
Liquor Ammoniae Fortior, Strong Solution of Ammonia.	Litharge, Oxide of Lead.
" Arsenicalis, Arsenical Solution.	Lithargyrum, Litharge.
" Arsenici Chloridi, Solution of Chloride of Arsenic.	Lithia 342 லிதீ.
" Arsenici Hydrochloricus, Hydrochloric Solution of Arsenic.	" Water, Effervescing Solution of Lithia 343.
" Calcis, Solution of Lime.	Lithiae Carbonas, Carbonate of Lithia 342.
" C. Saccharatus, Saccharated Solution of Lime.	" Citras, 343 Citrate of Lithia.
" Epispasticus, Blistering Liquid.	Lithium 342 லிதியம்.
" Ferri Perchloridi, Solution of Perchloride of Iron.	Litmus 272 லித்மசு.
" F. P. Fortior, Strong Solution of Perchloride of Iron.	" Paper Blue 272 நீலலித்மஸ் தாள்.
" F. Pernitris, Solution of Pernitrate of Iron.	" P. Red 273 சிவத்தலித்மஸ் தாள்.
" F. Persulphatis Solution of Persulphate of Iron.	" Tincture 272 லித்மசிரஞ்சம்.
" Hydrargyri Nitratis Acidus, Acid Solution of Nitrate of Mercury.	Lixiviation சாரநீரிதக்கல்.
" Lithiae Effervescens, Effervescing Solution of Lithia.	Load Stone காந்தக்கல்.
" Plumbi Subacetatis, Solution of Subacetate of Lead.	Loaf sugar லோவுச்சீனி, பருங்கட்டியானவெள்ளைச்சீனி.
" Potassae Arsenitis, Arsenical Solution.	Lobelia 139 லொபீலிப்பூடு.
" Potash 320 பதாசினீர்.	" Inflata லொபீலிப்பூடு.
" P. Effervescens, Effervescing Solution of Potash.	" Nicotianaefolia 140 லொபீலி நிகுதிப்பூடு. [கள்.
" Sodae Chloratae, Solution of Chlorinated Soda.	Lobeliaceae 138 லொபீலியாசியங்கள்.
" S. Effervescens, Effervescing Solution of Soda.	Local தானிக.
" Volatilis Cornu-Cervi, Spirit of Hartshorn.	Lodoicea Sechellarum கடற்றேங்காய்
Liquorice Plant 82 அதிமதுரப்பூடு.	Loganiaceae 154 லொகனியாசியங்கள்.
" Root 82 அதிமதுரவேர்.	Logwood 76 எமதக்கிலசிராய்.
Liquorice Extract 83 அதிமதுரம்பால். அதிமதுரப் டான், அதிமதுரச்சிறுத்து.	Long Peper 220 தப்பிலி, பிப்பிலி,
	" Zedoary 244 கிச்சிலிக்கிழங்கு, பூலாங்கிழங்கு.
	Loranthaceae 119 லொரந்தாசியங்கள்.
	Lotio, Lotion.
	" Hydrargyri Flava, Yellow Mercurial Lotion.
	" H. Nigra, Black Mercurial Lotion.
	Lotion லோஷன், தாவணி.
	Loxa Bark, Pale Cinchona Bark.
	Lozenge வில்லை, லட்டுநம், லாசெங்கு.
	Luffa Amara 106 லெப்ட்டிர்க்கம்.

LUN	MAS
Lunar Caustic, Nitrate of Silver.	Majoon, (H). கஞ்சாலேகியம்.
Lupulina, Lupuline.	Malabar Cardamom, Officinal C.
Lupuline 226 லுப்புலின்.	“ Catmint 179 பேய்வெருட்டி, பேய்மருட்டி, இரட்டைப்பேய்மருட்டி.
Lupulus, Hop 226.	Malabathri Folia, Tudje.
Lycopodium லைகுபொடியம்.	Male Fern 270 ஆண்வீலிக்ஸ்பூடு.
Lye சாம்பல்நீர், லைநீர்.	“ Pomegranate பூமாதனை.
Lythrarieae 95 லைத்ராரியங்கள்.	Male Shield Fern, Male Fern.
Lytta Assamensis 299 லித்தவச மேஞ்சி, அசாம் தேசத்துக் கொப்புளவண்டு.	Malic Acid மலிக்கமிலம்.
“ Gigas 290 லித்தசிகாசு, ஓர்வ கைக் கொப்புளவண்டு.	Malkungi, (H.) Celastrus Pani- culata.
“ Violacea 290 லித்தவியொலா சி, ஓர்வகைக்கொப்புளவண் டு.	Malleability பலகத்துவம், மலியபி லமை.
Maceration ஊறவைத்தல், மசிருத ம், மசுறித்தல்.	Mallotus Philippinensis, Kamala.
Mace 202 ஜாதிபத்திரி.	Mallow, Malva Sylvestris மால்வ ப்பூடு. இது வாணியுள்ளது.
Maculatus-a-um, Spotted.	Malvaceae 41 மல்வாசியங்கள்.
Madder மடர்பூடு, இதின்வேர் செம் மஞ்சட்சாயம்.	Mammalia 295 மமலியங்கள்.
Magistery of Bismuth, Subnitrate of Bismuth.	Mandrake, Podophyllum.
Magnesia 349 மக்னீசி.	Manganesii Oxidum Nigrum, Black Oxide of Manganese.
“ Levis, Light Magnesia 350.	Mangifera Indica, Mango Tree.
“ Usta, Light Magnesia 350.	Mango மாங்காய்.
Magnesiae Carbonas, 350 Carbo- nate of Magaesia.	“ Ginger 241 மாவிஞ்சி.
“ C. Levis, Light Carbonate of Magnesia 350.	“ Tree 63 மாமரம்.
“ Sulphas, Sulphate of Mag- nesia 351.	Mangosteen 39 மங்குஸ்தீன்.
Magnesium 349 மக்னீசியம்.	Manihot Utilissima மரவள்ளிக்கி ழங்கு, ஆள்வள்ளிக்கிழங்கு.
Magnet காந்தம்.	Manna மன்னா.
Magnetic Oxide of Iron 373 அய காந்தவக்சிரம்.	Mannite மன்னசு.
Magnetism காந்தசாரம்.	Marble மாபிள், மாபிட்கல்.
Magnoliaceae 12 மக்னோலியாசிய ங்கள்.	Marc சக்கை.
Mahwa Spirit, S. of Bassia La- tifolia Flowers. [பை.]	Margosa 61 வேம்பு.
Mahwa Tree 141 இலுப்பை, இருப்	“ Toddy வேப்பங்கள்ளு.
Mainsil, (H). Realgar.	Marking Nut 68 சேங்கொட்டை சேராங்கொட்டை.
Maize மக்காசோளம், மேசு.	Marmor Album, White Marble.
	Marrubium Malcolmianum, Micro- meria Capitellata.
	Marshmallow, Althaea Officinalis அல்தீயப்பூடு.
	Mass திரளை, கட்டி.

MAS	MIN
Mastic, Mastiche, Mastich.	Mentha Piperita, Peppermint.
Mastich 67 மஸ்திகு, இருமிமலைத்தி, பூனைக்கண் குங்கிலியம்.	“ Sativa, Indian Peppermint.
Materia Medica 9 பதார்த்தசாரம்.	“ Viridis, Spearmint.
Maticae Folia, Matico Leaves.	Mercurial Liniment 386 இரசலினி மென்.
Matico Leaves 219 மதிகவிலை.	“ Pill 396 இரசகுளிகை.
Matrass மாட்டசு, கலசம்.	“ Plaster 388 இரசபிலாஸ்தர்.
Ma-ul-khilaf, Destillate from Flowers of Salix Caprea கிலாவுபன்னீர்.	Mercurialization இரசமேறல்.
Maximum கருட்டம், மக்சிமம்.	Mercurical Ointment 387 இரச வன்கென்.
Measure அளவை, மேசர்.	Mercury 386 இரசம், இதரம், ஐராச் சிறம்.
Meadow Saffron, Colchicum.	“ with Chalk 387 இரசகிரீதம்.
Mecca Balsam, Balm of Gilead மெக்கபலசம்.	Meriandra Bengalensis 180 வங் காளமெரியாண்டப்பூடு.
Meconate of Lead ஈயமெகனசு.	“ Strobilifera 180 ஸ்திரோபிலி மெரியாண்டப்பூடு.
Meconic Acid மெகனிக்கமிலம்.	Mesua Ferrea 39 மெசுவவெறியம், நாகசாப்பூமரம்.
Meconin மெகனின்.	Met or Meth சிறதுதேசத்தில் சீனக் காரம் அரைக்கால் பங்குள்ள மண்.
Medical Dictionary மிடாரம்.	Metallic லோக, மெதல.
Medicated Water மருத்துநீர்.	“ Base லோகவடி.
Medicinal Dose அலுவததேயம்.	“ Ore ஆகரி.
Medium மாத்தியம்.	Methide மெதிரம்,
Mel, Honey.	Mezerei Cortex, Mezereon Bark.
“ Boracis, Borax Honey.	Mezereon Bark 200 மெசிரீயபட்டை.
“ Depuratum, Clarified Honey.	Mica அப்பிரகம், மீகம், மீகக்கல்.
Melaleuca Leucodendron, Lesser Melaleuca.	Mica Panis, Crumb of Bread.
“ Minor, Lesser Melaleuca.	Michelia Champaca 14 சம்பங்குப் புஷ்பம், சண்பகம், சம்பகம்.
Melanorrhoea Usitatissima, Bur- man Black Varnish Tree 69.	Micromeria Capitellata 179 இந் துப்பெப்பமிந்துப்பூடு.
Melanthaceae 255 மெலந்தாசியங் கள்.	Milk பால், சீரம்.
Meliaceae 61 மெலியாசியங்கள்.	“ Globule பாற்குலிகம், பாலிம்மி.
Melia Azedarach 63 மலைவேம்பு, மலைவேப்பம்.	Milk-hedge Plant 216 கள்ளி, கள் ளிக்கொம்பு.
Meloe Trianthema 290 மெலுவித் திரியந்திமம்.	Mimops Elengi 141 மொகடம்.
Menispermaceae 14 மெனிஸ்பெர் மாசியங்கள்.	Mineral ஆகரி, மினிறல்.
Menispermnin, the active principle of Yellow Parilla மெனிஸ் பேமின்.	Mineral Acid ஆகரியமிலம்.
Menstruum, Solvent விலயனி, மெ னஸ்துறம்.	“ Poison ஆகரிநஞ்சு.
	Minim துளி, மினிம்.
	Minimum லேசகம், மினிமம்.

MIN	MYL
Minium, Red Oxide of Lead ஈயச் சிவப்பு.	Morung Elachi 245 வங்காளவேலம், மொருங்கேலாச்சி.
Mirabilis Jalapa 196 பத்தருசு.	Moschus, Musk.
Mishimi Tita, Coptis Teeta.	“ Moschiferus 295 கஸ்தூரிமான்.
Mistura, Mixture.	Moss பாசி.
“ Ferri Aromatica, Aromatic Mixture of Iron.	Motha, (H). Cyperus Rotundus.
“ Ferri Composita, Compound Mixture of Iron.	Mould சக்கு, பூஞ்சு.
Mitchell's Lamp மிச்செல்விளக்கு.	Mountain Hemp 192 மலைஅயசீய மஸ்பூடு.
Mite, Mitis, Mild தண், மென்.	Mowa Tree, Mahwa Tree.
Mitigans, Lenitive.	Moxa மக்சம்
Mitius, Mild தண், மென், கிருசு.	Mucherus 43 முச்செரசு.
Mixture மிஸ்தூர், மிசிரம், கலவை, விரவு.	Mucilage முசிலாகு, சியானம்.
Miswak, (H). Salvadora Oleoides.	“ of Acacia 71 அகசிமுசிலாகு.
Moist Peroxide of Iron 374 அய வீரபிரவக்ஷிரம்.	“ of Starch 267 ஸ்தாட்சுமுசிலாகு, அமைலமுசிலாகு, தடித்தநெல்லரிசிமாக்கஞ்சி.
Mollugo Cerviana பர்ப்படாகம், பற்படாகம்,	Mucilago, Mucilage.
Momeerea, Root of Thalietrum Foliosum,	“ Amyli, Mucilage of Starch.
Momordica Charantia பாகற்கொடி.	Mucuna Pruriens, Cowhage.
Monkshood, Aconite.	Mudar 151 எருக்கு, எருக்கம்.
Monocotyledones 239 ஏககதிலீதங்கள்	Mudarine முடாரின்.
Mori Succus, Mulberry Juice.	Mulberry 227 பூஷம், மல்பெரி.
Moringae 69 மொரிங்கியங்கள்.	“ Juice 227 பூஷச்சாறு.
Moringa aptera 70 ஓர்வகைமுருங்கை.	Muller குழவி.
Moringa Pterygosperma 69 Indian Horse Radish.	Mummy மமி, வறுச்சுவம்.
Morphia 27 மாவியம்	Munjeth, (H). Indian Madder.
Morphiae Acetas, Acetate of Morphia.	Munsa sij, (B). Euphorbia Nerii-folia.
“ Hydrochloras, Hydrochlorate of Morphia.	Murdannia Scapiflora 247 நிலப்பனைக் கிழங்கு, முர்தனியஸ்காபி விலோறம்.
“ Murias, Hydrochlorate of Morphia.	Muriate of Ammonia, Chloride of Ammonium.
Mortar for pounding உரல், துவை உரல், அம்மி.	Muriatic Acid, Hydrochloric Acid.
“ for grinding அரையுரல், குழி	Murraya Konigii 57 கருவேப்பினை, கருவேம்பு.
Morus Indica, Indian Mulberry.	Musa Sapientum கதலிவாழை.
“ Nigra, Black Mulberry கரும் பூஷம்.	Musaceae 245 முசாசியங்கள்.
	Mushroom மஷிறுங்காளான்.
	Musk 295 கஸ்தூரி.
	Mustard 31 கடுகு.
	“ Poultice 31 கடுகுப்போட்டிசு.
	Mylabris Cichorii 289 Telini Fly மைலாபிரிச்சிகுரிவண்டு.

MYL	NIT
Mylabris Humeralis 290 மைலாபியுமராலி.	Nardostachys Jatamansi, Indian Spikenard 130 ஜடாமாசி.
“ Indica 290 மைலாபிரிஹந்துகம்	Nardus Indicus, Indian Spikenard.
“ Melanura 290 மைலாபிரிமெலனூரம்.	Native Sulphur விளைகெந்தகம், இயல்கெந்தகம்.
“ Orientalis 290 மைலாபிரியோரியந்தல்.	Nauclea Ovalifolia 128 வட்டவிளைச்சால்மரம்.
“ Proxima 290 மைலாபிரிப்பிற்சீமம்.	Nausadar, (H). Sal Ammoniac.
“ Punctum 290 மைலாபிரிப்பந்தம்.	Nectandra Rodiaei, Greenheart Tree 205 நெக்தண்டமரம்.
“ Pustulata 290 மைலாபிரிப்பஸ்துலாது.	Nectandrae Cortex, Bebeeru Bark.
Mysicht's Elixir Vitriol மைன்சிக்லிக்சவித்திரல்.	Neem, Nim, Margosa.
Myrica Sapida 229 மருதமரம்.	Neemooka (B). Pareira Brava.
Myricene 229 மிரைசியங்கள்.	Negative இருண்.
Myristica, Nutmeg.	Nepal Sassafra 208 நிபால்சசுவிரஸ்பட்டை. [ஓர்நீர்.
Myristica Malabarica 202 மலையாளச்சிடம்.	Nepenthe நிபெந்தி. இது அவினாள்ள
Myristiceae 201 மைநிஸ்திசியங்கள்.	Nephrodium Filix Mas, Male Shield Fern.
Myrobalans Tree 97 தான்றிமரம்	Nerium Odorum, Sweet Scented Oleander.
Myroxylon Pereirae, Peru Balsam Tree.	Neroli Oil நெலுவித்தேலம்.
“ Toluiferum, Tolu Balsam Tree.	Nervine நேவின், சிராகம்.
Myrrh 59 சசம், வெள்ளைப்போளம்.	Neurotic, Nervine.
Myrrha, Myrrh.	Neutral தடஸ்த.
Myrtaceae 99 மெர்தாசியங்கள்.	Nicotiana Tabacum, Tobacco 190 தபாக்கப்பூடு, புகையிலை.
Mysore Gamboge மைசூர்மக்கி.	Nicotianin 190 நிகுதியானின்.
Nagesur, Nag-Kesar.	Nicotin 190 நிகுதின்.
Nag-Kesar 39 நாகசாப்பூ	Nigella Sativa 13 கருஞ்சீரகம்.
Nagurmotha, (H). Cyperus Per-tenuis.	Nilakiri Nux Vomica Loranthus நீலகிரிக் காஞ்சிர புல்லுருவி.
Nan ta Youk, (B). Liquidambar Altingia Tree.	Nil tutiya (H). நீலத்துத்தம், Sul-phate of Copper
Naphtha நவ்தம். இதுகற்றூரின்அதிகநீர்த்ததும் வெள்ளையுமானபகுதி.	Nim, Neem, Margosa Tree.
Nercein 23 நாகின்.	Nima Quassioides, Brucea Quassioides.
Narcotic மஸ்து, கிராகி, நாகதிகம்.	Niter, Nitrate of Potash.
Narcotina, Narcotine.	Nitrate நீதுரசு.
Narcotine 29 நாகுதின்.	“ of Lead 371 ஈயநீதுரசு.
Narcotism, Narcosis கிராகசம்.	“ of Mercury இரசநீதுரசு.
	“ of Potash 325 பதாசினீதுரசு, வெடியுப்பு, பொட்டிலுப்பு.
	“ of Silver 395 வெள்ளிநீதுரசு, காடிச்சாறம்.

NIT

Nitrate of Soda சோடீந்ராக், இந் துப்பு, சிலம், By some miscalled Rock Salt.
 Nitric Acid 311 நீதுரிக்கமிலம், பொட்டிலுப்புத்திராவகம்.
 Nitrite நீதுரிசு.
 Nitrogen, Azote 311 நீதுருசம். இது பரமானுவில் ஐந்தல்நா லுபங்காயுள்ள வாயு.
 Nitrogenous Element நீதுருசசாத னம்.
 Nitro-hydrochloric Acid 313 நீது ருவைருகுலோறிக்கமிலம்.
 Nitropicric Acid, Carbazotic Acid.
 Nitrous Ether நீதுரோசீதர்.
 Non-absorbent அப்சாபெனற்ற. See Absorbent Medicine.
 Nostrum நாசடம், கட்டுமருந்து.
 Notonia Corymbosa, 137 a variety of N. Grandiflora செண்டு நொதோனி.
 " Grandiflora 137 பெரும்பூநொ தோனி.
 Nuti or Nutiya, (B.) Amaranthus Spinous 195 நுதியம்.
 Nut கொட்டை.
 Nutmeg Tree 200 சிடமரம்.
 Nutmeg 201 சிடம், சாதுக்காய்.
 Nutritive போஷண, போஷணையு ள்ள.
 Nux Vomica 154 காஞ்சிரமரம், கா ஞ்சிரங்கொட்டை, எட்டிக் கொட்டை.
 Nyctaginaceae 196 நிக்தச்சினுசிய ங்கள்.
 Nymphaea Edulis அல்லி, அல்லித் தாமரை, ஆம்பல்.
 Oak 221 ஒக்கு, ஒக்மரம், குவேகஸ் மரம்.
 " Galls ஒக்மாசக்காய்.
 " Bark 221 குவேகஸ்பட்டை.
 Oats ஒந்சு, ஒந்ஸ்தானியம்.
 Ochre ஒகர், காலிமண்.
 Ocimum Album கஞ்சாங்கோரை, நாயித் துளசி.

OIN

Ocimum Basilicum 178 திருநீற்றுப் பச்சை, திருநீற்றுப்பத்திரி.
 " Gratissimum 179 எலும்ச்சந் துளசி.
 " Menthoides நிழல்நாகை.
 " Pilosum 179 மயிர்த்துளசி.
 " Sanctum 178 துளசி.
 Odina Wodier 69 ஒதி, ஒதியமரம்.
 Official வாகட, வாகடமுறையான
 " Cardamom 242 ஏலம்.
 -oid வ, வம், Eng டு.
 Oil எண்ணெய், தேலம், தேல், தெல்.
 " Almond 92 வாதுமைத்தேலம்.
 Anethum 111 அனீதத்தேலம்.
 " Cajuput கயபுட்டேலம், கை யர்ப்புடைதேலம்.
 Caraway 108 கறுவித்தேலம்.
 Castor 213 ஆமணக்குத்தேலம்
 Cinnamon 206 கறுவாத்தேலம்,
 Cloves 101 கரம்புத்தேலம்;
 " Copaiva 73 கபேவத்தேலம்.
 Coriander 112 மல்லித்தேலம்.
 " Croton 213 வாளதேலம்.
 " Juniper சூனிபதேலம்.
 " Lavender லவந்தர்தேலம்.
 " Lemon 51 சம்பந்தேல்.
 " Lemon Grass காவட்டந்தேலம்
 " Olive 144 ஒலீவதேலம்.
 Oum 109 ஒமத்தேலம்.
 " Peppermint 177 பெப்பமிந்து தேலம்.
 Pimento 101 பிமெந்ததேலம்.
 " Rose 90 ரோசைத்தேலம்.
 " Rosemary ரோஸ்மரிதேலம்.
 " Rue 48 அறுதத்தேலம்.
 " Spearmint ஸ்பீர்மிந்துதேலம்.
 " Theobroma 44 தியுபுரோமதே லம்.
 " Turpentine 231 தர்ப்பந்தீன், கர்ப்பூரதேலம், தெறிபிந்த தேலம்.
 " Vitriol, Sulphuric Acid.
 " Valerian 129 வலீரியந்தேலம்.
 Ointment அன்கென், லேபம்.


OIN	OX A
Ointment, Aconitia 10 அகனிதசவன்கென்.	Ophelia Elegans 160 அழகுசிரட்டூடு.
" Coculus Indicus 17 காக்காய்கொல்லியன்கென்.	Ophiorhiza Manghos 129 கீரிபுரண்டான். கீரிப்பூடு.
" Galls and Opium மாசவவினன்கென்.	Ophioxylon Serpentinum 150 பாம்புச்சைலம்.
" Zinc துத்தவன்கென்.	Opianine 23 ஒபியனின்.
Okra, Edible Hibiscus.	Opium 22 அவின். அபினி, கசகசாப்பால், ஒபியம்.
Oldenlandia Umbellata இம்புரா வேர், சிறுவேர் இம்பூறல்.	" Enema 26 அவினெனீமம்.
Olea Europaea, European Olive.	" Wine 25 அவின்வைன்.
Oleaceae 144 ஒலியாசியங்கள்.	Opodeldoc ஒபுடெல்லு.
Oleander அலரி,	Opuntia Dillenii நாகதாளி.
Oleum Oil.	Orange 50 கிச்சிலிப்பழம். கொழுஞ்சிப்பழம், தோடை.
" Cajuputi, Oil of Cajuput.	" Flower 50 தோடம்பூ.
" Crotonis, Croton Oil.	" Peel 50 தோடந்தோல்.
" Juniperi, Oil of Juniper.	Orchella Weed 272 லிற்மஸ்பாசி.
" Lavandulae, Oil of Lavender.	Organic இந்திர, ஓர்கன்.
" Limonis, Oil of Lemon.	Oriental Sassafras Wood, Cinnamonum Parthenoxylon கிழக்குப்பூமிச் சசுவிரஸ்மரம்.
" Menthae Piperitae, Oil of Peppermint.	Orpiment, Tersulphide of Arsenic 356 அரிதாரம்.
" Menthae Viridis, Oil of Spearmint.	Orris Root ஈறிஸ்கிழங்கு.
" Morrhuae, Cod-Liver Oil.	Oryza Sativa, Rice.
" Nigrum, Black Oil.	Oryzae Farina நெல்லரிசிமா.
" Olivae Olive Oil.	-osum-ous ஓசு.
" Piscis, Fish Oil.	Os, ossa, Bone.
" Ricini, Castor Oil.	" Usteem, Bone ash.
" Rosmarini, Oil of Rosemary.	Ounce அன்சு.
" Rutae, Oil of Rue.	" Fluid நீர்ன்சு.
" Terebinthinae, Oil of Turpentine.	Outfit முஸ்திப்பு.
" Theobromae, Oil of Theobroma. [பானம்.	" Medical வைத்தியமுஸ்திப்பு.
Olibanura 60 குந்துருக்கம், ஒலி	" Surgical சத்திரீகமுஸ்திப்பு.
Olive Oil 144 ஒலீவதேலம், ஜை	Ovi Vitellus, Yelk of Egg.
தூன் எண்ணெய்.	Ovum Egg.
" Tree 144 ஒலீவமரம்.	Ox Bile கோபித்தநீர்.
Omum, Oman 109 ஒமம்.	Ox Gall, Ox Bile.
" Water 109 ஒமநீர்.	Oxalate of Ammonia 397 அமோ
Onion வெங்காயம், ஈரவெங்காயம்	னவக்சலசு.
Ophelia Angustifolia 160 ஒடுக்கி	" Cerium சீரியவக்சலசு.
லைச்சிரட்டூடு.	" Lead ஈயவக்சலசு.
" Densifolia 160 சடைச்சிரட்டூடு.	" Silver வெள்ளியக்சலசு.
	Soda சோடவக்சலசு.

OXA	PEN
Oxalic Acid 397 அக்சலிக்கமிலம். of Commerce கடையக்சலி க்கமிலம்.	Papayaceae 107 பபயாசியங்கள்.
Oxalis Corniculata புளியாரை.	Paper கடுதாசி, காகிதம், தாள்.
Oxidation அக்சிரித்தல்.	Paraffine 284 பரவின்.
Oxide, Oxidum அக்சிரம்.	Paradise Grains, Cardamoms.
“ of Antimony 356 அந்திமனி யக்சிரம். [சிங்கு.	Paramorphia 23 பரமாவியம்.
“ Lead 363 ஈயவக்சிரம், முதார்	Paregoric Elixir, Compound Tinc- ture of Camphor பெரிகாதி க்கு.
“ Silver வெள்ளியக்சிரம்.	Pareira Brava 15 பரைரக்கொடி.
“ Zinc 362 துத்தவக்சிரம்.	“ Root 15 பரைரவேர்.
Oxygen அக்சிதம், பரமானுவில் ஐந் தில் ஒருபங்காகிய வாயு.	Pareirae Radix, Pareira Root.
Oxymel 282 அக்சிமெல், கரடிதேன்.	Parmelia Perforata கற்பாசி, கல்ப் பூ.
“ Scillae, O. of Squill.	“ Perlata 273 வட்டுக்கற்பாசி, கல்ப்பூ.
“ of Squill 253 ஸ்குவிலக்சிமெல்.	Parrish's Chemical Food பறசர் கெமிஸ்தவுணவு.
Pachydermata 297 பகிடேமங்கள்.	Paste பசை, களி, பேஸ்து.
Pah சின்றுதேசத்தில் அலுமுள்ள ஒ ர்வகை மண்.	Patchouli 180 பச்சூலித்துளிர்.
Pale Catechu 127 செங்காசுக்கட்டி.	Patent ஆதீன, திறந்த.
“ Cinchona Bark 123 வெண்சின் கனட்டை.	Patthar ha phul (H) Parmelia Perlata.
Palliative தணிக்கிற, சாந்திசெய்கிற.	Pavonia Zeylanica சிற்றாழுட்டி.
Palmaceae 259 பல்மாசியங்கள்.	Peach பீற்சுபழம்.
Palmyra 260 பனை.	Pear பியேர்பழம்.
“ Toddy 260 பனங்கள்ளு.	Pearl Barley பேள்பாளி. நன்றாய்த் திட்டினவாற்கோதுமையரிசி.
“ Tree 260 பனைமரம்.	Pectoral பெக்தூரல், நெஞ்சுக்குரிய.
Palo, Impure Extract of Gulan- cha சீந்திலெசுருத்து.	PedaliuM Murex 162 பெருநெரு ஞ்சி, ஆணைநெருஞ்சி.
Panacea பனசீயம், சர்வாவுஷதம்.	Pediluvium பததோயம், பெரினூவி யம்.
Panax Pseudo-ginseng 118 நேபா ளஜின்செங்கிழங்கு.	Peel, Rind தோல்.
Pandanus Odoratissimus தாழை.	Peepla mool 220 பிப்பில்முலம், தி ப்பிலிவேர்.
Panis, Bread அப்பம், பனிசு.	Peganum Harmala சீமையழுவனை.
Panmuhri பெருஞ்சீரகக் கனி.	Pellitory of Spain 135 அக்கிராக் காரம், பைரீதிரப்பூடு.
Papaveraceae 21 பபாவிராசியங்கள்	“ Root 135 பைரீதிரவேர், அக்கி ராக்காரம்.
Papaverin 23 பபாவிரின், கசகசாசம்.	Penny Royal, Pulegium புலீச்சிமி ந்துப்பூடு.
Papaver Rhoeas, Red Poppy.	Penwar Pait, (M) Eurycoma Longifolia.
“ Somniferum, White Poppy.	
Papaveris Capsulae, Poppy Cap- sules.	
Papaw Tree 107 பப்பளிச்செடி, பப் பாவி.	

PEP	PIC
Pepper, Black 218 மிளகு.	Pharbitisin 167 ஜிரிகிராளம், வா பீதிசின்.
“ Long 220 திப்பிலி.	Pharmaceutics பார்மகுடீயம், சிகிச் சாவாகடம்.
“ Red 191 மிளகாய்.	Pharmacy சிகிச்சம், பார்மசி.
Peppermint 177 பெப்பமிந்துப்பூடு.	Phenic Acid, Carboic Acid.
“ Water 177 பெப்பமிந்துநீர்.	Phitkari (H.) அசுத்த பதாசியலும்.
Pepsin பெப்சின், பசனம்.	ஒர்வகைப் பருக்கன் சினக்கா ரம்.
Pepsina Porci பெப்சினபோர்சி.	Phoenix Dactilifera, Date.
இது அசீரணத்துக்கு நல்ல மருந்து.	“ Sylvestris, Wild Date.
Per பிர. [நிரம்.	Phosphate பாஸ்வசு.
Perchloride of Iron அயபிரகுலோ	“ of Ammonia அமோனபாஸ்வசு.
“ Mercury 390 இரசபிரகுலோநி	“ Iron 375 அயபாஸ்வசு.
ரம், சவ்வீரம், வீரம்.	“ Lime 349 கல்சிபர்ஸ்வசு.
“ Platinum பிலாடினபிரகுலோ	“ Soda 336 சோடபாஸ்வசு.
நிரம். [னம்.	Phosphene பாஸ்வின்.
Percolation பெர்குலாசம், சியந்த	Phosphoric Acid 302 பாஸ்வரிக் கமிலம்.
Perennial Plant பலவாட்டைப்பூடு.	Phosphorus 301 பாஸ்வரம்.
Perfume வாசனை.	Phulwara (H.) Fulwa.
Permanganate of Potash 326 பதா	Phyllanthus Emblica, Emblic Myrobalans. 216 நெல்லி.
சிபிரமங்கனசு.	Phyllanthus Niruri 217 கீழ்காய் நெல்லி, கீழாநெல்லி,
Pernuriate, Perchloride.	“ Urinaria 217 சிவப்புநெல்லி.
Pernitrate பிரநீதுரசு.	Physalis Alkekengi, Winter Cherry.
“ of Iron அயபிரநீதுரசு.	“ Somnifera, Withania Som- nifera.
Peroxide பிரவக்சிரம்.	Physeter Macrocephalus, Sperm Whale.
“ of Iron அயபிரவக்சிரம்.	Physostigma Venenosum 80 வை சுதிக்கமகொடி.
Per-Salt பிரவுப்பு.	Physostigmatis Faba, Calabar Bean.
Persulphate of Iron அயபிரசல்வசு.	Phytolaccaceae 195 வைதுலக்காசி யங்கள்.
Peru Balsam 77 பெருபல்சம்.	Phytolaccin, the active principle of Poke Root வைதுலக்சின்.
Peru Balsam Tree 77 பெருபல்ச மரம்.	Pickle ஊறுகாய், அடைகாய், பிக் குல், ல. பிக்குலித்தல்.
Periwinkle பெரிவிங்குல். இதுசீமை	Picraena Excelsa, Quassia Tree.
யிலுள்ள துவரான ஓர் பூடு.	Picric Acid, Carbazotic Acid.
Pessary பெசரி.	
Pessus, Pessum, Pessary.	
Pestle உலக்கை, பெசில்.	
Petal பெதல், அல்லி. See Sepal.	
Petroleum 284 Rock Oil பெற்றோ	
லியம்.	
“ Ether பெற்றோலியவீதர்.	
Pewter வெள்ளியம், பியூட்டர். இது	
தகரமும் ஈயமும் மிகுதியா	
ய்ச்சேர்ந்த கலவைலோகம்.	
Pharbitis Nil, Kaladana,	
“ N. Ruber 166 வெள்ளைஜிரிக	
லிசை.	

PIC	PIX
Picrorrhiza kurroa 171 கைச்சல் தண்டான்பூடு, கைச்சல் கு ரோயப்பூடு.	Pimpinella Anisum, Anise.
Picrotoxin, Picrotoxin 16 பிக்கு தாக்கின்.	Pine 231 பைன், பைன்மரம்.
Picrotoxic Acid பிக்குதக்கிக்கமில்ம்	Pine Apple அன்னதாழை, அஞ்சப் பழம்.
Pila Jari, Thalictrum Foliosum Root பீதவேர். இதுபீனைசா றியோ?	Piney Dammar, White Dammar வெள்ளைடாமர்.
Pill குளிகை, பில்.	Piney Tallow வெள்ளைக்குன்றிக நெய்
“ Aloes and Assafoetida சகை யிங்குக்குளிகை.	Pint பைன்று, அரைநாழி.
“ Aloes and Iron சகையயக் குளிகை.	Pinus Deodara 237 தேவதாரிப் பைன்.
“ Aloes and Myrrh 249 சகை சசக்குளிகை.	“ Longifolia 237 சீமைத்தேவ தாரி, நெட்டிலைப்பைன்மரம்.
“ of Colocynth comp'd 104 கலுசிந்துக்கூட்டுக் குளிகை.	“ Palustris, Swamp Pine 231 சதுவற்பைன்.
“ of colocynth and Hyoscy- amus 104 கலுசிந்தயசீயமசு க் குளிகை.	“ Sylvestris, 234 Wild Pine or Scotch Fir காட்டுப்பைன்.
“ of Socotrine Aloes 249 சொ கோத்திரசகைக்குளிகை.	“ Taeda, Frankincense Pine 231 குந்துருப்பைன்மரம்.
“ Machine குளிகையந்திரம்.	Pipe clay வெண்களிமண், பைப்பி ளெய், வெண்கிளெய்.
“ Tile குளிகைப்பலகம்.	Piper, Pepper.
Pilu (H.) 182 களர்வா, கார்கொள் மரம், பிலா.	Piperaceae 218 பைபராசியங்கள்.
Pilula, Pill.	Piper Angustifolium, Matico Plant
“ Aloes et Assafoetidae, Pill of Aloes and Assafoetida.	“ Betel 220 வெற்றிலை.
“ Aloes et Ferri, Pill of Aloes and Iron.	“ Chaba சாப்பு, ஜாப்பம் மொள ச்சகீவிலுள்ள மிளகு.
Pilula Aloes et Myrrhae, Pill of Aloes and Myrrh.	“ Dichotomum தேசாவரம்.
“ Calomelanos Composita, Compound Pill of Sub- chloride of Mercury.	“ Longum, Long Pepper.
“ Hydrargyri, Mercurial Pill.	“ Nigrum, Black Pepper.
“ Hydrargyri, Subchloridi Composita, Compound Pill of Subchloride of Mercury.	Pistachis Nut, Ground Nut 82 நிலக்கடலை.
Pimenta, Fimento.	Pistacia Cabulica 67 கபூல்பிஸ்தகி மரம்.
Pimento 101 பிமெந்தம்.	“ Khinjuk, similar to P. Ca- bulica Tree. 67 கிஞ்சுக் பிஸ்தகிமரம்.
	“ Lentiscus, Mastich Tree.
	Piston பிஸ்தன், தாம்பியம்.
	Pitch பிற்சு.
	“ plaster 231 பிற்சுப் பிலாஸ்தர்.
	Pix, Pitch.
	“ Burgundica, Burgundy pitch.
	“ Liquida, Tar.

PLA	POS
Plane தளம்.	Pod pepper, Capsicum fruit.
“ Inclined சாப்தளம். [கள்.	Podophylli resina, Podophyllum resin.
Plantagineae 194 பிளந்தச்சினியங்	“ radix, Podophyllum root.
Plantago Ispaghula, Spogel Seeds 191 இஸ்பகூல்ச் செடி.	Podophyllin, the active principle of May Apple பொடுவிலின்.
Plantain 245 வாழை.	Podophyllum Emodi 18 இமயமலைப் பொடுவிலப்பூடு.
Plasma பிளஸ்மம். வர்ப்பசம்.	“ Peltatum பொடுவிலப்பூடு.
Plaster பிலாஸ்தர், பற்று.	“ resin 19 பொடுவிலராளம்.
“ machine பிலாஸ்தரியந்திரம்.	“ root 18 பொடுவிலவேர்.
“ of Paris, Gypsum.	Pogostemon patchouli 180 பச்சுலிப்பூடு.
Platina, platinum.	Polanisia Icosandra நாய்வேனை.
Platinum பிலாடினம்.	Polygaleae 35 பொலிக்கலியங்கள்.
“ Black 397 பிலாடினக்கறுப்பு.	Polygala Crotalarioides 36 குரோதலரியடுப்பொலிக்கலம்.
“ Foil பிலாடினபத்திரம்.	“ Senega 35 செனிகப்பூடு.
Pledget தக்கை.	“ Telephioides 36 தெலிவியடுப்பொலிக்கலம்.
Plug அடைப்பம்.	Polygonaceae 197 பொலிக்கனாகியங்கள்.
Plum Tree பிளம்மரம். இது ஒரு கொட்டையையும் நிரம்பசாற்றையுமுள்ள சின்னப்பழத்தையுடைய சிறுமரம்.	Polyporus Anthelminticus புழுக்கொல்லி ஆம்பி.
Plumbagin 131 பிளம்பசின்.	Pomegranate 102 மாதனைச்செடி.
Plumbagineae 180 பிளம்பச்சினியங்கள்.	Pomegranate Root Bark 102 மாதளவேர்ப்பட்டை.
[ரம்.	“ Rind 102 மாதளம்பழத்தோல்.
Plumbago, Graphite தாசிக்கரி, மினீ	Ponderosus-a-um, Heavy.
“ Cupensis கருங்கொடி வேர், கறுப்புச் சித்திரமூலம்.	Pongamia Glabra 87 புன்கு, புங்கன், புங்கமரம்.
“ Rosea 180 சிவப்புச் சித்திரமூலம், செங்கொடிவேலி.	Poppy 21 கசகசா.
“ Zeylanica 180 வெண்சித்திரமூலம், வெண்கொடிவேலி.	“ Capsule 21 கசகசாக்காய்.
Plumbi Acetas, Acetate of Lead.	“ Head, P. Capsule.
“ Carbonas, Carbonate of Lead.	Porcelain போசிலன். இது ஓர்வகை மெல்லிய பீங்கான்.
“ Iodidum, Iodide of Lead.	Porphyroxin பாவிரூக்கின்.
“ Nitras, Nitrate of Lead.	Porridge பாறிச்சு, கூழ், குழம்பு.
“ Oxidum, Oxide of Lead.	Porter போட்டர். இது ஓர் நொதி வெறிபானம்.
“ O. Rubrum, Red Oxide of Lead.	Portia Tree பூவாசனை.
Plumbum, Lead.	Port Wine போட்டைவன்.
Plurals, in Latin, are formed, many of them, thus; the Singular in <i>us</i> , becomes in the plural, <i>i</i> ; in <i>a</i> , becomes <i>ae</i> ; in <i>r</i> , becomes <i>res</i> ; in <i>um</i> becomes <i>a</i> . In Greek <i>α</i> , becomes <i>ατα</i> .	Positive தன.
	Posological தேய.



POT	PRU
Potash, Potassa.	Powder of Algaroth, Oxide of Antimony.
“ water, Effervescing solution of potash 322.	“ Folder சரைக்கருவி.
“ with lime சுண்ணப்பதாசி.	“ packet of சரை.
Potassa பதாசி. See Potassium.	Praecipitatus-a-um, precipitated.
“ caustica, Caustic potash.	Praeparatus-a-um, prepared.
“ cum calce Potash with lime.	Precipitate அதகம், அடையல்.
“ sulphurata, Sulphurated potash.	Precipitated அதக, பிறசிபிதாத.
Potassae Acetas, Acetate of potash	Precipitated Carbonate of Lime 316 அதகசுண்ணம்.
“ Bicarbonas, Bicarbonate of potash.	“ Sulphur 304 அதககந்தி.
“ Bichromas, Bichromate of potash.	Precipitation அடைதல். [பருதம்.
“ Bitartras, Acid tartrate of potash.	Preparation செய்வு, ரகிதம், பிரெப்
“ Boro-tartras, Borotartrate of Potash.	Prepared பூத.
“ Carbonas, Carbonate of potash	Prepared Chalk 346 பூதகிரீதம்.
“ Chloras, Chlorate of potash.	“ Cassia 74 பூதக்கொன்றைக்கனி.
“ Citras, Citrate of potash.	“ Storax 96 பூதஸ்தைரக்க.
“ Hydras, Caustic potash.	“ Suet 296 பூதசீபம், பூதநிணம், சுத்தசூவெற்று.
“ Nitras, Nitrate of potash.	Prescription கற்பிதம்.
“ T. Acida, Acid Tartrate of potash.	Press பிறெசு, பாரசி, அழுக்கு.
Potassii Bromidum, Bromide of potassium.	Preventive வாரணி, உற்பாலனி.
“ Iodidum, Iodide of potassium.	Prickly Galega முக்காவேனை.
“ Sulphuretum, Sulphurated potash.	Principle சாதனம்.
Potassio-Tartrate of Soda, Tartrated Soda.	Prism பிரிசம், நிபாபிதி.
Potassium 319 பதாசியம்.	Prismatic Color தனசியநிறம், நிபாபிதவருணம்.
Pothos Officinalis, Scindapsus Officinalis.	Crystal பிரிசபடிசம்.
Poultice 267 போட்டிசு, புற்கை, பாப்பை.	Probe சலாகை, சோதனி, புரோபி.
Pound இருததல்.	Process முறை, கிருத்தியம்.
“ fluid, நீரிருத்தல்.	Product பேறு.
Powder பொடி, சூரணம், பற்பம், பல்விசு. For vegetable powders சூரணம், and for mineral powders பற்பம் may be most appropriate.	Products of fermentation and distillation 275 நொதிப்புத் திஸ்திலிப்பாலாகும் பதார்த்தங்கள்.
	Proof spirit 276 கிருசஸ்பிநிது, புருவிஸ்பிநிது, புருவுசீது.
	Prophylaxis புரெவிஸாக்கம், ரோகநிவாரம், உற்பாலனம்.
	Prot புர. [நிரம்.
	Protochloride of Tin தகரபுரகுலோ
	Protoxide of Iron அயபுரவக்கிரம்.
	Prune 94 புருணம், அல்பொகாடா பழம்.
	Prunum, Prune.

PRU	QUA
Prunus Domestica , Plum Tree 94.	Pulvis Kino cum Opio , Compound powder of Kino.
“ Laurocerasus , Cherry Laurel.	Pumice Stone பமிஸ்கல்.
Prussic Acid , Hydrocyanic Acid.	Pumpkin பூசணி, பங்கின்.
Psidium Pomiferum , Red Guava.	Puneer , Punir.
“ Pyriferum , White Guava.	Pungent உறைப்பான, கார்ப்பான.
Psoralea Corylifolia கார்போகரிசி, கார்புவாவரிசி.	Pung-ma-theing , (B.) Blumea Grandis .
Pterocarpus Lignum , Red Sandal-Wood.	Punica Granatum , Pomegranate.
Pterocarpus Marsupium , Indian Kino Tree.	Punir or Punirbad , Puneeria Coagulans புனீர்என்ற சிறுசெடி.
“ Santalinus , Red Sandal Wood. [ஓமம்.	Punir Cardamoms , Dried fruit of Puneeria Coagulans .
Ptychotis Agjowan , Omam plant	Puniria Coagulans 193 புனீர்ச் செடி.
“ Coptica , Omam plant ஓமம்.	Punir-ja-fota , Punir Cardamoms.
“ Roxburghianum , Carum R.	Purgative விரேசனம், பேதி.
Puhari Indrayan , Hill Colocynth.	Purging Cassia 73 கொன்றை, சரக்கொன்றை.
Pulp சதை, களி, பல்பு, பல்பம்.	“ Croton 212 நேர்வாளம்.
Pulpa , Pulp.	Purificatus-a-um , Purified.
Pulverulent Silver மாவெள்ளி பொடியானவெள்ளி.	Purified Oxalic acid 397 சுத்தஆக்சலிக்கமில்லம்.
Pulvis , powder.	“ Ox Bile , 296 சுத்தகோபித்தம்.
“ Amygdalae Compositus , Compound powder of Almonds.	Purple Chiretta தூமிரசிரட்டுச்சி.
“ Antimonialis , Antimonial powder.	Purus , Pure சுத்த, பூத.
“ Aromaticus , Compound powder of Cinnamon.	Putchuk Root , Koot Root,
“ Cinnamoni Compositus , Compound powder of Cinnamon.	Pyrethri Radix , Pellitory Root.
“ Cretae Aromaticus , Aromatic powder of Chalk.	Pyro!igneous Acid பைறுலிக்னசமில்லம்.
“ C. A. cum Opio , Aromatic powder of Chalk and Opium.	Pyroxyline , Gum Cotton.
“ Ipecacuanhae Compositus , Compound powder of Ipecacuanha.	Pyrrhosia Horsfieldii , Wild Nutmeg.
“ Ipecacuanhae cum Opio , Compound powder of Ipecacuanha.	Pyrus Cydonia , Quince.
“ Kino Compositus , Compound powder of Kino.	Quack Medicine சத்தும மருந்து.
	Qualify தகையாக்கல்.
	Qualitative Analysis தன்மையனாலிசு, சத்துவவனாலிசு.
	Quantitative Analysis அளவையனாலிசு, மாத்திராவனாலிசு.
	Quart நாழி.
	Quassia Excelsa 57 குவசிமரம்.
	“ Wood 57 குவசிச்சிராய்.
	Quassiae Lignum , Quassia Wood.

QUA

Quassine 57 குவசீன்.
 Quercus Cortex, Oak Bark.
 Quercus, Oak.
 " Infectoria, Gall Oak.
 " Robur, 221 Common Oak.
 Quicklime, Unslaked Lime புட்டி யாத சுண்ணம்.
 Quicksilver, Mercury.
 Quietness powder அமைதிப்பொடி.
 Quince 94 சீமைமாதானை, குவிஞ்சு.
 " Seeds 94 குவிஞ்சுக்கொட்டை சீமைமாதாளங்கொட்டை.
 Quinia 121 கினியம், சுரப்பட்டைச் சத்து.
 Quiniae Sulphas, Sulphate of Quinia 121 கினியசல்வசு.
 Quinine, Quinia, 121 கினியம்.
 Quinovin கினுவின்.
 Quinidine 123 கினிடின்.
 Quisqualis Indica, Rangoon Creeper 99.
 Radish முள்ளாங்கி.
 Radix, Root கிழங்கு, வேர், மூலம்.
 " Chinesis, China Root.
 Rae-Suna, (H) Leaves of Berthelotia Lanceolata.
 Rai, Indian Mustard.
 Rain water மழைத்தண்ணீர்.
 Raise Madre de Deos, Root of Gmelina Asiatica.
 Raisins ரேசின், திராட்சப்பழ வற்றல், உலர்ந்த திராட்சப்பழம்.
 Raiz de Cobra, Aristolochia Indica.
 Randia Dumetorum 128 மருக்களாஞ்செடி.
 Rangoon Creeper 99 இரங்குன் மல்லி.
 Ranunculaceae 9 ரனன்குலாசியங்கள்.
 Raphanus Sativus, Radish.
 Rasot, Watery Extract of Indian Barberry 20,

RED

Raspberry ராஸ்பெரி, ராஸ்பெரிப் பழம்.
 Rat tail file எலிவாலரம்.
 Raw Sugar, Crude Sugar கருஞ்சீனி பருசருக்கரை.
 Reaction பிரதிகாரம், மீன்செயல்.
 Reagent புனர்காரி பிரதிகாரி.
 Realgar, Bisulphuret of Arsenic.
 Reaumur's Thermometer ரோமர் தாபமானி.
 Receiver 276 ஆதானி ஏந்தி, ஏனம்.
 Rectified Spirit 276 திட்டஸ்பிறிது, திட்டசீது.
 Red Armenian Bole சீமைக்காவி, பூக்காவி, சீமைக்காவிக்கல்லு.
 " Arsenic Realgar.
 " Catechu 127 செங்காசுக்கட்டி.
 " Cinchona Bark 124 செஞ்சின் கனப்பட்டை.
 " Cotton Tree 43 முள்ளிலவு, முள்ளிலவமரம்.
 " Guava 102 சிவப்புக்கொய்யாமரம்.
 " Gum 79 செங்கீனு, யுகலிப்தஸ் செம்பிசின்.
 " Iodide of Mercury 393 இரச செவ்வியோதிரம்.
 " Lead, Red Oxide of Lead,
 " Oxide of Lead ஈயச்சிவப்பு, ஈயசெவ்வக்கிரம்.
 " Oxide of Mercury 388 இரச செவ்வக்கிரம்.
 " Phosphorus செம்பாஸ்வரம்.
 " Poppy 21 செங்கசகசா, சிவப்புபோஸ்தகா.
 " Precipitate, Red Oxide of Mercury.
 " Prussiate of Potash 398 பதாசிசெம்புருசியசு.
 " Rose 89 செவ்வரோசை.
 " Sandal Wood 79 செஞ்சந்தனச்சிராய்.
 " Sorrel, Roselle.
 " Sulphur செங்கந்தி, சிவப்புக்கெந்தகம்.

RED	ROS
Red Sulphuret of Mercury, Bi-sulphuret of Mercury.	Rhizome, Root Stalk ரிசோம், நிலத் தண்டு, வேர்த்தண்டு.
“ Wood செம்மரம்.	Rhoeados Petala, Red Poppy Petals.
Reduced Iron 372 வியுத்தவயம்.	Rhomb, Rhombus ரம்பம், சாசிகம்.
“ I. Lozenges 373 வியுத்தவய வில்லை.	Rhombic ரம்ப, சாசிக.
Reducing Agent, Flux.	Rhubarb 197 வரியாத்து, இரேவற் சின்னி, மஞ்சட்சினக்கிழங்கு.
Reduction Process வியுத்தகரணம்.	“ Root 197 வரியாத்துக்கிழங்கு.
Reel for String தாம்பூரில்.	Rhus Succedanea 67 காக்கடசிங்கி, கற்கடகசிங்கி.
Refined Silver 394 சுத்தவெள்ளி, பூதவெள்ளி.	Rice 267 நெல்.
“ Sugar சுத்தசீனி, பூதச்சீனி.	“ Flour 267 நெல்லரிசிமா.
Reh வடமேற்கிந்துவில் விளையும் சோடசல்வசு.	Ricini Semina, Castor Oil Seeds.
Resin 233 குங்கிலியம், ராளம்.	Ricinus Communis, Castor Oil Plant.
“ Ointment 233 இராளவன்கென், குங்கிலியச்சேர்வை.	Ringworm Shrub சீமையகத்தி, வண்டுகொல்லி.
“ Plaster 233 இராளப்பிலாஸ்தர்.	Roasting வறுத்தல்.
Resina, Resin.	Rocella Fuciformis லங்கை லிற் மஸ்பாசி.
Resolvent, Discutient.	“ Tinctoria, Orchella Weed.
Restorative ரெஸ்தோரதி, உயிர்ப் பிக்குமருந்து.	Rochelle Salt, 341 Tartrated Soda.
Retort மூஷிகை குடுக்கை.	Rock Oil மண்டைலம், மண் எண்ணெய், பெற்றோலியம், (Petroleum).
“ Stand குடுக்கைதாங்கி.	“ Salt கட்டியான கறியுப்பு. See Nitrate of Soda.
Rhamneae 65 ரம்னியங்கள்.	Rodentia 298 ரோடென்சிகள்.
Rhamni Succus, Buckthorn Juice.	Rohun Bark 63 செம்மரப்பட்டை.
Rhamnus Catharticus 65 ரம்னஸ் செடி.	“ Tree 63 செம்மரம்.
Rhatania, Rhatany.	Roll Sulphur தடிக்கெந்தகம்.
Rhataniae Radix, Rhatany Root, Krameria Root.	Root, fibrous வேர்.
Rhatany, Krameria.	“ bulbous கிழங்கு.
Rhazya Stricta 150 ராசையம்.	Rosaceae 89 ரோசாசியங்கள்.
Rhei Radix, Rhubarb Root.	Rosa, Rose.
Rheine நீன்.	Rosae Caninae Fructus, Fruit of the Dog Rose 90.
Rheum, Rhubarb.	“ Centifoliae Petala, Cabbage Rose Petals 90.
“ Emodi 199 Indian Rhubarb எமோதியவரியாத்து.	“ Gallicae Petalla, Red Rose Petals 89.
“ Moorcroftianum, Indian Rhubarb 199 மூர்குரோவ்வரியாத்து.	Rose ரோசை.
“ Webbianum, 199 Indian Rhubarb வெபுவரியாத்து.	“ Confection 89 ரோசைலேகியம்.
Rhinacanthus Communis 174 ராகமல்லி.	

ROS	SAL
Rose Water 90 ரோசைநீர்.	Saccharated Carbonate of Iron 375
Rosella சிவப்புக்காசுருக்கீரை, சீமை க்காசுருக்கீரை.	அயகாபனசுச்சர்க்கரை.
Rosemary 178 ரோஸ்மரிச்செடி.	" Solution of Lime சுண்ணச் சீனிநீர்.
Rosmarinus Officinalis ரோஸ்மரிச் செடி.	Saccharum, Sugar.
Rotten-stone, Tripoli.	" Lactis, Sugar of Milk.
Rottlera Tinctoria, Mallotus Phi- lippinensis, Kamala.	" Officinarum, Sugar Cane.
Rough Bryony முசுமுசுக்கை.	" Purificatum, Refined Sugar.
Round-leaved Ash 146 வட்டவிலை யத்தமரம்.	Safed Chandan(H) வெண்சந்தனச் சிராய்
Round Zedoary 244 கஸ்தூரிமஞ் சள்.	" Musli (H). 247 சவீர்மூஸ்லி.
Roylea Elegans 180 அழகுரோயிற் பூடு.	" Sumbul (H.) Arsenious Acid.
Rubefacient 457 ருபிவாஷன், சோ ணதி.	Safety Lamp சேமதீபம்.
Rubiaceae 120 ரூபியாசியங்கள்.	" Tube சேமக்குழல்.
Rubia Cordifolia, 129 Indian Madder.	" Valve சேமயாரி.
" Tinctoria, Madder.	Saffron 248 குங்குமப்பூ, குங்கும்பூ.
Rue 47 ரூப்பூடு, அறுதம்.	" Crocus, 248 Saffron.
Rum இறம். இது ஓர் வகைச் சா ராயம்.	Sage, Salvia சல்வியம், சல்வியப் பூடு.
Rumicin, the active principle of Yellow Dock ருமிசின்.	Sago சவ்வரிசி.
Ruminantia 295 ருமினான்சிகள்.	Saint Ignatius' Bean கயப்பங்கொ ட்டை.
Rumex Vesicarius சுக்காங்கீரை.	Saji mitti (H.) 195 சாசிமித்தி.
Rusa-ka-tel, (H.) 268 ருசுகதெல், Oil of Andropogon Pach- nodes.	Sakir rumi, Kundar rumi.
Rusot, Rasot.	" Shirin (P.) Kundarun.
Rust கறை, ரீதி.	" Talkh (P.) Kundar.
Rutaceae 47 ருதாசியங்கள்.	Salajet (H.) சலசேற்று, நிபாலலும்.
Ruta Angustifolia, Indian Rue.	Sal Ammoniac, Chloride of Am- monium.
" Graveolens, Rue.	Salep சாலாமிரிசி.
Rye இரூய், 263 இரூய்த்தானியம்.	Sal Pohychrest, Sulphate of Po- tash.
Sabadilla, 257 Cevadilla சபதிலம்.	Salicinum, Salicin சலிசைன்.
Sabinae Cacumina, Savin Tops.	Salicornia Brachiata 195 சிற்றுமரி.
Sacchari Foex, Treacle.	" Indica 195 பேருமரி.
Saccharine சர்க்கரையான, சீனி யுள்ள.	Salifiable உப்பாக்கக்கூடிய.
	Saline உற்பித, லாவண, சலீன்.
	" Residue லாவணசேஷம், எஞ் சியவுப்பு.
	Salix Caprea 225 கிலாவு (Kalif) மரம்.
	" Tetrasperma 225 ஆற்றுப் பாலை.
	Salsolaceae 195 சல்கலாசியங்கள்.

SAL	SCR
Salsola Indica 195 நிலவுமரி.	Sarsaparilla 239 சீமைநன்னூரி, சார்சுவேர்.
Salt உப்பு, லவணம்.	Sarub (H) Pinus Longifolia.
“ Common 337 கறி யுப்பு,	Sassafras Officinalis 204 சசுவிரஸ்
Saltpeter, Niter, Nitrate of Potash.	மரம்.
Salvadora Indica 182 பெருகளர்	“ Root 204 சசுவிரஸ்வேர்.
வா, கார்டொள் மரம், பெரு	“ Radix, Sassafras Root,
ம்பினூ.	Sassafrin 204 சசுவிரின்.
“ Oleoides, S. Indica.	Saturate பூர்த்தித்தல்.
“ Persica 182 சிறுகளர்வா, சிறு	Saturated Solution பூர்த்திவிலய
ப்பினூ.	னம்.
“ Wightiana, pilu 182 களர்வா.	Saturation பூர்த்தம்.
Salvadoraceae 182 சல்வடிரூசியங்	Savanilla Rhatany பிரசில் கிரமே
கள்.	ரிச்செடியின் வேர்.
Salvia Officinalis, Sage.	Savin சபீனம்.
Sambuci Flores, Elder Flowers.	“ Tops சபீனத்துளிர்.
Sambucus Nigra 119 சம்பூகச்செடி.	Scale செதிள்.
sand Bath for heating மணல்மத்	Scales தராசு, ஸ்கேல், ஸ்கேல்கள்.
திகம்.	Scammoniae Radix, Scammony
“ B., a remedy, மணற்றோயம்.	Root.
Sandal Wood 208 சந்தனக்கட்டை.	“ Resina, Scammony Resin.
sandoricum Indicum சேவமரம்.	Scammonium, Scammony.
Sanguinarin, the active principle	Scammony 164 ஸ்கமுனி, சகமுனி
of Blood Root சங்குனூரின்.	யா, மாமுதா.
Sanguisuga Medicinalis, Speckled	“ Resin 165 ஸ்கமுனிராளம்.
Leech புள்ளியட்டை.	“ Root 164 ஸ்கமுனிவேர்.
“ Officinalis, Green Leech, பச்	Scheele's Green சீலர்பச்சை.
சையட்டை.	“ Prussic Acid சீலர் புருசிக் க
Santalaceae 208 சந்தலாசியங்கள்.	மிலம்.
Santalin 80 சந்தலின்.	Scilla, Squills.
Santalum Album, Sandal Wood.	Scindapsus Officinalis 262 அத்தித்
Santonica 132 சந்துனின், பூடு.	திப்பிலி, ஆணைத்திப்பிலி.
Santonin 132 சந்துனின்.	Scitamineae 241 சிற்றமீனியங்கள்.
Santoninum, ! Santonin.	Scoparii Cacumina, Broom Tops.
Sapindus Emarginatus, Soap Nut.	Scoparin ஸ்கொபாரின்.
Sapo, Soap.	Scoparius 84 ஸ்கொபாரி.
“ Durus, Hard Soap.	Scopolia Lurida 192 ஸ்கபோலிப்
“ Mollis, Soft Soap.	பூடு.
Sapotaceae 141 சபுதாசியங்கள்.	“ Acubata 55 மிளகரணை.
Sappan Wood 87 வத்தாங்கி, வத்	Scrophulariaceae 159 ஸ்கிறவுலரி
தேக்கு, வர்தங்கி.	யாசியங்கள்.
Sarsae Radix, Jamaica Sarsapa-	Scruple ஸ்குருபல். இது இருபது
rilla.	கிறேன் (Grain) கொண்ட
	நிறை.

SCU	SIM
Scutellarin, the active principle of Skullcap ஸ்குதெலாரின்.	Sesqui-carbonate of Ammonia அமோன சார்த்த காபனசு.
Sebestens 168 நறுவிலிப் பழம்.	“ chloride of Antimony அந்தி மனி சார்த்தகுலோதிரம்.
Sebum or Sevum, Suet ஆட்டுக் கொழுப்பு, ஆட்டுநிணம், சீபம்.	Seton வேசிதம், சீத்தன்.
Secale Cereale, Rye.	“ Needle திரியூசி, சீத்தனூசி.
“ Cornutum, Ergot.	Sevum Praeparatum, Prepared Suet.
Secalina 264 செகலீனம், ஏர்கற்சத்து	Sewur, Rhazya Stricta.
Secamone Emetica 153 செகமோனிச் செடி.	Shagreen சுருத்தோல், சகரீன்.
Sedative, as soothing சாந்தனி, செரதீவம்.	Shal, (H.) Nauclea Ovalifolia Tree.
“ as lessening force, Depres-sant.	Shapussundo, (B) Seeds of Ipomoea Cymosa and I. Sepiaria.
Sediment அடையல், மண்டி, வண்டல்.	Shark சுரு.
Seeds விரை, கொட்டை, விதை.	Sheep 295 ஆடு.
Seidlitz Powder சைட்லிப்பற்பம்.	Sherry 275 செரிவைன்.
Semecarpus Anacardium, Mark-ing Nut.	Shop கடை, சிகிச்சை
Semen Santonicum, Santonica Seeds.	Shora (H.) வெடியுப்பு, அசுத்தப தாசி நீதுரசு.
Semina, Seeds, Nuts.	Shorea Robusta 40 குங்கிலியமரம்
Senecionin, the active principle of Life Root செனிகியோனின்.	Shower Bath பாட்டத்தோயம்.
Senega Root 35 செனிகவேர்.	Shrub செடி.
Senegae Radix, Senega Root.	Sialagogue 458 சையலேகாக்கு, உமிழ்நீரை ஊறப்பண்ணும் மருந்து.
Seneka, Senega.	Sick-room நோவறை, நோயாளர் அறை.
Senna 74 சிலவாகை, நிலாவரை.	Sida Acuta 43 மலைதாங்கி, பொன் முசட்டை, வட்டத்திருப்பி.
“ Alexandrina, Alexandrian Senna.	“ Retusa மயிர்மாணிக்கம்.
Serna Indica, Tinnevelly Senna.	Sidhee, (H.) Bang.
Sepal சிபல், புல்லி. See Petal.	Sier Fish 294 அறுக்கிளாமீன்.
Serpentariae Radix, Serpentry Root.	Sieve அரிப்பெட்டி, சல்லடை, சிவ்வு.
Serpentry Root 209 சேபந்தாரி வேர்.	“ Drum பறைச்சவ்வு.
Sesameae 161 செசாமியங்கள்.	Si-har, Rhazya Stricta.
Sesamum Oil 161 நல்லெண்ணெய், எண்ணெய்.	Silica சிலிசி.
Sesamum Indicum 161 எள்ளு.	Silicate சிலிசியசு.
Sesbania Aegyptiaca செம்பை.	Silicious சிலிசியுள்ள.
Sesqui சார்த்த.	Silicium சிலிசியம்.
	Silver 394 வெள்ளி.
	Simarubae 57 சிமரூபியங்கள்.
	Simple தனி, கேவல.
	“ Ointment 291 லாடன்கென்.

SIN

Sinapis, Mustard.
 “ Juncea, Indian Mustard.
Sinapism 31 சினபிசம், கடுகுப்பிலாஸ்தர்.
Siphon சைபன்.
Sirium Myrtifolium, White Sandal Tree.
Sit-ruttee, (H.) Lesser Galangal.
Sittarittie, (H.) Lesser Galangal.
Slag கிட்டம்.
Slaked Lime 344 கல்சியைரசு, புட்பித்த சுண்ணம்.
Slate Blue வெண்ணீலம்.
Small Aloe 254 கற்றாழை.
 “ Chiretta சிறுகிரட்டுச்சி.
 “ Sebestens 168 சிறுநறுவிலி.
 “ Seeded Castor Oil Plant சிறுமணக்கு.
 “ Wood Apple குட்டிவிளாம், நிலவிளாம்.
Smelling Salt உறிஞ்சுப்பு.
Smilaceae 239 ஸ்மைலாசியங்கள்.
Smilacine ஸ்மைலாசின்.
Smilax China சீனக்கிழங்குப்பூடு.
 “ Glabra 240 அழுத்தஸ்மைலசுப்பூடு (Syphilis).
 “ Lanceaefolia 240 ஒடுக்கிலைஸ்மைலசுப்பூடு.
 “ Ovalifolia 240 மலைத்தாமரை.
Snake Bezoar பாம்புரோசனை.
 “ Stone பாம்புக்கல்.
Soap 145 சவுக்காரம், சபு.
 “ Liniment 145 சபுலினிமென்.
 “ Nut பொன்னுங்கொட்டை, புனலை, பூவந்தி.
 “ Plaster 145 சபுபிலாஸ்தர்.
 “ Stone, Saponite சபுனீற்று.
Socotrine Aloes 249 சொகோத்திரசகை.
Soda சோடம்.
 “ Caustica 332 Caustic Soda.
 “ Flux சோடத்திராவம்.
 “ Tartarata, Tartarated Soda.
 “ Water, Effervescing Solution of Soda.

SOL

Sodae Acetas, Acetate of Soda 340.
 “ Arsenias, Arseniate of Soda 339.
 “ Biboras, Borax.
 “ Bicarbonas, Bicarbonate of Soda 334.
 “ Carbonas, Carbonate of Soda 333.
 “ Citro-tartras Effervescens, Effervescent Citro-Tartrate of Soda 335.
 “ Nitras, Nitrate of Soda.
 “ Phosphas, 335 Phosphate of Soda.
 „ Sulphas, Sulphate of Soda 340.
 “ Valerianas, 342 Valerianate of Soda.
Sodii Chloridum, Chloride of Sodium 337.
Sodium சோடதம் 331 See Soda.
Soft Soap 146 மென்சபு, களிச்சவுக்காரம்.
 “ Water நன்னீர், மென்னீர்.
sohaga, (H.) Borax.
Sohunjuna, (H.) முருங்கை.
Solanaceae 182 சொலனாசியங்கள்.
Solanum 192 சொலானம், சொலானப்பூடு.
 “ Dulcamara 191 துல்சமாரக் கொடி.
 “ Ferox 193 ஆனைச்சுண்டை.
 “ Incertum 192 சொலானவிஞ்சேட்டப்பூடு.
 “ Indicum 193 முள்ளி, பப்பரமுள்ளி.
 “ Jacquini 192 கண்டங்கத்தரி.
 “ Nigrum 192 மணத்தக்காளி, கறுப்புமணத்தக்காளி.
 “ Rubrum சிவப்புமணத்தக்காளி, மணத்தக்காளி.
 “ Trilobatum 193 தூதுளை.
 “ Verbascifolium 193 மலைச்சுண்டை.
Solid கனம்.
 “ Storax கன ஸ்தைராக்சு.

SOL	SPI
Soluble திராவிய, விலயன, கரையக் கூடிய	Specific Weight, S. Gravity.
Solutio, Solution.	Sperm Whale 295 ஸ்பேந்திமிங்கலம்.
Solution நீர், நீரம், விலயனம், சொலூதம்.	Spermaceti 295 திமிநெய், மீன்கொழுப்பு.
Solution of Albumen 294 அல்புமின் நீர்.	Sphaeranthus Hirtus கொட்டக்கரந்தை.
“ Ammonia 314 அமோன நீர்.	Spice ஸ்பைசு, கறிச்சரக்கு, வாசனைச்சரக்கு.
“ Chloride of Arsenic ஆசெனிக குலோறிர நீர்.	“ Mill ஸ்பைஸ்மில், வாசனைச்சரக்கை அரைக்கும் சூத்திரம்.
“ Chlorinated soda சோடகுலோறாக நீர்.	Spike ஸ்பீகம், பூத்திரள்.
“ Lime 345 சுண்ணநீர்.	Spikenard, Indian Spikenard.
“ Perchloride of Iron (strong) 379 அயபிரகுலோறிர கரநீர்.	Spirit ஸ்பிறிது, ஸ்பிறிதம், சீது.
“ Pernitrate of Iron 381, அயபிரநீதுரசுநீர்.	“ of Bassia Latifolia Flowers காட்டிலுப்பைப் பூச் சீது.
“ Persulphate of Iron 378 அயபிர சல்வசுநீர்.	“ of French Wine, Brandy பிரண்டி.
“ Soda 332 சோடநீர்.	“ of Ether 278 ஈதர்ச்சீது.
“ Subacetate of Lead 370 ஈயவதவசிதசுநீர்.	“ of Hartshorn அமோன காபனசுநீர்.
“ Strychnia 156 ஸ்திரிக்னிநீர்.	“ Lamp சீது விளக்கு.
„ Terchloride of Antimony 353 அந்திமனிதிரிகுலோறிரநீர்.	“ of Nitrous Ether 278 நீதுரோசீதர்ஸ்பிறிது.
Solvent, Menstruum விலயனி, மென்ஸதுறம்.	Spirituos Liqueur அலக்காலுள்ளநீர், சீது.
Sorghum Vulgare சோளம்.	Spiritus, Spirit ஸ்பிறிது, சீது.
Sorrel சறெல், சறெல்பூடு.	“ Nitrici, Spirit of Nitrous Ether.
Sowa, (H.) Anethum Sowa.	“ Nitrosi, Spirit of Nitrous Ether.
Soymida Febrifuga, Rohun Tree.	Spiritus Ammoniae Aromaticus, Aromatic Spirit of Ammonia.
Soymidae Cortex, Rohun Bark.	“ A. Foetidus, Fetid Spirit of Ammonia.
Spartia ஸ்பாட்டியம்.	“ Cajuputi, Spirit of Cajuput.
Spartium Scoparium, Common Broom.	“ Juniperi, Spirit of Juniper.
Spatula ஸ்பத்துலை, துடிப்பு, முழை.	“ Lavandulae Compositus, Compound Tincture of Lavender.
Spearmint 177 ஸ்பீர்மிந்துப்பூடு.	“ Rectificatus, Rectified Spirit.
Specia Jar ஸ்பீஷசாடி, தொப்பிச்சாடி.	“ Tenuior, Proof Spirit.
Specific விசேட, விசேஷ, சுய.	“ Vini Gallici, Spirit of French Wine.
“ Medicine சுயமருந்து, ஸ்பெசீவம்.	
“ Abortive சுயவசனுதம்.	
“ Gravity விசேஷ கிருவிதம், விசேஷபாரம்.	

SPO	SUB
Spogel Seeds 194 இஸ்பஃஹ்லிரை.	Stramonii Folia, Stramonium Leaves.
Spondias Mangifera மரிமாஞ்செடி.	“ Semina, Stramonium Seeds.
Sponge ஸ்பஞ்சு.	Stramonium, Thorn Apple 185 ஸ்திராமுனிப்பூடு.
Spotted Hemlock 115 கோனியப் பூடு.	“ Leaves 185 ஸ்திராமுனியிலை.
Spreading Hog-weed மூக்குரட்டை.	“ Seeds 186 ஸ்திராமுனிவிரை.
Spruce Fir 230 பெர்கன்றிராள மரம், ஸ்புருசபீஸ்மரம்.	Strengthening Plaster மிண்டுப் பிலாஸ்தர்.
Spurge Laurel, Mezereon.	Strong Solution of Ammonia அமோனகரநீர்.
Squalin 293 ஸ்குவாலின்.	“ S. of Perchloride of Iron அயபிரகுலோறிகரநீர்.
Squalus Carcharias, White Shark.	“ Tincture of Ginger சுக்குகரரஞ்சம்.
Squill 252 ஸ்குவில், சீமைநரி வெங்காயம்.	Strychnia 156 ஸ்திரிக்னி.
Squirting Cucumber 104 எலதிரிக் கொடி.	Strychnic Acid ஸ்திரிக்னிக்கமிலம்.
Stannum, Tin.	Strychnos Colubrina 156 பாம்பெட்டிச்செடி.
Staphysagria ஸ்தவிசாகரிப்பூடு.	“ Nux Vomica, Nux Vomica.
Star Anise அண்ணாசுப்பூ.	“ Potatorum, Clearing Nut.
Starch 266 ஸ்தாட்சு, அமைலம்.	Sturgeon 292 ஸ்தேர்ச்சன் மீன்.
Steatite, Soap Stone.	Styptic 460 ஸ்திப்திகு, ஸ்தம்பனி, தம்பனி.
Stearine ஸ்தீயரின்.	“ Collid ஸ்தம்பனகலோடி.
Stearoptene ஸ்தியரப்தின்.	Styracaceae 143 ஸ்தைரகாசியங்கள்.
Steel உருக்கு, ஸ்தீல். [ஊ.]	Styracine 97 ஸ்தைரசின்.
Steer's Opodeldoc ஸ்தீரோபுடெல்	Styrax Benzoin, Benzoin Tree.
Sterculiaceae 41 ஸ்தேர்குலிபாசியங்கள்.	“ Praeparatus, Prepared Styrax.
Sternutatory, Errhine.	Styrax Balsam Tree 96 ஸ்தைரக்ஸ்பல்சமரம்.
Stibiated Tartar, Tartarated Antimony.	Suaeda Indica, Salsola Indica.
Stibium Oxidatum, Oxide of Antimony.	“ Nudiflora 195 நீருமரி.
Stick-Sulphur, Roll Sulphur.	Subacetate அதவசிதசு.
Stigma ஸ்திகம்மம், சூசினி.	“ of Lead ஈயவதவசிதசு.
Still ஸ்தில். இது நீரைக் காய்ச்சி அதின் ஆவியை இறுக்கி வடித்து எடுப்பதற்கான அணியம்.	“ Copper of Commerce கனிம்பு, சங்கால்பச்சை.
“ Pharmaceutical சிகிச்சஸ்தில்	Subchloride of Mercury 389 இரசவதகுலோறிரம், கலமல், இரசகர்ப்பூரம்.
Stillingia ஸ்திலிஞ்சி.	Subjee, (H.) Bang.
Stimulant 458 தீவனம், ஸ்திமூலம்.	Sublimate உச்சிகம், சப்பிலிமம், புடி.
Stomachic 446 ரோசனி, ஸ்தொமாகி.	
Stomach Pump குக்கிரேசி.	
Storax 96 ஸ்தைரக்பல்சம்.	
Strainer வடி, ஸ்திரேனர்.	

SUB	SWE
Sublimation உச்சீகரணம், சப்லிமித்தல்.	Sulphide of Iron 398 அயசல்விரம், Sulphite சல்விசு.
Sublimatum Corrosivum, Perchloride of Mercury.	Sulphocyanate of Ammonia அமோனசல்வுசையனசு.
Sublimatus Corrosivus, Perchloride of Mercury.	Sulphocyanic Acid சல்வுசையனிக் கமிலம்.
Sublimed Sulphur உச்சிககந்தி.	Sulphocyanide of Potassium பதாசியசல்வுசையனிரம்.
Subnitrate of Bismuth 360 பிஸ்முதவதநீதுரசு.	Sulphohydric Acid, Hydrosulphuric Acid.
Suboxide of Copper செம்பதவக் கிரம்.	Sulphur 303 கெந்தகம். கந்தி, சல்வு.
Subsulphate of Mercury இரசவத சல்வசு.	" Praecipitatum, Precipitated Sulphur 304.
Succedaneum சக்கிராணியம், பதற்சரக்கு.	" Sublimatum, Sublimed Sulphur 303.
Succinum, Amber.	Sulphurated Antimony 337 அந்திமனிசல்வுகம், அஞ்சனக்கல்.
Succus, Juice.	" Potash 323 பதாசிசல்வுகம்.
Sudorific சுவேதனி.	Sulphuret of Arsenic ஆசெனிகசல்விரம்.
Suet ஆட்டுக்கொழுப்பு, சீபம்.	" Antimony, Black Antimony.
Sugar 265 சருக்கரை, சீனி.	Sulphuretted Hydrogen, Hydrosulphuric Acid 398.
" Candy கற்கண்டு.	Sulphuric Acid 305 சல்வூரிக்கமிலம், கெந்தகத்திராவகம்.
" Cane 265 கரும்பு.	Sulphuris Iodidum, Iodide of Sulphur. [மிலம்.
" of Lead, Acetate of Lead.	Sulphurous Acid 306 சல்வூரோச
" of Milk 296 பாற்சீனி.	Sumach 87 சூமக்கு, சூமக்கெடி.
Suji-khar, (H.) Kharsuji.	Sumbul plant 116 சம்பற்பூண்டு.
Sulphate சல்வசு.	Sumbul Radix, Sumbul Root.
" of Atropia 185 அத்திரோபியசல்வசு.	" Root 116 சம்பற்கிழங்கு.
" Beberia 205 பிபேரியசல்வசு.	Sumrat-ul-asl, Galls of Tamarix Gallica.
" of Copper 385 செம்புசல்வசு, துருசி, மயில்துத்தம், துத்தந்துரிசி.	Sun Hemp ஜெனெப்பவிரை.
" Indigo இந்திகுசல்வசு.	Suppositoria Acidi Tannici, Tannic Acid Suppositories.
" Iron 376 அயசல்வசு, அன்னபேதி.	" Plumbi Composita, Compound Lead Suppositories.
" Magnesia மக்னீசிசல்வசு.	Suppositorium, Suppository.
" Mercury 389 இரசசல்வசு.	Suppository சப்பாசிதுறி, தலஸ்தம்.
" Potash 324 பதாசிசல்வசு.	Sus Scrofa, பன்றி, கிடி.
" Quinia கினியசல்வசு.	Sweet Basil 178 திருநீற்றுப்பச்சை, திருநீற்றுப்பத்திரி, குத்திரசடை, சப்சா.
" Soda 340 சோடசல்வசு.	
" Zinc 366 துத்தசலவசு, வெள்ளைத்துத்தம், பால்த்துத்தம்.	
Sulphide சல்விரம்.	
" of Ammonium அமோனதசல்விரம்.	

SWE	TEL
Sweet Flag 261 வசம்பு.	Tamarix Gall 37 சிறுசவுக்குமரத் தில் உண்டாகும் மாசக்காய்.
" Almond 290 தேன்வாதுமை.	Tamarix Gallica 37 சிறு சவுக்குமரம், ஆற்றுச் சவுக்குமரம், கோடசவுக்குமரம்.
" Scented Oleander 150 செவ்வலரி.	" Orientalis 37 சிவப்பாற்றுச்சவுக்குமரம், சிவப்புக்கோடசவுக்குமரம், சிவப்புச் சிறுசவுக்குமரம்.
Sydenham Laudanum சிடனும்லாடனம்.	Tan துவர்ப்பட்டைப்பொடி, தானு.
Symbol சின்னம்.	" Bath தானுதோயம்.
Symphytum சிம்விதப்பூடு.	Tannate of Iron அயதனசு.
Synthesis சம்யோகம், சிந்தசு.	Tannic Acid 223 தனிக்கமில்.
Syrian Nard 130 இமயவலீரியன் வேர்.	Tannic Acid Glycerine 224 தனிக்கமிலகிலைசரின்.
Syrup 265 சிறுபம், பாணி, சீனிதம்.	" A. Lozenges 224 தனிக்கமில் வில்லை.
" of Orange Flowers 51 தோடம்பூச் சிறுபம்.	" A. Suppository 223 தனிக்கமில்சப்பாசிதுறி.
" of Red Poppy 21 செங்கசகசாச் சிறுபம்.	Tansy தஞ்சிப்பூடு.
" Tolu 78 தொலுச்சிறுபம்.	Tar தார், கீல்.
Syrupus, Syrup.	" Water தாரீர்.
" Aurantii Floris, Syrup of Orange Flowers.	Taraxaci Radix, Dandelion Root.
" Tolutanus, Syrup of Tolu.	Taraxacum Dens Leonis தரக்கசப்பூடு.
Syzigium Jambolanum 102 நாவல், நாகம்.	Tartar Emetic, Tartarated Antimony.
Tabaci Folia, Leaf Tabacco.	Tartarated தாத்தரகம்.
Tabashir 269 மூங்கிலுப்பு.	" Antimony 358 அந்திமனிதாத்தரகம்.
Tabular பலகவு.	" Soda 344 சோடதாத்தரகம்.
Tacamahaca தாகமவகராளம். இது ஓர்வகை வாசனையுள்ள குங்கிலியம்.	Tartaric Acid 66 தாத்தரிக்கமில்.
Tacca Pinnatifida பெரிய கரணைக் கிழங்கு.	Tartarized, Tartarated.
Talipot Palm தளப்பம், கொட்டைப்பனை, தாளிப்பனை.	Tartarate of Potash 327 பதாசிதாத்தரசு.
Tamalpathri Folia, Tudje.	Tartaratum, Tartarated.
Tamarind புளி, புளியங்கனி.	Tasteless Ague Drop கைப்பற்றசுரத்துளி.
" Stone 73 புளியங்கொட்டை.	Tea தேயிலை.
" Tree 73 புளியமரம்.	Teak Tree 175 தேக்கமரம்.
Tamarindi Pulpa, Tamarind Pulp. 73 பழப்புளி.	Tear சொட்டு.
Tamarindus Indica, Tamarind.	Tectona Grandis, Teak Tree.
Tamariscineae 37 தாமரிஸ்சினியங்கள்.	Tej or Tedj pat, (H.) Tudje,
Tamarisk Tree சவுக்குமரம்.	Telini Fly 289 கொப்புளவண்டு, பிளிஸ்தீ,

TE	Tl
Tellicherry Bark, Bark of Holar- rhena Antidysenterica.	Thespesia Populnea 43 பூரசுமரம்.
Tenacious பிசினியான.	Thevetia Neriifolia, Exile Ole- ander.
Tephrosia Purpurea கொள்ளுக்கா ய் வேளை.	Thick-leaved Lavender 180 கர்ப் பூவள்ளி.
Terchloride of Arsenic ஆசெனிக் திரிகுலோதிரம்.	Thion, Sulphur.
Terebinthina, Common Frankin- cense.	Thit-tsi, (Bur.) Black Varnish.
“ Canadensis, Canada Balsam.	Thorn Apple 185 ஸ்திரூமுனிப்பூடு.
Terminalia Bellerica, Belleric My- robalans Tree.	Thus Americanum, C o m m o n Frankincense.
“ Catappa, Indian Almond.	Thymelaceae 200 தைமெலாசியங் கள்.
“ Chebula, Chebulic Myro- balans Tree.	Tiaridium Indicum 169 தேட்கொ டுக்கி.
“ Glabra வெள்ளை மருதமரம்.	Til Oil, Sesamum Oil.
“ Tomentosa 99 கறுப்பு மருதம ரம்.	Tin தகரம், வெள்ளியம்.
Tersulphuret of Antimony அந்தி மனிதிரிசல்விரம்.	Tinctura, Tincture.
Test சோதனை,	“ Camphorae Composita, Com- pound Tincture of Cam- phor.
“ Paper சோதனைத்தாள்.	“ C. cum Opio, Compound Tincture of Camphor.
“ Tube சோதனைக்குழல்.	“ Ferri Acetatis, Tincture of Acetate of Iron.
Test Solutions 398 சோதனைநீர்கள்.	“ F. Muriatis, Tincture of Perchloride of Iron.
“ for Volumetric estimations 402 பருமமதிப்புக்குச்சோத னைநீர்கள்.	“ Ferri Perchloridi, Tincture of Perchloride of Iron.
Tetrachloride of Carbon காபன் சதுகுலோதிரம்.	“ Ferri Sesquichloridi, Tinc- ture of Perchloride of Iron.
Tetranthra Roxburghii முசைப் பேயெட்டி, மைதாலக்டி, பி சுன்பட்டை.	“ Guaiaci Ammoniata, Am- moniated Tincture of Guai- cum.
Thalictrum Foliosum 13 தலிக்து ரம்வோலியுலோசம்.	“ Lavandulae Composita, Com- pound Tincture of Lavender.
Than-mo, (Bur.) Polyporus An- thelminticus.	“ Lobeliae Ætherea, Ethereal Tincture of Lobelia.
Thansa, (H.) Pinus Longifolia.	“ Opii, Tincture of Opium.
Thea, Tea.	“ Opii Camphorata, Compound Tincture of Camphor.
Theobroma 44 தியுபுரோமம், தியுபு ரோமநெய்.	“ Zingiberis Fortior, Strong Tincture of Ginger.
Theobroma Cacao, Theobroma.	Tincture ரஞ்சம், திந்தூறம், திஞ்சர்.
Therapeutic Agent ரோககரி, திரு பியகரி.	“ of Acetate of Iron 378 அயவ சித்சிரஞ்சம்.
Theriaca, Treacle.	
Thermometer தாபமானி.	

TI	UL
Tincture,	Trichosanthes Cordata 106 கடாத திரிக்குசாந்திஸ்கொடி.
“ Aconite 9 அகனிதரஞ்சம்.	“ Cucumerina பேய்ப்புடல்.
“ of Calumba 15 களும்பிரஞ்சம்.	“ Dioica , or.
“ of Gulancha 17 சந்திலிரஞ்சம்.	“ Nervifolia 105 கொம்புப்புடல்
“ of Indian Barberry 20 இந்து பாபெரி யிரஞ்சம்.	“ Palmata 106 கோரட்டை, சவ ரிப்பழம்.
“ of Kino 79 கினூரஞ்சம்.	Trigonella Foenum Graecum , Fe- nugreek.
“ Opium 25 அவினிரஞ்சம், லாட னம்.	Tripoli திரிப்பலிக்கல்.
“ Perchloride of Iron 379 அயபி ரகுலோதிரஞ்சம்.	Triticum vulgare , Wheat.
“ of Senna 75 நிலவாகைரஞ்சம்.	Trituration அரைத்தல்.
“ of Tolu 78 தொலுரஞ்சம்.	Trochisci Acidi Tannici , Tannic Acid Lozenges.
Tinian Pine , Casuarina Muricata .	“ Ferri Redacti , Reduced Iron Lozenges.
Tinnevelly Senna 74 நிலவாகை, நிலாவரை.	Trochiscus , Troche , Lozenge .
Tinospora Cordifolia , Gulancha .	Tsein-apho , (Bur.) 240 திசைனவு க்கிழங்கு.
“ Crispa , Cocculus Villosus .	Tuber or Bulb கிழங்கு.
Tobacco 190 புகைமலை, தபாக்கம்.	Tudje , 208 (H.) தாளிசவிலை.
Tissue Paper திசுத்தாள், மெல்லிய தாள்.	Tungstate of Lead ஈயதங்குஸ்தசு.
Toddalia Aculeata , Toddalia .	Turanjbin , (Bur.) 89 அல்காகிம ரோர (Alhagi Madrortum) செடியின் மன்னு.
Toddalia 55 மிளகரணை.	Turbid கலங்கலான.
Toddy கள்ளு.	Turbith Mineral , Yellow Sulphate of Mercury.
Tolu Balsam 77 தொலுபல்சம்.	“ Root 167 சிவதை, சிவதைவேர்.
Tolu Balsam Tree 77 தொலுபல் சமரம்.	Turmeric 243 மஞ்சள், காஞ்சனி.
Tonic 441 ஓசதி, தொணிகம்.	“ Paper 244 மஞ்சட்டாள்.
Tragacanth 83 திரககந்துச் செடி.	Turpentine , Oil of Turpentine .
“ Gum 83 திரககந்துப்பிசின்.	Tutenague துத்தநாகம்.
“ Mucilage 83 திரககந்துமுசிலாகு.	Tutia , Tutty .
“ Compound powder of 84 திர கந்துக்கூட்டுச்சூரணம்.	Tutty , (H.) அசுத்த துத்தவக்சிரமா கிய ஆகரி.
Tragacantha , Tragacanth .	Twining Plant ஏறுகொடி.
Translucent உருவொளியான, திரு ன்லாச.	Tylophora Asthmatica , Indian Ipecac .
Trapa Bispinosa பன்றிமொத்தை, பண்ணிமோந்தான்கிழங்கு.	Typhonium Orixense 262 கரணைக் கிழங்கு, கார்கரணைக்கிழங்கு.
Treacle , Theriaca தெறியகம், இக் குப்பாணி.	Ulmaceae 225 உல்மாசியங்கள்.
Tree மரம், விருட்சம்.	Ulmi Cortex , Elm Bark 225 உல் மஸ்பட்டை.
Tribulus Lanuginosus 47 நெருஞ்சி.	
Trichodesma Indicum 168 இந்துத் திரிகுடெஸ்மம். [ஸ்மம்]	
“ Zeylanica இலங்கைத்திரிகுடெ	

UL

Ulmus 225 உல்மஸ்மரம்.
 Umbelliferae 108 உம்பெலீவிரங்கள்.
 Uncaria Gambir, Gambir Plant.
 Unctuous நெய்ப்புள்ள.
 Unguentum, Ointment.
 " Gallae cum Opio, Ointment of Galls and Opium.
 " Hydrargyri Compositum, Compound Ointment of Mercury.
 " Simplex, Simple Ointment.
 " Zinci, Ointment of Zinc.
 " Z. Oxidi, Ointment of Zinc.
 Unimpregnated சாரமேறாத.
 Unofficinal அவாகட, வாகடமுறையற்ற.
 Unslaked Lime புட்பியாத சுண்ணம், உடன்சுட்டசுண்ணம், காரச்சுண்ணம்.
 Urginea Indica, Indian Squill.
 " Scilla, Officinal Squill ஸ்குவில்.
 Urticeae 226 ஏர்திசியங்கள்.
 Ustum, Calcined எரித்த.
 Utees 255 கிளவரிக்கிழங்கு.
 Uva Ursi, 140 யூவயூர்சி, Bearberry shrub.
 Uvae, Raisins.
 " Ursi Folia, Bearberry Leaves.
 Valerian 129 வலீரியன்பூடு.
 " Root 129 வலீரியன்வேர்.
 Valeriana, Valerian. [லீரியன்.
 Valeriana Hardwickii 130 இமயவ.
 Valerianeae 129 வலீரியானியங்கள்.
 Valerianae Radix, Valerian Root.
 Valerianate of Soda 342 சோடவலீரியனசு.
 " Zinc 364 துத்தவலீரியனசு.
 Vapor வேப்பர், வாஷ்பம்.
 " as Inhalation.
 " Acidi Hydrocyanici, Inhalation of Hydrocyanic Acid.
 Varieties பேதம், வகை.
 Varnish வாணிசு.

VI

Vateria Indica 41 வெள்ளைக்குன்றிகம், வெள்ளைடாமர்.
 Vatica Tumbugaia 61 கறுப்புடாமர்.
 Vegetable தாவரம், உற்பீசம்.
 Vegetable Materia Medica 9 தாவரபதார்த்தசாரம்.
 Vehicle அனுபானம்.
 Vellarine வல்லாரின்.
 Vera, True, Real உள்ள, உண்மையான.
 Veratria 258 விருத்தி.
 Veratri Viridis Radix, Green Hellebore Root.
 Veratrum Viride, Green Hellebore.
 Verbena, Lemon Grass.
 Verbenaceae 174 வெர்பினோசியங்கள்
 Verdigris, Subacetate of Copper of Commerce.
 Verjuice வெர்குசு, திராட்சக்காய்ச்சாறு.
 Vermifuge கிருமிகொல்லி, வேமிவுச்சு, குணுகினி.
 Vermilion நுண்ணியமாவான சாடிலிங்கம்.
 Vernonia Anthelmintica 136 காட்டுச்சீரகம்.
 Vesicant 462 கொப்புளிக்கும். மருந்து, விஸ்பொடி, வெசிகன்.
 Vesication கொப்புளித்தல், வெசிகாசன்.
 Vial வையல், குப்பி.
 Villarsia Indica பெரியவாகாசத்தாமரை.
 Vina, Wines வைன்வகை, மருத்துவைன்கள்.
 Vinegar 291 காடி, வின்னூரி.
 " of Cantharides 288 கந்தாரிஸ்காடி.
 " of Squill 252 ஸ்குவிற்காடி.
 Vinum, Wine.
 " Antimoniale, Antimonial Wine.
 " Colchici, Wine of Colchicum.

VI	WI
Vinum Stibiatum, Antimonial Wine.	Warm Water வெதுநீர்.
“ Xericum, Sherry.	Wash, Lotion.
Viola Odorata, Violet.	Water 300 நீர், தண்ணீர், அக்குவம்.
“ Suffruticosa ஒரிசைத்தாமரை.	“ Medicated மருத்துநீர்.
Violet color வியுலெற்று.	“ of Caraway 109 கறுவிநீர்;
“ plant வியோலப்பூடு.	“ Laurel 93 லாறுசெருசுநீர்;
Virginian Snake-root, Serpentry Root.	“ Pimento 101 பிமெந்தநீர்.
Virgin Scammony சுத்தஸ்கமுனி.	“ Rose 90 ரோசைநீர்.
Virtue சத்து.	“ Bath சலமத்திகம். See Bath.
Viscum Monoicum 119 புல்லுருவி, புல்லூரி.	Wax 290 மெழுகு.
Vitellus Ovi, Yelk of Egg.	Wedgewood Tile வெச்சுப்பலகம்.
Vitex Negundo 174 வெண்ணொச்சி, நொச்சி.	Weights நிறைகள்.
“ Trifolia 174 நீர்நொச்சி, சிறு நொச்சி.	“ Apothecaris சிகிச்சாநிறை.
Vitis Quadrangularis பிரண்டை.	“ Avoirdupois அவுடுபாநிறை.
“ Vinifera, Grape vine.	“ Cup கிண்ணியான பழிகள்.
Vitrified Ash சாம்பற்கிட்டம்.	“ Troy திரூய்நிறை.
Vitriol வித்திரல். ஆடிவம்.	Whale 295 திமி, திமிங்கலம்.
Vitriolic Acid, Sulphuric Acid.	Whale bone probe திமிக்குச்சு.
Viverra Zibetha 299 Civet Cat நாவிப்பூனை.	Wheat 266 கோதுமை.
Volatile அத்திர.	Wheaten Flour 266 கோதுமைமா.
“ Alkali, Ammonia.	Whey உவேய், ததிநீர், தயிர்த்தண்.
“ Oil அத்திரதேலம்.	“ நீர்.
Volatility அத்திரத்துவம், அத்திரமை.	Whiskey விஸ்கி.
Volatilized ஆவியாய்ப்போன, குடிபோன.	White Basil கஞ்சாங்கோரை.
Volcanic அக்கினிமலைக்குரிய, வல்கன.	“ Copperas. Sulphate of Zinc.
Volume பருமம்.	“ Guava 102 வெள்ளைக்கொய்யா
Volumetric Solution பருமநீர்.	“ Hellebore வெண்கடுரோணிப்
Vomit வமி.	“ பூடு.
Vulcanite வல்கனீற்று, வைரக்கூச்சு.	“ Lead. Carbonate of Lead.
Wafer வேவர்.	“ Marble வெண்மாரபிள்.
Walnut அக்குரோட்டு.	“ Poppy 21 கசகசா, போஸ்தகா.
Wa-mo, (Bur.) Polyporus Anthelminticus.	“ Precipitate, Ammoniated Mercury.
Warm plaster வெம்பற்று, கனற்று ம் பிலாஸ்தர்.	“ Shark 293 பாற்குரு.
	“ Vitriol, Sulphate of Zinc.
	“ Wax 290 வெண்மெழுகு.
	“ of Egg முட்டையின்வெண்கரு.
	Wild Cinnamon காட்டுக் கறுவாப்
	பட்டை.
	“ Date ஈஞ்சு.
	“ Liquorice குன்றிமணி, குண்டு மணி.
	“ Nutmeg காட்டுச்சாதிக்காய்.
	“ Pine 234 காட்டுப்பைன்.



WI	ZI	[கு]
Wine 275 வைன், வைனம், திராட்சச்சாராயம். [ன்.	Yellow Flowered Cotton Tree தன	
" Colchicum 256 கொல்சிகவை	" Mercurial Lotion 392 இரசபீ	
" Ipecacuanha 126 இபிகாக்வைன்.	தலோஷன்.	
" Quinia 122 கினியவைன்.	" Oleander, Exile Oleander.	
" Sherry 275 செரிவைன்.	" Orpiment, Yellow Sulphuret of Arsenic.	
Winter Cherry 193 அமுக்கிரா, அசுவகந்தி.	" Oxide of Mercury இரசபீதவக்சிரம்.	
" Green, Gaultheria.	" Precipitate பீதவதகம்.	
Withania Coagulans, Puneeria Coagulans 193 புனீர்ச்செடி.	" Prussiate of Potash 398 பதாசிபீதபுருசியசு.	
" Somnifera, 193 Winter Cherry அமுக்கிரா.	" Root இமயமலைச்சாரலில் உண்டாகும் Pilajari எனப்படும் மஞ்சள் நிறமுள்ள வேர்.	
Wood Apple 56 விளாம்பழம்.	" Soap மஞ்சட் சவுக்காரம்.	
" A. Gum 56 விளாம்பிசின்.	" Sulphate of Mercury இரசபீதசல்வசு.	
" A. Tree 56 விளாத்தி, விளாமரம்.	" Sulphuret of Arsenic அரிதாரம், தாரம், பொன்னரிதாரம், தாளகம்.	
" Charcoal 300 மரக்கரி.	" Thistle பிரமதண்டு.	
" Oil Tree, Gurjun Tree.	" Wax 290 செம்மெழுக்கு.	
" Tar 234 மரத்தார்.	Yolk, Yelk.	
Worm Killer கிருமிகொல்லி.	Zanthoxylum Alatum 56 சந்தச்சைலவலாதமரம். [மரம்.	
" Mushroom, Polyporus Anthelminticus.	" Hastile 56 சந்தச்சைலகஸ்திலி	
Wormseed, Santonica.	" Budrunga 56 சந்தச்சைலபுடுங்கமரம்.	
Wrightia Tinctoria 149 வெட்பாலை யரிசி, வெட்பாலைவிரை, Often confounded with Holarrhena Antidysenterica.	Zapavia Nodiflora பொடுதலை, பொற்றலைக்கையாரந்தகரை.	
Xanthochymus Pictorius தமால் செடி, சீகடிமரம்.	Zea Mays, Maize.	
Xylocarpus Granatum 64 கடற் றென்னை.	Zedoary இஞ்சியைப்போன்றதும், அதிலுங் காரசாரங்குறைந்த துமான கிழங்கு. இது இலங் கையிலும் இந்துவிலும் உண் டாகும்.	
Xyloidin சைலுயிதின்.	" Long, Curcuma Zedoaria.	
Xyris Indica கொச்சிலித்திப்புலு.	" Round, Curcuma Aromatica.	
Yeast 275 நொதி, யீஸ்து.	" Turmeric Colored, Zingiber Cassumunar.	
Yeast poultice 275 யீஸ்துப்பாப்பை	Zerumbet Zedoary, Kaempferia Rotunda.	
Yelk of Egg கவுரம், செங்கரு.	Zerumbad, Zingiber Zerumbet.	
Yellow மஞ்சணிற்முள்ள, பீதம், யெலு.	Zibeth, Civet Cat நாவிப்பூனை.	
" Cinchona Bark 120 பீதசின்க னப்பட்டை.		
" Arsenic, Teriodide of Arsenic ஆசெனிகத்ரீயோதிரம்.		

ZI	ZY
Zinc துத்தம், சிங்கு, துத்தநாகம்.	Zingiber Cassumunar, 242 கசு முனாவிஞ்சி.
Zinci Acetas, Acetate of Zinc.	" Zerumbet 242 செறும்பெற்றிஞ்சி.
" Carbonas, Carbonate of Zinc.	Zingiberis Radix, Ginger Root.
" Chloridum, Chloride of Zinc.	Zira-siah, (H.) Fruit of Carum Nigrum.
" Oxidum, Oxide of Zinc.	Zizyphus Jujuba இலந்தை.
" Sulphas, Sulphate of Zinc.	Zygophylleae சைகுலீலியங்கள்.
" Valerianas, Valerianate of Zinc.	
Zincum, Zinc.	
" Granulatum, Granulated Zinc	
Zingiber, Ginger.	

பரம வைத்தியராகிய
 இயேசுக்கிறிஸ்து நாதரே !
 ஆத்மாவின் இாட்சிப்புக்குரிய உமது
 சத்தியம் என்னும் அவுஷதத்தால்
 பற்பல தேசத்தாரில் பிடித்திருக்கிற
 விக்கிரகாராதனை என்னும் ரோகத்தை
 நீக்கினது போல
 தேவரீர் இரங்கி
 தமிழ்நாட்டிலுமிருந்து
 அக் கேடு சீக்கரமாக நீங்குவதற்கு
 இப் புஸ்தகம்
 உதவப்பண்ணியருள்வீராக.